

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА
ФИЛИАЛ МГУ имени М. В. ЛОМОНОСОВА
В г. УЛЬЯНОВСКЕ
УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

СЕРИЯ "ПРИРОДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ВЫПУСК 2

**В. В. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ,
Н. С. РАКОВ**

**КОНСПЕКТ ФЛОРЫ
ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ
РАСТЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ**

УЛЬЯНОВСК, 1994

УДК 581.9 /471.42/

ББК 28.592 /2Р 354-4 Ул./

Б 68

ВВЕДЕНИЕ

Конспект флоры - это инвентарь флоры того или иного региона с указанием кратких сведений о каждом виде растений. Конспект флоры - это необходимая предпосылка для многих других теоретических и практических работ, связанных с изучением, рациональным использованием и охраной растительного мира. Прежде всего, конспект флоры - фактическая основа для составления определителей растений, большое значение которых общеизвестно. Также материалы конспекта флоры позволяют произвести экологический анализ флоры (по жизненным формам, экологическим типам) и ботанико-географический (ареалогический) анализ флоры, что важно и с научной, и с практической точек зрения. Для целей рационального использования растительного мира конспект флоры помогает выделить хозяйственно-важные группы растений (пищевые, кормовые, лекарственные, медоносные и др.) и степень участия их в растительном покрове региона, что важно для установления степени их разумной эксплуатации. В интересах охраны природы конспект флоры позволяет установить наличие в регионе редких и исчезающих видов растений, что создает основу для разработки мероприятий по их сохранению и восстановлению.

Для Ульяновской области первый конспект флоры был составлен более 15 лет назад силами ботаников Ульяновского педагогического института, на основе которого был создан определитель растений. Но в настоящее время появилась крайняя необходимость в написании нового конспекта флоры высших сосудистых растений Ульяновской области. За прошедшие годы ботаниками области проведена большая исследовательская флористическая работа, в результате которой выявилось, что число видов растений в Ульяновской области оказалось значительно большим, чем считалось раньше. Если в прежнем конспекте флоры для области было зафиксировано 1366 видов высших сосудистых растений, то теперь это оценивается цифрой 1428 видов. Увеличение числа видов в значительной степени произошло за счет распространения по области адвентивных (заносных) видов растений и одичания некоторых культурных растений. Но и в естественных растительных сообществах обнаружено немало новых видов растений, которые раньше или просматривались или не были найдены из-за недостатка исследований. Кроме того, Н. С. Раковым с территории Ульяновской области был открыт и описан совместно с Н. Н. Цвелесвым, профессором Ботанического института Российской Академии Наук, новый для науки вид растения - льянка волжская, а совместно с научным сотрудником Жигулевского государственного заповедника С. В. Саксоновым описан новый гибрид ветренички алтайской и ветренички лютиковой, названной ветреничкой Коржинского. В то же время некоторые виды (правда их немного) оказались ошибочно указанными для области.

Не менее важным было, что за истекший период собрано много новых сведений о распространении видов растений по территории Ульяновской области, что позволяет привести более точные данные об их географии и приуроченности к определенным местообитаниям. Это важно для рационального использования

тех или иных видов растений и для установления степени редкости определенных видов и возможности их охраны.

В предлагаемом "Конспекте флоры высших сосудистых растений Ульяновской области" для каждого вида растений приводятся следующие данные:

В некоторых случаях приводятся и некоторые другие данные: наличие вида на границе ареала, реликты и эндемы, заносные и одичавшие растения.

В "Конспекте флоры" систематические таксоны расположены в той же последовательности, что и в "Определителе растений Среднего Поволжья" (Л., 1984). Для отделов, классов и семейств приведены латинские и русские названия, нумерация их сквозная. Роды в семействах отдельно не выделены, а в пределах каждого семейства виды приведены в алфавитном порядке и они пронумерованы. Нумерация для всех видов, приводимых в "Конспекте", сквозная и указана в скобках.

При характеристике жизненных форм и распространении видов по территории области приняты следующие условные сокращения: Д. - дерево; К. - кустарник; Кч. - кустарничек; Пк. - полукустарник или полукустарничек.; Тм. - травянистый многолетник; Дв. - двулетник; Од. - однолетник; Пв. - вид повсеместно распространен по области; Сп. - вид спорадически распространен во области; Из. - вид изредка встречается по всем районам области или только в ее правобережной части (Пб.) или только в ее левобережной части (Лб.).

В случае, если известно точное распространение вида по административным районам Ульяновской области (которых 21), то районы обозначены арабскими цифрами, а именно: 1 - Сурский; 2 - Цильнинский; 3 - Старомайнский; 4 - Карсунский; 5 - Майнский; 6 - Ульяновский; 7 - Чердаклинский; 8 - Мелекесский; 9 - Новомалыклинский; 10 - Инзенский; 11 - Вешкаймский; 12 - Тереньгульский; 13 - Сенгилеевский; 14 - Барышский; 15 - Кузоватовский; 16 - Николаевский; 17 - Новоспасский; 18 - Радищевский; 19 - Павловский; 20 - Старокулаткинский; 21 - Базарно-Сызганский.

Для редких растений приведены общепринятые степени редкости вида: Р0 - по-видимому, исчезнувшие: виды не встреченные в природе в течение ряда лет, но, возможно, уцелевшие в отдельных недоступных местах или сохранившиеся в культуре. Р1 - находящиеся под угрозой: виды, подвергающиеся непосредственной опасности вымирания, дальнейшее их существование невозможно без осуществления специальных мер охраны. Р2 - редкие: виды, не подвергающиеся прямой угрозе исчезновения, но встречающиеся в таком небольшом количестве, либо в таких ограниченных по площади и специализированных местах обитания, что они могут быстро исчезнуть. Р3 - сокращающиеся: виды, численность которых сокращается, а ареал сужается в течение определенного времени либо по естественным причинам, либо из-за вмешательства человека, либо из-за того и другого вместе. Р4 - неопределенные: виды, возможно находящиеся под угрозой, но недостаток сведений не позволяет дать достоверную оценку их современного состояния.

В "Конспекте флоры" приведен список видов, исчезнувших из флоры Ульяновской области, и список основной литературы.

При написании "Конспекта флоры" были также использованы материалы по флоре Ульяновской области, представленные И. В. Благовещенским, А. В. Масленниковым, Л. А. Шалдыбиной и А. Ю. Исаевым, которым мы приносим искреннюю благодарность.

КОНСПЕКТ ФЛОРЫ

Отдел 1. Lycopodiophyta — Плаунообразные

Класс 1. Lycopodiopsida — Плауновидные

Сем. 1. Lycopodiaceae — Плауновые

1/1/. *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub. — **Дифазиаструм сплюснутый**. Тм. VI-VIII. В сосняках зеленомошниках. Сп. Р2. На ю. границе ареала.

2/2/. *Lycopodium annotinum* L. — **Плаун годичный**. Тм. VI-VIII. В сосновых и сосново-еловых лесах зеленомошниках. Сп. Р3. На ю. границе ареала.

3/3/. *L. clavatum* L. — **П. булавовидный**. Тм. VII-VIII. В сосновых, сосново-еловых и сосново-широколиственных лесах зеленомошниках. Сп. Р3 На ю. границе ареала.

Сем.2. Huperziaceae — Баранцевые

1/4/. *Huperzia selago* (L.)bernh.ex Schrank et Mart. — **Баранец обыкновенный**. Тм. VI-VIII. Елово-сосновые леса. В рн. I. Ро. На ю. границе ареала.

Отдел 2. Equisetophyta — Хвощеобразные

Класс 2. Equisetopsida — Хвощевидные

Сем. 3. Equisetaceae — Хвощевые

1/5/. *Equisetum arvense* L. — **Хвощ полевой**. Тм. IV-V. На берегах рек, обрывах, сырых лугах, на полях. Пв.

2/6/. *E. fluviatile* L. — **Х. приречный**. Тм. VI-VII. На болотистых лугах, по берегам водоемов, в заболоченных лесах. Пв.

3/7/. *E. hyemale* L. — **Х. зимующий**. Тм. IV-V. По лесам. Сп.

4/8/. *E. palustre* L. — **Х. болотный**. Тм. VI-VII. В заболоченных лесах, на лугах, по берегам водоемов. Пв.

5/9/. *E. pratense* L. — **Х. луговой**. Тм. V-VII. Влажные леса, луга, берега рек. Пв.

6/10/. *E. ramosissimum* Desf. — **Х. ветвистый**. Тм. V-VI. По берегам рек. Ро.

7/11/. *E. sylvaticum* L. — **Х. лесной**. Тм. V-VI. В лесах. Пв.

Отдел 3. Polypodiophyta — Папоротникообразные

Класс 3. Polypodiopsida — Папоротниковидные

Сем. 4. Ophioglossaceae — Ужовниковые

1/12/. *Botrychium lunaria* (L.) Sw. — **Гроздовник полулунный**. Тм. V. Нагорные дубравы. В рн. 1, 8, 10. Р1. На ю. границе ареала.

- 2/13/. *B. multifidum* (S.G.Gmel.) Rupr. — **Г. многораздельный**. Тм. VI-VII. Разреженные сосновые леса. В рн. 16,18. P2. На ю. границе ареала.
3/14/. *Ophioglossum vulgatum* L. — **Ужовник обыкновенный**. Тм. VI-VII. Лесные поляны, сырые луга. В рн. 1,16. P2. На ю. границе ареала.

Сем. 5. Onocleaceae — Оноклеевые

- 1/15/. *Matteuccia struthiopteris*(L) Tod. — **Страусник обыкновенный**. Тм. VII-VIII. По влажным затененным оврагам и лесам, у лесных ручьев. Сп.

Сем. 6. Athyriaceae — Кочедыжниковые

- 1/16/. *Athyrium filix-femina* (L.) Roth — **Кочедыжник женский**. Тм. VI-VII. В сырых лесах, у лесных ручьев, на торфяниках. Сп.
2/17/. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. — **Пузырник ломкий**. Тм. VI- VII. По влажным затененным лесным местам. Сп.
3/18/. *Diplazium sibiricum* (Turcz.ex G.Kunze)Kurata — **Диплазиум сибирский**. Тм. VII. В сырых сосново-широколиственных лесах. В рн. 1, 10, 14. P2. На ю. з. границе ареала.

Сем.7. Aspidiaceae — Щитовниковые

- 1/19/. *Dryopteris austriaca* (Jacq.)Woinar ex Schinz et Thell. — **Щитовник австрийский**. Тм. VI-VIII. В сырых хвойно-широколиственных и заболоченных лесах. Из.
2/20/. *D. cristata* (L.) A. Gray — **Щитовник гребенчатый**. Тм. V. На торфяных болотах. P2. На ю. границе ареала.
3/21/. *D. filix-mas* (L.) Schott — **Щитовник мужской**. Тм. VI-VII. В тенистых лесах. Пв.
4/22/. *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newm. — **Голокучник Линнея**. Тм. VI-VII. В тенистых хвойно-широколиственных лесах. Сп.

Сем. 8. Thelypteridaceae — Телиптериевые

- 1/23/. *Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt — **Фегоптерис связывающий**. Тм. VI-VII. В сосняках зеленомошниках. В рн.16. P2.
2/24/. *Thelypteris palustris* Schott — **Телиптерис болотный**. Тм. VII-VIII. В заболоченных лесах и на торфяных болотах. Из.

Сем. 9. Hypolepidaceae — Гиполеписовые

1/25/. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn — **Орляк обыкновенный**. Тм. VI. По осветленным лесам и вырубкам. Пв.

Сем. 10. Polypodiaceae — Многоножковые

1/26/. *Polypodium vulgare* L. — **Многоножка обыкновенная**. Тм. VII-VIII. На тенистых скалах сливного палеогенового песчаника. В рн. 12. P2.

Сем. 11. Salviniaceae — Сальвиниевые

1/27/. *Salvinia natans* (L.) All. — **Сальвиния плавающая**. Од. VIII-IX. В стоячих водоемах с чистой водой. В рн. 1, 3, 8. P2. Реликт.

Отдел 4. Pinophyta (Gymnospermae) — Голосеменные

Класс 4. Pinopsida (Coniferae) — Хвойные

Сем. 12. Pinaceae — Сосновые

Larix sibirica Ledeb. — **Лиственница сибирская**. Д. V. В парках, скверах, палисадниках, в уличных посадках. Интр. Родина - Сибирь.

1/28/. *Picea abies* L. — **Ель обыкновенная**. Д. V. В сосновых и лиственных лесах на суглинистой и супесчаной почве. В рн. 1,6. P3. На ю. границе ареала.

2/29/. *P. obovata* Ledeb. — **Ель сибирская**. Д. V. В сосновых лесах. В рн. 1. P2. На ю.-з. границе ареала.

3/30/. *Pinus sylvestris* L. — **Сосна обыкновенная**. Д. V-VI. На песчаных и супесчаных почвах, реже на суглинистых. Пв.

4/31/. *P. sylvestris* L. var. *cretacea* Kalenicz ex Kom — **Сосна меловая**. Д. V-VI. На меловых обнажениях и щебнистых карбонатных почвах. В рн. 11,13,16,17,18. На с. границе ареала. Реликт. P1.

5/32/. *P. sylvestris* L var. *nana* Pall. — **Сосна болотная**. Д. V-VI. На торфяных болотах и сфагновых сплавинах озер. В рн. 1, 10, 12, 14, 15, 16. P1. На ю. границе ареала.

Сем. 13. Cupressaceae — Кипарисовые

1/33/. *Juniperus communis* L. — **Можжевельник обыкновенный**. К. V. В сосновых и сосново-широколиственных лесах. В рн. 1,2,3, 5, 7, 10, 14. P2. На ю. границе ареала.

Thuja occidentalis L. — **Туя западная**. Д. или К. V. Встречается только в культуре. В парках, скверах, в живых изгородях, реже в палисадниках. Интродуцент. Родина - вост. часть Сев. Америки.

Класс 5. Gnetopsida — Гнетовые
Сем. 14. Ephedraceae — Хвойниковые

1/34/. *Ephedra distachya* L. — **Хвойник двуколосковый**. Кч. V-VI. По меловым и мергелистым склонам, на песках. В рн. 4, 6, 8, 13, 16, 18, 20. P3. На с. границе ареала.

Отдел 5. Magnoliophyta (Angiospermae) — Покрытосеменные
Класс 6. Magnoliopsida (Dicotyledones) — Двудольные
Сем. 15. Aristolochiaceae — Кирказоновые

1/35/. *Aristolochia clematitis* L. — **Кирказон обыкновенный**. Тм. V-VII. По берегам рек, в пойменных лесах, кустарниках. Сп.

2/36/. *Asarum europaeum* L. — **Копытень европейский**. Тм. V. В широколиственных, сосново-широколиственных и осиновых лесах. Пв.

Сем. 16. Nymphaeaceae — Кувшинковые

1/37/. *Nuphar lutea* (L.) Smith. — **Кубышка желтая**. Тм. V-VIII. В реках и озерах. Пв. P3.

2/38/. *N. pumila* (Timm.) DC. — **Кубышка малая**. Тм. VI-VII. Озера. В рн. 14. P2. Близ ю. границы ареала.

3/39/. *Nymphaea alba* L. — **Кувшинка белая**. Тм. V-VIII. В реках и озерах. Сп. P3.

4/40/. *N. candida* J. et Presl — **К. чисто-белая**. Тм. V-VIII. В реках и озерах. Сп. P3.

5/41/. *N. tetragona* Georgi — **Кувшинка четырехгранная**. Тм. V-VII. Пойменные озера р. Суры. В рн. 1. P2.

Сем. 17. Ceratophyllaceae — Роголистниковые

1/42/. *Ceratophyllum demersum* L. — **Роголистник темно-зеленый**. Тм. V-VII. В водоемах. Пв.

Сем. 18. Ranunculaceae — Лютиковые

1/43/. *Actaea spicata* L. — **Воронец колосистый**. Тм. V-VI. В тенистых лиственных лесах, в нагорных дубравах. Сп. В с. части области, реже на юге. P3.

2/44/. *Aconitum septentrionale* Koell — **Борец северный**. Тм. V-VII. По влажным лесам и лесным оврагам. Сп. В с. части Пб. P2.

3/45/. *Adonis aestivalis* L. — **Адонис летний**. Од. VI-VII. На солонцеватых почвах, в посевах. В рн. 17. P3. На с. границе ареала.

- 4/46/. *A. vernalis* L. — **А. весенний**. Тм. V-VI. В степях, остепненных лесах, по склону. Сп. РЗ.
- 5/47/. *A. wolgensis* Stev. — **А. волжский**. Тм. V. В сухих степях, на меловых склонах. На юге Пб. РЗ. На с. границе ареала.
- 6/48/. *Anemone sylvestris* L. — **Ветреница лесная**. Тм. V-VI. В светлых остепненных лесах, степях. Из. РЗ.
- 7/49/. *Anemonoides altaica* (C.A.Mey) Holub — **Ветреничка алтайская**. Тм. IV-начало V. Липово-дубовый лес в окрестностях с. Ундоры в рн. 6. П1. Реликт.
- 8/50/. *A. korzhinskyi* Saksonov et Rakov (*A. altaica* x *A. ranunculoides*) — **В. Коржинского** /Ботанический журнал, 1992, т. 77, № 1, с. 113-115/. Тм. IV- начало V. Там же, где и *A. altaica*.
- 9/51/. *A. ranunculoides* (L.) Holub — **В. лютиковая**. Тм. IV-V. В широколиственных, сосново-широколиственных и осиновых лесах. Пв.
- Aquilegia vulgaris* L. — **Водосбор обыкновенный**. Тм. V-V. Выращивается как декоративное растение. Интродуцент. Три куста водосбора найдены в 2002 г. на территории старинного парка в с. Рус. Юрткуль Старомайнского р-на. От прежних посадок сохранились единичные деревья ели сибирской, сосны обыкновенной, жестера слабительного, черемухи обыкновенной, клена остролистного, липы мелколистной и яблони домашней. В середине парка хорошо просматривается аллея из свидины белой.
- Примечание. А. Д. Воейков распространял по Каталогу питомников (1911) *A. oluprica* Boiss., как известный "красивый цветок", предлагая смесь самых разнообразных колеров.
- 10/52/. *Batrachium circinatum* (Sibth.) Spach. — **Шелковник жестколистный**. Тм. VI-VIII. В водоемах. Сп.
- 11/53/. *B. trichophyllum* (Chaix) Bosch — **Ш. волосистый**. Тм. VI- VIII. В водоемах. Из. Р4.
- 12/54/. *Caltha palustris* L. — **Калужница болотная**. Тм. IV-V. По сырым лугам, болотам, берегам водоемов, в мелкой воде. Пв.
- 13/55/. *Ceratocephala falcata* (L.) Pers. — **Рогоглавник серповидный**. Од. IV-V. На сухих склонах, выгонах. Сп.
- Clematis x jackmanii* T.Moore. — **Клематис Жакмана, Ломонос**. Полудеревянистая лиана. VII-IX. Выращивается как декоративное растение в садах. Получен Георгом Жакманом в Англии в 1860 г. при скрещивании *C. hendersonii* с *C. lanuginosa*. В саду Б. С. Воробьева культивируется без снятия лианы со шпалеры. Благополучно перенес суровый январь 2006 г.
- 14/56/. *Consolida regalis* S. F. Gray — **Консолида полевая**. Од. VII- IX. По полям и около полей. Пв.
- 15/57/. *Delphinium cuneatum* Stev. ex DC. — **Живокость клиновидная**. Тм. VI-VII. По светлым лесам. Из. РЗ.
- 16/58/. *Ficaria verna* Huds. — **Чистяк весенний**. Тм. IV-V. По сыроватым лесам и лесным полянам. Пв.
- 17/59/. *Myosurus minimus* L. — **Мышехвостник маленький**. Од. IV-V. По сырым луговинам, пашням, берегам водоемов. Из.

- 18/60/. *Pulsatilla patens* (L.) Mill. — **Прострел раскрытый**. Тм. IV-V. В осветленных сосновых лесах, в песчаных степях. Пв. Р4.
- 19/61/. *P. pratensis* (L.) Mill. — **П. луговой**. Тм. IV-V. В сосновых лесах. В рн. 17. Р2.
- 20/62/. *Ranunculus acris* L. — **Лютик едкий**. Тм. V-VIII. По сырым лугам, лесам, лесным полянам. Пв.
- 21/63/. *R. auricomus* L. — **Л. золотистый**. Тм. IV-V. По сырым лугам и листовым лесам. Пв.
- 22/64/. *R. cassubicus* L. — **Л. кашубский**. Тм. IV-V. В широколиственных и широколиственных лесах. Сп.
- 23/65/. *R. flammula* L. — **Л. жгучий**. Тм. VI-VIII. По берегам водоемов. Сп.
- 24/66/. *R. lingua* L. — **Л. длиннолистный**. Тм. VI-VIII. По топким берегам озер. Сп.
- 25/67/. *R. megacarpus* Walo Koch — **Л. крупноплодный**. Тм. V. По опушкам и кустарникам. Ро.
- 26/68/. *R. nemorosus* DC. — **Л. дубравный**. Тм. VI-VII. На меловых склонах. В рн. 17. Р2.
- 27/69/. *R. pedatus* Waldst. et Kit. — **Л. стоповидный**. Тм. IV-V. На солонцах, в степях. В рн. 20 и Лб.
- 28/70/. *R. polyanthemus* L. — **Л. многоцветковый**. Тм. V-VIII. На лугах, лесных полянах. Пв.
- 29/71/. *R. polyrhizos* Steph. — **Л. многокорневой**. Тм. V. В каменистых степях. На юге Пб.
- 30/72/. *R. polyphyllus* Waldst. et Kit. — **Л. многолистный**. Тм. V-VI. На сырых лугах, по берегам водоемов. Сп.
- 31/73/. *R. repens* L. — **Л. ползучий**. Тм. V-VIII. По сырым лесам, лугам, берегам водоемов. Пв.
- 32/74/. *R. sceleratus* L. — **Л. ядовитый**. Од. или Дв. V-VIII. По берегам водоемов и сырым лугам. Пв.
- 33/75/. *Thalictrum flavum* L. — **Василистник желтый**. Тм. VI-VII. По сырым лугам, берегам рек. Сп.
- 34/76/. *T. lucidum* L. — **В. светлый**. Тм. VI-VII. По влажным лугам, лесным полянам. Сп.
- 35/77/. *T. minus* L. — **В. малый**. Тм. V-VI. На лугах, степных склонах. Пв.
- 36/78/. *T. simplex* L. — **В. простой**. Тм. VI-VIII. По сыроватым лугам, лесным полянам. Пв.
- 37/79/. *Trollius europaeus* L. — **Купальница европейская**. Тм. V-VI. На влажных лугах, сырых лесах и лесных полянах. Сп. Р3.

Сем. 19. Berberidaceae — Барбарисовые

- 1/80/. *Berberis vulgaris* L. — **Барбарис обыкновенный**. К. V-VI. По осветленным лесам. Сп. Одичавшее.

2/81/. *B. vulgaris* L. var. *purpurea* Bert. — **Б. пурпуровый**. К. V-VI. В сосново-широколиственном лесу. В рн. 6. Одичавшее.

Сем. 20. Papaveraceae — Маковые

1/82/. *Chelidonium majus*. — **Чистотел большой**. Тм. V-IX. В садах, огородах, нарушенных лесах. Пв.

2/83/. *Glaucium corniculatum* (L.) J.Rudolph — **Мачок рогатый**. Тм. V-VI. По меловым склонам, на полях. В рн. 5, 6, 13, 17, 18, 20. P3.

3/84/. *Papaver roeas* L. — **Мак самосейка**. Од. VI-VII. Вдоль дорог. Одичавшее. В рн. 7, 8.

4/85/. *P. somniferum* L. — **Мак снотворный**. Од. VI-VII. Вдоль дорог. Из. Одичавшее.

Сем. 21. Fumariaceae — Дымянковые

1/86/. *Corydalis marschalliana* Pers. — **Хохлатка Маршалла**. Тм. IV-V. В широколиственных лесах. В рн. 3. P2.

2/87/. *C. intermedia* (L.) Merat — **Х. средняя**. Тм. IV-V. В широколиственных лесах. В рн. 3, 6. P4.

3/88/. *C. solida* (L.) Clairv. — **Х. плотная**. Тм. IV-V. В широколиственных, сосново-широколиственных и осиновых лесах. Пв. P3.

4/89/. *Fumaria officinalis* L. — **Дымянка лекарственная**. Од. VI-IX. На полях. Сп.

5/90/. *F. schleicheri* Soy. Willem — **Д. Шлейхера**. Од. IV-V. В посевах. Редко в рн. 17, 18.

6/91/. *F. vaillantii* Loisel. — **Д. Вайана**. Од. V-VI. На каменистых склонах. На юге Пб. P4.

Сем. 22. Ulmaceae — Вязовые

1/92/. *Ulmus carpiniifolia* Rupp. ex Suckow. — **Вяз полевой или Берест**. Д. IV-V. Одичавшее на открытых местообитаниях.

2/93/. *Ulmus glabra* Huds. — **Вяз шершавый или Ильм**. Д. IV-V. В широколиственных, сосново-широколиственных и осиновых лесах. Сп.

3/94/. *Ulmus laevis* Pall. — **Вяз гладкий**. Д. IV-V. В широколиственных, сосново-широколиственных и осиновых лесах. Сп.

4/95/. *Ulmus pumila* L. — **Вяз мелколистный**. Д. IV-V. Из. Одичавшее на открытых местообитаниях.

Сем. 23. Cannabaceae — Коноплевые

- 1/96/. *Cannabis ruderalis* Janisch — **Конопля сорная**. Од. VI-VII. По обочинам дорог, мусорным местам, на ж.-д. станциях. Из. Заносное.
2/97/. *Cannabis saliva* L. — **Конопля посевная**. Од. VI-VII. В населенных пунктах, у дороги, на пустырях. Из. Одичавшее.
3/98/. *Humulus lupulus* L — **Хмель вьющийся**. Тм. VI-VIII. По лесам, особенно пойменным, лесным оврагам. Сп.

Сем. 24. Urticaceae — Крапивные

- 1/99/. *Urtica cannabina* L — **Крапива коноплевая**. Тм. VI-VII. На территориях суконных фабрик, на ж.-д. станциях, реже у дорог. В рн. 6, 8, 14. Заносное.
2/100/. *U. dioica* L. — **Крапива двудомная**. Тм. VI-IX. У жилищ, на пустырях, вырубках, в пойменных лесах /особенно ольшаниках/. Пв.
3/101/. *U. urens* L. — **К. жгучая**. Од. VI-IX. У жилья, на пустырях. Пв.

Сем.25. Fagaceae — Буковые

- 1/102/. *Quercus robur* L. — **Дуб обыкновенный**. Д. V. На темно-серых и светло-серых лесных суглинистых почвах, реже на супесчаных почвах. Пв.

Сем.26. Betulaceae — Березовые

- 1/103/. *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. — **Ольха клейкая, или черная**. Д. IV-V. По берегам рек, ручьев, по болотам и топким местам, особенно в поймах рек. Пв.
2/104/. *A. incana* (L.) Moench. — **О. серая**. Д. IV-V. В сыроватых лесах и по берегам рек. В сев. рн. области. P2. На ю. границе ареала.
3/105/. *Betula humilis* Schrank. — **Береза приземистая**. К. V. По торфяным болотам. В рн. 8, 14. P1. На ю. границе ареала.
4/106/. *B. pendula* Roth. — **Б. повислая**. Д. IV-V. На супесчаных и суглинистых почвах, примесь в сосновых и дубовых лесах. Пв.
5/107/. *B. pubescens* Ehrh. — **Б. пушистая**. Д. IV-V. По влажным и заболоченным лесам, на болотах и сплавинах озер. Сп.

Сем.27. Corylaceae — Лещиновые

- 1/108/. *Corylus avellana* L. — **Лещина обыкновенная, или Орешник**. К. IV-V. В широколиственных, сосново-широколиственных и осиновых лесах, на вырубках. Пв.

Сем. Juglandaceae — Ореховые

Juglans mandshurica Maxim. — **Орех маньчжурский**. Д. V. В парках, иногда в палисадниках, уличных посадках. Интродуцент. Родина - Дальний Восток. Цветет и плодоносит. Плод, называемый в обиходе "орех" является сухой костянкой. Опавшие плоды ("орехи") являются пищей для кабанов, которые разгрызают их, что наблюдалось близ села Новая Слобода Сэнгилеевского района.

Сем.28. Molluginaceae — Моллюгиновые

1/109/. *Mollugo cerviana (L.) Ser.* — **Моллюго маленькая**. Од. VI-VII. В песчаных степях. Из. В ю. рн. Пб.

Сем.29. Caryophyllaceae — Гвоздичные

1/110/. *Agrostemma githago L.* — **Куколь обыкновенный**. Од. VI-VII. В посевах. Исчезающее. Реликт антропогенный.

2/111/. *Arenaria serpyllifolia L.* — **Песчанка тимьянолистная**. Од. V-VIII. На склонах, полях. Сп.

3/112/. *Cerastium arvense L.* — **Ясколка полевая**. Тм. VI-VII. В степях. В рн.17. Р4.

4/113/. *C. holosteoides Fries.* — **Я. дернистая**. Тм., иногда Дв. или Од. IV-IX. На лугах, лесных полянах, у дорог. Пв.

5/114/. *Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br.* — **Горицвет кукушкин или Кукушкин цвет**. Тм. V-VIII. По сырым и болотистым лугам, лесным полянам, берегам рек и озер. Сп.

6/115/. *Cucubalis baccifer L.* — **Волдырник ягодный**. Тм. VII-IX. По берегам рек, озер, в пойменных кустарниках. Пв.

7/116/. *Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz.* — **Гвоздика Андржеевского**. Тм. VI-VII. В степях. Сп.

8/117/. *D. arenarius L.* — **Г. песчаная**. Тм. VI-VIII. В песчаных степях, по разбитым пескам, в сухих сосняках на песках. Сп.

9/118/. *D. barbatus L.* — **Г. бородчатая**. Тм. VI-VIII. На лесных полянах. В рн. 6,9. Одичавшее.

10/119/. *D. borbasii Vandas* — **Г. Борбаша**. Тм. VI-VII. В степях, остепненных лесах, на степных склонах. Пв.

11/120/. *D. campestris Bieb.* — **Г. полевая**. Тм. VI-VII. На сухих лесных полянах, в разреженных сосняках. Сп.

12/121/. *D. deltooides L.* — **Г. травянка**. Тм. VI-VII. По лесным опушкам, пойменным лугам. Сп.

13/122/. *D. fischeri Spreng.* — **Г. Фишера**. Тм. VI-VII. В сосновых лесах, на лугах. Из. Р3.

14/123/. *D. polymorphus Bieb.* — **Г. изменчивая**. Тм. VI-VII. В степях, на лесных сухих полянах. Сп.

15/124/. *D. pratensis Bieb.* — **Г. луговая**. Тм. VI-VII. На заливных лугах. Из. Р3

- 16/125/. *D. rigidus* Bieb. — **Г. жесткая**. Пк. VI-VII. По меловым склонам. В рн. 15, 17. Р4.
- 17/126/. *D. slenocalyx* Juz. — **Г. узкокашечная**. Тм. VI-VII. На заливных лугах, в разреженных лесах. Из. Р3.
- 18/127/. *D. superbus* L. — **Г. пышная**. Тм. VI-VIII. На лугах, лесных полянах. Из. Р3
- 19/128/. *D. versicolor* Fisch. ex Link. — **Г. разноцветная**. Тм. VI-VIII. В степях, в сухих сосняках. Из. Р4.
- 20/129/. *D. volgicus* Juz. — **Г. волжская**. Тм. VI-VII. В сухих разреженных сосняках, в песчаных степях. Из. Р4. Эндем.
- 21/130/. *Eremogone longifolia* (Bieb.) Fenzl. — **Еремогоне длиннолистная**. Тм. V-VI. В степях, на степных склонах. Из.
- 22/131/. *E. microdenia* (P.Smirn.) Ikonn. — **Е. украинская**. Тм. V-VII. В степях. Из.
- 23/132/. *E. saxatilis* (L.) Ikonn. — **Е. наскальная**. Тм. V-VIII. В степях, сосновых лесах. Сп.
- 24/133/. *Gypsophyla altissima* L. — **Качим высочайший**. Тм. VI-VII. На меловых и мергелистых склонах, в меловых сосняках, степях с перегнойно-карбонатной почвой. Сп. в рн. Пб.
- 25/134/. *G. paniculata* L. — **К. метельчатый**. Тм. VI-VII. В степях, на откосах ж.-д. насыпей. Пв.
- 26/135/. *Herniaria glabra* L. — **Грыжник голый**. Тм. V-IX. По сухим песчаным местам, выгонам, песчаным берегам рек. Пв.
- 27/136/. *H. polygama* J. Gay. — **Г. многобрачный**. Тм. V-IX. По сухим песчаным местам, в сухих сосняках. Пв.
- 28/137/. *Lychnis chalconica* L. — **Зорька обыкновенная или Татарское мыло**. Тм. VI-VII. В осветленных лесах, среди пойменных кустарников, на вырубках. Из. Р3. Близ с. границы ареала.
- 29/138/. *Melandrium album* (Mill.) Garcke. — **Дрема белая**. Дв. V-VIII. На лугах, пустырях, в разреженных лесах. Пв.
- 30/139/. *Minuartia setacea* (Thuill.) Hayek. — **Минуарция щетинковая**. Тм. VI-VII. На полузадернованных песках, песчано-каменистых склонах бугров. В рн. 17. Р4.
- 31/140/. *Moehringia lateriflora* (Thuill.) Hayek. — **Мерингия бокоцветная**. Тм. V-VI. По лиственным лесам. Из.
- 32/141/. *M. trinervi* (L.) Clairv. — **М. трехжилковая**. Од. или Дв. По берегам лесных ручьев, в тенистых лесах. Из.
- 33/142/. *Myosoton aquaticum* (L.) Moench. — **Мягковолосник водный**. Тм. V-IX. По берегам рек, ручьев, по сырым местам. Пв.
- 34/143/. *Oberna behen* (L.) Ikonn. — **Оберна хлопושка**. Тм. VI-IX. По полям, обочинам дорог, в разреженных нарушенных лесах, нарушенных лугах. Пв.
- 35/144/. *O. procumbens* (Murr.) Ikonn. — **О. лежачая**. Тм. VII-IX. По прибрежным пескам, реже в осветленных лесах. Сп.
- 36/145/. *Psammophiliella muralis* (L.) Ikonn. — **Песколюбка постенная**. Од. V-

- IX. По выгонам, полям, берегам рек, сыроватым лугам, у дорог. Пв.
 37/146/. *Sagina nodosa* (L.) Fenzl. — **Мшанка узловатая**. Тм. VI-VIII. Вдоль речек, ручьев, по берегам рек. Сп.
- 38/147/. *S. procumbens* L. — **М. лежачая**. По сыроватым мшистым местам, по берегам рек. Сп.
- 39/148/. *Saponaria officinalis* L. — **Мыльнянка лекарственная**. Тм. VI-IX. По заливным лугам, склонам и опушкам. Пв.
- 40/149/. *Scleranthus annus* L. — **Дивала однолетняя**. Од. IV-VII. По песчаным местам, в разреженных сосновых лесах. Сп.
- 41/150/. *Silene artemisetorum* (Klok.) Czer. — **Смолевка полынная**. Тм. или Дв. V-VI. В тырсовых степях на черноземах и перегнойно-карбонатных почвах. В рн. 5, 8, 13, 15, 17, 18, 20. P3.
- 42/151/. *S. baschkirorum* Janisch. — **С. башкирская**. Тм. или Дв. VI. В тырсовых степях на перегнойно-карбонатной щебнистой почве. В рн. 17. P2.
- 43/152/. *S. borysthenica* (Grim.) Walterns. — **С. днепровская**. Тм., реже Дв. V-VI. В песчаных степях, разреженных сосняках, на приречных песках. Пв.
- 44/153/. *S. chlorantha* (Willd.) Ehrh. — **С. зеленоцветковая**. Тм. VI- VII. По сухим лугам, песчано-каменистым склонам, в сухих сосняках и песчаных степях. Из.
- 45/154/. *S. dichotoma* Ehrh. — **С. вильчатая**. Од. VI-VII. В посевах. В рн. 7, 17. Заносное.
- 46/155/. *S. multiflora* (Waldst. et Kit.) Pers. — **С. многоцветковая**. Тм. V -VI. На меловых холмах. В рн. 17. P2
- 47/156/. *S. noctiflora* L. — **С. nocheцветная**. Дв. V-IX. В посевах, огородах, садах. Сп.
- 48/157/. *S. nutans* L. — **С. поникшая**. Тм. VI-VI. В осветленных лесах, на лесных полянах, в луговых степях. Сп.
- 49/158/. *S. repens* Patrin. — **С. ползучая**. Тм. VI-VII. По песчаным берегам рек. Сп. Реликт.
- 50/159/. *S. sibirica* (L.) Pers. — **С. сибирская**. Тм. VI-VII. В степях, по песчаным берегам рек, мергелисто-каменистым склонам. Из. В рн. Пб.
- 51/160/. *S. tatarica* (L.) Pers. — **С. татарская**. Тм. VI-VII. По песчаным берегам рек, песчаным склонам, в сухих сосняках. Сп.
- 52/161/. *S. viscosa* (L.) Pers. — **С. клейкая**. Дв. V-VI. В луговых степях, по степным склонам и полянам. Сп.
- 53/162/. *S. wolgensis* (Hormen) Bess. ex Spreng. — **С. волжская**. Дв. VI-VIII. В степях на суглинистых черноземах, на мергелистых склонах. Из. в Пб., в Лб. на ю. в. рн. 8.
- 54/163/. *Spergula arvensis* L. — **Торица полевая**. Од. VI-VIII. В посевах, Сп.
- 55/164/. *S. maxima* Weihe. — **Т. крупная**. Од. VI-VIII. В посевах. В рн. 17.
- 56/165/. *S. sativa* Boenn. — **Т. посевная**. Од. VI-VIII. В посевах. Из. В рн. 6, 17.
- 57/166/. *Spergularia marina* (L.) Griseb. — **Торичник морской**. Од. или Дв., редко Тм. VI-VII. На засоленных местах. В рн. Ульяновска на волжском косогоре. P4.

- 58/167/. *S. rubra* (L.) J. et C. Presl. — **Т. красный**. Од. или Дв., реже Тм. В посевах, на песках, в разреженных сосняках. Сп.
- 59/168/. *Stellaria crassifolia* Ehrh. — **Звездчатка толстолистная**. Тм. V-VIII. По болотам. Из.
- 60/169/. *S. graminea* L. — **З. злаковидная**. Тм. V-VIII. На лугах, лесных полянах, в разреженных лесах, луговых степях. Пв.
- 61/170/. *S. holostea* L. — **З. ланцетовидная**. Тм. V-VI. В широколиственных, сосново-широколиственных и осиновых лесах. Пв.
- 62/171/. *S. media* (L.) Will. — **З. средняя или Мокрица**. Од. V-VIII. В садах, огородах, поймах рек. Пв.
- 63/172/. *S. nemorum* L. — **З. дубравная**. Тм. V-VIII. По тенистым сырým лесам. Из.
- 64/173/. *S. palustris* Retz. — **З. болотная**. Тм. V-VIII. На сырых лугах. Сп.
- 65/174/. *Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert. — **Тысячеголов испанский**. Од. VI-VII. В посевах, на мусорных местах. Ро. Реликт антропогенный.
- 66/175/. *Viscaria vulgaris* Bernh. — **Смолка клейкая**. Тм. V-VI. На лесных полянах, в разреженных лесах, луговых и песчаных степях. Пв.

Сем.30. Amaranthaceae — Амарантовые

- 1/176/. *Amaranthus albus* L. — **Щирица белая**. Од. VII-X. По полям, мусорным местам, ж.-д. насыпям. Заносное. Сп.
- 2/177/. *A. blitoides* S. Wats. — **Щ. жминовидная**. Од. VI-VIII. По берегам рек, днищам балок с песчаной почвой, на мусорных местах, в посевах. Из.
- 3/178/. *A. lividus* L. — **Щ. синеватая**. Од. VII-VIII. По улицам, мусорным местам, в посевах. Из.
- 4/179/. *A. retroflexus* L. — **Щ. запрокинутая**. Од. VII-VIII. По огородам, полям, мусорным местам, у дорог. Пв.

Сем.31. Chenopodiaceae — Маревые

- 1/180/. *Atriplex calotheca* (Rafn.) Fries. — **Лебеда копельлистная**. Од. VII-VIII. По склонам, обрывам, на солончаковатых местах, днищам балок. Сп.
- 2/181/. *A. hortensis* L. — **Л. садовая**. Од. VII-VIII. По огородам, пустырям, у жилья, на вырубках, по берегам рек. Пв.
- 3/182/. *A. nitens* Schkuhr. — **Л. лоснящаяся**. Од. V-IX. По огородам, пустырям, у жилья, на вырубках, по берегам рек. Пв.
- 4/183/. *A. oblongifolia* Waldst. et Kit. — **Л. продолговатолистная**. Од. VII-IX. На солонцах, по балкам. В ю. рн. Пб. в Лб. в рн. 9.РЗ.
- 5/184/. *A. patens* (Litv.) Iljin. — **Л. отклоненная**. Од. VII-IX. По балкам, на влажных солонцеватых почвах. Южные рн. Пб. Р4. На з. границе ареала.
- 6/185/. *A. patula* L. — **Л. раскидистая**. Од. VII-VIII. По пустырям, улицам, берегам рек, ж.-д. насыпям, иногда на полях. Пв.

- 7/186/. *A. rosea* L. — **Л. розовая**. Од. VII-VIII. По улицам, пустырям, на ж.-д. станциях. Сп.
- 8/187/. *A. tatarica* L. — **Л. татарская**. Од. VII-VIII. По выбитым местам на глинистой почве, около дорог, на пустырях. Сп.
- 9/188/. *Axyris amaranthoides* L. — **Аксирис ширрицевый**. Од. VII-VIII. На пустырях, в населенных пунктах, иногда на полях. Сп.
- 10/189/. *Bassia sedoides* (Pall.) Aschers — **Бассия очитковидная**. Од. VIII-IX. По разбитым степным склонам, на солонцах. Сп.
- 11/190/. *Ceratocarpus arenarius* L. — **Рогач песчаный или Эбелек**. Од. V-VI. По нарушенным степям, особенно песчаным, выгонам, на склонах балок с солонцеватыми почвами, около дорог. Сп., чаще в ю. рн.
- 12/191/. *Ceratoides papposa* Botsch. et Ikonn. — **Терескен серый**. Кч. VI-VII. На меловых и щебневато-мергелистых склонах, в черноземных степях. Редко в ю. рн. Пб., в Лб. на ю. рн. 8. P2. На с. границе ареала.
- 13/192/. *Chenopodium album* L. — **Марь белая**. Од. VI-IX. По полям, огородам, на пустырях, вырубках, вдоль дорог, у жилья, по берегам рек. Пв.
- 14/193/. *Ch. botryodes* Smith. — **М. толстолистная**. Од. VII-IX. На солончаковых почвах. В рн. 7. P2.
- 15/194/. *Ch. botrys* L. — **М. душистая**. Од. VII-IX. По обочинам дорог. В рн. 7. Заносное.
- 16/195/. *Ch. foliosum* Aschers. — **М. многолистная, или Жминда**. Од. V-VIII. На меловых и мергелистых обнажениях, в степях на перегнойно-карбонатной почве. Сп.
- 17/196/. *Ch. glaucum* L. — **М. сизая**. Од. VI-IX. По сыроватым песчаным и илистым берегам рек, по мусорным местам. Сп.
- 18/197/. *Ch. hybridum* L. — **М. гибридная**. Од. VI-IX. В огородах, на пустырях. Пв.
- 19/198/. *Ch. polyspermum* L. — **М. многосеменная**. Од. V-IX. По полям, огородам, пустырям, иногда на прибрежных песках. Пв.
- 20/199/. *Ch. rubrum* L. — **М. красная**. Од. VII-VIII. По мусорным местам, у дорог, по ж.-д. насыпям, иногда на прибрежных песках. Сп.
- 21/200/. *Ch. strictum* Roth. — **М. торчащая**. Од. VIII-IX. На пустырях, по ж.-д. насыпям. В рн. 17, 18.
- 22/201/. *Ch. urbicum* L. — **М. городская**. Од. VI-IX. По мусорным местам, у жилья, на нарушенных солонцах. Сп.
- 23/202/. *Corispermum declinatum* Steph. ex Iljin. — **Верблюдка повислая**. Од. VI-IX. В посевах, реже по песчаным местам, особенно разбитым, В рн. 6, 7, 13, 17, 18, 21.
- 24/203/. *C. hyssopifolium* L. — **В. иссополистная**. Од. VI-IX. По песчаным берегам Волги, Суры, Свяги. Из.
- 25/204/. *C. marschallii* Stev. — **В. Маршалла**. Од. VII-VIII. На прибрежных песках и в песчаных степях. Сп.
- 26/205/. *C. orientale* Lam. — **В. восточная**. Од. VII-IX. В песчаных степях, по разбитым пескам, иногда в посевах на песчаной почве. В рн. Пб. 13, 17, 18.

- 27/206/. *Kochia laniflora* (S.G.Gmel.) Borb. — **Прутьняк шерстистоцветковый**. Од. VII-VIII. В песчаных степях, в сухих сосновых лесах и на вырубках с песчаной почвой. Пв.
- 28/207/. *K. prostrata* (L.) Schrad. — **П. простертый**. Пк. VII-VIII. На меловых склонах, иногда на солонцах и песках. В рн. 5, 6, 12, 17, 18, 20. РЗ. На с. границе ареала.
- 29/208/. *K. sieversiana* (Pall.) C. A. Mey. — **П. Сиверса**. Од. VII-IX. Заносное на ж.-д. станциях и суконных фабриках.
- 30/209/. *K. scoparia* (L.) Schrad. — **П. веничный**. Од. VII-IX. По мусорным местам, огородам, около жилья. Из.
- 31/210/. *Polycnemum arvense* L. — **Хрупявник полевой**. Од. VII-VIII. По пескам и песчано-каменистым склонам. Из. в южных рн. Пб., в Лб. в рн. 9.
- 32/211/. *Salicornia europaea* L. — **Солерос европейский**. Од. VII-IX. На засоленных почвах. Ро.
- 33/212/. *Salsola australis* R.Br. — **Солянка австралийская или чумная**. Од. VI-IX. По мусорным местам, обрывам, меловым склонам, около дорог, по ж.-д. насыпям, иногда на полях. Сп.
- 34/213/. *S. collina* Pall. — **С. холмовая**. Од. VII-IX. По мусорным местам, обрывам, склонам балок, меловым обнажениям, ж.-д. насыпям. Сп.
- 35/214/. *S. tamariscina* Pall. — **С. тамарисковидная**. Од. VII-IX. По глинистым солонцеватым склонам балок, иногда на песчано-каменистых и карбонатных шебневатых почвах. Из. в южных рн. Пб.
- 36/215/. *Suaeda prostrata* Pall. — **Сведа стелющаяся**. Од. VII-VIII. На солончаках. В рн. 17. Ро.

Сем.32. Polygonaceae — Гречишные

- 1/216/. *Fagopyrum esculentum* Moench. — **Гречиха посевная**. Од. VI-VII. На межах, у дорог, на пустырях. Сп. Одичавшее.
- 2/217/. *F. tataricum* (L.) Gaertn. — **Г. татарская**. Од. VI-VII. В посевах. Из.
- 3/218/. *Fallopia convolvulus* (L.) A. Love. — **Фаллопия вьюнковая**. Од. VI-IX. В посевах, на вырубках, в нарушенных лесах. Пв.
- 4/219/. *F. dumetorum* (L.) Holub. — **Ф. кустарниковая или призаборная**. Од. VI-IX. По пойменным кустарникам и вырубкам. В рн. 8, 17, 18.
- 5/220/. *Polygonum alpinum* All. — **Горец альпийский**. Тм. V-VI. По склонам балок, опушкам. Из.
- 6/221/. *P. amphibium* L. — **Г. земноводный**. Тм. VI-IX. В реках, озерах, старицах, прудах /водная форма/, по берегам рек /наземная форма/. Пв.
- 7/222/. *P. aviculare* L. — **Г. птичий, или Спорыш**. Од. VI-IX. По дорогам, улицам, выгонам, берегам рек, вырубкам. Пв.
- 8/223/. *P. bellardii* All. — **Г. Белларда, или лежачий**. Од. VII-IX. По дорогам, иногда в посевах. Из.
- 9/224/. *P. bistorta* L. — **Г. змеинный или Раковые шейки**. Тм. V-VI. По сырым лугам, сырым лесным полянам, травяным болотам. Пв.

- 10/225/. *P. hydropiper* L. — **Г. перечный, или Водяной перец.** Од. VII- IX. По сырым местам, около озер, канав, на топких болотах. Пв.
- 11/226/. *P. tatatifolium* L. — **Г. щавелелистный.** Од. VII-IX. По берегам рек, озер, реже в посевах. Сп.
- 12/227/. *P. minus* Huds. — **Г. малый.** Од. VII-IX. По сырым лугам, берегам рек, озер. Сп.
- 13/228/. *P. monspeliense* Thieb. — **Г. монпельский.** Од. VII-IX. По обочинам дорог, в садах, иногда в степях и в посевах. Сп.
- 14/229/. *P. novoascanicum* Klok. — **Г. новоасканийский.** Од. VII-IX. Заносное на ж.-д. станциях в рн. 21.
- 15/230/. *P. patulum* Bieb. — **Г. отклоненный.** Од. VII-IX. По дорогам, сухим лугам, на обнаженных песках, в посевах. Сп.
- 16/231/. *P. persicaria* L. — **Г. почечуйный.** Од. VI-IX. По берегам рек, озер, на сырых лугах, в сыроватых нарушенных лесах и вырубках, на пустырях, иногда в посевах. Пв.
- 17/232/. *P. scabrum* Moench. — **Г. шероховатый.** Од. VI-IX. На пустырях, в огородах, на песках, по берегам рек и озер, иногда в посевах. Пв.
- 18/233/. *Rumex acetosa* L. — **Щавель обыкновенный или кислый.** Тм. V-VI. На лесных полянах, лугах, по опушкам, в разреженных лиственных лесах. Пв.
- 19/234/. *R. acetosella* L. — **Щ. малый или Щавелек.** Тм. V-VI. По песчаным степям, разреженным сосновым лесам и вырубкам, на мусорных местах, на полях. Пв.
- 20/235/. *R. aquatikus* L. — **Щ. водный.** Тм. VI. По берегам пойменных озер, стариц, по берегам рек, на болотах и болотистых лугах. Сп.
- 21/236/. *R. confertus* Wild. — **Щ. густой или конский.** Тм. VI-VII. По сырым лугам, лесным полянам и вырубкам, в поймах рек, в балках. Пв.
- 22/237/. *R. crispus* L. — **Щ. курчавый.** Тм. VI-VII. По сырым лугах, в поймах рек, иногда по мокрым мусорным местам. Пв.
- 23/238/. *R. hydrolapathum* Huds. — **Щ. прибрежный.** Тм. VI-VII. По берегам рек, ручьев, озер. Сп.
- 24/239/. *R. maritimus* L. — **Щ. приморский.** Од. VI-VII. В поймах рек, по берегам рек, болотистым лугам и травяным болотам, лесным мочажинам. Пв.
- 25/240/. *R. marschallianus* Reichenb. — **Щ. Маршалла.** Од. VI. По солонцам. В рн. 9. P2.
- 26/241/. *R. obtusifolius* L. — **Щ. туполистный.** Тм. VI-VII. По лесам, лесным дорогам, в поймах рек. Сп.
- 27/242/. *R. pseudonatronalis* (Borb.) Borb. ex Murb. — **Щ. ложносолончаковый.** Тм. VII. По оврагам, днищам балок, лугам. Из.
- 28/243/. *R. stenophyllus* Ledeb. — **Щ. узколистный.** Тм. VII. На влажных солончаковатых почвах. В рн. 17, 18. P2.
- 29/244/. *R. thyrsoflorus* Fingerh. — **Щ. пирамидальный.** Тм. V-VI. По лугам, на травянистых склонах. Сп.
- 30/245/. *R. ucranicus* Fich. ex Spreng — **Щ. украинский.** Од. VII-VIII. По прибрежным пескам. Сп.

Сем.33. Limoniaceae — Кермековые

- 1/246/. *Goniolimon elatum* (Fisch. ex Spreng.) Boiss. — **Гониолимон высокий**. Тм. VI-VII. По меловым склонам с перегнойно-карбонатной почвой и на солонцеватых лугах. В рн. Пб. 4, 12, 16, 17, 18, 20. На с. границе ареала.
2/247/. *Limonium gmelinii* (Willd.) O.Kuntze. — **Кермек Гмелина**. Тм. VI-IX. На солонцеватых лугах. В рн. 6, 9. P2. На с.-з. границе ареала.

Сем.34. Paeoniaceae — Пионовые

- 1/248/. *Paeonia biebersteiniana* Rupr. — **Пион Биберштейна**. Тм. V-VI. На мергелистых склонах. В южных рн. Пб. P3. На в. границе ареала.
P. officinalis L. — **П. лекарственный**. Тм. V-VI. Выращивается как декоративное в цветниках, садах, парках.
2/249/. *P. tenuifolia* L. — **П. тонколистный**. Тм. V. На степных склонах с карбонатной почвой, по днищам балок. В южных рн. Пб. В 6 и 13 рн. как исчезнувшее растение. На в. границе ареала.

Сем. 35. Hypericaceae - Зверобойные

- 1/250/. *Hypericum elegans* Steph. — **Зверобой изящный**. Тм. V-VI. В степях, на каменистых меловых почвах, в остепненных сосновых лесах. Из.
2/251/. *H. hirsutum* L. — **З. волосистый**. Тм. VI-VIII. По лесным полянам, поймам рек. Сп.
3/252/. *H. maculatum* Crantz. — **З. пятнистый**. Тм. VI-VII. По лесам и лугам. Из.
4/253. *H. perforatum* L. — **З. продырявленный**. Тм. VI-VII. По осветленным лесам, лесным полянам, вырубкам, лугам, луговым степям. Пв.

Tamaricaceae — Гребенщиковые, или тамарисковые

- Tamarix laxa* Willd. — **Гребенщик, или тамариск рыхлый**. К. VI-VII. Парки, скверы, иногда в уличных посадках. Интродуцент. Родина - Средняя Азия, юг Западной Сибири, юго-восток Европейской России, Крым, Кавказ. Дичание. В 1997г. найден один экземпляр на песчаной отмели Куйбышевского водохранилища близ Нового города.

Сем. 36. Elatinaceae — Повойничковые

- 2/255/. *E. hydropiper* L. — **П. водяной перец**. Од. VI-VIII. В водоемах, лесных ручьях. Сп.

3/256/. *E. triandra Schkuhr* — **П. трехтычинковый**. Од. VII-VIII. По водоемам и их берегам. В рн. 1. P4.

Сем. 37. *Violaceae* — Фиалковые

1/257/. *Viola ambigua Waldst. et Kit.* — **Фиалка сомнительная**. Тм. IV-V. В степях на суглинистых черноземах, часто на перегнойно-карбонатной щебневатой почве. Из.

2/258/. *V. arvensis Murr.* — **Ф. полевая**. Од. V-IX. На полях, вырубках, в сухих сосняках. Пв.

3/259/. *V. canina L.* — **Ф. собачья**. Тм. V-VI. В сосновых, сосноволиственных и лиственных лесах. Пв.

4/260/. *V. collina Bess.* — **Ф. холмовая**. Тм. IV-V. По склонам, в сосняках, кустарниках. Из.

5/261/. *V. elatior Fries.* — **Ф. высокая**. Тм. VI-VII. По лесам. Из.

6/262/. *V. hirta L.* — **Ф. опушенная**. Тм. IV-V. В широколиственных и сосновошироколиственные лесах, на вырубках. Сп.

7/263/. *V. mirabilis L.* — **Ф. удивительная**. Тм. IV-V. В широколиственных, сосновошироколиственных и осиновых лесах. Пв.

8/264/. *V. montana L.* — **Ф. горная**. Тм. V-VI. В сосноволиственных и лиственных лесах. Из.

9/265/. *V. palustris L.* — **Ф. болотная**. Тм. IV-V. На болотах и болотистых лугах, в заболоченных поймах рек. Из.

10/266/. *V. pumila Chaix.* — **Ф. малорослая**. Тм. V-VI. По степным склонам на щебневато-карбонатной почве. Из. в рн. Пв.

11/267/. *V. rupestris F. M. Schmidt.* — **Ф. песчаная**. Тм. IV-V. По песчаным степям, вырубкам, в сухих разреженных сосняках с песчаной почвой, на склонах с перегнойно-карбонатной почвой. Сп.

12/268/. *V. tanaitica Grosset.* — **Ф. донская**. Тм. IV-V. В травяных сосняках. В рн. 10, 12. P2.

13/269/. *V. tricolor L.* — **Ф. трехцветная или Анютины глазки**. Од. IV-IX. В разреженных лесах, на вырубках, на лугах. Пв.

Сем. 38. *Cistaceae* — Ладанниковые

1/270/. *Helianthemum cretaceum (Rupr.) Juz ex Dobroc* — **Солнцецвет меловой**. Пк. VI-VII. На меловых склонах. В рн. 17. P2.

2/271/. *H. grandiflorum (Scop.) DC.* — **С. крупноцветковый**. Пк. VII-VIII. В горном меловом сосняке. В рн. 18. P0. На в. границе ареала.

3/272/. *H. nummularium (L.) Mill.* — **С. монетолистный**. Пк. V-VII. По степям, остепненным склонам с каменистыми меловыми почвами. В рн. 4, 15, 16, 17, 18, 20. P3.

4/273/. *H. rupifragum* A.Kerner. — **С. скалоломный**. Пк. VI-VII. На меловых обнажениях. В рн. 17, 20. P2.

Сем. 39. Cucurbitaceae — Тыквенные

1/274/. *Bryonia alba* L. — **Переступень белый**. Тм. VI-VIII. В садах, на мусорных местах. Из. Одичавшее.

Cucurbita pepo L. — **Тыква обыкновенная**. Од. VI-VIII. Культивируется как пищевое в огородах. Заносится на свалки. Единично. Не натурализуется. В диком состоянии не известен. Происходит из Мексики и южных штатов Северной Америки. Кроме типической формы *convar. pepo*, широко культивируются формы, объединяемые под названием кабачки и *convar. patissona* Greb. - Патиссоны с плоскими, дисковидными плодами. Кроме того, иногда культивируются декоративные формы *convar. microcarpa* Greb.

2/275/. *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Cray. — **Эхиноцистис шипиковый**. Од. VII-IX. В пойменных ивниках, в садах, по мусорным местам. Сп. Заносное.

3/276/. *Thladiantha dubia* Bunge. — **Тладианта сомнительная**. Тм. VII-VIII. В садах. В рн. 3, 5, 6, 8. Заносное, одичавшее.

Сем. 40. Brassicaceae (Cruciferae) — Крестоцветные

1/277/. *Alliaria petiolata* (Bieb.) Cavara et Grande — **Чесночница черешковая**. Дв. V-VI. По лесам, лесным дорогам, оврагам, в населенных пунктах. Из.

2/278/. *Alyssum culycinum* L. — **Бурачок чашечный**. Од. V-VI. В сосновых лесах на песчаной почве, в степях на перегойно-карбонатной почве. В рн. 15, 17. P4.

3/279/. *A. gmelinii* Jord. — **Б. Гмелина**. Тм. V-VI. На остепненных склонах, в сухих сосновых лесах на песчаной почве В рн. 17. P2.

4/280/. *A. gymnopodium* P.Smirn. — **Б. голоножковый**. Пк. V- VI. В глинистых степях и по склонам меловых бугров на щебневатых почвах. В рн. 17, 18. P3.

5/281/. *A. lenense* Adam. — **Б. ленский**. Пк. V -V I. По меловым склонам на щебневатой почве и в сосновых лесах на песчаной почве. В рн. 16, 17, 18. P3.

6/282/. *A. tortuosum* Waldst. et Kit. ex Willd. — **Б. извилистый или разностебельный**. Тм. V. На щебневатых перегнойно-карбонатных почвах меловых склонов. В рн. 17, 18, 20. P3.

7/283/. *A. turkestanicum* Regel et schmalh. — **Б. туркестанский или пустынный**. Од. IV-VII. В степях, на меловых склонах, на выгонах. Из.

8/284/. *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. — **Резуховидка Таля**. Од. IV-VI. В песчаных степях, на вырубках и лесных полянах с легкими почвами, по сухим склонам балок. Сп.

9/285/. *Arabis gerardii* (Bess.) Koch. — **Резуха Жерарда**. Дв. V-VI. По солонцеватым лугам. В рн. 18. P4.

10/286/. *A. pendula* L. — **Р. повислая**. Дв. VI-VII. По сырым лесам, днищам сырых балок, ивнякам, ольшаникам, берегам ручьев. Из.

- 11/287/. *A sagittata* DC. — **Р. стреловидная**. Дв. V-VI. По светлым лесам и среди кустарников на меловых буграх. В рн. 17, 18. P4.
- 12/288/. *Armoracia rusticana* Gaertn., Mey. et Schreb — **Хрен обыкновенный**. Тм. V-VI. По мусорным местам, улицам, иногда в поймах рек. Одичавшее. Сп.
- 13/289/. *Barbarea stricta* Andrz. — **Сурепка прямая**. Дв V-VI. В поймах рек, на лугах, по берегам водоемов. Из.
- 14/290/. *B. vulgaris* R.Br. — **С. обыкновенная**. Дв. V-VII. На полях, в огородах, по лугам, у дорог. Сп.
- 15/291/. *Berteroa incana* (L.) DC. — **Икотник серый**. Дв. V-IX. По сухим открытым склонам, песчаным местам, у дорог, по улицам, на вырубках, на окраинах полей, в степях. Пв.
- 16/292/. *Brassica campestris* L. — **Капуста полевая или Сурепица**. Од. V-IX. В посевах, по обочинам полей, у дорог, в населенных пунктах. Пв.
- 17/293/. *B. juncea* (L.) Czern. — **К. сарептская или Горчица сарептская**. Од. V-VI. В посевах. В рн. 17. Одичавшее.
- B. napus* L. var. *oleifera* DC. — **К. масличная или Рапс**. Од. V-VIII. Выращивается на полях как кормовое растение. Интродуцент. Дичание близ мест культивирования, но долго не сохраняется. Заносится вдоль дорог.
- 18/294/. *Bunias orientalis* L. — **Свербига восточная**. Дв. V-VII. По мусорным местам, у дорог, около жилья, иногда в посевах. Пв.
- 19/295/. *Camelina microcarpa* Andrz. — **Рыжик мелкоплодный**. Од. V-VIII. В посевах, у дорог, на пустырях. Пв.
- 20/296/. *C. pilosa* (DC.) N. Zing. — **Р. волосистый**. Од. V-VI. В посевах. Сп.
- 21/297/. *C. saliva* (L.) Grantz — **Р. посевной**. Од. VI-VIII. Одичавшее в посевах, на пустырях, у дорог, около жилья. Пв.
- 22/298/. *C. sylvestris* Wallr. — **Р. лесной**. Од. V-VII. В посевах, по степям. В рн. 17.
- 23/299/. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. — **Пастушья сумка обыкновенная**. Од. IV-X. У дорог, на улицах, около жилья, на мусорных местах, на вырубках, иногда в посевах. Пв.
- 24/300/. *Cardamine amara* L. — **Сердечник горький**. Тм. V-VII. По берегам водоемов, сырым лесным оврагам, влажным лесам. Сп.
- 25/301/. *C. impatiens* L. — **С. недотрога**. Од. или Дв. V-VI. По лесным полянам, гарям, вырубкам, сыроватым местам. Сп.
- 26/302/. *C. parviflora* L. — **С. мелкоцветковый**. Од. VI-VII. По берегам рек, озер, на болотах. Из.
- 27/303/. *C. pralensis* L. — **С. луговой**. Тм. V-VII. На влажных лугах, по берегам рек и озер, на болотах, по сырым лесным местам. Пв.
- 28/304/. *Cardaria draba* (L.) Desv. — **Кардария крупковая**. Тм. V-VI. По откосам: ж. д., автодорожных насыпей, на окраинах полей, в парках. Сп.
- 29/305/. *Chorispora lenella* (Pall.) DC. — **Хориспора нежная**. Од. IV-V. По мусорным местам, окраинам полей, на выгонах, сухих склонах, реже в посевах. Сп.
- 30/306/. *Clausia aprica* (Steph.) Korn. Tr. — **Клаузия солнцелюбивая**. Тм. V-VII. На меловых склонах, в горных меловых сосняках. В рн. 6, 13, 17, 18, 20. P2. На

с.-з. границе ареала.

31/307/. *Conringia orientalis* (L.) Dumort. — **Конрингия восточная**. Од. IV-V. По мусорным местам, изредка в посевах. В рн. 17, 18, 20.

32/308/. *Crambe tatarica* Sebeok. — **Катран татарский**. Тм. V-VI. По меловым склонам и в тырсовых степях на перегнойно-карбонатной почве. В рн. 16, 17, 20. P1.

33/309/. *Dentaria quinquefolia* Bieb. — **Зубянка пятилепестная**. Тм. IV-V. В широколиственных лесах. P0.

34/310/. *D. trifida* Poir. — **З. тройчатая**. Тм. IV-V. В широколиственных лесах. P0.

35/311/. *Descurainia sophia* (L.) Webb. ex Plante. — **Дескурайния Софии**. Од. V-X. На пустырях, по обочинам дорог, улицам, по окраинам полей, реже на самих полях. Пв.

36/312/. *Diploxys muralis* (L.) DC. — **Двурядник стенной**. Од. или Дв. VI-IX. На меловых склонах с маломощной перегнойно-карбонатной почвой. В рн. 6, 17, 18, 20. P3.

37/313/. *D. viminea* (L.) DC. — **Д. прутяной**. Од. или Дв. VI-X. На меловых обнажениях. В рн. 13. P2.

38/314/. *Draba nemorosa* L. — **Крупка дубравная**. Од. IV-V. На сухих склонах, в степях, на полянах и опушках леса. Пв.

39/315/. *Erophila verna* (L.) Bess. — **Веснянка весенняя**. Од. IV-V. По степным склонам, в песчаных степях, у дорог, редко на полях. Из.

40/316/. *Erucastrum armoracioides* (Czern. ex Turcz.) Cruchet. — **Рогачка хреновидная**. Тм. или Дв. V-VI. На меловых склонах, меловых сосняках, в тырсовых степях на каменистых карбонатных почвах. В рн. 6, 13, 17, 18, 20. P3.

41/317/. *E. cretaceum* Kotov — **Р. меловая**. Тм. или Дв. V-VI. На меловых склонах. В рн. 6. P2.

42/318/. *Erysimum cheiranthoides* L. — **Желтушник левкойный**. Од. V-IX. На сухих лугах и в луговых степях, около жилищ, на пустырях, у дорог, на вырубках, по окраинам полей. Сп.

43/319/. *E. diffusum* Ehrh — **Ж. серый**. Дв. V-VII. На меловых склонах, по остепненным опушкам сосновых лесов, иногда на солонцеватых почвах. Из.

44/320/. *E. hieracifolium* L. — **Ж. ястребинковый**. Од. или Дв., иногда Тм. V-VII. По сухим открытым склонам, светлым лесам, опушкам, вырубкам, в поймах рек. Сп.

45/321/. *Euclidium syriacum* (L.) R.Br. — **Крепкоплодник сирийский**. Од. IV-VII. В степях на перегнойно-карбонатной почве. В рн. 13. P2. На с.-з. границе ареала.

46/322/. *Hesperis ruscifolia* Borb. et Degen. — **Вечерница густоволосистая**. Дв. VI-VII. На лесных полянах, травяных склонах. P4. Близ с.-з. границы ареала.

47/323/. *H. sibirica* L. — **В. сибирская**. Дв. VI-VIII. В лесах и на лесных полянах. В рн. 7. P1. Близ з. границы ареала.

48/324/. *Isatis costata* C.A. Mey. — **Ваида ребристая**. Дв. V-VI. Заносное по обочинам автодорог. В рн. 12.

- 49/325/. *I. tinctoria* L. — **В. красильная**. Дв. V-VI. На сухих лугах, по луговинам у ж.-д. полотна. В рн.6, 17, 18, 21. Р4.
- 50/326/. *Lepidium campestre* (L.) R. Br. — **Клоповник полевой**. Дв. V-VI. У дорог, на ж.-д. насыпях. Из.
- 51/327/. *L. densiflorum* Schrad. — **К. густоцветный**. Од. или Дв. V-VI. На ж.-д. насыпях, реже на полях и в песчаных степях. Из. Заносное в ю. рн.
- 52/328/. *L. latifolium* L. — **К. широколистный**. Тм. VI-VII. По берегам рек, на сырых лугах и около жилья. Сп.
- 53/329/. *L. perfoliatum* L. — **К. пронзеннолистный**. Од. или Дв. V-VI. В населенных пунктах. Заносное в рн.20.
- 54/330/. *L. ruderale* L. — **К. сорный**. Од. или Дв. V-IX. По мусорным местам, у дорог, на улицах, на выгонах, на обочинах полей. Пв.
- 55/331/. *Matthiola fragrans* Bunge. — **Левкой душистый**. Тм. V-VI. На меловых обнажениях. В рн.16,17. Р1. На с. границе ареала. Эндем.
- 56/332/. *Meniocus linifolium* (Steph.) DC. — **Плоскоплодник льнолистный**. IV-VIII. Од. На щебневато-каменистых меловых склонах и на перегнойно-карбонатной почве. В некоторых рн. Пб. Р4. Близ с.-з. границы ареала.
- 57/333/. *Neslia paniculata* (L.) Desf. — **Неслия метельчатая**. Од. V-VI. В посевах, у дорог, иногда на степных склонах и вырубках. Из.
- 58/334/. *Rhaphanus raphanistrum* L. — **Редька дикая**. Од. V-X. В посевах, на мусорных местах, у дорог, около жилья. Пв.
- 59/335/. *Rorippa amphibia* (L.) Bess. — **Жерушник земноводный**. Тм. V-VI. В озерах, ручьях, канавах, по берегам рек, по болотистым и лесным мочажинам. Пв.
- 60/336/. *R. anceps* (Wahlenb.) Reichenb. — **Ж. обоюдоострый**. Тм. V-IX. По сырым местам, берегам рек. Из.
- 61/337/. *R. austriaca* (Crantz.) Bess. — **Ж. австрийский**. Тм. V-VII. На заливных лугах, по берегам рек, озер, болотам. Пв.
- 62/338/. *R. brachycarpa* (C.A.Mey.) Hayck. — **Ж. короткоплодный**. Од. или Дв. V-VI. По сырым пойменным лесам, лугам, берегам рек и другим сырым местам. Сп.
- 63/339/. *R. palustris* (L.) Bess. — **Ж. болотный**. Од. или Тм. VI-IX. По берегам водоемов, канавам, сырым лугам, сырым лесным полянам. Пв.
- 64/340/. *R. sylvestris* (L.) Bess. — **Ж. лесной**. Тм. V-VIII. По сырым местам, берегам рек, в канавах, на сырых лесных полянах. Сп.
- 65/341/. *Schivereckia podolica* Andrz. — **Шиверекия подольская**. Тм. V-VIII. В злаковой степи на дерново-карбонатной почве. В рн.13. Р1. Реликт.
- 66/342/. *Sinapis alba* L. — **Горчица белая**. Од. VI-VII. В посевах, у дорог, по улицам. Из.
- 67/343/. *S. arvensis* L. — **Г. полевая**. Од. V-VIII. В посевах, по мусорным местам, у дорог, в огородах. Сп.
- 68/344/. *Sisymbrium altissimum* L. — **Гулявник высокий**. Дв. V-VIII. По улицам, огородам, ж.-д. насыпям, около дорог, иногда на прибрежных песках. Сп.
- 69/345/. *S. loeselii* L. — **Г. Лезеля**. Од. V-IX. На пустырях, по улицам, у дорог, по

- обочинам полей, на ж.-д. насыпях, на вырубках, в нарушенных степях. Пв.
 70/346/. *S. officinale* (L.) Scop. — **Г. лекарственный**. Од. V-IX. По улицам в населенных пунктах, по огородам, мусорным местам, у дорог. Сп.
 71/347/. *S. strictissimum* L. — **Г. прямой**. Тм. VI-VII. На прибрежных песках, в лесах. Из.
 72/348/. *S. wolgensis* Bieb. ex Fourn — **Г. волжский**. Тм. V-VI. На мусорных местах, на полях, у дорог, на ж.-д. насыпях. Из.
 73/349/. *Syrenia cana* (Pill. et Mill.) Neilz. — **Сирения седая**. Дв. VI-VII. В песчаных и песчано-каменистых степях, по притеррасным пескам, на меловых склонах. Из.
 74/350/. *S. montana* (Pall.) Klok. — **С. горная**. Дв. VI-VII. В песчаных степях, по опушкам и вырубкам соснового леса, на меловых склонах. Из.
 75/351/. *S. siliculosa* (Bieb.) Andrz. — **С. стручковая**. Дв. V I-VI I. В песчаных степях, на остепненных участках речных террас. Из.
 76/352/. *Thlaspi arvense* L. — **Ярутка полевая**. Од. IV - IX. У дорог, на улицах, около жилья, на мусорных местах, на вырубках, по обочинам дорог, в посевах. Пв.
 77/353/. *Turritis glabra* L. — **Вяжечка гладкая**. Од. или Дв. V - VIII. В песчаных степях, на лесных полянах и вырубках преимущественно с песчаной почвой, иногда на меловых склонах с перегнойно-карбонатной почвой. Сп.

Сем.41. Resedaceae — Резедовые

- 1/354/. *Reseda lutea* L. — **Резеда желтая**. Тм. или Дв. V-IX. По меловым склонам, на перегнойно-карбонатной почве, реже на песках и по обочинам полей. В рн. Пб. 6, 16, 17, 18, 20. В Лб. Заносное в рн. 7, 8.

Сем. 42. Salicaceae — Ивовые

- 1/355/. *Populus alba* L. — **Тополь белый, или серебристый**. Д. IV. В долинах рек. Сп.
 2/356/. *P. nigra* L. — **Т. черный или Осокорь**. Д. IV-V. В поймах рек, по берегам рек и лесных ручьев. Сп.
 3/357/. *P. tremula* L. — **Т. дрожащий или Осина**. Д. IV-V. На светло-серых и темно-серых лесных почвах, а также в качестве примеси в широколиственных и сосново-широколиственных лесах. Пв.
 4/358/. *P. suaveolens* Fisch. — **Т. душистый**. Д. IV-V. Одичавшее в населенных пунктах.
 5/359/. *Salix acutifolia* Willd. — **Ива остролистная или Шелюга красная**. Д. или К. IV-V. На песках, особенно в долинах рек, в песчаных степях. Из.
 6/360/. *S. alba* L. — **И. белая или Ветла**. Д. V. По берегам рек, речек, ручьев, озер, канав. Пв.
 7/361/. *S. aurita* L. — **И. ушастая**. К. V. На лесных болотах, в сырых лесах, в

долинах лесных речек. Сп.

8/362/. *S. caprea* L. — **И. козья или Бредина**. Д. или К. IV-V. В сосновых, сосново-широколиственных и широколиственных лесах. Пв.

9/363/. *S. cinerea* L. — **И. пепельная**. К. V. В поймах рек, по лесным мочажинам, на болотах. Сп.

10/364/. *S. dasyclados* Wimm. — **И. шерстистопобеговая**. К. IV-V. По берегам рек и ручьев. Из.

11/365/. *S. fragilis* L. — **И. ломкая или Ракита**. Д. V. По берегам водоемов, по ключевым болотцам, изредка на болотах. Пв.

12/366/. *S. lapponum* L. — **И. лапландская или лопарская**. К. IV-V. На торфяных болотах и сплавинах озер. В рн. 1, 12, 14, 15, 16, 19. РЗ. На ю. границе ареала.

13/367/. *S. myrsinifolia* Salisb. — **И. мирзинолистная или чернеющая**. К. V. На сфагновых болотах. В рн. 1, 10, 15. РЗ.

14/368/. *S. myrtilloides* L. — **И. черниковидная**. К. V. На сфагновых болотах и по заболоченным лесам. В рн. 7, 10, 14. РЗ.

15/369/. *S. pentandra* L. — **И. пятитычинковая или Чернотал**. Д. или К. V-VI. По окраинам болот, на сыроватых вырубках, в сырых балках, по берегам рек и ручьев, в поймах рек, в заболоченных лесах. Из.

16/370/. *S. phyllicifolia* L. — **И. филиколистная**. К. V. На болотах и сплавинах озер. В рн. 1, 14, 16, 19. РЗ. На ю. границе ареала.

17/371/. *S. purpurea* L. — **И. пурпурная**. К. V. По берегам рек, ручьев. Из.

18/372/. *S. rosmarinifolia* L. — **И. розмаринолистная**. К. IV-V. По сфагновым и осоково-травяным болотам, на сплавинах озер. В рн. 1, 7, 12, 14, 17, 19. РЗ.

19/373/. *S. starkeana* Willd. — **И. приземистая**. К. V. По лесам, лесным опушкам, вырубкам. Сп.

20/374/. *S. triandra* L. — **И. трехтычинковая**. К. V. По прибрежным пескам, берегам рек, озер, реже на травяных болотах. Пв.

21/375/. *S. viminalis* L. — **И. корзиночная**. К. V. По прибрежным пескам, берегам рек, ручьев, в поймах, в сырых балках. Пв.

Сем. 43. Ericaceae (Vacciniaceae) — Вересковые

1/376/. *Andromeda polifolia* L. — **Подбел белолистник**. Кч. IV-VI. По торфяным болотам, на сплавинах озер, в сфагновых сосняках. В рн. 1, 10, 14, 16. РЗ. Реликт. На ю. границе ареала.

2/377/. *Calluna vulgaris* (L.) Hull. — **Вереск обыкновенный**. К. или Кч. VI-VIII. В сухих сосновых лесах. Ро.

3/378/. *Chamaedaphne calyculata* (L.) Moench. — **Болотный мирт обыкновенный**. К. или Кч. V. По торфяным болотам, сплавинам озер, в сфагновых сосняках. В рн. 1, 3, 10, 14, 15, 19. РЗ. Реликт. На ю. границе ареала.

4/379/. *Ledum palustre* L. — **Багульник болотный**. К. или Кч. V-VI. По сфагновым болотам, на сплавинах озер, в сфагновых сосняках. В рн. 1, 10, 11, 14. РЗ. Реликт. На ю. границе ареала.

- 5/380/. *Oxycoccus palustris* L. — **Клюква болотная**. Кч. V-VI. На сфагновых болотах и сфагновых сплавинах озер. В рн. 3, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19. РЗ. Реликт. На ю. границе ареала.
- 6/381/. *Vaccinium myrtillus* L. — **Черника**. Кч. V. В сыроватых сосновых лесах зеленомошниках, по окраинам торфяных болот, изредка в сыроватых березняках и сосново-широколиственных лесах. В рн. 1, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Реликт. Близ ю. границы ареала.
- 7/382/. *V. uliginosum* L. — **Голубика или Гонобобель**. Кч. или К. V-VI. По сфагновым болотам, в сфагновых сосняках. В рн. 1, 11, 15. Р1. Реликт. На ю. границе ареала.
- 8/383/. *V. vitis-idaea* L. — **Брусника**. Кч. V-VI. В сосновых лесах зеленомошниках, реже в сосново-широколиственных и вторичных лиственных лесах. В рн. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21. Реликт. Близ ю. границы ареала.

Сем. 44. Pyrolaceae — Грушанковые.

- 1/384/. *Chimaphila umbellata* (L.) W. Barton. — **Зимолоубка зонтичная**. Тм. VII-VIII. В сосновых лесах зеленомошниках и вторичных лиственных лесах. В рн. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21. Близ ю. границы ареала
- 2/385/. *Moneses uniflora* (L.) A. Cray. — **Одноцветка крупноцветковая**. Тм. VI-VII. В сосновых лесах зеленомошниках. В рн. 5, 10, 11, 12, 15, 21. РЗ. На ю. границе ареала.
- 3/386/. *Orthilia secunda* (L.) Garcke. — **Ортилия однобокая**. Тм. VI-VII. В сосновых лесах зеленомошниках, реже в сосново-широколиственных, вторичных широколиственных и мелколиственных лесах. В рн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Близ ю. границы ареала.
- 4/387/. *Pyrola chlorantha* Sw. — **Грушанка зеленоцветковая**. Тм. VI-VII. В сосновых лесах зеленомошниках, иногда в сосново-широколиственных и вторичных лиственных лесах. В рн. 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. РЗ. Близ ю. границы ареала.
- 5/388/. *P. media* Sw. — **Г. средняя**. Тм. VII. В сосновых лесах зеленомошниках. В рн. 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16. РЗ. На ю. границе ареала.
- 6/389/. *P. minor* L. — **Г. малая**. Тм. VI-VII. В сосновых лесах зеленомошниках, иногда во вторичных лиственных лесах. В рн. 1, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 16. РЗ. На ю. границе ареала.
- 7/390. *P. rotundifolia* L. — **Г. круглолистная**. Тм. VI-VII. В сыроватых сосновых лесах зеленомошниках и сосново-еловых лесах, реже в сосново-широколиственных лесах, заболоченных березняках, сыроватых вторичных лиственных лесах и по окраинам лесных болот. В рн. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21. РЗ. Близ ю. границы ареала.

Сем. 45. Monotropaceae — Вертляницевые

1/391/. *Hypopitys monotropa* Crantz — **Подъельник обыкновенный**. Тм. VI-VII. В сосновых лесах зеленомошниках, изредка в сосново-широколиственных лесах вторичных лиственных лесах и сосновых посадках. В рн. 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16. P3.

Сем. 46. Primulaceae — Первоцветные

- 1/392/. *Androsace elongata* L. — **Проломник удлинённый**. Од. IV-VI. В песчаных степях, на сухих лугах, открытых склонах, в остепненных лесах. Пв.
- 1/393/. *A. filiformis* Retz. — **П. нитевидный**. Од. V-VIII. По сырым лесным дорогам, мокрым лугам, берегам рек. Из. в рн. Пб.
- 3/394/. *A. maxima* L. — **П. наибольший**. Од. IV-V. В нарушенных степях по степным склонам на песчаных, глинистых и перегнойно-карбонатных почвах, иногда на солонцеватой почве. Сп., преимущественно в ю. и ю.-в. рн.
- 4/395/. *A. septentrionalis* L. — **П. северный**. Од. IV-VII. По степным склонам, в сухих сосняках, осветленных лиственных лесах, на вырубках. Пв.
- 5/396/. *Glaux maritima* L. — **Глаукс морской**. Тм. V-VI. На влажных солонцеватых лугах. В рн. 9. P2.
- 6/397/. *Lysimachia nummularia* L. — **Вербейник монетолистный или луговой чай**. Тм. VI-VII. По сыроватым лугам, лесам и лесным полянам в поймах рек. Пв.
- 7/398/. *L. vulgaris* L. — **В. обыкновенный**. Тм. VI-VII. По сырым лесам, на болотах, в поймах и по берегам рек и ручьев. Пв.
- 8/399/. *Naumburgia thyrsoflora* (L) Reichenb. — **Наумбургия кистевидная**. Тм. V-VII. В сырых поймах рек, в мелкой воде рек и озер, на сплавинах озер, на болотах. Сп.
- 9/400/. *Primula macrocalix* Bunge. — **Первоцвет крупночашечный**. Тм. V-VI. В осветленных лиственных лесах. В рн. 5, 19. P2.
- 10/401/. *P. veris* L. — **П. весенний**. Тм. IV-V. На лесных полянах и опушках, в разреженных лиственных лесах, по остепненным склонам. Сп. P3.
- 11/402/. *Trientalis europaea* L. — **Седмичник европейский**. Тм. V-VI. В сыроватых сосняках зеленомошниках и березовых лесах, по окраинам лесных болот. Пв.

Сем. 47. Tiliaceae — Липовые

- 1/403/. *Tilia cordata* Mill. — **Липа мелколистная или сердцевидная**. Д. VI-VII. На светло-серых и темно-серых лесных супесчаных и легкосуглинистых почвах и как примесь в других лесах. Пв.
- T. platyphyllos** Scop. — **Л. широколистная**. Д. VI. В парках и скверах, реже в уличных посадках. Интродуцент. Родина - Украина, Молдавия, Кавказ.

Сем. 48. Malvaceae — Мальвовые

- 1/404/. *Abutilon theophrasti* Medik. — **Канатник Теофраста**. Од. VII-VIII. Из. заносное на ж.-д. станциях. В рн. 5, 7.
- Alcea rosea* L. — **Шток-роза розовая, или Мальва садовая**. Тм. VI-IX. Культивируется как декоративное в цветниках. Натурализация. Расселяется семенным путем близ мест культивирования. Вдоль заборов и домов, на мусорных местах, обочинах дорог. Изредка.
- 2/405/. *Althaea officinalis* L. — **Алтей лекарственный**. Тм. VI-IX. В поймах, по беретм рек и сырым лугам. В рн. 8. P2. Раньше был обилен в пойме Волги, теперь затопленной.
- 3/406/. *Lavatera thuringiaca* L. — **Хатьма тюрингенская**. Тм. VI-IX. По степным склонам, разреженным остепненным лесам и опушкам. Сп.
- 4/407/. *Malva neglecta* Wallr. — **Просвирник пренебреженный**. Од. VI-IX. По огородам, у дорог. Из.
- 5/408/. *M. pusilla* Smith. — **П. приземистый**. Од. VI-IX. По улицам, огородам, садам. Пв.
- 6/409/. *M. sylvestris* L. — **П. лесной**. Од. или Дв., или Тм. VI-VIII. По пустырям. Из.

Сем. 49. Euphorbiaceae — Молочайные

- 1/410/. *Euphorbia borodinii* Sambuk — **Молочай Бородина**. Тм. VI-VII. По пойменным лугам, опушкам лиственных лесов. Из. в рн. Пб.
- 2/411/. *E. cyparissias* L. — **М. кипарисовый**. Тм. V-VI. В сосняках на песчаной почве, на песках. В рн. 8. P4. На в. границе ареала.
- 3/412/. *E. esula* L. — **М. острый**. Тм. VII-VIII. На степных склонах, лесных полянах, у дорог. В рн. 5, 6, 12, 13, 17, 18. P4. Из.
- 4/413/. *E. glareosa* Pall. ex Bieb. — **М. хрящеватый**. Тм. VI. В каменистых степях. В рн. 16. Редко.
- 5/414/. *E. helioscopia* L. — **М. солнцегляд**. Од. VI-VIII. У дорог, по огородам, садам, на полях. Из.
- E. marginata* Pursh. — **М. окаймленный**. Од. VI-VII. Выращивается как декоративное в цветниках. Интродуцент. Выращивается сорт "Suumer loiele". Семена успешно вызревают, поэтому в цветниках на будущий год наблюдается самосев. В г. Ульяновске - с 2006 г.
- 6/415/. *E. palustris* L. — **М. болотный**. Тм. VI-VII. По сырым лугам. Сп.
- 7/416/. *E. pseudagraria* P.Smirn. — **М. ложнополевой**. Тм. V-VI. В степях на меловой почве. В рн. 18, 20. P4.
- 8/417/. *E. seguieriana* Neck. — **М. Сегье**. Тм. V-VI. По сухим остепненным склонам на карбонатных почвах, на меловых обнажениях, реже на песках. Сп. в рн. Пб. и Из. на ю. в. Лб. P3.
- 9/418/. *E. semivillosa* Prokh. — **М. полумохнатый**. Тм. VI-VII. По остепненным лугам, берегам рек, балкам. Сп.
- 10/419/. *E. subtilis* Prokh. — **М. тонкий**. Тм. VI-VII. В светлых дубовых и сосново-дубовых лесах. Из. в рн. 17, 18.

11/420/. *E. uralensis* Fisch. ex Link. — **М. уральский**. Тм. VI-VII. Вдоль дорог. В рн. 6, 13. Редкое.

12/421/. *E. volgensis* Krysh. — **М. волжский**. Тм. VI-VII. На мелах, меловом рухляке, каменных склонах. В рн. 12, 16, 17, 18, 20. РЗ. Эндем.

13/422/. *E. waldsteinii* (Sojak) Czer. — **М. Вальдштейна**. Тм. VI-VIII. На полях, в степях, осветленных лесах, вырубках. Пв.

14/423/. *Mercurialis perennis* L. — **Пролесник многолетний**. Тм. IV-V. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах. Сп.

Ricinus communis L. — **Клещевина обыкновенная или Кастор**. Од. VII-X. Выращивается (декоративное) в садах, цветниках.

Сем. 50. Thymelaeaceae — Волчниковые

1/424/. *Daphne mezereum* L. — **Волчник обыкновенный или Волчье лыко**. К. IV-V. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах, иногда на облесенных меловых склонах. Из.РЗ

2/425/. *Thymelaea passerina* L. — **Тимелея воробьиная**. Од. VII. По склонам на меловой почве, реже в посевах. В рн. 17, 18. Р4.

Сем. 51. Elaeagnaceae — Лоховые

1/426/. *Elaeagnus angustifolia* L. — **Лох узколистный**. К. VI. Одицавшее по песчаным местам, балкам, склонам оврагов, у дорог, по опушкам лесов. В рн. 6, 7, 17.

Hippophae rhamnoides L. — **Облепиха крушиновидная**. К. IV-V. Выращивается как плодое растение. Интродуцент. Родина - Кавказ, Средняя Азия, Западная Сибирь. Натурализация: по берегам и поймам рек, по песчано-глинистым обнажениям берегов Куйбышевского водохранилища, озер и прудов.

Сем. Hydrangeaceae — Гортензиевые

Hydrangia arborescens L. f. *grandiflora* Rehd. — **Гортензия древовидная форма крупноцветковая**. К. Интродуцент. Выращивается в садах как декоративное растение.

Сем. 52. Grossulariaceae — Крыжовниковые

1/427/. *Grossularia reclinata* (L) Mill. — **Крыжовник обыкновенный**. К. V. Одицавшее в лесах в рн. 6, 7.

2/428/. *Ribes nigrum* L. — **Смородина черная**. К. V. По пойменным лесам, по берегам лесных ручьев и речек, реже по сыроватым водораздельным лесам. Сп.

3/429/. *R. pubescens* (Hartm.) Hedl. — **С. пушистая**. К. VI. В облесенных поймах рек. В рн. 1, 17. P2. На ю.-в. границе ареала.

Rutaceae — Рутовые

Phellodendron amurense Rupr. — **Бархат амурский, амурское пробковое дерево**. Д. VI. В парках, скверах. Интродуцент. Родина - Дальний Восток. Растет на Дальнем Востоке почти повсеместно.

Сем. 53. Crassulaceae — Толстянковые

1/430/. *Sedum acre* L. — **Очиток едкий**. Тм. VI-VII. На песках и сухих щебневатых склонах, в песчаных степях. Пв.

2/431/. *S. stepposum* Boriss. — **О. степной**. Тм. VI-VIII. На меловых склонах. Редко в рн. 17.

3/432/. *S. telephium* L. — **О. большой или Заячья капуста**. Тм. VI-VIII. В сосновых лесах, на песках. Пв.

Sempervivum tectorum L. — **Молодило кровельное**. Тм. VIII-IX. Выращивается как декоративное растение в цветниках, на кладбищах.

Сем. 54. Saxifagaceae — Камнеломковые

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. — **Бадан толстолистный**. Тм. V-VI. В парках, скверах, садах. Культивируется как декоративное, лекарственное растение. Интродуцент. Родина - Сибирь.

1/433/. *Chrysosplenium alternifolium* L. — **Селезеночник очередно-листный**. Тм. IV-V. По топким берегам лесных ручьев, в сырых лесах. Сп.

Сем. 55. Parnassiaceae — Белозеровые

1/434/. *Parnassia palustris* L. — **Белозер болотный**. Тм. VI-VIII. По заболоченным лугам, торфяным болотам, сырым полянам. Из. P3.

Сем. 56. Droseraceae — Росянковые

1/435/. *Drosera anglica* Huds. — **Росянка английская**. Тм. VII-VIII. На сфагновых болотах и сфагновых сплавинах озер. В рн. 3, 10, 14, 15, 16. P3. Близ ю. границы ареала.

2/436/. *D. obovata* Mert. et Koch. — **Р. обратнойцевидная**. Тм. VII-VIII. На сфагновых болотах и сфагновых сплавинах озер. В рн. 10, 14, 15. P3. Близ ю. границы ареала.

3/437/. *D. rotundifolia* L. — **Р. круглолистная**. Тм. VI-VIII. На сфагновых боло-

тах и сфагновых сплавинах озер. В рн. 3, 10, 12, 14, 15, 16, 19. РЗ. Близ ю. границы ареала.

Сем. 57. Rosaceae — Розовые

1/438/. *Agrimonia eupatoria* L. — **Репешок обыкновенный**. Тм. VI-VII. На лугах, в луговых степях, склонах балок, вдоль лесных дорог, на лесных полянах, вырубках, опушках. Сп.

2/439/. *A. pilosa* Ledeb. — **Р. волосистый**. Тм. VI-VIII. В поймах рек, на лесных опушках, в облесенных оврагах. Из.

3/440/. *Alchemilla acutiloba* Opiz. — **Манжетка остролопастная**. Тм. V-VIII. По лесам, на лугах. Из.

4/441/. *A. baltica* Sam. ex Juz. — **М. балтийская**. Тм. V-VII. По опушкам и лесным полянам. Сп. в с.-з. рн. Пб.

5/442/. *A. exilis* Juz. — **М. скудная**. Тм. VI. На лесных опушках. Рн. 4. Р4.

6/443/. *A. gracilis* Opiz. — **М. грациозная**. Тм. V-VII. По лугам, кустарникам, опушкам, светлым лесам. В рн. 17. Р4.

7/444/. *A. hirsuticaulis* Lindb. fil. — **М. шершавостебельная**. Тм. V-VII. На сухих лугах, сухих лесных полянах, склонах, реже на сыроватых лугах. Пв.

8/445/. *A. monticola* Opiz — **М. горная**. Тм. V-VII. По сырým замшелым лугови-
нам, у лесных ручьев и в ложбинах. В рн. 17. Р4.

9/446/. *A. nemoralis* Alech. — **М. дубравная**. Тм. VI-VII. В дубовых лесах. В рн. 11. Р4.

10/447/. *A. sarmatica* Juz. — **М. сарматская**. Тм. V-VII. По осветленным лесам, на опушках. Сп.

11/448/. *A. subcrenata* Bus. — **М. городковатая**. Тм. V-VII. По сырým лугам, в осветленных лесах. Сп.

12/449/. *Amygdalus nana* L. — **Миндаль низкий или Бобовник**. К. IV-V. На степных и меловых склонах. В рн. 5, 6, 8, 15, 18, 20. РЗ.

13/450/. *Cerasus fruticosa* Pall. — **Вишня степная**. К. IV-V. В осветленных сосновых и сосново-широколиственных лесах, в остепненных дубняках, на степных склонах. Сп.

Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall. — **В. войлочная**. К. IV-V. Выращивается как пищевое и декоративное растение в парках, живых изгородях, садах. Интродуцент. Натурализация: в пойме р. Свяги, в разреженных лесах, близ дачных участков и в местах отдыха человека.

14/451/. *Comarum palustre* L. — **Сабельник болотный**. Тм. VI-VII. По болотам, заболоченным лугам, тонким участкам пойм. Сп.

15/452/. *Cotoneaster lucidus* Schlecht. — **Кизильник блестящий**. К. V-VI. Оди-
чавшее в г. Ульяновске. По лесам.

16/453/. *C. melanocarpus* Fisch. ex Blytt. — **К. черноплодный**. К. IV-V. По меловым и каменистым склонам, в зарослях степных кустарников, в сосновых лесах на песчано-каменистом субстрате. В рн. 1, 5, 6, 10, 13, 20. РЗ.

17/454/. *Crataegus sanguinea* Pall. — **Боярышник кроваво-красный**. К. или Д.

- V. По разреженным широколиственным, сосново-широколиственным и осиновым лесам. Из.
- 18/455/. *Filipendula denudata* (J. et C. Presl.) Fritsch. — **Лабазник обнаженный**. Тм. VI-VII. На пойменных сырых заторфованных лугах, на берегах рек. Из. P4.
- 19/456/. *F. stepposa* Juz. — **Л. степной**. Тм. VI-VII. По склонам балок, среди степных кустарников и высокотравья. В рн. 18. P4.
- 20/457/. *F. ulmaria* (L.) Maxim. — **Л. вязолистный**. Тм. VI-VII. На заболоченных лугах, торфяных болотах, по топким берегам рек и ручьев, в сырых и заболоченных лесах. Пв.
- 21/458/. *F. vulgaris* Moench. — **Л. шестилепестный или Земляные орешки**. Тм. V-VI. В луговых степях, в осветленных лесах, на вырубках, на остепненных лесных полянах и опушках. Пв.
- 22/459/. *Fragaria moschata* Duch. — **Земляника мускусная**. Тм. V-VI. По лесам и кустарникам, на опушках. Из.
- 23/460/. *F. vesca* L. — **З. лесная**. Тм. V-VI. По сосновым лесам, лесным полянам и вырубкам. Пв.
- 24/461/. *F. viridis* Duch. — **З. зеленая или Клубника, или Полуница**. Тм. V-VI. В луговых степях, по травяным степным склонам, остепненным лесным полянам и опушкам. Пв.
- 25/462/. *Geum alepnicum* Jacq. — **Гравилат алеппский**. Тм. VI-IX. По лесным опушкам, полянам, пойменным лугам. В рн. 8,13, 17,18.
- 26/463/. *G. intermedium* Ehrh. — **Г. средний**. Тм. V-VI. По лесам и кустарникам. Из.
- 27/464/. *G. rivale* L. — **Г. речной**. Тм. IV-VI. По берегам рек и озер, в поймах рек, по сырым лесам и лугам, на болотах. Пв.
- 28/465/. *G. urbanium* L. — **Г. городской**. Тм. V-VI. В лесах, преимущественно лиственных, на опушках и вырубках, в поймах рек, около жилья. Пв.
- 29/466/. *Malus domestica* Borkh. — **Яблоня домашняя**. Д. V. Одицавшее в населенных пунктах. Сп.
- Malus niedzwetzkyana* Dieck. — **Я. Недзвецкого**. Д. V. Разводят в парках, скверах. Интродуцент. Родина - Западный Тянь-Шань.
- 30/467/. *M. sylvestris* Mill. — **Я. дикая**. Д. V. По широколиственным и сосново-широколиственным лесам, реже в сосновых лесах и облесенных балках. Сп.
- 31/468/. *Padus avium* Mill. — **Черемуха обыкновенная**. К. или Д. IV-V. В поймах рек, вдоль ручьев, в широколиственных и сосново-широколиственных лесах, особенно сыроватых. Пв.
- P. virginiana* (L.) Mill. — **Ч. виргинская**. К. или Д. V. В парках, скверах. Интродуцент. Родина - Северная Америка.
- 32/469/. *Potentilla alba* L. — **Лапчатка белая**. Тм. IV-V. В сосновых и сосново-лиственных лесах. В рн. 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17. P3.
- 33/470/. *P. anserina* L. — **Л. гусиная**. Тм. V-IX. В поймах рек, по сыроватым лугам, на улицах и около дорог. Пв.
- 34/471/. *P. argentea* L. — **Л. серебристая**. Тм. V-IX. По сухим склонам, вырубкам, сухим лесным полянам, нарушенным лесам и степям, около дорог и жилья,

по обочинам полей. Пв.

35/472/. *P. arenaria* Borkh. — **Л. песчаная**. Тм. IV-VI. В песчаных степях и разреженных сосновых лесах на песчаной почве, реже в степях на перегнойно-карбонатной почве. Пв.

36/473/. *P. bifurca* L. — **Л. двувильчатая**. Тм. VI-VII. Заносное на ж.-д. полотне и около дорог. Из.

37/474/. *P. erecta* (L.) Raeusch. — **Л. прямостоячая или Калган, Узик**. Тм. V-IX. По влажным сосновым, сосново-широколиственным, дубовым и березовым лесам, сыроватым лесным полянам и вырубкам, по окраинам болот. Сп.

38/475/. *P. goldbachii* Rupr. — **Л. Гольдбаха**. Тм. V-VII. В остепненных сосняках, на лесных полянах и склонах. Сп.

39/476/. *P. heptaphylla* L. — **Л. тусклая**. Тм. IV-V. В степях на засоленных почвах. В рн. 17. P0.

40/477/. *P. humifusa* Willd. ex Schlecht. — **Л. распростертая**. Тм. IV-V. По степным склонам с перегнойно-карбонатной почвой, в песчаных степях, в разреженных сосновых лесах, на вырубках. В рн. 1, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 21.

41/478/. *P. intermedia* L. — **Л. средняя**. Тм. V-IX. В сосновых лесах, на лесных полянах, у дорог, по окраинам полей. Сп.

42/479/. *P. longipes* Ledeb. — **Л. длинночерешковая**. Тм. V-IX. В дубовых лесах на меловой супесчаной почве. В рн. 17. P4.

43/480/. *P. norvegica* L. — **Л. норвежская**. Од. или Дв. VI-IX. На вырубках, лесных полянах, в разреженных лесах, по берегам рек, окраинам полей, около жилья. Сп.

44/481/. *P. recta* L. — **Л. прямая**. Тм. VI-VII. На перегнойно-карбонатных почвах, меловых склонах, на остепненных лесных полянах, в степях, в долинах рек. Сп.

45/482/. *P. supina* L. — **Л. лежачая**. Од. или Дв. По песчаным берегам рек, песчаным влажным днищам балок, у жилья. Из.

46/483/. *P. volgarica* Juz. — **Л. волжская**. Тм. VI. На меловых склонах. В рн. 20. P1. На с. границе ареала.

Prunus domestica L. — **Слива домашняя**. К. IV-V. Разводится в садах. В диком виде не встречается. Произошел путем естественной гибридизации алычи с терном (*Prunus divaricata* Ledeb. x *P. spinosa* L.). В культуре более 2000 лет, известно более 2-3 тыс. сортов, из которых широко распространены 150-200.

47/484/. *Prunus spinosa* L. — **Слива колючая или Терн**. К. IV-V. По степным и меловым склонам, остепненным опушкам и в остепненных сосново-дубовых лесах. В рн. 6, 16, 18, 19. P4.

48/ 485/. *Pyrus communis* L. — **Груша обыкновенная**. Д. V. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах, по опушкам. Из.

49/486/. *Rosa acicularis* Lindl. — **Шиповник иглистый**. К. VI-VII. По разреженным лесам, кустарникам, холмам. Из. P4.

50/487/. *R. canina* L. — **Ш. собачий**. К. VI-VII. По разреженным лесам, склонам балок. Из.

51/488/. *R. gallica* L. — **Ш. французский**. К. V-VI. Одичавшее в рн. 14., в старом

парке.

52/489/. *R. glabrifolia* C.A.Mey ex Rupr. — **Ш. гололистный**. К. V-VII. В степи на меловых склонах. В рн. 16. P4.

53/490/. *R. majalis* Herrm. — **Ш. коричный или майский**. К. V-VII. По широколиственным и сосново-широколиственным лесам, опушкам, вырубкам, лесным оврагам, в поймах рек. Пв.

54/491/. *R. pratorum* Sukacz. — **Ш. луговой**. К. V-VII. В степи на меловом рухляке. В рн.16. P4.

55/492/. *R. tomentosa* Smith. — **Ш. войлочный**. К. VI. По степным склонам. P0 .

56/493/. *Rubus caesius* L. — **Ежевика**. Пк. VI-IX. В поймах рек, в сыроватых лесах на водоразделах. Сп.

57/494/. *R. idaeus* L. — **Малина**. Пк. VI-VIII. На вырубках, гарях, лесных полянах, разреженных лесах, в поймах рек. Пв.

58/495/. *R. nessensis* W.Hall. — **Куманика**. Пк. VI-VII. В поймах рек и сосновых лесах. В рн. 17, 18. P2.

59/496/. *R. saxatilis* L. — **Костяника**. Тм. V-VI. В сосновых, сосново-дубовых и осветленных лиственных лесах, на вырубках. Пв.

60/497/. *Sanguisorba officinalis* L. — **Кровохлебка лекарственная**. Тм. VI-VII. По влажным лугам, берегам водоемов, лесным полянам, вырубкам, разреженным лиственным лесам, опушкам, на меловых и мергелистых склонах. Пв.

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. — **Рябинник рябинолистный**. К. VI-VII. В парках, скверах, уличных посадках. Интродуцент. Родина - Сибирь. Натурализация. Расселяется семенным путем близ мест культивирования. Отмечен в лесу у с. Архангельского Чердаклинского района. Единично.

61/498/. *Sorbus aucuparia* L. — **Рябина обыкновенная**. Д. или К. V. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах, на опушках и вырубках. Пв.

62/499/. *Spiraea crenata* L. — **Спирея городчатая**. К. V-VI. По степным склонам, остепненным опушкам, в разреженных остепненных сосновых, сосново-дубовых и дубовых лесах. Сп.

63/500/. *S. hypericifolia* L. — **С. зверобоелистная**. К. V. Одичавшее в некоторых рн.

64/501/. *S. litvinovii* Dobroc. — **С. Литвинова**. К. V-VII. По остепненным соснякам и в зарослях степных кустарников. В рн. 17, 18. P4.

65/502/. *S. salicifolia* L. — **С. иволистная**. Одичавшее в пойме реки в рн. 17.

Spiraea x bumalda Burv. (*S. japonica* L. x *S. albiflora* (Miq.) Zbl.) — **С. Бумальда**. К. VI. В парках, скверах. Интродуцент.

Сем. 58. Fabaceae (Leguminosae) — Бобовые

Amorpha fruticosa L. — **Аморфа кустарниковая**. К. VI. Культивируется как декоративное растение в парках, скверах, иногда в уличных посадках. Интродуцент. Родина - Северная Америка. Натурализация. Расселяется семенным путем. В пойме р. Свияги - экопарк "Черное озеро". Единично.

1/503/. *Anthyllis macrocephala* Wend. — **Язвенник крупноголовый**. Тм. VI-VII.

По склонам и сухим лугам. Ро.

2/504/. *Astragalus albicaulis* DC. — **Астрагал белостебельный**. Пк. V -VI. По каменистым и меловым степям. На юге Пб. P2. Эндем.

3/505/. *A. arenarius* L. — **А. песчаный**. Тм. V-VI. В сухих сосняках песчаных степях. Из.

4/506/. *A. asper* Jacq. — **А. шершавый**. Тм. VI-VII. В степях. На юге Пб. P4. На с. границе ареала.

5/507/. *A. austriacus* Jacq. — **А. австрийский**. Тм. V-VI. В степях. Сп.

6/508/. *A. brachylobus* DC. — **А. коротколопастный**. Пк. V-VIII. По степям и сухим склонам. В ю. рн. Пб. P3 На с. границе ареала. Эндем.

7/509/. *A. cicer* L. — **А. нутовый**. Тм. V-VIII. В лиственных лесах, на склонах, лугах, вырубках. Пв.

8/510/. *A. cornutus* Pall. — **А. рогоплодный**. Кч. VI-VII. В степях на меловых щеблеватых склонах. В рн. 6, 13, 16, 18. P3. На с. границе ареала. Эндем.

9/511/. *A. danicus* Retz. — **А. датский**. Тм. V-VI. По лугам, склонам, лесным полянам. Сп.

A. elenevskiy Sytin — **А. Еленевского**. Тм. V-VI. На степных каменистых и песчаных склонах, опушках сосняков, в степях, иногда на обнажениях мела.

10/512/. *A. glycyphyllos* L. — **А. солодколистный**. Тм. V-IX. В разреженных лесах. Сп.

11/513/. *A. helmii* Fisch. — **А. Гельма**. Тм. V-VI. В степях с каменистой почвой. На юге Пб. P2. Эндем.

12/514/. *A. henningii* (Stev.) Klok. — **А. Хеннинга**. Тм. V. В степях. На юге Пб. и в Лб. на ю.-в. рн. 8. P3. Эндем.

13/515/. *A. macropus* Bunge. — **А. длинноногий**. Пк. V-VI. По солонцеватым склонам балок. В рн. 17. P3. На с. границе ареала.

14/516/. *A. onobrychis* L. — **А. эспарцетный**. Тм. V-VI. На степных каменистых и песчаных склонах, опушках сосняков, в степях, иногда на обнажениях мела. Сп. в рн. Пб.

15/517/. *A. pseudotataricus* Boriss. — **А. ложнотатарский**. Пк. По солонцеватым глинистым склонам балок. В рн. 17. P3. На с. границе ареала.

16/518/. *A. rupifragus* Pall. — **А. камнеломковый**. Тм. V-VI. По степным склонам балок на глинистой щебневатой почве. В рн. 6, 13, 17, 18. P3 На с.-з. границе ареала.

17/519/. *A. sulcatus* L. — **А. бороздчатый**. Тм. VI-VII. В луговых степях с перегнойно-карбонатной почвой, на мелах. В рн. 6, 16, 17. P3.

18/520/. *A. testiculatus* Pall. — **А. яйцеплодный**. Тм. V. В степях, на меловых склонах. Из. в Пб., в Лб. на ю.-в. рн. 8.

19/521/. *A. varius* S.G.Gmel. — **А. разноцветный**. Пк. VII-VIII. В степях с глинистыми, песчаными и каменистыми почвами. Из. на ю. Пб.

20/522/. *A. wolgensis* Bunge. — **А. волжский**. Тм. V-VI. По меловым и каменистым степям. На юге Пб. P2. Эндем.

21/523/. *A. zingeri* Korsh. — **А. Цингера**. Пк. VI. На меловых обнажениях, в степях с карбонатной почвой. В ю. рн. Пб. P3. Эндем.

- 22/524/. *Calophaca wolgarica* (*L.fil.*) *DC.* — **Майкараган волжский**. К. VII-VIII. По степным склонам, опушкам сосняков. На юге Пб. Ро. На с. границе ареала. Эндем.
- Caragana arborescens* *Lam.* — **Карагана древовидная, или Желтая акация**. К. V-VI. В сосновых посадках, парках, скверах, в уличных посадках и живых изгородях. Интродуцент. Родина - Сибирь, Ср.Азия, Монголия. Натурализация. Расселяется семенным путем близ мест культивирования. Единично. Описано из Сибири.
- 23/525/. *Caragana frutex* (*L*) *C.Koch.* — **Караганник кустарниковый**. К. V-VI. По степям и склонам. В ю. рн. Пб. Р2. На с. границе ареала.
- 24/526/. *Coronilla varia* *L.* — **Вязель разноцветный**. Тм. V-IX. В разреженных лиственных лесах, на лесных полянах, в луговых степях. Пв.
- 25/527/. *Cytisus ruthenicus* *Fisch.ex Woloszcz.* — **Ракитник русский**. К. V-VI. В сосновых, сосново-широколиственных и вторичных дубовых лесах, на вырубках, в песчаных степях и по степным склонам. Пв.
- 26/528/. *C. zingeri* (*Nenuk.*) *V.Krecz.* — **Р. Цингера**. К. V-VI. В разреженных сосновых лесах, в песчаных степях. Из.
- Galega officinalis* *L.* — **Козлятник лекарственный**. Тм. VII-VIII. Культивируется как кормовое на полях. В 2001 г. найден на замусоренном газоне у общежития УлГПУ в г. Ульяновске. Единично.
- 27/529/. *Genista tinctoria* *L.* — **Дрок красильный**. К. VI-VII. В сухих сосновых и вторичных дубовых лесах, по степным склонам, остепненным опушкам, вырубкам. Пв.
- Glycine max* (*L.*) *Merr.* — **Соя посевная**. Од. Возделывается на полях как пищевое растение. Интродуцент. Селекцией этого растения в Ульяновском государственном сельскохозяйственном институте (сейчас Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия) занимался А. Ф. Дырда, который вывел несколько районированных сортов, названных "УСХИ" (Дырда, Дырда, 1985; Дырда, 1990). В последнее время (2006 г.) соя возделывалась в некоторых хозяйствах Чердаклинского р-на.
- 28/530/. *Hedysarum gmelinii* *Ledeb.* — **Копеечник Гмелина**. Тм. V-VI. По меловым обнажениям. В рн. 4, 11, 18. Р3. На с.-з. границе ареала.
- 29/531/. *H. grandiflorum* *Pall.* — **К. крупноцветковый**. Тм. V-VIII. На меловых и мергелистых склонах. В рн. 6, 11, 17, 18, 20. Р3. Эндем.
- 30/532/. *H. rasoumovianum* *Fisch. et Helm.* — **К. Разумовского**. Тм. VII. На меловых склонах. В рн. 12. Р3. На с.-з. границе ареала. Эндем.
- 31/533/. *Lathyrus lacteus* (*Bieb.*) *Wissjul.* — **Чина венгерская**. Тм. V-VI. На лугах, опушках. Ро.
- 32/534/. *L. palustris* *L.* — **Ч. болотная**. Тм. VII-VIII. На влажных пойменных лугах, травяных болотах, иногда по берегам водоемов. Сп.
- 33/535/. *L. pallescens* (*Bieb.*) *C.Koch.* — **Ч. сероватая**. Тм. V-VI. По лесным полянам, вырубкам, остепненным опушкам. Сп. в рн. Пб., в Лб. реже.
- 34/536/. *L. pisiformis* *L.* — **Ч. гороховидная**. Тм. V-VI. В осветленных широколиственных и сосново-широколиственных лесах. Пв.

- 35/537/. *L. pratensis* L. — **Ч. луговая.** Тм. VI-IX. На пойменных лугах, лесных полянах. Пв.
- 36/538/. *L. sativus* L. — **Ч. посевная.** Од. VI-VII. В посевах. Из.
- 37/539/. *L. sylvestris* L. — **Ч. лесная.** Тм. VI-IX. По разреженным листовым лесам. Сп., но больше в с. части области.
- 38/540/. *L. tuberosus* L. — **Ч. клубненосная.** Тм. VI-IX. По степным склонам, в поймах рек. Из.
- 39/541/. *L. vernus* (L.) Bernh. — **Ч. весенняя.** Тм. V. В широколиственных, со-сново-широколиственных и осиновых лесах. Пв.
- 40/542/. *Lens culinaris* Med. — **Чечевича съедобная.** Од. VI-VII. На газонах г. Ульяновска. Из. Одичавшее.
- 41/543/. *Lotus corniculatus* L. — **Лядвенец рогатый.** Тм. V-IX. На лугах, лесных полянах, склонах. Сп.
- 42/544/. *L. tenuis* Waldst. et Kit. ex Willd. — **Л. тонкий.** Тм. VI-VII. На влажных луговинах у дороги в г. Ульяновске.
- 43/545/. *L. zhegulensis* Klok. — **Л. жигулевский.** Тм. VI-VIII. По песчаным мес-там в поймах рек. Редко в рн. 1.
- 44/546/. *Lupinus polyphyllus* Lindl. — **Люпин многолистный.** Тм. VI-IX. Из. вдоль дорог в рн. 12. Одичавшее.
- 45/547/. *Medicago falcata* L. — **Люцерна серповидная.** Тм. V-IX. На сухих лу-гах, в степях, по меловым склонам. Пв.
- 46/548/. *M. lupulina* L. — **Л. хмелевая.** Од. V-IX. По лугам, склонам, берегам рек. Пв.
- 47/549/. *M. romanica* Prod. — **Л. румынская.** Тм. V-VII. В степях, по песчано-каменистым склонам, в меловых сосняках. Из. на юге Пб., в Лб. на ю.-в. рн. 8. Р4.
- 48/550/. *M. saliva* L. — **Л. посевная.** Тм. V-VI. Вдоль дорог, в поймах рек. Из. Одичавшее.
- 49/551/. *Melilotus albus* Medik. — **Донник белый.** Дв. VI-IX. По мусорным мес-там, вдоль дорог, в поймах рек, на ж.-д. насыпях, в степях. Пв.
- 50/552/. *M. dentatus* (Waldst. et Kit.) Pers. — **Д. зубчатый.** Дв. VI-VII. На солон-цеватых почвах, балках у выхода солонцеватых грунтовых вод. В рн. 4, 6, 12, 13, 18. Р4. На с. границе ареала.
- 51/553/. *M. officinalis* (L.) Pall. — **Д. лекарственный.** Дв. VI-IX. По мусорным местам, вдоль дорог, склонам, ж.-д. станциям и насыпям. Пв.
- 52/554/. *M. wolgicus* Poir. — **Д. волжский.** Дв. VI-VII. На солонцеватых почвах, ж.-д. насыпях. В рн. 5, 6, 18. Р4.
- 53/555/. *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC. — **Эспарцет песчаный.** Тм. V-VII. В сте-пях, на меловых склонах. Из. в рн. Пб.
- 54/556/. *Ononis arvensis* L. — **Стальник полевой.** Тм. VII-VIII. На лугах, по бе-регам рек, склонам балок. Из. в рн. Пб. Р3.
- 55/557/. *Oxytropis floribunda* (Pall.) DC. — **Остролодочник яркоцветный.** Тм. V-VII. На меловых обнажениях. В рн. 13, 17, 18. Р3. На с.-з. границе ареала.
- 56/558/. *O. pilosa* (L.) DC. — **О. волосистый.** Тм. V-VII. В степях, в меловых со-

сняках. Сп.

57/559/. *O. spicata* (Pall.) O. et Fedtsch. — **О. колосистый**. Тм. V-VII. На меловых склонах. В рн. 17. P3. На с.-з. границе ареала.

58/560/. *Pisum arvense* L. — **Горох полевой**. Од. VI-VII. На полях. Из.

Robinia pseudoacacia L. — **Робиния ложноакация, или Белая акация**. Д. V-VI. В парках, скверах, в уличных посадках. Интродуцент. Родина - Сев. Америка. **Натурализация семенным путем на мусорных местах. Единично.**

59/561/. *Trifolium alpestre* L. — **Клевер альпийский**. Тм. VI-VII. В сосновых и сухих лиственных лесах, на сухих лесных полянах, луговых и песчаных степях, в меловых сосняках. Пв.

60/562/. *T. arvense* L. — **К. пашенный**. Од. V-VI. На полях, сухих лугах, в песчаных степях. Сп.

61/563/. *T. aureum* Poll. — **К. золотистый**. Од. VI-VII. На сухих лугах, в остепненных дубравах, на полях. Сп.

62/564/. *T. campestre* Schreb. — **К. равнинный**. Од. V-VII. На полях. В рн. 7. Заносное.

63/565/. *T. elegans* Savi. — **К. изящный**. Тм. VI-VIII. На влажных лугах, сырых лесных полянах. Сп.

64/566/. *T. fragiferum* L. — **К. земляничный**. Тм. VI-VII. По сыроватым лугам. Из.

65/567/. *T. hybridum* L. — **К. гибридный**. Тм. VI-VII. На пойменных лугах, в балках, разреженных лесах. Из.

66/568/. *T. medium* L. — **К. средний**. Тм. V-VII. В разреженных лесах, на лесных полянах, но склонам. Сп.

67/569/. *T. montanum* L. — **К. горный**. Тм. VI-VIII. По луговым степям, сухим лесным полянам, сухим склонам, на возвышенностях в поймах рек. Пв.

68/570/. *T. pratense* L. — **К. луговой**. Дв. или Тм. V-VIII. На лугах, в разреженных лиственных лесах, у дорог. Пв.

69/571/. *T. repens* L. — **К. ползучий**. Тм. V-IX. По сыроватым лугам, берегам водоемов, выгонам, лесным полянам. Пв.

70/572/. *T. spadicum* L. — **К. темноцветный**. Од. VI-IX. По сырым лугам и лесным полянам. Сп.

71/573/. *T. spryginii* Belaeva et Sipl. — **К. Спрыгина**. Тм. VI-VIII. В разреженных сосновых и сосново-дубовых лесах. В рн. 10, 14, 16. P2. Реликт.

72/574/. *Trigonella orthoceras* Kar. et Kir. — **Пажитник пряморогий**. Од. V-VI. Вдоль дорог. В рн. 12. Из. Заносное.

73/575/. *Vicia angustifolia* Reichard. — **Горошек узколистный**. Од. V-IX. На полях. Из. в рн. Пб.

74/576/. *V. cassubica* L. — **Г. кашубский**. Тм. VI-VIII. В сосновых, сосново-широколиственных и вторичных дубовых лесах. Из. в рн. Пб.

75/577/. *V. cracca* L. — **Г. мышинный**. Тм. V-IX. Луга, луговые степи, разреженные леса. Пв.

76/578/. *V. grandiflora* Scop. — **Г. крупноцветковый**. Од. или Дв. V-VI. На мусорных местах, г. Ульяновск. Заносное.

- 77/579/. *V. hirsuta* (L.) S.F.Gray. — **Г. волосистый**. Од. V-VI. На полях, огородах. Сп.
- 78/580/. *V. picta* Fisch. et Mey. — **Г. пестроцветный**. Дв. VI-VIII. В поймах рек. Из. в ю. рн. Пб.
- 79/581/. *V. pisiformis* L. — **Г. гороховидный**. Тм. VI-VII. В лиственных лесах. Из.
- 80/582/. *V. saliva* L. — **Г. посевной**. Од. VI-VII. В посевах, на мусорных местах. Сп. Одичавшее.
- 81/583/. *V. sepium* L. — **Г. заборный**. Тм. V-IX. В осветленных лиственных и сосново-лиственных лесах, на лесных полянах, лугах. Пв.
- 82/584/. *V. sylvatica* L. — **Г. лесной**. Тм. VI-VII. По лиственным и сосново-лиственным лесам. Сп.
- 83/585/. *V. tenuifolia* Roth. — **Г. тонколиственный**. Тм. VI-VII. В разреженных широколиственных лесах. Сп.
- 84/586/. *V. tetrasperma* (L.) Schreb. — **Г. четырехсеменной**. Од. V-XII. На полях, в балках. Из.
- 85/587/. *V. villosa* Roth. — **Г. мохнатый**. Од., реже Дв. VI-VII. На полях. Сп.

Сем. 59. Lythraceae — Дербенниковые

- 1/588/. *Lythrum salicaria* L. — **Дербенник иволистный или Плакун-трава**. Тм. VI-IX. В поймах рек, по берегам водоемов, в мелкой воде, на болотах, сырых лугах. Пв.
- 2/589/. *L. thymifolia* L. — **Д. тимьянолистник**. Од. VI-IX. По сырým солонцеватым суффузионным блюдцам. В рн. 9. P2.
- 3/590/. *L. virgatum* L. — **Д. прутовидный**. Тм. VI-VII. По сырým лесам, влажным солонцеватым местам. Сп.

Сем. 60. Onagraceae — Кипрейные

- 1/591/. *Chamerion angustifolium* (L.) Holub. — **Иван-чай узколиственный, или обыкновенный, или Капорский чай**. Тм. VI-VII. По вырубкам, гарям, в разреженных сосновых лесах, по склонам оврагов, ж.-д. насыпям. Пв.
- 2/592/. *Circaea alpina* L. — **Двулепестник альпийский**. Тм. VI-VII. По влажным соснякам зеленомошникам, в сосново-широколиственных и сосново-елово-широколиственных лесах. На с.-з. Пб. На ю. границе ареала. P2.
- 3/593/. *C. lutetiana* L. — **Д. парижский**. Тм. VI-VIII. В тенистых широколиственных лесах. В рн. 1, 6, P2. На ю. границе ареала.
- 4/594/. *Epilobium hirsutum* L. — **Кипрей волосистый**. Тм. VII-VIII. По заболоченным берегам водоемов, окраинам болот. Сп.
- 5/595/. *E. montanum* L. — **К. горный**. Тм. VI-VII. По лесам и вырубкам. Сп.
- 6/596/. *E. nervosum* Boiss. et Buhse. — **К. жилковатый**. Тм. VII-VIII. По лесным ручьям, ключевым болотам. Из.

- 7/597/. *E. palustre* L. - **К. болотный**. Тм. VI-IX. На болотах, по тонким берегам рек. Пв.
- 8/598/. *E. parviflorum* Schreb. — **К. мелкоцветковый**. Тм. VI-VIII. По тонким берегам рек и ручьев, на болотах. Из.
- 9/599/. *E. roseum* Schreb. — **К. розовый**. Тм. VII-VIII. По лесным ручьям, в поймах рек. Пв.
- 10/600/. *E. tetragonum* L. — **К. четырехгранный**. Тм. VII-VIII. По ключам, топким берегам рек. Сп.
- 11/601/. *Oenothera biennis* L. — **Ослинник двулетний**. Дв. VI-VIII. В разреженных сосновых лесах, песчаных степях, на ж.-д. насыпях. Сп. Заносное.
- 12/602/. *O. depressa* Greene. — **О. низкий**. Од. VII-VII. На ж.-д. станциях, насыпях. В г. Ульяновске, в рн. 12. Заносное.
- 13/603/. *O. rubicaulis* Klebahn. — **О. красностебельный**. Од. VII-VIII. На обочинах дорог, на мусорных местах в населенных пунктах, около суконных фабрик. В рн. 7, 10, 21. Заносное.
- O. tetragona* Roth. — **О. четырехгранный**. Од. VI-XI. Выращивается как декоративное в цветниках в последние годы. Довольно редко.

Сем. 61. Tragaceae — Рогульниковые

- 1/604/. *Trapa natans* L. — **Рогульник плавающий или Водяной орех, или Чилим**. Од. V-VI. В пойменных озерах р. Суры. Р0. Реликт.

Сем. 62. Haloragaceae — Сладкоягодниковые

- 1/605/. *Myriophyllum spicatum* L. — **Уруть колосистая**. Тм. VI-VII. В водоемах. Сп.
- 2/606/. *M. verticillatum* L. — **У. мутовчатая**. Тм. VI-VII. В водоемах. Сп.

Сем. 63. Hippuridaceae — Хвостниковые

- 1/607/. *Hippuris vulgaris* L. — **Хвостник обыкновенный, или Водяная сосенка**. Тм. VI-VII. В мелкой стоячей воде, по берегам водоемов, на болотах. Сп.

Сем. 64. Aceraceae — Кленовые

- 1/608/. *Acer negundo* L. — **Клен американский или ясенелистный**. Д. IV-V. Одичавшее по опушкам. Сп.
- 2/609/. *A. platanoides* L. — **Клен платановидный или остролистный**. Д. IV-V. Преимущественно примесь в широколиственных и сосново-широколиственных лесах на светло-серых и темно-серых лесных почвах. Пв.
- 3/610/. *A. tataricum* L. — **Клен татарский или Черноклен**. Д. или К. V-VI. В

широколиственных и сосново-широколиственных водораздельных лесах и пойменных дубравах Суры и Барыша. В рн. 1, 8, 10, 11, 18, 19, 20. РЗ.

Сем. 65. Linaceae — Льновые

1/611/. *Linum catharticum* L. — **Лен слабительный**. Од. реже Дв., иногда Тм. VI-VIII. По сыроватым лугам и полянам. Р0.

2/612/. *L. flavum* L. — **Л. желтый**. Тм. VI-VII. На меловых и мергелистых склонах, в меловых сосняках, в степях на карбонатных почвах. Только в рн. Пб. РЗ.

3/613/. *L. perenne* L. — **Л. многолетний**. Тм. VI-VII. По меловым и мергелистым склонам, в степях на перегнойно-карбонатной почве. Только в рн. Пб. РЗ.

4/614/. *L. ucranicum* Czern. — **Л. украинский**. Пк. VI-VII. По меловым и мергелистым склонам, в тырсовых степях. Только в рн. Пб. РЗ.

Сем. 66. Oxalidaceae — Кисличные

1/615/. *Oxalis acetosella* L. — **Кислица обыкновенная**. Тм. V. В сосняках зеленомошниках, реже в сосново-широколиственных лесах. В рн. 1. Р0. На ю. границе ареала.

2/616/. *Xanthoxalis corniculata* (L.) Small. — **Кисличка рогатая**. Од. или Дв. VII-IX. В цветниках г. Ульяновска. Заносное. Единично.

3/617/. *X. dillenii* (Jacq.) Holub. — **К. Диллена**. Од. или Дв. VI-IX. В садах в рн. 7. Заносное. Порою обильно.

Сем. 67. Geraniaceae — Гераниевые

1/618/. *Erodium cicutarium* (L.) LHer. — **Аистник цикутный или Грабельки**. Од. VII-IX. По полям, огородам, мусорным местам. Сп.

2/619/. *Geranium bohemicum* L. — **Герань цыганская**. Од. VI. На горелых местах, в разреженных лесах и вырубках. В рн. 1, 2, 11, 14, 15, 17. Р4.

3/620/. *G. collinum* Steph. — **Г. холмовая**. Тм. VI-VII. По балкам с глинистыми солончаковатыми почвами. В рн. 17, 18. Р4.

4/621/. *G. palustre* L. — **Г. болотная**. Тм. VI-IX. По берегам рек, ручьев, озер. Сп.

5/622/. *G. pratense* L. — **Г. луговая**. Тм. VI-IX. По лугам, лесным полянам, балкам, около жилья. Пв.

6/623/. *G. pusillum* L. — **Г. мелкая**. Од. V-IX. По пустырям, мусорным местам, на газонах. Сп.

7/624/. *G. robertianum* L. — **Г. Роберта**. Од. или Дв. VI-IX. В пойменных ольшаниках, тенистых облесенных балках. В рн. 1, 3, 5, 6, 8. РЗ. Реликт.

8/625/. *G. sanguineum* L. — **Г. кровяно-красная**. Тм. VI-VII. В сухих сосновых лесах, песчаных степях, остепненных дубняках, по балкам. Пв.

9/626/. *G. sibiricum* L. — **Г. сибирская**. Тм. VI-IX. На лесных полянах, в насе-

ленных пунктах. Из.

10/627/. *G. sylvaticum* L. — **Г. лесная**. Тм. V-VI. По сосново-лиственнным и разреженным лиственнным лесам, на вырубках. Пв.

Сем. 68. Balsaminaceae — Бальзаминовые

1/628/. *Impatiens grandulifera* Royle. — **Недотрога железистая**. Од. VI-IX. Мусорные места в городах, поселках. В рн. 6, 8, 14. Из. Одичавшее.

2/629/. *I. noli-tangere* L. — **Н. обыкновенная**. Од. VI-IX. По сырым пойменным лесам, берегам водоемов, ручьев, в сосново-еловых лесах. Сп.

Сем. 69. Polygalaceae — Истодовые

1/630/. *Polygala comosa* Schkuhr. — **Истод хохлатый**. Тм. V-VIII. На лугах, остепненных склонах, в степях. Пв.

2/631/. *P. hybrida* DC. — **И. гибридный**. Тм. V-VII. На перегнойно-карбонатных почвах. В рн. 17, 18. Р3.

3/632/. *P. podolica* DC. — **И. подольский**. Тм. V-VI. В сухих сосняках. В рн. 3. Р2.

4/633/. *P. sibirica* L. — **И. сибирский**. Тм. V-VI. На перегнойно-карбонатных почвах в степях, меловых склонах, в меловых сосняках. В рн. 2, 4, 5, 10, 14, 15, 17, 18, 20. Р3.

5/634/. *P. vulgaris* L. — **И. обыкновенный**. Тм. V-VI. По остепненным склонам, лугам, опушкам. Сп.

Сем. 70. Cornaceae — Кизилловые

1/635/. *Swida alba* (L.) Opiz — **Свидина белая**. К. V-VI. В пойменных ивниках. В рн. 17, 18. Р4.

Сем. 71. Apiaceae (Umbelliferae) — Зонтичные

1/636/. *Aegopodium podagraria* L. — **Сныть обыкновенная**. Тм. VI-VII. В широколиственных, сосново-широколиственных, осиновых и пойменных лесах, на вырубках. Пв.

2/637/. *Aethusa cynapium* L. — **Кокорыш собачья петрушка**. Од. VI-IX. Около жилья. Из.

3/638/. *Angelica archangelica* L. — **Дудник лекарственный или Дягиль**. Тм. или Дв. VI-VII. По болотам, сырым пойменным лугам и сырым лесным полянам. Сп.

4/639/. *A. palustris* (Bess.) Hoffm. — **Д. болотный**. Тм. VI-VIII. В поймах, на болотистых лугах, у ключей. Из.

- 5/640/. *A. sylvestris* L. — **Д. лесной**. Тм. VI-VIII. В сыроватых лесах, на влажных лугах. Пв.
- 6/641/. *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. — **Купырь лесной**. Тм. V-VII. В лиственных и сосново-широколиственных лесах, на вырубках. Пв.
- 7/642/. *Bupleurum aureum* Fisch. — **Володушка золотистая**. Тм. VII. В лиственных лесах. В рн. 1, 8, 11, 12, 13. P2. Реликт. На з. границе ареала.
- 8/643/. *B. falcatum* L. — **В. серповидная**. Тм. VII-VIII. На меловых обнажениях, мергелистых склонах, в каменистых и тырсовых степях с перегнойно-карбонатной почвой. Сп. в рн. Пб. P3.
- 9/644/. *Carum carvi* L. — **Тмин обыкновенный**. Дв. V-VI. На пойменных лугах, сырых лесных полянах, по окраинам болот. Пв.
- 10/645/. *Cenolophium denudatum* (Hornem.) Tutin. — **Пусторезышник обнаженный**. Тм. VI-IX. По берегам рек. Сп.
- 11/646/. *Chaerophyllum bulbosum* L. — **Бутень клубненосный**. Тм. VI-VIII. На лугах, в пойменных кустарниках. Из.
- 12/647/. *C. prescottii* DC. — **Б. Прескотта**. Тм. VI-VIII. По лугам и степям. Из.
- 13/648/. *Cicuta virosa* L. — **Вех ядовитый**. Тм. VI-IX. По болотам, топким берегам водоемов. Сп.
- 14/649/. *Cnidium dubium* (Schkuhr) Thell. — **Жгун-корень сомнительный**. Тм. VII-VIII. По осветленным лесам, в балках. Сп.
- 15/650/. *Conium maculatum* L. — **Болиголов крапчатый**. Дв. VI- VII. По мусорным местам, у жилья, на запущенных лугах, лесных полянах. Сп.
- 16/651/. *Conioselinum tataricum* Hoffm. — **Гирчовник татарский**. Тм. VI-VIII. По сырым лесам и лугам. Пв.
- 17/652/. *Daucus carota* L. — **Морковь дикая**. Дв. VI-VII. На лугах, лесных полянах. Из.
- 18/653/. *Eryngium planum* L. — **Синеголовник плосколистный**. Тм. VI-VII. В степях, на остепненных лугах, в осветленных лесах. Пв.
- 19/654/. *Falcaria vulgaris* Bernh. — **Резак обыкновенный**. Дв. VI- VIII. По степям, лесным опушкам, окраинам полей, ж.-д. насыпям. Пв.
- 20/655/. *Ferula tatarica* Fisch. ex Spreng. — **Ферула татарская**. Тм. VI-VII. В степях на перегнойно-карбонатных почвах. В рн. 15, 20. P2.
- 21/656/. *Heracleum sibiricum* L. — **Борщевик сибирский**. Тм. или Дв. VI-VII. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах, в поймах рек. Пв.
- 22/657/. *H. sosnowskyi* Manden. — **Б. Сосновского**. Тм. или Дв. VI- IX. Из. по опушкам лесополос в рн. 7. Одичавшее.
- 23/658/. *Laser trilobum* (L.) Borkh. — **Лазурник трехлопастной**. Тм. VII-VIII. В сосново-дубовых и вторичных дубовых лесах, в горных сосняках и на меловых склонах. Сп. в рн. Пб., в Лб. в рн. 8. Реликт.
- 24/659/. *Laserpitium prutenicum* L. — **Гладыш прусский**. Тм. VII-VIII. По сухим соснякам и в осветленных дубравах. Из.
- 25/660/. *Oenanthe aquatica* (L.) Poir. — **Омежник водный**. Тм. или Дв. VI-IX. По болотам, топким местам, берегам водоемов, в мелкой воде. Пв.
- 26/661/. *Pastinaca sylvestris* Mill. — **Пастернак лесной**. Дв. VI-IX. По остепнен-

- ным лугам, склонам, у жилья, около дорог. Пв.
- 27/662/. *Peucedanum alsaticum* L. — **Горичник эльзасский**. Тм. VII-VIII. В степях, разреженных остепненных лесах, на меловых склонах. Сп.
- 28/663/. *P. oreoselinum* (L.) Moench. — **Г. горный**. Тм. VI-VII. В сосновых, сосново-дубовых и вторичных дубовых лесах. Сп.
- 29/664/. *P. palustre* (L.) Moench. — **Г. болотный**. Тм. VI-VII. По заболоченным лугам, торфяным болотам, опушкам ольшаников. Из.
- 30/665/. *P. ruthenicum* Bieb. — **Г. русский**. Тм. VII-VIII. По сухим степям, остепненным сосновым лесам. Сп.
- 31/666/. *Petroselinum crispum* (Miller) Hill. — **Петрушка курчавая или посевная**. Дв. VI-VIII. Вдоль заборов и строений. Из. в рн. 6, 14. Заносное. Плодоносит, но не дичает.
- 32/667/. *Pimpinella saxifraga* L. — **Бедренец камнеломка**. Тм. VI-IX. В светлых лесах, на лесных полянах, на лугах, в степях. Пв.
- 33/668/. *P. titanophila* Woronow. — **Б. известколюбивый**. Тм. VI-VII. По меловым и мергелистым склонам. Сп. в рн. Пв. с выходом верхнемеловых карбонатных пород. РЗ.
- 34/669/. *Selinum carvifolia* L. — **Гирча тминолистная**. Тм. VI-IX. На сырых лугах, сырых лесных полянах. Сп.
- 35/670/. *Seseli annuum* L. — **Жабрица однолетняя**. Дв. или Тм., реже Од. VII-VIII. В осветленных лесах, в степях, по склонам. Сп.
- 36/671/. *S. libanotis* (L.) Koch. — **Ж. порезниковая**. Тм. VI-VII. В разреженных лесах, на лугах, по склонам. Пв.
- 37/672/. *S. tortuosum* L. — **Ж. извилистая**. Тм. VII-VIII. По степям. Из.
- 38/673/. *Silaum silaus* (L.) Schinz et Thell. — **Морковник обыкновенный**. Тм. VI-VII. На солонцах, склонах, в степях. Из.
- 39/674/. *Sium latifolium* L. — **Поручейник широколистный**. Тм. V-IX. По болотам, берегам водоемов. Сп.
- 40/675/. *S. sisaroides* DC. — **П. сизаролистный**. Тм. VI-VII. По болотистым местам, берегам рек. Сп.
- 41/676/. *Torilis japonica* (Houtt.) DC. — **Торилис японский**. Од. или Дв. VI-VII. В осветленных лесах, на лугах. Сп.
- 42/677/. *Trinia multicaulis* (Poir.) Schischk. — **Триния многостебельная**. Дв. VI-VII. На щебневато-каменистых склонах меловых бугров, в степях. В рн. 13, 16, 17, 18, 20. РЗ.
- 43/678/. *Turgenia latifolia* (L.) Hoffm. — **Тургенеция широколистная**. Од. V-VI. В посевах. Из. в рн. 17, 18.

Сем. 72. Celastraceae — Бересклетовые

- 1/679/. *Euonymus verrucosa* Scop. — **Бересклет бородавчатый**. К. V-VI. В широколиственных, сосново-широколиственных и осиновых лесах, иногда в сосновых лесах. Пв.

Vitaceae — Виноградовые

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. — **Девичий виноград пятилисточковый**. Деревянистая лиана. VII-VIII. В парках, скверах, садах, у домов. Используется для вертикального озеленения. Выращивается в бочках и ящиках на балконах. Интродуцент. Родина - Северная Америка. Натурализация. Расселяется семенным путем в лесах, сосновых посадках и по пойменным лесам.

Vitis amurensis Rupr. — **Виноград амурский**. Деревянистая лиана. VI. В парках, скверах. Интродуцент. Родина - Дальний Восток. Используется для вертикального озеленения.

Сем. 73. Rhamnaceae — Крушиновые

1/680/. *Frangula alnus* Mill. — **Крушина ломкая**. К. или Д. V-VI. В широколиственных, сосново-широколиственных, реже сосновых лесах, преимущественно сыроватых, в поймах рек. Пв.

2/681/. *Rhamnus cathartica* L. — **Жестер слабительный**. К. или Д. V-VI. На степных склонах, по остепненным опушкам, в разреженных лесах, на возвышенных участках пойм, реже в широколиственных и сосново-широколиственных лесах. Пв.

Сем. 74. Santalaceae — Санталовые

1/682/. *Thesium arvense* Horvatorszky. — **Ленец полевой**. Тм. V-VI. По луговым и песчаным степям, на каменистых щебневатых склонах. Сп.

2/683/. *Th. ebracteatum* Hayne. — **Л. бесприцветничковый**. Тм. V-VI. По лесным полянам, луговым степям. Сп.

Сем. 75. Oleaceae — Маслинные

1/684/. *Fraxinus excelsior* L. — **Ясень обыкновенный**. Д. IV-V. В широколиственных, сосново-широколиственных и осиновых лесах на светло-серых и темно-серых лесных суглинистых почвах. В рн. 1, 4, 6, 10. Р1. На в. границе ареала.

2/685/. *F. pennsylvanica* Marsh. — **Я. пенсильванский**. Д. IV-V. Одичавшее в населенных пунктах и в полосах отчуждения автодорог. Из.

3/686/. *Syringa vulgaris* L. — **Сирень обыкновенная**. К. V-VI. Одичавшее в населенных пунктах. Сп.

Сем. 76. Caprifoliaceae — Жимолостные

1/687/. *Linnaea borealis* L. — **Линнея северная**. Пк. VI-VII. В сосновых лесах зеленомошниках. В рн. 1, 3. Р3. На ю. границе ареала.

- Lonicera caprifolium* L. — **Жимолость каприфоль**. К. V-VI. Выращивается в парках, скверах. Интродуцент. Родина - Кавказ, Средняя и Южная Европа.
- 2/688/. *Lonicera tatarica* L. — **Жимолость татарская**. К. V-VI. Одикавшее в населенных пунктах. Из.
- 3/689/. *L. xylosteum* L. — **Ж. лесная**. К. V-VI. В широколиственных, сосново-широколиственных и осиновых лесах, на вырубках. Пв.
- 4/690/. *Sambucus racemosa* L. — **Бузина красная**. К. V-VI. Одикавшее в лесах, преимущественно сосновых, около населенных пунктов, иногда в поймах рек. Сп.
- Viburnum lantana* L. — **Калина Гордовина**. К. V. В парках. Интродуцент. Родина - Северная Америка.
- 5/691/. *Viburnum opulus* L. — **Калина обыкновенная**. К. V-VI. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах, по опушкам, вырубкам, облесенным склонам, в поймах рек. Пв.

Сем. 77. Adoxaceae — Адоксовые

- 1/692/. *Adoxa moschatellina* L. — **Адокса мускусная**. Тм. IV-V. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах. Сп.

Сем. 78. Valerianaceae — Валериановые

- 1/693/. *Valeriana officinalis* L. — **Валериана лекарственная**. Тм. VI-VII. В сыроватых лесах, на сырых лугах, болотах, в поймах рек, по берегам рек и ручьев. Сп. P3.
- 2/694/. *V. rossica* P.Smirn. — **В. русская**. Тм. VI. На меловых склонах и разреженных остепненных лесах. В рн. 2, 5, 16. P3.
- 3/695/. *V. tuberosa* L. — **В. клубненосная**. Тм. V. На меловых и песчано-каменистых склонах. В рн. 17, 20. P2.
- 4/696/. *V. wolgensis* Kazak. — **В. волжская**. Тм. VII. В сыроватых лесах, на сырых лугах и болотах. Сп. P3.

Сем. 79. Dipsacaceae — Ворсянковые

- 1/697/. *Cephalaria uralensis* Schrad. — **Головчатка уральская**. Тм. VI. Каменистая степь на мергелистом склоне в рн. 20. P3. На с. границе ареала.
- 2/698/. *Dipsacus sativus* (L.) Scholl. — **Ворсянка посевная или Ворсовальная шишка**. Од. VII-VIII. Заносное в г. Димитровграде, единично.
- 3/699/. *Knautia arvensis* (L.) Coult. — **Короставник полевой**. Тм. VI-VII. В разреженных лиственных лесах, на полянах, вырубках, по мусорным местам. Пв.
- 4/700/. *Scabiosa isetensis* L. — **Скабиоза исетская**. Пк. VI-IX. На меловых и мергелистых склонах. На Пб. в рн. выхода к поверхности верхнемеловых карбонатных пород. P3.

- 5/701/. *S. ochroleuca* L. — **С. желтая**. Тм. VI-VII. В степях. Сп.
6/702/. *Succisa pratensis* Moench. — **Сивец луговой**. Тм. VII-VIII. По разрежен-
ным сыроватым листовным и сосново-лиственным лесам, на сырых лесных
полянах, но окраинам лесных торфяных болот и озер. Сп. в Пб., в Лб. в рн. 3. P3.

Сем. 80. Arosynaceae — Кутровые

- 1/703/. *Trachomitum sarmatiensis* Woodson. — **Кендырь сарматский**. Тм. VI-VII.
На опушке леса правого берега Волги и на бичевнике в рн. 6. P0 .

Сем. 81. Asclepiadaceae — Ластовневые

- 1/704/. *Cynanchum acutum* L. — **Цинанхум острый**. Тм. VI-VII. На опушке со-
сновой посадки в рн. 7. P4.
2/705/. *Vincetoxicum hirundinaria* Medik. — **Винцетоксикум обыкновенный**. Тм.
V-VIII. В разреженных остепненных листовных лесах и по их опушкам, на пес-
чаных склонах. Сп.
3/706/. *V. stepposum* (Pobed.)A.et D.Love. — **В. степной**. Тм. V-VIII. В сухих со-
сновых лесах на песчаных почвах, в песчаных степях, на меловых склонах, на
перегнойно-карбонатной почве. Сп.

Сем. 82. Gentianaceae — Горечавковые

- 1/707/. *Centaurium erythrae* Rafn. — **Золототысячник обыкновенный**. Од. или
Дв. VI-IX. На сухих лесных полянах. P0.
2/708/. *C. pulchellum* (Sw.) Druce. — **З. красивый**. Тм. или Од. VI-VIII. В рн. 7,
17, 18. P2.
3/709/. *Gentianella amarella* (L.) Boern. — **Горечавочка горькая**. Дв. VIII-IX. На
низкотравных лугах и осушенных торфяниках. В рн. 11. P2.
4/710/. *G. lingulata* (Agardh) Pritchard. — **Г. язычковая**. Дв. VI-VII. На низко-
травных лугах. P0.
5/711/. *Gentiana cruciata* L. — **Горечавка крестовидная или Соколий перелет**.
Тм. VI-VII. В степях, на задернованных меловых склонах, в дубовых осветлен-
ных лесах, на сухих лесных полянах. Из. P3.
6/712/. *G. pneumonanthe* L. — **Г. легочная**. Тм. VII-VIII. По сырым разреженным
лесам, сырым вырубкам, лесным полянам и опушкам, окраинам лесных болот.
Из. P3.

Сем. 83. Menyanthaceae — Вахтовые

- 1/713/. *Menyanthes trifoliata* L. — **Вахта трехлистная или Трифоль**. Тм. V-VII.
По берегам заболачивающихся озер, на сплавинах, но торфяным болотам. Сп.

Сем. 84. Rubiaceae — Мареновые

- 1/714/. *Asperula exasperata* V.Krecz. et Klok. — **Ясменник шероховатый**. Пк. VII-VIII. На меловых склонах и мергелистых обнажениях. Из. в рн. Пб. P2.
- 2/715/. *A. petraea* V.Krecz et Klok. — **Я. скальный**. Пк. VI-VIII. В тырсовых степях на перегнойно-карбонатной почве. В рн. 17. P2.
- 3/716/. *Galium aparine* L. — **Подмаренник цепкий**. Од. V-IX. В посевах, на мусорных местах, в ольшаниках и пойменных дубравах. Пв.
- 4/717/. *G. boreale* L. — **П. северный**. Тм. VI-VII. В лиственных и сосново-лиственных лесах, на лугах и в луговых степях. Пв.
- 5/718/. *G. mollugo* L. — **П. мягкий**. Тм. VI-VII. На лесных полянах, пойменных лугах, луговых степях, в осветленных лесах, на вырубках, около дорог и полей, по склонам оврагов и балок. Пв.
- 6/719/. *G. odoratum* (L.) Scop. — **П. пахучий**. Тм. V-VI. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах. Пв.
- 7/720/. *G. octonarium* (Klok.) Soo. — **П. восьмилистный**. Тм. V-VI. На меловых обнажениях и меловом рухляке. В рн. Пб. P3.
- 8/721/. *G. palustre* L. — **П. болотный**. Тм. V-VIII. На болотах, по берегам ручьев, сырым пойменным лугам, в ольшаниках. Пв.
- 9/722/. *G. physocarpum* Ledeb. — **П. вздутоплодный**. Тм. VI-IX. В поймах рек, по лесам. Сп.
- 10/723/. *G. pseudorivale* Tzvel. — **П. ложноприручейный**. Тм. VI-IX. По сырым и топким пойменным лугам, но берегам водоемов, у ключей. Сп.
- 11/724/. *G. rivale* (Sibth. et Smith) Griseb. — **П. приручейный**. Тм. VI-VIII. По берегам рек и ручьев. Сп.
- 12/725/. *G. ruprechtii* Robed. — **П. Рупрехта**. Тм. VI-VII. По торфяным болотам, зарастающим озерам, в заболоченных лиственных лесах. Сп.
- 13/726/. *G. ruthenicum* Willd. — **П. русский**. Тм. VI-VIII. В степях на меловом субстрате. Сп. в рн. Пб.
- 14/727/. *G. spurium* L. — **П. ложный**. Од. IV-VIII. На полях. P0.
- 15/728/. *G. tinctorium* (L.) Scop. — **П. красильный**. Тм. V-VI. В разреженных дубовых и сосново-дубовых лесах, в степях. Пв.
- 16/729/. *G. uliginosum* L. — **П. топяной**. Тм. V-IX. На болотах, сырых лугах, по берегам рек и озер. Пв.
- 17/730/. *G. verum* L. — **П. настоящий**. Тм. VI-VIII. В степях, на остепненных полянах и вырубках. Пв.
- 18/731/. *Rubia tatarica* (Trev.) Fr. Schmidt. — **Марена татарская**. Тм. VI-VII. По берегам Волги. P0.

Сем. 85. Polemoniaceae — Синюховые

- 1/732/. *Collomia linearis* Nutt. — **Колломия линейная**. Од. VI-VIII. В посевах в рн. 10. Заносное.
- 2/733/. *Polemonium caeruleum* L. — **Синюха голубая**. Тм. VI-VII. В лиственных

и сосново-лиственных лесах, на пойменных лугах, по окраинам лесных болот. Сп., в рн. Пб., но в Лб, реже. РЗ.

Сем. 86. Convolvulaceae — Вьюнковые

1/734/. *Ipomoea sibirica* (L.) Pers. — **Ипомея сибирская**. Од. VIII. Заносное на волжском косогоре в рн. 13. и в рн. 10 /г. Инза/, в рн. 14 /г. Барыш/.

2/735/. *Calystegia sepium* (L.) R.Br. — **Калистегия заборная**. Тм. VI-IX. В кустарниковых зарослях в поймах рек. Сп.

3/736/. *Convolvulus arvensis* L. — **Вьюнок полевой**. Тм. VI-IX. В посевах и около посевов, на мусорных местах, у дорог, на травяных склонах, иногда в степях и на лугах. Пв.

Сем. 87. Cuscutaceae — Повиликовые

1/737/. *Cuscuta campestris* Yunck. — **Повилика равнинная**. Од. VI-VII. На рудеральных местах. В рн. 6, 8, 14. Заносное, порою обильно.

2/738/. *C. epilinum* Weihe. — **П. льняная**. Од. VI-VIII. В посевах. Из.

3/739/. *C. epithymum* (L.) Murr. — **П. тимьянная**. Од. VI-VII. В степях. Из. на юге Пб.

4/740/. *C. europaea* L. — **П. европейская**. Од. VI-VIII. По мусорным местам в населенных пунктах, на лугах, в поймах рек. Паразитирует чаще всего на крапиве. Сп.

5/741/. *C. lupuliformis* Krock. — **П. хмелевидная**. Од. VI-VIII. В поймах рек, по лесным оврагам. Сп.

6/742/. *C. monogyna* Vahl. — **П. одностолбиковая**. Од. VI-VII. На степных кустарниках и травянистых мношлетниках. Из.

7/743/. *C. planiflora* Ten. — **П. плоскоцветковая**. Од. VI. На меловых каменистых склонах. Из. на юге Пб.

Примечание. С семенами люцерны посевной, поставляемой с С. Кавказа, могут заноситься южные виды повилик.

Сем. 88. Hydrophyllaceae — Воднолистниковые

1/744/. *Phacelia tanacetifolia* Benth. — **Фацелия пижмолистная**. Од. VI-IX. На залежах, в мусорных местах, у дорог, в населенных пунктах. Из. Одичавшее.

Сем. 89. Boraginaceae — Бурачниковые

1/745/. *Anchusa officinalis* L. — **Анхуза лекарственная**. Тм. V-VIII. Около жилья, по окраинам полей. Из.

2/746/. *Argusia sibirica* (L.) Dandy. — **Аргузия сибирская**. Тм. V-VI. На приреч-

- ных песках, ж.-д. откосах. В рн. 6, 7. P2. На с.-з. границе ареала.
- 3/747/. *Asperugo procumbens* L. — **Острица лежачая**. Од. V-VII. На пустырях, по улицам. Сп.
- 4/748/. *Borago officinalis* L. — **Бурачник лекарственный, или Огуречная трава**. Од. VI-VII. Около жилья. В рн. 6, 15.
- Brunnera macrophylla* (Adams) Johnston. — **Бруннера крупнолистная**. Тм. IV-V. Выращивается как декоративное в цветниках, палисадниках. Интродуцент. Родина Пред. - и Закавказье. В культуре с 1825 г.
- 5/749/. *Buglossoides arvensis* (L.) Johnston. — **Буглоззоидес полевой**. Од. V-VII. В посевах, на пустырях. Сп.
- 6/750/. *Cynoglossum officinale* L. — **Чернокорень лекарственный**. Дв. V-VIII. По мусорным местам, на улицах, на нарушенных степных склонах. Пв.
- 7/751/. *Echium maculatum* L. — **Синяк пятнистый**. Дв. V-VI. В степях, на остепненных лесных полянах, чаще на карбонатных почвах. Сп. в рн. Пб.
- 8/752/. *E. vulgare* L. — **С. обыкновенный**. Дв. VI-VII. По песчаным местам, сухим щебнистым и меловым склонам, у дорог. Пв.
- 9/753/. *Hackelia deflexa* (Wahlenb.) Opiz. — **Гакелия поникшая**. Од. V-VI. На тенистых склонах. P0.
- 10/754/. *Lappula heterocantha* (Ledeb.) Borb. — **Липучка разношиповая**. Од. V-VIII. На каменистых местообитаниях. В рн. 4. P1.
- 11/755/. *L. patula* (Lehm.) Menyharth. — **Л. раскидистая**. Од. V-VIII. На полях, сухих склонах. Из.
- 12/756/. *L. squarrosa* (Retz.) Dumort. — **Л. растопыренная**. Од. V-VIII. По полям, мусорным местам, нарушенным лесам и степям. Пв.
- 13/757/. *Lithospermum officinale* L. — **Воробейник лекарственный**. Тм. VI-VII. В разреженных лиственных лесах. Сп.
- 14/758/. *Lycopsis arvensis* L. — **Кривоцвет полевой**. Од. V-VIII. В посевах, по мусорным местам, преимущественно на песчаной почве. Из.
- 15/759/. *L. orientalis* L. — **К. восточный**. Од. VI-VIII. В посевах, около жилья. Из. в рн. Пб.
- 16/760/. *Myosotis arvensis* (L.) Hill. — **Незабудка полевая**. Од., Дв. или Тм. V-IX. По мусорным местам, на полях, на нарушенных остепненных участках, опушках и вырубках. Пв.
- 17/761/. *M. caespitosa* K. F. Schultz. — **Н. дернистая**. Тм. VI-IX. По сырым и заболоченным лугам, берегам озер. Сп.
- 18/762/. *M. micrantha* Pall. ex Lehm. — **Н. мелкоцветковая**. Од. V-VIII. По полям, огородам, нарушенным степным участкам. Пв.
- 19/763/. *M. palustris* (L.) L. — **Н. болотная**. Тм. V-VI. По сырым и заболоченным местам, в поймах рек, по сырым лесам. Из.
- 20/764/. *M. popovii* Dobrocz. — **Н. Попова**. Тм. IV-V. В степях, на остепненных склонах с карбонатными почвами. Сп.
- 21/765/. *M. sparsiflora* Pohl. — **Н. редкоцветковая**. Од. IV-V. По разреженным сыроватым лесам, в садах и огородах, но сыроватым луговинам, в поймах. Сп.
- 22/766/. *Nonea pulla* (L.) DC. — **Noneя темно-бурая**. Тм. V-IX. В степях, по ос-

тепненным склонам, опушкам и полянам, у жилья. Пв.
 23/767/. *Omphalodes scorpiodes* (Haenke) Schrank. — **Омфалодес завитой**. Дв. IV-VII. На притеррасных пойменных песках. В рн. 1. P2. На в. границе ареала.
 24/768/. *Onosma polychroma* Klok. ex M. Pop. — **Оносма многоцветная**. Дв. V-VI. На меловых склонах, в степях. В рн. 5, 8. P2.
 25/769/. *O. simplicissima* L. — **О. простейшая**. Пк. V-IX. В каменистых степях на меловых и мергелистых склонах. В рн. Пб. с выходом к поверхности верхнемеловых карбонатных пород. P3. Близ с. границы ареала.
 Примечание. Совсем недавно киевский ботаник Д. Н. Доброчаева выделила из онозмы простейшей с поволжских мелов онозму волжскую — *O. volgense* Dobrosz, которая рассматривается как эндем. Но мы не располагаем данными не ее распространению по территории Ульяновской области.
 26/770/. *O. tinctoria* Bieb. — **О. красильная**. Дв. V-VI. В каменистых степях на меловых и мергелистых склонах. В рн. Пб. P2. На с. границе ареала.
 27/771/. *Pulmonaria angustifolia* L. — **Медуница узколистная**. Тм. IV-V. В сосново-дубовых и вторичных дубовых лесах, разреженных лиственных лесах и на вырубках. Пв.
 28/772/. *P. dacica* Simonk. — **М. мягкая**. Тм. IV-V. В лиственных и сыроватых пойменных лесах. Из.
 29/773/. *P. obscura* Dumort. — **М. неясная**. Тм. IV-V. В широколиственных, сосново-широколиственных и осиновых лесах. Пв.
 30/774/. *Rindera tetraspis* Pall. — **Риндера четырехрешетинковая или Очердник**. Тм. IV-V. По меловым склонам. В рн. 18. P4.
 31/775/. *Symphytum officinale* L. — **Окопник лекарственный**. Тм. V-VIII. В поймах, по берегам водоемов, на болотах. Пв.

Сем. 90. Solanaceae — Пасленовые

1/776/. *Datura stramonium* L. — **Дурман вонючий**. Од. VI-IX. По мусорным местам. В рн. 6, 7, 8, 17, 19.
 2/777/. *Hyoscyamus niger* L. — **Белена черная**. Дв. V-VIII. По мусорным местам. Пв.
 3/778/. *Lycium barbatum* L. — **Дереза обыкновенная**. К. VI-IX. Одичавшее в рн. 6, 17. Редкое.
Lycium chinense Miel. — **Дереза китайская**. К. IX-X. На волжском косогоре в г. Ульяновске. Наибольшая популяция - вдоль бульвара Новый Венец.
Petunia x hybrida Vilm. — **Петуния садовая**. Од. V-IX. Интродуцент. Возник в культуре. Близ мест культивирования (на газонах и в трещинах асфальтного покрытия) может дичать, но в этих местах долго не удерживается. Как остаточная культура в цветниках.
 4/779/. *Solanum dulcamara* L. — **Паслен сладко-горький**. Пк. V-IX. В поймах рек, около озер, по окраинам болот, мусорным местам. Пв.
 5/780/. *S. nigrum* L. — **П. черный**. Од. VI-IX. По огородам, полям, мусорным местам. Пв.

Antirrhinum majus L. — **Львиный зев большой**. Од. VI-IX. Культивируется в цветниках. Интродуцент. Родина - Южная Европа, Северная Африка, Перед. Азия. В культуре с 1567 г. Известен ряд садовых групп, различающихся по величине цветков, высоте растений и их ветвлению.

1/781/. *Chaenorhinum minus* (L.) Lange. — **Хеноринум малый**. Од. VI-IX. На меловых обнажениях. В рн. 1, 4, 5, 10, 16, 18. P4.

2/782/. *Digitalis grandiflora* L. — **Наперстянка крупноцветковая**. Тм. VI-VII. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах, на опушках и вырубках этих лесов. В рн. 10. P0.

3/783/. *Euphrasia brevipila* Burn. et Greml. — **Очанка коротково-лосистая**. Од. VI-VIII. В сосновых лесах. Сп.

4/784/. *E. pectinata* Ten. — **О. гребенчатая**. Од. VII-IX. По луговым степям, лугам, сосновым лесам, на степных склонах с перегнойно-карбонатной почвой, на меловых склонах. Сп.

5/785/. *E. stricta* D. Wolff. ex J.F.Lehm. — **О. прямая**. Од. VI-IX. По степным склонам на карбонатной почве, на вырубках и опушках соснового леса на песчаной почве. Из.

6/786/. *Gratiola officinalis* L. — **Авран лекарственный**. Тм. V-IX. По сырым лугам в поймах рек, берегам рек. Из. P3.

7/787/. *Latraea squamaria* L. — **Петров крест чешуйчатый**. Тм. IV-V. В широколиственных, сосново-широколиственных и осиновых лесах, чаще всего с подлеском из лещины. В рн. 3, 5, 6. P4.

8/788/. *Limosella aquatica* L. — **Лужайник водный**. Од. V-IX. По иловатым берегам водоемов, в мелкой воде. Сп.

9/789/. *Linaria cretacea* Fisch. ex Spreng. — **Льянка меловая**. Тм. VI-VII. На меловых склонах. В рн. 20. P2. На с. границе ареала. Эндем.

10/790/. *L. genistifolia* (L.) Mill. — **Л. дроколистная**. Тм. VI-IX. В песчаных степях, разреженных сосновых лесах на песчаной почве. Из.

11/791/. *L. ruthenica* Blonski — **Л. русская**. Тм. VI-IX. На меловых обнажениях, степных склонах с перегнойно-карбонатной почвой. В рн. 13. P2. На с. границе ареала.

12/792/. *L. volgensis* Rakov et Tzvel. — **Л. волжская**. /Новости систематики высших растений, т. 29, 1993/. Тм. V-VI. В песчаных и каменистых степях. В рн. 16. P2. Эндем.

13/793/. *L. vulgaris* Mill. — **Л. обыкновенная**. Тм. VI-VIII. На полях, мусорных местах, ж.-д. насыпях, реже в сосновых лесах и песчаных степях. Пв.

14/794/. *Melampyrum argyrocotum* Finch. ex K-Pol. — **Марьянник серебристо-хохлатый**. Од. VI-VII. По степным склонам, среди степных кустарников. Из. в рн. 17, 18, 20.

15/795/. *M. arvense* L. — **М. полевой**. Од. VI-IX. На степных склонах с перегнойно-карбонатной почвой, в разреженных остепненных лесах. Сп. в рн. Пб., но чаще на юге.

- 16/796/. *M. cristatum* L. — **М. гребенчатый или Петушиный гребешок.** Од. VI-VIII. В разреженных лесах, по лесным полянам. Сп.
- 17/797/. *M. nemorosum* L. — **М. дубравный, или Иван-да-Марья.** Од. V-IX. В разреженных лиственных лесах, на лесных полянах. Пв., но в Лб. реже.
- 18/798/. *M. pratense* L. — **М. луговой.** Од. VI-IX. В сосновых лесах зеленомошниках, березняках, но окраинам лесных болот, на сыроватых лесных полянах. Чаще в рн. с. половины области, реже на юге.
- 19/799/. *Odontites vulgaris* Moench. — **Зубчатка обыкновенная.** Од. VI-IX. По лугам, степям, вырубкам. Пв.
- 20/800/. *Orphantha lutea* (L.) Kerner ex Wettst. — **Орванта желтая.** Од. VI-IX. По степным склонам. Из. в рн. 5, 17, 20.
- 21/801/. *Pedicularis kaufmannii* Pinzg. — **Мытник Кауфмана.** Тм. VI-VII. По сухим лугам и склонам, на остепненных местах с щебнистой карбонатной почвой, в разреженных дубовых лесах. Сп., но в Лб. реже.
- 22/802/. *P. palustris* L. — **М. болотный.** Дв. VI-VII. По болотам, болотистым лугам, на сплавинах озер, по берегам рек. Сп.
- 23/803/. *P. sceptrum-carolinum* L. — **М. скипетровидный.** Тм. VI-IX. По торфяным болотам, заболоченным березнякам, на сырых лугах. Из. в рн. с. половины области.
- 24/804/. *Rhinanthus aestivalis* (N.Zing.) Schischk. et Serg. — **Погремок летний.** Од. VII-VIII. На лугах, реже в посевах. P0.
- 25/805/. *Rh. minor* L. — **П. малый.** Од. V-VI. По лугам, лесным полянам. Сп.
- 26/806/. *Rh. serotinus* (Schoench.) Oborny. — **П. поздний.** Од. VII-VIII. В разреженных лесах, в посевах. Из.
- 27/807/. *Rh. vernalis* (N.Zing.) Schischk. et Serg. — **П. весенний.** Од. VI-VII. На лугах, лесных полянах. Сп.
- 28/808/. *Scrophularia nodosa* L. — **Норичник шишковатый.** Тм. V-IX. По лесам, пойменным лугам, берегам рек. Пв.
- 29/809/. *S. umbrosa* Dumort. — **Н. теневой.** Тм. VI-VII. По берегам лесных ручьев и чистых речек. В рн. 2, 19. P2.
- 30/810/. *Verbascum blattaria* L. — **Коровяк тараканий.** Дв. VI-VII. Одичавшее в рн. 8. P0.
- 31/811/. *V. lychnitis* L. — **К. метельчатый.** Дв., реже Тм. V-VIII. По степям, склонам балок, на остепненных полянах и опушках, по ж.-д. насыпям. Пв.
- 32/812/. *V. nigrum* L. — **К. черный.** Тм., реже Дв. VI-VII. В разреженных лиственных лесах, на полянах, склонах оврагов. Из.
- 33/813/. *V. orientale* (L.) All. — **К. восточный.** Тм., реже Дв. V-IX. В песчаных и каменистых степях, на меловых щебневатых склонах, остепненных опушках. Си.
- 34/814/. *V. phoeniceum* L. — **К. фиолетовый.** Тм. VI-VII. По ковыльно-типчачковым, песчаным и луговым степям. Сп.
- 35/815/. *V. phlomoides* L. — **К. мохнатый.** Дв. VI-VII. На песчаных мусорных местах в окрестностях суконных фабрик. Заносное в рн. 8.
- 36/816/. *V. thapsus* L. — **К. медвежье ухо.** Дв. VI-VII. В сухих сосновых лесах, в

песчаных степях, на вырубках. Сп.

37/817/. *Veronica anagalloides* Guss. — **Вероника ложноключевая**. Тм. или Од. VI-IX. В поймах по илистым топким местам. В рн. 17, 18. P4.

38/818/. *V. anagallis-aquatica* L. — **В. ключевая**. Тм. IV-IX. По берегам ключей и ручьев и в самой воде, на сырых лугах. Пв.

39/819/. *V. arvensis* L. — **В. полевая**. Од., реже Дв. IV-IX. В посевах. Сп.

40/820/. *V. beccabunga* L. — **В. поручейная**. Тм. IV-IX. По берегам ручьев и других водоемов. Пв.

41/821/. *V. chamaedrys* L. — **В. дубравная**. Тм. VI-IX. По разреженным листовым лесам, лесным полянам, склонам, на лугах. Пв.

42/822/. *V. dillenii* Crantz. — **В. Дилления**. Од., или Дв. IV-VI. В степях, сосновых лесах, на сухих лугах. Сп.

43/823/. *V. incana* L. — **В. седая**. Тм. V-VIII. В степях, на меловых и песчано-каменистых почвах. Из. в рн. Пб., в Лб. только на ю. в. рн. 8. P3.

44/824/. *V. jacquinii* Baumg. — **В. Жакена**. Тм. V-VII. На меловых склонах, в разнотравно-ковыльных степях. В рн. 20. P3. На с. границе ареала.

45/825/. *V. longifolia* L. — **В. длиннолистная**. Тм. VI-IX. По сырым местам, влажным лугам, берегам водоемов. Сп.

46/826/. *V. officinalis* L. — **В. лекарственная**. Тм. VI-IX. В сосновых лесах, на полянах, реже в сосново-широколиственных лесах. Сп.

47/827/. *V. persica* Poir. — **В. персидская**. Од., реже Дв. IV-IX. В огородах, на полях, по мусорным местам, на газонах. Из.

48/828/. *V. polita* Fries. — **В. двойчатая**. Од. или Дв. IV-IX. На сорных местах, на газонах. В г. Ульяновске на газонах, довольно обильно. Заносное.

49/829/. *V. prostrata* L. — **В. простертая**. Тм. IV-VII. По остепненным склонам, сухим лугам, сухим полянам и сосновым лесам. Пв.

50/830/. *V. scutellata* L. — **В. щитковая**. Тм. V-IX. На влажных лугах, по окраинам зарастающих лесных озер, лесным мочажинам. Из.

51/831/. *V. serpyllifolia* L. — **В. тимьянолистная**. Тм. V-VIII. По лесным дорогам, полянам, на выгонах. Из.

52/832/. *V. spicata* L. — **В. колосистая**. Тм. VI-IX. В степях, разреженных сосновых лесах, по меловым и мергелистым склонам. Пв.

53/833/. *V. spuria* L. — **В. ложная**. Тм. VI-IX. На сухих лесных полянах, сухих лугах, склонах балок. Сп.

54/834/. *V. teucrium* L. — **В. широколистная**. Тм. V-VII. В разреженных листовых лесах, на лесных полянах, осветленных склонах, в луговых степях. Пв.

55/835/. *V. verna* L. — **В. весенняя**. Од. или Дв. IV-VII. По степям, сухим склонам, реже в посевах. Сп.

Сем. 92. Orobanchaceae — Заразиховые

1/836/. *Orobanche alba* Steph. — **Заразиха белая**. Тм. VI-VII. В меловом сосняке. В рн. 13. P1.

2/837/. *O. caesia* Reichenb. — **З. голубая**. Тм. VI-VIII. В степях. В рн. 17. P1.

- 3/838/. *O. coeruleascens* Steph. — **3. синеватая.** Тм. VI-VII. На песчано-каменистых склонах и песках. В рн. 17, 18. P2.
- 4/839/. *O. cumana* Wallr. — **3. подсолнечная.** Од., Дв. или Тм. VI-VIII. В степях и посевах. Из.
- 5/840/. *O. elatior* Sutt. — **3. высокая.** Тм. VI-VII. На меловых обнажениях, в меловых сосняках, в сосновых лесах на песчаной почве. В рн. 16, 17, 18. P3.
- 6/841/. *O. libanotidis* Rupr. — **3. порезниковая.** Тм. VII-VIII. В сосновых лесах, на лесных полянах, на меловых обнажениях. Из.
- 7/842/. *O. purpurea* Jacq. — **3. пурпуровая.** Тм. VI-VII. В степях и на меловых обнажениях. В рн. 1, 18. P2.
- 8/843/. *O. uralensis* G.Beck. — **3. уральская.** Тм. VI-VII. В степях. В рн. 17, 18. P2.

Сем. 93. Lentibulariaceae — Пузырчатковые

- 1/844/. *Utricularia intermedia* Hayne. — **Пузырчатка средняя.** Тм. VI-VII. В мелкой воде озер и болот. Из. P3.
- 2/845/. *U. minor* L. — **П. малая.** Тм. VI-VIII. В стоячих водоемах, но торфяным болотам. В рн. 14. P2.
- 3/846/. *U. vulgaris* L. — **П. обыкновенная.** Тм. VI-VIII. В озерах и старицах. Сп. P3.

Сем. 94. Globulariaceae — Глобуляриевые

- 1/847/. *Globularia punctata* Lapeyr. — **Глобулярия крапчатая или Шаровница.** Тм. V-VI. В каменистых степях с карбонатным субстратом, в ковыльных и кострцовых степях с перегнойно-карбонатными почвами, на меловых обнажениях. В рн. 5, 6, 17, 18, 20. P2. Реликт.

Сем. 95. Plantaginaceae — Подорожниковые

- 1/848/. *Plantago lanceolata* L. — **Подорожник ланцетолистный.** Тм. V-VI. По луговым степям и остепненным лиственным лесам. Сп.
- 2/849/. *P. major* L. — **П. большой.** Тм. VI-VIII. По улицам, дорогам, особенно лесным, на пойменных лугах, в балках. Пв.
- 3/850/. *P. maxima* Juss. — **П. наибольший.** Тм. V-VI. На пойменных лугах и влажных засоленных почвах. Раньше был широко распространен на пойменных лугах, особенно в пойме Волги, но почти исчез из-за затопления поймы Волги и распашки пойм других рек. В последнее время найден единичными особями в полосе отчуждения автодороги в г. Ульяновске. P0.
- 4/851/. *P. media* L. — **П. средний.** Тм. V-IX. На сухих лугах, по разреженным лиственным лесам, степям, у дорог. Пв.
- 5/852/. *P. salsa* Pall. — **П. солончаковый.** Тм. VI-VII. На засоленных почвах. В

рн. 8, 9. P2.

6/853/. *P. scabra Moench.* — **П. шероховатый.** Од. VI-VII. На полузаросших песках, по опушкам сосняков, обочинам дорог. В рн. 8, 14, 17. P3.

7/854/. *P. tenuifolia Waldst. et Kit.* — **П. тонкоцветковый.** Од. V. На солонцах. В рн. 9. P2.

8/855/. *P. urvillei Opiz.* — **П. степной.** Тм. V-VIII. В степях, но остепненным опушкам и полянам. Сп.

Сем. 96. Lamiaceae (Labiatae) — Губоцветные

1/856/. *Acinos arvensis (Lam.) Dandy.* — **Щебрушка полевая.** Од. V-IX. В песчаных степях, на меловых склонах, полях. Сп.

2/857/. *Ajuga chia Schreb.* — **Живучка хиосская.** Тм. V-VIII. На степных склонах с перегнойно-карбонатной почвой, на меловых склонах. В рн. 18, 20. P3. На с. границе ареала.

3/858/. *A. genevensis L.* — **Ж. женеvская.** В лиственных и сосново-лиственных лесах, в луговых степях. Пв.

4/859/. *Ballota nigra L.* — **Белокудренник черный.** Тм. VI-VIII. По пустырям, приречным ивнякам. Из.

5/860/. *Betonica officinalis L.* — **Буквица лекарственная.** Тм. VII-IX. Осветленные леса, лесные поляны, вырубки. Пв.

6/861/. *Chaiturus marrubiastrum (L.) Reichenb.* — **Щетинохвост шандровый.** Дв., реже Од. VII-VIII. В поймах рек Суры, Черемшана, Терешки. Из.

7/862/. *Clinopodium vulgare L.* — **Пахучка обыкновенная.** Тм. VI-IX. В разреженных лесах, на лесных полянах. Пв.

8/863/. *Dracocephalum ruyschiana L.* — **Змееголовник Рюйша.** Тм. VI-VII. В сосновых лесах. Сп.

9/864/. *D. thymiflorum L.* — **З. тимьяноцветковый.** Од. или Дв. V-VII. На мусорных местах, в песчаных степях, в разреженных нарушенных лесах. Пв.

10/865/. *Elsholzia ciliata (Thunb.) Hyl.* — **Эльсгольция реснитчатая.** Од. VII-VIII. По мусорным местам. В рн. 5, 8, 12. Заносное.

11/866/. *Galeopsis bifida Boenn.* — **Пикульник двурасщепленный или Жабрей.** Од. VI-IX. По сырым лесам, ольшаникам, сырым лугам. Сп.

12/867/. *G. ladanum L.* — **П. ладанниковый.** Од. VI-IX. В посевах и около них. Пв.

13/868/. *G. tetrahit L.* — **П. обыкновенный.** Од. VI-IX. По сырым лесам и вырубкам, на полях. Из.

14/869/. *G. speciosa Mill.* — **П. красивый или Зябра.** Од. VII-IX. На полях, мусорных местах, по берегам рек. Сп.

15/870/. *Glechoma hederacea L.* — **Будра плющевидная.** Тм. IV-VIII. По лесам, сырым лугам, огородам, паркам, на улицах. Пв.

16/871/. *Lamium album L.* — **Яснотка белая или Глухая крапива.** Тм. IV-VIII. У жилья, по тенистым кустарникам. Из.

17/872/. *L. amplexicaule L.* — **Я. стеблеобъемлющая.** Од. или Дв. V-IX. На по-

лях, огородах, около жилищ. Из.

18/873/. *L. maculatum* (L.) L. — **Я. крапчатая**. Тм. IV-IX. По лесам, около болот. Из.

19/874/. *L. paczoskianum* Worosch. — **Я. Пачоского**. Од. или Дв. V-IX. По сырым балкам. В рн. 18, 20. P2.

20/875/. *L. purpureum* L. — **Я. пурпуровая**. Од. или Дв. V-IX. Около жилищ. Сп.

21/876/. *Leonurus quinquelobatus* Gilib. — **Пустырник пятилопастный**. Тм. V-IX. По пустырям, улицам, на вырубках, в нарушенных разреженных лесах. Пв.

Lophantus anisatus Benh. — **Лофант анисовый**. Тм. VI-IX. Культивируется на приусадебных участках, садах и огородах.

22/877/. *Lycopus europaeus* L. — **Зюзник европейский**. Тм. VI-IX. По берегам водоемов, сырым лугам, в поймах рек. Пв.

23/878/. *L. exaltatus* L. fil. — **З. высокий**. Тм. VII-VIII. По берегам рек и озер, сырым лугам, на болотах. Сп.

24/879/. *Mentha arvensis* L. — **Мята полевая**. Тм. VI-IX. По берегам водоемов, сырым лугам и лесам, в поймах рек. Сп.

25/880/. *M. longifolia* (L.) L. — **М. длиннолистная**. Тм. VII-VIII. По берегам рек, лесных ручьев, в сырых балках. Сп. в рн. Пб.

26/881/. *Nepeta cataria* L. — **Котовник кошачий**. Тм. VI-VII. На мусорных местах, в огородах, по остепненным склонам. Сп.

27/882/. *N. pannonica* L. — **К. венгерский**. Тм. VI-VIII. В разреженных лесах. Сп.

28/883/. *N. ucranica* L. — **К. украинский**. Тм. V-VII. На каменистых меловых склонах. В рн. 16, 17. P1.

29/884/. *Origanum vulgare* L. — **Душица обыкновенная**. Тм. VI-IX. В осветленных лесах, на лесных полянах, вырубках, в луговых степях. Пв.

30/885/. *Phlomis pungens* Willd. — **Зопник колючий**. Тм. V-VII. По каменистым степям, на меловых склонах. В рн. 17, 18, 20. P3. На с. границе ареала.

31/886/. *Ph. tuberosa* L. — **З. клубненосный**. Тм. VI-VIII. По луговым степям, остепненным лесным полянам. Пв.

32/887/. *Prunella grandiflora* (L.) Scholl. — **Черноголовка крупноцветковая**. Тм. VI-IX. В разреженных лиственных лесах, на лесных полянах. Из.

33/888/. *P. vulgaris* L. — **Ч. обыкновенная**. Тм. VI-IX. В разреженных лесах, по лесным полянам и дорогам. Пв.

34/889/. *Salvia nutans* L. — **Шалфей поникающий**. Тм. V-VI. На степных склонах с перегнойно-карбонатными почвами, на меловых обнажениях. Из. в рн. Пб. P3.

35/890/. *S. pratensis* L. — **Ш. луговой**. Тм. V-VI. На остепненных склонах и лесных полянах. В рн. 1, 3, 7, 8, 13, 17, 18. P2. На в. границе ареала.

Salvia splendens Ker.-Gawl. — **Ш. Шалфей сверкающий или сальвия**. Од. VI-IX. Культивируется как декоративное в цветниках. Интродуцент. Родина Бразилия. В культуре с 1822 г.

36/891/. *S. stepposa* Shost. — **Ш. степной**. Тм. VI-VII. В степях, в разреженных остепненных лесах. Пв.

- 37/892/. *S. tesquicola* Klok. et Pobed. — **Ш. остепненный**. Тм. VI-VIII. В степях, на остепненных склонах. Пв.
- 38/893/. *S. verticillata* L. — **Ш. мутовчатый**. Тм. VI-VIII. В степях с перегнойно-карбонатными почвами, на меловых обнажениях. Сп. в рн. Пб. Р3.
- 39/894/. *Scutellaria altissima* L. — **Шлемник высокий**. Тм. V-VI. В лесах и поймах рек. В рн. 17. Р2.
- 40/895/. *S. dubia* Taliev et Sirj. — **Ш. сомнительный**. Тм. VI-VIII. На пойменных лугах, по берегам водоемов, болотам. Из.
- 41/896/. *S. galericulata* L. — **Ш. обыкновенный**. Тм. VI-IX. По болотам, сырым лугам, берегам водоемов. Пв.
- 42/897/. *S. hastifolia* L. — **Ш. копельистный**. Тм. V-VIII. По берегам водоемов. В рн. 3. Р2.
- 43/898/. *Stachys annua* (L.) L. — **Чистец однолетний**. Од. VI-IX. В посевах и около них. Пв.
- Stachys byzantina* C. Koch (*S. lanata* Jacq. — **Чистец шерстистый**. Тм. Интродуцент. Культивируется как декоративное растение. А. Д. Воейков распространял по Каталогу питомников (1911) как прекрасное седое растение для ковровых клумб.
- 44/899/. *S. recta* L. — **Ч. прямой**. Тм. V-VIII. По луговым степям, остепненным полянам и в разреженных остепненных лесах. Пв.
- 45/900/. *S. palustris* L. — **Ч. болотный**. Тм. VI-VIII. По берегам водоемов, в поймах рек, но сырым лугам и полям. Пв.
- 46/901/. *S. sylvatica* L. — **Ч. лесной**. Тм. VI-VII. Во влажных лесах. Сп.
- 47/902/. *Theucrium scordium* L. — **Дубровник чесночный**. Тм. VI-VIII. На засоленных лугах. В рн. 8, 9. Р2.
- 48/903/. *Thymus cimicinus* Blum. — **Тимьян или Чабрец клоповый**. Пк. VI-VIII. На меловых обнажениях и меловых склонах с перегнойно-карбонатной почвой. Сп. в рн. Пб. Р3.
- 49/904/. *Th. cretaceus* Klok. et Shost. — **Т. меловой**. Пк. VI-VII. На меловых обнажениях, в каменистых степях на меловых и мергелистых субстратах. Сп. в рн. Пб. Р3.
- 50/905/. *Th. guberlinensis* Iljin. — **Т. губерлинский**. Пк. VI-VIII. В песчаных степях, в сухих сосновых лесах, иногда на меловых склонах. Редко в рн. Пб.
- 51/906/. *Th. kirgisorum* Dubjan. — **Т. киргизский**. Пк. VI-VII. В песчаных степях и по меловым склонам. Редко в рн. Пб.
- 52/907/. *Th. marschallianus* Willd. — **Т. Маршалла**. Пк. V-VIII. В степях, на степных склонах, остепненных полянах. Пв.
- 53/908/. *Th. pallasianus* H.Br. — **Т. Палласа**. Пк. V-IX. В песчаных степях и сухих сосняках. Сп. в рн. Пб.
- 54/909/. *Th. serpyllum* L. — **Т. обыкновенный, или Богородская трава**. Пк. V-IX. В степях. Пв.
- 55/910/. *Th. stepposus* Klok. et Shost. — **Т. степной**. Пк. VI-VII. На песчано-каменистых склонах. В рн. 17, 18. Р3.

Сем. 97. Callitrichaceae — Болотниковые

- 1/911/. *Callitriche cophocarpa* Sendtner. — **Болотник короткоплодный или изменчивый**. Од. V-IX. В озерах, прудах и других стоячих водоемах. Сп.
2/912/. *C. hermaphroditica* L. — **Б. обоеполюй**. Од. VII-IX. По лесным ручьям и речкам. Сп.
3/913/. *C. verna* L. — **Б. весенний**. Од. V-IX. В озерах, канавах и других стоячих водоемах. Сп.

Сем. 98. Campanulaceae — Колокольчиковые

- 1/914/. *Adenophora liliifolia* (L.) A.DC. — **Бубенчик лилиелистный**. Тм. VII-VIII. В сосново-дубовых, дубовых и мелколиственных лесах. Сп.
2/915/. *Campanula bononiensis* L. — **Колокольчик болонский**. Тм. VI-VIII. В разреженных лесах, на полянах, опушках. Пв.
3/916/. *C. cervicaria* L. — **К. жестковолосистый**. Дв. V-VI. По лесным полянам, разреженным лиственным лесам. Сп.
4/917/. *C. glomerata* L. — **К. скученный**. Тм. VI-VIII. В разреженных лиственных лесах, на лесных полянах, в луговых степях. Пв.
5/918/. *C. latifolia* L. — **К. широколиственный**. Тм. VI-VIII. В широколиственных, сосново-широколиственных и пойменных лесах. Сп.
6/919/. *C. patula* L. — **К. раскидистый**. Дв. V-VI. В разреженных лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках, в балках. Пв.
7/920/. *C. persicifolia* L. — **К. персиколиственный**. Тм. VI-VII. По разреженным лиственным и сосново-лиственным лесам, полянам. Пв. Р3.
8/921/. *C. rapunculoides* L. — **К. рапунцеливидный**. Тм. VI-VII. По травяным склонам, в разреженных лесах. Сп.
9/922/. *C. rotundifolia* L. — **К. круглолиственный**. Тм. VI-VII. По остепненным склонам балок, на сухих лугах. В рн. 17, 18. Р1.
10/923/. *C. sibirica* L. — **К. сибирский**. Дв. VI-IX. В степях, на остепненных склонах, иногда в разреженных остепненных лесах. Пв.
11/924/. *C. trachelium* L. — **К. крапиволиственный**. Тм. VI-VIII. В лесах, на вырубках. Пв.
12/925/. *C. wolgensis* P. Smirn. — **К. волжский**. Тм. VI-VII. В степях, чаще на щебневатой меловой почве. Сп. в рн. Пб.
13/926/. *Jasione montana* L. — **Букашник горный**. Дв. VI-VII. По соснякам на песчаной почве. Р0.

Сем. 99. Asteraceae (Compositae) — Сложноцветные

- 1/927/. *Achillea cartilaginea* Ledeb. — **Тысячелистник хрящеватый**. Тм. VI-IX. По берегам водоемов, в прибрежных кустарниках, на болотах, на сырых лесных полянах. Сп.

- 2/928/. *A. micrantha Willd.* — **Т. мелкоцветковый**. Тм. VI-VIII. На приречных песках. В рн. 17. П1.
- 3/929/. *A. millefolium L.* — **Т. обыкновенный**. Тм. V-IX. На лугах, в осветленных лесах, на лесных полянах, опушкам, вырубкам, луговым степям, около дорог, на пустырях, по улицам, около посевов, реже в посевах. Пв.
- 4/930/. *A. nobilis L.* — **Т. благородный**. Тм. VI-IX. По сухим степям, залежам, чаще на песчаных и щебнисто-песчаных почвах, по меловым склонам, у дорог, реже около посевов и в посевах на легких почвах. Пв.
- 5/931/. *A. salicifolia Bess.* — **Т. иволистный**. Тм. VI-IX. По берегам водоемов, в прибрежных кустарниках. Из.
- 6/932/. *A. septentrionalis (Serg.) Botsch.* — **Т. северный**. Тм. VI-IX. По берегам водоемов, на сырых лугах. В рн. 13. П4.
- 7/933/. *A. setacea Waldst. et Kit.* — **Т. щетинистый**. Тм. VI-VIII. В степях, чаще на сухих каменистых почвах и меловых склонах, реже у дорог и на полях. Сп. в рн. Пб.
- 8/934/. *Acroptilon repens (L.) DC.* — **Горчак ползучий**. Тм. VII-VIII. Заносное в рн. 17, 18. Опасный карантинный сорняк.
- 9/935/. *Achyrophorus maculatus (L.) Scop.* — **Прозанник крапчатый**. Тм. V-VI. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах, на лесных полянах, реже на степных склонах и в сухих сосняках. Пв.
- Ageratum houstonianum Mill.* — **Долгоцветка**. Пк. в культуре. Од. VI-IX. Выращивается как декоративное в цветниках. Семена вызревают, поэтому на следующий год в цветниках, в посадках других декоративных культур наблюдаются всходы, мелкие нецветущие особи, отдельные из которых зацветают. Родина - Центральная Америка. Легко поддается стрижке.
- 10/936/. *Ambrosia artemisifolia L.* — **Амброзия полыннолистная**. Од. VII-X. На мусорных местах, на полях. Заносное в рн. 1, 6, 7, 10.
- Ambrosia trifida L.* — **Амброзия трехраздельная**. Од. VII-X. На мусорных местах, на полях. Заносное.
- 11/937/. *Anthemis cotula L.* — **Пулавка собачья**. Од. VI-VIII. По мусорным местам и в посевах. В рн. 17, 18.
- 12/938/. *A. ruthenica Bieb.* — **П. русская**. Од. VI-VIII. У дорог, в лесополосах. Заносное в рн. 17.
- 13/939/. *A. subtinctoria Dobrocz.* — **П. светло-желтая**. Тм. VI-IX. На степных склонах с песчано-каменистыми и перегнойно-карбонатными почвами, на меловых обнажениях, иногда на полях и у дорог. Пв.
- 14/940/. *A. tinctoria L.* — **П. красильная**. Тм. VI-IX. На степных склонах с перегнойно-карбонатными почвами, на меловых обнажениях, реже по остепненным опушкам, в разреженных лесах, у дорог и в посевах. Сп.
- 15/941/. *Antennaria dioica (L.) Gaertn.* — **Кошачья лапка двудомная**. Тм. V-VI. В сосновых лесах на песчаных почвах, реже в сосново-дубовых лесах, на сухих лесных полянах. Пв.
- 16/942/. *Arctium lappa L.* — **Лопух большой**. Дв. VI-VII. По мусорным местам, вырубкам, у жилья, на берегах рек. Пв.

- 17/943/. *A. minus* (Hill) Bernh. — **Л. малый**. Дв. VI-VII. По мусорным сыроватым местам, в балках, ольшаниках, в пойменных лесах. Сп.
- 18/944/. *A. nemorosum* Lej — **Л. лесной**. Дв. VI-VII. В разреженных лиственных лесах и на вырубках. Из.
- 19/945/. *A. tomentosum* Mill. — **Л. паутинистый**. Дв. VI-VII. По мусорным местам, у жилья, на вырубках, по берегам рек. Пв.
- 20/946/. *Artemisia absinthium* L. — **Польнь горькая**. Тм. VII-VIII. По мусорным местам, залежам, около домов, в огородах, на полях, на приречных песках, на вырубках, у дорог. Пв.
- 21/947/. *A. annua* L. — **П. однолетняя**. Од. VII-IX. Заносное на мусорных местах около сукожных фабрик и в их окрестностях. В рн. 8, 14.
- 22/948/. *A. armeniaca* Lam. — **П. армянская**. Тм. VII-VIII. На меловых склонах, лесных полянах. В рн. 8, 17. P2.
- 23/949/. *A. austriaca* Jacq. — **П. австрийская**. Тм. VII-VIII. В степях, на выгонах, меловых обнажениях, солонцах, залежах, у дорог, на мусорных местах. Пв.
- 24/950/. *A. campestris* L. — **П. равнинная**. Тм. VI-IX. В песчаных степях, в сухих сосновых лесах, на меловых обнажениях. Сп.
- 25/951/. *A. commutata* Bess. — **П. замещающая**. Тм. VII-VIII. В меловых сосняках. В рн. 18. P2. На с.-з. границе ареала.
- 26/952/. *A. dracunculus* L. — **П. эстрагон**. Тм. VII-IX. По песчаным берегам рек, реже как заносное на ж.-д. насыпях и в забурьяненных лесных полосах. Из.
- 27/953/. *A. latifolia* Ledeb. — **П. широколистая**. Тм. VII-VIII. В меловых сосняках, на склонах с меловой щебневатой почвой, в степях и сосново-дубовых лесах на меловых склонах. В рн. 2, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 20. P2.
- 28/954/. *A. lerchiana* Web. ex Stechm. — **П. Лерха**. Тм. VII-IX. На засоленных почвах. В рн. 9, 17. P1. На с.-з. границе ареала.
- 29/955/. *A. marschalliana* Spreng. — **П. Маршалла**. Тм. VII-VIII. В песчаных степях, на вырубках соснового леса и в разреженных сосновых лесах на песчаной почве. Пв.
- 30/956/. *A. nitrosa* Web. ex Stechm. — **П. селитряная**. Пк. VIII-IX. По сухим солонцеватым склонам балок. В рн. 17, 18. P2. На с. границе ареала.
- 31/957/. *A. pontica* L. — **П. понтийская**. Тм. VII-VIII. По склонам балок, в зарослях степных кустарников, по опушкам леса на перегнойно-карбонатной почве. В рн. 17, 18. P2.
- 32/958/. *A. procera* Willd. — **П. высокая**. Пк. VII-VIII. По пескам в поймах рек, на сухих лугах, по днищам балок. Сп.
- 33/959/. *A. salsoloides* Willd. — **П. солянковидная**. Пк. VII-IX. На меловых обнажениях. В рн. 4. P0.
- 34/960/. *A. sanionica* L. — **П. сантонская**. Тм. VII-IX. На засоленных почвах. В рн. 8, 9, 17, 18. P2. На с. границе ареала.
- 35/961/. *A. scoparia* Waldsl. et Kit. — **П. веничная**. Од. или Дв. VII-VIII. По склонам балок и оврагов, чаще на песчаной почве. Из.
- 36/962/. *A. sericea* Web. ex Stechm. — **П. шелковистая**. Тм. VII-VIII. В сосновых лесах на песчаной почве, в дубовых лесах на перегнойно-карбонатной почве, в

- меловых сосняках и на меловых степных склонах. Из. в рн. Пб. P2. Близ с. границы ареала.
- 37/963/. *A. sieversiana* Willd. — **П. Сиверса**. Од. или Дв. Заносное на ж.-д. насыпях и прилегающих участках. Из.
- 38/964/. *A. tschernieviana* Bess. — **П. Черняева**. Пк. VII-VIII. В сухих сосновых лесах, песчаных степях, на меловых склонах. Сп.
- 39/965/. *A. vulgaris* L. — **П. обыкновенная или Чернобыльник**. Тм. VII-VIII. По мусорным местам, на залежах, по огородам, в населенных пунктах, у дорог, в поймах рек, на ж.-д. насыпях, вырубках, иногда в посевах. Пв.
- 40/966/. *Aster amelloides* Bess. — **Астра ромашковидная**. Тм. VIII. В луговых степях, по меловым склонам, по остепненным опушкам леса. Из.
- 41/967/. *A. amellus* L. — **А. ромашковая**. Тм. VI-IX. В луговых степях, часто на перегнойно-карбонатной почве, по остепненным опушкам леса, в разреженных остепненных лесах, на меловых склонах. Пв.
- 42/968/. *Bidens cernua* L. — **Черда поникшая**. Од. VI-IX. По болотистым берегам рек, озер и ручьев. Сп.
- 43/969/. *B. frondosa* L. — **Ч. олиственная**. Од. VII-IX. Заносное в рн. 7. на песчано-глинистом берегу Куйбышевскою водохранилища.
- 44/970/. *B. tripartita* L. — **Ч. трехраздельная**. Од. VI-IX. По болотистым берегам рек, озер, ручьев, в канавах. Пв.
- 45/971/. *Cacalia hastata* L. — **Какалия копьевидная**. Тм. VI-VII. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах. В рн. 3, 8, 9, 14. P2. На ю.-з. границе ареала.
- Calendula officinalis* L. — **Ноготки лекарственные**. Од. VII-IX. Культивируется как декоративное растение. Может сорничать, но не удерживается в травостое.
- 46/972/. *Carduus acanthoides* L. — **Чертополох колючий**. Дв. VI-IX. На пустырях, в оврагах. Из.
- 47/973/. *C. crispus* L. — **Ч. курчавый**. Дв. VI-IX. На пустырях, по улицам, в садах, около полей и дорог, в поймах рек, на вырубках, в нарушенных лесах и степях, реже на посевах. Пв.
- 48/974/. *C. hamulosus* Ehrh. — **Ч. крючковатый**. Дв. VII-VIII. По степям, меловым склонам, на мусорных местах. Из.
- 49/975/. *C. thoermeri* Weinm. — **Ч. Термера**. Дв. VI-IX. В степях на перегнойно-карбонатной почве, на меловых склонах, по мусорным местам. Сп.
- 50/976/. *Carlina biebersteinii* Bernh. — **Колючник Биберштейна**. Дв. V-IX. В сухих сосновых лесах и на вырубках, в песчаных степях. Сп.
- 51/977/. *Centaurea adpressa* Ledeb. — **Василек прижатый**. Тм. VI-VIII. В ковыльно-разнотравных степях, на меловых щебневатых почвах, в сухих сосновых лесах. Из.
- 52/978/. *C. apiculata* Ledeb. — **В. шиниконосный**. Тм. VI-VIII. В степях, на степных склонах, в сухих сосновых лесах. В рн. 8, 17, 18. P4.
- 53/979/. *C. carbonata* Klok. — **В. угольный**. Тм. V-VI. По меловым склонам на щебневатой перегнойно-карбонатной почве. Из.
- 54/980/. *C. cyanus* L. — **В. синий или полевой**. Од., реже Дв. VI-IX. В посевах,

- около посевов, на залежах, реже на мусорных местах. Пв.
 55/981/. *C. diffusa* Lam. — **В. раскидистый**. Дв. VI-IX. Заносное по ж.-д. насыпям, иногда у дорог. В рн. 6, 8, 15.
 56/982/. *C. jacea* L. — **В. луговой**. Тм. VI-IX. На лугах, лесных полянах, опушках, вырубках, в разреженных лиственных лесах. Пв.
 57/983/. *C. phrygia* L. — **В. фригийский**. Тм. VI-IX. На лугах, лесных полянах, опушках, вырубках, в разреженных лиственных лесах. Сп.
 58/984/. *C. pseudomaculosa* Dobrosz. — **В. ложнопятнистый**. Дв. VII-VIII. В луговых, ковыльно-разнотравных и песчаных степях, на меловых склонах, у дорог, по ж.-д. насыпям. Пв.
 59/985/. *C. pseudophrygia* Dobrosz. — **В. ложнофригийский**. Тм. VII-VIII. На лугах, лесных полянах, вырубках, опушках, в разреженных лиственных лесах, нередко на влажной почве. Сп.
 60/986/. *C. ruthenica* Lam. — **В. русский**. Тм. VI-VIII. По меловым склонам, на опушках и в разреженных лесах на перегнойно-карбонатной почве, иногда в степях на черноземной почве. В рн. 2, 4, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20. РЗ.
 61/987/. *C. scabiosa* L. — **В. скабиозный**. Тм. VI-VIII. В степях, на остепненных опушках и лесных полянах, вырубках, в осветленных лесах. Пв.
 62/988/. *C. sumensis* Kalen. — **В. сумский**. Тм. V-VI. В сухих сосновых лесах и на вырубках этих лесов, в песчаных степях, иногда на меловых склонах. Пв.
 63/989/. *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert — **Ромашка лекарственная**. Од. V-IX. По мусорным местам, близ жилья, в садах, у дорог, в поймах. Из.
 64/990/. *Ch. suaveolens* (Pursh) Rydb. — **Р. пахучая**. Од. VI-VIII. По улицам, во дворах, около дорог, на мусорных местах. Пв.
 65/991/. *Chondrilla graminea* Bieb. — **Хондрилла злаколистная**. Дв. VII-IX. В песчаных степях, в сухих сосновых лесах на песчаной почве. В рн. 17, 18. Р2.
 66/992/. *Ch. juncea* L. — **Х. обыкновенная, или ситниковидная**. Тм. или Дв. В песчаных степях, в сухих сосновых лесах на песчаной почве. Сп.
 67/993/. *Cichorium intybus* L. — **Цикорий обыкновенный**. Тм. VI-VII. По луговым виадам вдоль дорог, на травяных склонах, в степях, на вырубках, опушках, в населенных пунктах. Пв.
 68/994/. *Cirsium arvense* (L.) Scop. — **Бодяк полевой**. Тм. VI-IX. На полях и около полей, на мусорных местах, вырубках, по берегам рек. Пв.
 69/995/. *C. canum* (L.) All. — **Б. серый**. Тм. VII-VIII. На сырых лугах, болотах, по топким местам. Из.
 70/996/. *C. esculentum* (Siev.) C.A.Mey. — **Б. съедобный**. Тм. VII-VIII. На лугах в поймах рек /иногда на солонцеватых почвах/, по окраинам болот, на выгонах. Из.
 71/997/. *C. heterophyllum* (L.) Hill. — **Б. разнолистный**. Тм. VII-VIII. На сырых лугах, влажных лесных полянах, в разреженных влажных лесах. Из.
 72/998/. *C. incanum* (S.G.Gmel.) Fisch. — **Б. беловойлочный**. Тм. VII-VIII. В пойменных кустарниках, на влажных лугах, иногда в посевах. Из.
 73/999/. *C. oleraceum* (L.) Scop. — **Б. огородный**. Тм. VII-IX. По сыроватым местам в поймах рек, на болотах, у лесных ручьев. Сп.

- 74/1000/. *C. palustre* (L.) Scop. — **Б. болотный**. Тм. VII-VIII. На сырых лугах. Из.
- 75/1001/. *C. serrulatum* (Bieb.) Fisch. — **Б. мелкопильчатый**. Дв. VII-IX. В балках на глинистых, часто солонцеватых почвах, на выгонах. В рн. 6, 17, 18. P2.
- 76/1002/. *C. vulgare* (Savi) Ten. — **Б. обыкновенный**. Дв. VII-VIII. По мусорным местам, в балках, иногда на полях. Сп.
- 77/1003/. *Cosmos bipinnatus* Cav. — **Космея двоякоперистая**. Од. VII-VIII. Местами одичавшее в рн. 6, 14.
- 78/1004/. *Crepis biennis* L. — **Скерда двулетняя**. Од. или Дв. VI-VII. По лесам и лугам. Из.
- 79/1005/. *C. pannonica* (Jacq.) C.Koch. — **С. венгерская**. Тм. VI-VIII. В меловых сосняках. В рн. 18. P1.
- 80/1006/. *C. praemorsa* (L.) Tausch. — **С. тупоконечная**. Тм. V-VI. На лугах, в разреженных дубовых и сосново-дубовых лесах, на лесных полянах, на меловых склонах. Из.
- 81/1007/. *C. sibirica* L. — **С. сибирская**. Тм. VI-VIII. В сосновых, сосново-дубовых и дубовых лесах, реже на лесных полянах и влажноватых лугах. Сп.
- 82/1008/. *C. tectorum* L. — **С. кровельная**. Од. или Дв. VI-VII. В посевах и около полей, на мусорных местах, около дорог, на вырубках и ж.-д. насыпях, реже по степным склонам и лесным полянам. Пв.
- 83/1009/. *Crinitaria linosyris* (L.) Less. — **Кринитария льнолистная**. Тм. VIII-IX. По песчано-каменистым и меловым степным склонам. Сп. в рн. Пб.
- 84/1010/. *C. villosa* (L.) Grossh. — **К. мохнатая**. Тм. VII-IX. По меловым и песчано-каменистым степным склонам, реже в черноземных степях. Сп. в рн. Пб., в Лб. в рн. 8.
- 85/1011/. *Cyclachaena xanthifolia* (Nutt.) Fresch. — **Циклахена дурнишникилистная**. Од. VIII-IX. В населенных пунктах, около складских помещений, на ж.-д. станциях. Заносное в рн. 3, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16.
- Dahlia pinnata* Cav. — **Георгина перистая**. Од. VII-IX. Культивируется как декоративное в цветниках. Родина - Северная Америка.
- Echinacea purpurea* (L.) Moench (*Rudbeckia purpurea* L.) — **Эхинацея пурпуровая**. Тм. VII-IX. Выращивается в цветниках, садах, как декоративное, лекарственное растение. В 2002 г. в качестве лекарственного растения культивировался в Ульяновском НИИ сельского хозяйства на площади 2 га. Родина - Северная Америка. В культуре с 1692 г.
- 86/1012/. *Echinops ritro* L. — **Мордовник обыкновенный**. Тм. VI-VIII. По степям, меловым и песчано-каменистым склонам. Сп.
- 87/1013/. *E. sphaerocephalus* L. — **М. шароголовый**. Тм. VI-VIII. В поймах рек, по склонам оврагов, мусорным местам, реже по опушкам лесов и меловым склонам. Пв.
- 88/1014/. *Erigeron acris* L. — **Мелколепестник острый**. Дв., иногда Тм, VI-VIII. По полям, мусорным местам, около дорог, на вырубках. Пв.
- 89/1015/. *E. canadensis* L. — **М. канадский**. Од. V-IX. На полях, на мусорных местах, около дорог, на вырубках чаще на песчаной почве. Пв.
- 90/1016/. *Eupatorium cannabinum* L. — **Посконник коноплевый**. Тм. VI-IX. По

- сырым понижениям в поймах рек, у ручьев, по сырым логам. Из.
 91/1017/. *Filago arvensis* L. — **Жабник полевой**. Од. VI-VIII. На полях, вырубках, в песчаных степях и в нарушенных остепненных лугах. Сп.
Gaillardia aristata Pursh. — **Гайлардия остистая**. Тм. VI-IX. Культивируется как декоративное в цветниках. Дичает на пустырях Нового города в г. Ульяновске. Единично. Родина - Северная Америка.
 92/1018/. *Galatella angustissima* (Tausch) Novopokr. — **Солонечник узколистный**. Тм. VII-IX. В песчано-каменистых степях и на меловых склонах. В рн. 12, 13, 17, 18. Р4.
 93/1019/. *G. divaricata* (Fisch. ex Bieb.) Novopokr. — **С. растопыренный**. Тм. VI-IX. В степях и на каменистых склонах. Из. Р4.
 94/1020/. *G. novopokrovskii* Zefir. — **С. Новопокровского**. Тм. VIII-IX. На солонцеватых лугах. Из. в рн. Пб. Р4.
 95/1021/. *G. rossica* Novopokr. — **С. русский**. В луговой степи на опушках и на лесных полянах. Из. в ю. рн. Пб. Р4.
 96/1022/. *Galinsoga ciliata* (Rafin) Blacke. — **Галинсога реснитчатая**. Од. VII-IX. По улицам, огородам, в парках, на мусорных местах. Заносное в рн. 6. /г. Ульяновск/.
 97/1023/. *G. parviflora* Cav. — **Г. мелкоцветковая**. Од. VII-IX. В садах, парках, по улицам, на пустырях. Сп.
 98/1024/. *Gnaphalium sylvaticum* L. — **Сушеница лесная**. Тм. VI-IX. В разреженных лесах, на вырубках, опушках, лесных полянах. Сп.
 99/1025/. *G. uliginosum* L. — **С. болотная**. Од. VI-VIII. По песчаным берегам рек, речек, ручьев, по сыроватым западинам. Сп.
 100/1026/. *Helianthus annuus* L. — **Подсолнечник однолетний**. Од. VII-VIII. Одичавшее по мусорным местам, вырубкам, на ж.-д. насыпях. Сп.
 101/1027/. *H. tuberosus* L. — **П. клубненосный или Топинамбур**. Тм. VII-IX. На пустырях, вырубках, по улицам, в поймах речек. Одичавшее. Сп.
 102/1028/. *Helichrysum arenarium* (L.) Moench. — **Цмин песчаный**. Тм. VI-IX. В песчаных степях и в разреженных сосновых лесах на песчаной почве. Пв.
Heliopsis scabra Dun. — **Гелиопсис шероховатый**. Тм. VIII-IX. Культивируется в цветниках. Интродуцент. Родина - Северная Америка. В Ульяновске сравнительно недавно - с 1990-х годов.
 103/1029/. *Hieracium arvicola* Naeg. et Peter. — **Ястребинка пашенная**. Тм. На лугах и полях, по опушкам. Р0.
 104/1030/. *H. cymigerum* Reichenb. — **Я. зонтиконосная**. Тм. VI-VII. В сухих дубовых лесах, на полянах, опушках. Из.
 105/1031/. *H. cymosum* L. — **Я. зонтиковидная**. Тм. VI-VII. На лесных полянах. Из.
 106/1032/. *H. echioides* Lumm. — **Я. румяноквая**. Тм. VI-VIII. В степях, сухих сосновых лесах на песчаной почве, на сухих лесных полянах и вырубках. Пв.
 107/1033/. *H. pilosella* L. — **Я. волосистая**. Тм. V-VI. В сосновых лесах на песчаной почве, в песчаных степях, по сухим лесным полянам и опушкам. Пв.
 108/1034/. *H. piloselloides* Vill. — **Я. волосистовидная**. Тм. В сухих сосновых

- лесах на песчаной почве, на опушках и вырубках соснового леса. Из. 109/1035/. *H. robustum Fries* — **Я. могучая**. Тм. VII-VIII. По песчано-каменистым склонам. В рн. 17, 18. P4.
- 110/1036/. *H. umbellatum L.* — **Я. зонтичная**. Тм. VII-IX. В сосновых лесах, светлых лиственных лесах, на вырубках. Пв.
- 111/1037/. *H. virosum Pall.* — **Я. ядовитая**. Тм. VI-IX. В степях на перегнойно-карбонатной почве и черноземах, по меловым склонам, в меловых сосняках. Сп. в рн. Пб., в Лб. в рн. 8.
- 112/1038/. *H. zizanium Tausch.* — **Я. Цица**. Тм. VI-VII. На полянах в дубняках и на вырубках. В рн. 17, 18. P4.
- 113/1039/. *Inula aspera Poir.* — **Девясил шероховатый**. Тм. VI-VIII. На меловых склонах и в ковыльных степях на черноземах. В рн. 8, 18. P3.
- 114/1040/. *I. britannica L.* — **Д. британский**. Тм. VI-VIII. По степям, в разреженных лесах, на лесных полянах, около дорог, иногда по мусорным местам. Сп.
- 115/1041/. *I. ensifolia L.* — **Д. мечелистный**. Тм. VII-VIII. В степях и на меловых склонах. В рн. 9, 12. P4.
- 116/1042/. *I. germanica L.* — **Д. германский**. Тм. VI-VIII. На лесных полянах и опушках. P0.
- 117/1043/. *I. helenium L.* — **Д. высокий**. Тм. VI-IX. В поймах рек, на сырых местах, на болотах. Сп. P3.
- 118/1044/. *I. hirta L.* — **Д. шершавый**. Тм. VI-VII. В разреженных лесах, на лесных полянах, вырубках, опушках, степных склонах, чаще на песчаной или карбонатной почве. Пв.
- 119/1045/. *I. salicina L.* — **Д. иволистный**. Тм. VI-IX. В разреженных лиственных и сосново-лиственных лесах, на лесных полянах и вырубках. Пв.
- 120/1046/. *Jurinea arachnoidea Bunge.* — **Наголоватка паутинистая**. Тм. VI-VII. В ковыльных и луговых степях, по меловым и песчано-каменистым склонам. В рн. 2, 6, 15, 17, 18. P3.
- 121/1047/. *J. charkovensisa Klok.* — **Н. харьковская**. Тм. VI-VII. По открытым террасам и боровым пескам. В рн. 1, 17, 18. P2.
- 122/1048/. *J. cyanoides (L.) Reichenb.* — **Н. васильковая**. Тм. VI-VII. В песчаных степях, в сухих сосновых лесах и на вырубках, на меловых склонах, иногда в черноземной степи. В рн. 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20.
- 123/1049/. *J. ewersmannii Bunge.* — **Н. Эверсмана**. Тм. VI-VII. В песчаных степях и сухих сосновых лесах. В рн. 1. P4.
- 124/1050/. *J. ledebourii Bunge.* — **Н. Ледебюра**. Тм. V-VII. По меловым и песчано-каменистым склонам и в ковыльно-разнотравных степях на черноземах. Из. в рн. Пб., в Лб. в рн. 8.
- 125/1051/. *J. multiflora (L.) B.Fedtsch.* — **Н. многоцветковая**. Тм. VI-VII. В степях, по солонцеватым склонам балок. Из. в некоторых рн. Пб., в Лб. рн. 8.
- 126/1052/. *Lactuca serriola L.* — **Латук компасный**. Од. или Дв. VI-IX. По мусорным местам, у дорог, у жилья, на вырубках, редко в посевах. Пв.
- 127/1053/. *L. tatarica (L.) С.А.Мей.* — **Л. татарский**. Тм. VI-VIII. В посевах, на мусорных местах, по берегам рек, иногда на лугах. Пв.

- 128/1054/. *Lapsana communis* L. — **Бородавник обыкновенный**. Од. VI-IX. По тенистым местам в лесах и в населенных пунктах. Из.
- 129/1055/. *Leontodon autumnalis* L. — **Кульбаба осенняя**. Тм. VII-IX. На сыроватых лугах в поймах рек, около озер, на лесных сыроватых полянах. Пв.
- 130/1056/. *L. hispidus* L. — **К. шершаволистная**. Тм. V-VII. По открытым местам и склонам, на лесных полянах. Из.
- 131/1057/. *Leucanthemum vulgare* Lam. — **Нивяник обыкновенный или Луговая ромашка**. Тм. VI-VII. По лесным полянам, опушкам, лугам, в разреженных лесах, на вырубках. Пв.
- 132/1058/. *Ligularia sibirica* (L.) Cass. — **Бузульник сибирский**. Тм. VII-VIII. На заболоченных торфянистых лугах. В рн. 1. P2.
- 133/1059/. *Matricaria perforata* Merat. — **Матрикария непахучая**. Од., реже Дв. V-IX. В населенных пунктах, на пустырях, на вырубках, по берегам рек, около дорог, реже в посевах. Пв.
- 134/1060/. *Onopordon acanthium* L. — **Татарник колючий**. Дв. V-IX. На мусорных местах, у дорог, по песчаным террасам рек, около жилья. Сп.
- 135/1061/. *Petasites spurius* (Retz.) Reichenb. — **Белокопытник ненастоящий**. Тм. IV-V. По песчаным берегам рек, ручьев, по молодым песчаным наносам в балках и оврагах. Пв.
- 136/1062/. *Picris hieracioides* L. — **Горлюха ястребинковая или Горчак желтый**. Дв. VII-IX. В степях, по сухим лугам, в разреженных сухих лесах, по берегам рек. Пв.
- 137/1063/. *Pulicaria vulgaris* Gaertn. — **Блошница обыкновенная**. Од. VI-VIII. У дорог, на песках, на мусорных местах. Сп.
- 138/1064/. *Pyrethrum corymbosum* (L.) Scop. — **Пиретрум щитковый**. Тм. VI-VIII. В лиственных и сосново-лиственных разреженных лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках. Пв.
- Rudbeckia hirta* L. — **Рудбекия волосистая**. Од. или Дв. VII-IX. Культивируется в цветниках. Родина - Северная Америка, откуда и описан.
- Rudbeckia laciniata* L. — **Рудбекия рассеченная, или Золотой шар**. Тм. VI-IX. Культивируется в палисадниках как декоративное растение. Родина - Северная Америка, откуда и описан.
- 139/1065/. *Saussurea amara* (L.) DC. — **Соссюрея горькая**. Тм. VII-IX. На засоленных почвах. P0.
- 140/1066/. *S. salsa* (Pall.) Spreng. — **С. солончаковая**. Тм. VII-VIII. На засоленных почвах. В рн. 8. P0. На с. границе ареала.
- 141/1067/. *Scorzonera austriaca* Willd. — **Козелец австрийский**. Тм. V-VI. На щебневатых меловых склонах, в меловых сосняках. В рн. 17, 18. P3.
- 142/1068/. *S. ensifolia* Bieb. — **К. мечелистный**. Тм. V-VI. По песчаным террасам рек, реже на меловых склонах. В рн. 9, 12, 16, 17. P2.
- 143/1069/. *S. hispanica* L. — **К. испанский**. Тм. V-VI. В степях, на меловых склонах, на солонцах. В рн. 17, 18, 20. P3.
- 144/1070/. *S. purpurea* L. — **К. пурпуровый**. Тм. V-VI. В луговых степях, по остепненным склонам и луговинам вдоль дорог, в остепненных разреженных ле-

сах и на лесных полянах. Сп.

145/1071/. *S. stricta* Hornem. — **К. прямой.** Тм. V-VIII. В степях, на меловых склонах с перегнойно-карбонатной почвой, на лесных остепненных полянах. Из. *Senecio cineraria* DC. — **Крестовник пепельный.** Очень популярное в последнее время растение и выращивается в орнаментных цветниках. Культивируется два сорта: "Citrus" - листья цельные, меняющие окраску с серебристо-зеленой на серебристо-белую и "Silverdus" - листья глубоко перисторассеченные серебристо-белые. Интродуцент. Родина - Западное Средиземноморье.

146/1072/. *Senecio congestus* (R.Br.) DC. — **Крестовник скученный.** Дв. V-VIII. По сырым местам. В рн. 8, 17. P2.

147/1073/. *S. czernjaevii* Minder. — **К. Черняева.** Тм. V-VI. По осветленным листовенным лесам и сосново-лиственнным лесам, лесным полянам и опушкам. Сп.

148/1074/. *S. erucifolius* L. — **К. эруколистный.** Тм. VII-VIII. По кустарникам в поймах рек. Из.

149/1075/. *S. fluviatilis* Wallr. — **К. приречный.** Тм. VI-IX. По пойменным кустарникам, сырым ольшаникам. Из.

150/1076/. *S. grandidentatus* Ledeb. — **К. крупнозубчатый.** Тм. VIII. По ивнякам в поймах рек и на песках. В рн. 13, 17, 18. P4. На с. границе ареала.

151/1077/. *S. jacobaea* L. — **К. Якова.** Тм. или Од. VI-IX. По лесным полянам, опушкам, в разреженных листовенных лесах, в луговых степях, на вырубках, у дорог. Пв.

152/1078/. *S. kirghisicus* DC. — **К. киргизский.** Тм. VII-VIII. На солонцах. В рн. 8, 9. P1.

153/1079/. *S. schvetzovii* Korsh. — **К. Швецова.** Тм. VI-VIII. В поймах рек, в черномоземных степях, на засоленных почвах, на меловых склонах. В рн. 2, 5, 8, 18. P4.

154/1080/. *S. tataricus* Less. — **К. татарский.** Тм. VI-IX. По заболоченным берегам рек и озер, на заболоченных понижениях в поймах рек. Из.

155/1081/. *S. vernalis* Waldst. et Kit. — **К. весенний.** Од. или Дв. V-VI. В луговых степях, на опушках, лесных полянах, у дорог, реже на полях. Из.

156/1082/. *S. viscosus* L. — **К. клейкий.** Од. VI-IX. Заносное по песчаным и мусорным местам, на ж.-д. станциях. В рн. 5, 6, 7, 10.

157/1083/. *S. vulgaris* L. — **К. обыкновенный.** Од. или Дв. V-IX. По огородам, садам, улицам, мусорным местам, у дорог. Пв.

158/1084/. *Serratula lycopifolia* (Vill.) A.Kerner. — **Серпуха разнолистная.** Тм. V-VI. В луговых степях, в остепненных дубравах, в зарослях степных кустарников. В рн. 1, 9, 13, 17, 18. P4.

159/1085/. *S. tinctoria* L. — **С. красильная.** Тм. VI-IX. По листовенным и сосново-лиственнным лесам, лесным полянам и вырубкам. Сп.

160/1086/. *S. wolffii* Andrae. — **С. Вольфа.** Тм. VII-VIII. В дубняках и сосняках на песчаных и перегнойно-карбонатных почвах, на лесных полянах и вырубках. Из.

161/1087/. *Silphium perfoliatum* L. — **Сильфия пронзеннолистная.** Тм. VII-VIII. Одикавшее в рн. 7, вдоль опушек лесополос.

- 162/1088/. *Solidago virgaurea* L. — **Золотарник обыкновенный** или **Золотая розга**. Тм. VI-IX. По лесам /особенно сосновым и сосново-дубовым/, лесным полянам и вырубкам. Пв.
- 163/1089/. *Sonchus asper* (L.) Hill. — **Осот шероховатый**. Од. VII-IX. В огородах, садах, у жилья, по мусорным местам. Из.
- 164/1090/. *S. arvensis* L. — **Осот полевой** или **желтый**. Тм. VI-IX. В посевах и около посевов, по огородам, мусорным местам, на вырубках. Пв.
- 165/1091/. *S. oleraceus* L. — **О. огородный**. Од. VI-IX. В садах, огородах, на мусорных местах, реже на полях. Пв.
- 166/1092/. *S. palustris* L. — **О. болотный**. Тм. VI-VII. На сырых местах в поймах рек, у ручьев, на травяных болотах. В рн. 1, 5, 8, 17, 18, 19. P4.
- 167/1093/. *Tanacetum kittaryanum* (C.A.Mey) Tzvel. — **Пижма Киттари**. Тм. VI-VIII. На меловых и мергелистых обнажениях с щебневатой почвой. В рн. 6, 17, 20. P2. На з. границе ареала.
- 168/1094/. *T. millefolium* (L.) Tzvel. — **П. тысячелистная**. Тм. VI-VII. По меловым склонам и песчаным местам. В рн. 17. P2.
- 169/1095/. *T. sclerophyllum* (Krasch.) Tzvel. — **П. жестколистная**. Тм. VI-VIII. На меловых обнажениях. В рн. 17, 18. P2. На с. границе ареала.
- 170/1096/. *T. uralense* (Krasch.) Tzvel. — **П. уральская**. Тм. VI-VIII. На меловых и мергелистых склонах с щебневатой маломощной почвой. В рн. 16, 17, 20. P2. На з. границе ареала.
- 171/1097/. *T. vulgare* L. — **П. обыкновенная** или **Дикая рябинка**. Тм. VII-X. По высокому берегу рек, балкам, сухим лесным полянам, вырубкам, у дорог, на ж.-д. насыпях, около жилищ, по окраинам полей. Пв.
- 172/1098/. *Taraxacum bessarabicum* (Hornem.) Hand-Mazz. — **Одуванчик бессарабский**. Тм. VII-VIII. На солонцеватых лугах и солончаковых луговинах в балках. В рн. 17, 18. P4.
- 173/1099/. *T. erythrospermum* Andrz. — **О. красноплодный**. Тм. V-VI. На солонцеватых лугах и солончаковых луговинах в балках. В рн. 17, 18. P4.
- 174/1100/. *T. officinale* Wigg. — **О. лекарственный**. Тм. IV-IX. В населенных пунктах, на лугах, в садах, огородах, по обочинам дорог, около полей, на пустырях, в степях, в разреженных лесах, на вырубках. Пв.
Примечание. Данный вид понимается здесь в широком объеме.
- 175/1101/. *T. serotinum* (Waldst. et Kit.) Poir. — **О. поздний**. Тм. VII-VIII. В ковыльно-разнотравных степях, на степных склонах с черноземными и перегнойно-карбонатными почвами, на солонцеватых глинистых почвах, на меловых обнажениях. Сп. в рн. Пб., в Лб. в рн. 8.
- 176/1102/. *T. turgaicum* Schisch. — **О. тургайский**. Тм. IV-VI. Раньше указывался для поймы Волги. P0.
- 177/1103/. *Tragopogon dasyrhynchus* Artemcz. — **Козлобородник опушенноносый**. Дв. V-VIII. В каменистой степи на перегнойно-карбонатной почве. В рн. 20. P2.
- 178/1104/. *T. dubius* Scop. — **К. сомнительный**. Дв. V-VIII. В степях, на сухих лугах, в сухих разреженных лесах, на вырубках, на меловых склонах. Сп.

- 179/1105/. *T. orientalis* L. — **К. восточный**. Дв. V-VIII. По лесным полянам, в степях, по остепненным опушкам, иногда на ж.-д. насыпях. Сп.
- 180/1106/. *T. podolicus* (DC.) Artemcz. — **К. подольский**. Дв. V-VIII. На полянах во вторичных дубравах, по балкам, на меловых склонах. В рн. 15, 17, 18. Р4.
- 181/1107/. *T. pratensis* L. — **К. луговой**. Дв. V-IX. На лугах, лесных полянах, вырубках, по опушкам, на меловых склонах, у дорог. Сп.
- 182/1108/. *Tussilago farfara* L. — **Мать-и-мачеха обыкновенная**. Тм. IV-V. По глинистым обнажениям и склонам, по зарастающим наносам рек и склонам речных берегов. Пв.
- 183/1109/. *Xanthium rupicola* Holub. — **Дурнишник скальный**. Од. VII-IX. Заносное. Сп. На мусорных местах.
- 184/1110/. *X. occidentale* Bertol. — **Д. западный**. Од. VII-VIII. Заносное. Сп. На мусорных местах.
- 185/1111/. *X. spinosum* L. — **Д. колючий**. Од. VII-VIII. Заносное на мусорных местах в рн. 6, 14, 16.
- 186/1112/. *X. strumarium* L. — **Д. обыкновенный**. Од. VII-VIII. У жилья, на мусорных местах, около дорог чаще на песчаной почве, по песчаным берегам рек. Вытесняется предыдущими видами.
- Zinnia elegans* Jacq. — **Цинния изящная**. Од. VII-IX. Культивируется в цветниках. Интродуцент. Родина - Центр. и Южн. Америка. Описан из Мексики.

Класс 6. Liliatae (Monocotyledones) — Однодольные.

Сем. 100. Butomaceae — Сусаковые

- 1/1113/. *Butomus umbellatus* L. — **Сусак зонтичный**. Тм. VI-VII. По берегам водоемов, болотам и болотистым лугам. Пв.

Сем. 101. Alismataceae — Частуховые

- 1/1114/. *Alisma gramineum* Lej. — **Частуха-злаковидная**. Тм. VII-VIII. По берегам водоемов. Из. в рн. 8, 9.
- 2/1115/. *A. lanceolatum* With. — **Ч. ланцетная**. Тм. VI-VIII. На болотистых лугах, болотах, по берегам водоемов. Сп.
- 3/1116/. *A. plantago-aquatica* L. — **Ч. подорожниковая**. Тм. VI-VIII. По берегам водоемов, на болотах в мелкой воде. Пв.
- 4/1117/. *Sagittaria sagittifolia* L. — **Стрелолист обыкновенный**. Тм. VI-IX. По берегам водоемов в мелкой воде, на болотах. Пв.

Сем. 102. Hydrocharitaceae — Водокрасовые

- 1/1118/. *Elodea canadensis* Michx. — **Элодея канадская**. Тм. VII-VIII. В озерах, прудах. Пв. Заносное.
- 2/1119/. *Hydrocharis morsus-ranae* L. — **Водокрас обыкновенный или лягу-**

шатник. В стоячих и медленно текущих водах. Пв.
3/1120/. *Stratiotes aloides* L. — **Телорез алоевидный.** Тм. VII. В пойменных озерах и старицах. Сп.

Сем. 103. Scheuchzeriaceae — Шейхцериевые

1/1121/. *Scheuchzeria palustris* L. — **Шейхцерия болотная.** Тм. V-VII. По сплавиным озерам, моховым болотам. В рн. 10, 11, 14, 15, 16. РЗ. Близ ю. границы ареала.

Сем. 104. Juncaginaceae — Ситниковидные

1/1122/. *Triglochin maritimum* L. — **Триостренник морской.** Тм. V-VI. На засоленных почвах в поймах рек. В рн. 9, 17. Р2.

2/1123/. *T. palustris* L. — **Т. болотный.** Тм. V-VIII. На низинных болотах, сырых лугах, по берегам рек и озер. Сп.

Сем. 105. Potamogetonaceae — Рдестовые

1/1124/. *Potamogeton alpinus* Balb. — **Рдест альпийский.** Тм. VI-VII. В озерах. В рн. 16. Редкое.

2/1125/. *P. berchtoldii* Fieb. — **Р. Берхтольда.** Тм. VI-VII. В реках, озерах, прудах. Сп.

3/1126/. *P. compressus* L. — **Р. сплюснутый.** Тм. VI-VII. В реках, озерах, прудах. Из.

4/1127/. *P. crispus* L. — **Р. курчавый.** Тм. VI-VII. В реках, озерах, прудах. Пв.

5/1128/. *P. friesii* Rupr. — **Р. Фриса.** Тм. VI-VIII. В озерах, прудах. Нередко в рн. 17, 18.

6/1129/. *P. gramineus* L. — **Р. злаковый.** Тм. VI. В озерах, реже на низинных болотах. В рн. 12, 14, 15, 16, 17. Р4.

7/1130/. *P. lucens* L. — **Р. блестящий.** Тм. VI-VII. В реках, озерах, прудах. Пв.

8/1131/. *P. natans* L. — **Р. плавающий.** Тм. VI-VII. В реках, озерах, прудах. Сп.

9/1132/. *P. nodosus* Poir. — **Р. узловатый.** Тм. VI-VII. Из. по Большому и Малому Черемшану.

10/1133/. *P. pectinatus* L. — **Р. гребенчатый.** Тм. VI-VII. В реках, озерах, прудах. Пв.

11/1134/. *P. perfoliatus* L. — **Р. пронзеннолистный.** Тм. VI-VII. В реках, озерах, прудах. Сп.

12/1135/. *P. trichoides* Cham. et Schlecht. — **Р. волосовидный.** Тм. VI-VII. По небольшим речкам, мелким озерам. Из.

Сем. 106. Zannichelliaceae — Цаникеллиевые

1/1136/. *Zannichellia palustris* L. — **Цаникеллия болотная**. Тм. VI-VII. В озерах, заводях, на топких болотах. В рн. 17. РЗ.

Сем. 107. Najadaceae — Наядовые

1/1137/. *Caulinia minor* (All.) Coss. et Germ. — **Каулиния малая**. Од. VI-VII. В пойменных озерах р. Б.Черемшан в рн. 8. Редко. Заслуживает охраны!

2/1138/. *Najas marina* L. — **Наяда морская**. Од. VI-IX. В сравнительно быстро текущих реках и ручьях. В рн. 6. Редко.

Сем. Nemerocallidaceae — Краснодневовые

Nemerocallis fulva (L.) L. — **Красноднев оранжевый, или Лилейник**. Тм. VII-VIII. Культивируется в цветниках, садах как декоративное растение. Дичает. Отмечен на свалке строительного мусора в экопарке "Черное озеро" в г. Ульяновске, на пустырях близ жилья. Единично.

Сем. 108. Liliaceae — Лилейные

1/1139/. *Convallaria majalis* L. — **Ландыш майский**. Тм. V-VI. В сосновых, сосново-широколиственных, широколиственных и осиновых лесах, реже в березовых лесах. Пв.

2/1140/. *Fritillaria meleagroides* Patrin ex Schult. et Schult. — **Рябчик шахматовидный**. Тм. V. По сыроватым местам в поймах рек. В рн. 2. Р2.

3/1141/. *F. ruthenica* Wikstr. — **Р. русский**. Тм. V. По осветленным лиственным лесам, остепненным лесным полянам, опушкам, степным склонам. В рн. 1, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20. РЗ. Эндем.

4/1142/. *Gagea erubescens* (Bess.) Schult. et Schult. fil. — **Гусиный лук краснеющий**. Тм. IV-V. По склонам и опушкам. Из.

5/1143/. *G. granulosa* Turcz. — **Г. л. зернистый**. Тм. IV-V. В лесах. Р0.

6/1144/. *G. lutea* (L.) Ker.-Gawl. — **Г. л. желтый**. Тм. IV-V. В широколиственных, сосново-широколиственных и осиновых лесах. Пв.

7/1145/. *G. minima* (L.) Ker.-Gawl. — **Г. л. малый**. Тм. IV-V. По лесным склонам, в разреженных лесах. Сп.

8/1146/. *G. pusilla* (F.W.Schmidt) Schult. et Schult. fil. — **Г. л. маленький**. Тм. IV-V. По степным травяным и меловым склонам. Из.

Lilium lancifolium Thunb. — **Лилия ланцетолистная, или тигровая**. Тм. VIII. Интродуцент. Родина - Дальний Восток. А. Д. Воейков распространял по Каталогу питомников (1911) как типовую форму, так и крупноцветковую и махровую формы. Отмечает их выносливость.

9/1147/. *Lilium martagon* L. — **Лилия саранка или Царские кудри**. Тм. VI-VII. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах. Сп. РЗ.

10/1148/. *L. pilosiusculum* (Freyn.) Misch. — **Л. опушенная**. Тм. VI-VII. В широ-

колиственных и сосново-широколиственных лесах. Сп. P3.

11/1149/. *Majanthemum bifolium* (L.) F. W. Schmidt. — **Майник двулистный**. Тм. V-VI. В сосновых лесах зеленомошниках, сосново-березовых и вторичных березовых лесах, реже в сосново-широколиственных и вторичных широколиственных лесах, а также по окраинам лесных болот. Пв.

12/1150/. *Paris quadrifolia* L. — **Вороний глаз четырехлистный**. Тм. V-VI. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах, реже во влажных листовых лесах и в пойменных ольшаниках. Пв.

13/1151/. *Polygonatum multiflorum* (L.) All. — **Купена многоцветковая**. Тм. V-VI. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах. Сп.

14/1152/. *P. odoratum* (Mill.) Druce. — **Купена пахучая или лекарственная**. Тм. V-VI. В сосновых лесах зеленомошниках, сосново-дубовых лесах и вторичных дубовых лесах на супесчаных почвах, реже в сосново-широколиственных и широколиственных лесах, в меловых сосняках и на открытых меловых склонах. Пв.

15/1153/. *Scilla sibirica* Haw. — **Пролеска сибирская**. Тм. IV. В широколиственных лесах. В рн. 18. P2. На в. границе ареала. Реликт.

16/1154/. *Tulipa biebersteiniana* Schult. et Schult. fit. — **Тюльпан Биберштейна**. Тм. IV. В остепненных дубняках, по лесным полянам и опушкам. В рн. 18, 20. P2.

17/1155/. *Veratrum lobelianum* Bernh. — **Чемерица Лобеля**. Тм. VI-VII. По сырым пойменным лугам, сырым лесным полянам и опушкам, сырым заболоченным лесам, на травяных болотах. Пв.

Сем. 109. Alliaceae — Луковые

1/1156/. *Allium angulosum* L. — **Лук угловатый**. Тм. V-VI. На сыроватых пойменных лугах. Из.

2/1157/. *A. decipiens* Fisch. ex Schult. et Schult. fil. — **Л. обманчивый**. Тм. VI-VII. В степях на меловых холмах. В рн. 16, 20. P2. На с. границе ареала.

3/1158/. *A. flavescens* Bess. — **Л. желтеющий**. Тм. VI-VII. По черноземным степям и склонам с карбонатной почвой, реже в песчаной степи. В рн. 2, 8, 12, 15, 16, 17, 18. P4.

4/1159/. *A. globosum* Bieb. ex Redonte. — **Л. шаровидный**. Тм. VI-VII. На меловых и песчано-каменистых склонах. В рн. 5, 6, 17, 18. P4.

5/1160/. *A. lineare* L. — **Л. линейный**. Тм. VI-VII. По степям, на меловых склонах. Сп.

6/1161/. *A. oleraceum* L. — **Л. огородный**. Тм. V-VII. В разреженных дубовых лесах, на лесных полянах, в луговых степях, на меловых холмах. В рн. 2, 5, 15, 17, 18. P4.

7/1162/. *A. paniculatum* L. — **Л. метельчатый**. Тм. VI-VII. По степям и солонцеватым склонам балок. В рн. 17, 18. P4.

8/1163/. *A. rotundum* L. — **Л. круглый**. Тм. VI-VII. В посевах, иногда в степи на перегнойно-карбонатной почве. Из.

9/1164/. *A. schoenoprasum* L. — **Л. скорода**. Тм. VI-VII. Одичавшее в населенных

пунктах, около дорог. Из.

10/1165/. *A. strictum* Schrad. — **Л. прямой**. Тм. VI-VII. На меловых обнажениях, в каменистых степях на перегнойно-карбонатной почве, в песчаной степи. Сп.

Сем. 110. Asparagaceae — Спаржевые

1/1166/. *Asparagus officinalis* L. — **Спаржа лекарственная, или съедобная**. Тм. VI. По пойменным лугам и остепненным склонам, иногда в разреженных лесах. Сп.

2/1167/. *A. polyphyllus* Stev. — **С. многолистная**. Тм. VI. На мелах и меловом рухляке, на склонах с перегнойно-карбонатной и песчано-каменистой почвой, иногда по солонцеватым глинистым склонам. Из. РЗ. Находится на с. границе ареала.

Сем. 111. Iridaceae — Касатиковые

Crocus flavus Weston. — **Шафран, или крокус желтый**. Тм. IV. Выращивается как декоративное в цветниках. Родина - Балканы, Мал. Азия.

1/1168/. *Gladiolus imbricatus* L. — **Шпажник черепчатый**. Тм. VI-VII. В поймах рек, на сырых лугах, по опушкам влажных лесов. В рн. 4, 8, 9, 11, 14, 17. Р2.

2/1169/. *Iris aphylla* L. — **Касатик безлистный**. Тм. V-VI. По осветленным сосновым и сосново-лиственным лесам, особенно на песчаных и супесчаных почвах, на остепненных лесных полянах, на песчано-каменистых и меловых склонах. Сп. РЗ.

3/1170/. *I. halophila* Pall. — **К. солончаковый**. Тм. V-VI. На лугах и по берегу р. Терешки в рн. 20. Р1.

4/1171/. *I. pineticola* Klok. — **К. боровой**. Тм. IV-V. В разреженных вторичных дубняках и на опушках соснового леса. В рн. 12, 14. Р1.

5/1172/. *I. pseudacorus* L. — **К. водный или аировидный**. Тм. V-VI. По болотам, топким лугам, берегам рек и озер. Из. РЗ.

6/1173/. *I. pumila* L. — **К. низкий**. Тм. IV-V. В степях и по степным склонам с перегнойно-карбонатными и черноземными почвами, на солонцеватых почвах. В рн. 8, 15, 16, 18, 20. Р2. На в. границе ареала.

7/1174/. *I. sibirica* L. — **К. сибирский**. Тм. V-VI. В осветленных лесах, на опушках. Из. в рн. Пб. Р4.

Сем. 112. Orchidaceae — Орхидные

1/1175/. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. — **Пыльцеголовник красный**. Тм. V. В широколиственных лесах и на опушках. В рн. 1, 3, 8, 10, 13, 17. Р2.

2/1176/. *Coeloglossum viridae* (L.) C.Hartm. — **Пололепестник зеленый**. Тм. V-VII. По лесам, реже на лугах. Р0.

3/1177/. *Cypripedium calceolus* L. — **Венерин башмачок настоящий или жел-**

- тый.** Тм. V-VI. Во влажных широколиственных лесах, по лесным оврагам. В рн. 2, 4, 6, 13, 18. P1.
- 4/1178/. *C. guttatum* Sw. — **В. б. пятнистый.** Тм. V-VI. По лесам. P0.
- 5/1179/. *C. macranthon* Sw. — **В. б. крупноцветковый.** Тм. VI. В сосняках на песчаной почве. P0.
- 6/1180/. *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soo. — **Пальчатокоренник Фукса.** Тм. VI-VII. В болотистых лесах, на заболоченных лугах и болотах. В рн. 1, 8. P3.
- 7/1181/. *D. incarnata* (L.) Soo. — **П. мясо-красный.** Тм. V-VI. По заболоченным лугам и сырым лесным полянам. В рн. 7, 11, 12, 14. P2.
- 8/1182/. *D. maculata* (L.) Soo. — **П. пятнистый.** Тм. VI-VII. В сыроватых широколиственных лесах, в сосняках зеленомошниках, по окраинам болот. P3.
- 9/1183/. *Epipactis atrorubens* (Hoffm. ex Bernh.) Schult. — **Дремлик тёмнокрасный.** Тм. VI-VII. В разреженных лесах с карбонатной почвой. В рн. 5, 10, 17, 18. P3.
- 10/1184/. *E. helleborine* (L) Crantz. — **Д. широколистный.** Тм. VII-VIII. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах. Сп. P3.
- 11/1185/. *E. palustris* (L.) Crantz. — **Д. болотный.** Тм. VI-VII. По болотам и сырм лугам. Из. P3.
- 12/1186/. *Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br. — **Кокушник длиннорогий.** Тм. VI. В сосновых лесах брусничниках и в дубняках на меловых холмах. В рн. 10, 14, 15, 17, 18, 21. P2.
- 13/1187/. *G. odoratissima* (L.) L. C.Rich. — **К. душистый.** Тм. VI. По болотам и лугам. В рн. 10, 21. P1.
- 14/1188/. *Hammarbia paludosa* (L.) O.Kuntze. — **Гаммарбия болотная.** Тм. VI-VII. На моховых болотах и сплавинах озер. В рн. 3, 10, 12, 15, 16. P2.
- 15/1189/. *Herminium monorchis* (L.) R.Br. — **Бровник одноклубневый.** Тм. VI-VII. По сыроватым лугам. P0.
- 16/1190/. *Liparis loeselii* (L.) Rich. — **Лосняк Лёзеля.** Тм. V-VI. По торфяным болотам. P0.
- 17/1191/. *Listera ovata* (L.) R.Br. — **Тайник яйцевидный.** Тм. V-VI. Во влажных лиственных лесах. В рн.6. P2.
- 18/1192/. *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. — **Гнездовка настоящая.** Тм. V-VI. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах. Из. P3.
- 19/1193/. *Neottianthe cucullata* (L.) Schlechter. — **Неоттинанта клобучковая.** Тм. VII-VIII. В сосновых лесах зеленомошниках. В рн. 7, 10, 11, 14, 15, 16. P2.
- 20/1194/. *Orchis militaris* L. — **Ятрышник шлемовидный.** Тм. V-VI. По сырм лугам, сырм лесным полянам, на травяных болотах. Из. P2.
- 21/1195/. *O. ustulata* L. — **Я. обожженный.** Тм. VI-VII. На лесных полянах. P0.
- 22/1196/. *Platanthera bifolia* (L.) Rich. — **Любка двулистная, или Ночная фиалка.** Тм. V-VI. В сосново-широколиственных и широколиственных лесах, на лесных полянах. Сп. P3.

- 1/1197/. *Juncus articulatus* L. — **Ситник членистый**. Тм. VI-VII. По берегам водоемов, сырым лугам, на болотах. Пв.
- 2/1198/. *J. atratus* Krock. — **С. черный**. Тм. VI. По берегам водоемов, на болотах и сырых лугах. Сп.
- 3/1199/. *J. bufonius* L. — **С. жабий**. Од. V-VIII. По сырым лугам, сырым лесным дорогам, берегам водоемов, илистым водостокам балок. Пв.
- 4/1200/. *J. compressus* Jacq. — **С. сплюснутый**. Тм. VI-VII. По сырым лугам, болотам, берегам рек и озер. Пв.
- 5/1201/. *J. conglomeratus* L. — **С. скученный**. Тм. VI-VII. По берегам водоемов, в мелкой воде, по болотистым понижениям в лесах. В рн. 3, 17, 18.
- 6/1202/. *J. effusus* L. — **С. развесистый**. Тм. VI-VII. По берегам водоемов, в сырых понижениях в лесах, у канав. Пв.
- 7/1203/. *J. filiformis* L. — **С. нитевидный**. Тм. VI. По сырым лугам. Сп.
- 8/1204/. *J. geniculatus* Schrank. — **С. коленчатый**. Тм. VI-VII. По берегам водоемов, на болотах. Сп.
- 9/1205/. *J. gerardii* Loisel. — **С. Жерарда**. Тм. VI. По сырым местам в поймах рек, на болотах, по влажным солонцеватым лугам. Сп.
- 10/1206/. *J. sphaerocarpus* Nees. — **С. круглоплодный**. Од. VI-VII. В сыроватых местах на песчаной почве. В рн.1. P4.
- 11/1207/. *Luzula campestris* (L.) DC. — **Ожика равнинная**. Тм. V-VI. По лугам, лесным полянам. Сп.
- 12/1208/. *L. multiflora* (Retz) Jej. — **О. многоцветковая**. Тм. V-VI. На лугах, в разреженных лесах, на торфяниках. Сп.
- 13/1209/. *L. pallescens* Sw. — **О. бледноватая**. Тм. V-VI. На лугах, в разреженных лесах. Сп.
- 14/1210/. *L. pilosa* (L.) Willd. — **О. волосистая**. Тм. IV-V. В сосновых лесах зеленомошниках, реже в сосново-широколиственных и вторичных дубовых лесах, на вырубках. Пв.

Сем. 114. Сурегасеae — Осоковые

- 1/1211/. *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla. — **Клубнекамыш приморский**. Тм. VI-VII. По берегам рек и озер, в мелкой воде, по заболоченным лесным низинам, на влажных солончаковых почвах. Сп.
- 2/1212/. *Carex acuta* L. — **Осока острая**. Тм. V-VI. По берегам водоемов, болотам, в заболоченных лесах. Пв.
- 3/1213/. *C. acutiformis* Ehrh. — **О. заостренная**. Тм. V-VI. По берегам водоемов, в мелкой воде, по заболоченным местам в поймах рек, по сырым пойменным лесам. Пв.
- 4/1214/. *C. appropinquata* Schum. — **О. сближенная**. Тм. V-VIII. По болотам. Из.
- 5/1215/. *C. arnellii* Christ. — **О. Арнелла**. Тм. V-VI. В поймах рек на лугах и в дубняках, по опушкам. В рн. 1, 3, 4, 9. P2.
- 6/1216/. *C. aspratilis* V.Krecz. — **О. шероховатая**. Тм. IV-V. На пойменных лугах. P0.

- 7/1217/. *C. atherodes Spreng.* — **О. прямоколосья.** Тм. V-VI. На болотистых местах. В рн. 18. P2.
- 8/1218/. *C. bohemica Schred.* — **О. богемская, или сытевидная.** Тм. VI-IX. По берегам пойменных озер и стариц. В рн. 3, 9. P2.
- 9/1219/. *C. brunnescens (Pers.) Pair.* — **О. буроватая.** Тм. V-VI. На моховых болотах. В рн. 11. P2.
- 10/1220/. *C. capillaris L.* — **О. волосовидная.** Тм. V-VI. На болотах и в заболоченных лесах. P0.
- 11/1221/. *C. caryophyllea Latourr.* — **О. гвоздичная или ранняя.** Тм. IV-V. В степях, на меловых склонах, в сухих остепненных сосняках. Сп.
- 12/1222/. *C. cespitosa L.* — **О. дернистая.** Тм. V. По болотам, берегам озер, в заболоченных лесах. Пв.
- 13/1223/. *C. cinerea Poll.* — **О. пепельно-серая.** Тм. V-VI. По болотам, болотистым лугам, сырым сосново-березовым лесам. Из.
- 14/1224/. *C. colchica J.Gay.* — **О. колхидская.** Тм. V-VI. По речным террасовым пескам. В рн. 17. P1.
- 15/1225/. *C. contigua Hoppe.* — **О. соседняя.** Тм. V-VI. В сосняках зеленомошниках, вторичных дубняках, на вырубках, по лесным дорогам, реже в луговой степи. Сп.
- 16/1226/. *C. diandra Schrank.* — **О. двутычинковая.** Тм. V-VI. По пойменным и лесным болотам. Из.
- 17/1227/. *C. digitata L.* — **О. пальчатая.** Тм. IV-V. В сосново-широколиственных и вторичных дубовых лесах. Пв.
- 18/1228/. *C. diluta Bieb.* — **О. светлая.** Тм. IV-V. По сырым солончаковым луговинам у ключей в балках. В рн. 17. P2.
- 19/1229/. *C. distacha Huds.* — **О. двурядная.** Тм. V-VII. На пойменных и болотистых лугах. Из.
- 20/1230/. *C. elata All.* — **О. высокая.** Тм. V-VI. На заболоченных местах в долинах рек. Из.
- 21/1231/. *C. elongata L.* — **О. удлиненная.** Тм. V-VII. По сырым и болотистым лугам. В некоторых рн. P4.
- 22/1232/. *C. ericetorum Poll.* — **О. верещатниковая.** Тм. IV-V. В сосновых и сосново-дубовых лесах, во вторичных дубняках и березняках, на лесных полянах и вырубках, преимущественно на песчаной и супесчаной почве. Сп.
- 23/1233/. *C. globularis L.* — **О. шаровидная.** Тм. V-VI. На болотах и в заболоченных лесах. В рн. 10. P4.
- 24/1234/. *C. hartmanii Cajand.* — **О. Гартмана.** Тм. VI-VII. На выработанных торфяниках, в мочажинах. В рн. 11, 15. P2.
- 25/1235/. *C. hirta L.* — **О. коротковолосистая.** Тм. V-VI. По берегам водоемов, в поймах рек. Сп.
- 26/1236/. *C. juncella (Fries) Th. Fries.* — **О. ситничек.** Тм. V-VI. На болотах, сырых пойменных лугах, у ключей. В рн. 1, 14, 17. P2.
- 27/1237/. *C. lasiocarpa Ehrh.* — **О. волосистоплодная.** Тм. V. На моховых и травяных болотах. В рн. 1, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 19. P3.

- 28/1238/. *C. leporina* L. — **О. заячья**. Тм. V-VI. По сыроватым лугам, сырым понижениям в разреженных лесах, по сырым лесным полянам. Сп.
- 29/1239/. *C. limosa* L. — **О. топяная**. Тм. V-VI. На моховых болотах. В рн. 10, 12, 14, 15, 16, 19.
- 30/1240/. *C. melanostachya* Bieb. ex Willd. — **О. черноколосая**. Тм. V. По тальвегам балок и на солонцеватых почвах. В рн. 18. P2.
- 31/1241/. *C. montana* L. — **О. горная**. Тм. IV-V. В широколиственных, сосново-широколиственных и осиновых лесах, реже в остепненных лесах. Сп.
- 32/1242/. *C. muricata* L. — **О. колючковатая**. Тм. V-VI В разреженных лесах, по лесным полянам, в долинах рек. В рн. 3, 12, 13, 17, 18. P4.
- 33/1243/. *C. nigra* (L.) Reichard. — **О. черная или обыкновенная**. Тм. V-VI. По сырым лугам, травяным, реже моховым болотам. В рн. 5, 12, 15. P4.
- 34/1244/. *C. pallescens* L. — **О. бледноватая**. Тм. V. На лугах, в осветленных лесах. Из.
- 35/1245/. *C. panicea* L. — **О. просяная**. Тм. IV-V. В сосново-еловых и сосново-широколиственных лесах. Из. в сев. рн. Пб.
- 36/1246/. *C. pediformis* C.A.Mey. — **О. стоповидная**. Тм. V. В ковыльных степях, в каменистых меловых степях, в меловых сосняках. В рн. 13, 16. P2. На с. границе ареала.
- 37/1247/. *C. pilosa* Scop. — **О. волосистая**. Тм. IV-V. В широколиственных, сосново-широколиственных, осиновых лесах, иногда в березовых лесах и на молодых вырубках. Пв.
- 38/1248/. *C. praecox* Schreb. — **О. ранняя**. Тм. IV-V. В песчаных степях, на сухих склонах, на меловых склонах с перегнойно-карбонатной почвой, на сухих лесных полянах. Пв.
- 39/1249/. *C. pseudocyperus* L. — **О. ложносытевая**. Тм. V-VI. По берегам водоемов и в мелкой воде. Сп.
- 40/1250/. *C. rhizina* Blytt ex Lindbl. — **О. корневищная**. Тм. V. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах, иногда на вырубках. Пв.
- 41/1251/. *C. rhynchophysa* C.A.Mey. — **О. вздутоносная**. Тм. V-VII. По окраинам болот. В рн. 11. P2.
- 42/1252/. *C. riparia* Curt. — **О. береговая**. Тм. V-VI. По берегам рек, озер, по водотокам балок. Пв.
- 43/1253/. *C. rostrata* Stokes. — **О. вздутая**. Тм. V-VI. На болотах, по берегам водоемов, на сырых пойменных лугах, иногда в сырых пойменных дубравах. Пв.
- 44/1254/. *C. supina* Wahlenb. — **О. приземистая**. Тм. IV-V. В песчаных и песчано-каменистых степях, по меловым и мергелистым склонам, в горных сосняках, иногда в сухих сосновых лесах. Сп.
- 45/1255/. *C. sylvatica* Huds. — **О. лесная**. Тм. V-VI. По лесам. Из. в с. рн.
- 46/1256/. *C. tenuiflora* Wahlenb. — **О. тонкоцветковая**. Тм. VI-VII. По торфяным болотам. В рн. 14. P2.
- 47/1257/. *C. tomentosa* L. — **О. войлочная**. Тм. V. По сырым местам около рек и озер. Из.
- 48/1258/. *C. vaginata* Tausch. — **О. влагалищная**. Тм. V-VI. По окраинам сфаг-

новых болот и сплавин. В рн. 1, 16. P2.

49/1259/. *C. vesicaria* L. — **О. пузырчатая**. Тм. V-VI. На болотах, по берегам водоемов, по болотистым местам в поймах рек, в заболоченных лесах. Пв.

50/1260/. *C. vulpina* L. — **О. лисья**. Тм. V-VI. На пойменных лугах, на болотах, по берегам озер, в лесных мочажинах. Пв.

51/1261/. *Cyperus fuscus* L. — **Сыть бурая**. Од. VII-IX. По песчаным берегам рек, на илистых местах по окраинам озер, по днищам балок. Сп.

52/1262/. *Dichostylis micheliana* (L.) Ness. — **Дихостилис Микели**. Од. VII-VIII. По илесто-песчаным косам рек. В рн. 1. P2.

53/1263/. *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. — **Ситняг игольчатый**. Тм. V-VII. По беретм водоемов, в мелкой воде, на болотах. Сп.

34/1264/. *E. mamillata* Lindb. Fil. — **С. сосочковый**. Тм. V-VI. По болотам, на сырых лугах, в заболоченных лесах. В рн. 1, 16, 19. P4.

155/1265/. *E. palustris* (L.) Roem. et Schult. — **С. болотный**. Тм. VI-VII. По берегам водоемов, в мелкой воде, по сырым и болотистым местам. Пв.

56/1266/. *E. uniglumis* (Link) Schult. — **С. одночешуйчатый**. Тм. V-VII. По болотистым солонцеватым лугам, водотокам балок, по берегам рек, озер и ручьев. В рн. 17. P4.

57/1267/. *Eriophorum gracile* Koch. — **Пушица тонкая**. Тм. V. По моховым болотам и сплавином озер. В рн. 11, 12, 15. P2.

58/1268/. *E. latifolium* Hoppe. — **П. широколистная**. Тм. V. По торфяным болотам. P0.

59/1269/. *E. polystachyon* L. — **П. многоколосковая**. Тм. V. По тростниково-моховым болотам и на сплавином озер. В рн. 1, 10, 11, 14, 15, 16. P3. Близ ю. границы ареала.

60/1270/. *E. vaginatum* L. — **П. влагалищная**. Тм. IV-V. На моховых болотах и выработанных торфяниках. В рн. 1,5,10,11, 14, 15, 16, 19. P3. Близ ю. границы ареала.

61/1271/. *Mariscus hamulosus* (Bieb.) Hooper. — **Марискус крючковатый**. Од. VII. По илесто-песчаным косам рек. В рн. 1. P2.

62/1272/. *Rhynchospora alba* (L.) Vahl. — **Очеретник белый**. Тм. V-VI. На сфагновых болотах и на сплавином озер. В рн. 10, 14, 15, 16. P3. На ю. границе ареала.

63/1273/. *Scirpoides holoschoenus* (L.) Sojak. — **Сцирпоидес обыкновенный**. Тм. VI-VII. По зарастающим пескам в поймах рек. В рн. 17. P4.

64/1274/. *Scirpus lacustris* L. — **Камыш озерный**. Тм. VI-VII. По берегам водоемов, в мелкой воде, по топким болотам. Пв.

65/1275/. *S. radicans* Schkuhr. — **К. укореняющийся**. Тм. VI-VII. По берегам озер, на сырых лугах и в поймах рек. В рн. 1, 6, 12, 16, 17. P4.

66/1276/. *S. tabernaemontani* C.C.Gmel. — **К. Табернемонтана**. Тм. VI-VII. По берегам рек, озер, на болотах, в мелкой воде. Сп.

67/1277/. *S. sylvaticus* L. — **К. лесной**. Тм. VI-VII. По болотам, берегам рек, озер, ручьев, в заболоченных лесах. Пв.

- 1/1278/. *Agropyron desertorum* (Fisch. ex Link) Schult. — **Житняк пустынный**. Тм. VI-VII. В каменистых степях, на склонах балок. Из., но чаще южнее р. Сызранки.
- 2/1279/. *A. pectinatum* (Bieb.) Beauv. — **Ж. гребневидный**. Тм. VI-VII. В степях, по мелям, сухим полянам Сп.
- 3/1280/. *Agrostis canina* L. — **Полевица собачья**. Тм. VI-VII. По сырым лугам, около болот, по сырым лесным полянам. Сп.
- 85 4/1281/. *A. gigantea* Roth. — **П. гигантская**. Тм. VI-VIII. По берегам водоемов, на пойменных лугах, лесных полянах. Сп.
- 5/1282/. *A. stolonifera* L. — **П. побегообразующая**. Тм. VI-VIII. На влажных лугах, по берегам рек, у ключей. Сп.
- 6/1283/. *A. tenuis* Sibth. — **П. тонкая**. Тм. VI-VII. На лугах, лесных полянах, в разреженных лесах. Пв.
- 7/1284/. *A. vinealis* Schreb. — **П. виноградниковая**. Тм. VI-VII. На сухих лугах, но чаще на песчаных почвах. Сп.
- 8/1285/. *Alopecurus aequalis* Sobol. — **Лисохвост короткоостный**. Од., Дв. или Тм. VI-VII. На заболоченных лугах, по берегам водоемов. Из.
- 9/1286/. *A. arundinaceus* Pair. — **Л. тростниковидный**. Тм. V-VI. По сырым и солонцеватым лугам, травяным болотам, окраинам торфяных болот. Сп.
- 10/1287/. *A. geniculatus* L. — **Л. коленчатый**. Од., Дв. или Тм. VI-VII. По сырым и заболоченным лугам, берегам водоемов. Из.
- 11/1288/. *A. pratensis* L. — **Л. луговой**. Тм. V-VII. На пойменных лугах, окраинах болот, по берегам рек. Пв.
- 12/1289/. *Anisantha tectorum* (L.) Nevski. — **Неравноцветник кровельный**. Од. V-VI. В посевах, у дорог, на ж.-д. насыпях. Сп.
- 13/1290/. *Anthoxanthum odoratum* L. — **Пахучеколосник обыкновенный или Душистый колосок**. Тм. V-VI. На влажных лугах, сырых лесных полянах, по окраинам озер и болот. Из., но чаще в с. части области.
- 14/1291/. *Apera spica-venti* (L.) Beauv. — **Метлица полевая**. Од. или Дв. VII-VIII. На полях, мусорных местах. Сп.
- 15/1292/. *Arrhenatherum elatius* (L.) J. et Presl. — **Райграс высокий**. Тм. VI-VII. На лесных полянах и по опушкам дубовых лесов. Редко в рн. 6, 8.
- 16/1293/. *Avena fatua* L. — **Овес пустой или Овсяг.** Од. VI-VII. На полях, особенно в посевах овса. Пв.
- 17/1294/. *A. sativa* L. — **О. посевной**. Од. VI-VIII. Одичавшее у дорог и на ж.-д. станциях. Сп.
- 18/1295/. *A. sterilis* L. — **О. бесплодный**. Од. VI-VII. На полях и у дорог. Из. на ю. области.
- 19/1296/. *Beckmannia eruciformis* (L.) Host. — **Бекманния обыкновенная**. Тм. VI-VIII. На влажных лугах, в поймах рек. Из.
- 20/1297/. *Bromus arvensis* L. — **Костер полевой**. Од. или Дв. VI-VII. На полях, по мусорным местам, ж.-д. насыпям. Сп.

- 21/1298/. *B. japonicus* Thunb. — **К. японский**. Од. или Дв. V-VII. На карбонатных субстратах, по склонам коренного берега р. Волги, на ж.-д. насыпях. Из. в Пб.
- 22/1299/. *B. mollis* L. — **К. мягкий**. Од. или Дв. VI-VIII. На склонах коренных берегов рек, на полях, по обочинам дорог. Из.
- 23/1300/. *B. secalinus* L. — **К. ржаной**. Од. или Дв. VI-VIII. На полях, мусорных местах, ж.-д. насыпях. Сп.
- 24/1301/. *B. squarrosus* L. — **К. растопыренный**. Од. или Дв. V-VI. В степях на щебневатых почвах, на остепненных склонах, на ж.-д. насыпях. Сп.
- 25/1302/. *Bromopsis benekenii* (Lange) Holub. — **Кострец Бенекена**. Тм. VI-VIII. В тенистых лиственных, реже сосново-широколиственных лесах. Из.
- 26/1303/. *B. inermis* (Leys.) Holub. — **К. безостый**. Тм. VI-VIII. По пойменным лугам, лесным полянам, в луговых степях. Пв.
- 27/1304/. *B. riparia* (Rehm.) Holub. — **К. береговой**. Тм. V-VII. В луговых степях, в остепненных сосново-дубовых и вторичных дубовых лесах и на лесных полянах, на меловых склонах. Пв. в рн. Пб., в Лб. реже.
- 28/1305/. *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv. — **Коротконожка перистая**. Тм. VI-VII. В сосново-дубовых и вторичных дубовых лесах, березняках и осинниках. Пв.
- 29/1306/. *B. sylvaticum* (Huds.) Beauv. — **К. лесная**. Тм. VI-VIII. В сосново-широколиственных и широколиственных лесах. В рн. 8, 9, 12, 17. Из.
- 30/1307/. *Briza media* L. — **Трясунка средняя**. Тм. V-VIII. На сыроватых лугах и лесных полянах. В с. части Пб. Из. Р3. Близ ю. границы ареала.
- 31/1308/. *Calamagrostis arundinaceae* (L.) Roth. — **Вейник тростниковидный**. Тм. VI-VII. В основных, сосново-дубовых, вторичных дубовых и березовых лесах. Пв.
- 32/1309/. *C. canescens* (Web.) Roth. — **В. сероватый**. Тм. VI-VII. По болотам, сырым и заболоченным лесам. Сп.
- 33/1310/. *C. epigeios* (L.) Roth. — **В. наземный**. Тм. VI-VII. В разреженных сосянках на песчаной почве, на вырубках соснового леса, в песчаных степях, на сухих лесных полянах и остепненных склонах. Пв.
- 34/1311/. *C. neglecta* (Ehrh.) Gaertn. — **В. незамечаемый**. Тм. VI-VII. На сфагновых болотах. В рн. 14, 16. Р3. Близ ю. границы ареала.
- 35/1312/. *C. pseudophragmites* (Hall.f.) Koel. — **В. ложнотростниковый**. Тм. VI-VII. На аллювиальных отложениях по берегам Волги и Б.Черемшана. В рн. 3, 9. Р3. На с.-з. границе ареала.
- 36/1313/. *Catabrosella humilis* (Bieb.) Tzyel. — **Катаброзочка низкая**. Тм. IV-V. На солонцах. В рн. 8. Р2. Близ северо-западной границы ареала.
- 37/1314/. *Cleistogenes squarrosa* (Trin.) Keng. — **Змеевка растопыренная**. Тм. VI-VIII. В песчаных степях и на песчаных склонах. В рн. 12, 16, 17, 20. Из. Р3. На с.-з. границе ареала.
- 38/1315/. *Crypsis alopecuroides* (Pill, et Mitt.) Host ex Roem. — **Скрытница лисохвостовидная**. Од. VII-IX. На сырых солонцеватых местах. В рн. 8, 9. Р2.
- 39/1316/. *C. schoenoides* (L.) Lam. — **С. камышевидная**. Од. VI-IX. На сырых солонцеватых местах. В рн. 1, 9. Р2.

- 40/1317/. *Dactylis glomerata* L. — **Ежа сборная**. Тм. V-VIII. На лугах, лесных полянах, в осветленных лесах. Пв.
- 41/1318/. *Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv. — **Щучка дернистая или Луговик**. Тм. VI-VII. По сырым лугам, сырым лесам, берегам водоемов. Пв.
- 42/1319/. *Digitaria aegyptica* (Retz.) Willd. — **Росичка египетская**. Од. VII-IX. На песках, ж.-д. станциях, в г. Ульяновске. Из.
- 43/1320/. *D. ischaetum* (Schreb.) Muehl. — **Р. кровоостанавливающая**. Од. VII-IX. В песчаных степях, на приречных песках, иногда в сосняках. В рн. 3, 12, 16, 17, 18, Из.
- 44/1321/. *D. sanguinalis* (L.) Scop. — **Р. кроваво-красная**. Од. VI-IX. По пескам. На юге Пб. и в рн. 1. Из.
- 45/1322/. *Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv. — **Ежовник обыкновенный или Куринное просо**. Од. VI-IX. На полях, мусорных местах, по берегам рек. Пв.
- 46/1323/. *Elymus caninus* (L.) L. — **Пырейник собачий**. Тм. VII-VIII. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах. Сп.
- 47/1324/. *E. fibrosus* (Schrenk.) Tzvel. — **П. волокнистый**. Тм. VI-VII. На пойменных лугах, по берегам рек. В рн. 1, 6, 9, 15, 17. P2.
- 48/1325/. *E. novae-angliae* (Scrib.) Tzvel. — **П. новоанглийский, или бескорневидный пырей**. Тм. VII-VIII. Из. в качестве заносного и одичавшего по залежам и обочинам дорог в рн. 6.
- 49/1326/. *E. sibiricus* L. — **П. сибирский**. Тм. VI-VIII. Вдоль дорог. Из. Заносное.
- 50/1327/. *Elytrigia intermedia* (Host) Nevski. — **Пырей промежуточный**. Тм. VI-VII. На песчаных, каменисто-песчаных и глинистых склонах, на меловом рудляке. Сп., но по югу области чаще.
- 51/1328/. *E. lolioides* (Kar. et Kir.) Nevski. — **П. плевеловидный**. Тм. VI-VII. По степным склонам, на меловых обнажениях. На юге Пб. Сп.
- 52/1329/. *E. repens* (L.) Nevski. — **П. ползучий**. Тм. VI-VIII. На лугах, в степях, на меловых склонах, на полях, пустырях. Пв.
- 53/1330/. *E. trichophora* (Link) Nevski. — **П. волосоносный**. Тм. VI-VII. По степным склонам, на щербнистом и меловом субстрате. В рн. 6, 12. Из.
- 54/1331/. *Eremopyrum orientale* (L.) Jaub. et Spach. — **Мортук восточный**. Од. V-VI. В степях. Сп.
- 55/1332/. *E. triticeum* (Gaertn.) Nevski. — **М. пшеничный**. Од. IV-V. В степях. Преимущественно в ю. рн. Из.
- 56/1333/. *Eragrostis minor* Host. — **Полевичка малая**. Од. VII-IX. По пойменным и надпойменным пескам. Из.
- 57/1334/. *E. pilosa* (L.) Beauv. — **П. волосистая**. Од. VII-IX. На речных песчаных отмелях. Из.
- 58/1335/. *E. suaveolens* A.Beck. ex Claus. — **П. душистая**. Од. VII-IX. По берегам рек на песчаной почве. В рн. 1, 8, 9, 17. P4.
- 59/1336/. *Festuca altissima* All. — **Овсяница лесная**. Тм. VI-VII. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах. В рн. 1, 13. P1. Реликт.
- 60/1337/. *F. gigantea* (L.) Vill. — **О. гигантская**. Тм. VI-VII. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах. Из.

- 61/1338/. *F. polesica* Zapal. — **О. полесская**. Тм. V-VI. В песчаных степях, в разреженных сосняках на песчаной почве. В рн. Пб. Сп.
- 62/1339/. *F. pratensis* Huds. — **О. луговая**. Тм. VI. На пойменных лугах. Пв.
- 63/1340/. *F. pseudodalmatica* Krajina. — **О. ложнодалматская**. Тм. V-VI. В степях, на каменистых склонах. Из. в рн. 16.
- 64/1341/. *F. regeliana* Pavl. — **О. Регеля**. Тм. V-VI. По окраинам торфяных болот, сырым ивнякам, солончаковатым лугам. В рн. 6, 7, 13, 18. РЗ. Близ с. границы ареала.
- 65/1342/. *F. rupicola* Heuff. — **О. бороздчатая**. Тм. V-VI. На каменистых склонах, в степях. В рн. 20. Из.
- 66/1343/. *F. rubra* L. — **О. красная**. Тм. V-VI. По сыроватым пойменным лугам. Сп.
- 67/1344/. *F. valesiaca* Gaudin. — **О. валисская или Типчак**. Тм. V-VI. В степях, на остепненных лугах, в сухих остепненных лесах. Пв.
- 68/1345/. *F. wolgensis* P.Smirn. — **О. волжская**. Тм. VI. На меловых склонах. В рн. Пб. Р2.
- 69/1346/. *Glyceria arundinacea* Kunth. — **Манник тростниковидный**. Тм. VI-VII. По берегам водоемов. Из.
- 70/1347/. *G. flutians* (L.) R. Br. — **М. плавающий**. Тм. VI-VIII. По берегам водоемов, в мелкой воде. Пв.
- 71/1348/. *G. maxima* (C.Hartm.) Holmb. — **М. большой**. Тм. VI-VIII. По берегам водоемов, в мелкой воде, на болотах. Пв.
- 72/1349/. *G. plicata* Fries. — **М. складчатый**. Тм. VI-VIII. По берегам водоемов. Из.
- 73/1350/. *Helictotrichon desertorum* (Less.) Nevski. — **Овсец пустынный**. Тм. VI. В каменистых степях, на меловых обнажениях. В ю. рн. Пб. РЗ. Близ с. границы ареала.
- 74/1351/. *H. pubescens* (Huds.) Pilg. — **О. опушенный**. Тм. V-VI. По луговым степям, остепненным лугам, в разреженных остепненных лесах. Сп.
- 75/1352/. *H. schellianum* (Hack.) Kitag. — **О. Шелля**. Тм. VI-VII. На меловых и щебневатых почвах склонов. В рн. 13, 17. РЗ.
- 76/1353/. *Hierochloa odorata* (L.) Beauv. — **Зубровка душистая**. Тм. IV-VI. На песчаных почвах, сырых лугах. Из.
- 77/1354/. *H. repens* (Host) Beauv. — **З. ползучая**. Тм. IV-VI. В степях, на сухих лугах, по склонам. Из.
- 78/1355/. *Hordeum distichon* L. — **Ячмень двурядный**. Од. VI-VII. Как заносное в посевах других культур и одичавшее у дорог, на насыпях ж.-д. Из.
- 79/1356/. *H. jubatum* L. — **Я. гривастый**. Тм. или Од. VII-VIII. На ж.-д. станциях, у дорог, около жилья. Сп. Заносное.
- 80/1357/. *H. vulgare* L. — **Я. обыкновенный**. Од. VI-VII. Заносное в посевах других культур и одичавшее у дорог, на ж.-д. насыпях. Из.
- 81/1358/. *Koeleria cristata* (L.) Pers. — **Келерия гребенчатая или Тонконог**. Тм. V-VII. В черноземных степях. Сп.
- 82/1359/. *K. delavignei* Czern. ex Domin. — **К. Делявиня**. Тм. VI-VII. На лугах,

лесных полянах. Из.

83/1360/. *K. glauca* (Spreng.) DC. — **К. сизая**. Тм. VI-VII. В песчаных степях, на обнаженных песках, в разреженных сосняках на песках. Пв.

84/1361/. *K. sabuletorum* (Domin) Klok. — **К. песчаная**. Тм. VI-VII. В песчаных степях, по остепненным песчаным склонам. Сп.

85/1362/. *K. sclerophylla* P.Smirn. — **К. жестколистная**. Тм. VI-VII. На обнажениях мела, меловом рухляке. В рн. 13, 18, 20. P2. Эндем.

86/1363/. *Leersia oryzoides* (L.) Sw. — **Леерсия рисовидная**. Тм. VII-VIII. По берегам небольших речек. В рн. 7, 10, 19. P2.

87/1364/. *Leymus angustus* (Trin.) Pilg. — **Волоснец узколистный**. Тм. VII-VIII. На ж.-д. насыпях в рн. 15, 17. Из. Заносное.

88/1365/. *L. racemos* (Lam.) Tzvel. — **В. кистистый или гигантский**. Тм. VI-VIII. На песчаных террасах в поймах рек. В рн. 10, 17. P4. На с. границе ареала.

89/1366/. *L. ramosus* (Trin.) Tzvel. — **В. ветвистый**. Тм. VI-VII. На солонцеватых почвах. В рн. 9. P4. На с. границе ареала.

90/1367/. *Lolium perenne* L. — **Плевел многолетний или Райграс пастбищный**. Тм. V-IX. На лугах, у дорог, в парках. Из.

91/1368/. *L. temulentum* L. — **П. опьяняющий**. Од. VI-VIII. В посевах. В рн. 17. Редкое.

92/1369/. *Melica altissima* L. — **Перловник высокий**. Тм. VI-VII. По лесным полянам, травяным склонам. Из.

93/1370/. *M. nutans* L. — **П. поникий**. Тм. V-VI. В лиственных и сосново-лиственных лесах. Пв.

94/1371/. *M. transsilvanica* Schur. — **П. трансильванский**. Тм. VI-VII. По обле-сенным склонам и каменистым буграм. В рн. 6, 17, 18. P3.

95/1372/. *Milium effusum* L. — **Бор развесистый**. Тм. V-VI. В широколиственных и сосново-широколиственных лесах. Сп.

96/1373/. *Molinia coerulea* (L.) Moench. — **Молиния голубая**. Тм. VII-IX. По болотам, их окраинам, во влажных хвойных лесах. Сп., но на юге области реже.

97/1374/. *Nardus stricta* L. — **Белоус торчащий**. Тм. V-VI. На влажных лесных полянах, по долинам малых рек. В рн. 5, 10, 16. P2. На ю. границе ареала. Реликт.

98/1375/. *Panicum mileaceum* L. — **Просо посевное**. Од. VI-VII. Нередко встречается как заносное на полях, чаще пропашных культур, у дорог, на ж.-д. насыпях. Долго не удерживается и не натурализуется.

99/1376/. *P. miliaceum* subsp. *ruderales* (Kitag.) Tzvel. — **Просо сорно-полевое**. Од. VI-VII. В посевах проса и в особенности пропашных культур, у дорог, на мусорных местах. Пв. Заносное.

100/1377/. *Phleum nodosum* L. — **Тимофеевка узловатая**. Тм. VI-VII. На травяных склонах, лесных полянах, сухих лугах. Из.

101/1378/. *Ph. phleoides* (L.) Karst. — **Т. степная**. Тм. VI-VII. В степях, по остепненным склонам. Пв.

102/1379/. *Ph. pratense* L. — **Т. луговая**. Тм. VI-VII. На лугах, лесных полянах. Пв.

- 103/1380/. *Phalaroides arundinaceae* (L.) Rausc-her. — **Двуклосточник тростниковидный**. Тм. VI-VII. На влажных лугах, по берегам водоемов. Сп.
- 104/1381/. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. — **Тростник обыкновенный**. Тм. VII-IX. По берегам водоемов, в мелкой воде, на сплавинах озер, по болотам и болотистым лугам, в заболоченных лесах. Пв.
- 105/1382/. *Poa angustifolia* L. — **Мятлик узколистный**. Тм. V-VII. В степях, на степных склонах, в остепненных лесах. Пв.
- 106/1383/. *P. annua* L. — **М. однолетний**. Од. или Дв., реже Тм. У дорог, в садах, на пустырях. Пв.
- 107/1384/. *P. bulbosa* L. — **М. луковичный**. Тм. IV-VI. В степях и по степным склонам. Сп.
- 108/1385/. *P. compressa* L. — **М. плюснугый**. Тм. V-VIII. По остепненным и меловым склонам, в каменистых степях. Сп.
- 109/1386/. *P. nemoralis* L. — **М. дубравный**. Тм. VI-VIII. В лесах. Пв.
- 110/1387/. *P. palustris* L. — **М. болотный**. Тм. VI-VII. По болотам, берегам водоемов, на сырых лугах, в сырых лесах. Пв.
- 111/1388/. *P. pratensis* L. — **М. луговой**. Тм. VI-VIII. На лугах и лесных полянах. Пв.
- 112/1389/. *P. remota* Forsell. — **М. расставленный**. Тм, VI-VII. По болотистым и пойменным лесам. В рн. 1, 17, 18. Из. P4.
- 113/1390/. *P. stepposa* (Kryl.) Roshev. — **М. степной**. Тм. VI-VII. В степях. Из., на юге Пб. чаще.
- 114/1391/. *P. trivialis* L. — **М. обыкновенный**. Тм. VI-VIII. На влажных лугах, лесных полянах. Пв.
- 115/1392/. *Psathyrostachys juncea* (Fisch.) Nevski. — **Ломкоколосник ситниковый**. Тм. VI-VII. На мелах. В рн. 6, 18. P2. На с.-з. границе ареала.
- 116/1393/. *Puccinella distans* (Jacq.) Parl. — **Бескильница расставленная**. Тм. VI-VIII. На солонцах. Из. P3.
- 117/1394/. *P. tenuissima* Litv. ex V.Krecz. — **Б. тончайшая**. Тм. V-VI. На солончаковых лугах. В рн. 7, 9, 17. Из. P3. Близ з. границы ареала.
- 118/1395/. *Scolochloa festucaceae* (Wilbl.) Link. — **Тростянка овсяничная**. Тм. VI-VII. По окраинам болот и водоемов. Из.
- 119/1396/. *Secale cereale* L. — **Рожь посевная**. Од. VI. Нередко как заносное у дорог, в посевах других культур. Долго не удерживается и не натурализуется.
- 120/1397/. *S. sylvestre* Host. — **Р. дикая**. Од. V-VI. На надпойменных песках и в песчаных степях. Из. на юге Пб.
- 121/1398/. *Setaria glauca* (L.) Beauv. — **Щетинник сизый**. Од. VII-IX. На полях, песках, по берегам рек. Пв.
- 122/1399/. *S. italica* (L.) Beauv. — **Щ. итальянский**. Од. VI-IX. В посевах. В рн. 17, 18. Из. Заносное.
- 123/1400/. *S. pycnocola* (Steud.) Henrardex Nakai. — **Щ. большой**. Од. VII-X. На полях. В рн. 7, порою обильно. Заносное. Описан из Японии.
- 124/1401/. *S. viridis* (L.) Beauv. — **Щ. зеленый**. Од. VII-IX. На полях, мусорных местах, по берегам рек. Пв.

- 125/1402/. *S. weinmannii* Roem. et Schult. — **Щ. Вайнмана**. Од. VII-IX. На полях, ж.-д. станциях. Сп. в рн. 6, 7, но порою обильно. Заносное.
- 126/1403/. *Sorgum sudanense* (Piper.) Stapf. — **Сорго суданское или Суданская трава**. Од. VII-IX. Культивируется и заносное у дорог. Из.
- 127/1404/. *Stipa borysthena* Klok. ex Procul. — **Ковыль днепровский**. Тм. V-VI. На песках. В рн. 17. P4.
- 128/1405/. *S. capillata* L. — **К. волосатик или Тырса**. Тм. VI-VII. В степях. Сп.
- 129/1406/. *S. dasyphylla* (Lindem.) Trautv. — **К. опушеннолистный**. Тм. V-VI. На песчаных и песчано-каменистых почвах. В рн. 17, 18. P3. 130/1407/. *S. korshinskii* Roshev. — **К. Коржинского**. Тм. V-VI. На каменистых склонах и в степях. В рн. 16, 17. P1. На з. границе ареала. Эндем.
- 131/1408/. *S. lessingiana* Trin. et Rupr. — **К. Лессинга**. Тм. V-VI. В степях, по степным склонам с карбонатной и щебневатой почвой. Из. в рн. Пб. P2.
- 132/1409/. *S. pennata* L. — **К. перистый**. Тм. V-VI. В степях, в разреженных остепненных лесах и лесных полянах. Сп. P3.
- 133/1410/. *S. pulcherrima* C.Koch. — **К. красивейший**. Тм. V-VI. На склонах с каменисто-щебневатыми почвами, на меловом рухляке. На юге Пб. P4.
- 134/1411/. *S. sareptana* A.Beck. — **К. сарептский**. Тм. V-VI. В степях на черноземах и на склонах с перегнойно-карбонатными почвами. Из. в рн. Пб. P2. На с.-з. границе ареала.
- 135/1412/. *S. tirsia* Stev. — **К. узколистный**. Тм. VI-VII. По опушкам дубовых лесов, на склонах балок у зарослей степных кустарников. На юге Пб. P2.
- 136/1413/. *S. zaleskii* Wilensky. — **К. Залесского**. Тм. V-VI. По песчаным степям. В рн. 17, 18, 20. P4.
- 137/1414/. *Trisetum sibiricum* Rupr. — **Трищитинник сибирский**. Тм. VI-VII. По сыроватым и болотистым лугам, сырým лесным полянам. P0.
- 138/1415/. *Triticum aestivum* L. — **Пшеница мягкая или летняя**. Од. VI-VII. Заносное у дорог, на ж.-д. станциях. Сп.
- 139/1416/. *T. dicoccum* Schrank. — **П. двузернянка или Полба волжская**. Од. VI-VII. Прежде культивировалась на Средней Волге, а сейчас нет. В настоящее время используется в селекции. Антропогенный реликт.
- 140/1417/. *Zea mays* L. — **Кукуруза обыкновенная**. Од. VII-VIII. Встречается у дорог, на ж.-д. станциях и пустырях, но не дичает.

Сем. 116. Araceae — Ароидные

- 1/1418/. *Acorus calamus* L. — **Аир обыкновенный или Аирный корень**. Тм. V. По берегам рек, озер, в мелкой воде, на болотах. В рн. 3, 4, 6, 8, 13, 17. P3. Заносное.
- 2/1419/. *Calla palustris* L. — **Белокрыльник болотный**. Тм. V-VI. По лесным и травяным болотам, топким берегам рек и озер. Из. P3.

Сем. 117. Lemnaceae — Рясковые

- 1/1420/. *Lemna minor* L. — **Ряска малая**. Тм. V-VI. В озерах, прудах, речных заводях, на болотах. Пв.
2/1421/. *L. trisulca* L. — **Р. трехдольная**. Тм. VI-VII. В озерах, прудах, речных заводях. Пв.
3/1422/. *Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid. — **Многокоренник обыкновенный**. Тм. V-VI. В прудах, озерах, речных заводях. Сп.

Сем. 118. Sparganiaceae — Ежеголовниковые

- 1/1423/. *Sparganium angustifolium* Mich. — **Ежеголовник узколистный**. Тм. VII-VIII. По берегам озер и топким болотам. Редко.
2/1424/. *S. emersum* Rehm. — **Е. всплывающий**. Тм. VI-IX. По берегам рек, озер, болотам. Сп.
3/1425/. *S. erectum* L. — **Е. прямой**. Тм. VI-VIII. По топким берегам водоемов, на болотах. Пв.
4/1426/. *S. minimum* Wallr. — **Е. малый**. Тм. VI-VII. На мелкой воде озер. Из.

Сем. 119. Typhaceae — Рогозовые

- 1/1427/. *Typha angustifolia* L. — **Рогоз узколистный**. Тм. VI-VII. По болотам, окраинам озер, берегам рек. Сп.
2/1428/. *T. latifolia* L. — **Р. широколистный**. Тм. VI-VII. По болотам, окраинам озер, берегам рек. Пв.
Из перечисленных 1428 видов высших сосудистых растений Ульяновской области 40 видов находятся под прямой угрозой исчезновения, они отмечены в тексте знаком P0.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ВНОВЬ НАЙДЕННЫХ ВИДОВ

1. *Sisymbrium polymorphum* (Murr.) Roth. – **Гулявник изменчивый**. Сем. Brassicaceae – Крестоцветные. Тм. V-VI. В степях на карбонатно-черноземных почвах, на меловых склонах. 13 – урочище Шиловская лесостепь, 17 – урочище Суруловская лесостепь, 18 – урочище Аш-Тала близ с.Средниково, восточнее ж. д. ст. Рябина, 16 – урочище Акуловская степь и к востоку с. Варваровка. Из. Коллектор А. Масленников.
2. *Juniperus sabina* L. – **Можжевельник казацкий**. Сем. Cupressaceae – Кипарисовые. К. IV-V. На меловых склонах. 18 – к востоку от ж. д. ст. Рябина. Единично. Коллектор А.Масленников.
3. *Serratula gmelinii* Tausch. – **Серпуха Гмелина**. Сем. Asteraceae – Сложноцветные. Тм. VI. На лесных полянах и остепненных склонах. 6, 7, 9, 16. Коллекторы Н. Раков и А. Масленников.
4. *Bossia hyssopifolia* (Pall.) O.Kuntze. – **Бассия иссополистная**. Сем. Chenopodiaceae – Маревые. Од. VIII-IX. Солончак. К востоку от ж.-д. ст. Рябина. Из. Коллектор А. Масленников.
5. *Serratula tanaitica* P.Smirn. – **Серпуха донская**. Сем. Asteraceae – Сложноцветные. Тм. V. В разнотравно-ковыльных степях на черноземно-карбонатных почвах меловых склонов. 18 – урочище Аш-Тала и гора Вотлама. Из. Коллектор А. Масленников.
6. *Anisantha sterillis* (L.) Nevski. – **Неравноцветник бесплодный**. Сем. Poaceae – Злаки. Од. V-VI. Обочина дороги на краю Карасевского болота, г. Ульяновск. Обильно. Заносное. Коллектор Н. Раков.
7. *Helianthus subcanescens* E. E. Wats. – **Подсолнечник сероватый**. Сем. Asteraceae – Сложноцветные. Тм. IX-X. На пустырях, близ дачных участков, по обочинам дорог. Порою обильно. Заносное. Коллектор Н. Раков.
8. *Ferula caspica* Bieb. – **Ферула каспийская**. Сем. Apiaceae – Зонтичные. Тм. VI-VII. На песчано-карбонатных почвах у основания меловых холмов. 18 – близ ж.-д. ст. Рябина. Из. Коллектор А. Масленников.
9. *Epilobium adenocaulon* Hausskn. – **Кипрей железистостебельный**. Сем. Onagraceae – Кипрейные. Тм. VII-IX. Центр г. Ульяновска близ Мемориала и Карамзинского сквера. Сп., порою обильно. Заносное. Коллектор Н. Раков.
10. *E. rubescens* Rydb. – **К. краснеющий**. Тм. VI-VIII. По берегам Куйбышевского водохранилища в черте г. Ульяновска. Сп. Заносное. Коллектор Н. Раков.
11. *Hippophae rhamnoides* L. – **Облепиха крушиновидная**. Сем. Elaeagnaceae – Лоховые. К. IV-V. На песках вдоль дамбы на Н. Террасе г. Ульяновска. Одицалое. Коллектор Н. Раков.
12. *Linaria incompleta* Kuprian. – **Льянка неполная**. Сем. Scrophulariaceae – Норичниковые. Тм. Конец V-VI. По склонам. 13 – к северу от с. Шиловка. Сп. Коллекторы В. Благовещенский и Н. Раков.
13. *Festuca cretacea* T. Pop. et Proskor. – **Овсяница меловая**. Сем. Poaceae – Злаки. Тм. VI. На мелах Поволжской горы к северу от с. Шиловка. Об. Коллектор Н. Раков. Эндем.

14. *Bidens radiata Thuill.* – **Черда лучистая.** Сем. Asteraceae – Сложноцветные. Од. VII-VIII. По левому берегу Куйбышевского водохранилища между г. Ульяновском и с. Архангельское. Изредка. Коллектор Н. Раков. До этого отмечалась Р. Е. Левиной и С. В. Голицыным /1953/ во флоре г. Ульяновска и его окрестностей, но позднее не находилась долгое время.
15. *Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.* – **Вишня войлочная.** Сем. Rosaceae – Розоцветные. К. У. В разреженных лесах и сосновых посадках, по обочинам дорог близ дачных участков. Единично. Одичалое. Коллектор Н. Раков.
16. *Prunus cerasifera Ehrh.* – **Слива вишневая.** Сем. Rosaceae – Розоцветные. К. У. На пустыре в Засвияжском р-не г. Ульяновска. Единично. Заносное. Коллектор Н. Раков.
17. *Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek* – **Кардаминописис многолистный.** Сем. Brassicaceae – Крестоцветные. Од. V-VII. На песках по опушкам и дорогам соснового леса, близ р. п. Мулловка и с. Лебяжье Мелекесского р-на. Коллектор Н. Раков.
18. *Arabis sagitata (Bertol.) DC.* – **Резуха стреловидная.** Сем. Brassicaceae – Крестоцветные. Од. V-VI. Склон к Волге в окрестностях г. Ульяновска. Сп. Коллектор В. Благовещенский.
19. *Cardamine dentata Schult.* – **Сердечник зубчатый.** Сем. Brassicaceae – Крестоцветные. Тм. V-VI. На влажных лугах, близ с. Лебяжье Мелекесского р-на и Поповка Чердаклинского р-на. Коллектор Н. Раков.
20. *Erysimum durum J. et C.Presl.* – **Желтушник твердый.** Сем. Brassicaceae – Крестоцветные. Од. V-VII. На меловых склонах, с. Коржевка Инзенского р-на, с. Кр. Бор Вешкаймского р-на. Коллектор В. Благовещенский.
21. *Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C.Presl) Reichenb.* – **Сурепка дуговидная.** Сем. Brassicaceae – Крестоцветные. Од. V-VI. На лугах, лесных полянах. Сп., с. Городище Инзенского р-на, с. Арбузовка Цильнинского р-на. Коллектор Н. Раков.
22. *Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch.* – **Рдест туполистный.** Сем. Potamogetonaceae – Рдестовые. Тм. VII-VIII. Оз. Каракуль у с. Ст. Бесовка Новомалыклинского р-на. Коллектор Н. Раков.
23. *Juncus nastanthus V.Krecz, et Gontsch.* – **Ситник скученно-цветковый.** Сем. Juncaceae – Ситниковые. Од. V-VIII. Прибрежные пески р. Суры в окрестностях р. п. Сурское. Коллектор Н. Раков.

ЛИТЕРАТУРА

Благовещенский В. В. Итоги изучения флоры и растительности Ульяновской области за 50 лет Советской власти.// Ученые записки Ульяновского пед. ин-та. Сер. биол., т. 27, вып. 7. 1973. С. 3-21.

Благовещенский В. В., Пчелкин Ю. А., Раков Н. С. Растительный мир.// Природные условия Ульяновской области. Издательство Казанского ун-та. 1978. С. 227-255.

Благовещенский В. В., Пчелкин Ю. А., Раков Н. С. Новые сведения о флоре Ульяновской области.// Флора и растительность Среднею Поволжья. Межвузовский сборник. Ульяновск, 1979. С. 72-78.

Благовещенский В. В., Пчелкин Ю. А., Раков Н. С., Старикова В. В., Шустов В. С. Определитель растений Среднего Поволжья. Л.: Наука. 1984. – 392 с.

Благовещенский В. В., Раков Н. С., Шустов В. С. Редкие и исчезающие растения Ульяновской области. Саратов.: Приволжское книжное издательство. 1989. 96 с.

Левина Р. Е. и Голицын С. В. Флора города Ульяновска и его окрестностей и возможность ее использования.// Краеведческие записки. Вып. 1. Ульяновск. С. 87-101.

Михеев А. Д. Флора и растительность Новоспасского и Радищевского районов Ульяновской области. Автореферат и рукопись диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук с приложением "Конспекта флоры Новоспасского и Радищевского районов". 1964. М.

Михеев А. Д. Дополнение к флоре Ульяновской области.// Ботанический журнал. 1968. Т. 53, № 5. С. 679-682.

Новиков В. С., Октябрева Н. Б., Силаева Т. Б., Тихомиров В. Н. Новые виды флоры Мордовии. // Научные доклады высшей школы. Биологические науки. 1989. № 4. С. 55-61. /Заметка о находке колломии линейной в Ульяновской области/

Пискунов В. Н. Ценные растения торфяников Ульяновскою Предволжья, вопросы их рационального использования и охраны.//Растительные ресурсы Южного Урала и Среднего Поволжья и вопросы их рационального использования. Уфа, 1974. С. 13-14.

Пчелкин Ю. А. и Раков Н. С. О флористической изученности Ульяновской области и новые данные о флоре этого региона.// Научные доклады высшей школы. Биологические науки. 1972, № 1. С. 67-70.

Пчелкин Ю. А. К анализу степной флоры Ульяновской области.//Ученые записки Ульяновского педагогического ин-та. Сер. биол., т. 27, вып.7, 1973. С. 37-45.

Пчелкин Ю. А. К анализу флоры Ульяновской области.// Ученые записки Ульяновского педш огического ин-та. Сер. биол., т. 27, вып. 7. 1973. С. 45-53.

Пчелкин Ю. А. Ботанико-географический анализ флоры Ульяновской области. Автореферат и рукопись диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. 1974. Саратов.

Пчелкин Ю. А. и Раков Н. С. Бореально- хвойный элемент во флоре Ульяновской области.// Ботанический журнал. 1973. Т. 58, № 6. С. 885-890.

Пчелкин Ю. А. Гипо-аркто-бореальный элемент во флоре Ульяновской области. // Научные доклады высшей школы. Биологические науки. 1974. № 4. С. 80-83.

Пчелкин Ю. А. Редкие и исчезающие растения во флоре Ульяновской области. // Растительные ресурсы Южного Урала и СПоволреднего жья и вопрос их рационального использования. 1974. Уфа. С. 9-10.

Пчелкин Ю. А., Раков Н. С. Редкие красивоцветущие растения флоры Ульяновской области. Ульяновск. 1974. 31 с.

Раков И. С. Цветет элодея.// Природа. 1971, № 1. С. 90.

Раков Н. С., Пчелкин Ю. А. Флористические находки в Ульяновской области.// Ботанический журнал. 1980. Т. 65, № 5. С. 711-713.

Раков Н. С. О нахождении *Salvia pratensis* (Lamiaceae) в Заволжье.// Ботанический журнал. 1987, Т. 72, № 9. С. 1207-1209.

Раков Н. С. О некоторых адвентивных растениях Ульяновской области.// Ботанический журнал. 1988. Т. 73, № 4. С. 603-604.

Раков Н. С. Адвентивные растения Ульяновской области.// Проблемы изучения адвентивной флоры СССР./Материалы совещания 1-3 февраля 1989г./ М.: Наука, 1989. С. 53-55.

Раков Н.С. О некоторых более редких и новых для флоры Ульяновского Заволжья видах растений.// Ботанический журнал. 1969. Т. 54, № 12. С. 1990-1991.

Раков Н. С., Цвелев Н. Н. Новый вид рода *Linaria* Mill. (Scrophulariaceae) из Ульяновской области.// Новости систематики высших растений. 1993. Т. 29. С. 119-120.

Саксонов С. В., Раков Н. С. *Anemonoides x korzhinsky* (Ranunculaceae) – новый гибридогенный вид из Среднего Поволжья.// Ботанический журнал. 1992. Т. 77, № 1. С. 111-113. Ценные ботанические объекты Ульяновской области. Сборник. Ульяновск, 1986. 96 с.

В. В. Благовещенский, Н. С. Раков

КОНСПЕКТ ФЛОРЫ ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

Из серии "Природа Ульяновской области"
Выпуск 2

Сдано в набор 30.06.94. Подписано в печать
Формат 60x84 1/16. Бумага тип №1. Гарнитура Тип Таймс. Офсет.
Усл. печ. л. 6,04. Уч изд. л. 7,9.
Тираж 1000. Заказ № 1535.

Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова
432700, г. Ульяновск, ул. Л Толстого, 42

ГП облтипография "Печатный двор"
432061, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 13.

ПРИМЕЧАНИЕ: Красным цветом отмечены виды не вошедшие в конспект флоры 1994 г.