

R

$\frac{83}{50}$

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~



Училища
Библиотеки
3-го полка
Александров.

С	3
І	27.

$\frac{3}{27}$

К-28
P 83
50

№ Соч. 2101.

№ Том. 2



№ Ф. К. А. Ф. 16.

№ Полк. 7.

200.
лет. 5 л. 123
ш. не расф. ✓

2101 - 7502

16 - 1.

X

28

N15



2014079225

R 83 / 50
ИЗОБРАЖЕНІЯ

и

ОПИСАНІЯ

ЖИВОТНЫХЪ

РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ,

ИЗДАВАЕМЫЯ

ИВАНОМЪ ДВИГУБСКИМЪ.

. *Optamus*
unum de patriis videre focus,
Nescio, qua natale solum dulcedine captos
Ducit

ОVID. Epist. III ex Ponto 34—36.

МОСКВА.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ.

1 8 1 7.



РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА

7551-0

Печаташь позволяешся, съ предсшавле-
нiемъ 5 экземпляровъ въ Цензурный Ко-
мишешъ для казенныхъ мѣспъ. Москва,
Юня 12 дня, 1817. О. П., Надворный
Совѣтникъ и Кавалеръ Левъ Цѣвѣасевъ.




107130


Цѣвѣасевъ

ИЗОБРАЖЕНІЯ
и
ОПИСАНІЯ
ЖИВОТНЫХЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.



№ 5.







Equus Hemionus. L. Дикоземей.

ДЖИГГИТЕЙ.

Equus Hemionus, unicolor lutescens; cauda extremitate pilosa, stria dorſi fusca. *FISCH. Zoognof. Vol. III. p. 488. ДВИГУВ. Краткое описаніе всѣхъ животныхъ члвчороног. и килловъ Россійск. стр. 81.*

Equus Hemionus, unicolor, pedibus solidungulis, cauda calva extremitate pilosa, cruce nulla. *LINN.-GMEL. Syst. Nat. T. 1. p. 210.*

Wilde Halbefel Dschiggetäi. *PALLAS neue nordische Beyträge. B. II. p. 1.*

Czigitai. *SONNINI Edit. Buff. T. 29. p. 346.*

Мессершмилъ, ѣздившій въ Сибирь въ 1720 — 26 годахъ по повелѣнію Императора ПЕТРА Великаго для изслѣдыванія естественныхъ произведеній сей обширной страны, первый далъ понятіе о существованіи особой

жороды лошадей. Спусти двадцать лѣтъ послѣ него, старшій Гмелинъ имѣлъ также случай видѣть Джиггигей въ Иркутскѣ. Но никто не описалъ его такъ порядочно, какъ неупоминимый Академикъ Палласъ въ 1772 году.

Джиггигей водится по опдаленнымъ степямъ Мунгальскимъ, особливо же въ безводной странѣ Гоби великими стадами. Въ Россійскихъ владѣнiяхъ въ прежнія времена лошади сіи водились въ большемъ количествѣ, между рѣками Онономъ и аргуномъ, нежели теперь. Ибо съ тѣхъ поръ, какъ по Россійской границѣ караулы въ большемъ числѣ разсѣялены, рѣдко примѣчающася стада изъ двадцати и тридцати кобылъ, предводимыхъ старымъ жеребцомъ. Теперь попадаются только по одиночкѣ забѣгшіе отъ шабуна опбиные молодые жеребчики, или кобылки, съ Мунгальской стороны забѣгающія.

Джиггигей занимаетъ средину между лошадей и осломъ; онъ гораздо красивѣе осла, и величиною не множно

больше мѣлкихъ лошадей, или съ лошака, но только красивѣе. Голова его больше лошадиной и съ боковъ болѣе сжата; лобъ плоской, губы полстыя и усажены коропкими жесткими волосами; зубовъ во рту только 34; но они во всемъ почти подобны лошадинымъ. Глаза посредственной величины; зрачокъ продолговатой, а радужная перепонка темносѣрая. Уши длиннѣе лошадиныхъ, но меньше ослиныхъ и торчатъ къверху. Шея ширѣе и круглѣе лошадиной. Грива коропенькая какъ у жеребенковъ, и опѣ запылка простирается до плечей. Грудь и переднія лопатки не такъ мясисты, какъ у лошадей; хребетъ плоской, ровной, а крестецъ выпуклой. Ноги высокія и тонкія; на внутренней сторонѣ переднихъ ляшекъ примѣчается черное голое пятно. Копыта маленькія очень твердыя, цвѣтомъ черныя. Хвостъ похожъ на коровій, и только на концѣ обросъ длинными волосами.

Шерсть на Джиггисѣ коропкая, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ завилась

кружками. Морда бѣлованая, а прочая часть головы, шея и шоловище буланья. Задняя сторона переднихъ ногъ, брюхо, внутренняя сторона заднихъ ногъ и задъ бѣлованы. Грива черновата съ желносѣрыми кончиками; ошъ гривы до самаго почти конца хвоста идешъ вдоль спины узенькая черная полоса; бока хвоста подобны цвѣшомъ шоловищу, а самой конецъ черенъ. Зимую шерсть на сихъ животныхъ бываетъ длиннѣе, косматая и цвѣшомъ свѣплѣе.

Джиггишей любятъ ровныя сухія степи и долины, поросшія густою травою. Говорятъ, что они рѣдко приходятъ къ водѣ и долго могутъ прожить не пивши, каковое свойство весьма для нихъ нужно: ибо они живутъ въ пустыняхъ, гдѣ часто на разстояніи ста верстъ не лзя найти воды. Джиггишей носятъ голову всегда поднявши вверхъ, а когда бѣжитъ, то скидываетъ ее еще выше, чтобы видѣть позади себя. Онъ очень бояливъ и оспороженъ. О скорости его

всѣ жители шѣхъ мѣстѣ , гдѣ онѣ водились , единогласно увѣряютъ , что никакая лошадь , какова бы легка она ни была , Джиггитыя догнашь не можешь . И потому никоимъ образомъ заспрылишь его не можно , развѣ зашедши противъ вѣтру , лежашь до шѣхъ порѣ , пока онѣ такъ близко подойдешь , что пуля изъ ружья достанешь его можешь .

Такая беспрога его въ бѣгу могла бы доставить весьма большія выгоды въ домоводствѣ , если бы можно было его сдѣлать ручнымъ ; но Джиггитыя чрезвычайно дикъ , и всѣ попытки Мунгаловѣ и Тунгузовѣ сдѣлать его ручнымъ , обучить и разводить оставались до сихъ порѣ тщетными . Однако же *Г. Палласъ* думаетъ , что если взять надлежащія предосторожности съ самыми молодыми жеребятами , которыхъ надобно стараться достать вскорѣ послѣ ихъ рожденія , то не лзя сказать , чтобы такая попытка была вовсе бесполезна и безнадежна . Ес-

ли бы, говоритъ онъ (*) „на сіе вы-
 „сочайшее повелѣніе послѣдовало, то бы
 „оное легко могло учинишься въ нѣ-
 „сколько лѣтъ въ степи межъ Тареемъ
 „и Далай - Нооромъ Тундусами по гра-
 „ницѣ споящими.“ Мнѣніе споль вели-
 каго испытателя природы заслужи-
 ваешъ всякое уваженіе. Опытъ можно
 бы учинишь въ Дауріи въ загорожен-
 ныхъ звѣринцахъ, чего сдѣлашь кочу-
 ющіе народы не въ состояніи (**).
 Чпо кочующіе народы не могли до
 сихъ поръ сдѣлашь ручными Джигги-
 шеевъ, изъ сего не лзя заключишь,
 чпо ихъ шочно не можно сдѣлашь руч-
 ными. Такъ на пр. Киргизцы, по учи-
 неніи многихъ опытовъ сдѣлашь руч-
 ными онагровъ, или дикихъ ословъ,
 въ степяхъ ихъ находящихся, заклю-

(*) *Палласа* путешествіе по разнымъ про-
 винціямъ Россійскаго Государства. Часть. III.
 половина 2я, стр. 302.

(**) *Neue nordische Beyträge zur physicalischen
 und geographischen Erd und Volksbeschrei-
 bung, Naturgeschichte und Oekonomie.* В.
 II. р. 7.

чили, что онагровъ ручными сдѣлать никакъ не можно, между нѣмъ какъ у Восточныхъ народовъ, живущихъ поспоянными селеніями, искусство сіе давно извѣстно было, и они большую ошъ того получали пользу по свидѣтельству *Варрона*, *Колумеллы* и *Плинія* (*). *Зебра* Африканская также почиталась звѣремъ неукрошимымъ, и котораго не можно сдѣлать ручнымъ; но по опытамъ, сдѣланнымъ въ Лиссабонъ и Парижъ, совсѣмъ прошивное оказалось: ее можно запрягать въ повозки и ѣздить на ней верхомъ. До сихъ поръ кочующіе народы бьютъ *Джиггисеевъ* шолько для ихъ мяса, которое почитаютъ весьма вкуснымъ, а кожу выдѣлываютъ для обуви. Но ловля ихъ весьма затруднительна, ибо *Джиггисей* имѣютъ очень острое зрѣніе, сильное обоняніе и чрезвычайно хорошо слышатъ; почему за нѣсколько верстъ охотниковъ къ себѣ не подпускаютъ, выклю-

(*) Neue nordische Beyträge. В. II. р. 8.

чая бурное и пасмурное время, въ которое они, по словамъ Мунгаловъ, бывающъ какъ бы шальные, и не могутъ ни видѣть хорошо, ни обонять. Всего лучше удаеися заспрѣливать Джигтисеевъ изъ хорошихъ ружей, застрѣвши близъ ручьевъ или другихъ мѣстъ, куда они ходятъ пить.


Жеребцы, имѣющіе больше или меньше значительное число кобылъ, сперегущъ ихъ безпрестанно, и если что-нибудь издали необыкновенное увидящъ, то тотчасъ спороною приближаются къ тому мѣсту. Иногда завидѣвши подкрадывающагося спрѣлка, раза по два и по три въ ту сторону бѣгающъ, при каковомъ развѣдываніи иногда бывающъ заспрѣливаемы, и тогда все стадо кобылъ разбѣгается въ разныя спороны. Но если жеребецъ примѣтитъ явную опасность, то собравъ свое стадо, тотчасъ пускается бѣжать. Молодые жеребенки, прогнанные отъ стада старыхъ кобылъ, обыкновенно слѣдующъ за ними издали, пока нѣсколько молодыхъ кобылъ, или

и спарыхъ , опсшавшихъ опъ какого
нибудъ спада, къ нимъ приспануть, и
соспавяиъ новое спадо.

Джиггишеи бѣгающа въ половинѣ
и концѣ Августа; а кобылы жере-
бятся на слѣдующую весну. Онѣ обы-
кновенно жеребятся однимъ жеребен-
комъ.

Жеребцы кусаются между собою ,
но иногда и бьются задними ногами ,
какъ по примѣчено на одномъ моло-
домъ жеребенкѣ , копорой былъ пой-
манъ и жилъ у козака , однакожъ
очень скоро умеръ.







Мышь аелланайи. Фрушиковая Соня.

СОНЯ ОРЪШНИКОВАЯ.

Myoxus avellanarius, corpore rufo, gula albicante, pollicibus posticis muticis. FISCH. Zoognos. Vol. III. p. 40. ДВИГУБСК. Крапк. описаніе животи. четверон. Россійск. стр. 41.

Myoxus muscardinus. LINN. - GMEL. Syst. Nat. T. I. p. 156.

Kleine Haselmaus. BECHSTEIN gemeinnütz. Naturgesch. Deutschlands. T. I. p. 516.

Muscardin. BUFF. Hist. nat. T. VIII. p. 193.

Dormouse. PENN. Syn. Quadr. p. 291.

Сіе красивое живошное, извѣстное въ Украинѣ и другихъ смежныхъ съ нею мѣстахъ подъ именемъ *Мушловки*, водится въ Южной и умѣренной Россіи, и очень рѣдко въ Сѣверной. Люби-

мое жилище сони сушь лѣса, сады и кустарники, особливо орѣховые.


Соня сія немножко побольше домашней мыши; голова у ней толстая, рыло шупое, съ длинными усами. Глаза большіе, черные. Уши короткія, кругловатыя, очень шовкія, внутри и снаружи покрытыя коронкою шерстью. Туловище толстое; ноги коротенькія, пяшипалыя, снабденныя маленькими когтями, выключая большой палецъ на заднихъ лапкахъ, на которомъ когтя нѣтъ. Хвостъ толстой. Шерсть на семь звѣркѣ свѣлорыжая или шемнорыжая, на брюхѣ свѣложелтая, а на глоткѣ бѣлая. Хвостъ покрытъ густою рыжею шерстью съ нѣсколькими бѣлыми на концѣ волосами.

Звѣрокъ сей довольно красивъ и забавенъ; онъ бѣгаетъ по деревьямъ легко и скоро, наподобіе бѣлокъ; живетъ около 6 лѣтъ. Зиму проводитъ во снѣ, въ каменныхъ ущелияхъ или въ норахъ подъ корнями деревьевъ, куда сперва наноситъ моху и лишай.

Питаются наиболѣе орѣхами, которыя умѣють очень искусно раскусывать. Ёшь также сѣмена другихъ деревьевъ, почки ихъ, зерна разныхъ плодовъ и ягодъ. Соня, сдѣлавшись ручною, ёшь и хлѣбъ, ипорой кладеть въ ротъ передними лапками, какъ бѣлка.

Самка дѣлаеть довольно большое и красивое гнѣздо между густыми вѣтвями орѣховыхъ кустарниковъ; оно со всѣхъ сторонъ закрыто, и уславлено лишьями, правою, мохомъ и шерстью, и на одной только споронѣ имѣеть боковое опверстие. Въ семъ гнѣздѣ самка родить по 4 слѣпыхъ дѣтенышей, на которыхъ шерсть бываетъ темнѣе нежели на спарыхъ. Молодыхъ звѣрковъ сихъ вынимають иногда изъ гнѣздъ и держать въ клѣткахъ, спарыхъ же поймать живыми трудно. Злѣйшіе непріатели ихъ суть дикія кошки и куницы. Звѣрки сіи ни пользы намъ, ни вреда значительнаго не приносятъ.





Parus cyaneus. L.

Parus major.



СИНИЦА КНЯЗІОКЪ.

Parus cyanus, corpore supra pallide
caerulescente, subtus niveo, uropygio
et vertice ex cano albidis, cervicis
albae fascia lata, humeris tectrici-
busque caudae caeruleis. LINN.-
GMEL. *Syst. Nat.* t. I. p. 1007.

Parus Kniascik, albus, subtus macula
continua, linea oculari et collari
lividis. GMEL.-LINN. *ibid.* p. 1013.
Grosse Blaumeise. GEORGI *geogr. phys.*
u. naturh. Besch. d. Rufss. Reichs.
Vol. III. p. 1856.

Grand melange bleu. BUFF. *Hist.*
nat. des ois. V. p. 455.

Azure Titmouse. PENN. *Arct. Zool.*
2. p. 426.

Лелехинъ и Палласъ первые
примѣтили и описали сію птичку,
которая по красотѣ своей заслужила

имя князька между синицами. Она водится не только въ Сибири, но и въ Губ. Пермской, Казанской, Симбирской, Саратовской, Нижегородской, Владимирской, Московской; вѣроятно и во многихъ другихъ Сѣверныхъ мѣстахъ, откуда лѣтъ за тридцать появилась и въ Швеціи, въ прочихъ же частяхъ Европы не примѣчена.

Пшичка сія предспавлена здѣсь въ естественной величинѣ. Клівъ у ней, какъ и у всѣхъ синицъ, корошенькой, съ боковъ сжатой, черноватой, воздри кругловатая, закрытая коронками бѣлыми перьями. Лобъ, шія, щеки, шея, грудь и брюхо бѣловатая, выключая неправильное продолговатое синее пятно посрединѣ брюха. Ось носа чрезъ глаза идетъ черносиняя полоса, и соединяется съ синимъ ожерельемъ, находящимся на запылкѣ. Подъ симъ ожерельемъ примѣшно другое бѣловатое. Большія перья крыльевъ при основаніи имѣютъ цвѣтъ голубой, а на концѣ черной; у перьевъ, которыя поменьше первыхъ, имѣютъ концы бѣлые; папоро-


почныя перья голубаго цвѣту съ бѣлыми концами, отъ чего на крыльяхъ составляетъ бѣлая поперечная полоса. Хвостъ состоишь изъ 12 перьевъ, изъ которыхъ два среднія почти совсѣмъ голубыя, и только кончики у нихъ бѣлые. Прочія же перья при корнѣ только голубыя, а къ концу совсѣмъ бѣлыя. Ноги и когти черныя.

Князюкъ водился по большой части въ мѣлкомъ дубнякѣ; въ Симбирскѣ, по словамъ Г. Лепехина (*), примѣчается только зимою; но князюкъ, съ котораго снятъ прилагаемой рисунокъ, пойманъ близъ Москвы въ концѣ Апрѣля мѣсяца (**).


(*) Дневныя записки Лепехина Ч. I. стр. 291.

(**) „Поелику ппичка сія кромѣ Россіи и Швеціи, по свидѣтельствву Г. Реца, нигдѣ болѣе не примѣчена, и до сихъ поръ вѣрнаго ей рисунка живыми красками изображеннаго нигдѣ не было: но она здѣсь и срисована съ пойманной близъ Москвы. Много бы можно было помѣщать въ семъ изданіи новыхъ рисунковъ, сдѣланныхъ съ живыхъ живописныхъ, если бы общественнаго свидѣтельства Издашелоу позволяли.

Г. Гмелинь въ 13мъ изданіи Линнеевой системы описалъ сію пшичку, какъ двѣ совсѣмъ разныя породы: одинъ разъ подъ именемъ *Parus cyanus*, а въ другой разъ подъ именемъ *Parus Kniascik*; почему и должно послѣднюю исключить. Въ Москвѣ князька называющъ и голубою синицею.







Popers.

Salmo Fario. L.

Ф О Р Е Л Ь.

Salmo Fario, ocellis rubris, iridibus lucidioribus, pinna anali radiis undecim. *BLOCH'S Naturgesch. d. Fische Deutschlands*. Т. 1. p. 148.

Die Teich-Forelle *ibidem*.

La truite. *Nouv. dict. d'hist. natur.* Т. 22. p. 401.

The Trough. *PENN. Brit. Zool.* p. 297.

Рыба сія опличается отъ другихъ сродныхъ съ нею породъ красными круглыми пшнами, копоры окружены свѣшлыми кружками, и копоры усяно все ея шѣло даже до брюха, и одинадцашью распорками перьевъ красного пера. Голова у ней довольно большая; челюспи усажены оспрыми и внутрь закривившимися зубами, нижняя челюспь нѣсколько длинѣе верхней; глаза средней величины, зрачокъ черной съ краснымъ ободоч-

комъ, а радужная перепонка бѣлая. Туловище сжатое, спина круглая, съ черноватыми пятнами. Боковая линия прямая черная. Часць пуловища, выше сей линии находящаяся, изжелта зеленоватая, а нижняя желтая; брюхо же бѣлое. Все пуловище ея покрыто мѣлкою чешуею и испещрено круглыми пятнами, отъ чего она въ некоторыхъ мѣстахъ Россіи и называется *пеструшкою*; пятна сіи на головѣ черноваты, а на бокахъ красны въ голубоватомъ полѣ. Плавабельныя перья грудныя темныя, брюшныя желтыя, красное перо изжелтасѣрое; хвостовое перо съ небольшою выемкою и желтоватыми полосами. Жирное перо желтое съ темными краями, а спинное сѣрое съ пурпуровыми пятнами. Сія форель гораздо красивѣе другихъ форелей, а особливо самка. Длинною бываетъ въ поларшина и болѣе.

Форель любитъ рѣки, въ которыхъ вода чиста, холодна и быстро течетъ изъ горъ, и которыхъ дно каменное. Она водится въ рѣкахъ, впадающихъ

въ Балтійское море, Каспійское и Черное; попадаются также хопя рѣже, въ рѣкахъ, впадающихъ въ Бѣлое море. Она плаваешь чрезвычайно быстро и выпрыгиваетъ изъ воды вышиною около двухъ аршинъ, для избѣжанія иногда прецѣпавшій на пупи ей встрѣчающихся; питается червями, мѣлыми рыбками, улитками, раковинами и водяными насекомыми.

Форель мечетъ икру въ Сентябрѣ, а въ другихъ мѣстахъ въ Октябрѣ, и въ сіе время она шрещя около корней древесныхъ и большихъ камней. Форели распложаются очень сильно, хопя онѣ имѣютъ икры меньше другихъ рѣчныхъ рыбъ; но сіе можетъ бытъ происходить отъ того, что другія хищныя рыбы не любятъ холодныхъ водъ, въ которыхъ водятся форели. Онѣ бы еще въ большемъ числѣ размножались, если бы не были очень прожорливы, и сами не испребляли однѣ другихъ; поелику не рѣдко находятъ молодыхъ форелей въ желудкѣ старыхъ.

Форелей ловящъ сачками, вершами и удками. Сачки надобно поспѣшь выпаскивать изъ воды, какъ только примѣпятъ, что рыба въ нихъ вошла, а иначе она опяшь выскакиваетъ вонъ. Для заманы въ вершу, употребляютъ какую-нибудь сильно пахучую приманку (*). Удки, для ловли форелей употребляемыя, должны имѣть какъ древко, такъ и нишку очень крѣпкія, поелику пойманная форель порывается очень сильно и можетъ переломить древко, или перервать нишку. На удку для приманки насаживаютъ раковые хвосты, земляныхъ червей и разрѣзанныхъ на части пиявицъ. Англича-

(*) „Въ чужихъ странахъ употребляютъ „приманку изъ бобровой струи и канфары; обѣ сіи маперіи расплавляютъ на „огнѣ и смѣшиваютъ съ льнянымъ масломъ; „потомъ обмочивши въ сію смѣсь положен- „цо, связываютъ его на подобіе мѣшечка, и „привязываютъ въ вершѣ. Канфару употре- „бляютъ даже для приманки на удку; въ „семъ случаѣ берутъ одну часть канфары, „двѣ части аиспового жиру, чепыре части „гнилой ивы и одну меду.“ *Bloch's Natur. g. d. Fisch.* Т. 1. р. 150.

не, которые очень любящъ ловить посредствомъ удокъ, замѣняя, что форель часто выскакиваетъ изъ воды, чтобъ схватить какое - нибудь насекомое, лежащее надъ водою, дѣлаютъ фигуры насекомыхъ изъ шелку и конской гривы, и какъ въ природѣ каждой мѣсяцъ появляюща новыя насекомыя, то они также ихъ перемѣняютъ; фигурки сія насекомыхъ, прикрѣпивши къ удкѣ, двигаютъ въ разныя стороны надъ водою, и рыба бросается на нихъ. Таковая ловля бываетъ особливо удачна при восхожденіи солнца, или при хорошей погодѣ. Ночью ловля происходитъ при огнѣ. Во время же мѣшанія икры, форелей руками почти ловить можно.

Форели имѣютъ весьма нѣжное и вкусное мясо, и чѣмъ холоднѣе вода, въ которой онѣ живутъ, тѣмъ бываютъ вкуснѣе. Лѣтомъ ихъ мясо красновато и нѣжнѣе, нежели зимою; сверхъ того мясо ихъ удобоваримо и доставляетъ хорошее пищаніе для людей слабыхъ и выздоравливающихъ.

Форель во всей Европѣ въ уваженіи об-
давнихъ временъ. Еще Римляне употреба-
ляли ее только при великолѣпныхъ
пиршесствахъ. Гдѣ много ловится форел-
лей, шамъ ихъ маринируютъ, или
солятъ.


По причинѣ весьма вкуснаго мяса
форелей и ихъ дороговизны, весьма
бы не худо воспитывать ихъ въ пруд-
дахъ; но, къ сожалѣнію, не всѣ мѣста
способны къ разведенію ихъ, ибо онѣ
любятъ чистыя, быстрыя и холодныя
воды. Но если бы кто захотѣлъ дер-
жать ихъ въ прудѣ, то 1) прудъ для
нихъ надобно имѣть съ чистою и хо-
лодною водою, и кошорато дно было бы
усплано пескомъ или кремнями. 2) Въ
сей прудъ надобно провести ручеекъ
чистой воды, кошорая бы въ него без-
престанно пришекала. 3) Прудъ дол-
женъ имѣть высокіе берега, чшобы фо-
рель не могла выскакивать вонъ.
4) Прудъ долженъ быть обсаженъ
высокими деревьями, кошорыя всегда
могли бы доспавлять тѣнь ему. 5) На
днѣ пруда надобно накласть или дре-

весныхъ корней, или большихъ камней, между копорыми рыба могла бы бросать икру. 6) Прудъ долженъ быть глубиною въ три аршина и сближимъ, а иначе форель при бурной непогодѣ всплываетъ на верхъ, и если долго непогода продолжится, умираетъ. 7) Форелямъ надобно доставлять изобильную пищу, и какъ онѣ суть хищныя рыбы, то можно съ ними напускать въ прудъ другихъ рыбъ, любящихъ одинакую же воду, но не хищныхъ, каковы на пр. сунь: пискари, гольцы, язи, бершики и пр.

Но если не можно такихъ рыбъ имѣть въ достаточномъ количествѣ, то можно кормить ихъ кишками живыхъ, рубленою печенкою и сухою смѣсью изъ ячменя и бычачей крови. Зимой надобно смотрѣть, чтобы проруби не замерзали. Лучшее мѣсто для такихъ прудовъ была бы долина, осыняемая деревьями и имѣющая вблизи хорошую ключевую воду. Мѣсяць Сентябрь считается лучшимъ для пусканія въ прудъ форелей.

Ловящяся форели въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нѣсколько отличныя отъ описанной; а именно: голова у нихъ цвѣтомъ гораздо темнѣе, радужная перепонка въ глазахъ голубоватая. Цвѣтъ на шуловищѣ также темнѣе, нежели у обыкновенной форели. Форель въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи называется *трожницею* (*).

(*) „Духъ Журналовъ 1817 года N 6. стр. 117.“





Menura superba.

Пышная Мемура.

*

ПЫШНАЯ МЕНУРА.

Menura superba. LATHAM.

Parkinson. *Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle* T. XVII. p. 125.

~~~~~

Новая Голландія, большой островъ Южнаго моря, чрезвычайно изобильный въ спранныхъ произведеніяхъ природы, естъ опечесшво и сей красивой мшицы. Менура живешъ въ гористой части острова и ошъ живущихъ тамъ Англичанъ называется *горнымъ фазаномъ*. Она не въ давнемъ времени сдѣлалась извѣсною Европейцамъ. Она величиною съ обыкновенную курицу. Кліовъ у ней выпуклой, и при корнѣ голой, ноздри лежатъ посрединѣ верхней челюсти. Ноги крѣпкія чешырепалыя, когти длинные. Цвѣшъ перьевъ на ней сверху шемно-сѣрой, а на брюхѣ посвѣтлѣе, крылья шемно-красныя. На головѣ естъ маленькой



хохолокъ. Но отъ всѣхъ пшницъ отличаеяса она своимъ великолѣпнымъ хвостомъ. Всѣхъ перьевъ въ хвостѣ 16; десять изъ нихъ къ концу усажены длинными и чрезвычайно тонкими волосками, въ дальнемъ одинъ отъ другаго разстояніи сидящими. Два среднія пера опущены мѣлкими перышками только съ одной стороны; они цвѣту сѣроваго, и вверху загибаются въ стороны въ видѣ дуги. Два боковыя пера, широкія, сверху сѣроваго, а снизу бѣловаго цвѣту полукружіями, имѣющъ концы черные, и когда пшница поднимаетъ ихъ вверху, то онѣ концами загибаются внутрь.

Самка поменьше самца, хвостъ у ней короче, и вообще не такъ красивъ. Молодые самцы дѣлаются похожими на самцовъ по прошествіи перваго линія, а до того времени они вовсе не имѣютъ ни среднихъ, ни большихъ красивыхъ перьевъ.

Впрочемъ родъ жизни сихъ пшницъ до сихъ поръ мало еще извѣстенъ.





---

## У В Ъ Д О М Л Е Н І Е .

*Изображенія и описанія Россійскихъ живописныхъ* будущъ продолжаемы и на слѣдующіе полгода почно въ такомъ же порядкѣ, какъ и теперь; почему *Особы*, желающія имѣть продолженіе сего изданія, благоволяшъ ошноситься съ своими пребываніями въ Газетную Экспедицію Московскаго Почтамта, взнося за раскрашенныя каршинки по 22 руб., а за не раскрашенныя по 12 руб., иногородныя же прилагаютъ за пересылку по 3 руб. — Издашель покорнѣйше проситъ *Особъ*, имѣющихъ намѣреніе требовать раскрашенныя каршинки, объявлять свои требованія благовременно: ибо раскрашенныя каршинки пригото- вляется не больше, какъ сколько пре- буется, и пошому позднія требованія не могутъ быть скоро удовлестворе- ны, не смотря на самое усерднѣйшее стараніе Издашеля угодишь подписав- шимся *Особамъ*.

---









ИЗОБРАЖЕНІЯ  
И  
ОПИСАНІЯ  
ЖИВОТНЫХЪ  
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ,

ИЗДАВАЕМЫЯ

ИВАНОМЪ ДВИГУБСКИМЪ.

. . . . . *Optamus*  
*Fumum de patriis . . . . videre focis ,*  
*Nescio, qua natale solum dulcedine captos*  
*Ducit . . . . .*

*OVID.* Epist. III. ex Ponto 34—36.

---

МОСКВА.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ.

1 8 1 7.

Печаташь позволяешся, съ предспавле-  
ніемъ 5 экземпляровъ въ Ценсурный Ко-  
мишешъ для казенныхъ мѣспъ. Москва,  
Юля 14 дня, 1817. О. П., Надворный  
Соеѣтникъ и Казалеръ Левъ Цеѣтаевъ.

РОССИЙСКАЯ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
БИБЛИОТЕКА

7552-0

ИЗОБРАЖЕНІЯ  
и  
ОПИСАНІЯ  
ЖИВОТНЫХЪ  
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.

~~~~~  
№ 6.





Capreolus capreolus



Antilope rupicapra. Серна.

С Е Р Н А.

Antilope rupicapra, cornibus erectis teretibus, laevigatis, apice retrorsum uncinatis. LINN. - GMEL. *Syst. nat.* Т. 1. р. 182.

ДВИГУБСК. *Кратк. описан. животных. четвероног. Россійск. стр.* 71.

Die Gemse. BECHSTEIN *gemein. Naturg. Deutschl.* Т. 1. р. 600.

Le Chamois. BUFF. *Hist. nat.* XII. р. 136.

The Chamois. PENN. *Syn. quadr.* р. 17.

Серны, называемые иначе и дикими козами, принадлежатъ къ роду Сайги. Онѣ походящъ видомъ на козъ, но опличаются отъ нихъ рогами, и не имѣниемъ бороды; сверхъ того нижняя губа не такъ выдается впередъ какъ у козъ, ноги ихъ крѣпче и нѣсколько длиннѣе; величиною же онѣ не больше козъ.

Рога у серны выходятъ почти надъ глазами, они круглы, прямы, и только кончики ихъ загнуты къ спинѣ въ видѣ крючка. Длина ихъ около 9 вершковъ; вдоль ихъ примѣшны морщины, въ видѣ колецъ ихъ окружающія, но верхушка гладка. Кольца сіи прибавляются ежегодно по одному. Шерсть на сернѣ не вездѣ одинакой длины; на спинѣ, брюхѣ и ногахъ она подлиннѣе, а на прочихъ частяхъ шела короче. Касательно же цвѣту, серны бываютъ шемнорыжія, бѣлыя и пестрыя; но цвѣтъ сей перемѣняется и по временамъ года: весною бываетъ сѣрой, лѣтомъ краснорыжіей, а осенью бурой, зимою же шемной по всему туловищу, выключая головы, которая имѣетъ цвѣтъ рыжеватобѣлой съ двумя черными или бурными полосами чрезъ глаза проходящими. Глошка и брюхо нечиспаго бѣловатаго цвѣта, а коронькой хвостъ весь черной.

Серны любятъ высочайшія горы; тамъ онѣ живутъ стадами по 20, 30 и болѣе вмѣстѣ. Въ Россіи попадаются

жрѣдка въ Грузіи по Кавказу, въ Крыму и въ Сибири по рѣкѣ Ишиму. Онѣ робки, но въ бѣгу довольно быстры; особливо природа одарила ихъ удивительною способностію, прыгати съ высокихъ скалъ, часто вышиною въ 20 футовъ и болѣе, на другія низшія, безъ всякаго вреда. Видя ихъ, перепрыгивающихъ съ непонятнымъ проворствомъ ущесы и пропасти, спремглавъ низвергающихся съ высоты горъ, подумаешь, что онѣ имѣютъ крылья, а не ноги. Серны питаются нѣжными, ароматическими травами, цвѣтами и молодыми древесными почками. Онѣ выходятъ на пашву утромъ и вечеромъ, а рѣдко днемъ. Онѣ не любятъ шеплопы, почему лѣпомъ всегда избираютъ шѣнишныя мѣста вблизи снѣговъ, по кошорымъ не рѣдко валяются, а зимою скрывающіяся въ высокихъ и густыхъ лѣсахъ.

Серны бѣгаются, подобно козамъ, въ концѣ Апрѣля и началѣ Мая; у самцовъ бывающъ въ сіе время жестокія сраженія. Серны носятъ отъ 20 до 22


ведѣль, и родящѣ по одному, рѣдко по два козленка, которыхъ мать кормитъ молокомъ въ теченіе шести мѣсяцовъ. Пойманныя молодыя серны, хотя шрудно, но привыкаютъ къ человеку. Серны очень оспорожны, имѣютъ острое зрѣніе, хорошій слухъ и тонкое обоняніе. Когда серна увидитъ человека и явственно его распознаетъ, то въ то же мгновеніе пускается бѣжать; если же услышитъ чтонибудь необыкновенное, чего глазами увидѣть не можетъ, то начинаетъ зычать или свистать съ такою силою, что зыкъ сей далеко раздается по скаламъ и лѣсамъ. Онъ съ начала бываетъ очень пронзительнъ, но къ концу ослабѣваетъ. Серна опдыхаетъ на минушу, озирается во всѣ стороны, и опять начинаетъ зычать, при чѣмъ находится въ чрезвычайномъ движеніи, бьетъ передними ногами землю, взбѣгаетъ на высопы, прислушивается, приглядывается и увидѣвъ чтонибудь, тотчасъ убѣгаетъ. Свистъ сей или зыкъ есть ничто иное, какъ сильное

и крѣпкое дышаніе серны; обыкновенной же ея голосъ очень тихъ и походилъ на бляніе козъ.

Ловъ сернъ сопряженъ съ большими опасностями, потому, что должно преслѣдовать ихъ по утесистымъ скаламъ, копорыя перебѣгаютъ онѣ очень легко, а люди и собаки не могутъ слѣдовать за ними удобно; почему съ собаками рѣдко гоняются за ними, а употребляютъ разныя хищроси, или убиваютъ изъ хорошихъ ружей, подкравшись очень тихо и прошивъ въ шкуру. Спрѣляютъ такъ же и въ то время, когда серны приходятъ лизать соль, парочно для того въ извѣстныхъ мѣстахъ разсыпанную.

Мясо спарыхъ сернъ жестко, но молодыхъ очень вкусно, и въ великомъ уваженіи. Кожа ихъ нѣжна и плотна, почему и выдѣлываютъ ее на разныя пошребы. Особливо же она потому хороша, что не боится мокроты, и вещи изъ нея сдѣланныя можно мыть. Рога употребляются на набалдашники къ шроснямъ.







Perdix cinerea. Сурская Трыпонамка.

СЪРАЯ КУРОПАТКА.

Perdix cinerea, calcarata, rufo et nigro varia, macula nuda coccinea sub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo. *LATHAM. Ind. ornith.* 2. p. 645.

Tetrao Perdix, macula nuda coccinea sub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo, pedibus albidis. *LINN.-GMEL. Syst. nat.* T. 1. p. 757.

Gemeines Feldhuhn. *BECHST. Ornitholog. Taschenb.* T. 1. p. 242.

Perdrix grise. *BUFF. Hist. des Ois.* II. p. 401.

Common Partridge. *Brit. Zoolog.* I. n. 96.



Куропатки водятся только въ странахъ умеренныхъ: ихъ нѣшь ни въ знойномъ климатѣ, ни въ холодномъ. Любимыя жилища ихъ сушь ров-

ныя степи и поля. Въ Россіи нѣтъ почти ни одной Губерніи, гдѣ бы не было ихъ въ большемъ или меньшемъ количествѣ.

Сѣрая куропапка гораздо меньше курицы; клювъ у ней корошкой выпуклой, ноздри полузакрытые; около глазъ къ задней сторонѣ находится голое красноватое пятно. Голова сверху сѣрая съ бѣловатыми продолговатыми пятнами. Лобъ, щеки и глотка рыжеватые. Грудь пепельнаго цвѣту, съ узенькими поперечными черными полосками. На груди у самца бурое луновидное пятно; у самки же сего пятна нѣтъ. Спина сѣрая съ бурыми волнистыми полосками, брюхо бѣловатое. Крылья сѣрыя, съ темнобурыми пятнами, и бѣловатымъ каждою пера оперженемъ. Большія перья у крыльевъ изъ сѣра-черныхъ съ блѣдными полосками. Хвостъ изъ буракрасной, (коришневой) корошкой. Ноги голыя изъ сѣражелтоватые. У самца есть на нихъ бодни.

Куропапки живутъ стаями вмѣстѣ до того времени, пока любовь ра-

здѣлившъ ихъ обществу, заставляя жить попарно, что обыкновенно бываетъ при концѣ зимы, и тогда происходящъ жестокия сраженія между самцами, иногда и самками. Но когда самецъ изберешишь себѣ самку, тогда живутъ въ совершенномъ согласіи. Они дѣлаютъ себѣ гнѣзда на нивахъ засѣянныхъ хлѣбомъ, или на лугахъ. Небольшая ямка въ землѣ, гдѣ находишься нѣсколько соломы или сухой травы, составляетъ ихъ гнѣздо. Въ такомъ гнѣздѣ кладутъ онъ отъ 15 до 25 зеленоватыхъ яицъ, величиною съ голубиные, и сидитъ на нихъ 20 дней или 21. Во все время, пока самка сидитъ на яйцахъ, самецъ не отплываетъ далеко отъ гнѣзда, и когда самка слѣзаетъ съ онаго для исканія себѣ пищи, самецъ вездѣ бываетъ съ нею.

Вышедшія изъ яицъ цыплята тотчасъ начинають бѣгать. Самецъ въ сіе время заботы воспитанія раздѣляетъ съ самкою: они водятъ цыплятъ вмѣстѣ, согрѣвая ихъ подъ своими крыльями на подобіе курицъ, скликають без-

преспанно, и показывающъ имъ приличную пищу. Любимая ихъ пища сущъ муравьиныя яйца; но также и другія насѣкомыя и черви, копорыхъ онецъ съ маперью вырываютъ изъ земли, и онъ не прежде начинаютъ питаться зернами, какъ довольно уже подросши.

Цыплята не будучи еще въ состоянн лѣпашь, бывающъ столь хилы, что ихъ трудно сыскать, они скорѣ согласяшя бышъ раздавлены ногами пшители, нежели выйдущъ изъ своего мѣста. Маперивская любовь заспавляешъ самку прибѣгать къ другимъ хилостямъ, чшобъ удалить опасность ошъ цыпляшъ. Если случится охотнику подойти къ гнѣзду ея, шо она потшчасъ слезаетъ съ онаго и садится близко, чшобы приманишъ охотника къ себѣ, потомъ ошашъ оплешаетъ нѣсколько и ошашъ садится на землю, чшю продолжаешъ дѣлать до шѣхъ поръ, пока охотникъ будетъ уже очень далеко ошъ гнѣзда, шога она улешаетъ изъ виду его.

У молодыхъ куропапокъ ноги жел-
тыя и съ лѣпами спановятся шемнѣ.
Первое перо у крыльевъ бываетъ острое,
и уже по прошествіи впорато линянія
дѣлается круглымъ. Рыжеватыя перья
на лбу и около глазъ вырастающъ так-
же въ четвершой мѣсяцъ.


Куропапка смирна, но сдѣлать ее
ручною трудно. Самки сдѣлавшись
ручными рѣдко несутся и выводящъ
цыплятъ. Если бы кто захотѣлъ раз-
весить куропапокъ въ домъ, то для се-
го надобно набрать въ полъ яицъ ди-
кихъ куропапокъ, и подложить подъ
курицъ; каждая курица можетъ вы-
весить двадцать куропапокъ, которыя
будущъ вездѣ за нею ходить, какъ бы
за собственною мащерью, но только до
извѣснаго времени. Въ первые дни по
выходѣ цыплятъ изъ яицъ, надобно
держатъ ихъ съ насѣдкою въ какомъ-ни-
будь не большомъ загороженномъ мѣстѣ
и припомъ съ другими цыплятами, что-
бы онѣ могли удобнѣ привыкнутьъ къ на-
сѣдкѣ и къ цыплятамъ. Кормить ихъ
можно муравьиными яйцами, а въ не-


дештапкѣ ихъ, рублеными куриными яицами, хлѣбнымъ мякишемъ, кашею и проч., а взрослыхъ разными хлѣбными зернами. Такимъ образомъ молодыя куропапки сполько привыкають къ курамъ, что и улещѣвши со двора, возвращаются оныя назадъ. Оныя пошчасъ начинають кричать по куриному, когда услышатъ голосъ другихъ куръ.

Куропапки соснавляютъ очень вкусную, вѣжную и здоровую пищу; для сего по ловяють ихъ разнымъ образомъ силками, сѣтями, западнями и спреляють изъ ружей.

Домашнихъ куропапокъ, чтобы оныя сдѣлались вѣжнѣе, пріяпнѣе и сочнѣе, надобно подержать одинъ мѣсяць въ какомъ нибудь не больномъ шемномъ покоѣ, въ которой выпускають сполько свѣшу, сколько нужно куропапокъ для того, чтобы увидѣшь пославленный для нея кормъ.







Eux. Belone. L. Семьноса. Щуна.

ЩУКА ОСТРОНОСАЯ.

Esox Belone, rostro utraque maxilla
subulato. LINN. - GMEL. *Syst. nat.*
Т. 1. р. 1391.

Der Hornhecht. BLOCH. *Oecon. Naturg.*
der Fische Deutschl. V. I. р. 237.

La Belone. BLOCH. *ibidem.*


Garfich. BLOCH. *ibidem.*


Щука сія опличається отъ обь-
ловенной своимъ длиннымъ и шонкимъ
рыломъ, которое въ нѣсколько разъ дли-
нѣе головы. Челюсти у ней обь подвиж-
ныя, и нижняя длиннѣе верхней. Онѣ
снабдѣны множествомъ шиловидныхъ
зубовъ, сидящихъ въ нѣкоторомъ однѣ
отъ другихъ отдаленіи; средняя поло-
са неба усажена также маленькими
зубами. Черепъ прозрачной, шуловище
длинное, кругловатое и съ боковъ нѣ-
сколько сжатое.

Плавапельныя грудныя перья имѣюшъ по 13 костпочекъ, колѣнчатыхъ и въшвисныхъ, выключая первую; брюшныя находяща весьма далеко отъ головы, имѣюшъ 7 костпочекъ; а въ спинномъ перѣ 17 костпочекъ; хвостовое перо имѣетъ большую выемку.

Красивая сія рыба, у которой голова и шуловище сверху высокаго зеленого цвѣту, а бока и брюхо сребристаго, водится въ Балтійскомъ морѣ, и его заливахъ, заходяшъ пакъ же въ устья большихъ рѣкъ, какова на пр. Двина западная, попадаетъ и около Таврическаго полуострова въ Черномъ морѣ. Она длиною болѣе полуаршина, а рыло у ней длиною въ пядень. Особливаго въ ней удивленія достойно то, что мясо ея и даже кости получаюшъ зеленой цвѣтъ, когда ее сваряшъ и она въ щемлошъ иногда свѣпится; а по сему и желашельно, чтобы части ея испытаны были Химически. По сей причинѣ, хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и ловашъ ее въ довольномъ количествѣ, но не употребляюшъ въ пищу; въ Помераніи

однакожъ ѣдятъ ее вареную и копченую. Ловятъ же ее по ночамъ, ѣздя въ лодкахъ съ огнемъ, и когда рыба на свѣтѣ приплываетъ близко къ лодкѣ, бьютъ ее оспрогою. Она принадлежитъ къ числу хищныхъ рыбъ.







Mantis religiosa Linn. Второе издание обновленнѣи

ВОГОМОЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ.

Mantis religiosa, thorace laevi subcarinato, elytrisque viridibus immaculatis. *LINN. - GMEL. Syst. nat.* T. I. p. 2050.

Die Fangheuschrecke. *ROESEL. Insectenbelustig.* T. II. p. 20.

La Mante. *Cabinet du Jeune naturaliste.* T. 6. p. 299.

Насѣкомыя сія вообще имѣютъ странное образование шѣла, ибо нѣкоторыя изъ нихъ походятъ на сухой древесной листъ, а другія на древесные прушки и проч. Всѣ они живутъ въ мѣстахъ теплыхъ, и одна только порода водится въ Европейской Россіи. По свидѣтельству *Г. Вебера* (*) обыкновенный Богомоль водится близъ Царицына,

(*) *Georgi Geograph. Physical u. naturhist. Beschreib. d. Russ. Reich.* T. III. p. 2053.

но вѣроятно и въ другихъ мѣстахъ Южной Россіи, ибо я самъ видѣлъ сихъ насѣкомыхъ въ степи между Днѣпромъ и Дономъ.

Богомоль сей имѣетъ голову снабженную зубчатыми челюстями, и чешырю кусательными осприями: усики у него щетиновидныя; кромѣ большихъ глазъ есть еще три побочные глаза: крыльевъ 4 перепончатыхъ; переднія ноги зубчатая, а прочія гладкія. Порода сія вся зеленаго цвѣту безъ пятенъ, но края груднаго щипка, усики и кусательныя орудія красноваты. Насѣкомое сіе ходитъ на чешырехъ заднихъ ногахъ, а грудь и голову съ передними ногами носитъ подыавъ въ верхъ, дабы удобнѣе и скорѣе ловитъ другихъ насѣкомыхъ, копорыми оно питаенся. Таковое положеніе переднихъ ногъ ея, подало поводъ суевѣрному народу думатьъ, что сіе насѣкомое въ такомъ положеніи находится моляся Богу, отъ чего во Франціи въ Лангедокъ получило названіе Богомола (*prega-Dieu* (*)); да и Турецкая

(*) *Le Cabinet du jeune naturaliste par F. Smith*
t. 6- p. 300

чернь думаетъ, что насѣкомое сіе голову обращаетъ къ Меккѣ, и ноги свои складываетъ изъ набожності (*). Другое свойство оего насѣкомаго протягивать свои ноги по въ лѣво, по въ право, также заспавило думаетъ Лангедокскихъ крестьянъ, что оно указываетъ дорогу иностраннымъ пупникамъ по словамъ *Муффета*. Въ самомъ же дѣлѣ Богомоль держитъ переднія свои лапки поднявши вверхъ, чтобы удобнѣе схватить какое нибудь насѣкомое. Надобно удивляться перпѣнію Богомола при сей ловлѣ, продолжающейся иногда нѣскольکو часовъ. Если онъ увидитъ насѣкомое не въ дальнемъ отъ себя разстояніи, то приподнимаетъ пошхоньку свою длинную грудь, и споя на заднихъ лапкахъ, начинаетъ разгибать и протягивать свои переднія лапки, попомъ бросается на свою добычу и сжимаетъ ее зубчиками переднихъ лапокъ. Если

(*) *Леске* начальныя основанія Естественной Испоріи. Переводъ Н. *Озерецковскаго*. Ч. 5. стр. 27.

же не схватишь насъкомаго, по лапокъ не сгибаешь, но въ такомъ положеніи дожидается, пока насъкомое опять прилетишь такъ близко, что его схватишь можно. Богомолы пожирають и одни другихъ.

Самка кладетъ свои яйца въ продолговатой мѣшечекъ изъ полспаго и съпчалаго вещества и прикрѣпляетъ его къ какому нибудь распѣнію; изъ яицъ по прошествіи нѣкотораго времени выходятъ гусеницы. Какъ гусеницы сіи такъ и совершенные Богомолы питаются другими насъковыми, какъ - то мухами, комарами и проч.





Ictanys ruber. *Паравайна красная.*

КАРАВАЙКА КРАСНАЯ.

Tantalus ruber, facie, rostro pedibusque rubris, corpore sanguineo, alarum apicibus nigris. *LINN.-GMEL. Syst. nat.* T. 1. 651.

Courlis rouge du Bresil. *BUFF. Hist. des Ois.* T. VIII. p. 35.

Scarlet ibis. *Arctic. Zool.* 2. p. 458.


Красная Каравайка живётъ въ южной Америкѣ по низменнымъ мѣстамъ около рѣкъ. Она вся яркаго краснаго цвѣту, и одни только концы крыльевъ черныя; голая кожа на передней части головы и шея подходящъ болѣе къ розовому цвѣту. Цвѣтъ у самки не такъ яркъ, какъ у самца. Да и самцы дѣлаются совершенно красными по прошествіи нѣсколькихъ уже лѣтъ. Цыплята ихъ обыкновенно бывающъ сѣраго цвѣту, но вылиняв-

ни во второй разъ, дѣлаются пестрыми, ибо сѣрой цвѣтѣ начинаютъ имѣть примѣсь краснаго, вылинявши же въ третій разъ, дѣлаются красными.

Пщицы сіи живутъ общеспвами, и всегда находящяся вмѣстѣ, лезаютъ ли, сидятъ на деревьяхъ, или ищутъ себѣ пищи, состоящей въ раковинахъ, панцирькахъ, маленькихъ рыбахъ и проч. Полетъ ихъ довольно быстръ, но они лезаютъ только по утрамъ и вечерамъ, во время же сильнаго дневнаго зноя кроются подъ тѣнію деревьевъ, гдѣ такъ же проводятъ и ночь.

Каравайки начинаютъ нестись въ Январѣ и продолжаютъ даже до Мая мѣсяца. Они кладутъ свои зеленоватые яйца въ травѣ, или въ куспартникѣ. Молодые каравайки очень смиренны и не дики: ихъ можно брать въ руки, когда мать ведетъ ихъ и скажетъ кормъ, и онѣ легко опривыкаютъ къ человеку, и даже могутъ разводиться въ домахъ. Сверхъ сего пщицы сіи привыкаютъ ѣсть всякую пищу, по чему

весьма легко можно размножать сихъ
птицъ, копорыя могли бы служить
украшеніемъ нашихъ птичниковъ, подоб-
но павлинамъ, фазанамъ, и пр. Мясо ихъ
вкусно, и оныя перемѣны пищи могло
бы еще сдѣлаться лучшимъ и попе-
рять совершенно болонной запахъ.
Дикіе Американцы уиращаютъ себя
шерьями сихъ птицъ.



ПРОДОЛЖЕНІЕ МѢСТЪ И ОСОВЪ ПОД-
ПИСАВШИХСЯ НА СІЕ ИЗДАНИЕ СЪ
РАСКРАШЕННЫМИ КАРТИНКАМИ.

Въ Ярославѣ. Ярославское Демидов-
ское Вышнихъ Наукъ Училище.

Въ Москвѣ. Его Сіяшельство Князь
Михаиль Андреевичъ Голицынъ.

— — — — Кандидашъ Московскаго
Университетна Палеховъ.

Въ Алексинѣ. Его Высокоблагородіе
Василій Алексеевичъ Левшинъ.

Въ Бѣлѣѣ. Его Сіяшельство Князь
Михайло Александровичъ Щербатовъ.

ИЗОБРАЖЕНІЯ

И

ОПИСАНІЯ

ЖИВОТНЫХЪ

РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ,

ИЗДАВАЕМЫЯ

ИВАНОМЪ ДВИГУБСКИМЪ.

• • • • • *Optamus*
Fumum de patriis videre fociis,
Nescio, qua natale solum dulcedine captos
Ducit

OVID. Epist. III. ex Ponto 34—36.

МОСКВА.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ.

1 8 1 7.

Печашашь позволяешя, съ представле-
ніемъ 5 экземпляровъ въ Ценсурный Ко-
мишешь для казенныхъ мѣсшъ. Москва,
Августа 9 дня, 1817. О. П., Надворный
Совѣтникъ и Кавалеръ Левъ Цеѣтасеѣ.

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА


7553-0

ИЗОБРАЖЕНІЯ
и
ОПИСАНІЯ
ЖИВОТНЫХЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.



№ 7.







Стенная Кошка. *Felis Manul.*

СТЕПНАЯ КОШКА.

Felis Manul, cauda elongata nigro-annulata, capite punctis et fasciis duabus lateralibus nigris insignito. LINN. - GMEL. *Syst. nat.* T. I. p. 81. ДВИГУВСК. Кралк. описан. животи. четверон. Россійск. стр. 28.

Steppen-Katze. GEORGI *geogr.-physic. und naturh. Besch. d. Russ. Reichs* T. III. p. 1522.

Le chat-manoul. *Nouv. dictionn. d'hist. nat.* T. V. p. 88.

Стелная кошка водится по безлѣснымъ гористымъ степямъ, начинающаюся отъ Каспійскаго моря даже до Восточнаго океана, по границѣ Россіи съ Киргискайсакими и Кипаемами.

Она весьма похожа на рысь, но меньше ея; на кончикахъ ушей не

имѣетъ длинныхъ пучковъ волосъ, да и хвостъ у ней гораздо длиннѣе, нежели у рыси. Сверхъ того степная кошка никогда не живетъ въ лѣсахъ, любимомъ жилищѣ рысей, и вовсе не встрѣчается въ мѣстахъ холодныхъ.

Степная кошка величиною съ лисицу; голова у ней большая, съ часными на верхушкѣ темными крапинами; конецъ рыла темной, усы бѣлые, глаза желтоватыя, уши широкія, корешки, внутри бѣловатыя, а снаружи желтоватыя; глотка бѣловата, а прочая нижняя часть шеи сѣровата. Вся спина и бока желтоваты, съ черными изрѣдка на спинѣ волосками, но брюхо и ноги свѣтлѣе. Хвостъ очень мохнатой, такого же цвѣту, какъ и все пуловище, но имѣетъ нѣсколько темныхъ колецъ, а кончикъ его черной.

Сие животное избираетъ себѣ въ жилище расщелины въ горахъ, или пещеры; иногда же занимаетъ норы выгнанныхъ ею лисицъ, или бабаковъ. На добычу выходитъ только ночью, и питается мышухами, полаями

и другими маленькими горными звѣрками, пшичками, ящерицами и проч. Бывшая у Г. Георги сшепная кошка живая, пойманная около верхней Селенги, жила въ клѣшкѣ 14 дней, не принимая никакой пищи. При всякомъ приближеніи къ клѣшкѣ, она всегда приходила въ жестокое бѣшенство (*). Шкурка ея доставляетъ крѣпкіе и теплые мѣха, но не красивые; почему и продается не дорогою цѣною, особливо въ Оренбургѣ и Кяхтѣ.

Монголы и Тунгузы, кочующіе по сшепямъ, занимаются ловлею кошекъ только тогда, когда выпадетъ снѣгъ, на коноромъ видны слѣды ихъ, и когда шкурка бываетъ лучше. Кошекъ ловятъ или посредствомъ ловушекъ, или убиваютъ въ самыхъ гнѣздахъ.



(*) *Georgi geogr. physic. u. naturh. Besch.*
d. Rufs. Reichs T. I. p. 1522.



1840

1841





Lagomys alpinus.

Furcyca.

П И Щ У Х А.

Lagomys alpinus, rufescens, auriculis plantisque fuscis. FISCHER *Zoognos.* Vol. III. p. 96. ДВИГУВСК. Кратк. описаніе всѣхъ животн. четверон. Россійск. стр. 61.

Lepus alpinus, ecaudatus rufescens, auriculis rotundatis plantisque fuscis. LINN.-GMEL. *Syst. nat.* T. I. p. 165.

Steinhaf. GEORGI *geogr. - physical. und naturhist. Beschreib. d. Russ. Reichs* T. III. p. 1600.

Pika. *Nouveau diction. d'hist. nat.* T. VI. p. 568.

Пищуха водится по гористымъ мѣстамъ около верхняго Иртыша, по горамъ Алтайскимъ, Саянскимъ и Байкальскимъ, около рѣки Лены, въ Камчаткѣ и по нѣкопрымъ близъ оной осировамъ. Первый примѣнилъ сіе

животное *Мессершмидтъ*, но порядочно описалъ его *Палласъ*.

Пищуха обыкновенно величиною бываетъ съ крысу; но естъ и гораздо крупнѣе въ Алтайскихъ горахъ, и гораздо мѣльче около Красноярска. Видомъ походитъ она на маленькаго зайчика; но голова у ней продолговатѣе, уши круглѣе, заднія ноги съ передними одинакой почти длины, и приномъ хвоста во все нѣшъ, да и пуловище пошолще заячьяго. Переднія лапки о пяти пальцахъ, а заднія о чепырехъ. Рыло у ней темное съ длинными черными усами; глаза черные; уши большія, темнаго цвѣшу, съ бѣловатыми закраинами; прочее пуловище рыжеватого цвѣшу, а лапки свисподи черныя. Такой цвѣшъ шерсти не перемѣняется ни по мѣсту, гдѣ онѣ живутъ, ни по временамъ года. Въ хорошую погоду большею частію онѣ сидятъ между камнями, или въ древесныхъ дуплахъ; а въ худую и дождливую бѣгаютъ вездѣ, особливо въ сумерки и позже. Голосъ у нихъ пронзительный,

подобный свисту. Онъ живущъ или поодиначкѣ, или маленькими обществами, смотря по общоящельснвамъ обитаемаго ими мѣста.

Въ Августѣ мѣсяцѣ живошныя сія начинаютъ себѣ готовить на зиму запасъ, состоящій изъ разныхъ травъ, которыя сперва высушиваютъ, а потомъ въ Сентябрѣ мѣсяцѣ спавятъ въ коническія копны. Сія копны тамъ, гдѣ много пищухъ, складываются общими ихъ силами, и бывающъ иногда вышиною въ ростъ человѣческой, а въ поперешникѣ около трехъ аршинъ. По наступленіи зимы, когда выпадетъ снѣгъ, пищухи прорываютъ подземные ходы къ своимъ копнамъ, такъ что имъ ни снѣгъ, ни морозъ не препятствуютъ пользоваться собраннымъ запасомъ. По симъ-то копнамъ называютъ ихъ и *сѣноставнами*.

Г. Палласъ, желая узнать, какія травы наиболѣе употребляютъ пищухи, разобралъ нѣсколько шаковыхъ копнъ и нашелъ въ нихъ: *анемоны, бѣлую чемерицу, живокость, василисникъ,*

серлужу, килрей, хвошь, Сибирскій гераній, разные горохи, желтоцвѣтникъ, воронецъ, черноголовникъ, молодые побѣги осоки, и проч. Всѣ сіи травы сорваны въ полномъ ихъ возрастѣ, и высушены такъ хорошо, что онѣ составляютъ очень сочную пишу. Между оными травами нѣтъ ни колосьевъ, ни швердыхъ или деревянистыхъ стеблей, ни цвѣтовъ.

Копны сіи не рѣдко служатъ добычею звѣринымъ промышленникамъ для корму ихъ лошадей и для корму скоша. Самые Якушы, не имѣя предусмотрительности пищухъ, пользующихся шкурами сихъ животныхъ, оставая умирають ихъ съ голоду. Соболи и ласочки суть злѣйшіе непріатели ршнихъ невинныхъ звѣрковъ.





Agave

Mexicanus californicus



Phasianus colchicus .

Фазанъ.

Ф А З А Н Ъ.

Phasianus Colchicus, rufus capite caeruleo, cauda cuneata, genis papillo-sis. LINN. - GMEL. *Syst. nat.* T. I. p. 740.

Der Fasan. *Naturg. der Vögel* v. BUFFON, übers. v. MARTINI, T. V. p. 201.

Le faisan. *Histoire des oiseaux* par MARTINET. T. II. No XXI.

Красивыя перья, стройной станъ и вкусное мясо фазановъ оправдываютъ доспашочно заботы хозяевъ, которые спараются разводить ихъ пшицъ въ климатахъ имъ несродныхъ.

Фазанъ наружною красною можетъ спорить съ павлиномъ. Цвѣтъ перьевъ головныхъ и шейныхъ получаетъ такія же измѣненія отъ лучей солнечныхъ, какъ и цвѣтъ шеи у голубей; ибо на сихъ

частяхъ постепенно можно видѣть
цвѣты синіе и фіолетовые съ зеле-
нымъ и золотистымъ яркимъ отли-
вомъ, которые придають болѣ живо-
спи и прелестей красной голой кожѣ,
окружающей глаза ихъ. Цвѣтъ сей
кожи ярчеъ бываетъ во время любви
фазановъ; въ это время перья, на-
ходящіяся около ушей, поднимаются
вверхъ наподобіе маленькихъ рожковъ
и блистають разными цвѣтами. При
самомъ малѣйшемъ движеніи пицы, и
цвѣты сіи измѣняются пріятнѣйшимъ
образомъ. Остальная часть шеи,
брюхо и бока покрыты яркимъ пур-
пуровымъ цвѣтомъ.

У фазановъ спина сѣровая, крылья
темныя съ желтоватыми пятнами,
хвостъ длинной красной съ попереч-
ными черными полосками; ноги тем-
наго цвѣту съ боднями.

Самецъ величиною съ пѣтуха, и онъ
только одинъ имѣетъ вышеописанныя
прекрасныя перья; самка меньше его
и не такъ красива. Она вся испещ-
рена цвѣтами сѣрымъ, краснымъ,

спемнымъ и чернымъ. Дикіе фазаны водятся въ Грузіи, также около рѣкъ Кумы, Терека, около Аспрахани, особливо въ проспникѣ; изъ сихъ мѣстъ пересылаютъ ихъ зимою мерзлыхъ въ столицу.

Всѣ вообще почищаютъ опечесствомъ фазановъ Колхиду, нынѣшнюю Мингрелію, гдѣ протекаетъ рѣка Рионъ, древній Фазисъ, отъ которой они и имя получили. Сперва они вывезены Аргонавтами, и теперь разводятся по всѣмъ частямъ свѣта.

*Argiva primum sum transportata carina,
Ante mihi notum nil, nisi Phazis erat.*

MARTIALIS.

Дикіе фазаны очень сердиты, и сдѣлашь ихъ ручными чрезвычайно трудно. Они удаляются отъ людей и мѣстъ, ими обищаемыхъ; они не живутъ общесвами, или вмѣстѣ, но всегда поодивачкѣ, выключая время любви, что бываетъ обыкновенно въ началѣ весны. Въ сіе время самцы ищутъ самокъ, и созываютъ ихъ непріятнымъ крикомъ.

Въ дикомъ состояніи самецъ имѣетъ одну только самку, которая дѣлаетъ гнѣздо при корнѣ какого-нибудь дерева, и устилаетъ его сухою сравою. Въ такомъ гнѣздѣ она кладетъ отъ 12 до 15 яицъ зеленосѣрыхъ съ темными крапинками. На яйцахъ сидитъ она отъ 23 до 24 дней. Вышедшіе изъ яицъ цыплята потчасъ начинаютъ бѣгать, подобно цыплятамъ куринымъ. Мать не имѣетъ къ нимъ сколько привязанности, какъ самки другихъ куриныхъ породъ. При захожденіи солнца фазаны ищутъ высокихъ деревьевъ, на вѣтвяхъ которыхъ они обыкновенно ночуютъ.

Фазаны кормятся сѣменами хлѣбныхъ и другихъ расѣній, муравьиными яйцами, кузнечиками и другими насекомыми.

Фазановъ ловятъ посредствомъ выученныхъ хищныхъ птицъ, или силками; также и стрѣляютъ изъ ружей.

Фазановъ съ давнихъ уже временъ, по причинѣ вкусаго ихъ мяса, разводятъ въ птичникахъ.


Мѣсто для разведенія фазановъ должно быть огорожено высокимъ и крѣпкимъ заборомъ, чѣмобъ не могли злуда лазить лисицы, ласки и другіе хищные звѣрки. Пространство пшичника соразмѣряется количеству фазановъ, для которыхъ онъ строится. Въ семь пшичникъ дѣлаются особыя отдѣленія для каждаго фазана съ его самками, которыхъ должно быть не болѣе семи. Надобно, чѣмобы все это мѣсто имѣло хорошую праву, изрѣдка засѣяно рожью, овсомъ, сарачинскимъ пшеномъ, и сверхъ того изобиловало бы кустарниками, каковы на пр. суть барбарисъ, смородина, дрокъ, можжевельникъ съ разными деревьями, для того, чѣмобы фазаны могли имѣть нужное убѣжище отъ преслѣдованія хищныхъ пшичъ.


Когда самки начнутъ нестись, то надобно каждой день собирать ихъ яйца и для вывода цыплятъ подкладывать подъ каждую самку по 18 яицъ въ особыхъ подземныхъ избушкахъ, дабы насѣдокъ не сильно беспокоить


громъ, и чтобы шеплоша была равномерна. Когда выведутся цыплята, то ихъ осматриваютъ еще подъ насѣдкою цѣлыя сушки безъ пищи; потомъ переносятъ въ особую большую клѣшку съ перегородкою такимъ образомъ сдѣланною, что цыплята могутъ бѣгать къ насѣдкѣ, а ей не лѣзя пролѣзать къ нимъ. По прошествіи 15 дней цыплятъ выпускаютъ на волю, оставляя только самку въ клѣшкѣ, которая безпрестанно ихъ скликаетъ, и не даетъ расходиться врозь. Молодыхъ цыплятъ кормятъ сперва яицами луговыхъ муравьевъ и рублеными вареными куриными яицами, потомъ яицами муравьевъ лѣсныхъ, хлѣбными зернами, хлѣбнымъ мякишемъ и проч. — Воду для фазановъ должно имѣть чистую и часто ее перемѣнять. Фазаньи яица можно для высиживанія цыплятъ подкладывать и подъ обыкновенныхъ курицъ.

Мясо фазановъ, а особливо молодыхъ, составляетъ превосходное ку-

шанье нѣжное и здоровое. Увѣряюшѣ, что мясо ублюдковѣ, происшедшихѣ отѣ фазановѣ и обыкновенныхѣ курицѣ, бываетѣ еще лучше.







Окунь.

Perca fluviatilis.

О К У Н Ъ.

Perca fluviatilis, pinnarum dorsalium
secunda radiis XVI. LINN. - GMEL.
T. I. p. 1306.

Der Baarsch. BLOCH. *Oeconom. Na-
turg. der Fische Deutschlands*. T.
II. p. 66.

Une perche *ibidem* p. 72.

The perch. *Brit. Zool.* III. p. 254.

Nec te delicias mensarum, *perca*, silebo,
Amnigenos inter pisces dignande, marinis
Solut puniceis facilis contendere nullis.

Сіи стихи написалъ Лашинскій
Спихопшворецъ *Авзоній*, въ честь и
славу вкусныхъ окуней, бывшихъ въ
большомъ уваженіи у Римлянъ. И въ
ваше время окуни составляютъ очень
пріятную и здоровую пищу; бѣлое ихъ
мясо, а особливо окуней, живущихъ въ
чистыхъ рѣкахъ, по истиннѣ есть

лакомство для охотниковъ до рыбы; и поелику оно не слишкомъ жирно, то и для больныхъ и выздоравливающихъ людей почитается полезною пищею.

Окуней не только варящъ въ похлебкахъ, въ соусахъ, жарящъ, но даже солящъ и маринируютъ. Въ Сибири и въ другихъ нѣкопрыхъ мѣстахъ развозящъ по городамъ сушеныхъ окуней.

Зубчатая жаберная закрышечка и двойное спинное перо съ колючими косточками сославляютъ опличіе цѣлаго рода окуней; описываемая же здѣсь порода: *рѣчной окунь*, опличается отъ всѣхъ другихъ тѣмъ, что во второмъ спинномъ перѣ имѣетъ 16 косточекъ. У окуня ротъ широкой, челюсти одинакой длины съ мѣлкими зубами, ноздри двойныя, глаза большіе, въ кошорыхъ радужная перепонка золотищаго цвѣту. Чешуя, покрывающая тѣло, шверда и крѣпко приросла къ кожѣ. Вся рыба имѣетъ желтозеленой цвѣтъ, больше или меньше яркой, съ шестью темными поперечными полосами. Чѣмъ чище вода, въ кошорой окуни водятъ.

ея, тѣмъ цвѣтъ на нихъ красивѣе. Брюхо у нихъ бѣлое, а плавательныя перья больше или меньше красныя. Въ грудныхъ плавательныхъ перьяхъ косточекъ 14, въ брюшныхъ 5, въ первомъ спинномъ 15, во второмъ 14, а въ хвостовомъ 25.

Окуни водятся во всей Россіи и Сибири. Они любятъ чистыя рѣки; могутъ жить также и въ озерахъ и даже въ прудахъ, въ которыхъ вода не столько чиста.

Окуни мечутъ икру въ началѣ весны около береговъ рѣкъ, озеръ и прудовъ. Они очень плодовиты, ибо въ одной самкѣ насчитывали до 992,000 яицъ. Окуни начинаютъ метать икру на шестомъ году ихъ возраста. Способъ метанія икры заслуживаетъ также вниманіе. Окунь ищетъ острокъ дерева или камня, и обь остріе сіе шрепся; опъ такового шренія начинаютъ яйца (икра) выходить вонъ, и приставапъ къ шѣлу, около котораго окунь обращаясь кругомъ, намащываетъ, такъ сказать, свою икру

на него. Сія яйца, по 4 или 5 вмѣстѣ, находясь въ общей перепонкѣ, что все вмѣстѣ представляемъ сѣтку съ шестигугольными дирочками. Хотя окуни и очень обильно мечутъ икру, но много ее пропадаетъ отъ чрезвычайнаго множества непріятелей, копорые не только икру ихъ, но и самихъ ихъ, какъ маленькихъ, такъ и большихъ, пожираютъ. Впрочемъ и они сами суть хищныя рыбы и ѣдятъ другихъ маленькихъ рыбокъ, также водяныхъ ящерицъ, лягушекъ, насѣкомыхъ и пр. Лѣтомъ часто случается видѣть ихъ выпрыгивающихъ изъ воды, чтобы схватить какое-нибудь насѣкомое, очень низко надъ водою летящее.

Окуней ловятъ удками, насаживая на нихъ маленькихъ рыбокъ, червячковъ, или раковыя клешни, также сѣтями, сачками и пр. Окунь плаваешь быстро, и большею частію близъ поверхности воды, что очень нужно знать тому, кто хочетъ ловить ихъ удкою.

Окуни живущи; и при холодною погодою можно ихъ живыхъ въ шра-


въ перевозить за нѣсколько верстѣ для разводу въ другихъ прудахъ, только не вмѣснѣ съ другими рыбами, копорыхъ они могутъ пожиратьъ. Лучше сажать ихъ въ особые пруды, куда для корму напускаютъ плошвы или другой дешевой и размножающейся скоро рыбы. Можно также разводять ихъ и посредствомъ икры (*).

Кромѣ употребленія окуней въ пишу, можно бы, гдѣ ихъ много водится, вываривать изъ нихъ клей, чего у насъ, кажется, нѣтъ еще въ употребленіи. Шведскіе Лапландцы приготавливаютъ такой клей слѣдующимъ образомъ: они сдираютъ съ окуней кожу, сушатъ ее, потомъ мочатъ въ холодной водѣ, до тѣхъ поръ пока чешуя начнетъ легко отставать. Нѣсколько эшихъ кожицъ соединяютъ вмѣснѣ и завязываютъ въ олений пузырь или въ берзовую кору, потомъ кладутъ въ горшокъ налишю водою, и наложивши сверху камень, чшобъ онъ не всплывали

(*) *Bloch Naturg. d. Fisch. V. II. p. m.*

вверхъ, кипящящъ на огнѣ болѣе часу; такимъ образомъ онъ дѣлающася мягкими и клейкими. Сими кожами Лапландцы шрутъ деревья, опредѣленные для дѣланія луковъ, отъ чего они отменно крѣпки и прочны бывающъ. Съ маленькою перемѣною можно пригошовлять клей, подобной осеприному, бѣлужьему и проч, кошорымъ въ добротѣ онъ ни мало не уступаетъ (*). Для пригошовленія сего клею можно употреблять окуней, которые въ пищу негодятся. — Окуня цвѣтомъ бывающъ очень различны, смотря по водѣ, въ кошорой они живутъ; часно можно видѣть окуней зеленоватыхъ, желтоватыхъ, золотистыхъ и сѣроватыхъ.

(*) Abhandlung der Schwedisch. Akademie B. I. p. 262.



Scorpena usasna.

Scorpaena antennata.

*

СКОРПЕНА УСАСТАЯ.

Scorpena antennata, fascia oculari.
LINN.-GMEL. Syst. nat. T. I. p.
1219.

Der Fühlhornträger. BLOCH ausländ.
Fische. Vol. III. p. 21.

Scorpenne à antennes. BLOCH *ibidem*
p. 23.

~~~~~

Голова у всѣхъ скорпеевъ большая, усаженная колючими остриями и усиками, спинное перо длинное, имѣющее переднія косточки колючія. Усастая скорпена отъ всѣхъ прочихъ породъ отличается темною полоскою, проходящею чрезъ глаза. Голова у ней вся испещрена полосками и черпочками; надъ глазами возвышающіяся два усика, круглыя съ выпуклыми темными кольцами; все тѣло испещрено широкими тем-



ными и узкими желтоватыми поперечными полосками; боковыя плавабельныя перья чрезвычайно длинныя. Въ первомъ спинномъ перьѣ 16 косточекъ, во второмъ 24, въ боковомъ 17, въ грудномъ 6 и въ брюшномъ 10.

Рыба сія водится въ рѣкахъ Амбоины и принадлежитъ къ числу хищныхъ рыбъ; ловятъ ее сѣтями и удками; вкусное мясо ея употребляется въ пищу.



ИЗОБРАЖЕНІЯ

И

ОПИСАНІЯ

ЖИВОТНЫХЪ

РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ,

ИЗДАВАЕМЫЯ

ИВАНОМЪ ДВИГУБСКИМЪ.

. . . . . *Optamus*  
*Fumum de patriis . . . . videre fœcis,*  
*Nescio, qua natale solum dulcedine captos*  
*Ducit . . . . .*

*OVID.* Epist. III. ex Ponto 34—36.

---

МОСКВА.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ.

1 8 1 7.

Печаташиъ позволяешся, съ предпошавле-  
нiемъ 5 экземпляровъ въ Ценсурный Ко-  
мишешъ для казенныхъ мѣспъ. Москва,  
Сеншября 19 дня, 1817. О. П., Надворный  
Соеѣтникъ и Кавалеръ Левъ Цеѣтаееѣ.




7554-0


ИЗОБРАЖЕНІЯ  
И  
ОПИСАНІЯ  
ЖИВОТНЫХЪ  
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.



№ 8.







*Alouatta palliata*

*Canis Canis*

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

*Pteromys borealis* F. Lemnaea Copehnae.



Л Е Т Я Г А .

*Pteromys borealis*. ДВИГУБСК. Кратк.  
описан. животн. челверон. Рос-  
сійск. стр. 44.

*Petauristus borealis*, corpore cano sub-  
tus albo, auriculis rotundatis. FI-  
SCHER Zoognof. Vol. III. p. 499.

*Sciurus volans*, hypochondriis prolixis  
volitans, cauda rotundata. LINN.-  
GMEI. Syst. nat. I. p. 134.

Fliegende Einhörchen. FISCHER Na-  
turg. Livlands p. 158.

Le polatuche. BUFF. Hist. nat. X.  
p. 95.

Flying Squirrel. PENN. Hist. quadr.  
II. p. 418.

Лешяги водятся по всѣмъ лѣсамъ  
Сѣверной Россіи и Сибири до самой  
Камчатки, гдѣ ихъ нѣтъ; попадающ-  
ся также и въ умѣренной Россіи. Они  
живутъ въ древесныхъ дуплахъ.



Лешяга, называемая также *лешучето* *бѣлкою*, величиною почти съ обыкновенную бѣлку; только хвостъ у нее гораздо короче. Рыло у лешяги не такъ толсто, какъ у бѣлки; уши безъ особаго пучка волосъ, находящагося у бѣлки, и глаза у ней по размѣру шѣла больше. Между передними и задними ногами боковая кожа на шѣлѣ споль много имѣетъ запасу, что лешяга, распустивъ ее посредствомъ лапокъ, можетъ съ большою легкостью перескакивать съ дерева на дерево весьма далеко, однако всегда сверху внизъ; ибо для лешанія снизу вверхъ кожа сія служишь не можетъ.

Лешяга сверху цвѣшомъ сѣрая (даже голубоватая), снизу бѣлая. Но есть и совсѣмъ бѣлая лешяга. Лешяги, какъ сказано, живутъ въ дуплахъ древесныхъ, откуда выходятъ только ввечеру, или ночью искать себѣ пищи, состоящей въ березовыхъ почкахъ, сережкахъ, а также и въ почкахъ осенъ, дубовъ и проч.

Лешяга очень проворна, и посредством своей боковой кожи и хвоста перескакивает очень большія разстоянія. Она прыгаетъ не горизонтально, но въ косвенномъ направленіи, такъ что съ верхушки одного дерева спрыгиваетъ на средину другаго.

Лешяга рождаетъ или двухъ до четырехъ дѣтенышей, которые около двухъ почти недѣль бываютъ слѣпы; въ это время самка днемъ согрѣваетъ ихъ собою, а къ вечеру укрываетъ ихъ мохомъ.

Г. Палласъ, получивши самку съ маленькими дѣтьми, хотѣлъ ихъ выростить, но никакъ не могъ, ибо какъ только дѣти спали глядѣшь, то самка всѣхъ ихъ одного за другимъ поѣла, и потомъ сама скоро издохла.

Лешягъ, для ихъ важной и красивой шкурки, ловятъ съѣдами, которыми окружаютъ по дереву, въ коемъ живутъ лешяги; потомъ спаряются, посредствомъ дыму, выгнать ихъ изъ гнѣздъ, въ копорыхъ онъ, выскочивши, за-

путьваются въ сѣтяхъ. Шкурка ихъ (\*) очень уважается Кишайцами, и пошому отправляешся купцами больше на Кяхту, нежели во внутренніе города Россіи.]




---

(\*) „Она, по свидѣтельству Г. Фалка, будучи потерта рукою, тотчасъ показываетъ знаки электричества. — *Falk Beiträge zur topograph. Kenntn. d. Russ. Reichs. T. III. p. 312.*“







*Mustela Putorius. L. Kopionö.*

---

---

## Х О Р Ъ О К Ъ .

- Mustela putorius*, corpore fuscescente,  
ore auricularumque margine albis.  
*FISCHER* Zoognos. Vol. III. p. 195.  
ДВИГУВСК. Кралк. описан. жи-  
волн. челверон. Россійск. стр. 23.  
Der Iltis. *SCHREBER* Saeugthier. III.  
p. 485.  
Le putois. *BUFF.* Hist. nat. VII. p. 199.  
Folecac. *PENN.* Brit. Zool. I. p. 89.
- 

Хорѣокъ принадлежитъ къ роду  
куницъ и, подобно имъ, имѣетъ шесть  
переднихъ зубовъ неровныхъ, по одно-  
му съ обѣихъ сторонъ большому клы-  
ку, и по 4 зуба коренныхъ; у него лап-  
ки съ пястью раздѣльными пальцами; но  
онъ опличается отъ куницъ черно-жел-  
товатою шерстью, а особливо бѣлова-  
тымъ рыломъ и бѣлыми же краюшка-  
ми ушей. Голова у него похожа на-

Сколько на лисью, глаза довольно великіе, темные, уши короткія, кругловатыя; ноги короткія же съ оспирыми когтями; хвостъ прямой пушистой. Шерсть на немъ двухъ сортовъ; мѣлкіе волосы густые, мягкіе, желтоватаго цвѣту, а длинныя немного порѣже и чернаго цвѣту, особливо кончики ихъ. Такимъ образомъ хоріокъ издали, а особливо зимою, кажется чернаго цвѣту; но вблизи и лѣтомъ, когда длинныя волосы сдѣлаются рѣже, и желтоватыя снѣгованыя явственны примѣшны, хоріокъ кажется черножелтоватымъ.

Хоріокъ водится по всей Россіи и Сибири. Онъ живетъ въ лѣсахъ, поляхъ и около домовъ; а для жилья себѣ избираетъ развалины строеній, пустыя деревья, кучи дровъ, камней, старыя и брошенныя норы лисицъ и другихъ звѣрковъ; иногда и самъ себѣ дѣлаетъ норы. Зимою держится болѣе около жилья. Онъ бѣгаетъ прыгивая, и находится въ непрерывномъ движеніи. Сей хищной звѣрокъ очень



жужорливъ, и за добычею своею выходитъ только по ночамъ, ловитъ гусей, утокъ, курицъ, голубей, и проч. Онъ хищнѣе куницы и пробирается къ мѣсну своей добычи весьма осторожно и безъ всякаго шума. Когда онъ заберется въ курятникъ, или на голубятню, то не умерщвляетъ всѣхъ птицъ, подобно куницѣ, но схвативши лучшую, уноситъ въ свою нору, и потомъ опять возвращается за другою. Львомъ по полямъ ищетъ яицъ разныхъ птицъ, которыхъ гнѣзда бываютъ на земли. Онъ ѣстъ также кроликовъ; любитъ медъ, почему и опустошаетъ иногда пчельники. Въ недоспашкѣ другой птицы ловитъ мышей, хомяковъ, крошкв, улитокъ и лягушекъ, а зимою ловитъ иногда и рыбу.

Хорьки бѣгаютъ въ Мартѣ мѣсяцѣ. Самка бываетъ беременна два мѣсяца и родитъ по 4, рѣдко по 6 слѣпыхъ дѣтенышей, которыхъ можно ручными сдѣлать.

Самки совершенно подобны самцамъ, но у нихъ рыло и уши совсѣмъ




бѣлы. Поелику хорьки весьма много дѣлающѣ вреда, испребляя домашнихъ пипицѣ, по стараются и ихъ испребляющѣ всяческимъ образомъ: ловушками, западнями, и проч.

Шкурка хорьковая, по причинѣ тяжелаго своего запаха, рѣдко употребляется на хорошія издѣлія, хотя ее, подкрашивая, и можно сдѣлать довольно пріятною для глазѣ. При всемъ томъ она идетъ болѣе на опушку шулуновѣ и шапокѣ; изъ длинныхъ же волосѣ, особливо хвостовыхъ, дѣлаются лучшія рисовальныя кисточки. Ручныхъ хорьковѣ употребляютъ иногда для ловли кроликовѣ. По степямъ Азіянской Россіи попадающѣ хорьки бѣлые.







*Oriolus*  *galbula*. L. *Noarea*.

И В О Л Г А.

*Oriolus galbula*, luteus, loris artubusque nigris, reatricibus exterioribus postice flavis. *LINN. - GMEL. Syst. nat.* T. I. p. 382.

Gemeiner Pirol. *BECHTSTEIN Ornitholog. Taschenb.* T. I. p. 98.

Loriot. *Buff. Hist. Nat. des ois.* III. p. 254.

Golden Oriole. *LATH. Syn.* I. p. 449.

*Иволга* есть одна изъ красивѣйшихъ Рускихъ птицъ. Голова у ней, шея и все пуловище высокаго желтаго цвѣту, крылья же и часть хвоста черныя, равно какъ и полоска между клювомъ и глазами; желтая пята на свѣрхъ того находящаяся на крыльяхъ и на концѣ хвоста.

Клювъ у ней коричневаго цвѣту, глаза красныя, а ноги синеващяя. Самка въ видѣ перьевъ отлична; ибо она не желтаго, но олековаго цвѣту; а крылья и



часть хвоста темная съ зеленоватою  
опишнкою; грудь же и часть брюха  
сѣроваты. Иволга величиною немного  
меньше галки.

Ищицы сіи водятся по всей Рос-  
сии и Сибири, выключая самыя холод-  
ныя мѣста; лѣса и кустарники суть  
обыкновенное ихъ жилище. Иволги  
прилетаютъ въ разныя части Россіи  
весною, а осенью рано опять улетаютъ  
въ страны шепльшія.

Самецъ и самка понимаются ве-  
сною, и вьютъ гнѣзда на низшихъ вѣт-  
вяхъ высокихъ деревьевъ. Гнѣздо ихъ  
очень искусно успроено. Обыкновенно  
прикрѣпляютъ его къ какой-нибудь  
вѣткѣ, раздѣлившейся на двѣ части,  
которыя онѣ переплетаютъ длинными  
соломинками или конопляными спебель-  
ками, изъ которыхъ однѣ прямо идутъ  
отъ первой вѣтки къ другой и состав-  
ляютъ передній край гнѣзда, другія же  
служатъ самымъ основаніемъ, дномъ  
гнѣзда, или проходя пониже его, обвива-  
ются вокругъ другой противоположной  
вѣтви; чрезъ что все гнѣздо дѣлается

очень крѣпкимъ. Сии длинные соломенныя и коноплянные сѣбли сославляюшъ наружнось гнѣзда; внутреннось же его успиляется мохомъ, древесными лишьями и другими подобными мягкими веществами; а по мѣсто, гдѣ должны лежать яйца, покрыто шерстью, паушиною и пухомъ, весьма плотно и искусно переплетенными. Въ шаквомъ гнѣздѣ самка кладетъ ошъ 4 до 5 бѣловашыхъ яицъ, съ шемными крапинками. Самка сидитъ на яйцахъ около шрехъ недѣль, и когда выведутся дѣти, то она великое прилагаетъ о нихъ попеченіе, и защищаетъ ихъ ошъ непріятелей съ такою неустрашимосцію, какой едваль можно ожидать ошъ шаккой маленькой пшички.


Иволги питаются разными насекомыми, ихъ гусеницами и червями, любяшъ шакже и плоды, особливо самыя зрѣлыя вишни.

Иволгу шрудно сдѣлать ручною. Вынутыя изъ гнѣзда вмѣстѣ съ самкою маленькія иволги привыкаютъ иногда къ человеку, но рѣдко болѣе двухъ

лѣтъ жить могутъ. Ихъ кормятъ сперва муравьиными яйцами, потомъ пчелами. Иволги очень осторожны, и поэтому весьма трудно ихъ спрѣлать. Случается иногда по цѣлому часу слѣдовать за иволгою отъ одного дерева къ другому, пока можно будетъ довольно близко подойти, чтобы попасть въ нее. Ловятъ сихъ птицъ также посредствомъ силковъ, особливо когда поспѣютъ вишни, а также и приманиваютъ, подражая свистомъ ихъ голосу.

Мясо иволги, особливо въ Июль, очень вкусно, почему въ Италіи и другихъ нѣкоторыхъ мѣстахъ употребляется она въ пищу.









Yucco.

*Coluber natrix. L.*

42

У Ж Ъ.

*Coluber natrix*, scutis 170, scutellis  
60. LINN. GMEL. *Syst. nat.* T. I.  
p. 1100.

*C. natrix*; supra niger, subtus chaly-  
beus submaculatus, colli maculis du-  
abus flavescens. RETZII *Faun.*  
*Suec.* T. I. p. 293.

Die Ringel- Natter. BLUMENB.  
*Handb. d. Naturg.* p. 245.

La coulevre à collier. *Hist. natur. des*  
*reptiles* par SONNINI et LA-  
TREILLE T. IV. p. 38.

Ringel-Snake. PENN. *Brit. Zool.* III.  
p. 33.

Ужъ есть невинное животное, которое  
по одному только сходству съ ядовиты-  
ми змѣями приводитъ въ трепетъ лю-  
дей, не знающихъ, отличать его отъ змѣй,  
и въ болѣе, что не многимъ извѣстно,

гдѣ собственно находится ядѣ у сихъ послѣднихъ. Не только простой народъ, но и премногіе изъ лучшихъ сословій думаютъ еще до сихъ поръ, что змѣи имѣютъ какое-то во рту жало, посредствомъ котораго жалятъ людей и животныхъ, и причиняютъ имъ чрезъ то нередко смерть. Длинной и мягкой языкъ, на концѣ раздвоенной, которой змѣи и ужи безпрестанно изо рта высовываютъ, былъ причиною, что почти всѣ очень долго почитали его за сіе смертоносное жало, которое живописцы, не знающіе также, гдѣ у змѣи ядѣ, изображаютъ всегда въ видѣ треугольнаго копьеца. Но языкъ есть языкъ, и у самыхъ ядовитыхъ змѣи онъ столько же безвреденъ, какъ и у всѣхъ другихъ животныхъ. Ядовитыя змѣи, какова на пр. у насъ ехидна, называемая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ *козюльжою*, а въ Украинѣ *гадюкою*, имѣютъ во рту, кромѣ другихъ зубовъ, съ каждой стороны близъ верхней челюсти по одному зубу длинному, кривому, ввнутри пустому и очень острому.



со скважиною на оспреѣ. Зубы сіи подвижныя, и прикрѣплены къ особому пузырьку, наполненному ядовитою жидкостью. Когда раздраженная змѣя кого-нибудь укуситъ, то вредоносныя сіи два зуба входящѣ въ плѣ, и отъ сжатія челюсти ядъ изъ пузырьковъ чрезъ нихъ же проходитъ въ плѣ и причиняетъ нерѣдко смерть. Сихъ-то ядовитыхъ зубовъ ужи не имѣютъ, и пошому они совершенно безвредны. Ихъ можно брать въ руки безъ всякаго опасенія; они даже рѣша никогда не опворяютъ съ плѣмъ намѣреніемъ, что хотѣя укуситъ, выключая времени ихъ любви; въ другое же время ежели ихъ раздражитъ, то надуваются, щипая сильно, и свившись въ кружокъ, выславляютъ только голову, угрожая броситься на того, кто ихъ беспокоитъ, чего однакожь никогда не дѣлаютъ, но испускаютъ сильной вонючій запахъ, похожій на чесночный.

Ужи по всей Россіи, кромѣ очень холодныхъ странъ, водятся



въ мокрыхъ мѣстахъ, по лѣсамъ, около рѣкъ, по площадямъ и даже по деревенскимъ дворамъ.

Ужи бываютъ иногда длиною въ полшора аршина. Голова у нихъ маленькая, покрытая сверху девястью большими чешуями, въ три ряда лежащими. На спинѣ чешуи поменьше, а на брюхѣ большія продолговатая чешвероугольныя пластинки, которыхъ у ужа бываетъ обыкновенно до 170, но иногда больше, а иногда и меньше; подъ хвостомъ маленькія чешуйки лежатъ въ два ряда, и число ихъ обыкновенное 53; бываетъ и больше.

Ужи почти всегда сверху черноватые, иногда темносѣрые и оливковые, съ чешырью рядами черныхъ пятенъ, идущихъ вдоль шѣла. Голова шакаго же цвѣту, съ двумя оранжевыми или бѣловатыми на шеѣ пятнами, которыми они легко отъ всѣхъ нашихъ змѣй отличаются; брюшныя пластинки

спальнаго цвѣшу съ бѣлыми и желтоватыми пятнами. Хвостъ свисодитъ черной.

Ужи кладутъ яйца весною въ ямкахъ, лежащихъ на полдень, близь береговъ стоячихъ водъ, и въ навозъ. Яйца сіи величиною съ голубиные, цвѣшу желтоватаго, скорлупы не имѣютъ, но покрыты крѣпкою кожицею и одно съ другимъ соединяются клейкою матеріею, сославляя родъ чешокъ.

Ужинныя яйца, находимыя въ навозъ, подали поводъ простому народу выдумать смѣшную сказку, что будто цѣшухи несутъ сіи яйца, изъ коихъ и родятся змѣнки.

Уженокъ лежидъ въ яйцѣ, свернувшись въ нѣсколько кружковъ. Теплоша атмосферы и теплоша самага навоза (буде яйца положены въ навозъ) достаточны возбудишь жизнь въ зародышѣ безъ помощи матери. Уженокъ, вышедши изъ яйца, шопчасъ уже бѣ-

гаешъ очень проворно, и отъ спарихъ оплываетъ только меньшимъ ростомъ и цвѣтомъ, не такъ темнымъ. Ужи ползаютъ по землѣ весьма скоро и плаваютъ въ водѣ также хорошо.

Ужи питаются мышами, ящерицами, лягушками, наѣкомыми, иногда же и маленькими рыбками и молоденькими пшичками, ибо они хорошо всплываютъ на деревья. Говорятъ, что ужъ очень любитъ молоко, и даже сосетъ коровъ и овецъ; но последнее безъ сомнѣнiя есть выдумка проспаго народа, или обманщиковъ. Я имѣлъ случай въ разные времена держать даже по году множество ужей и давалъ имъ молока, но не примѣнилъ, чтобы они имѣли къ нему охоту; вообще, по крайней мѣрѣ въ неволь, они не ѣли ничего въ теченiе многихъ мѣсяцовъ, впрочемъ были почти одинаково полсны. Изъ разныхъ животнохъ, копорыхъ я запералъ вмѣстѣ съ ужами въ ящикъ, одинъ только ужъ, чрезъ мѣсяцъ пребыванiя своего съ лягушкою, схватилъ ее за



заднюю ногу, и въ продолженіе 3 дней всю проглотилъ.

Сихъ-то совершенно безвредныхъ ужей обманщики показываютъ простодушнымъ вмѣсто змѣй, и увѣряютъ, что они умѣютъ заговаривать ихъ такъ, что они ихъ не укусятъ.

Г. Ласеледъ пишетъ (\*), что въ Сардиніи женщины такъ ихъ любятъ, что держатъ ихъ въ домахъ, сами ихъ кормятъ, и даже пригошляемую для нихъ пищу сами кладутъ имъ въ ротъ; да и у насъ многіе крестьяне почитаютъ ужей за хорошее предзнаменованіе, и не гоняютъ ихъ изъ домовъ, думая, что если они выгонятъ ужа, то вмѣстѣ съ нимъ пропадетъ и ихъ счастье.

Многіе увѣряютъ, что ужи чувствуютъ ласки, приползаютъ къ ногамъ, которые ихъ ласкаютъ, любятъ прятаться въ ихъ плащѣ, обвертываютъ

---


(\*) Hist. natur. des Reptiles par Sonnini et Latreille T. IV. p. 41.



ся вокругъ шеи, рукъ и ногъ и пр. Я по собственнымъ моимъ многолѣтнимъ наблюдѣніямъ могу сказать единственно то, что нѣкоторыхъ изъ ужей приучилъ я только не бѣгать вдругъ отъ меня, но никогда не могъ довести ихъ до того, чтобы они сами ко мнѣ приползали, хотя, будучи положены на руку, свернувшись на ней лежали смирно и не убѣгали.

Ужи при наступленіи осени скрываются въ глубокія норы, гдѣ и проводятъ всю зиму окоченѣвшіе, пока весенняя теплота вызоветъ ихъ опять изъ сихъ убѣжищъ.

Во Франціи ѣдятъ ужей, по свидѣтельству Г. Кювье (\*).




---

(\*) Le regne animal par Cuvier. Т. II. р. 70.





*Paradisea magnifica*. L. *Парадиуска прекрасная*.



## ПАРАДИЗКА КРАСИВАЯ.

*Paradisea magnifica*, supra spadicea, gula viridi, lunulis aureis, cervicis fasciculo pennarum flavarum. LINN.-GMEI. *Syst. Nat.* T. I. p. 401.

Der prächtige Paradiesvogel. BUFFONS *Naturg. der Vögel*, übers. v. OTTO V. VII. p. 339.

Oiseau de Paradis surnommé le Magnifique. *Hist. d. ois. par MARTINET.* T. IV. n. VIII. p. 20.

Magnificent Paradise Bird. LATH. *Synops.* 1. p. 477.

Красивая парадизка въ самомъ дѣлѣ очень красива. Клювъ у нее желтоватъ, верхняя часть головы красновата, а глотка темнозеленая. На шеѣ, близь самага зашылка, примѣшны два пучка сшоячихъ перьевъ; одинъ




пучокъ желтоватаго цвѣту съ черно-вапными пшнами, а другой весь золо- шиспой желпой; спина каштанова- го цвѣту; маленькія перья на крыль- яхъ оранжевыя, а большія желшыя; хвостъ шемный, грудь и брюхо сине- вапозеленыя съ золошиспымъ опли- вомъ; ноги желповашыя. Изъ середины хвоста выходятъ два длинныя и узень- кія пера зеленоватаго цвѣту; кошо- рыя кончатся осприемъ. Сія птица во- дится въ Новой Гвинее, и пишается ароматическими распѣніями.

Очень долго думали, что всѣ пшицы, принадлежащія къ сему роду, не имѣ- ютъ ногъ; поелику жилили, употреб- ляющіе ихъ перья для своего украшенія, искусно опривали ноги, и въ такомъ видѣ продавали ихъ Европейцамъ. Безногія пшицы, богатыя споль прекрасными перьями, опшличающіяся какъ видомъ сво- имъ, такъ и самымъ расположеніемъ перь- евъ опъ другихъ пшиць, должны и жить совсѣмъ другимъ образомъ. *Аностъ* увѣрялъ, что пшицы сіи, не имѣя воз- можности садиться на земль и на де-

ревьяхъ по неимѣнію ногъ, прицѣпля-  
 ются къ древеснымъ вѣтвямъ посред-  
 ствомъ длинныхъ своихъ перьевъ, жи-  
 вущъ на воздухъ, на полѣхъ спящъ,  
 несущъ яйца и даже выводящъ дѣшей  
 на воздухъ; а по мнѣнію другихъ, для  
 вывода дѣшей, улепающъ въ земной рай,  
 отъ чего и получили названіе *Райскихъ*  
*жлицъ*. Пища ихъ также необыкновен-  
 нна, ибо онѣ ничего не ѣдятъ, а пи-  
 таются одною только росой. Сіи и  
 другія нелѣпыя выдумки какъ жипелей,  
 такъ и корыслолюбивыхъ продавцовъ,  
 мало по малу обнаружилась, когда на-  
 чали привозить въ Европу сѣхъ пшницъ  
 и ихъ лучше разсматривать.









РКМ  
МБ





2014079225