

ИЗОБРАЖЕНІЯ
И
ОПИСАНІЯ
ЖИВОТНЫХЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ,

ИЗДАВАЕМЫЯ

ИВАНОМЪ ДВИГУБСКИМЪ.

..... *Optamus*
Fumum de patriis videre focus,
Nescio, qua natale solum dulcedine captos
Ducit

ОVID. Epist. III. ex Ponto 54—56.

МОСКВА.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ.

1817.

Печаташь позволяешя, съ представле-
ніемъ 5 экземпляровъ въ Ценсурный Ко-
мишешъ для казенныхъ мѣстъ. Москва,
Октября 13 дня, 1817. О. П., Надеорный
Советникъ и Касцлеръ Левъ Цвѣтаевъ.




ИИВ. М.К.И. - 5418


6188758

ИЗОБРАЖЕНІЯ
и
ОПИСАНІЯ
ЖИВОТНЫХЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.



№ 9.







Cervus Dama L. *Stamb*

Л А Н Ъ.

Cervus dama, cornibus ramosis recurvatis compressis: summitate palmata.
LINN.-GMEL. Syst. Nat. T. I. p. 178. ДВИГУВСК. Краткое описаніе животныхъ четвероногихъ Россійск. стр. 70.

Damhirsch. *SCHREB. Saeugth. V. p.*

Daïm. *BUFF. Hist. Nat. VI. p. 167.*

Fallow-Deer. *PENN. quadr. p. 48.*

Лань похожа на обыкновеннаго оленя (*Cervus elaphus*), но меньше его; припомъ рога у оленя въпвисшыя, круглыя, а у лани въпвисшыя сплюснутыя, и загибающя впередъ; верхушки ихъ плоски и разширяющя наподобіе ручной ладони.

Лань обыкновенно краснобурого цвѣшу съ бѣлыми пятнами, а брюхо у ней бѣловатое, но бывающъ лани рыжія, сѣрыя, черновашья и совер-

шенно бѣлыя. Самки роговъ не имѣютъ и роспомъ меньше самцовъ.

Лани не въ такомъ множествѣ находящіяся въ Европѣ, какъ олени; въ Россіи попадающіяся онѣ изрѣдка въ Крыму и въ Губерніяхъ Волынской, Минской, Гродненской и Виленской. Онѣ любятъ мѣста высокія, сухія, съ небольшими пригорками, и не такъ скоро перемѣняютъ свое мѣстопробываніе, какъ олени.

Дикія лани проворны, рѣзвы и пугливы. Онѣ живутъ общеснвами, соспавляя большія стада; но когда случится гдѣ-нибудь много самцовъ въ одномъ мѣстѣ, то иногда они раздѣляются на партіи, и не рѣдко за выгоднѣйшее мѣсто жестоко сражаются, а чаще всего за самокъ. Лани бѣгаются въ Октябрѣ мѣсяцѣ, и самки по прошествіи 8 мѣсяцовъ родятъ по одному или по два дѣтеныша.

У молодыхъ ланей рога показывающіяся на первомъ году; на впоромъ году они начинаютъ раздвояться или даже раздѣляться на нѣсколько вѣтвей,

копорья прибавляются ежегодно и спавняшся часъ онъ часу шире до пятого году и далѣе. Лани живущь до двадцати лѣтъ, и ежегодно весною ровняютъ рога. Лани зимою живущь въ сосновыхъ лѣсахъ, гдѣ растенъ верескъ, или много молодыхъ древесныхъ побѣговъ, копорьями онъ кормяшся, а лѣтомъ на лугахъ, или около кустарниковъ. Онъ, подобно всѣмъ рога имѣющимъ живошнымъ, жуеши жвачку.


Живошныя сіи легко дѣлаются ручными, почему ихъ можно хорошо разводисъ въ звѣринцахъ. Мясо ихъ, а особливо молодыхъ, очень нѣжно и вкусно; а изъ кожи ихъ выдѣлываютъ весьма хорошия перчатки, панталоны и другія вещи; шерсть служисъ для набивки плюфяковъ, сѣделъ, подушекъ для креселъ и проч. Рога и копыта идуши на разныя у мастеровъ косяныхъ дѣлъ подѣлки.

Ланей ловяши гонясы за ними съ собаками и буюши ихъ спрѣляя изъ ружей. Ловля сія не шакъ ушомишель-

на какъ оленья, поелику онѣ не убѣга-
ютъ далеко, но только разными из-
воротами спаряются избѣгая угро-
жающей имъ опасности.

Нигдѣ столько ланей нѣтъ, какъ
въ Англіи, гдѣ ихъ держатъ въ звѣ-
ринцахъ въ великомъ множествѣ, по-
чему въ другихъ странахъ называютъ
ихъ и *Англинскими оленями*.





Faint handwritten text, possibly a signature or date, written vertically on the right side of the page.

Colymbus arcticus. L. Traupha Saarw.



ГАГАРА ГАГАКЪ.

Colymbus arcticus, capite cano, collo subtus atro-violaceo: fascia alba interrupta. *LINN.-GMEL. Syst. Nat.* T. I. p. 587.

Nordtaucher. *GEORGI Geogr.-physic.-und naturhist. Beschr. d. Rufs. Reichs* T. III. p. 1761.

Lümme. *BUFF. Hist. Nat. des ois.* 8. p. 261.

Black throated Diver. *Brit. Zool.* II. n. 241.

Балшійское, Бѣлое и Ледовитое моря, озера и рѣки Сѣверной части Россіи, Сѣверовосточной и Восточной Сибири суть любимыя лѣпныя жилища гагаковъ. Въ умѣренной и Южной Россіи попадаются сіи птицы рѣдко, во время только весны и осени.

Гагакъ, какъ и всѣ птицы сего рода, имѣеть клювъ острый, прямой, чернова-

шой; ноздри продолговатыя при концѣ клѣва. Ноги находящяся при концѣ плѣла, почему сіи пшцы совсѣмъ почти по землѣ ходитъ не могутъ.

Голова у сихъ гагаръ и шея сверху пепельнаго цвѣту; глотка и часть шеи черныя съ фіолетовымъ отливомъ; подъ глоткою примѣшны продолговатыя бѣлыя пятна, наподобіе ожерелья окружающія часть шеи. Спина и крылья черныя съ поперечными четверугольными продолговатыми пятнами. Хвостъ короткой, безъ большихъ перьевъ, черной; грудь и брюхо бѣлыя.

Пшцы сіи плаваютъ очень проворно, и лишь только примѣшны опасности, тотчасъ ныряютъ въ воду, и могутъ долго пробывъ въ такомъ положеніи, почему и весьма трудно ихъ снрѣлять. Поеликуже крылья у нихъ по величинѣ плѣла очень малы, шо онѣ рѣдко летаютъ, и съ трудомъ.


Онѣ питаются большею частію рыбою и водяными насѣкомыми. Гнѣз-


да вьютъ на берегахъ рѣкъ и озеръ въ тростникахъ, почему весьма трудно ихъ находить. Самка несетъ по два довольно большихъ яйца, на которыхъ самка и самецъ сидятъ 4 недѣли.

Мясо ихъ не очень вкусно, однако же Сѣверные народы ѣдятъ ихъ, такъ какъ и яйца ихъ. Особливо же лютуютъ ихъ для шкурки, кошора, по выдѣлкѣ, употребляется на шапки, муфты и даже на шубы, почему и составляетъ прибыльной поваръ на Сибирскихъ ярмаркахъ. Шубы шитыя изъ шаковыхъ шкурокъ очень крѣпки, шенлы и въ мокрую погоду не дѣлаются мокрыми; ибо вода съ нихъ спекаетъ, а въ нихъ не проходитъ. Шьютъ шаковыя шубы перьями снаружи и употребляютъ для сего шкурки не только сей породы, но и другихъ гадаръ, особливо большихъ (*).



(*) *Falks* Beyträge zur topograph. Kenntniss d. Russ. Reichs T. III. p. 353.







Mullus surmuletus. Рыбнокопчова карбуца.

КРАСНОБОРОДКА БОЛЬШАЯ.

Mullus surmuletus, cirris geminis, lineis luteis longitudinalibus. LINN.-GMEI. *Syst. nat.* T. I. p. 496.

Mullus, corpore rubro, striis luteis. BLOCH. *Naturg. d. Fisch. Deutsch.* T. II. p. 111.

Rothbart. *ibid.*

Surmulet. *ibid.*

Striped Surmulet. PENN. *Brit. Zool.* III. p. 274.

Въ моряхъ, омывающихъ Россійскія владѣнія, водятся двѣ породы краснобородки: *большая*, о которой здѣсь говорится, и другая, извѣстная подъ именемъ *Султанской рыбы* (*Mullus barbatus*). Онѣ вообще сходны въ томъ, что не только пуловище ихъ, но и самая голова покрыты большими чешуями, легко сваливающимися, и что

у каждой изъ нихъ находится на нижней челюсти по два усика. Обѣ сии рыбы краснаго цвѣту съ бѣлымъ сребристымъ брюхомъ. Но у большой краснобородки по туловищу примѣшны желшыя полосы, а у Султанской рыбы сихъ полосъ нѣтъ, да и голова у ней шупѣе, и она меньше первой. Первая изрѣдка попадается въ Балтійскомъ морѣ, а вторая водится въ Черномъ морѣ около Крыма въ довольномъ количествѣ.

У большой краснобородки подглоточныя плаващельныя перья имѣють 15 косточекъ, грудныя 6, брюшныя 7, хвостовое перо 22, первое спинное 7, а второе 9. Линия боковая параллельна со спиною, и только при хвостѣ немножко удаляется отъ ней. Туловище у ней красное, а на поверхности чешуи находящяся желшыя полосы, которыя пропадаютъ, когда чешуя свалился; за то красной цвѣтѣ, просвѣчивающій сквозь чешуи, становяща еще ярче. Плаващельныя перья у ней желшоваты, а косточки ихъ

красновашы. Въ Балпійскомъ морѣ она рѣдко бываешъ больше полфунта, но въ Средиземномъ морѣ попадающси длиною больше фунта.

Рыба сія не только примѣчательна по наружной своей красотѣ, но и по бѣлому, швердому, нѣжному и очень вкусному мясу. Греки и Римляне весьма высоко ее цѣнили, и покупали очень дорогою цѣною. Не рѣдко платили за сію рыбу столько вѣсомъ серебра, сколько было въ ней вѣсу.

Ювеналъ справедливо упрекалъ *Калліодора*, что онъ за чешыре краснобородки для одного ужина заплащилъ 1200 сестерціевъ. Императоръ *Тиверій* велѣлъ продать одну такую рыбу, ему подаренную, вѣсомъ въ 4 фунта, за которую *Окшавій* не усомнился заплащитъ 5000 сестерціевъ, почитая такую цѣну не слишкомъ высокою, по свидѣтельству *Сенеки*. Консулъ *Целеръ* заплащилъ еще дороже за краснобородку, давши 8000 сестерціевъ, по увѣренію *Плинія*; а *Светоній* говоритъ, что при Императорѣ *Тиверіи* проданы

были при таковыя рыбки за 30,000 естерциевъ (*).

Вѣроятно, что Римляне такъ дорого покупали краснобородокъ не только потому, что онъ очень вкусны, но и потому, что онъ очень красивы. По свидѣтельству *Варрона*, держали ихъ живыхъ въ садкахъ для красоты. *Цицеронъ* укоряетъ своихъ единоплеменниковъ, что тѣ, которые могли имѣть въ своихъ садкахъ краснобородокъ, тѣмъ чрезвычайно гордились. Но это еще не все; *Сенека* увѣряетъ, что Римляне держали ихъ въ покояхъ и, при своихъ пиршествахъ приказывали приносить ихъ въ стеклянныхъ сосудахъ, дабы гости видѣли ихъ живыхъ и забавлялись различнымъ измѣненіемъ цвѣтовъ, постепенно на рыбкѣ производившемъ, по мѣрѣ какъ она издыхала (**).

У Грековъ краснобородка посвящена была *Дианѣ*. Впрочемъ не только

(*) По вычисленію, сдѣланномъ, *Кумберландомъ*, это сослало бы 1000 рейхсгалеровъ, следовательно на наши деньги болѣе 40,000 рублей. *Bloch. Naturg. d. Fische. T. II. p. 112.*

(**) *Bloch. Ibidem p. 115.*

большая краснобородка, но и малая или Сулпанская рыба была въ одинакомъ уваженіи.

Краснобородки принадлежатъ къ числу хищныхъ рыбъ; онѣ питаются обыкновенно раками, раковинами и маленькими рыбками, иногда же и шрупами мерпвыхъ живошныхъ.


При наспупленіи весны онѣ спадами поднимаются изъ глубины моря, и плывущъ къ успьямъ рѣкъ для метанія шамъ икры. Но можно ли положить на увѣреніе *Аристотеля*, что сія рыба по три раза въ годѣ мечущъ икру, когда всѣ извѣстныя рыбы мечущъ ее по одному шолько разу въ годѣ?

Краснобородокъ ловящъ сѣтями, вершами и удками, употребляя въ семъ послѣднемъ случаѣ, для приманки, раковыя шейки.

Если нужно сію рыбку пересылать куда-нибудь въ опдаленное мѣсто, то, чтобы она не испортилась, варящъ ее шолчасъ въ морской водѣ, попомъ валяющъ въ мукъ, и замазываютъ

въ тѣсто, чтобы воздухъ не могъ до нее
доходить. Ъдящъ ее, какъ вареную,
шакъ и жареную, приправленную съ
оливковымъ масломъ и лимоннымъ со-
комъ, уксуомъ и проч.; особливо пе-
ченка изъ нее почищается лакомымъ
кускомъ.







Sphinx atropos. L. *Сphinx атроповъ*.

СФИНКСЪ МЕРТВОГОЛОВОЙ.

Sphinx atropos, alis posterioribus luteis : fasciis fuscis, abdomine luteo, cingulis nigris. *LINN.-GMEL. Syst. Nat. T. 1. p. 2378.*

Der Todenkopf. *ROESEL Belust. Insect. III. 2.*

Le sphinx tête de mort. *Hist. Nat. des insectes par de TYGNY. I. p. 263.*

Мертвоголовой сфинксъ есть самой большой между Россійскими сфинксами или бабочками сумерочными. Настоящее отечество его есть Африка и Америка, гдѣ онъ бываетъ въ два раза болѣе Европейскихъ. Онъ въ Европу завезенъ вмѣстѣ съ каршофелями, копорыми кормится его гусеница, и потомъ распространился по разнымъ ея мѣстамъ.

Въ Россіи находящся сіи насѣкомыя по Губерніямъ: Астраханской, Са-

рашовской, Кавказской, Таврической, Волынской, Подольской, Кіевской, Лифляндской, Московской, вѣроятно и многимъ другимъ, хотя не въ большомъ количествѣ.

Усики у сихъ насѣкомыхъ призматическіе, и отъ самаго корня спановящія къ концу толще, но оканчивающія оспріемъ; кусательныя орудія у нихъ шупыя; сверхъ того онѣ имѣютъ язычекъ.

У описываемой породы верхнія крылья темнаго цвѣту съ неправильными пятнами темножелтыми и свѣтложелтыми; нижнія крылья желтыя съ двумя темными поперечными полосами; брюхо изсѣра-синевашое, но бока его желты, и каждое кольцо замѣчено черною поперечною полосою. Замѣчательнѣе же всего сіе насѣкомое по желтоватому неправильному пятну на спинѣ находящемуся. Пятно сіе представляеть нѣкоторымъ образомъ видъ мерцвой головы, и сіе изображеніе

для суевѣрныхъ людей бываетъ причиною сильнаго, хотя въ прочемъ неосновательнаго страха. Сверхъ того насѣкомыя сіи, поширая усики обѣ свой язычекъ, производящъ нѣкошорой родъ унылаго звука, и поелику онѣ лежатъ только по ночамъ, то и почитаются предвозвѣстниками смерти, голоду и проч. Нѣкогда появились онѣ въ большомъ множествѣ во Французской провинціи Брешани, и какъ въ сіе же время тамъ были повальные болѣзни, то поселяне приведены были появленіемъ сихъ насѣкомыхъ въ великой страхъ, почитая ихъ причиною повальныхъ болѣзней и предвѣстниками неминуемой смерти (*).

Гусеница сихъ насѣкомыхъ довольно велика, цвѣшомъ темножелтая, съ зелеными пятами; на хвостѣ ея примѣшенъ рожокъ не гладкой, какъ у другихъ гусеницъ, но зернистой. Она кормится каршофельными и мор-

(*) Nouveau dictionn. d. Hist. Nat. T. XXI. p. 163.

ковными лисьями, и къ концу лѣта
перемѣняется въ темнокрасную кукол-
ку: совершенное насѣкомое изъ куколки
выходитъ осенью.







Hyena vulgaris. T. Siena

Г І Е Н А.

Hyæna vulgaris. ДВИГУБСК. Крап-
кое описаніе животн. чепверон.
Россійскихъ. стр. 37.

H. striata. FISCHER Zoogn. V. III.
p. 264.

Canis Hyæna, cauda recta, pilis cer-
vicis erectis, auriculis nudis, pedibus
tetradactylis. LINN. - GMEL. Syst.
nat. T. I. p. 71.

Hyæna. SCHREBER Saügthiere T. III.
p. 371.

Hyæne. BUFF. Hist. nat. V. p. 268.

Striped *Hyæna.* PENN. Syn. quadr.
p. 161.

Хищныя сіи живошныя опличаюп-
ся ошъ прочихъ съ ними сродныхъ
тѣмъ, что у нихъ на всѣхъ ногахъ
по четыре только пальца.

Гіена живеть въ пещерахъ и уще-
ліяхъ горъ Африки и Азіи; но, по при-
соединеніи Грузіи къ Россійскому Госу-

дарству, можно причислить ее къ живошнымъ Россійскимъ, ибо она попадаетъ, хотя изрѣдка, въ Грузію. Гиена величиною съ волка, или большую собаку, но челюсти у ней короче и крѣпче. Шерсть на ней темно-сѣрая съ прожельною, по пуловищу и ногамъ находящаяся неправильная пятна темнаго, а иногда ржавчиннаго цвѣту. Шерсть на спинѣ длинная, въ видѣ гривы, и вся сѣраго цвѣту; рыло, глотка и нижняя часть шеи темныя, а лобъ и щеки желтоватосѣрыя. Уши почти безъ шерсти, темноватыя; хвостъ сѣрой. Но попадающія выродки, на которыхъ цвѣтъ сѣрой, шо свѣтлѣе, шо темнѣе, да и самыя пятна въ цвѣтѣ и расположеніи разнятся.

Взглядъ у гиены спрашной и свирѣпой. Короткое рыло, большія и голыя уши, подымающаяся вверхъ грива, когда живошное разсердился, дѣлающъ весьма непріятное впечатлѣніе на зрителя; сверхъ того походка у ней очень странная. Задъ у ней всегда ниже

передней части тѣла, и сіе происходитъ не отъ меньшей величины костей составляющихъ его, но поелику тіена крѣпко сжимаетъ всѣ свои соспавы; и отъ сей привычки она кажется прихрамливающею, когда начинаетъ идти.

Тіены весьма сильны; самыя сильныя собаки не могли одолѣвать ихъ при сраженіяхъ, которыя нарочно для сего были даваемы въ Европѣ. Онѣ сперва перекусывали собакамъ ноги и потомъ удавляли ихъ. Въ самомъ дѣлѣ, судя по величинѣ ихъ зубовъ и ширинѣ челюстныхъ мускуловъ, должно заключить, что укуса ихъ должна быть ужасна.

Тіена сколь сильна, столько же ненасытна и прожорлива. Тіены каждую ночь выходятъ изъ своихъ норъ искать себѣ пищи, и не только ловятъ живыхъ, которыя имъ попадутся въ полѣ; но входятъ въ города для пожирания нечистотъ, труновъ и оспащковъ живыхъ на бойняхъ убитыхъ. Въ Абиссиніи, гдѣ по варварскому

обычаю разбрасываютъ по улицамъ шѣла людей, преданныхъ казни, гиены входятъ въ города для насыщенія ими. Нерѣдко и проходящіе люди бываютъ преслѣдуемы ими.

Гиены такъ отважны, что входятъ иногда въ самые дома, гдѣ пожираютъ все, даже сало и кожи. Онѣ слѣдуютъ за стадами коровъ и овецъ, а также за караванами, гдѣ не только питаются трупами живописныхъ и людей на дорогѣ умирающихъ, но нападаютъ и на живыхъ, опдалившихся какимъ-нибудь образомъ отъ каравановъ. Впрочемъ онѣ охотнѣе бросаются на лошаковъ и ословъ, нежели на сидящихъ на нихъ людей; но мясо собакъ предпочитаютъ всему. Гиены, не довольствуясь живыми живописными и валяющимися на поверхности земли трупами, выкапываютъ даже мершвыя шѣла изъ гробовъ, и ими питаются; однакожъ могутъ сіи живописныя питаться и растѣніями, особливо луковицами и другими мясистыми кореньями.

Когда гіена схватитъ что - либо зубами, то добычи своей не выпускаетъ изо рта, почему Негры бросаютъ ей конецъ большаго мѣшка, нарочно для сего сдѣланнаго, и когда гіена его схватитъ зубами, тогда удобно ее убиваютъ, ибо она мѣшка изо рта не выпускаетъ.

Гіену чрезвычайно трудно сдѣлать ручною; однако же есть примѣры, что онѣ, по крайней мѣрѣ молодыя, своихъ хозяевъ знали и на нихъ не бросались.



22

Людям, которые хотят узнать
что такое философия, не следует
идти к философам, а к людям,
которые живут. Философия — это
жизнь, это искусство жить.
Философия — это искусство
думать. Философия — это
искусство любить. Философия —
это искусство быть счастливым.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
СССР
И. В. И. Ленин

ИИВ. МН. 5419

61888-58

ИЗОБРАЖЕНІЯ
И
ОПИСАНІЯ
ЖИВОТНЫХЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ,

ИЗДАВАЕМЫЯ

ИВАНОМЪ ДВИГУБСКИМЪ.

..... *Optamus*
Fumum de patriis videre fociis ,
Nescio , qua natale solum dulcedine captos
Ducit

OVID. Epist. III. ex Ponto 34—36.

МОСКВА.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ.

1 8 1 7.

Печаташь позволяешя, съ предспавле-
нiемъ 5 экземпляровъ въ Ценсурный Ко-
мишешъ для казенныхъ мѣспъ. Москва,
Ноября 15 дня, 1817. О. П., Надворный
Советникъ и Кавалеръ Левъ Цефтаевъ.

ИЗОБРАЖЕНІЯ
И
ОПИСАНІЯ
ЖИВОТНЫХЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.



№ 10.


JOSEPH HENRI

CHOCOLAT

DE LA MAISON

DE CHOCOLAT

1810



Mogade macchata. Sauripede.



ВЫХУХОЛЬ.

Mygale moschata. FISCHER Zoognof.

Т. III. р. 598. ДВИГУВСК. Крап-
ное описан. живолн. челвероног.
Россійск. стр. 15.

Sorex moschatus, pedibus palmatis,
cauda compresso-lanceolata. LINN.-
GMEI. Syst. Nat. T. I. р. 113.

Bisamratte. CUVIER Naturgesch. d.
Thiere. T. I. р. 147.

Le desman. BUFF. Hist. Nat. T. X.
р. 1.

The longnosed Bever. PENN. Syn.
quadr. р. 260.

Нѣтъ ни одного животного изъ
числа челвероногихъ земноводныхъ жи-
вотныхъ, которое бы заслуживало
болѣе вниманія своимъ родомъ жизни,
какъ *выхухоль*. Онъ большую
часть жизни проводитъ на водѣ и подъ
водою. Онъ никогда не выходитъ на

сушу, но подземными каналами, между нѣкошорыми озерами находящимися, или во время наводненій изъ рѣкъ переплываетъ въ озера, а изъ озеръ въ рѣки; пошому и мѣшопребываніе сихъ живошныхъ очень ограничено. Ихъ находяшъ только въ рѣкахъ, ошъ Сѣвера шекующихъ въ Каспійское море и Черное, въ рѣкахъ, впадающихъ въ Днѣпръ, Донъ, а особливо въ Волгу. Въ другихъ же мѣстахъ сихъ живошныхъ вовсе нѣшъ. Около Волги называютъ сіе живошное *выхухолемъ*, подъ кошорымъ именемъ извѣшно оно и въ премногихъ другихъ мѣстахъ Россіи; но около Оки называютъ его *чурсиномъ*, а въ Малороссіи *гогулемъ*.

Голова у выхухола не велика, продолговата; верхняя челюсть оканчивается весьма подвижнымъ хоботкомъ, кошорой нѣсколько загнулся внизъ. Ноздри находяшя на самомъ концѣ хоботка. Зѣвъ продолговатой; зубовъ во рту 22, переднихъ вверху 20, а внизу чешыре. Глаза очень малые, а ушей наружныхъ вовсе нѣшъ. Шея не

примѣтна. Туловище продолговатое ; хвостъ сплюснутой, чешуйчатой. Переднія и заднія лапы имѣютъ по пяти пальцевъ, соединенныхъ между собою плавательною перепонкою, и покрытыхъ сверху маленькими чешуйками. Все животное покрыто мягкой густою шерстью, темносѣрою ; но между сею шерстью находятся еще жесткіе волоса длиннѣе шерсти, на спинѣ черноватые, а на брюхѣ поблѣе. Около ушей примѣтно бѣловатое пятно; лапки также бѣловаты. Хвостъ желтоватъ, а особливо жесткія щетинки, изрѣдка выходящія между чешуйками.

Выхухоли, какъ сказано, живутъ въ рѣкахъ и озерахъ, особливо въ старицахъ, въ копорыхъ вода заспаиваются, берега довольно высоки, и способны для рышья норъ. Выхухоли начинаютъ рышь себѣ нору подъ водою, и косвенно проводятъ ее вверхъ по берегу, длиною въ двадцать футовъ, и болѣе къ поверхности земли; но на поверхность оной никогда не дѣлаютъ

выходу. Въ таковыхъ норахъ живутъ они или поодиначкѣ, или попарно. Весною и лѣтомъ можно видѣть ихъ въ рѣкахъ и озерахъ, особливо около проспника и корней деревь, при берегахъ распущихъ. Здѣсь они или ходящъ подъ водою, и хоботкомъ своимъ проворно ищущъ червячковъ, или всплывающъ на поверхность воды, особливо въ хорошую погоду, гдѣ играютъ, дѣлая многоразныя движенія; во время зимы они сидящъ въ своихъ норахъ и не окоченѣваютъ, подобно другимъ животнымъ, въ норахъ живущимъ. Хотя въ сіе время воды покрыты бываютъ льдомъ, но для жизни ихъ довольно оснается воздуха, въ норахъ ихъ находящагося. Поелику же они не могутъ жить совершенно безъ воздуха, то въ зимнее время часто случается вынаскивать ихъ изъ воды мерзвыхъ.

Выхухоли питаются пиявками и разными личинками водяныхъ и другихъ насекомыхъ. Время ихъ любви и беременности неизвѣстно, а равно и то, во сколько они родящъ дѣтей.

Г. Палласъ держалъ нѣсколько времени выхухолей живыми, и мы ему обязаны лучшими свѣдѣніями о сихъ страннѣхъ животныхъ (*).

Г. Палласъ пишетъ, что онъ не могъ довольно надивиться беспре-
спаннымъ и скорымъ, хотя несклад-
нымъ движеніямъ живыхъ выхухолей.
Особливо хоботокъ ихъ въ безпрерыв-
номъ находящся движеніи, и съ чрез-
вычайною скоростію обращается во всѣ
споронны. Животное, по видимому,
употребляетъ его орудіемъ осязанія и
обонянія, ибо всѣ предметы, ему по-
падающіеся, хоботкомъ своимъ ошущи-
ваетъ; но слухъ и зрѣніе имѣетъ не
очень хорошія. До какой бы часни се-
го животного ни допронуться, оно
шотчасъ обращаетъ въ ту сторону
свой хоботокъ, и весьма не любитъ,
когда ударишь его по сей часни.

Когда будешь держашъ выхухоля
безъ воды, то онъ всегда находится

(*) Acta Academ. scientiar. imperial. Petropolit.
pro anno 1781, pars posterior, pag. 319 et
seqq.

въ чрезвычайномъ безпокойствѣ, и всячески стараешся уйти изъ клѣшки, но по приливѣ воды, какъ бы освѣжаешся, и разныя въ водѣ дѣлаешъ движенія, особливо своимъ носомъ. Иногда спавшійся онѣ и на заднія лапки. Хоботокъ свой часто приближаешъ ко рту, или вложивши его въ ротъ, очень скоро облизываешъ языкомъ, и, кажешся, такимъ образомъ, по замѣчанію *Палласа*, выхухоль пьетъ воду. Равномѣрно и брошенныхъ въ воду червячковъ подбираешъ хоботкомъ и вкладываешъ въ ротъ. Когда оставляли выхухоля въ покоѣ, то онѣ почти безпрестанно лежалъ на боку, или опершись на переднія лапки заднею лапкою, чесалъ себѣ бока и брюхо. Заднія лапки такъ у него подвижны, что онѣ можешъ доставать ими даже до креснца; хвостъ напрошивъ шого мало движенія и всегда почти лежишъ согнушъ въ видѣ серпа.

Вода, въ которой жили выхухоли, шончасъ получала запахъ мускуса, и надобно было ее очень часто пере-

иѣннѣе. Выхухоль ввечеру, даже и безъ воды, ложись спать; въ семъ случаѣ онъ свершывается въ кружокъ, и хоботокъ кладетъ между лапокъ, и во снѣ часто перемѣняетъ свое положеніе.

Шкурки выхухолей хотя и красивы, но по причинѣ тяжелаго запаха не употребляются на дѣланіе шубъ, но иногда только на опушки шапокъ и плутовъ; высушенной хвостъ, по причинѣ его крѣпкаго мускусоваго запаха, кладутъ въ сундуки между плащемъ для прогнанія моли. Пахучая жидкость, сообщающая животному сей запахъ, отдѣляется въ особыхъ пузырькахъ, лежащихъ близь корня хвоста, и чрезвычайно долгое время сохраняетъ сей запахъ, даже лѣтъ двадцать и болѣе; по сему и неудивительно, что сомъ и другія большія рыбы, проглотившія иногда выхухоля, такъ сильно пахнутъ мускусомъ, что ихъ въ пищу употреблятъ не можно.

Ся пахучая жидкость, можетъ быть, имѣетъ и лѣкарственныя силы; ибо Калмыки употребляютъ ее въ бо-

лѣзняхъ мозга и чувственныхъ жилъ не только для нюханія, но и внутрь. Весьма желательна, чтобы наши Врачи обратили на сіе вещество свое особенное вниманіе. Можеть бысть оно замѣнило бы Кабардинскую спрую, или бобровую, или Цибешовую, которыя очень дороги.

Выхухолей рѣдко нарочно ловящъ, но они попадаются часто въ сѣняхъ вмѣстѣ съ рыбою.







Sciurus striatus *Dypipodys*

Б У Р У Н Д У К Ъ.

Sciurus striatus, flavus, striis quinque
fuscis longitudinalibus. LINN. -

GMEL. *Syst. Nat.* T. I. p. 150.

Gestreiftes Eichhorn. SCHREB. *Säugeth.*

T. 4. p. 799.

Ecureil Suisse. BUFF. *Hist. Nat.* X. p.
126.

Striped Dormoise. PENN. *Hist.* p. 422.

~~Бурундуки~~ водятся только въ
странахъ холодныхъ. Обширные лѣса
Губерній: Архангелогородской, Вятской,
Пермской и всей Сѣверовосточной Сиби-
ри до Охотска и Камчатки, доста-
вляютъ убѣжище симъ маленькимъ
звѣркамъ, живущимъ въ норахъ подъ
корнями деревьевъ и въ пусныхъ дре-
весныхъ дуплахъ.

Звѣрокъ сей поменьше обыкновен-
ной бѣлки. Голова у него продолгова-
та и съ боковъ нѣсколько сжата. Во
ршу находящаяся особые защечные мѣ-

шечки, въ которыхъ онъ приноситъ
разныя сѣмена въ свою нору. Онъ не
имѣетъ на ушкахъ длинныхъ пучечковъ
волосъ, примѣчаемыхъ у бѣлокъ; хвостъ
короче, нежели у бѣлки, и не такъ пу-
шистъ. На переднихъ лапкахъ имѣетъ
по 4 пальца съ бородавкой, а на зад-
нихъ по 5 пальцевъ.

Шерсть на немъ коропенькая,
пѣжная, желповатая; вдоль спинки
идушь пять черноватыхъ полосъ; ниж-
няя часть шеи и брюхо бѣловатое, а
хвостъ сѣровато-черноватъ.

Бурундуки питаются особливо ке-
дровыми и сосновыми орѣшками, березо-
выми сережками и разными сѣменами
расшѣній. За пищу выходятъ днемъ,
и собираюшь зерна какъ на землѣ, бѣ-
гая очень проворно, такъ и на дере-
вьяхъ, на которыхъ взбѣгаюшь легко, и
даже перепрыгиваюшь съ одного дерева
на другое.


Звѣрки сіи зимою спятъ долго,
но не проводятъ цѣлой зимы во снѣ,
почему и собираюшь на зиму запасъ,
состоящій большею частью изъ кедро-

вѣхъ орѣшковъ. Звѣриные промышленники вынимаютъ иногда изъ ихъ норъ по 8 и 10 фунтовъ сего запаса. Бурундуки очень чувствительны къ переменѣ погоды и извѣщаютъ сіе произвольнымъ свистомъ. Они понимаются два раза въ годъ, и родятъ по 3 и 4 дѣтеныша.

Ловятъ ихъ силками, ловушками и стрѣляютъ шупыми стрѣлами, для ихъ шкуркъ, котпорыя, будучи сшиты вмѣстѣ, составляютъ красивые мѣха, хотя не очень теплые. Употребляютъ ихъ также на зимнія рукавицы и другія подѣлки; ошущаются онѣ и на продажу Китайцамъ въ Кяхту. Кромѣ людей, преслѣдуютъ сихъ звѣрковъ куницы, горностаи, ласки и хищныя птицы.

Звѣрки сіи не очень дики и легко дѣлаются ручными, даже спарые, и могутъ размножаться въ домахъ, въ которыхъ невыгодно впрочемъ держатъ ихъ пошому, что они порятъ всякую мебель и платье, грызутъ даже самыя сѣны.









Uruba Epops. Godd.

У Д О Д Ъ.

Кр. Рыболова

Upupa epops, crista variegata. LINN.

G MEL. Syst. Nat. T. I. p. 466.

Wiedehopf. *BECHSTEIN Ornithol. Taschenb. T. I. p. 75.*

Нуре ou puput. *BUFF. Hist. Nat. des ois. VI. p. 459.*

Hoop or Neopoe. *Arctic. Zool. II. p. 283.*

Сія красивая, но нечислоплошная птвичка водится по всей Россіи и Сибири. Она величиною поменьше галки; кліовъ имѣетъ длинной, нѣсколько загнутый внизъ, чернаго цвѣту; ноздри очень маленькія. На головѣ у ней находится хохолокъ изъ красноватыхъ перьевъ, имѣющихъ черныя кончики. Хохолокъ сей птвички по ея волѣ можетъ подниматься вверхъ и опускаться внизъ. Голова ея, шея и грудь красно-

вашаго цвѣту, а крылья и хвостъ бѣловашныя съ черными пятнами и полосками. На самкѣ цвѣтъ гораздо блѣднѣе, нежели на самцѣ.

Удоды рѣдко живутъ въ густотѣ лѣсовъ, но большею частію по перелѣскамъ, лугамъ и полямъ. Пишущаяся дождевыми червями, кузнечиками, навозными жуками и другими насѣкомыми, копорыхъ они находятъ въ землѣ, на водѣ и даже на мерзвыхъ тѣлахъ.

Удоды вьютъ гнѣздо въ древесныхъ дуплахъ, въ щеляхъ старыхъ снѣговъ, и даже въ навозѣ, и изъ матеріаловъ весьма нечистыхъ, отъ чего какъ гнѣздо, такъ и сами они пахнутъ дурно. Они понимаются одинъ разъ въ годъ, и кладутъ въ гнѣздо по два и по четыре яйца пепельнаго цвѣта, на копорыхъ сидятъ двѣ недѣли съ лишнимъ. На зиму улетають въ страны теплѣйшія.

Птичка сія смирна и не очень дика, но пойманная и запертая въ клѣшкѣ скоро умираетъ. Она бѣгаетъ по землѣ очень проворно, но


если свиснуть, то вдругъ оспанавли-
ваеяся, приподнимаея въ свой хохолокъ
вверхъ и озираеяся вокругъ. Полетъ
ея плавной; она кричитъ: *гуль, гуль,*
или *гуль, гуль.* *(чирокъ)*

Пшичка сія не только безвредна,
но приноситъ еще большую пользу
исстребленіемъ множесва вредныхъ
насъкомыхъ.

Мясо ея, какъ нечистое, было за-
прещено нѣкогда Іудеямъ употреблять
въ пищу; но въ Италіи ѣдятъ его,
а особливо осенью, когда сіи пшички
дѣлаются очень жирными (*). Въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ Россіи называютъ ее
золотой лукою.



(*) *Europäische Fauna*, von Goeze, IV B. p. 397.







Scolopax rusticola. Рыжикъ лѣсной.

ЛѢСНОЙ КУЛИКЪ. *Млн Служка*

Scolopax rusticola, rostro recto basi rufescente, pedibus cinereis, femoribus tectis, fascia capitis nigra. LINN.-GMEI. *Syst. Nat.* T. I. p. 660.

Waldschner *Europäische Fauna v. GOEZE.* T. VI. p. 85.

Becasse. BUFF. *Hist. Nat. des ois.* VII. p. 462.

Woodcock. LATH. *Syn.* III. p. 129.

Кулики отличаются отъ другихъ птицъ длиннымъ своимъ клювомъ, котораго верхняя челюсть нѣсколько длиннѣе нижней, и на концѣ имѣетъ небольшую выпуклость. Голова у нихъ съ боковъ какъ бы сдавлена, глаза большіе, и находящаяся близь запылка, отъ чего физиогномія ихъ кажется довольно глупою.

Лѣсной куликъ величиною меньше куропадки; онъ весь пестрой,

сверху имѣетъ пятна и полосы сѣрыя, черныя и рыжія, а снизу по сѣрому полю поперечныя темныя полосы; хвостъ сверху темный, а снизу бѣлый. Отличительный же признакъ его составляютъ четыре поперечныя широкія чернаго цвѣту полосы, находящіяся на задней части головы. Кліювъ у кулика красноватъ; ноги темныя, а когти черные.

Птицы сіи любятъ сырыя мѣста, особливо кустарники, лежащіе около болотъ и топкихъ мѣстъ; но водяныя и по снѣгамъ, хотя въ меньшемъ количествѣ, по всей Россіи и Сибири; на зиму улетають въ мѣста теплѣйшія. Онѣ рѣдко стадами собираются, но живутъ всегда попарно или поодиночкѣ, лешають большею частью по ушрамъ и вечерамъ, а дни проводятъ въ лѣсахъ и кустарникахъ, особливо гдѣ валяется по землѣ много сухихъ листьевъ. За пищею, состоящею въ червяхъ, улиткахъ и разныхъ наѣкомыхъ, выходятъ только по ночамъ въ болотныя, просѣнки и осокою поросшія мѣста. Онѣ питаются

также съменами растѣній и молоденькими шравками и кореньями.

Пшаницы сіи съ шрудомъ поднимающся съ земли, и на лешу производяшъ небольшой шумъ. Хотя онъ и быспролетаютъ, но не высоко и не долго. Онъ опускающся на землю съ такою быспрошою, что, по видимому, падаютъ единственнo по своей тяжести, и потчасъ убѣгаютъ съ мѣста, на которое опустились, почему и не лзя найши ихъ шумъ, куда онъ, кажется, опустились. Хотя ноги у нихъ высоки, но когда онъ бѣгутъ, то кажется, что брюхомъ касаются земли.


Пшаницы сіи дѣлаютъ себѣ гнѣзда въ кустарникахъ и болотныхъ мѣстахъ, близъ корня какого-нибудь дерева, или близъ кочки на голой землѣ, изъ сухихъ листьевъ и шравъ, безъ всякаго искусства. Въ такомъ гнѣздѣ самка кладетъ отъ 4 хъ до 5 сѣро-красноватыхъ яицъ съ темными крапинами, величиною съ голубиныя. Вышедшіе изъ яицъ цыплята потчасъ начинаютъ бѣгать съ матерью. Самецъ, пока дѣти со-

вершенно не выросшупѣ, не покидаешѣ самки, да и во время сидѣнія самки на яйцахъ находишся близъ нее; впрочемъ самцы очень ревнивы, и за самокъ дерущся жестоко. Удивитель-но, что кулики, по природѣ очень пугливые, во время сидѣнія на яйцахъ допускаютъ подходить къ себѣ близ-ко, не прогаясь съ мѣста, по свидѣ-тельству *Смита*.

Птицы сіи бывающѣ очень жирны осенью, и имѣющѣ довольно вкусное мясо, которое приномѣ долго можешѣ хранишся не поршишся. *Соннини* гово-ришѣ, что люди, любящіе хорошо поѣсти, знаютъ время, когда мясо сихъ птицѣ получаешѣ пошѣ вкусѣ, которой имѣ нравишся: птицу сію берушѣ за среднее перо хвоста и поднимающѣ ее такимѣ образомѣ вверхѣ; когда она опорвеш-ся, то это знакѣ, что пора ее ѣсти. Молодые кулики, по мнѣнію ихѣ, имѣ-ющѣ мясо нѣжнѣе, но не такѣ вкус-ны, какѣ старыя (*).

(*) Nouveau dictionnaire d'Histoire Naturelle
T. III. p. 79.

лѣ
ки
е ;
за
ь
нь
кв
з
ѣ
ы
ое
лѣ
о
г,
дѣ
лѣ
ее
лѣ
п-
ь.
ѣ-
с-
лѣ





Munpato.

Scomber scomber.

МАКРЕЛЬ.

Scomber Scomber, pinnulis quinque.
LINN.-GMEL. Syst. Nat. T. I. p.
1328.

Mackrelle. *BLOCH Naturg. d. Fische.*
Th. II p. 88.

Le Maquereau. *Ibidem.* p. 94.

The common Mackrel. *PENN. Brit.*
Zool. III. p. 264.

Макрель отличается отъ всѣхъ своего рода рыбъ пятью маленькими плаванельными перьями, находящимися у ней между спиннымъ перомъ и хвостовымъ, и между брюшнымъ перомъ и также хвостовымъ.

Голова у сей рыбы длинная, да и все нѣло продолговатое, и къ хвосту очень тонкое; ротъ великъ и усаженъ мѣлкими острыми зубами, находящимися даже по краямъ неба; нижняя челюсть нѣсколько длиннѣ верхней.

Глаза большіе черные, а радужная перепонка серебристая; они бывающъ во

всю зиму закрышы особливо кожицею, весною пропадающею. Жаберныя крышечки состоянѣ изъ шрехъ косточекъ. Туловище покрыто мѣлкими и нѣжкими чешуйками; боковая линей иденѣ близь спины. Рыба сія величиною бываетъ въ поларшина и болѣе. Верхняя часть головы, запылокъ и спина черноватаго цвѣта съ поперечными полосками, а иногда синеватаго; такого же цвѣту и продолговатая пята, находящаяся пониже боковой линии. Бока, голова и туловище, а также и брюхо серебристаго цвѣта. Плавашельныя перья строватныя; въ боковыхъ плавашельныхъ перьяхъ находится по 20 косточекъ, въ грудномъ перѣ 6, въ брюшномъ 13, въ хвостовомъ перѣ луновидномъ 20, и въ обоихъ спинныхъ перьяхъ по 12 косточекъ.


Макрель водится въ Балтійскомъ морѣ, около береговъ Курляндскихъ, Лифляндскихъ и Эстляндскихъ, а также въ Черномъ морѣ, около Крыма.

Рыбы сіи зимою живутъ во глубинѣ морей, а весною поднимающя больша-

Куликовъ стрѣляютъ для снола
изъ ружей, особливо по вечерамъ, ког-
да они выходятъ искашь себѣ пищи,
и по утрамъ, когда они возвращаютъ
ся въ свои убѣжища. Ловятъ ихъ такъ
же сѣтями и силками.

Яица сихъ пшицъ также очень
вкусны, и пошому гдѣ онѣ въ изоби-
лїи водяшся, шамъ ихъ собираютъ для
снола.





M
A
O
I
B
R
R
C
I
M
S


ми стадами, и плывутъ къ берегамъ для метанія икры и для полученія обильнѣйшей пищи. Онѣ чрезвычайно прожорливы и питаются всѣмъ, что имъ ни встрѣшится, даже бросаются на мерзвыя шѣла людей, въ моряхъ попадающіяся; но любимая пища ихъ состоитъ въ сельдахъ, которыхъ онѣ преслѣдуютъ съ великимъ оспервентіемъ, равно какъ и другихъ мѣлкихъ рыбокъ. Впрочемъ онѣ не очень живущи, ибо, попавшись на удку, или даже ударившись сильно объ сѣти, пошчасъ умираютъ.

Макрель очень вкусна, почему и употребляютъ ее въ пищу, приготавливая разнымъ образомъ. Въ Италіи ее маринуютъ, а въ Англіи солятъ также многообразно, въ Шотландіи приготавливаютъ ее подобно сельдямъ. При всемъ томъ рыба сія, будучи очень жирна, для слабыхъ желудковъ неудобоварима.

Ловятъ сихъ рыбъ удками, употребляя для приманки маленькихъ, или уже испортившихся сельдей, или ку-

сокъ другой какой-либо рыбы, или кусокъ мяса. Ловящъ ихъ и сѣтями, для чего рыболовы втыкающъ колъ въ песокъ, недалеко отъ берега; къ сему колу привязываютъ одинъ конецъ сѣти, а другой конецъ держатъ на лодкѣ, съ копорю отъ берега отбѣзжаютъ такъ далеко, сколько позволяетъ длина сѣти, и сдѣлавши сѣтью полукружіе къ берегу, по данному знаку выпаскиваютъ ее; на такой ловлѣ случается иногда добывать отъ 400 до 500 рыбъ. Ловля бываетъ особливо удачна во время сильного вѣтра; ловящъ ихъ сѣтями и ночью при свѣтѣ факеловъ.

Макрель, только лишь вышавшая изъ моря, издаетъ фосфорической свѣтъ, копорой по прошествіи нѣсколькихъ часовъ пропадаетъ.



ЛНБ, МКН-5420

61889-58

ИЗОБРАЖЕНІЯ
И
ОПИСАНІЯ
ЖИВОТНЫХЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ,

ИЗДАВАЕМЫЯ

ИВАНОМЪ ДВИГУВСКІМЪ.

. Optamus
Fumum de patriis videre fociis,
Nescio, qua natale solum dulcedine captos
Ducit

OVID. Epist. III. ex Ponto 34—36.

МОСКВА.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ.

1817.


Издатель позволяет, съ представле-
ніемъ 5 экземпляровъ въ Ценсурный Ко-
митетъ для казенныхъ мѣстъ. Москва,
Декабря 21 дня, 1817. О. П., Надежный
Совѣтникъ и Кавалеръ Левъ Цѣтасевъ.

ИЗОБРАЖЕНІЯ
и
ОПИСАНІЯ
ЖИВОТНЫХЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.



№ 11.

ESSEX COUNTY
OF MASSACHUSETTS
THE BOARD OF
SCHOOL SUPERVISORS
OF THE
TOWN OF



Canis lagopus. Steud. Hecurus.



ПЕСЕЦЪ.

CANIS LAGOPUS, cauda recta, pal-
mis plantisque pilosissimis. LINN.-
GMEL. *Syst. Nat.* T. I. p. 75.
ДВИГУБСК. Краткое описание
животныхъ четвероногихъ Рос-
сийскихъ стр. 36.

Steinfuchs. SCHREBER. *Säugethiere.*
III. 362.

L'Isatis. BUFF. *Hist. Nat.* XIII. p.
72. 260. (#)

The arctic fox. PENN. *Synops. quadr.*
p. 155.

Песець видомъ своимъ походитъ на ли-
сицу, но меньше ея. Рыло у него не такъ
острое какъ у лисицы; уши короче, и при-
помъ кругловатыя. Живошныя сіи жи-
вушъ въ самыхъ холодныхъ, безлѣсныхъ
и гористыхъ пустыняхъ Сѣверныхъ, по-
крытыхъ всегдашнимъ почти снѣгомъ;
для перенесенія большой въ сихъ спра-

1
A. Voy. Hist. net de Buffon
p. 260. ou il décrit que M. Paul
Schmidoff, Ruffien Monsieur de
desman de l'Isatis.

нахъ спужи, Природа снабдила ихъ очень нѣжною и чрезвычайно густою шерспью; даже спупни ногъ ихъ покрышы весьма длинною шерспью.

Песцы водяшыя вдоль всего берега Ледовитаго моря, начиная отъ Колы даже до Чукошкаго носа, по берегамъ Восточнаго океана, на Новой Землѣ, на Беринговыхъ и другихъ островахъ Восточнаго моря. Они живутъ въ каменныхъ ущеліяхъ, въ земляныхъ норахъ, которыя или сами для себя выкапываютъ со многими выходами, или занимаютъ норы, другими звѣрями выкопанныя; обыкновенно въ шаковыхъ норахъ бываетъ по два песца, а иногда по 3 и по 4.

Цвѣтъ шерспи на песцахъ бываетъ различной, смотря по ихъ возрасту и по временамъ года: попадающа песцы дымчашые, желшовашостѣрые, желшовашые и совершенно бѣлые. Песцы бѣгающа весной рано, п. е. въ мѣсяцъ Маршъ; самки бываютъ беременны 9 недѣль и родятъ отъ 6 до 8 щенковъ; на однихъ изъ сихъ щенковъ

шерсть бываетъ корошкая рыжеватая, которая въ послѣдствіи времени перемѣняется въ бѣлую (песцы бѣлые); на другихъ же бываетъ черноватая, перемѣняющаяся со временемъ въ дымчатую (песцы голубые.) Таковыя песцы, какъ скоро начинаютъ выходить изъ своихъ норъ, называются *норниками*.

Четырехмѣсячные песцы спановятся уже бѣлыми, кромѣ сѣрой спины и части, лежащей при лопашкахъ, гдѣ сѣрая полоса пересѣкаетъ сѣрую же полосу спинную, почему и называютъ ихъ въ сіе время *крестовиками*. У голубыхъ песцовъ также въ сіе время спина и надлопашная часть и мѣютъ сѣрой цвѣтъ. Къ концу Октября песцы спановятся одноцвѣтными; но шерсть ихъ не получаетъ еще надлежащей длины и мягкости, почему и называютъ ихъ *недопесцами*; въ Декабрѣ же мѣсяцъ они получаютъ совершенную ось, и тогда называются просто *песцами* или *рослопесцами*. Весною песцы линяютъ, и называются *вешняками*.

Песцы хотя очень похожи на лисицъ, но не такъ хитры; и голосъ ихъ совершенно онъ лисьяго ошмненъ, ибо онъ толще и сиповаше; иногда они воююшъ подобно собакамъ.

Живошныя сіи питаюшся разными породами мышей, а особливо песпрушками, за кошорыми часто далеко онъ обыкновенныхъ своихъ жилищъ ошходяшъ, такъ что жилища близкихъ къ Ледовитому морю мѣстъ всегда заключаюшъ о хорошемъ или худомъ ловѣ песцовъ, по появляющемуся количеству песпрушекъ. Кромъ мышей ѣдашъ они также зайцовъ, гусей, ушокъ, куроштокъ, а въ случаѣ недостатка другой пищи и рыбу, выбрасываемыя на берега моря раковины и мершвыхъ живошныхъ, а иногда и ягоды расшвнй.

Песцы, не познавшіе еще могущества человека, такъ бываюшъ ошважны, что на необитаемомъ Беринговомъ островѣ, по свидѣшельству Г-на *Стеллера*, входили даже въ жилище его и его спушниковъ, уносили все, что

и только могли, не только съѣстные припасы, но и другія вещи въ пищу не употребляемыя, даже съ спящихъ людей уносили колпаки, бобровыя шкуры, кошорыми они одѣвались, и проч., беспокоили ихъ днемъ и ночью, не взирая на то, что ихъ множество убивали палками, и различнымъ образомъ мучили.

Песцы, будучи взяпы молодыми, легко и скоро привыкающъ къ человѣку и дѣлающя весьма ручными.

Песцовъ, для ихъ весьма теплой и красивой шкурки, ловящъ силками, петлями, спрѣляющъ изъ луковъ, выкуривающъ дымомъ, выкапывающъ лопатками изъ норъ, въ какомъ случаѣ, если поскребешь при опверснїи норы, то песецъ, кроющійся въ норѣ, тошчасъ подасъ голосъ; если же никакого голоса не будетъ, то это знакъ, что нора пустая. Таковою ловлею занимающя множество Сибирскихъ охотниковъ.


Красивые, мягкіе и теплые мѣха изъ сихъ животныхъ весьма уважающя, почему и сосшавляющъ немало важный предметъ шорговли не только

ко внутренней, но и заграничной; особливо много иделъ ихъ въ Китай.

Голубые песцы дороже бѣлыхъ, и чѣмъ они цвѣномъ темнѣе, тѣмъ дороже. Сверхъ шкурки, употребляемой на мѣха, мясо песцовъ употребляется въ пищу разными, близъ Ледовитаго моря кочующими народами.



7
0
1
1
0





Cricetus songarus. Камысь Зюнгорский.

ХОМЯКЪ ЗЮНГОРСКІЙ.

Cricetus Songarus, corpore cinereo, linea spinali nigra, lateribus albo fuscoque variis, ventre albo. *FISCH. Zoognos.* III. p. 54. ДВИГУБ. Кратк. описан. живот. четвероп. Россійск. стр. 46.

Mus Songarus, buccis sacculiferis, dorso cinereo, linea spinali nigra, lateribus albo fuscoque variis, ventre albo. *LINN.-GMEL. Syst. Nat.* T. I. p. 139.

Fleck-Maus *SCHREB. Säugthier.* IV. p. 709.

Сей красивой звѣрокъ бываетъ длиною не болѣе двухъ вершковъ съ половиною. Голова у него шолшая, корошенькая, усы густые, зубы передніе желтые. Уши овальныя съ складками. Во рпу находящая зашеч-

ные мѣшечки, простирающіеся даже до плечъ; въ сіи-шо мѣшечки собираешъ животное пишу и въ нихъ привошишь въ свою нору. Туловище у него корошкое; на переднихъ лапкахъ по 4 пальца, большой палецъ безъ когтя; на заднихъ лапкахъ по 5 пальцевъ. Хвостъ очень корошкой, тупой и цвѣтомъ бѣлой.

Спина у сего звѣрка пепельнаго цвѣту съ черною полосою, отъ зашылка идущею къ хвосту; бока имѣющъ бѣловашья и шемныя пятна; брюхо бѣлое, ноги также бѣловашья.

Звѣрокъ сей водится по сухимъ солянымъ и песчанымъ степямъ Зюнгорскимъ и Монгольскимъ и въ полуденныхъ странахъ около рѣки Иртыша, гдѣ роетъ для жишья себѣ глубокія норы со многими закоулками. Пойманный скоро дѣлается ручнымъ. За пищею, соспоющею въ разныхъ расщѣніяхъ и сѣменахъ ихъ, бѣгаетъ днемъ.

Самки въ Іюнь мѣсяцѣ родящъ по 6 и 7 дѣтенышей.







Coracias garrula. L. Cuboboponka

СИВОВОРОНКА.

Coracias garrula, caerulea, dorso rubro, remigibus nigris. LINN.-GMEL. Syst. Nat. T. I. p. 378.

Blaue Racke. BECHSTEIN ornithol. Taschenb. T. I. p. 96.

Rollier d'Europe. BUFF. Hist. Nat. des ois. III. p. 135.


Roller. Arctic. Zool. II. p. 253.

Сивоворонка принадлежитъ къ числу красивѣйшихъ птицъ не только Россійской Имперіи, но и всей Европы. Перья ея блещутъ изумрудами и аметистами. Клювъ у ней черенъ; голова, шея и нижняя часть шѣла зеленого цвѣту, больше или меньше свѣтлаго; папороточныя перья крыльевъ фіолетоваго цвѣту; а самыя крылья черныя съ зеленоватымъ по краямъ отливомъ. Спина покрыта рыжеватыми перьями; хвостъ свѣтлозеленой съ фіолетовою свисподи широкою полосою, ноги желтоватыя. Вся птица величиною съ галку.

Сивоворонки водятся по всей Рос-
еи Южной и умѣренной, и очень рѣд-
ки въ странахъ холодныхъ; на зиму
улетаютъ въ страны теплѣйшія. Въ
лѣсахъ мѣсягахъ, гдѣ много березовыхъ
лѣсовъ, можно видѣть сивоворонокъ въ
большемъ количествѣ, ибо птицы сіи
преимущественно вьютъ гнѣзда на
березахъ; въ такихъ гнѣздахъ самки
кладутъ отъ 4 хъ до 7 бѣлыхъ яицъ.

Молодые сивоворонки до перваго линя-
нія имѣютъ перья сѣропато - зеленія.
Птицы сіи большею частію живутъ
въ густыхъ лѣсахъ; питаются раз-
ными насѣкомыми, особливо жуками
въ навозѣ живущими, кузнечиками,
саранчею и проч.; полетъ ихъ быстръ.
Голосъ ихъ похожъ на кваканье лягу-
шекъ. Онѣ очень пугливы и ручными
сдѣлать ихъ не легко; однакожъ иног-
да держатъ ихъ въ домахъ для красо-
ты ихъ перьевъ; ибо онѣ такъ кра-
сивы, что въ томъ ни мало не уступа-
ютъ попугаямъ и другимъ иностран-
нымъ птицамъ.







Murieana Anguilla. L. G. G. G.

У Г О Р Ъ.

Muraena Anguilla, maxilla inferiore longiore, corpore unicolore. LINN.-G MEL. Syst. Nat. T. I. p. 1132.

Der Aal. BLOCH Deutschlands Fische. T. III. p. 4.

Anguille. BLOCH ibidem p. 16.

The Eel. Brit. Zool. III. p. 142.

Рѣки, впадающія въ Балтійское море и въ море Бѣлое, изобилуютъ угрями; попадаются они также въ Сибири въ рѣкахъ Тоболѣ и Исени. Всѣ вообще угри отличаются отъ другихъ непрерывъ рыбъ своимъ шуловищемъ, на змѣиное похожимъ; описываемаго же здѣсь угря, отъ прочихъ среднихъ съ нимъ весьма легко отличить, по его одноцвѣтному зеленоватому безъ пятенъ шуловищу.

Голова у него продолговатая оспрая; ротъ маленькой съ мѣлкими зубами, гла-

за маленькіе, покрышые кожею, радужная перепонка золотистаго цвѣту. Туловище длинное, по бокамъ нѣсколько сжатое; боковыя плавательныя перья снабжены 19ю косточками; брюшныя, спинныя и хвостовыя имѣютъ по 100 косточекъ. Кожа на угрѣ слизкая, очень крѣпкая и покрыта чрезвычайно мѣлкими чешуйками, которыя можно видѣть только на угрѣ высохшемъ. Цвѣтъ на угряхъ, смотря по водѣ, въ которой они живутъ, переменный. Угри, живущіе въ тинистыхъ рѣкахъ, черны съ желтоватымъ брюхомъ; а въ рѣкахъ, имѣющихъ песчаное дно, зеленоваты съ брюхомъ серебристымъ.

Угри бывающъ длиною около аршина, иногда попадаются, хотя очень рѣдко, въ два аршина. Угри принадлежатъ къ хищнымъ рыбамъ, но по причинѣ малаго отверстія рта, пожирающъ только маленькихъ рыбокъ; питаются также водяными насекомыми, и даже выходятъ изъ рѣкъ искашь на лугахъ червей и сѣмень чечевицы. За пищу они выходятъ

только по ночамъ, а днемъ лежатъ зарывшись глубоко въ шнѣ.

Угри весьма живучи; ихъ можно живыхъ пересылать въ далекія мѣста; надобно только обвернуть ихъ пра-вою, или проспаникомъ. При всемъ помъ они не терпятъ ни большой стужи, ни великаго жару; почему при концѣ осени зарываются въ рѣчную шину и не прежде весны выходятъ вонъ.

Угри размножаются очень сильно. Ихъ ловятъ сѣтями и другими снарядами, употребляя для приманки ихъ маленькихъ сельдей, гольцовъ, пискарей, плотву и другихъ маленькихъ рыбокъ. Удачнѣйшая ловля угрей бываетъ ночью въ мушной водѣ и при дурной погодѣ.

Угри составляютъ весьма вкусную пищу, хотя не очень здоровую и удобоваримую. Ихъ отвариваютъ съ солью, пряными вещами и уксусомъ, употребляютъ и жареныхъ; сверхъ того солятъ и коптятъ. Кто хочетъ разводять угрей въ прудѣ, тотъ долженъ имѣть большой прудъ съ песчанымъ дномъ и

сверхъ того свѣжую пекучую воду. По словамъ *Плинія*, угри привыкаютъ такъ къ человеку, что изъ рукъ его берутъ пищу.

Кожа изъ угрей въ нѣкоторыхъ мѣстахъ употребляется въ окна, вмѣсто стеколъ, можетъ также служить вмѣсто пузырей и веревокъ.



.
-
b
o
-
-
b



Aranca tarantula
Muzupb.

М И З Г И Р Ь.

Aranea tarantula, abdominis dorso maculis trigonis nigris, pedibus nigro maculatis. LINN.-GMEL. *Syst. Nat.* T. I. p. 2956.

Tarantelspinne. GEORGI *geographisch. physicalische und naturhistorische Beschreibung d. Russischen Reichs.* T. III. p. 2171.

L'araignée Tarentule. *Hist. Nat. des insectes par TIGNY.* T. X. p. 268.

Насѣкомое сіе, нѣкогда сполько славное по своимъ ядовитымъ угрызеніямъ и по способу лѣченія угрызенныхъ имъ музыкою, названное по имени города Тарента въ Италіи, близь котораго оно во множествѣ находится, естъ и въ Россіи, и извѣстно подъ именемъ мизгиря.

Оно живеть въ маленькихъ земляныхъ норкахъ по солончакамъ около Хер-

сона и Азова, около моря Каспійскаго, по степямъ Куманскимъ и Киргизскимъ, въ Сибири по Алтаю и въ Даурии.

Мизгирь бываетъ длиною около вершка и болѣе; онъ весь мохнатой. Грудь у него продолговатая, пепельнаго цвѣту, съ черными полосками, копорыя лучеобразно сходятся на срединѣ спинки. Глазъ у него 8, изъ копорыхъ чешыре побольше и чешыре поменьше. Брюхо овальное пепельнаго цвѣту съ искорками. Иподъ шѣла весь чернаго цвѣту. Кусательныя орудія во рпу и усики желтоватые съ черными кончиками. Ноги сверху пепельнаго цвѣту, снизу испещрены черными полосками и почками; самка больше самца.

Мизгири не дѣлаютъ паутины, но, какъ выше сказано, живутъ въ землѣ въ перпендикулярно вырытыхъ цилиндрическихъ норкахъ отъ 3 до 6 вершковъ глубины, и копорыхъ стѣны устланы особою паушиною пленкою, препятствующею землѣ обваливаться. Они обыкновенно сидятъ при

опверснїи своей норы и увидѣвши какое-нибудь насѣкомое, тотчасъ бросающа на него, схватывающъ клещами (кусательными орудїями), уносящъ въ свою нору и сѣдаютъ совѣмъ, отбрасывая однѣ только самыя швердья части. Если самыхъ мизгирей нѣсколько запереть въ банку, то сильнѣйшіе изъ нихъ поядаютъ слабѣйшихъ, пока останется одинъ. Г. Фалкъ къ мизгирю, находившемуся въ банкѣ, впускалъ живыхъ мухъ, кошорымъ мизгирь не дѣлалъ никакого вреда; но мухи очень скоро умирали, и тогда мизгирь высасывалъ ихъ такъ, что оставалась отъ нихъ одна только шелуха (*).

Мизгирь въ нашихъ степяхъ имѣетъ страшнаго непрїателя въ насѣкомомъ, называемомъ *бихорхо* (*Phalangium araneoides*), кошораго одного одолѣваетъ мизгирь и сѣдаетъ;

(*) Beitr. z. topogr. Kenntn. d. Russ. Reich. T. III. p. 444.

но если случатся бихорхо нѣсколько вмѣстѣ, то они одолавають мизгири и свѣдаютъ (*).

Самка кладетъ лѣпомъ множественно яицъ, весьма похожихъ на маковыя бѣлыя зерна. Она кладетъ ихъ въ гнѣздо, сдѣланное изъ бѣлой плотной паутины, которое прикрѣпляетъ къ своему брюху, и вездѣ съ нимъ бѣгаетъ; какъ скоро маленькіе мизгири выведутся, то самка прогрызаетъ гнѣздо, изъ котораго они выходятъ, и до первой перемѣны ихъ кожицы живутъ на спинѣ у матери, которая и кормитъ ихъ до шѣхъ поръ, какъ они сдѣлаются въ состояніи вырывать себѣ норы и промышлять пищу.

Мизгири умираютъ при концѣ лѣта, а иногда зиму проводятъ въ состояніи оцѣпенѣнія въ своей норѣ, которой отверстіе плотно закупориваютъ, и не прежде выходятъ изъ нее весною, какъ уже сдѣлаются очень тепло.

(*) *Georgi Besch. d. Rufs. Reichs. T. III. p. 2172.*

О ядовитомъ угрызеніи сего живошнаго и о чудесномъ лѣченіи угрызенныхъ посредствомъ музыки и танцовъ много было рассказываемо баснословнаго въ прежнія времена, но какъ теперь и въ самой Апуліи нельзя уже болѣе пляскою, отъ угрызенія сего живошнаго происходившею, ничего выпросить, то и не слышно болѣе о чрезвычайной ядовитости его. Лѣченіе музыкою угрызенныхъ шарангуломъ происходило часнію отъ возбужденія людей, подверженныхъ ипохондрическимъ припадкамъ; а еще чаще бѣдные люди, пользуясь общимъ мнѣніемъ, обманывали легковѣрныхъ.

Впрочемъ извѣстно то, что угрызеніе мизгиря во время лѣпныхъ жаровъ, подобно угрызеніямъ другихъ насѣкомыхъ, бываетъ опасно, и можеть производить большія опухоли съ сильною болью, а также корчи или судороги.

Г. *Лепехинъ* видѣлъ въ степяхъ около Эмшонаго озера, что мизгирь, когда ему пресѣкали всѣ средства

кѣ побѣту, становился неподвижнымъ, и надувшись, прыскалъ изъ спины своей ядовитой бѣлой сокъ аршина на два вверхъ. Могоулинскіе козаки увѣряли Г-на *Лепехина*, что сей сокъ ядовитъ и причиняетъ опасную опухоль съ нестерпимою болью на шомъ мѣснѣ шѣла, на кошорое онъ попадетъ (*). Въ семъ же самомъ увѣряли Г-на *Фалка* Калмыки, и что лучшее противъ сего ядовитаго соку лѣкарство у нихъ состоитъ въ шомъ, чтобы окропленное сокомъ мѣсно прижечь желѣзомъ, или проколовъ иглою, примачивать нашатырнымъ растворомъ. Самое же укушеніе мизгирей, по увѣренію Калмыковъ, не такъ ядовито (**). Жители степныхъ мѣснѣ, гдѣ водятся сіи насѣкомыя, лѣчатъ укушенныя ими мѣсна прикладываніемъ ихъ же самихъ, сполкши ихъ въ деревянномъ маслѣ, или кислотѣ

(*) *Лепехина* дневныя записки путешествія по Россіи Ч. I. стр. 416.

(**) *Falcks* Beutr. z. topogr. Kenntn. d. Russ. Reichs T. III. p. 444.

молокъ ; также укушенные мѣста при-
жигаютъ горячимъ желѣзомъ.

Овцы , по увѣренію путешество-
вавшихъ Саваннпепербургской Академіи
Гг. Профессоровъ, особливо черныя, вы-
капываютъ мизгирей изъ ихъ норъ
и пожираютъ безъ всякаго вреда ; а
также и собаки , копорымъ Док-
торъ *Виръ* давалъ ѣсть мизгирей , не
претерпѣли ни малѣйшаго вреда. Даже
можно въ степи, гдѣ водятся мизгири,
спать на шубѣ , или на войлокѣ изъ
овечьей шерсти , безъ всякой опа-
сности отъ укушенія мизгирей.



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Fu
Ne
Du

ПЕЧАТНИЦА
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
С. ПЕТЕРБУРГ

ЛНБ. МР. 5421

61890-2

ИЗОБРАЖЕНІЯ
И
ОПИСАНІЯ
ЖИВОТНЫХЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ,

ИЗДАВАЕМЫЯ

ИВАНОМЪ ДВИГУБСКИМЪ.

. *Optamus*
Fumum de patriis videre focus,
Nescio, qua natale solum dulcedine captos
Ducit

OVID. Epist. III. ex Ponto 34—36.

МОСКВА.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ.

1818.

Печаташь позволяешся, съ предспавле-
нiемъ 5 экземпляровъ въ Ценсурный Ко-
мишешъ для казенныхъ мѣспъ. Москва,
Января 29 дня, 1818. О. П., Коллежскiй
Соевѣшникъ и Кавалеръ Левъ Цѣвтаевъ.

ИЗОБРАЖЕНІЯ
И
ОПИСАНІЯ
ЖИВОТНЫХЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.



№ 12.

NEOPLA WENTH

QINGAMAS

NEOPLA WENTH

NEOPLA WENTH

NEOPLA WENTH



НЕТОПЫРЬ ТОНКОУХОЙ.

Vespertilio noctula, auriculis ovato-triangularibus, capite brevioribus; operculo semicordato; pilis supra fuscis, infra clarioribus. FISCH. Zoognos. V. III. p. 525. ДВИГУБСК. Описан. животн. четверон. Россійскихъ. стр. 84.

Die Speckmaus. BECHSTEIN Naturg. Deutsch. I. T. I. p. 174.

La noctule. BUFF. Hist. Nat. VIII. p. 118.

The Noctule Bat. PENN. Hist. quadr. p. 559.

Нетопыри, известные у насъ и подъ именемъ летушихъ мышей, кромѣ цвѣту шерсти на нѣкоторыхъ изъ нихъ, похожей на мышиную, ничего съ ними сходнаго не имѣюшъ. Древніе причисляли ихъ къ птицамъ, пошому

Сино Восток. Ветисств. Наука 1856 № 14 стр. 46 и 47 (Коданъ)

шолько, что они могутъ летать, но самыя сіи крылья совершенно ошъ пшчыхъ ошмѣнны: ибо онѣ не что иное сушь, какъ широкія перепонки, соединяющія пальцы переднихъ лапокъ и ошъ нихъ простирающіяся даже до хвоста; и самой сей хвостъ у нѣкоторыхъ породъ также окруженъ ею. Непопыри сушь дѣйствишельно живущія четвероногія летающія; они родящъ живыхъ дѣшей, и кормящъ ихъ грудью.

Голова у непопырей маленькая, уши или длиннѣе головы, или короче оной, во рту у нихъ по 4 боковыхъ зуба, а число переднихъ зубовъ у разныхъ породъ бываетъ различное. На переднихъ лапкахъ пальцы очень длинные, кромѣ большаго пальца, а на заднихъ короткіе.

У *тонкоухаго* непопыря ушки круглоовато-треугольныя, короче головы; закрышечки въ ушахъ полукруглыя; шерсть на всемъ шѣлѣ сверху шемная, а снизу нѣсколько посвѣшлѣе.

Непопыри сіи водятся въ Южной части Россіи; для жишья своего изби-

раюшѣ разсѣлины въ строеніяхъ, дровяныя кучи въ лѣсахъ и древесныя дупла, особливо по близости прудовъ и озеръ. Въ такихъ убѣжищахъ они живутъ большею частію попарно. Зиму проводятъ во снѣ, и не прежде начинаютъ вылетать изъ своихъ жилищъ, какъ уже сдѣлается очень тепло. Самки родятъ по два дѣтеныша, на которыхъ шерсть въ первой годъ бываетъ свѣтлѣе.

Пища сихъ животныхъ состоитъ въ комарахъ, слизняхъ и особливо въ сумерочныхъ бабочкахъ, копорыхъ ловятъ они въ сумерки и по ночамъ. Сіи животные совершенно безвредны, хотя простой народъ и щипаетъ ихъ ядовитыми.



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and appears to be a formal document or letter.





Strixubo. Филинъ.

Ф И Л И Н Ъ. *H (Nyctale)*.

Strix bubo, capite auriculato, corpore
rufo. LINN.-GMEL. Syst. Nat.
T. I. p. 286.

Uhu. BECHST. ornithol. Taschenb. T.
I. p. 47.

Grand duc. BUFF. Hist. des ois. I. p.
322.

Eagle owl. Brit. Zool. p. 64.

Когда свѣшило дня склоняется къ
западу, и всѣ почини животноя пре-
дающя сну, тогда филинъ вылетаетъ
изъ своего мрачнаго жилища, и
спрашнымъ крикомъ своимъ пробужда-
етъ ихъ, беспокоитъ, преслѣдуетъ,
убиваетъ и уноситъ въ свое гнѣздо.
Зайцы, кролики, куропапки, рябчики
и другія птицы служатъ ему обыкно-
венною добычею; но онъ также ло-
витъ и крысъ, мышей, кротовъ, не-
топырей, ящерицъ, змѣй и лягушекъ.
Филинъ есть самая большая птица

изъ пшицъ хищныхъ ночныхъ, ко-
 рыя по особому строению глазъ своихъ,
 не могутъ сносить солнечнаго свѣта.
 Филинъ съ перваго взгляду кажется
 величиною съ орла, по причинѣ его
 пушистыхъ перьевъ, но въ самомъ дѣлѣ
 онъ меньше орла. Вообще попада-
 ются филины величиною съ гусей и
 гораздо меньше. Клювъ у нихъ ко-
 рошкой, загнутой внизъ, безъ перевосья
 или особой цвѣтной кожицы, находя-
 щейся у орловъ, соколовъ, ястребовъ и
 проч. Голова большая съ обращенными
 къ клюву большими глазами; на голо-
 вѣ съ обѣихъ ея сторонъ около ушей
 торчатъ длинныя перья, дающія фи-
 лину странной видъ. Цвѣтъ перьевъ
 на немъ больше или меньше красова-
 тый съ темными или черными про-
 договатыми пятами и почками на
 каждомъ перѣ; хвостъ корошкой съ
 темными поперечными полосками; но-
 ги до самыхъ когтей покрыты мяг-
 кимъ бѣловатымъ пухомъ.

Филины избираютъ себѣ въ жи-
 лище лѣса, каменистыя горы, скалы

обвалившіяся башни и другія об-
вешшалаыя жилища. Въ Россіи нахо-
дятся ихъ вездѣ, также въ Сибири,
Камчаткѣ, и по островамъ Восточнаго
океана.

Пшеницы сіи вьются гнѣзда въ уще-
ліяхъ горъ и пещеръ, на высокихъ
старыхъ зданіяхъ и, хотя рѣже, на
большихъ деревьяхъ. Гнѣздо ихъ имѣ-
етъ при фуша въ поперешникѣ, и
состоитъ изъ гибкихъ прутьевъ, пе-
релепенныхъ между собою, и внутри
устилаемо мочьями древесными. Въ
сихъ гнѣздахъ кладутъ онѣ по одному,
по два и рѣдко по три яйца бѣлыхъ,
которыя не много больше куриныхъ.
Вышедшія изъ яицъ дѣти весьма про-
жорливы, и долго не оставляютъ
гнѣздъ своихъ. Въ сіе по время онецъ
и масть особливо дѣятельны бывающъ
въ доставленіи имъ пищи, и сполько
приносятъ изловленныхъ ими жи-
вотныхъ, что въ гнѣздѣ помѣстивъ
ихъ всѣхъ не можно. — Ни одна изъ
хищныхъ пшеницъ не приуготовляетъ
сполько запасу для дѣшей, сколько фи-

ливъ, и припомъ всѣ сіи припасы свѣжіе.

Г. *Кронштедъ*, поймавши маленькаго филина, заперъ его въ большой пшичникъ; на другой день по ушру нашли близъ пшичника убитую куропашку. Вѣроятно, что ошець или мать запершаго филина, искавши его ночью, узнали о немъ по его крику, привесли ему куропашку. Сіе мнѣніе подтвердилось наблюдениемъ 14 ночей; ибо въ каждую ночь приносима была какая-нибудь пшичка, а особливо молодья куропашки. При всемъ однакожъ стараніи Г. *Кронштеда* и его слугъ, не можно было ни одного раза замѣшшь филина, приносившаго пищу. По видимому, пшицы сіи, которыя ночью очель хорошо видяшъ, клали пріобрѣщенную ими добычу въ шю самое мгновение, когда никого не видѣли у окна. Сверхъ шого летающъ онъ не производя ни малѣйшаго шума. Въ Августѣ мѣсяцъ не было болѣе приносимо молодому заключенному филину пищи; но въ семъ мѣсяцъ и всѣ хищныя пшицы

предоставляющѣ уже дѣтямъ своимъ самимъ промышлять для себя кормъ (*).

Филины двемъ рѣдко вылезаютъ изъ своихъ гнѣздъ, и, когда сіе случится, то лѣзутъ они низко. Въ сіе-то время нападаютъ иногда на Филина стадо воронъ, которыя лезаютъ за нимъ и окружаютъ его тысячами, производя ужасной крикъ, на что онъ также отвѣчаетъ своимъ крикомъ, дѣлая множеству нескладныхъ, смѣшныхъ движеній. Вечеру же лезаетъ иногда очень высоко.


Громкой его крикъ по ночамъ: гу-гу, пугу, проняжной и часно повторяемый, пугаетъ не только птицъ, но и самыхъ людей, особливо суевѣрныхъ, считающихъ крикъ сей за предзнаменованіе какого-либо несчастія. *Киргизцы* берутъ иногда съ собою на охоту и въ путешествіяхъ крыло Филина; ибо оно, по мнѣнію ихъ, предохраняетъ отъ всякаго очарова-

(*) Le cabinet du jeune Naturaliste par *Smith*.
Т. III. р. 82.

нія и на ловѣ доставляешъ большую удачу. Таковое ихъ суевѣріе основывается на народной ихъ сказкѣ, что нѣкогда храбрый ихъ и непобѣдимый богатырь *Бай-Тибетъ* наконецъ былъ не только побѣжденъ однимъ ничтожнымъ богатыремъ, который былъ вмѣстѣ волшебникомъ, но и превращенъ въ филина; и до сихъ поръ крикомъ своимъ жалуется на свое несчастіе (*).

Филина молодого легко можно сдѣлать ручнымъ; но стараго очень трудно. Ихъ употребляютъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ для ловли другихъ хищныхъ птицъ, иногда противъ воронъ и галовъ. Въ Малоросіи называютъ филина *пугачемъ*, именемъ, производшимъ отъ его крика *пугу*.

(*) *Falks Beyträge zur topograpfischen Kenntniss des Russischen Reichs T. III. p. 332.*



то
л-
то
лй
в
к-
в-
в
о-
в-
в
о-
в
о-
а-
з-
-
лз



Picus Viridis.
Зеленой Дамеко.

ЗЕЛЕНОЙ ДЯТЕЛЬ.

Picus viridis, viridis, vertice coccineo.
LINN.-GMEL. Syst. Nat. T. I. p.
433.

Grünspecht. *BEUSTEIN ornithol Taschenb. T. I.*

Pic verd. *BUFF. Hist. Nat. des ois. 7*
p. 7.

Green Woodspecker. *Brit. Zool. p. 84.*

Дятлы суть птицы лѣсныя; ихъ
совсѣмъ нѣтъ въ мѣстахъ степныхъ
и безлѣсныхъ. Клювъ у нихъ крѣпкой
на подобіе клина, которымъ они удоб-
но раздробляютъ гнилыя деревья, подъ
корю воихъ ищутъ они обыкновенную
свою пищу, насѣкомыхъ и ихъ личин-
ки. Пальцы на ногахъ ихъ расположе-
ны такимъ образомъ, что два пальца
обращены впередъ и другіе два назадъ;
и сіе расположеніе способствуетъ
имъ удобно держаться на деревьяхъ въ
разныхъ положеніяхъ.

Зеленой дятель величиною съ галку. Кліѳъ у него черной, верхушкѣ головы яркаго краснаго цвѣту съ черными пятнами; кружокъ радужной перепонки внутренній красноватъ, а наружной бѣловатъ. Виски темные; горло, грудь и брюхо блѣднозеленаго цвѣту, а у самокъ сѣроваватаго; шея, спина, перья, покрывающія крылья, больше или меньше яркаго зеленаго цвѣту, а главныя перья крыльевъ темныя съ бѣлыми пятнами. Крестецъ желтозеленаго цвѣту, хвостовыя перья зеленоватыя съ черными пятнами; они крѣпки и на концѣ заострены; ноги сѣроватыя.

Дятель питается насѣкомыми, а особливо живущими въ пусныхъ и гнилыхъ деревьяхъ и подъ ихъ корою; крѣпкимъ своимъ кліѳомъ легко пробиваетъ онъ кору древесную и длиннымъ своимъ языкомъ достаеиъ насѣкомыхъ подъ нею скрывающихся. Ударивши нѣсколько разъ по дереву, или его въпви онъ обѣгаетъ ее кругомъ, чѣпобъ изловивъ насѣкомыхъ, кошорыя, испужа-

шись спутку, выходящъ вонъ изъ овоихъ
убъжищъ.


Дятлы живутъ въ дуплахъ дре-
весныхъ, въ копорыхъ самка кладетъ
обыкновенно отъ пяти до шести яицъ,
сѣроватыхъ съ черноватыми пятнами.

Пищцы сіи находятся въ непре-
станномъ движеніи; онѣ бѣгающъ и
прыгающъ по деревьямъ, крича часно
генъ! генъ! Не рѣдко ихъ сильной
крикъ предвѣщаетъ дождь. Зеленые дя-
тлы водятся по всемъ лѣсамъ Россіи
и Сибири, выключая самыя холодныя
мѣста; на зиму ошлепающъ въ шец-
лыя страны.

Дятлы испребляющъ множество
насъкомыхъ, а особливо вредныхъ имъ
гусеницъ и личинокъ; иногда также
причиняющъ вредъ и ульямъ, пробивая
ихъ, и вышаскивая пчелиныя личинки.



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher.



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side]



Diomedea exulans.

Морская

ТОГАКЪ.

Diomedex exulans, alba, dorso alisque
nigro-lineatis, rostro luteo, pedibus
incarnatis, remigibus nigris, cauda
plumbea rotundata. LINN.-GMEL.
Syst. Nat. T. I. p. 566.

Albatros. BUFF. *Hist. Nat. des ois.*
IX. p. 339.

Wandering albatros LATH. *Syn.* III.
p. 304.

Птицы сіи, живущія обыкновенно въ жаркихъ странахъ около пропиковъ, въ Іюнь и Іюль мѣсяцѣ въ большомъ количествѣ видимы бывающъ въ Пенженской губѣ около Охотска, по Охотскому и Восточному морю, около Камчатки, острововъ Курильскихъ и Алеушскихъ; въ началѣ же Августа опять улетаютъ въ свое обыкновенное мѣстопробываніе.

Тогакъ больше всѣхъ водяныхъ
птицъ, выключая лебедя. Клювъ у
него прямъ, и только кончикъ верхней
челюсти загнутъ внизъ; цвѣтомъ жел-
шоватъ; ноздри наподобіе сжатыхъ
трубочекъ, корошкія. Голова у него и
шея бѣлая, иногда же сѣроватая, спина
также бѣлая; но на крестцѣ имѣетъ
онъ черныя пятна; крылья очень дли-
выя и узкія, большія перья сначала
желтыя, но всегда къ концу черныя,
а корошкія верхнія темныя. Хвостъ
бѣлой, но конецъ у него черной или
темной. Ноги у него о трехъ пальцахъ,
соединенныхъ плавающимъ перепон-
кою, красноватая.

Птицы сіи чрезвычайно прожорли-
вы; онѣ въ великомъ множествѣ пожи-
раютъ треску, корифенъ, лешучихъ
рыбъ; и хотя шломы очень велики,
но робки и на большихъ рыбъ не на-
падаютъ, но довольствуются малень-
кими рыбами, раковинными червями и
другими мягкими морскими животными.
Жадность ихъ чрезвычайно велика, и
онѣ такое количество пожираютъ

рыбъ и другихъ живошныхъ, что не могутъ ни лезать, ни бѣжать отъ угрожающей имъ какой-либо опасности.


Птицы сіи летаютъ близъ самой поверхности моря и рѣдко поднимающія высоко, развѣ только во время сильной бури. Живутъ всегда въ удаленіи отъ земли, спятъ на водѣ; а на сушу летаютъ только для выведенія дѣшей. Яйца ихъ гораздо больше гусиныхъ и цвѣтомъ бѣлыя.

Жители Камчатки умѣютъ пользоваться ими птицами. Они ловятъ ихъ посредствомъ удокъ, прикрѣпляя къ нимъ для приманки кусочки рыбъ. Они употребляютъ косточки изъ ихъ крыльевъ для разныхъ своихъ надобностей, какъ то вмѣсто чубуковъ для куренія табаку, вмѣсто игольниковъ, гребней для чесанія нѣкошорыхъ шравъ, вмѣсто льну употребляемыхъ ими. Бдятъ также и мясо ихъ, хотя оно жестко и не вкусно. Сверхъ того кишки ихъ высушенныя и надушыя употребляютъ вмѣсто поплавковъ къ сѣтямъ при ловлѣ рыбъ.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Second block of faint, illegible text in the middle of the page.

Third block of faint, illegible text at the bottom of the page.



Taenia finna. Gm. *Глиста Свинная.*

СВИНАЯ ГЛИСТА.

Taenia Finna, conica, duplici vesicae inclusa, interiori basi sua adhaerens, capite collum vesicae versus directo. LINN-GMEL. Syst. Nat. T. I. p. 3063.

Cisticercus s. RUDOLPHI Entozoa. Vol. II. p. 214.

На картинкѣ представлено живошное въ двухъ разныхъ видахъ: маленькая фигура представляетъ его въ настоящей величинѣ; а большая представляетъ живошное въ увеличенномъ видѣ; у сего послѣдняго примѣтны на тонкомъ концѣ четыре маленькихъ скважинки, посредствомъ которыхъ живошное питається.

Спранныя сіи живошныя, принадлежащія къ роду червей, въ шляхъ живошныхъ находящихся, водятся шолько въ домашнихъ свиньяхъ и про-

изводящъ въ нихъ родъ паршей или короспы, по всему шѣлу примѣчаемой. Глиста сія зараждается между мускулами въ клѣпчатой плевѣ, и соспѣивъ изъ овальнаго пузырька и шоненькой шейки. Она прозрачна и внутри наполнена красновато-желтою жидкостію.

Удивительно, что глиста сія примѣчена только въ домашнихъ свиньяхъ (изрѣдка въ быкахъ), а никогда въ дикихъ свиньяхъ, и по видимому тогда уже въ нихъ появилась, когда свиньи, сдѣлавшись домашними животными, чрезъ то потеряли перемѣну въ сложеніи своего шѣла.



инв. МКН-5422 61891-58

MK IV-5411-5422

И
К

14

