

- 1 -

Ал.А. ФЕДОРОВ

Разделение много на очередных координатных обозначений было признано полезным составлять разного рода определители.

Полностью разделяя эту ответственную мысль, мы закалились целью составить определитель авторов «Флоры СССР», имея в виду тот круглый интерес к нему, который несомненно возникнет у любителей.

К Р А Т К И Й

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ АВТОРОВ

«ФЛОРЫ СССР»

Виды из «Флоры СССР» (или находящиеся в состоянии болезни), нами описаны.

Некоторые виды, лишь эпизодически встречались на страницах «Флоры», даны в примечаниях.

Ключ для определения составлен по дихотомической системе, принятой во «Флоре СССР».

Разумеется, — все разнообразие его нами бережно охвачено.

Краткие диагнозы видов приводятся в самом ключе, Аптекаровский остров. 1964. Отступаем от канона «Флоры».

Издано на средства автора.

Виды, указанные в ключе, даны для достаточной точности обозначения видов, отсюда лишь

Ответственный редактор

Д.В.ЛЕБЕДЕВ

Решением одного из очередных координационных совещаний было признано полезным составлять разного рода определители.

Полностью разделяя эту плодотворную мысль, мы задались целью составить определитель авторов "Флоры СССР", имея в виду тот жгучий интерес к ним, который несомненно возникнет у потомков.

В определитель вошли наиболее заметные виды из числа ныне здравствующих авторов. Виды же, ушедшие *ad patres* (или находящиеся в состоянии болезни), нами опущены.

Некоторые виды, лишь эпизодически появлявшиеся на страницах "Флоры", даны в примечаниях.

Ключ для определения составлен по дихотомической системе, принятой во "Флоре СССР".

Разумеется, — все несообразности его нами бережно скопированы.

Краткие диагнозы видов приводятся в самом ключе, что является единственным отступлением от канонов "Флоры".

В этих диагнозах мы стремились дать достаточно точные описания видов, оттеняя лишь

свойственные им и наиболее характерные черты.

В том случае, когда по правилам современной номенклатуры требовалось указать наиболее точное и принятое наукой название, — параллельно с ним приведены необходимые синонимы.

Большинство видов, нашедших себе место в определителе, относится к монотипным родам, обладающим высоким «аптекаарским» эндемизмом и чисто «биновским» морфологическим своеобразием.

Если наш по необходимости краткий определитель окажется в какой то мере полезным, мы сочтем свою задачу решенной.

Ключ для определения видов

- I. Особи, отмеченные знаком Юпитера
I. (Сем. *Masculinaceae*)..... 2
- Особи, носящие знак Венеры
II. (Сем. *Feminiaceae*)..... 15
2. Кожные покровы лица темные..... 3
- Кожные покровы иного оттенка... 4
3. Лик смуглый. Волосяной покров черепа густой, почти черный.

В молодом возрасте питался диким миндалем и плацентами различных растений. Впоследствии перешел на фоссилезованные растительные остатки, а также стволы и ветви родословного дерева растений.

1. *Takhtadzhianus phylogenicus* (Sosn.)

Krischt.

(Syn. *T. amygdalinus* Sosn.)^x)

x) Вид включен ошибочно. В пределах

"Флоры СССР" не встречается. Прим. Рег.

- Лик смугловатый, Волосистой покров сивый, с чуть заметными признаками изреживания.

Питается "водяными орехами" и березовым соком. Избегает ледниковых морен и валунов.

2. *Vassilievius deluvium testis*

(Ком.) Iljin.

(Syn. *V. trapezobetulinus* Kom.).

4. Лик бледноватый, тощий. Брюшки узкие 18-20 см ширины; пальто короткое, модное, до 100 см в длину.

Питается клевером и "кузмичевой травой". Считается ядовитым.

3. *Bobrovius eugenius* Schischk.

(рис. I).

+ Иные признаки... .. 5

5. Лик окрашен нормально. Выражение его как бы плаксивое. Голос (в раздраженном состоянии) с подвизгиванием.

Питается гербарными отходами и дублетами.

4. *Czerepanovius duplicarius* (Schischk.)

Taht.

(Syn. *Cz. alnoides* Schischk.)

- Иные признаки 6

6. Апикальная часть черепа гладкая, прикрытая особой затылочной прядью.

Питается сорняками и всходами.

5. *Vassilczenkovius ruderalis* Novopokr.

- Затылочная прядь отсутствует..... 7

7. Выражение лица б.ч. сердитое. Нос довольно длинный.

Крайне аккуратен и весьма медлителен. Имеет острые колючки, которыми (при случае) больно колет. Передвигается в сопровождении *Rozhkovia satellita*.

6. *Linczevskyius tardus* (M. Pop.)

Schischk.

- Рост средний или малый..... 8

8. Лик разнообразной окраски..... 9

- Иные признаки..... II

9. Лик бледный, суховатый. Голос тихий, тон его минорный.

Питается (в основном) злаками, но мо-

жет жить и на одуванчиках (с мякиной)

7. *Tzvelevius palefatus* (Schischk.)

Takht.

(Syn. *Tz. graminivorus* Schischk.).

- Покровы лица яркие или нормальные ... IO

IO. Лик красный. *Habitus* важный, самоуверенный.

Отрицательно относится к правилам пунктуации в рукописях.

Питается видами полни, в том числе и глистогонными.

8. *Poljakovius ingloriosus* (N. Pavl.).

E. Bobr.

(Syn. *P. ingratus* N. Pavl.).

- Лик нормальной окраски. Волосистой покров черепа и подбородка буровато-серый ("изабеллиновый").

Совершает заметные миграции за пределы своего естественного ареала.

Питается словарями и некоторыми сложноцветными.

(Syn. *P. albidus* Schischk.)

9. *Kirpicznikovius translatus*
(Schischk.) Juz.
(Syn. *K. gnaphalioides* Schischk.).

II. Выражение лица мрачное. Взгляд сердитый. Слуховые аппараты заметно увеличенные против нормы.

Питается дробленными видами различных растений.

10. *Klokovius klokionus* Juz.

- Иные признаки..... 12

12. Лик чаще сумрачный. Взгляд острый.

Вооружен шипами.

Питался грушами и околоснежной растительностью.

11. *Fedorovius primulaceus* (Sosn.)

Schischk.

(Syn. *F. pyriscopis* Sosn.).

(рис. 2).

- Волосистой покров на черепе есть или он отсутствует..... 13

13. Апикальная часть черепа гладкая, блестящая. Голос устрашающий (преимуще-

ственно для особой женского пола).

Изредка питается лебедой и со-
лянками. Обитает между шкафов, ко-
торые иногда носит на спине.

12. *Botschantzevius pseudoferox*

(Vved.) Kuprevicz.

(Syn. *B. asiaticus* Vved.).

- Голос скрипящий..... I4

I4. Апикальная часть черепа волосистая.

Выражение лица б.ч. брезгливое.

Питается крушиной и гербарием

Пржевальского.

13. *Grubovius sino-mongolicus*

(Schischk.) Lavr.

(Syn. *G. rhamnoides* Schischk.).

- Волосной покров черепа торчащий,
черный (с проседью). Выражение ли-
ца ироническое, углы губ скорбно
опущены.

Обитает в тени. Содержит фитон-
циды.

14. *Lipschitzovius historiographus*

Baranov.

(рис. 3).

- I5(I). Сем. *Feminae*. Особи упитанные,
едва уместяющиеся на обычном стуле..... I6
- Особи средней упитанности или то-
щие (типа "селедка")..... I7
- I6. Возраст солидный или преклонный..... I8
- Возраст средний (а также "бальзаков-
ский")..... I9
- I7. Глаза выразительные..... 20
- Глаза тусклые (но не с "поволокой").... 21
- I8. Лик морщинистый; слегка или сильно
подкрашенный (подсем. *Ornatae*)..... 22
- Лик гладкий, а если морщинистый, то
без подкраски (подсем. *Incarinatae*)... 23
- I9. Цвет волос рыжий, структура пакле-
видная. 24
- Цвет волос нормальный, структура
отсутствует..... 25

20.Голос приятный, музыкальный.....	26
- Голос сильный, но противный.....	27
21.Характер покладистый, спокойный..	28
- Характер несносный.....	29

Конец ключа изъят цензурой.

Опечатки:

стр.3,

Напечатано: Юпитера,

Следует; Марса.



Bobrius
argentus
Schizma

Puc 1.



Proc. 2

Fedorovias
primulaeae (Sosn.) Schleich.



L. historiographus
Baranov. Puc. 3.

Тираж - Іэкз.

Авт.лістоў - 8

Падпісана к печати

26.У-1964 г.

Цена 11руб.50коп.

Тираж - 1000

8 - листов, табл.

Подписано и печать

1931-г. 23