


А.Л. ИВАНОВ

**КОНСПЕКТ
ФЛОРЫ
СТАВРОПОЛЬЯ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

А.Л. ИВАНОВ

КОНСПЕКТ
ФЛОРЫ
СТАВРОПОЛЬЯ



СТАВРОПОЛЬ
2005

УДК 582(470.63)+581.9(470.63)
ББК 28.585(2Р-4Ст) И
И 20

Иванов А.Л.
И 20 Конспект флоры Ставрополья. 3-е изд., испр. и доп. -Ставрополь: Изд-во СГУ, 2005. – 175 с. : 23 ил.

Конспект флоры Ставрополья содержит актуальные сведения по видовому составу растений с указанием приуроченности к флористическому району, географического типа, фитоценотической принадлежности, жизненной формы, хозяйственной ценности (отмечены лекарственные, ядовитые, пищевые, кормовые и декоративные растения). Даны основные синонимы. Указаны эндемики разного ранга, реликты, охраняемые и нуждающиеся в охране виды, а также виды, *locus classicus* (классическое место) которых находится в регионе.

Предназначен для студентов-биологов, магистрантов и аспирантов, научных сотрудников, специалистов сельского хозяйства, работников природоохранных органов, учителей средних школ.

Научный редактор
докт. биол. наук, проф. Ю.А. Дударь

ISBN 5-88648-276-8

© Иванов А. Л., 2005

© Ставропольский государственный
университет, 2005

ОТ АВТОРА

Флористические исследования в Предкавказье, особенно в Центральном Предкавказье, в последние годы шли особенно интенсивно. Появились новые работы, касающиеся как ревизии флоры в целом, так и посвященные критической обработке отдельных семейств и родов. Большой труд проделан коллективом авторов Ботанического института (БИН) им. В.Л. Комарова РАН, который в 2003 году выпустил первый том "Конспекта флоры Кавказа", в котором содержится сводка таксонов кавказской флоры высших споровых и голосеменных растений. Ставропольские ботаники многие годы работают над проблемой инвентаризации региональной флоры и критическим пересмотром таксономических списков. Основой для этого являются труды А.А. Гроссгейма (1939-1967), А.И. Галушки (1978-1980), В.Г. Танфильева и В.Н. Кононова (1987), публикации БИНа, а также собственные исследования коллектива кафедры ботаники Ставропольского государственного университета, учёных Ставропольского ботанического сада и филиала БИНа в г. Пятигорске. Полученные сведения нашли отражение в первом и втором изданиях "Конспекта флоры Ставрополья" (1997, 2001), в который было включено 2204 и 2252 вида соответственно.


В связи с критическим пересмотром предкавказской флоры, результаты которого изложены в монографии "Флора Предкавказья и её генезис" (Иванов, 1998), возникла необходимость внесения дополнений и изменений в существующий конспект ставропольской флоры. Во-первых, разработана новая система геоэлементов, отражающая характер общего распространения видов. Во-вторых, проведено дробное флористическое районирование территории и выделены новые флористические районы, что позволяет более точно указывать распространение видов. Кроме того, описаны новые для науки виды и сделаны новые флористические находки. В список видов вошли также некоторые интродуцированные древесные растения (12 видов), одичавшие и ставшие компонентами естественных фитоценозов. Таким образом, список второго издания пополнился ещё 47 видами. В третье издание добавлено ещё 5 видов.

Основная номенклатура приведена в соответствие с последней сводкой С.К.Черепанова (1995), однако названия многих видов и номенклатура многих родов оставлены в таком виде, в каком они приняты во Флоре Скверного Кавказа (Галушко, 1978-1980). В необходимых случаях приведены основные синонимы, что облегчает обращение к различным литературным источникам.

Автор выражает благодарность профессору Дударю Ю.А., сделавшему ценные замечания при работе с рукописью.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Информация о каждом виде даётся в следующем порядке: научное латинское и традиционное русское название вида и в необходимых случаях синоним или синонимы (в скобках, курсивом). После знака = приводятся: распространение, географический тип (геоэлемент), флороценозлемент, жизненная форма по Раункиеру, встречаемость и для отдельных видов дополнительные сведения. Распространение видов на территории Ставропольского края приводится согласно схеме флористических районов Предкавказья, разработанной автором (Иванов, 1998, 1999). Границы этих районов и их условные обозначения изображены на прилагаемой картосхеме.



На территории края пересекаются границы трёх флористических провинций: Понтической, Кавказской и Туранской. Первые две относятся к Евросибирской области Бореального подцарства, третья - к Сахаро-Гобийской области Древнесредиземноморского подцарства. Положение Ставропольского края в системе фитогеографического районирования оценивается следующим образом:

ГОЛАРКТИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО
БОРЕАЛЬНОЕ ПОДЦАРСТВО
Евросибирская область

Европейская подобласть

I. Понтическая провинция

- I.1. Западнопредкавказский округ
 - КЕ - Кубано-Егорлыкский район
- I.2. Центральнопредкавказский округ
 - МД - Манычско-Дадынский район
 - АИ - Арзгирско-Ипатовский район
 - НК - Нижне-Кумский район
 - Прик - Прикалауский район
 - ТБ - Томузловско-Буйволинский район
 - М - Моздокский район

II. Кавказская провинция

- II.1. Ставропольский округ
 - Ст - Ставропольский район
- II.2. Кубанский округ
 - ЛН - Лабинско-Невинномысский район
- II.3. Терский округ
 - СК - Средне-Кумский район
- II.4. Эльбрусский округ
 - П - Пятигорский район
 - Кисл - Кисловодский район

ДРЕВНЕСРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОДЦАРСТВО

Сахаро-Гобийская область

Центрально-Азиатская подобласть

III. Туранская провинция

- III.1. Восточнопредкавказский округ
 - КН - Кара-Ногайский район

Исходя из этого положения строится последовательность перечисления районов распространения каждого вида.

После перечня районов в скобках даётся общее распространение вида (геоэлемент). Система геоэлементов приведена в таблице I.

- 1. Плюрирегиональный.** Включает виды, ареалы которых выходят за пределы Голарктического царства.
- 2. Голарктический.** Относимые к этому географическому элементу виды встречаются во всех (или почти во всех) областях Голарктического царства.

- 3. Палеарктический.** Представлен видами, ареалы которых охватывают умеренные и субтропические области Голарктического царства Старого Света без определённой приуроченности к одному из подцарств.
- 4. Панбореальный.** Относимые сюда виды распространены во всех или почти во всех областях Бореального подцарства, включая Западное полушарие,
- 5. Евро-Сибирский.** К нему относятся виды, распространённые в евразиатской части Циркумбореальной области А.Л.Тахтаджяна (1978).
- 6. Евро-Кавказский.** Относимые сюда виды распространены в Кавказской, Эвксинской и европейских провинциях Евро-Сибирской области, т.е. тяготеют к Европейской широколиственной области Е.М.Лавренко (1950) или Среднеевропейской области А.И.Толмачёва (1974).
- 7. Европейский.** Объединяемые в этот элемент виды распространены в основном в умеренных частях европейских провинций А.Л.Тахтаджяна (1978) - Атлантическо-Европейской, Северо-Европейской, Центрально-Европейской и Восточно-Европейской, проникая в Кавказскую провинцию.
- 8. Кавказский.** К этому элементу относятся виды, характерные для Кавказской провинции. Они имеют различный характер распространения. Кроме собственно кавказских, ареал которых охватывает весь Кавказ (включая и Малый Кавказ), выделены виды, ограниченные распространением на Большом Кавказе (**Эукавказские**), и в Предкавказье (**Предкавказские**).
- 9. Эвксинский.** Объединяет виды, основной ареал которых ограничен Эвксинской провинцией Циркумбореальной области (Тахтаджян, 1978).
- 10. Понтическо-Южносибирский.** Включает в себя виды, распространённые в Понтической провинции А.Л.Тахтаджяна (1978), или южных частях Восточно-Европейской и Западно-Сибирской провинциях А.Л. Тахтаджяна (1978), или Евразиатской степной области Е.М.Лавренко (1950, 1970).
- 11. Понтический.** Объединяет виды, приуроченные к степным и лесостепным районам Восточноевропейской провинции, их восточные границы ареалов ограничены Поволжьем, реже доходят до Урала. Небольшая часть видов ограничена в своём распространении Крымом и Предкавказьем.
- 12. Общедревнесредиземноморский.** Объединяет виды, широко распространённые в Средиземноморской и Ирано-Туранской областях Древнесредиземноморского подцарства (Тахтаджян, 1978).
- 13. Западнодревнесредиземноморский.** К нему относятся виды, ареалы которых охватывают всю Средиземноморскую область или её большую часть, и заходят на востоке в западную часть Ирано-Туранской области.
- 14. Средиземноморский.** Объединяет виды, ареалы которых охватывают две и более провинций Средиземноморской области.

- 15. Крымско-Новороссийский.** Объединяет виды, распространённые в Крымско-Новороссийской провинции, иррадиирующие на территорию Предкавказья.
- 16. Восточнодревнесредиземноморский.** Объединяет виды, распространённые в Переднеазиатской и Центральноазиатской подобластях Ирано-Туранской области и широко иррадиирующие.
- 17. Ирано-Туранский.** Включает виды, характерные для Переднеазиатской подобласти Ирано-Туранской области.
- 18. Арmeno-Иранский.** Ареалы видов этого элемента приурочены к Армено-Иранской провинции Переднеазиатской подобласти Ирано-Туранской области, одному из основных центров Ирано-Туранской флоры.
- 19. Туранский.** Центр тяжести относимых к этому геоэлементу видов находится в Туранской провинции.
- 20. Субсредиземноморский*.** Относимые к этому геоэлементу виды более или менее равномерно распространены в северных и северо-восточных районах Средиземноморской области и в юго-западных районах Евро-Сибирской области.
- 21. Субкавказский*.** Объединяет связующие виды, основная часть ареалов которых охватывает Кавказскую провинцию, а также часто Эвксинскую провинцию Евро-Сибирской области и Арmeno-Иранскую провинцию Ирано-Туранской области.
- 22. Субпонтический*.** Объединяет виды, основная часть ареалов которых находится в степных и лесостепных районах Восточно-Европейской и преимущественно западных районах Эвксинской провинции Евро-Сибирской области и в восточных районах Иллирийской, в Центрально-Анатолийской и Восточно-Средиземноморской провинциях Средиземноморской области.
- 23. Субтуранский*.** Объединяет связующие виды, ареалы которых охватывают лесостепную и степную часть Восточно-Европейской и Западно-Сибирской провинций Евро-Сибирской области и Туранскую провинцию Ирано-Туранской области (преимущественно северную часть).
- 24. Адвентивный.** Объединяет заносные виды.

После точки с запятой указываются флороценозлемент и жизненная форма (биоморфа) вида. Выделяются следующие флороценозлементы:

S (Silvaticus) - лесной
P (Pratensis) - луговой
Ra - равнинный
Pb – субальпийский
Pc – альпийский

ST (Stepposus) – степной

SD (Semidesertus) - полупустынный

D (Desertus) - пустынный

Da - кальцепетрофильный

Db - псаммофильный

Dc - галофильный

Dd - аргиллофильный

A (Aquaticus) - водный

Aa - гигрофильный

Ab - гидрофильный


Ac- гидатофильный

R (Ruderalis) - сорный

Ra - сегетальный

Rb - рудеральный

Основные типы растительности на территории Ставропольского края приведены на картосхеме.



В скобках приводятся жизненные формы по Раункиеру:

Ph (*Phanerophyton*) – фанерофит: почки возобновления находятся от уровня снежного покрова до 30 м и более. Подразделяется на следующие группы:

Phmg (*Megaphanerophyton*) – мегафанерофит: почки возобновления находятся на высоте более 30 м;

Phms (*Mesophanerophyton*) – мезофанерофит: почки возобновления находятся на высоте от 8 до 30 м;

Phm (*Microphanerophyton*) – микрофанерофит: почки возобновления находятся на высоте от 2 до 8 м;

Phn (*Nanophanerophyton*) – нанофанерофит: почки возобновления находятся на высоте от 0,15 до 2 м.

Ch (*Chamaephyton*) - почки возобновления расположены выше уровня почвы и обычно зимой находятся ниже уровня снежного покрова. К ним относятся кустарнички и полукустарники, растения-подушки.

HK (*Hemicryptophyton*) – гемикриптофит: травянистые растения, почки возобновления которых находятся на уровне почвы. К ним относятся розеткообразующие травы, двулетники, озимые однолетники, дерновинообразующие и короткокорневищные травы.

K (*Cryptophyton*) – криптофит: травянистые растения, почки возобновления которых лежат глубоко в почве (геофиты) или под водой (гидрофиты). Это луковичные, корневищные, клубневые или корнеотприсковые растения.

T (*Therophyton*) – терофит: однолетние растения, не имеющие почек возобновления и переносящие неблагоприятные условия в виде семян.

Дополнительные сведения о жизненных формах указываются через двоеточие:

fl (*fruticulus*) - кустарничек

sf (*suffrutex*) - полукустарник и полукустарничек

ll (*liana lignosa*) - одревесневающая лиана

lh (*liana herbacea*) - травянистая лиана

eph (*ephemera*) - эфемер

ephd (*ephemeroidum*) - эфемероид

ep (*epiphyton*) - эпифит

par (*parasitus*) - паразит

hpar (*hemiparasitus*) - полупаразит

sap (*saprophyton*) - сапрофит

sv (*semperfiriens*) - вечнозелёное растение

hv (*hiemeviriens*) - зимнозелёное растение

pb (*planta biennis*) - двулетнее растение

pi (*planta insectivora*) - насекомоядное растение

ps (*planta succulenta*) - суккулентное растение

ТАБЛИЦА I
СИСТЕМА ГЕОЭЛЕМЕНТОВ ФЛОРЫ СТАВРОПОЛЬЯ

№	Сокращение	ГЕОЭЛЕМЕНТ
ПЛЮРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
1	Плюрирег.	Плюрирегиональный
ОБЩЕГОЛАРКТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
2	Голаркт.	Голарктический
3	Палеаркт.	Палеарктический
БОРЕАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
4	Панбор.	Пан boreальный
5	Евро-Сиб.	Евро-Сибирский
6	Евро-Кавк.	Евро-Кавказский
7	Европ.	Европейский
8	Кавк.	Кавказский
8.1	Эукавк.	Эукавказский
8.2	Предкавк.	Предкавказский
9	Эвксин.	Эвксинский
10	Понт.-Южносиб.	Понтально-Южносибирский
11	Понтич.	Понтический
ДРЕВНЕСРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
12	Общедр.средиз.	Общедревнесредиземноморский
13	Зап.др.средиз.	Западнодревнесредиземноморский
14	Средиземн.	Средиземноморский
15	Кр.-Новоросс.	Крымско-Новороссийский
16	Вост.др.средиз.	Восточнодревнесредиземноморский
17	Ирано-Туран.	Ирано-Туранский
18	Арmeno-Иран.	Арmeno-Иранский
19	Туранск.	Туранский
СВЯЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
20	Субсредиз.*	Субсредиземноморский*
21	Субкавк.*	Субкавказский*
22	Субпонт.*	Субпонтический*
23	Субтуран.*	Субтуранский*
АДВЕНТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
24	Адвент.	Адвентивный

Встречаемость (в квадратных скобках):

[Soc.] (Sociales) - доминирует

[Pl.] (Plerumque) - обычно

[Sp.] (Sparse) - рассеянно

[R.] (Raro) - редко

[Rs.] (Rarissimo) - очень редко

Дополнительные сведения о видах:

<Es> (*Planta stenoendemica*) - стеноэндемик

<Ee> (*Planta euriendemica*) - эвриэндемик

<Esub> (*Planta subendemica*) - субэндемик

<Rg> (*Relictum glacialum*) - гляциальный реликт

<Rx> (*Relictum xerothermicum*) - ксеротермический реликт

<Rt> (*Relictum tertiarium*) - третичный реликт

<Pt> (*Planta toxica*) - ядовитое растение

<Pm> (*Planta medicinalis*) - лекарственное растение

<Pp> (*Planta pabularis*) - кормовое растение

<Po> (*Planta ornamentalis*) - декоративное растение

<Pa> (*Planta alimentaria*) - пищевое растение

★ - виды, занесённые в Красную книгу Ставропольского края (2002)

★★ - виды, занесённые в Красную книгу РСФСР (1988)

l.c. (*locus classicus*) - классическое место

CONSPECTUS FLORAE STAUROPOLENSIS **КОНСПЕКТ ФЛОРЫ СТАВРОПОЛЬЯ**

ОТДЕЛ LYCOPODIOPHYTA - ПЛАУНООБРАЗНЫЕ

Класс LYCOPODIOPSIDA - ПЛАУНОВИДНЫЕ

Сем. 1. HUPERZIACEAE Rothm. - БАРАНЦОВЫЕ

1. ★ *Huperzia selago*(L.)Bernh.ex Schrank et C.Mart. - Баранец обыкновенный = П,Кисл(Плюрирег.); S(Ch:sv); [Rs.] <Rg;Rt;Pm>

Класс ISOËTOPSIDA - ПОЛУШНИКОВИДНЫЕ

Сем. 2. SELAGINELLACEAE Willk. - ПЛАУНКОВЫЕ

2. *Selaginella helvetica*(L.)Spring - Плаунок щвейцарский = Кисл(Палеаркт.); S(Ch:sv); [Sp.] <Rt>

ОТДЕЛ EQUISETOPHYTA - ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ

Класс EQUISETOPSIDA - ХВОЩЕВИДНЫЕ

Сем. 3. EQUISETACEAE Rich. ex DC. - ХВОЩЕВЫЕ

3. *Equisetum telmateia* Ehrh. - Хвощ Тельматея = Прик,М,Ст,ЛН,П,Кисл (Субсредиз*); S(HK); [Pl.]
4. *E. arvense* L. - X. полевой = Прик,Ст,ЛН,СК,Кисл(Голаркт.); Pa,Aa(HK); [Pl.] <Pm>
5. *E. pratense* Ehrh. - X. луговой = П,Кисл(Голаркт.); S,Aa(HK); [R.]
6. *E. palustre* L. - X. болотный = Кисл(Голаркт.); Aa(K); [Sp.]
7. *E. hyemale* L. - X. зимующий = Ст,Прик(Палеаркт.); S,Aa(HK:hv); [Sp.] <Rt>
8. *E. ramosissimum* Desf. - X. ветвистый = Все р-ны(Голаркт.); Pa,Aa(HK); [Pl.]
9. *E. variegatum* Schleich. - X. пёстрый = Кисл(Голаркт.); Db,Aa(K); [Sp.]

ОТДЕЛ POLYPODIOPHYTA - ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ

Класс OPHIOGLOSSOPSIDA - УЖОВНИКОВИДНЫЕ

Сем. 4. OPHIOGLOSSACEAE(R.Br.)Agardh. - УЖОВНИКОВЫЕ

10. ★ *Ophioglossum vulgatum* L. - Ужовник обыкновенный = Ст(Евро-Кавк.); S(HK); [Rs.] <Rg;Rt>
11. ★ *Botrychium lunaria*(L.)Sw. - Гроздовник полулуинный = П,Кисл(Плюрирег.); Pb(HK); [R.] <Rt>

Класс POLYPODIOPSIDA - ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ

Сем. 5. ONOCLEACEAE Pichi Sermolli (*ASPIDIACEAE*) - ОНОКЛЕЕВЫЕ

12. ★ *Matteuccia struthiopteris*(L.)Tod. - Страусник обыкновенный = СТ,П,Кисл (Голаркт.); S(HK); [Sp.]

Сем. 6. ATHYRIACEAE Alst.(ASPIDIACEAE) - КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ

13. *Athyrium filix-femina*(L.)Roth - Кочедыжник женский = Ст,П,Кисл (Плюриег.); S(HK); [Sp.]
14. *Cystopteris fragilis*(L.)Bernh. (*C. filix-fragilis*(L.)Borb.) - Пузырник ломкий = Ст,П,Кисл(Палеаркт.); S(HK); [Pl.]
15. ★ *Rhizomatopteris sudetica*(A.Br. et Milde)A.Khokhr. (*Cystopteris sudetica* A.Br. et Milde) - Ризоматоптерис судетский = Кисл(Европ.); S(HK); [R.] <Rg>
16. *Gymnocarpium dryopteris*(L.)Newm. (*Dryopteris pumila* V.Krecz., *D. linneana* C.Chr.) - Гимнокарпийум кочедыжник = П,Кисл(Голаркт.); S(HK); [R.]

Сем. 7. WOODSIACEAE(Diels)Herter(ASPIDIACEAE) - ВУДСИЕВЫЕ

17. ★ *Woodsia fragilis*(Trev.)Moore - Вудсия ломкая = Кисл(Кавк.); S(HK); [Sp.]
18. ★ *W. glabella* R.Br. - В. гладковатая = Кисл(Голаркт.); S,Da(HK); [Sp.]
19. ★ *W. ilvensis*(L.)R.Br. - В. эльбская = Кисл(Голаркт.); S,Da(HK); [R.]

Сем. 8. DRYOPTERIDACEAE Ching(ASPIDIACEAE) - ЩИТОВНИКОВЫЕ

20. *Dryopteris filix-mas*(L.)Schott - Щитовник мужской = Ст,П,Кисл(Голаркт.); S(HK); [Pl.] <Pm>
21. *D. caucasica*(A.Br.)Fraser-Jenkins et Corley - Щ. кавказский = Ст,П,Кисл (Кавк.); S(HK); [Sp.]
22. *D. carthusiana*(Vill.)H.P.Fusch (*D. lanceolato-cristata* (Hoffm.)Alst., *D. spinulosa* (O.F.Muell.) O.Kuntze) - Щ. картузианский = П,Кисл(Голаркт.); S(HK); [Sp.] <Pm>
23. *D. assimilis* S.Walker (*D. austriaca*(Jacq.)Woynar) - Щ. схожий = П,Кисл (Голаркт.); S(HK); [Sp.] <Pm>
24. ★ *Polystichum aculeatum*(L.)Roth (*P. lobatum*(Huds.)Alst.) - Многорядник мелкошиповатый = Ст,П(Субредиз*); S(HK:hv); [R.] <Rt;Rg>
25. ★ *P. setiferum*(Forssk.)Moore ex Woynar (*P. angulare*(Kit. et Willd.)C.Presl.) - М. щетинконосный = Ст(Темнолесская) (Субредиз*); S(HK:hv); [Rs.] <Rg;Rt>
26. ★ *P. braunii*(Spenn.)Fee - М. Брауна = Ст,П,Кисл(Панбор.); S(HK:hv); [Pl.] <Rt>

Сем. 9. THELIPTERIDACEAE Pichi Sermolli(ASPIDIACEAE) - ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ

27. ★ *Thelypteris palustris* Schott (*Dryopteris thelypteris*(L.)A.Gray) - Телиптерис болотный = HK(Кума),Ст(Кравцово оз.),П(Голаркт.); Ab(K); [R.] <Rg>

Сем. 10. ASPLENIACEAE Newm. - КОСТЕНЦОВЫЕ

28. *Asplenium ruta-muraria* L. - Костенец рута постенная = Ст,П,Кисл(Голаркт.); S,Da(HK:hv); [Pl.] <Rt>

29. *A. septemtrionale*(L.)Hoffm. - К. северный = Ст,П,Кисл(Голаркт.);
S,Da(HK:hv); [Pl.] <Rt>
30. *A. trichomanes* L. - К. волосовидный = Ст,П,Кисл(Плюрирег.); S,Da(HK:hv);
[Pl.] <Rt;Pm>
31. ★*Ceterach officinarum* Willd. - Скребница аптечная = Ст,П,Кисл (Общедр.
средиз.); Da(HK); [R.] <Rt>
32. ★*Phyllitis scolopendrium*(L.)Newm. - Листовник многоножковый = СТ,П,Кисл
(Евро-Кавк.); S(HK:hv); [Sp.] <Rt;Pm>

Сем. 11. HYPOLEPIDACEAE Pichi Sermolli(*PTERIDACEAE*) -
ГИПОЛЕПИСОВЫЕ

33. *Pteridium aquilinum*(L.)Kuhn - Орляк обыкновенный = П(Плюрирег.); S(K);
[R.]
34. *P. tauricum* V.Krecz. - О. крымский = П,Кисл(Кр.-Новоросс.); S(K); [R.] <Rg>

Сем. 12. POLYPODIACEAE Bercht.et J.Presl. - МНОГОНОЖКОВЫЕ

35. ★*Polypodium vulgare* L. - Многоножка обыкновенная = Ст,П,Кисл
(Плюрирег.); S(HK:hv:ep); [Sp.] <Rt>

Класс SALVINIOPSIDA - САЛЬВИНИЕВИДНЫЕ

Сем. 13. SALVINIACEAE T.Lest. - САЛЬВИНИЕВЫЕ

36. ★*Salvinia natans*(L.)All. - Сальвиния плавающая = НК(Кума), ТБ(Томузловка),
М(Тerek)(Плюрирег.); Ac(T); [Sp.]

ОТДЕЛ PINOPHYTA - СОСНООБРАЗНЫЕ (ГОЛОСЕМЕННЫЕ)

Класс PINOPSIDA - СОСНОВИДНЫЕ (ХВОЙНЫЕ)

Сем. 14. TAXACEAE S.F.Gray - ТИСОВЫЕ

37. ★★*Taxus baccata* L. - Тис ягодный = П,Кисл(Евро-Кавк.); S(Phm); [R.]
<Rt;Rg;Pt>

Сем. 15. CUPRESSACEAE Rich.ex Bartl. - КИПАРИСОВЫЕ

38. *Juniperus oblonga* Bieb. - Можжевельник продолговатый = М,П,Кисл,КН
(Кавк.); Da,Db(Phn); <Pa;Pm>
39. *J. sabina* L. - М. казацкий = П,Кисл(Понт.-Южносиб.); Da(Phn); [R.] <Pt;Pm>

ОТДЕЛ EPHEDROPHYTA - ЭФЕДРООБРАЗНЫЕ (ОБОЛОЧКОСЕМЕННЫЕ)

Класс EPHEDROPSIDA - ЭФЕДРОВИДНЫЕ

Сем. 16. EPHEDRACEAE Dumort. - ЭФЕДРОВЫЕ

40. *Ephedra distachia* L. - Эфедра двухколосковая = АИ,Прик,Ст,ЛН,СК,П(Понт.-
Южносиб.); Da,Db(Ch:fl); [Sp.] <Pm>

41. *E. procera* Fisch. et C. A. Mey. - Э. рослая = П, Кисл(Ирано-Туран.); Da(Ch); [Sp.]
<Pm>

ОТДЕЛ MAGNOLIOPHYTA - МАГНОЛИЕОБРАЗНЫЕ (ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ)

Класс LILIOPSIDA - ЛИЛИЕВИДНЫЕ (ОДНОДОЛЬНЫЕ)

Сем. 17. TYPHACEAE Juss. - РОГОЗОВЫЕ

42. *Typha latifolia* L. - Рогоз широколистный = Все р-ны(Голаркт.); Ab(K); [Pl.]
43. *T. laxmannii* Lepech. - Р. Лаксмана = КЕ, МД, АИ, НК, Ст, П(Палеаркт.); Ab(K);
[Sp.]
44. *T. angustifolia* L. - Р. узколистный = Все р-ны (Плюрирег.); Ab(K); [Pl.]
45. *T. domingensis* Pers (*T. australis* Schum. et Thonn., *T. angustata* Bory et Chaub) -
Р. доминирующий = Ст, Кисл(Общедр. средиз.); Ab(K); [R.]
46. *T. minima* Funck - Р. малый = КЕ(Кубань), МД, АИ, НК, ЛН, СК, П (Общедр.
средиз.); Ab(K); [R.]

Сем. 18. SPARGANIACEAE Rudolphi - ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ

47. *Sparganium angustifolium* Michx. - Ежеголовник узколистный = Кисл
(Голаркт.); Ab(K); [R.]
48. *S. erectum* L. - Е. прямой = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, Ст, ЛН, П(Палеаркт.);
Ab(K); [Sp.]
49. *S. neglectum* Beeby - Е. незамеченный = КЕ, МД, АИ, НК, Ст, ЛН, СК, П
(Палеаркт.); Ab (K); [Sp.]
50. *S. microcarpum*(Neum.)Raunk. - Е. мелкоплодный = ЛН, СК, П(Евро-Сиб.);
Ab(K); [R.]

Сем. 19. POTAMOGETONACEAE Dumort. - РДЕСТОВЫЕ

51. *Potamogeton pectinatus* L. - Рдест гребенчатый = МД, АИ, НК, Прик, ТБ, Ст
(Плюрирег.); Ac(K); [R.]
52. *P. filiformis* Pers. - Р. нитевидный = НК(Кума)(Плюрирег.); Ac(K); [R.]
53. *P. berchtoldii* Fieb. - Р. Берхтольда = НК(Кума), Ст, ЛН, П, Кисл(Плюрирег.);
Ac(K); [Sp.]
54. *P. crispus* L. - Р. курчавый = КЕ, МД, АИ, НК, Ст, СК, П(Плюрирег.); Ac(K); [Sp.]
55. *P. lucens* L. - Р. блестящий = НК(Кума), М, Ст, СК(Голаркт.); Ac(K); [sp.]
56. *P. perfoliatus* L. - Р. стеблеобъемлющий = Все р-ны(Плюрирег.); Ac(K); [Sp.]
57. *P. natans* L. - Р. плавающий = Все р-ны(Плюрирег.); Ac(K); [Sp.]
58. *P. nodosus* Poir. - Р. узловатый = П(Плюрирег.); Ac(K); [Sp.]

Сем. 20. RUPPIACEAE Hutch. - РУППИЕВЫЕ

59. *Ruppia maritima* L. - Руппия приморская = МД, АИ, НК, Прик, ТБ, СК
(Плюрирег.); Ac(K); [Sp.]
60. *R. spiralis* L. - Р. спиральная = ТБ, НК(Плюрирег.); Ac(K); [R.]

Сем. 21. ZANNICHELLIACEAE Dumort. - ЗАННИКЕЛИЕВЫЕ

61. *Zannichellia palustris* L. - Занникелия болотная = НК, ТБ, М, Ст, СК (Плюрирег.);
Ac(K); [Sp.]
62. *Z. pedunculata* Reichenb. - З. стебельчатая = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ,
Ст, СК, П(Палеаркт.); Ac(K); [Sp.]
63. *Z. major* Boenn. - З. большая = МД, АИ, НК, СТ, П(Евро-Кавк.); Ac(K); [R.]

Сем. 22. NAJADACEAE Juss. - НАЯДОВЫЕ

64. ★ *Najas major* All. - Наяда большая = КЕ(Новотроицкое вдхр.,
Правоегорлыкский канал) [авт.] (Голаркт.); Ac(T); [R.]
65. ★ *Caulinia minor* (All.) Coss. et Germ (*Najas minor* All.) - Каулиния малая = КЕ
(Новотроицкое вдхр., Правоегорлыкский канал) [авт.] (Палеаркт.); Ac(T); [R.]

Сем. 23. JUNCAGINACEAE Rich. - СИТНИЧКОВЫЕ

66. *Triglochin palustre* L. - Триостенник болотный = Кисл(Палеаркт.); Aa(НК);
[Sp.]

Сем. 24. ALISMATACEAE Vent. - ЧАСТУХОВЫЕ

67. *Alisma plantago-aquatica* L. - Частуха подорожниковая = Все р-ны (Палеаркт.);
Aa(K); [Pl.]
68. *A. lanceolatum* With. - Ч. ланцетная = ТБ, НК, Ст, ЛН, П(Европ.); Aa(K); [Pl.]
69. *A. gramineum* Lej. - Ч. злаковая = КЕ, Ст, ЛН, СК, П(Палеаркт.); Aa(K); [R.]
70. *Sagittaria sagittifolia* L. - Стрелолист стрелолистный = НК(Палеаркт.);
Aa, Ab(K); [R.]

Сем. 25. BUTOMACEAE Rich. - СУСАКОВЫЕ

71. ★ *Butomus umbellatus* L. - Сусак зонтичный = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М, Ст,
ЛН, СК, П(Палеаркт.); Ab(K); [R.]

Сем. 26. HYDROCHARITACEAE Juss. - ВОДОКРАСОВЫЕ

72. *Hydrocharis morsus-ranae* L. - Водокрас лягушачий = НК(Палеаркт.); Ac(T);
[Sp.]
73. *Vallisneria spiralis* L. - Валлинерия спиральная = КЕ(Новотроицкое
вдхр) [авт.]; Ac(HK); [Sp.]

Сем. 27. POACEAE Barnhart - МЯТЛИКОВЫЕ(ЗЛАКОВЫЕ)

74. ★ *Imperata cylindrica*(L.)Raeusch. - Императа цилиндрическая = М,КН
(Общедр.средиз.); Db(HK); [Sp.] <Po>
75. ★ *Erianthus ravennae*(L.)Beauv. - Эриантус Равенны = М,П,Кисл,КН
(Вост.др.средиз.); Aa(K); [R.]
76. *Botriochloa ischaemum*(L.)Keng (*Andropogon ischaemum* L.) - Бородач
кровеостанавливающий = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST(HK); [Soc.] <Pp>
77. *Sorghum halepense* (L.)Pers. - Сорго гумай = М,ЛН,СК,П(Общедр.средиз.);
Rb(HK); [Pl.] <Pp>
78. *Chrysopogon gryllus*(L.)Trin. - Золотобородник цикадовый = ЛН
(Зап.др.средиз.); ST(HK); [R.]
79. *Tragus racemosus*(L.)All. - Трагус кистевидный = Все р-ны(Зап.др.средиз.);
Db,Ra(T); [Pl.]
80. *Eriochloa villosa*(Thunb.)Kunth - Шерстняк волосистый = ЛН,СК(Адвент.
[Япония,Китай]); Rb(T); [R.]
81. *Digitaria ischaemum*(Schreb.)Muehl (*D. linearis*(L.)Crep.) - Росичка крове-
останавливающая = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Db,Rb(HK); [Sp.]
82. *D. aegyptiaca*(Retz.)Willd. - Р. египетская = М,СК,П(Субсредиз*); Db,Rb(T);
[Sp.]
83. *D. sanguinalis*(L.)Scop. - Р. кровяная = Все р-ны(Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Pl.]
84. *D. pectiniformis*(Henrard)Tzvel. - Р. гребенчатая = КЕ,Ст,СК,П,КН
(Субсредиз*); Db(T); [R.]
85. *Brachiaria eruciformis*(Smith.)Griseb. - Брахиария гусеницевидная = Ст
(Вост.др.средиз.); Ra,Rb(T); [R.]
86. *Echinochloa crusgalli*(L.)Beauv. - Куриное просо обыкновенное = Все р-ны
(Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Pl.]
87. *E. oryzoides*(Ard.)Fritsch - К.п. рисовидное = СК(Адвент.[Япония, Китай]);
Ab,Ra(T); [R.]
88. *E. phyllopogon*(Stapf)Kossenko - К.п. волосистолистное = ЛН,СК(Адвент.
[Япония,Китай]); Ab,Ra(T); [R.]
89. *E. occidentalis*(Wiegand)Rydb. (*E. spiralis* Vasing.) - К.п. спиральное = ЛН,
СК(Адвент.[Япония, Китай]); Ab,Ra(T); [R.]
90. *Panicum miliaceum* L. - Просо посевное = Все р-ны(Адвент.[космополитный]);
Ra,Rb(T); [Sp.]
91. *Setaria verticillata*(L.)Beauv. - Щетинник мутовчатый = Все р-ны (Палеаркт.);
Ra,Rb(T); [Pl.]
92. *S. pumila*(Poir.)Schult. (*S. glauca*(L.)Beauv.) - Щ. сизый = Все р-ны (Адвент.
[космополитный]); Ra,Rb(T); [Pl.]
93. *S. viridis*(L.)Beauv. - Щ. зелёный = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
94. *Leersia oryzoides*(L.)Sw. - Леерсия рисовидная = ЛН,П(Палеаркт.); Ab(HK);
[R.]

95. *Phalaroides arundinacea*(L.)Rauschert - Двукисточник тростниковый = КЕ,М, Ст,ЛН,СК,П(Голаркт.); Аа(К); [R.]
96. *Phalaris canariensis* L. - Канареечник канарский = Кисл(Адвент.[Зап. Средиземноморье]); Rb(T); [R.]
97. *Anthoxanthum alpinum* A.et D.Love - Душистый колосок альпийский = [Ст: Колмаков, 1928],П(Евро-Сиб.); Pb(HK); [Sp.] <Pa>
98. *Hierochloe odorata*(L.)Beauv. - Зубровка душистая = Ст,СК(Голаркт.); Pa,ST(HK); [R.] <Pa>
99. *Stipa capillata* L. - Ковыль волосатик = Все р-ны(Палеаркт.); ST(HK); [Sp.]
100. ★ *S. sareptana* A.Beck. - К. сарептский = НК,КН(Субтуран*.); ST,Db(HK); [R.]
101. ★ *S. caucasica* Schmalh. - К. кавказский = П,Кисл(Ирано-Туран.); Da(HK); [R.]
102. ★ *S. caspia* C.Koch - К. каспийский = НК,КН(Туранск.); Db(HK); [Sp.]
103. *S. lessingiana* Trin.et Rupr. - К. Лессинга = Все р-ны(Субтуран*); ST(HK); [Pl.]
104. ★★ *S. dasypylla*(Lindem.)Trautv. - К. опушённолистный = Ст(Понт.-Южносиб.); ST(HK); [R.]
105. ★★ *S. pulcherrima* C.Koch - К. красивейший = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Pl.]
106. *S. tirsia* Stev. (*S. longifolia* Borb.; *S. stenophylla*(Lindem.)Trautv.) - К. пирамидальный = Ст,П,КН(Субсредиз*); ST(HK); [Sp.]
107. ★★ *S. ucrainica* P.Smirn. - К. украинский = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК (Понтич.); ST(HK); [Sp.]
108. ★★ *S. pennata* L. (*S. joannis* Celac.) - К. перистый = Все р-ны(Субтуран*); ST,Db(HK); [Pl.] <Pm>
109. *S. pontica* P.Smirn. - К. понтийский = Ст,П(Зап.др.средиз.); Da(HK); [R.]
110. *Achnatherum caragana*(Trin.)Nevski - Чий карагана = Кисл(Туранск.); Da(HK); [R.]
111. *Piptatherum virescens*(Trin.)Boiss. (*Oryzopsis virescens*(Trin.) G.Beck) - Пиптатерум зеленоватый = ЛН,Ст,П,Кисл,КН(Вост.др.средиз.); S(HK); [Sp.]
112. *P. holciformis*(Bieb.)Roem.et Schult. (*O. holciforme*(Bieb.)Hack.) - П. бухарниковый =ЛН,П(Вост.др.средиз.); Da(HK); [R.]
113. *Milium vernale* Bieb. - Бор весенний = Прик,ТБ,[НК:Кононов, Тан菲尔ев, 1987],ЛН,Ст(Субсредиз*); Pa(T); [Sp.]
114. *M. effusum* L. - Б. развесистый = [Ст: Кононов, Тан菲尔ев, 1987],П,Кисл (Голаркт.); S(HK); [Sp.]
115. *Crypsis aculeata*(L.)Ait. - Скрытница колючая = Все р-ны(Зап.др.средиз.); Dd(T); [Sp.]
116. *C. schoenoides*(L.)Lam. (*Heleochnloa schoenoides*(L.)Host.ex Roem.) - С. камы-шевидная = Все р-ны(Зап.др.средиз.); Dc,Dd,Aa(T); [Sp.]
117. *C. alopecuroides*(Pill.et Mitt.)Schrad. (*H. alopecuroides*(Pill.et Mitt.)Host ex Roem.) - С. лисохвостная = КЕ,М,ЛН,СК,П(Зап.др.средиз.); Dc,Dd,Aa(T); [Sp.]

118. *Phleum pratense* L. - Тимофеевка луговая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Pb (HK); [Pl.]
119. *Ph. paniculatum* Huds. - Т. метельчатая = Все р-ны(Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.]
120. *Ph. phleoides*(L.)Karst. - Т. степная = Все р-ны(Палеаркт.); ST(HK); [Pl.]
121. *Ph. montanum* C.Koch - Т. горная = П,Кисл(Кавк.); Pa(HK);[Sp.]
122. *Ph. nodosum* L. - Т. узловатая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST,Db(HK); [Sp.]
123. *Alopecurus myosuroides* Huds. - Лисохвост мышевостниковый = КЕ,М,ЛН, Ст,П(Зап.др.средиз.); Aa(T); [R.]
124. *A. aequalis* Sobol. - Л. равный = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(T); [Sp.]
125. *A. pratensis* L. - Л. луговой = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Сиб.); Pa(HK); [Sp.] <Pp>
126. *A. arundinaceus* Poir. - Л. тростниковый = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(HK); [Sp.]
127. *A. vaginatus*(Willd.)Pall.ex Kunth - Л. влагалищный = ЛН,СК,П,Кисл (Общедр.средиз.); Pb(HK); [Sp.]
128. *A. glacialis* C.Koch - Л. ледниковый = П,Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Pl.]
129. *Polypogon monspeliensis*(L.)Desf.-Многобородник монспелиенский = М (Терек),П(Общедр.средиз.); Aa(T); [R.]
130. ★★ *Zingeria biebersteiniana*(Claus)P.Smirn. - Цингерия Биберштейна = Кисл (Понтич.); Pa,Aa(T); [Rs.] <Rg>
131. *Agrostis planifolia* C.Koch - Полевица плосколистная = П,Кисл(Ирано-Туран.); S,Pb(HK); [Sp.]
132. *A. vinealis* Schreb. (*A. tenuifolia* Bieb.; *A. marschalliana* Seredin) - П. виноградниковая = Ст,П,Кисл(Понтич.); Pb(HK); [Pl.] l.c. Бештау
133. *A. stolonifera* L. - П. корневищная = Все р-ны(Голаркт.); Aa(HK); [Sp.]
134. *A. tenuis* Sibth. - П. тонкая = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Сиб.); Pa(HK); [Pl.]
135. *A. gigantea* Roth - П. гигантская = Все р-ны(Голаркт.); Aa(HK); [Sp.]
136. *Calamagrostis arundinacea*(L.)Roth - Вейник тростниковый = ЛН,П,Кисл (Палеаркт.); Pb(HK); [Sp.]
137. ★ *C. canescens*(Web.)Roth (*C. lanceolata* Roth) - В. седеющий = Ст[оз. Кравцово: Колмаков, 1928](Европ.); Aa(HK); [Rs.] <Rg>
138. *C. teberdensis* Litv. - В. тебердинский = Кисл(Джинал)(Кавк.); S(HK); [R.]
139. *C. epigeios*(L.)Roth - В. наземный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(HK); [Pl.]
140. *C. pseudophragmites*(Hall fil.)Koel. - В. ложнотростниковый = КЕ,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Палеаркт.); Aa(HK); [Pl.]
141. *Apera spica-venti*(L.)Beauv. - Метелица обыкновенная = НК(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [R.]
142. *A. interrupta*(L.)Beauv. - М. прерывистая = НК,ТБ,М,КН(Общедр.средиз.); Ra(T); [R.]

143. *Holcus lanatus* L. - Бухарник шерстистый = ЛН(Невинномысск, Надзорное), Ст,Кисл(Европ.); Pa(НК); [Sp.]
144. *Trisetum rigidum*(Bieb.)Roem.et Schult. - Трищетинник жёсткий = ЛН (Невинномысск),Кисл(Армено-Иран.); Pa(НК); [Sp.] <Рg>
145. *T. turcicum* Chrtek (*T. sibiricum* Rupr.) - Т. турецкий = П,Кисл(Голаркт.); Pa(НК); [Sp.]
146. *T. flavescens*(L.)Beauv. (*T. pratense* Pers.) - Т. желтоватый = [Ст(Ставрополь): Колмаков, 1928],П,Кисл(Субсредиз*); Pa(НК); [Sp.]
147. *Trisetaria cavanillesii*(Trin.)Maire (*Trisetum cavanillesii* Trin.) - Трисетария Каванилля = М(Терские пески),КН(Общедр.средиз.); Db(Т); [Sp.]
148. *Ventenata dubia*(Leers)Coss. - Вентената сомнительная = М,Ст,ЛН,СК,П (Зап.др.средиз.); S(Т); [Sp.]
149. *Avena fatua* L. - Овсянка пустой = Все р-ны(Голаркт.); Ra,Rb(Т); [Sp.]
150. *A. persica* Steud. (*A. ludoviciana* Durieu) - О. персидская = Все р-ны (Общедр.средиз.); Ra,Rb(Т); [Sp.]
151. *A. eriantha* Durieu - О. мохнатоцветковый = М,КН[Цвелёв, 1976] (Общедр.средиз.); Da,Db(Т); [Sp.]
152. *Helictotrichon pubescens*(Huds.)Pilg. - Овсец опушённый = Ст,ЛН,П,Кисл (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.]
153. *H. adzharicum*(Albov)Grossh. - О. аджарский = ЛН,П,Кисл(Кавк.); Pb,Pc(НК); [Sp.]
154. *Arrhenantherum elatius*(L.)J.et C.Presl - Французский райграс высокий = Ст, ЛН,П,Кисл(Европ.); Pa(НК); [Sp.] <Рp>
155. *Cynodon dactylon*(L.)Pers. - Свинорой пальчатый = Все р-ны (Общедр. средиз.); ST,Ra,Rb(НК); [Pl.] <Рp;Pm>
156. *Beckmannia eruciformis*(L.)Host - Бекмания гусеницевидная = КЕ,М,Ст,ЛН, СК(Субсредиз*); Aa(K); [Sp.]
157. *Sesleria alba* Smith (*S. anatolica* Deyl.) - Сеслерия белая = Кисл(Средиз.); Da(НК); [R.]
158. *S. phleoides* Stev.ex Roem.et Schult. - С. тимофеевковидная = Кисл (Зап.др.средиз.); Da(НК); [R.]
159. *S. heufleriana* Schur - С. Гейфлера = Кисл(Понтич); Da(НК); [R.]
160. *Phragmites australis*(Cav.)Trin.ex Steud. - Тростник южный = Все р-ны (Плюрирег.); Aa(НК); [Pl.] <Рm>
161. *Cleistogenes bulgarica*(Bornm.)Keng (*Diplachne bulgarica*(Bornm.)Bornm.; *Cleistogenes maeotica* Klok.et Zoz) - Змеёвка болгарская = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН, СК,П, Кисл,КН(Понт.-Южносиб.); ST,Db(НК); [Sp.]
162. *C. serotina*(L.)Keng. (*Diplachne serotina*(L.)Link) - З. поздняя = М (Средиземн.); ST,Pa(НК); [R.]

163. *Molinia coerulea*(L.)Moench - Молиния голубая = Кисл(Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.]
164. *M. litoralis* Host - М. прибрежная = Кисл(Европ.); Aa(НК); [R.]
165. *Eragrostis minor* Host. - Полевичка малая = Все р-ны(Голаркт.); ST,Ra(T); [Sp.]
166. *E. collina* Trin. (*E. arundinacea*(L.)Roshev.) - П. холмовая = ТБ,М,П,КН (Субтуран*); ST,Dc(НК); [Sp.]
167. *E. pilosa*(L.)Beauv. - П. волосистая = Ст,ЛН(Голаркт.); Rb(T); [R.]
168. *Koeleria caucasica*(Domin)B.Fedtsch. - Тонконог кавказский = Ст,П,Кисл (Вост.др.средиз.); Pb(НК); [Sp.]
169. *K. luersennii*(Domin)Domin - Т. Люерсена = Прик,ТБ,Ст,ЛН,П,Кисл (Эукавк.); ST(НК); [Sp.]
170. *K. cristata*(L.)Pers. - Т. гребенчатый = Все р-ны(Голаркт.); ST(НК); [Pl.] <Рр>
171. *Melica transsilvanica* Schur - Перловник транссильванский = Все р-ны (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
172. *M. taurica* C.Koch - П. крымский = Все р-ны(Вост.др.средиз.); ST(НК); [Sp.]
173. *M. altissima* L. - П. высокий = Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субтуран*); Pa(НК); [Sp.]
174. *M. uniflora* Retz. - П. одноцветковый = ЛН(Европ.); S(НК); [Sp.]
175. *M. nutans* L. - П. поникающий = Ст,ЛН,П,Кисл(Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.]
176. *M. picta* C.Koch - П. пёстрый = Прик,М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
177. *Briza australis* Procud. - Трясунка южная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); Pa(НК); [Sp.]
178. *B. elatior* Sibth.et Smith - Т. высокая = П,Кисл(Вост.др.средиз.); Pb(НК); [Sp.] <Ро>
179. *Aeluropus littoralis*(Gouan)Parl. - Прибрежница обыкновенная = МД,АИ,НК, Прик,М,Ст,КН(Общедр.средиз.); Dc(НК); [Sp.]
180. *Ae. pungens*(Bieb.)C.Koch - П. колючая = КН(Субтуран*); Dc(НК); [R.]
181. *Dactylis glomerata* L. - Ежа сборная = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Рр>
182. *D. polygama* Horvat. - Е. многобрачная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); S(НК); [Pl.] <Рр>
183. *Cynosurus cristatus* L. - Гребневик обыкновенный = Ст[Колмаков, 1928] (Субсредиз*); S,Pa(НК); [R.]
184. *Sclerochloa dura*(L.)Beauv. - Жесткоколосница твёрдая = Все р-ны (Общедр.средиз.); Rb(T); [Pl.]
185. *Poa compressa* L. - Мятлик сплюснутый = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,П,Кисл (Европ.); Pa(НК); [Sp.]
186. *P. annua* L. - М. однолетний = Все р-ны(Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]
187. *P. bulbosa* L. - М. луковичный = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Rb(НК:ephd); [Pl.]

188. *P. crispa* Thuill. - М. живородящий = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Rb (HK:ephd); [Pl.]
189. *P. sylvicola* Guss. - М. лесной = Все р-ны(Зап.др.средиз.); S(HK); [Sp.]
190. *P. trivialis* L. - М. обыкновенный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Aa(HK); [Pl.]
191. *P. pratensis* L. - М. луговой = Все р-ны(Голаркт.); Pa(HK); [Pl.] <Pp>
192. *P. angustifolia* L. - М. узколистный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(HK); [Sp.] <Pp>
193. *P. iberica* Fisch.et C.A.Mey. - М. грузинский = П,Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Pl.] <Pp>
194. *P. badensis* Haenke (*P. alpina* auct.) - М. баденский = Ст,ЛН,П,Кисл (Голаркт.); Pa(HK); [Pl.]
195. *P. sterilis* Bieb. - М. бесплодный = Ст,ЛН,СК,П(Понтич.); Da(HK); [R.]
196. *P. nemoralis* L. - М. боровой = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Панбор.); S(HK); [Pl.]
197. *P. palustris* L. - М. болотный = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П(Голаркт.); Aa(HK); [Sp.]
198. *Catabrosella humilis*(Bieb.)Tzvel. (*Colpodium humile*(Bieb.)Griseb.) - Катаброзелла низкая = Ст,СК,П(Субтуран*);Db(HK); [R.] l.c. Бештау
199. *Colpodium versicolor*(Stev.)Schmalh. - Кольподиум разноцветный = П,Кисл (Кавк.); Pb(HK); [Sp.]
200. *Catabrosa aquatica*(L.)Beauv. - Поручейница водная = Все р-ны(Голаркт.); Aa(HK); [Pl.]
201. *Glyceria fluitans*(L.)R.Br. - Манник наплывающий = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,П, Кисл(Панбор.); Aa(HK); [Sp.]
202. *G. notata* Chevall. (*G. plicata*(Fries)Fries) - М. складчатый = МД,Ст,ЛН, П,Кисл(Палеаркт.); Aa(HK); [Sp.]
203. *G. nemoralis*(Uechtr.)Uechtr.et Koern. - М. дубравный = ЛН,СК,П(Евро-Кавк.); S(HK); [Sp.]
204. *G. arundinacea* Kunth - М. тростниковый = КЕ,Прик,ТБ,НК(Палеаркт.); Aa(HK); [R.]
205. *G. maxima*(C.Hartm.)Holub (*G. aquatica*(L.)Wachlenb.) - М. большой = КЕ, Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П(Палеаркт.); Aa(HK); [Sp.]
206. *Puccinellia distans*(Jacq.)Parl. (*Atropis distans*(Jacq.)Griseb.) - Бескильница расставленная = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(HK); [Sp.]
207. *P. gigantea*(Grossh.)Grossh. - Б. крупная = СК,П(Туранск.); Aa,Dc(HK); [R.]
208. *P. poecilantha*(C.Koch)Grossh. - Б. пестроцветковая = МД(Туранск.); Aa,Dc(HK); [Sp.]
209. *P. dolicholepis* V.Krecz. - Б. длинночешуйчатая = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,СК (Субтуран*); Aa,Dc(HK); [Sp.]

210. *P. fominii* Bilyk - Б. Фомина = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, Ст, СК (Понтич.); Db, Dc (HK); [R.]
211. *Leucopoa sclerophylla* (Boiss. et Hohen.) V. Krecz. et Bobr. (*Festuca sclerophylla* Boiss. et Bischoff.) - Беломятник жестколистный = СК, П, Кисл (Арmeno-Иран.); Da (HK); [R.] <Po>
212. *Festuca gigantea* (L.) Vill. - Овсяница исполинская = Ст, СК, ЛН, П, Кисл (Палеаркт.); S (HK); [Pl.]
213. *F. pratensis* Huds. - О. луговая = Все р-ны (Палеаркт.); Pa, ST (HK); [Pl.] <Pp>
214. *F. regeliana* Pavl. (*F. orientalis* (Hack.) V. Krecz. et Bobr.) - О. Регеля = Все р-ны (Палеаркт.); Pa (HK); [Sp.]
215. *F. drymeia* Mert. et Koch (*F. montana* Bieb.) - О. горная = ЛН, СК, П, Кисл (Кавк.-Эвкс.); S (HK); [Pl.]
216. *F. altissima* All. (*F. sylvatica* (Poll.) Holub) - О. высокая = Ст, СК, П, Кисл (Палеаркт.); S (HK); [Sp.]
217. *F. rubra* L. - О. красная = Ст (Ставрополь), П, Кисл (Палеаркт.); Pb, Pc (HK); [Sp.]
218. *F. woronowii* Hack. - О. Воронова = Кисл (Кавк.); Pb (HK); [Pl.]
219. *F. heterophylla* Lam. - О. разнолистная = П (Машук), Кисл (Европ.); S (HK); [R.]
220. *F. ovina* L. - О. овечья = Все р-ны (Европ.); ST (HK); [Sp.] <Pp>
221. *F. beckeri* (Hack.) Trautv. - О. Беккера = Прик (Бешпагир) (Понт.-Южносиб.); Dd (HK); [R.]
222. *F. valesiaca* Gaudin - О. валезская = Все р-ны (Палеаркт.); ST (HK); [Pl.] <Pp>
223. *F. saxatilis* Schur - О. скальная = Кисл (Зап. др. средиз.); Da (HK); [Sp.]
224. *Vulpia myuros* (L.) C. C. Gmel. - Вульпия мышехвостниковая = П (Общедр. средиз.); SD (HK); [R.]
225. *Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub - Кострец безостый = Все р-ны (Палеаркт.); Pa (HK); [Pl.] <Pp>
226. *B. biebersteinii* (Roem. et Schult.) Holub - К. Биберштейна = П [Бештау: Коннов, Танфильев, 1987], Кисл (Кавк.); Da (HK); [Sp.]
227. *B. benekenii* (Lange) Holub - К. Бенекена = Ст, ЛН, П (Палеаркт.); S (HK); [Sp.]
228. *B. riparia* (Rehm.) Holub - К. береговой = Все р-ны (Понт.-Южносиб.); ST (HK); [Pl.] <Pp>
229. *B. variegata* (Bieb.) Holub - К. пёстрый = П, Кисл (Ирано-Туран.); Pb, Pc (HK); [Sp.] <Pp>
230. ★ *B. gordjaginii* (Tzvel.) Galushko - К. Гордягина = Ст, СК, П, Кисл (Предкавк.); Da (HK); [Sp.] <Ee> l. c. ст. Подкумок (рис. 1)
231. *Anisanta sterilis* (L.) Nevski - Анизанта стерильная = Все р-ны (Общедр. средиз.); ST, Ra, Rb (T: eph); [Sp.]
232. *A. tectorum* (L.) Nevski - А. кровельная = Все р-ны (Голаркт.); ST, Ra, Rb (T: eph); [Sp.]

233. *Bromus arvensis* L. - Костёр полевой = КЕ, МД, АИ, Прик, НК, Ст, ЛН, П
(Палеаркт.); Pa, ST(T); [Sp.]
234. *B. secalinus* L. - К. ржаной = Ст, ЛН, СК, П(Палеаркт.); Ra(T);]R.]
235. *B. mollis* L. - К. мягкий = Все р-ны(Голаркт.); Pa, Ra(T); [Sp.]
236. *B. scorpioides* L. - К. метельчатый = Все р-ны(Вост.др.средиз.); Aa, Rb(T); [Pl.]
237. *B. commutatus* Schrad. - К. переменчивый = Все р-ны(Европ.); Pa(T); [Sp.]
238. *B. squarrosum* L. - К. растопыренный = Все р-ны(Средиземн.); ST, Rb(T); [Sp.]
239. *B. japonicus* Thunb. - К. японский = Все р-ны(Палеаркт.); ST, Ra(T); [Sp.]
240. *Brachypodium sylvaticum*(Huds.)Beauv. - Коротконожка лесная = КЕ, Прик,
ТБ, НК, Ст, ЛН, П, Кисл(Палеаркт.); S(HK); [Pl.]
241. *B. pinnatum*(L.)Beauv. - К. перистая = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, П, Кисл
(Палеаркт.); S(HK); [Sp.]
242. *B. rupestre*(Host.)Roem. et Schult - К. скальная = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, П,
Кисл(Евро-Кавк.); S(HK); [R.]
243. *Lolium temulentum* L. - Плевел опьяняющий = Ст, ЛН(Палеаркт.); Rb(T); [R.]
244. *L. persicum* Boiss. et Hohen. - П. персидский = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, П
(Ирано-Туран.); Db, Rb(T); [Sp.]
245. *L. perenne* L. (*L. marschallii* Stev.) - П. многолетний = Все р-ны(Голаркт.);
Pa, Rb(HK); [Sp.] <Pp>
246. *L. rigidum* Gaudin - П. жёсткий = Ст(Зап.др.средиз.); ST, Db(T); [Sp.]
247. *L. marschallii* Stev. - П. Маршалла = Кисл(Кавк.); Pa(HK); [R.]
248. *Pholiurus pannonicus*(Host)Trin. - Чешуехвостник венгерский = КЕ, МД, АИ,
НК, Прик, ТБ, М, Ст, СК(Субтуран*); Dc(T); [R.]
249. *Elymus caninus*(L.)L. (*Roegneria canina*(L.)Nevski; *Elytrigia canina*(L.)Drob.) -
Элимус собачий = Ст, П, Кисл(Палеаркт.); Aa(HK); [R.]
250. *Elytrigia gracillima*(Nevski)Nevski - Пырей стройный = ЛН, СК, П, Кисл
(Эукавк.); Da(HK); [R.]
251. ★ *E. dshinalica* Sablina - П. джинальский = Кисл(Кавк); Da(HK); [R.] <Es> 1.c.
Кисловодск (рис. 2)
252. ★★ *E. stipifolia*(Czern. ex Nevski)Nevski - П. ковылелистный =
КЕ, АИ, НК, Прик, ТБ, Ст, СК, Кисл(Понт.-Южносиб.); ST(HK); [R.]
253. *E. elongata*(Host)Nevski - П. удлинённый = Все р-ны(Средиземн.); Dc(HK);
[Sp.] <Pp>
254. *E. repens*(L.)Nevski - П. ползучий = Все р-ны(Палеаркт.); Pa, ST, Ra, Rb (HK);
[Pl.] <Pm; Pp>
255. *E. pseudocesia*(Pacz.)Prokud. - П. ложноизюматый = КЕ, МД, АИ, НК, Прик,
ТБ, М, Ст, СК(Понт.-Южносиб.); ST, Db(HK); [Sp.] <Pp>
256. *E. intermedia*(Host)Nevski - П. средний = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST(HK);
[Sp.] <Pp>

257. *E. trichophora*(Link)Nevski - П. волосоносный = ЛН,Ст,СК,П,Кисл
(Вост.др.средиз.); Pa,ST(HK); [Sp.] <Pp>
258. *E. pulcherrima*(Grossh.)Nevski - П. красивейший = П,Кисл(Армено-Иран.);
ST(HK); [R.]
259. *E. maeotica*(Prokud.)Prokud. - П. азовский = КЕ,МД,НК,Прик,ТБ,СК,КН
(Туранск.); Dc(HK); [Sp.] <Pp>
260. *Agropyron fragile*(Roth)P.Gandary - Житняк ломкий = НК,Прик,ТБ,Ст,СК
(Понтич.); Db,Dd(HK); [Pl.] <Pp>
261. *A. desertorum*(Fisch.ex Link)Schult. - Ж. пустынный = НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК
(Понтич.); Da,Dd(HK); [Sp.] <Pp>
262. *A. pectinatum*(Bieb.)Beauv. (*A. imbricatum* Roem. et Schult.) - Ж. гребенчатый =
Все р-ны(Палеаркт.); ST(HK) [Pl.] <Pp>
263. *Eremopyrum triticeum*(Gaertn.)Nevski - Мортук пшеничный = КЕ,МД,АИ,НК,
Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,СК(Субтуран*.); Dc(T); [Sp.]
264. *E. orientale*(L.)Jaub. et Spach - М. восточный = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,
Ст,СК(Общедр.средиз.); Db,Dc(T); [Sp.]
265. *Secale sylvestre* Host - Рожь лесная = Все р-ны(Субтуран*.); Db(T); [Sp.]
<Pp>
266. *S. cereale* L. - Р. посевная = Все р-ны(Туранск.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pp>
267. *Aegylops cylindrica* Host - Эгилопс цилиндрический = Все р-ны (Субтуран*.*.);
Pa,ST,Rb(T); [Pl.]
268. *Ae. tauschii* Coss. - Э. Тауша = НК,М(совхоз Рошинский)(Ирано-Туран.);
ST,Rb(T); [Sp.]
269. ★★ *Hordelymus europaeus*(L.)Harz - Горделимус европейский = Ст,П,Кисл
(Европ.); S(HK); [R.]
270. *Hordeum violaceum* Boiss. et Huet - Ячмень фиолетовый = П,Кисл(Армено-
Иран.); Pb(HK); [Sp.]
271. *H. leporinum* Link - Я. заячий = Все р-ны(Вост.др.средиз.); Rb(T); [Pl.]
272. *H. glaucum* Steud. - Я. сизый = КЕ,МД, АИ,НК,КН(Вост.др.средиз.); Dc(T);
[Sp.]
273. *H. geniculatum* All. - Я. коленчатостебельный = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,
Ст,СК,П(Субсредиз*.*.); Db,Dc,Dd(T); [Sp.]
274. *Psathyrostachys juncea*(Fisch.)Nevski - Ломкоостенник ситниковый = КН
(северная часть)(Вост.др.средиз.); Dc(T); [R.]
275. *Aneurolepidium ramosum*(Trin.)Nevski (*Leymus ramosus*(Trin.)Tzvel.) - Вострец
ветвистый = НК,КН(Субтуран*.*.); Dc(HK); [R.]
276. *Leymus racemosus*(Lam.)Tzvel. - Колосняк ветвистый = МД,КН (Субтуран*.*.);
Db(HK); [Pl.]

Сем. 28. CYPERACEAE Juss. - ОСОКОВЫЕ

277. *Cyperus fuscus* L. - Сыть чёрно-бурая = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(T); [Sp.]
278. *C. glomeratus* L. - C. скученная = Ст,СК,П(Палеаркт.); Aa(T); [R.]
279. *Juncellus pannonicus*(Jacq.)Clarke (*Acorellus pannonicus*(Jacq.)Palla) - Аирник венгерский = КН(Субтуран*); Aa(T); [R.]
280. *Pycreus flavescens*(L.)Beauv.ex Reichenb. - Ситовник желтеющий
КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П(Голаркт.); Aa(T); [Sp.]
281. *Baeothrion pumilum*(Vahl)A.et D.Love - Беотрион маленький = Кисл(Палеаркт.); Aa(K); [R.]
282. *Scirpoides holoschoenus*(L.)Sojak (*Holoschoenus vulgaris* Link, *H. romanus*(L.)Fritsch) - Камышник (Голосхенус)обыкновенный = КЕ,Ст,ЛН,СК,П(Общедр. средиз.); Aa(HK); [Sp.]
283. *Scirpus sylvaticus* L. - Камыш лесной = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Сиб.); S,Aa(HK); [Sp.]
284. *Schoenoplectus mucronatus*(L.)Palla. (*Scyrpus mucronatus* L.) - Шеноплектус. остроконечный = ЛН(Кочубеевское)[Кононов, Тан菲尔ев, 1987](Палеаркт.); Aa(HK); [R.]
285. *Sch. setaceus* (L.)Palla (*S. setaceus* L.) - III. щетинковидный = П,Кисл(Палеаркт.); Aa(T); [Sp.]
286. *Sch. lacustris*(L.)Palla (*S. lacustris* L.) - III. озёрный = Все р-ны(Панбор.); Ab(K); [Pl.]
287. *Sch. tabernemontani*(C.C.Gmel.)Palla (*S. tabernemontanii* C.C.Gmel.) - III. Табернемонтана = Все р-ны(Палеаркт.); Ab(K); [Sp.]
288. *Sch. triqueter*(L.)Palla (*S. triqueter* L.) - III. трёхгранный = МД,НК,ТБ,КН(Голаркт.); Aa(HK); [Sp.]
289. *Sch. litoralis*(Schrad.)Palla (*S. litoralis* Schrad.) - III. приморский = МД,НК,ЛН,КН(Турansk.); Aa(HK); [R.]
290. *Sch. hippolyti* (V.Krecz.)V.Krecz. (*S. hippolyti* V.Krecz.) - III. гиполитный = ЛН(Невинномысск),П(Ессентуки)[Егорова, 1991](Палеаркт.); Ab(K); [Rs.]
291. *Bolboschoenus maritimus*(L.)Palla (*B. compactus*(Hoffm.)Drob.) - Клубнекамыш морской = Все р-ны(Голаркт.); Aa,Ab(K); [Pl.]
292. *Blymus compressus*(L.)Panz.ex Link - Блимус сжатый = Кисл(Европ.); Aa(K); [Sp.]
293. *Eleocharis austriaca* Hayek (*E. leptostylospodiata* Zinserl.) - Болотница австрийская = Ст,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Aa,Ab(K); [Sp.]
294. *E. intersita* Zinserl. - Б. промежуточная = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК(Голаркт.); Aa(HK); [R.]
295. *E. palustris*(L.)Roem.et Schult. (*E. crassa* Fisch. et C.A.Mey. ex Zinserl.) - Б. болотная = Все р-ны(Субтуран*); Aa,Ab(K); [Sp.]

296. *E. mitracarpa* Steud. (*E. argyrolepidoides* Zinserl., *E. equisetiformis* (Meinsh.) B.Fedtsch.) - Б. ложносеребристочешуйчатая = НК, КН(Понтич.); Аа, Ab(K); [R.]
297. *E. acicularis*(L.)Roem.et Schult. - Б. игольчатая = МД(Голаркт.); Аа, Ab(K); [Sp.]
298. *E. uniglumis*(Link)Schult. (*E. multiseta* Zinserl.) - Б. одночешуйчатая = КЕ, МД, НК, ТБ, Ст, КН(Субтуран*); Аа, Dc(HK); [R.]
299. ★★ *Cladium mariscus*(L.)Pohl - Меч-трава обыкновенная = Ст, П (Зап.др средиз.); Ab(K); [Rs.]
300. *Carex hirta* L. - Осока волосистая = Все р-ны(Европ.); Аа(K); [Sp.]
301. ★ *C. lasiocarpa* Ehrh. - О. волосистоплодная = Ст[Галушко, 1979] (Палеаркт.); Ab(K); [R.] <Rg>
302. *C. vesicaria* L. - О. пузырчатая = Все р-ны[Егорова, 1991](Палеаркт.); Ab(K); [Sp.]
303. *C. acutiformis* Ehrh. - О. островатая = Все р-ны(Палеаркт.); Ab(K); [Pl.]
304. *C. riparia* Curt. - О. береговая = Все р-ны(Палеаркт.); Ab(K); [Pl.]
305. *C. melanostachya* Bieb.ex Willd. - О. черноколосая = Все р-ны(Палеаркт.); Аа(HK); [Pl.]
306. *C. pseudocyperus* L. - О. ложносыть = Все р-ны [Егорова, 1991](Голаркт.); Ab(K); [R.] <Rg>
307. *C. hordeistichos* Vill. - О. ячменорядная = Все р-ны[Егорова, 1991]
(Субсредиз*); Ab(K); [Sp.]
308. *C. secalina* Willd.ex Wachlenb. - О. ржаная = Ст, П(Евро-Сиб.); Аа(HK); [R.]
309. *C. sylvatica* Huds. - О. лесная = КЕ, Прик, ТБ, НК, ЛН, Ст, П, СК(Европ.); S(HK); [Pl.]
310. *C. pendula* Huds. - О. пониклая = Ст, ЛН, П(Субсредиз*); S(HK); [Sp.]
311. *C. cuspidata* Host - О. заострённая = Ст, ЛН(Зап.др. средиз.); S(HK); [Sp.]
312. ★ *C. depauperata* Curt.ex With. - О. обеднённая = Ст(Европ.); S(HK); [R.] <Rg>
313. *C. michelii* Host. - О. Микели = Все р-ны(Европ.); Pa(HK); [Pl.]
314. *C. vaginata* Tausch. - О. влагалищная = [Ст: Ставрополь, Егорова, 1991]
(Голаркт.); Ab(HK); [R.]
315. ★ *C. panicea* L. - О. просяная = Ст[Ставрополь: Егорова, 1991](Палеаркт.); Аа(HK); [R.] <Rg>
316. *C. depressa* Link (*C. transsilvanica* Schur) - О. отжатая = Ст, ЛН (Субсредиз*); S, Pa(HK); [R.]
317. *C. caryophyllea* Latourr. - О. гвоздичная = Ст, П(Палеаркт.); Pa, ST(HK); [Pl.]
318. *C. diluta* Bieb. - О. светлая = Все р-ны(Турansk.); Ab(K); [Pl.]
319. *C. hallerana* Asso - О. Галлира = Ст(Средиземн.); Da(HK); [R.]
320. *C. humilis* Leyss. - О. низкая = Ст, СК, П(Евро-Сиб.); Pa(HK); [Sp.] <Pp>
321. *C. digitata* L. - О. пальчатая = Все р-ны[Егорова, 1991](Европ.); S(HK); [Pl.]

322. *C. alba* Scop. - О. белая = Кисл(Евро-Сиб.); Da(HK); [Sp.]
323. *C. pallescens* L. - О. бледноватая = Ст,ЛН,П(Голаркт.); Pa(HK); [Pl.]
324. *C. tomentosa* L. - О. шерстистая = Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa,ST(HK); [Pl.]
325. ★*C. ericetorum* Poll. - О. верещатниковая = Ст(Евро-Сиб.); Pa(HK); [Rs.]
 <Rg>
326. *C. schkuhrii* Willd. (*C. bordzilowskii* V.Krecz., *C. liparocarpos* Gaudin) - О. Шкура = Ст,СК,П,КН(Кавк.); ST(HK); [Sp.]
327. *C. supina* Willd.ex Wahlenb. - О. приземистая = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ, М,Ст(Евро-Сиб.); ST(HK); [Sp.]
328. *C. acuta* L. - О. острая = Ст,ЛН(Евро-Сиб.); Ab(K); [R.]
329. *C. paniculata* L. - О. метельчатая = П(Европ.); Ab(K); [R.]
330. *C. vulpina* L. - О. лисья = Ст,ЛН,П,КН(Евро-Сиб.); Ab(K); [Pl.]
331. *C. otrubae* Podp. - О. Отрубы = Все р-ны(Субсредиз*); Ab(K); [Pl.]
332. *C. divulsa* Stokes - О. прерванная = Все р-ны[Егорова, 1991(Голаркт.); S(HK); [Sp.]
333. *C. polyphylla* Kar.et Kir. - О. многолистная = Все р-ны[Егорова, 1991]
 (Палеаркт.); S(HK); [Sp.]
334. *C. muricata* L. - О. муриката = Прик[с. Спицевка: Егорова, 1991](Панбор.); S(HK); [R.]
335. *C. contigua* Hoppe - О. соседняя = Ст,ЛН,П(Палеаркт.); S,Pa(HK); [Sp.]
336. ★*C. disticha* Huds. - О. двурядная = Ст[Ставрополь: Егорова, 1991]
 (Палеаркт.); Aa(HK); [R.] <Rg>
337. *C. colchica* J.Gay - О. колхидская = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Db(HK); [Sp.]
338. *C. praecox* Schreb. - О. ранняя = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,П,КН(Палеаркт.); ST,Db(HK); [Pl.]
339. *C. divisa* Huds. - О. раздельная = МД,АИ,НК,М,КН(Палеаркт.); Dc(HK); [Sp.]
340. *C. stenophylla* Wahlenb. - О. узколистная = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК, П(Субтуран*); ST,SD(HK); [R.]
341. *C. physodes* Bieb. - О. вздутая = НК,КН[р.Кума: Егорова, 1991](Турansk.); Db(HK); [R.]
342. *C. remota* L. - О. раздвинутая = Ст[Ставрополь: Егорова, 1991],
 П(Палеаркт.); S,Aa(HK); [Sp.]

Сем. 29. ARACEAE Juss. - АРОИДНЫЕ

343. *Arum elongatum* Stev. - Аронник удлинённый = Ст,ЛН,П(Зап.др.средиз.); S(K); [Sp.] <Pm>
344. *A. orientale* Bieb. - А. восточный = Ст,ЛН,П,Кисл(Субкавк*); S(K); [Sp.]
 <Pm>

345. *A. albispatherum* Stev.ex Ledeb. - А. белокрылый = Ст,ЛН,П,Кисл (Субкавк*.); S(K); [Pl.]

Сем. 30. LEMNACEAE S.F.Gray - РЯСКОВЫЕ

346. *Lemna trisulca* L. - Ряска тройчатая = МД,НК,Ст,ЛН(Голаркт.); Ac(T); [R.]

347. *L. minor* L. - Р. маленькая = Все р-ны(Голаркт.); Ac(T); [Pl.] <Pm>

348. *L. turionifera* Landolt - Р. туриононосная = Ст[Ставрополь: Цвелёв, 1990] (Панбор.); Ac(T); [Rs.] <Rg>

349. *Telmatophace gibba*(L.)Schleid. (*L. gibba* L.) - Тельматофака горбатая = Ст,ЛН (Голаркт.); Ac(T); [R.] <Rg>

Сем. 31. COMMELINACEAE R.Br. - КОММЕЛИНОВЫЕ

350. *Commelina communis* L. - Коммелина синеглазка = Ст,ЛН,Кисл(Адвент. [Вост.Азия]); Ra,Rb(T); [R.]

Сем. 32. JUNCACEAE Juss. - СИТНИКОВЫЕ

351. *Luzula pilosa*(L.)Willd. - Ожика волосистая = Ст,П,Кисл(Панбор.); S(HK); [Pl.]

352. *L. multiflora*(Ehrh.)Lej. - О. многоцветковая = Ст,П,Кисл(Евро-Сиб.); Pa(HK); [Sp.]

353. *L. campestris*(L.)DC. (*L. subpilosa* Gilib.) - О. полевая = КЕ,Ст,ЛН,СК,П, Кисл(Европ.); S,Pa(HK); [Sp.]

354. *Juncus inflexus* L. - Ситник отклоняющийся = Все р-ны(Субкавк*.); Aa(HK); [Pl.]

355. *J. effusus* L. - С. расходящийся = Все р-ны(Европ.); Aa(HK); [Pl.]

356. *J. bufonius* L. - С. лягушечий = Все р-ны(Голаркт.); Aa(T); [Pl.]

357. *J. tenageia* Ehrh.ex L.fil. - С. мелководный = Кисл(Европ.); Aa,Ab(K); [R.]

358. *J. sphaerocarpus* Nees - С. шароплодный = Кисл(Евро-Сиб.); Aa(T); [R.]

359. *J. compressus* Jacq. - С. сплюснутый = Все р-ны(Евро-Сиб.); Aa(HK); [Pl.]

360. *J. gerardii* Loisel. - С. Жерара = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(HK); [Pl.]

361. *J. soranthus* Schrenk - С. кучкоцветный = МД,АИ,Прик,ТБ,НК(Субтуран*.); Aa,Dc(HK); [R.]

362. *J. atratus* Krock. - С. темноцветный = Ст(Палеаркт.); Aa(HK); [R.]

363. *J. articulatus* L. - С. членистый = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(HK); [Pl.]

Сем. 33. MELANTHIACEAE Batsch. (*LILIACEAE*) - МЕЛАНТИЕВЫЕ

364. *Verathrum lobelianum* Bernh. - Чемерица Лобеля = Кисл(Кавк); Pb(HK); [Pl.] <Pt;Pm>

Сем. 34. COLCHICACEAE DC. (*LILIACEAE*) - БЕЗВРЕМЕННИКОВЫЕ

365. ★ *Merendera trigyna*(Stev.ex Adams)Stapf - Мерендера трёхстолбиковая = М,ЛН, СК,П,Кисл(Ирано-Туран.); Pa,ST(K:ephd); [Sp.] <Po>
366. ★ *M. eichleri*(Regel)Boiss. - М. Эйхлера = Прик,ТБ,НК,М,КН(Эукавк.); Pa,ST (K:ephd); [R.] <Po>
367. ★★ *Colchicum laetum* Stev. - Безвременник яркий = Все р-ны, кроме Кисл (Предкавк.); Pa,ST(K:ephd); [Sp.] <Esub;Pmel;Po>
368. ★★ *C. umbrosum* Stev. - Б. теневой = Ст,ЛН,СК,П(Георгиевск)(Субкавк*.); S,Pa(K:ephd); [R.] <Pt;Pm;Po;Pmel>

Сем. 35. ASPHODELACEAE Juss. (*LILIACEAE*) - АСФОДЕЛОВЫЕ

369. ★ *Asphodeline lutea*(L.)Reichenb.- Асфоделина жёлтая = Кисл(Средиз.); Da(K); [Rs.] <Rx;Po>
370. ★★ *A. tenuior*(Bieb.)Ledeb. - А. тонкая = П,Кисл (Предкавк.); Pa,ST,Da(HK); [Rs.] l.c. Бештау <Esub>
371. ★★ *A. taurica*(Pall.ex Bieb.)Endl. - А. крымская = П,Кисл(Кр.-Новоросс.); Pa,ST(HK); [Sp.] <Rx>
372. ★★ *Eremurus spectabilis* Bieb. - Череш (Эремурус) представительный = Прик,ТБ,Ст,СК,П (Субкавк*.); ST(HK); [R.] l.c. pp. Кума и Сабля

Сем. 36. ANTHERICACEAE J.G.Agardh (*LILIACEAE*)- ВЕНЕЧНИКОВЫЕ

373. ★ *Anthericum ramosum* L. - Венечник ветвистый = П[Танфильев, Кононов, 1987],Кисл(Европ.); Pa,ST(K); <Po>

Сем. 37. LILIACEAE Juss. - ЛИЛЕЙНЫЕ

374. *Gagea minima*(L.)Ker-Gawl. - Гусиный лук малый = Прик,ТБ,Ст,СК,П (Европ.); S(K:ephd); [R.]
375. *G. lutea*(L.)Ker.-Gawl. - Г.л. жёлтый = КЕ,Ст,ЛН,СК,П(Панбор.); S(K:ephd); [Sp.] <Pm>
376. *G. helenae* Grossh. - Г.л. Елены = П,Кисл(Эукавк.); S(K:ephd); [R.]
377. *G. pusilla*(F.W.Schmidt)Schult.et Schult.fil. - Г.л. маленький = КЕ,МД,АИ, НК,Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,СК,П(Понт.-Южносиб.); ST(K:ephd); [Sp.]
378. *G. chanae* Grossh. - Г.л. Ханы = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,СК,П (Эукавк.); ST(K:ephd); [Sp.]
379. *G. germainae* Grossh. - Г.л. Жермены = П,Кисл(Эукавк.); ST(K:ephd); [R.]
380. *G. dubia* Terr. - Г.л. сомнительный = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст(Субпонт*.); ST(K:ephd); [R.]
381. *G. taurica* Stev. - Г.л. крымский = Ст,ЛН,СК,П(Предкавк.); ST(K:ephd); [R.]
382. ★ *G. alexeenkoana* Miscz. - Г.л. Алексеенко = П(Эукавк.); Pс(K:ephd); [R.]
383. *G. reticulata*(Pall.)Schult.et Schult.fil. - Г.л. сетчатый = Ст,СК,П(Туранск.); Da,Db(K:ephd); [R.]

384. *G. bulbifera*(Pall.)Salisb. - Г.л. луковичный = Все р-ны(Вост.др.средиз.); ST,Dd(K:ephd); [Sp.]
385. *G. villosa*(Bieb.)Duby (*G. arvensis* Dumort.) - Г.л. мохнатый = КЕ,Ст,СК,П
(Субпонт*.); ST(K:ephd); [R.]
386. ★*G. artemczukii* A.Krasnova - Г.л. Артемчука = МД[Данилевич, 1995]
(Понтич.); Dd(K:ephd); [R.] <Rx>
387. ★*G. fibrosa*(Desf.)Schult.et Schult.fil. (*G. commutata* C.Koch) - Г.л. фиброзный
= ТБ[Данилевич, 1996](Субкав*); ST(K:ephd); [R.]
388. ★*G. tenuifolia*(Boiss.)Fomin) – Г.л. тонколистный = КН [Данилевич, 2000]
(Субкав*); Da,Db,Dd(K:ephd); [Rs.]
389. ★★*Erythronium caucasicum* Woronow - Кандык кавказский = Ст(Ставрополь)
(Эвксин.); S(K:ephd); [Rs.] <Rg;Po>
390. ★★*Tulipa gesneriana* L. (*Tulipa schrenkii* Regel) - Тюльпан Геснера =
КЕ,МД,АИ, НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,П,КН(Субтуран*); ST(K:ephd); [Sp.] <Po>
391. ★*T. biebersteiniana* Schult.et Schult.fil. - Т. Биберштейна = Все р-ны(Субтуран*);
ST(K:ephd); [Sp.] l.c. м-ду Моздоком и Кизляром <Po>
392. ★*T. biflora* Pall. - Т. двуцветковый = МД(Туранск.); ST(K:ephd); [Rs.] <Po>
393. ★*T. quercetorum* Klok.et Zoz. - Т. дубравный = НК,ТБ,Ст,СК,П(Понтич.);
S(K:ephd); [Sp.] <Po>
394. ★*Fritillaria ophioglossifolia* Freyn et Sint. (*F. lutea* Bieb.) - Рябчик ужовнико-
листный = Кисл (Кавк.); Pb(K:ephd); [Sp.] <Po>
395. ★★*F. caucasica* Adams - Р. кавказский = П,Кисл(Эукав.); Da(K:ephd); [Rs.]
l.c. Пятигорск <Po>
396. ★*F. meleagriodes* Partin ex Schult.et Schult.fil. - Р. шахматовидный =
Ст(х.Калюжный) (Субтуран*); ST,Aa(K:ephd); [R.]<Rg>
397. ★*Lilium monadelphum* Bieb. - Лилия однобратвенная = Ст(?),П,Кисл
(Эукав.); Pb(K); [Sp.]

Сем. 38. HYACINTHACEAE Batsch (*LILIACEAE*)- ГИАЦИНТОВЫЕ

398. *Scilla sibirica* Haw. - Пролеска сибирская = Все лесные р-ны(Евро-Кавк.);
S(K:ephd); [Pl.] <Po>
399. *Ornithogalum ponticum* Zahar. (*O. pyrenaicum* auct.) - Птицемлечник понтийский
= КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,П(Эукав.); Pa(K:ephd); [Pl.]
400. *O. fischerianum* Krasch. - П. Фишера = МД(Субтуран*); ST,Dd(K:ephd); [R.]
401. ★*O. magnum* Krasch.et Schischk. - П. большой = П(Бештау)(Кавк.); S(K:ephd);
[R.] <Rg>
402. ★★*O. arcuatum* Stev. - П. дугообразный = Ст,ЛН,СК,П(Предкав.);
S(K:ephd); [Sp.] l.c. Бештау <Esub>
403. *O. woronowii* Krasch. - П. Воронова = Ст,ЛН,П,Кисл(Эвксин.); Pa(K:ephd); [R.]

404. *O. schmalhausenii* Albov - П. Шмальгаузена = Кисл(Арmeno-Иран.);
Pb(K:ephd); [R.]
405. *O. kochii* Parl. (*O. gussonii* Ten; *O. tenuifolium* auct.) - П. Коха = КЕ,МД,
АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субпонт*.); ST(K:ephd); [Pl.]
406. ★ *Pusckinia scilloides* Adams - Пушкиния пролесковая = П,Кисл(Субкавк*.);
Pb(K:ephd); [Sp.] <Po>
407. ★★ *Bellevalia sarmatica*(Georgi)Woronow - Беллевалия сарматская = Прик,ТБ,
НК,М,Ст,ЛН,СК,П(Понтич.); ST(K:ephd); [R.]
408. ★ *Leopoldia tenuiflora*(Tausch)Heldr. - Леопольдия тонкоцветная = П
(Субпонт*.); ST(K:ephd); [Rs.] <Rx> <Po>
409. *Pseudomuscari pallens*(Bieb.)Garbari (*Muscari pallens*(Bieb.)Fisch.) -
Псевдомускари бледный = П,Кисл(Кавк.); ST(K:ephd); [Sp.] <Po>
410. *Muscaria muscarimi* Medik. (*M. racemosum*(L.)Mill.) - Мышиный гиацинт
кистевидный = Все р-ны(Субсредиз*.); Pa,ST(K:ephd); [Pl.] <Po>
411. ★ *M. szovitsianum* Baker - М.г. Шовица = П(Бештау)[Танфильев, Коннов,
1987](Кавк.); Dd(K:ephd); [Rs.] <Rx>

Сем. 39. ALLIACEAE J.Agardh (*LILIACEAE*) - ЛУКОВЫЕ

412. ★ *Allium scorodoprasum* L. var. *brachyspathum* Nemirova et Trotzkaja – Лук
причесочный форма короткочехольная = Ст(Стрижамент, Ставропольское
плато) [Немирова, Троцкая, 2004] (Предкавк.); Pa(K:ephd); [Rs.]
413. *A. rotundum* L. – Л. круглый = Все р-ны(Субпонт*.); Pa(K); [Sp.]
414. *A. waldsteinii* G.Don fil. - Л. Вальдштейна = Все р-ны(Понтич.); Pa(K); [Sp.]
415. *A. jajlae* Vved. - Л. яйлинский = СК,П,Кисл(Субкавк*.); Pb(K); [Sp.]
416. *A. erubescens* C.Koch - Л. краснеющий = СК,П,Кисл(Субкавк*.); Pa(K); [Sp.]
417. *A. atroviolaceum* Boiss. - Л. тёмнофиолетовый = Все р-ны(Туранск.); Dd(K);
[Sp.]
418. *A. leucanthum* C.Koch - Л. бледноцветный = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,КН
(Эукавк.); ST,Db(K); [Sp.]
419. *A. fuscoviolaceum* Fomin - Л. тёмнофиолетовый = СК,П(Ирано-Туран.);
ST(K); [Sp.]
420. *A. sphaerocephalon* L. - Л. шароголовый = Ст,СК,П,Кисл(Европ.); ST(K); [Sp.]
421. *A. rubellum* Bieb. - Л. красивейший = П(Субкавк*.); ST(K); [R.]
422. ★ *A. inaequale* Janka - Л. неравный = Ст,СК,П(Субтуран*.); ST,Da(K); [Sp.]
423. *A. moschatum* L. - Л. мохнатый = Кисл(Общедр.средиз.); Pb(K); [Sp.]
424. *A. saxatile* Bieb. - Л. каменный = П,Кисл(Субтуран*.); Da(K); [Sp.]
425. *A. globosum* Bieb.ex Redoute - Л. шаровидный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Понт.-
Южносиб.); Da(K); [Sp.]
426. *A. albidum* Fisch.ex Bieb. - Л. беловатый = Все р-ны(Ирано-Туран.); ST(K); [Pl.]
427. *A. victorialis* L. - Л. победный = Кисл(Голаркт.); Pb(K); [Sp.] <Pa;Pm>

428. *A. pseudoflavum* Vved. - Л. ложножёлтый = П(Ирано-Туран.); ST(K); [R.]
429. *A. paczoskianum* Tuzs. (*A. pulchellum* G.Don fil.) - Л. Пачоского = Все р-ны (Понтич.); ST(K); [Sp.]
430. *A. paniculatum* L. - Л. метельчатый = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(K); [Pl.]
431. ★*A. lenkoranicum* Miscz.ex Grossh. – Л. ленкоранский = П(Бештау) [Немирова, Троцкая, 2003] (Субкавк*); S(K:ephd); [Rs.]
432. *A. rupestre* Stev. - Л. скальный = П,Кисл(Субкавк*); Pa(HK); [Sp.]
433. *A. kunthianum* Vved. - Л. Кунта = П,Кисл(Кавк.); ST,Da(K); [Pl.]
434. ★*A. ursinum* L. - Л. медвежий (Черемша) = Ст,П,Кисл(Европ.); S(K); [Pl.]
<Pa;Pm>
435. *A. decipiens* Fisch.et Schult.et Schult.fil. - Л. обманывающийся = Ст,ЛН,СК, П,Кисл(Субтуран*); ST(K); [Sp.]
436. *A. oleraceum* L. - Л. огородный = Ст(Европ.); Pa,ST(K); [Sp.]

Сем. 40. ASPARAGACEAE Juss. (*LILIACEAE*) - СПАРЖЕВЫЕ

437. *Asparagus verticillatus* L. - Спаржа мутовчатая = НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Ирано-Туран.); S,Pa(HK); [Sp.]
438. *A. officinalis* L. - С. лекарственная = Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa(HK); [Pl.]
<Pm;Po>
439. *A. caspius* Schult.et Schult.fil. - С. каспийская = МД,АИ,Прик,ТБ,НК,М (Туранск.); ST(K); [R.]
440. *A. polyphyllus* Stev. - С. многолистная = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST(K); [Pl.]
441. *A. persicus* Baker - С. персидская = КН(Туранск.); Pa(HK); [R.]

Сем. 41. CONVALLARIACEAE Horan. (*LILIACEAE*) - ЛАНДЫШЕВЫЕ

442. ★*Convallaria transcaucasica* Utkin ex Grossh. - Ландыш закавказский = М(Тerek), Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кавк.); S(HK); [Pl.] <Pm;Po>
443. ★*Majanthemum bifolium*(L.)F.W.Schmidt - Майник двулистный = П (окр.Железноводска)[Галушко, 1979](Панбор.); S(K); [Rs.] <Rg;Pm>
444. *Polygonatum verticillatum*(L.)All. - Купена мутовчатая = Кисл(Голаркт.); S(K); [Sp.]
445. *P. orientale* Desf. (*P. polyanthemum*(Bieb.)A.Dietr.) - К. восточная = Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Субкавк*); S(K); [Sp.]
446. *P. multiflorum*(L.)All. - К. многоцветковая = П,Кисл(Голаркт.); S(K); [Sp.]
447. *P. glaberrimum* C.Koch - К. гладкая = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Кавк.); S(K); [Pl.]
448. *P. ovatum* Miscz.ex Knorr. - К. яйцевидная = Ст,П(Эукавк.); S(K); [Sp.] 1.c.
Минеральные Воды

Сем. 42. TRILLIACEAE Lindl. (*LILIACEAE*) - ТРИЛЛИЕВЫЕ

449. *Paris quadrifolia* L. - Вороний глаз четырёхлистный = Кисл(Дарвинские высоты)(Евро-Сиб.); S(K); [R.]
450. ★ *P. incompleta* Bieb. - В.г. неполный = Кисл(Дарвинские высоты)(Кавк.); S(K); [Sp.]

Сем. 43 AMARYLLIDACEAE J.St.-Hil. - АМАРИЛЛИСОВЫЕ

451. ★★ *Galanthus caucasicus*(Baker)Grossh. - Подснежник кавказский = Ст,ЛН,СК, П,Кисл(Кавк.); S(K:ephd); [Sp.] <Pm;Po>
452. ★★ *G.woronowii* Losinsk. - П. Воронова = Кисл[Кравцун, 1989](Эвксин.); S(K:ephd); <Rg;Po>
453. ★★ *G. angustifolius* G.Koss. - П. узколистный = П(Предкавк.); S(K:ephd); [Rs.] <Esub> <Pm>
454. ★★ *Sternbergia colchiciflora* Waldst.et Kit. - Штернбергия безвременниковая = Ст,П(Средиземн.); ST(K:ephd); [Rs.] <Rx>

Сем. 44. DIOSCOREACEAE R.Br. - ДИОСКОРЕЙНЫЕ

455. *Tamus communis* L. - Тамус обыкновенный (Адамов корень) = Ст,ЛН,СК,П, Кисл(Средиземн.); S(K:lh); [Pl.] <Pm>

Сем. 45. IRIDACEAE Juss. - ИРИСОВЫЕ(КАСАТИКОВЫЕ)

456. ★ *Crocus reticulatus* Stev.ex Adams - Шафран сетчатый = КЕ,МД,АИ,НК, Прик,ТБ,М,Ст,СК,П,Кисл(Понт.-Южносиб.); Pa,ST,S(K:ephd); [Pl.] <Po>
457. ★★ *C. speciosus* Bieb. - Ш. видный = Ст(Арmeno-Иран.); ST(K:ephd); [Rs.] <Rx;Po>
458. ★ *Iris marschalliana* Bobr. (*I. pontica* Zapal ; *I. humilis* Bieb.) - Ирис Маршалла = СК,П,Кисл(Понтич.); Pa(K:ephd); [R.] <Po>
459. ★ *I. pseudacorus* L. - И. жёлтый = МД,НК,М(Палеаркт.); Ab(K); [R.] <Po;Pm>
460. ★ *I. sibirica* L. - И. сибирский = П,Кисл(Евро-Сиб.); Pa,Aa(HK); [Sp.] <Po>
461. ★ *I. colchica* Kem.-Nath. - И. колхидский = П,Кисл(Эвксин.); Pa(K); [Sp.] <Po>
462. ★★ *I. notha* Bieb. - И. ненастоящий = КЕ(Егорлык),Ст,СК,П(Предкавк.); Pa(K); [R.] <Esub> 1.с. г. Бештау
463. ★ *I. pseudonotha* Galushko - И. ложнонастоящий = НК,М,КН(Кура) (Субтуран*.); ST,Aa(K); [Sp.] 1.с. Величаевское
464. ★ *I. halophila* Pall. - И. солелюбивый = КЕ,Ст,ЛН,СК,П(Понт.-Южносиб.); ST,Dc(K); [Sp.] <Po>
465. ★ *I. furcata* Bieb. (*I. aphylla* L.) - И. вильчатый = Ст,П,Кисл(Евро-Кавк.); Pa(K:ephd); [Sp.] <Po>
466. ★★ *I. taurica* Lodd. (*I. pumila* L.) - И. крымский = Все р-ны(Субсредиз*.); Pa,ST(K:ephd); [Sp.] <Po>

467. ★★ *I. scariosa* Willd.ex Link (*I. astrachanica* Rodionenko) - И. кожистый = МД, АИ, НК, М(Турansk.); ST, Db, Dd(K:ephd); [Sp.] <Po>
468. ★ *Gladiolus communis* Bieb. - Шпажник обыкновенный = Ст, П, Кисл (Субкавк*); Pa(K); [Sp.] <Po; Pm>
469. ★ *G. tenuis* Bieb. - Ш. тонкий = КЕ, ЛН, Прик, ТБ, Ст, СК, П, Кисл(Евро-Кавк.); Pa(K); [Sp.] <Po>
470. ★ *G. apterus* Kick. - Ш. бескрылый = Ст(Субпонт.*); Pa(K); [R.] <Rg; Po>

Сем. 46. ORCHIDACEAE Juss. - ОРХИДНЫЕ

471. ★ *Listera ovata*(L.)R.Br. - Тайник овальный = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Евро-Сиб.); S(HK); [Sp.]
472. ★ *Neottia nidus-avis*(L.)Rich. - Гнездовка обыкновенная = Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Панбор.); S(K:sap); [Sp.] <Pm>
473. ★★ *Cephalanthera rubra*(L.)Rich. - Пыльцеголовник красный = Ст, ЛН, П, Кисл (Панбор.); S(HK); [R.]
474. ★★ *C. longifolia*(L.)Fritsch - П. длиннолистный = Кисл(Панбор.); S(HK); [R.]
475. ★★ *C. damasonium*(Mill.)Druce - П. дамасонский(крупноцветковый) = КЕ, Прик, ТБ, Ст, СК, П, Кисл(Евро-Кавк.); S(HK); [Sp.]
476. ★ *Eripactis atrorubens*(Hoffm.ex Bernh.)Bess. - Дремлик ржавый = ЛН, П, Кисл (Субсредиз*); S(K); [R.]
477. ★ *E. palustris*(L.)Crantz - Д. болотный = Ст, ЛН, П, Кисл(Палеаркт.); S(K); [R.]
478. ★ *E. helleborinae*(L.)Crantz - Д. морозниковый = МД, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Плеаркт.); S(K); [R.]
479. ★★ *Limodorum abortivum*(L.)Sw. - Лимодорум недоразвитый = П(Евро-Кавк.); S(K:sap); [Rs.] <Rg>
480. ★ *Herminium monorchis*(L.)R.Br. - Бровник одноклубневой = П, Кисл (Палеаркт.); Pb(K); [R.]
481. ★ *Coeloglossum viride*(L.)C.Hartm. - Пололепестник зелёный = Ст, ЛН, П, Кисл (Панбор.); Pa, Pb(K); [Sp.] <Pm>
482. ★ *Gymnadenia conopsea*(L.)R.Br. - Кокушник комарниковый = Ст, ЛН, П, Кисл (Палеаркт.); Pb(K); [Sp.] <Pm>
483. ★ *Platanthera bifolia*(L.)Rich. - Любка двулистная = ЛН, П(Палеаркт.); S(K); [R.] <Pm>
484. ★ *P. chlorantha*(Cust.)Reichenb. - Л. зеленоцветная = Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Евро-Кавк.); S(K); [Pl.] <Pm>
485. ★★ *Traunsteinera globosa*(L.)Reichenb. - Траунштейнера шаровидная = П, Кисл (Субкавк*); Pb(K); [Rs.] <Pm>
486. ★ *Traunsteinera sphaerica*(Bieb.)Schlechter - Т. сферическая = П, Кисл(Кавк.); Pb(K); [R.] <Pm>

487. ★★ *Orchis ustulata* L. - Ятрышник обожжённый = П,Кисл(Европ.); Pb(K); [R.] <Pm>
488. ★★ *O. purpurea* Huds. - Я. пурпурный = Ст,П,Кисл(Европ.); S,Pa(K); [Rs.] <Pm>
489. ★★ *O. simia* Lam. - Я. обезьяний = П(Субсредиз*); Pb(K); [Rs.] <Pm>
490. ★★ *O. militaris* L. - Я. вооружённый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S,Pa(K); [R.] <Pm>
491. ★★ *O. tridentata* Scop. - Я. трёхзубчатый = КЕ,Прик,ТБ,ЛН,Ст,СК,П,Кисл (Субсредиз*); Pa(K); [Pl.] <Pm>
492. ★★ *O. mascula*(L.)L. - Я. мужской = Ст,ЛН,П,Кисл(Палеаркт.); Pa,Pb(K); [R.] <Pm>
493. ★★ *O. coriophora* L. - Я. клопоносный = П,Кисл(Общедр.средиз.); Pb(K); [R.] <Pm>
494. ★★ *O. picta* Loisel. - Я. разукрашенный = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П (Субсредиз*); Pa(K); [Sp.] <Pm>
495. ★ *Dactylorhiza incarnata*(L.)Soo - Пальчатокоренник мясокрасный = Ст,ЛН, П,Кисл(Палеаркт.); Aa(K); [R.] <Pm>
496. ★ *D. salina*(Turcz.ex Lindl.)Soo (*D. sanasunitensis*(Fleischm.)Soo) - П. салина = П,Кисл(Субкавк*); Pb(K); [Sp.] <Pm>
497. ★ *D. flavesrens* C.Koch - П. желтоватый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субкавк*); Pb(K); [R.] <Pm>
498. ★ *D. iberica*(Bieb.ex Willd.)Soo - П. грузинский = Ст[Колмаков, 1928] (Субкавк*); Aa(K); [Rs.]
499. ★★ *D. urvilleana*(Steudel)Baumann et Kuenkele (*D. amblyoloba*(Nevski) Aver.; *D. triphylla*(C.Koch)Czer.) - П. Урвиля = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субкавк*); Pb(K); [Sp.] <Pm>
500. ★★ *Anacamptis pyramidalis*(L.)Rich. - Анакамптис пирамидальный = П,Кисл (Субсредиз*); Pb(K); [R.] <Pm>
501. ★★ *Ophrys oestifera* Bieb. - Офрис оводоносный = Кисл [Иванов, 1993] (Эвксин.); Pa(HK); [Rs.] <Pm>

Класс MAGNOLIOPSIDA - МАГНОЛИЕВИДНЫЕ (ДВУДОЛЬНЫЕ)

Сем. 47. SALICACEAE Mirb. - ИВОВЫЕ

502. *Salix caprea* L. - Ива козья = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S(Phm); [Pl.] <Pm; Pmel>
503. *S. aegyptiaca* L. (*S. phlomoides* Bieb.) - И. египетская = ЛН,П(Субпонт*); S(Phn); [R.] <Pmel>
504. *S. cinerea* L. - И. серая = Все р-ны(Палеаркт.); Aa,S(Phm); [Sp.] <Pmel>
505. *S. viminalis* L. - И. корзиночная = Ст,П(Палеаркт.); Aa(Phn); [R.] <Pm; Pmel>

506. *S. purpurea* L. - И. пурпурная = Ст,ЛН,П,Кисл(Палеаркт.); Aa(Phm); [Pl.] <Pmel>
507. *S. caspica* Pall. - И. каспийская = М,П(Субтуран*); Aa(Phn); [Sp.] <Pmel>
508. *S. triandra* L. - И. трёхтычинковая = МД,НК,М,Ст,СК,П,Кисл (Палеаркт.);Aa(Phn);[Sp.] Pmel
509. *S. alba* L. - И. белая = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(Phn); [Pl.] <Pm;Pmel>
510. *S. excelsa* S.G.Gmel. (*S. australoir* Anderss.) - И. возвышенная = Все р-ны (Туранск.); Aa(Phms); [Sp.] <Pmel>
511. *S. fragilis* L. - И. ломкая = Ст,ЛН,П,Кисл(Палеаркт.); Aa(Phns); [Sp.] <Pmel>
512. *Populus alba* L. - Тополь белый(Белолистка) = М,Ст,ЛН,П(Палеаркт.); Aa(Phms); [Pl.]
513. *P. canescens*(Ait.)Smith - Т. сереющий = НК[Проханов, 1950](Субкавк*); Aa(Phms); [Sp.]
514. *P. tremula* L. - Т. дрожащий (Осина) = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S(Phms); [Pl.] <Pm>
515. *P. nigra* L.- Т. чёрный (Осокорь) = НК,М(Терек),ЛН,П (Палеаркт.); Aa(Phms); [Sp.] <Pm>
516. *P. sosnovskyi* Grossh. - Т. Сосновского = П,КН(Евро-Сиб.); S(Phms); [R.]

Сем. 48. JUGLANDACEAE A.Rich.ex Kunth - ОРЕХОВЫЕ

517. *Juglans regia* L. - Орех грецкий = Все р-ны(Адвент.[Балканы, Малая, Центральная и Восточная Азия]; S(Phms); <Pa>

Сем. 49. CORYLACEAE Mirb.(BETULACEAE) - ЛЕЩИНОВЫЕ

518. ★★ *Ostrya carpinifolia* Scop - Хмелеграб обыкновенный = Кисл(Эвксин.); S(Phms); [R.] <Rt>
519. *Carpinus caucasica* Grossh. (*Carpinus betulus* L.) - Граб кавказский = КЕ,Прик, ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кавк.); S(Phms); [Soc.]
520. *Corylus avellana* L. - Лещина обыкновенная = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН, П,Кисл(Палеаркт.); S(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>

Сем. 50. BETULACEAE S.F.Gray - БЕРЁЗОВЫЕ

521. *Betula pendula* Roth - Берёза плакучая = Ст,П,Кисл(Палеаркт.); S(Phms); [Sp.] <Pm>
522. *B. pubescens* Ehrh. - Б. пушистая = Ст,П,Кисл[Танфильев, Кононов, 1987] (Евро-Сиб.); S(Phms); [Sp.] <Pm>
523. *B. litwinowii* Doluch. - Б. Литвинова = П,Кисл(Кавк.); S(Phms); [Pl.] <Pm>
524. *Alnus glutinosa*(L.)Moench - Ольха клейкая = Кисл(Евро-Сиб.); S(Phms); [Pl.] <Pm>

525. *A. incana*(L.)Moench - О. серая = ЛН,П,Кисл(Панбор.); S(Phms); [Pl.]
<Pm;Pmel>

Сем. 51. FAGACEAE Dumort. - БУКОВЫЕ

526. *Quercus robur* L. - Дуб черешчатый(сильный) = КЕ,НК,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,
П,Кисл(Европ.); S(Phms); [Pl.] <Pm>
527. *Q. petraea* L.ex Liebl. - Д. скальный = Ст,ЛН,П,Кисл(Евро-Кавк.); S(Phms);
[Pl.] <Pm>
528. *Q. dalechampii* Ten. (*Q. calcarea* Troitz.) - Д. меловой = П,Кисл(Субкавк*.);
S(Phms); [Sp.]
529. *Fagus orientalis* Lipsky - Бук восточный = Ст,ЛН,П,Кисл(Субкавк*.);
S(Phmg); [Sp.]

Сем. 52. ULMACEAE Mirb. - ИЛЬМОВЫЕ

530. *Ulmus laevis* Pall. - Ильм гладкий = Ст,П(Европ.); S(Phms); [R.]
531. *U. minor* Mill. (*U. suberosa* Moench;) - И. пробковый = Все р-ны(Палеаркт.);
S,Aa(Phm); [Sp.] <Pm>
532. *U. glabra* Huds. (*U. elliptica* C.Koch) - И. шершавый = Ст,ЛН,П,Кисл
(Субкавк*.); S(Phms); [R.]
533. *U. sukaczovii* Andron. - И. Сукачева = Ст,П,Кисл(Эвксин.); S(Phms); [Pl.]
534. *U. carpinifolia* Rupr.ex Suckow - И. граболистный = Все р-ны(Евро-Сиб.);
S(Phms); [Pl.]

Сем. 53. CELTIDACEAE Link.(ULMACEAE) - КАРКАСОВЫЕ

535. ★*Celtis glabrata* Stev.ex Planch. - Каркас оголённый = Ст,П,Кисл (Субкавк*.);
Da(Phn); [R.]

Сем. 54. MORACEAE Link - ТУТОВЫЕ

536. *Morus alba* L. - Шелковица белая = Все р-ны(Адвент.[Япония, Китай]);
S,Pa(Phms); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>
537. *M. nigra* L. - Ш. чёрная = Все р-ны(Адвент.[Передняя Азия, Афганистан]);
S,Pa(Phms); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>
538. *Maclura pomifera*(Rafin.)Schneid. (*M. aurantiaca* Nutt.) - Маклюра яблочная =
КЕ,АИ,Прик,ТБ,НК,М,Ст,СК,ЛН,П(Адвент.[Сев.Америка]); S,Pa(Phms); [Sp.]
<Pm>

Сем. 55. CANNABACEAE Endl. - КОНОПЛЁВЫЕ

539. *Humulus lupulus* L. - Хмель обыкновенный = Все р-ны(Голаркт.);
S,Aa(HK:lh); [Pl.] <Pa;Pm>

540. *Cannabis ruderalis* Janisch. - Конопля сорная = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Rb(HK); [Sp.]

Сем. 56. URTICACEAE Juss. - КРАПИВНЫЕ

541. *Urtica urens* L. - Крапива жгучая = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); Rb(HK); [Sp.] <Pm>

542. *U. dioica* L. - К. двудомная = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(HK); [Pl.] <Pm;Pa>

543. *Parietaria judaica* L. - Постенница иудейская = П, Кисл(Общедр.средиз.); Da(HK); [Pl.]

Сем. 57. VISCAEAE Batsch(*LORANTHACEAE*) - ОМЁЛОВЫЕ

544. *Viscum album* L. - Омёла белая = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); S(Phn:hpar:ep); [Sp.] <Pm>

Сем. 58. SANTALACEAE R.Br. - САНТАЛОВЫЕ

545. *Thesium procumbens* C.A.Mey. - Ленец простёртый = КЕ(ст.Рождественская) (Евро-Кавк.); Pa(HK:hpar); [Sp.]

546. *Th. arvense* Horvato vszky (*Th. ramosum Hayne*) - Л. полевой = Все р-ны (Субтуран*); Pa(HK:hpar); [Pl.]

Сем. 59. ARISTOLOCHIACEAE Juss. - КИРКАЗОНОВЫЕ

547. ★*Asarum intermedium*(C.A.Mey.)Grossh. (*Asarum ibericum* Stev.ex Ledeb.) - Копытень промежуточный = П, Кисл(Эвксин.); S(HK); [R.] <Pt;Pm>

548. *Aristolochia clematitis* L. - Кирказон ломоносовидный = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Евро-Кавк.); S(HK); [Pl.] <Pt;Pm>

Сем. 60. POLYGONACEAE Juss. - ГРЕЧИШНЫЕ

549. *Rumex acetosella* L. - Щавель малый = Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa,Rb(HK); [Pl.]

550. *R. acetoselloides* Bal. - Щ. кисловатый = П, Кисл(Эвксин.); Pb(HK); [Pl.] <Pm>

551. *R. acetosa* L. - Щ. кислый = Все р-ны(Голаркт.); Pa(HK); [Pl.] <Pa;Pm>

552. *R. thyrsiflorus* Fingerh. - Щ. пирамidalный = Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); Pa(HK); [Sp.]

553. *R. euxinus* Klok. (*R. tuberosus* L.) - Щ. клубневой = Ст, СК, П (Общедр.средиз.); Pa(HK); [Pl.]

554. *R. hastifolius* Bieb. (*R. scutatus* L.) - Щ. копьелистный = П, Кисл (Общедр.средиз.); Da(HK); [Sp.]

555. *R. crispus* L. - Щ. курчавый = Все р-ны(Голаркт.); Rb(HK); [Pl.] <Pm>

556. *R. hydrolapathum* Huds. - Щ. водощавлевый = НК(Европ.); Aa(HK); [R.]

557. *R. confertus* Willd. - Щ. конский = П, Кисл(Палеаркт.); Pa,Pb(HK); [R.] <Pm>

558. *R. patientia* L. - Щ. шпинатный = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Палеаркт.); Aa(HK); [Sp.]

559. *R. aquaticus* L. - Щ. водяной = НК, КН(Палеаркт.); Аа(НК); [R.] <Pm>
560. *R. sanguineus* L. - Щ. кровяной = Ст, П(Палеаркт.); S, Аа(НК); [Sp.]
561. *R. stenophyllus* Ledeb. - Щ. узколистный = КЕ, МД, НК, Ст, КН(Субтуран*.*); Аа(НК); [R.]
562. *R. reticulatus* Bess. - Щ. сетчатый = МД, НК, М, СК, КН(Арmeno-Иран.); Аа(Т); [R.]
563. *R. halaczii* Rech. - Щ. Галачи = МД, НК, КН(Ирано-Туран.); Аа(Т); [R.]
564. *R. pulcher* L. - Щ. красивый = МД, НК, КН(Субсредиз*.*); Аа(НК); [R.]
565. *R. obtusifolius* L. - Щ. туполистный = Все р-ны(Палеаркт.); S, Pa(НК); [Sp.] <Pm>
566. *R. marschallianus* Reichenb. - Щ. Маршалла = КН(Камыш-Бурун) (Субтуран*.*); Dc(НК); [R.]
567. *R. maritimus* L. - Щ. морской = МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М, СК, КН(Палеаркт.); Аа(НК); [R.]
568. *R. longifolius* DC. (*R. domesticus* C.Hartm.) - Щ. длиннолистный = ЛН (Голаркт.); Db(НК); [R.]
569. *R. conglomeratus* Murr. - Щ. клубковатый = ЛН(Палеаркт.); Pa, Аа(НК); [R.]
570. *Calligonum aphyllum*(Pall.)Guerke - Джузгун безлистный = КН(Туранск.); Db(Ch); [R.]
571. *Fallopia convolvulus*(L.)A.Love (*Polygonum convolvulus* L.; *Bilderdikia convolvulus*(L.)Dumort.) - Фаллопия выюновая = Все р-ны(Палеаркт.); Ra, Rb(T); [Sp.] <Pm>
572. *F. dumetorum*(L.)Holub (*Polygonum dumetorum* L.; *B. dumetorum*(L.) Dumort.) - Ф. кустарниковая = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Палеаркт.); Ra, Rb(T); [Sp.]
573. *Polygonum ammanoides* Jaub. et Spach - Гречишко амманиевидная = Кисл(Кавк.); Da, Rb(НК); [Rs.]
574. *P. alpestre* C.A.Mey. - Г. предальпийская = Кисл(Ирано-Туран.); Da, Rb(T); [Sp.]
575. *P. aviculare* L. - Г. птичья = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pm>
576. *P. arenastrum* Boreau - Г. песчаная = Все р-ны(Голаркт.); Rb(T); [Pl.]
577. *P. argyrocoleon* Steud.ex G.Kunze - Г. серебристая = М, КН(Туранск.); Rb(T); [R.]
578. *P. salsugineum* Bieb. - Г. солонцеватая = СК, П(Туранск.); Dc(T); [Sp.]
579. *P. patulum* Bieb. - Г. раскидистая = МД, АИ, НК, Ст, ЛН, П, Кисл(Палеаркт.); Аа, Rb(T); [Sp.]
580. *P. novoascanicum* Klok. - Г. новоасканийская = НК, М(Терек), КН(Понтич.); Аа, Dc(T); [Sp.]
581. *P. pseudoarenarium* Klok. - Г. ложнопесчаная = МД, НК, КН(Туранск.); Db(T); [Pl.]
582. *Persicaria amphibia*(L.)S.F.Gray (*Polygonum amphibium* L.) - Персикия (Гречишко) земноводная = КЕ, МД, АИ, НК, Ст, СК, П(Голаркт.); Аа, Ab(K); [R.]

583. *P. maculata*(Rafin.)A.et D.Love (*Polygonum maculatum* Rafin.; *P. persicaria* L.) - П.(Г.) почечуйная = Все р-ны(Палеаркт.); Aa,Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>
584. *P. hydropiper*(L.)Spach (*Polygonum hydropiper* L.) - П.(Г.) водяной перец = КЕ,Прик, ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Голаркт.); Aa(T); [Sp.]
585. *P. lapathifolia*(L.)S.F.Gray (*Polygonum lapatifolium* L.) - П.(Г.) щавелелистная = Все р-ны (Палеаркт.); Aa(T); [Sp.]
586. *P. minor*(Huds.)Opiz (*Polygonum minus* Huds.) - П.(Г.) малая = Ст,П(Палеаркт.); Aa,Dc(T); [R.]
587. *Bistorta carnea*(C.Koch)Kom. (*Polygonum carneum* C.Koch) - Бисторта (Гречишка) мясокрасная = Кисл(Субкавк*); Pb(НК); [Pl.] <Pm>
588. *Fagopyrum tataricum*(L.)Gaertn. - Гречиха татарская = П,Кисл(Палеаркт.); Ra(T); [Sp.]

Сем. 61. CHENOPODIACEAE Vent. - МАРЕВЫЕ

589. *Polycnemum arvense* L. - Хруплявник полевой = Все р-ны(Палеаркт.); Db,Rb(T); [R.]
590. *P. majus* A.Br. - Х. большой = Ст,СК,П(Субсредиз*); ST,Rb(T); [R.]
591. ★ *Hablitzia tamnoides* Bieb. - Габлиция тамусовидная = Ст,П,Кисл (Субкавк*); Da(HK); [Sp.] l.c. окр. Пятигорска
592. *Blitum virgatum* L. (*Chenopodium foliosum* Aschers.) - Блитум прутьевидный = П,Кисл(Палеаркт.); Da,Rb(T); [Pl.] <Pa>
593. *Chenopodium chenopodioides*(L.)Aell. - Марь толстолистная = МД,АИ,НК, Прик,ТБ,КН(Голаркт.); Aa,Dc(T); [R.]
594. *Ch. glaucum* L. - М. сизая = Все р-ны(Плюрирег.); ST,Rb(T); [Sp.]
595. *Ch. rubrum* L. - М. красная = МД,АИ,НК,Ст,СК(Голаркт.); Rb(T); [Sp.]
596. *Ch. polyspermum* L. - М. многосеменная = КЕ,М,Ст,ЛН,СК(Евро-Сиб.); Dc(T); [R.]
597. *Ch. hybridum* L. - М. гибридная = Все р-ны(Голаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]
598. *Ch. urbicum* L. - М. городская = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
599. *Ch. album* L. - М. белая = Все р-ны(Плюрирег.); Rb(T); [Pl.] <Pm>
600. *Ch. opulifolium* Schrad. - М. калинолистная = МД,АИ,НК,Ст,П (Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]
601. *Ch. vulvaria* L. - М. вонючая = Ст,СК,П,КН(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.] <Pm>
602. *Atriplex sagittata* Borkh. (*A. nitens* Schkuhr) - Лебеда стреловидная = МД,АИ, НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,П(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
603. *A. aucheri* Moq. (*A. amblyostegia* Turcz.) - Л. Оше = МД,НК,М,КН(Ирано-Туран.); Dc(T); [R.]
604. *A. littoralis* L. - Л. прибрежная = КЕ,М,Ст,СК,П(Палеаркт.); Dc(T); [R.]
605. *A. patula* L. - Л. раскидистая = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Da(T); [Pl.]

606. *A. oblongifolia* Waldst. et Kit. - Л. удлинённолистная = МД, АИ, НК, М, Ст, СК, П(Палеаркт.); Rb(T); [R.]
607. *A. calotheca*(Rafin)Fries (*A. hastata* L.) - Л. калотека = Все р-ны (Палеаркт.); ST, Dc(T); [Pl.]
608. *A. patens* (Litv.) Iljin - Л. поникшая = МД, АИ, НК, Прик, ТБ, Ст, П (Субтуран*.); Dc(T); [Sp.]
609. *A. micrantha* C.A.Mey. (*A. heterosperma* Bunge) - Л. мелкоцветная = МД, АИ, НК, Ст(Туранск.); Rb(T); [R.]
610. *A. rosea* L. - Л. розовая = МД, АИ, НК, М, СК, КН(Европ.); Rb(T); [R.] <Рм>
611. *A. sphaeromorpha* Iljin - Л. шаровидная = МД, АИ, НК, М(Субпонт*.); Db(T); [R.]
612. *A. tatarica* L. - Л. татарская = Все р-ны(Палеаркт.); ST, Da(T); [Pl.]
613. *Halimione verrucifera*(Bieb.)Aell. (*Atriplex verrucifera* Bieb.) - Галимионе бородавчатый = КЕ, МД, АИ, НК, М, Ст, СК, П(Вост.др.средиз.); Dc(Ch:sf); [Sp.]
614. *H. pedunculata*(L.)Aell. (*A. pedunculata* L.) - Г. черешчатый = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М, КН (Палеаркт.); Dc(T); [R.]
615. *Krascheninnikovia ceratoides*(L.)Gueldenst. (*Ceratoides papposa* Botsch. et Ikonn.) - Терескен хохлатый = Прик(г.Брык), НК(Общедр.средиз.); SD(Ch:sf); [R.]
616. *Ceratocarpus arenarius* L. - Рогоплодник песчаный = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М, Ст, СК, П, КН(Общедр.средиз.); SD(T); [Pl.]
617. *C. utriculosus* Bluk (*C. turkestanicus* Sav.-Rycz. ex Iljin) - Р. мешочковый = МД, АИ, НК, СК, КН(Туранск.); ST, SD(T); [R.]
618. *Camphorosma monspeliacana* L. - Камфоросма марсельская = МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М, Ст, СК(Общедр.средиз.); Dc(Ch:sf); [R.] <Рп>
619. *C. lessingii* Litv. - К. Лессинга = МД, АИ, НК, М, КН(Туранск.); SD(Ch:sf); [R.]
620. *Bassia hyssopifolia*(Pall.)O.Kuntze (*Echinopsilon hyssopifolium*(Pall.)Moq.) - Бассия иссополистная = МД, АИ, НК, М, СК, КН(Общедр.средиз.); Dc(T); [R.]
621. *B. sedoides*(Pall.)Aschers. (*E. sedoides*(Pall.)Moq.) - Б. очитковая = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М, Ст, СК, П, КН(Вост.др.средиз.); Dc(T); [Sp.]
622. *B. hirsuta*(L.)Aschers. (*E. hirsutum*(L.)Moq.) - Б. волосистая = Прик(г.Брык) (Общедр.средиз.); Dc(T); [R.]
623. *Kochia prostrata*(L.)Schrad. - Прутняк простёртый = Все р-ны (Общедр.средиз.); ST, Da(Ch:sf); [Pl.] <Рп>
624. *K. laniflora*(S.G.Gmel.)Borb. - П. шерстистоцветковый = Прик, ТБ, НК, М, СК, КН(Палеаркт.); Db(T); [R.]
625. *K. scoparia*(L.)Schrad. - П. веничный = Все р-ны(Общедр.средиз.); Rb(T); [Sp.] <Рм>
626. *Corispermum caucasicum*(Iljin)Iljin (*C. aralo-caspicum* Iljin) - Верблюдка кавказская = М, КН(Туранск.); Db(T); [Sp.]
627. *C. orientale* Lam. - В. восточная = КН(Субпонт*.); Db(T); [R.]

628. *C. nitidum* Schult. - В. лоснящаяся = КН[Тан菲尔ев, Кононов, 1987]
 (Понтич.); Db(T); [R.]
629. *Agriophyllum squarrosum*(L.)Moq. (*A. arenarium* Bieb.ex C.A.Mey.) - Кумарчик
 оттопыренный = МД,АИ,НК,М,КН(Субтуран*.); Db(T); [Sp.]
630. *Kalidium foliatum*(Pall.)Moq. - Поташник олиственный = КН(Туранск.);
 Dc(HK); [R.]
631. *K. caspicum*(L.)Ung.-Sternb. - П. каспийский = КН(Ирано-Туран.); Dc(Phn); [R.]
632. *Halopeplis pygmaea*(Pall.)Bunge ex Ung.-Sternb. - Соровник низкий = КН
 (Туранск.); Dc(T); [R.] l.c. низовья Кумы
633. *Halostachis belangeriana*(Moq.)Botsch. (*Halostachys caspia* C.A.Mey.) -
 Соляноколосник Белангера = МД,АИ,НК,КН(Ирано-Туран.); Dc(Ch); [R.]
634. *Halocnemum strobilaceum*(Pall.)Bieb. - Сарсазан шишковатый = МД,АИ,НК,
 Прик,ТБ,М,КН(Общедр.средиз.); Dc(Ch:sf); [Sp.]
635. *Salicornia europaea* L. (*S. herbaceae*(L.)L.) - Солерос европейский = Все р-ны
 (Голаркт.); Dc(T:ps); [Sp.]
636. ★ *Suaeda microphylla* Pall. - Сведа мелколистная = МД,АИ,НК,М,Ст,КН
 (Ирано-Туран.); Dc(Ch:fl); [Sp.]
637. *S. altissima*(L.)Pall. - С. высокая = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,КН(Ирано-
 Туран.); Dc(T); [Sp.]
638. *S. confusa* Iljin - С. запутанная = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,КН
 (Субтуран*.); Dc(T); [Pl.]
639. *S. salsa*(L.)Pall. - С. солончаковая = КЕ,МД,АИ,НК,М,Ст(Туранск.); Dc(T); [R.]
640. *S. prostrata* Pall. - С. простёртая = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,СК,КН (Палеаркт.);
 Dc(T); [Sp.] <Pm>
641. *Salsola soda* L. - Солянка содоносная = КЕ,МД,АИ,НК(Общедр.средиз.);
 Dc(T); [Sp.]
642. *S. laricina* Pall. - С. лиственничная = МД,АИ,НК,М,КН(Субпонт*.);
 Dc(Ch:fl); [Sp.]
643. *S. dendroides* Pall. - С. древовидная = МД,АИ,НК,М,КН(Ирано-Туран.);
 Dc(Ch); [Sp.] <Pp>
644. *S. australis* R.Br. (*S. iberica*(Sennen et Pau)Botsch.; *S. pestifer* Nels.) - С. южная
 = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST,SD,Rb(T); [Pl.]
645. *S. ericoides* Bieb. - С. вересковидная = КН(Субкавк*.); Dc(Phn); [R.] l.c. между
 р.р. Куря и Кума <Pp>
646. *S. orientale*(S.G.Gmel.)Tzvel. - С. восточная = КН[Тан菲尔ев, Кононов,
 1987](Туранск.); Dc(T); [R.]
647. *Caspia foliosa*(L.)Galushko (*Salsola foliosa*(L.)Schrad.) - Каспия. олиственная =
 НК,КН(Субтуран*.); Dc(T); [R.]
648. *Climacoptera crassa*(Bieb.)Botsch. (*Salsola crassa* Bieb.) - Климакоптера
 мясистая = М,КН(Туранск.); Dc(T); [Sp.]

649. *C. brachiata*(Pall.)Botsch. (*S. brachiata* Pall.) - К. супротиволистная = КН
(Вост.др.средиз.); Dc(T); [Sp.]
650. *Anabasis aphylla* L. - Анабазис безлистный = КН(Ирано-Туран.); SD(Ch:sf);
[Sp.] <Pt;Pm>
651. *Petrosimonia brachiata*(Pall.)Bunge - Петросимония раскидистая = МД, АИ,
HK, M, KN(Ирано-Туран.); Dc(T); [Rs.] <Pp>
652. *P. glaucescens*(Bunge)Iljin - П. сизоватая = Прик[Танфильев, Кононов, 1987]
(Туранск.); Dc(T); [R.]
653. *P. oppositifolia*(Pall.)Litv. (*P. crassifolia*(Pall.)Bunge) - П. супротиволистная =
Все р-ны(Субтуран*); Dc(T); [Sp.]
654. *P. triandra*(Pall.)Simonk. - П. трёхтычинковая = KE, M, Ct, CK, [П: Танфильев,
Кононов, 1987]KN(Субтуран*); Dc(T); [Sp.] <Pp>

Сем. 62. AMARANTHACEAE Juss. - ЩИРИЦИЕВЫЕ

655. *Amaranthus cruentus* L. (*A. paniculatus* L.) - Щирица кровяная = Все р-ны
(Плюрирг.); Rb(T); [Pl.]
656. *A. retroflexus* L. - Щ. запрокинутая = Все р-ны(Плюрирг.); Rb(T); [Pl.]
657. *A. blitoides* S.Wats. - Щ. жминдовидная = Все р-ны(Адвент.[Сев.Америка]);
Rb(T); [Sp.]
658. *A. albus* L. - Щ. белая = Все р-ны(Адвент.[Сев. Америка]); Rb(T); [R.]
659. *A. blitum* L. (*A. lividus* L.) - Щ. синеватая = KE, Ct, CK, П, Kisл(Плюрирг.);
Rb(T); [Pl.]
660. *A. graecizans* L. - Щ. маскированная = M, CK, П, KN(Адвент.[Сев. Америка]);
Rb(T); [R.]

Сем. 63. PHYTOLACCACEAE R.Br. - ЛАКОНОСОВЫЕ

661. *Phytolacca americana* L. - Лаконос американский = Ст, П(Пятигорск) (Адвент.
[Сев.Америка]); Rb(HK); [R.] <Pm>

Сем. 64. PORTULACACEAE Juss. - ПОРТУЛАКОВЫЕ

662. *Portulaca oleracea* L. - Портулак овощной = Все р-ны(Общедр.средиз.);
Ra,Rb(T); [Pl.] <Pa;Pm>

Сем. 65. ILLECEBRACEAE R.Br. (*CARYOPHYLLACEAE*) - ДИВАЛОВЫЕ

663. *Herniaria besseri* Fisch.ex Hornem (*H. incana* Lam.) - Грыжник Бессера = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST,Db(Ch:sf); [Pl.]
664. *H. glabra* L. (*H. suavis* Klok.) - Г. голый = Ст[Лазьков, 1996] (Общедр.
средиз.); Db,Rb(T); [R.]
665. *H. hirsuta* L. (*H. cinerea* DC.)- Г. волосистый = Ст(Общедр.средиз.); Db,Dd(T); [R.]
<Pm>

666. *H. polygama* J.Gay - Г.многобрачный = Ст,СК(Понт.-Южносиб.);
Da,Db(Ch:sf); [R.]
667. *Scleranthus annuus* L. - Дивала однолетняя = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Rb(T);
[Pl.]
668. *S. polycarpos* L. - Д. многоплодная = СК,П,Кисл(Субсредиз*.); Pa(T); [Sp.]
669. *S. uncinatus* Schur - Д. крючковатая = Ст,ЛН,П,Кисл(Общедр.средиз.);
Da,Rb(T); [Pl.]

Сем. 66. CARYOPHYLLACEAE Juss. - ГВОЗДИЧНЫЕ

670. *Stellaria media*(L.)Vill. - Звёздчатка средняя = Все р-ны(Голаркт.); Rb(T); [Pl.]
<Pa;Pm>
671. *S. neglecta* Weihe - З. незамеченная = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
672. *S. holostea* L. - З. ланцетолистная = М,ЛН(Палеаркт.); S(HK); [Sp.] <Pm>
673. *S. graminea* L. - З. злачная = М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S,Pa(HK); [Pl.]
<Pm>
674. *Myosoton aquaticum*(L.)Moench (*Malachium aquaticum* Fries) -
Мягковолосник водный = М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл,КН(Палеаркт.); Aa(HK); [Sp.]
675. *Cerastium nemorale* Bieb. - Ясколка лесная = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,
П,Кисл(Субкавк*.); S(T); [Pl.]
676. *C. holosteum* Fisch.ex Hornem. - Я. костенцовая = П,Кисл(Эукавк.); S(HK); [Pl.]
677. *C. davuricum* Fisch.ex Spreng. - Я. даурская = П,Кисл(Субтуран*.); S,Pa(HK);
[Sp.]
678. *C. perfoliatum* L. - Я. пронзённолистная = МД,АИ,НК,Ст(Зап.др.средиз);
Pa(T); [R.]
679. *C. ruderale* Bieb. - Я. сорная = КЕ,М,П,КН(Эукавк.); Pa(T); [Sp.] 1.с. Кизляр
680. *C. brachypetalum* Desp.ex Pers. (*C. tauricum* Spreng.) - Я. коротколепестная =
СК,П (Евро-Кавк.); Rb(T); [Sp.]
681. *C. glomeratum* Thuill. - Я. скученоцветковая = СК,П,Кисл(Плюрирг.);
Db(T); [Sp.]
682. *C. semidecandrum* L. - Я. пятитычиночная = СК,П(Евро-Кавк.); Pa(T); [R.]
683. *C. balericum* F.Herm. (*C. dentatum* Moschl.) - Я. зубчатая = КЕ,МД,АИ,НК,
Прик,ТБ,М,СК(Субтуран*.); ST(T); [Sp.]
684. *C. glutinosum* Fries - Я. липкая = Ст(Евро-Кавк.); Db,Dc(T); [R.]
685. *C. meyerianum* Rupr. - Я. Мейера = П(Предкавк.); S(T); [R.] 1.с. г. Бештау <Rg>
686. *C. purpurascens* Adams - Я. пурпурная = Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Pl.] <Pp>
687. *C. holosteoides* Fries (*C. caespitosum* Gilib) - Я. дернистая = Все р-ны
(Плюрирг.); Pa,Aa(HK); [Pl.]
688. *C. arvense* L. - Я. полевая = Все р-ны(Голаркт.); Pa(HK); [Pl.]

689. *Dichodon viscidum*(Bieb.)Holub (*Cerastium dubium*(Bast.)Guepin; *C. anomalum* Waldst. et Kit.) - Диходон (Ясколка) уклоняющийся = МД,М(Терек),Ст,КН (Субсредиз*.); Aa(T); [R.]
690. *Holosteum umbellatum* L. - Костенец зонтичный = Все р-ны(Палеаркт.); ST,SD(T:eph); [Pl.]
691. *H. glutinosum*(Bieb.)Fisch. et C.A.Mey. - К. липкий = М,Ст,СК(Ирано-Туран.); ST,SD(T:eph); [R.]
692. *H. marginatum* Fisch. et C.A.Mey. - К. окаймлённый = П(Машук) (Субкавк*.); ST,SD(T:eph); [R.]
693. ★*Bufonia parviflora* Griseb. (*Bufonia tenuifolia* L.) - Бюфония тонколистная = KE(ст. Рождественская)(Субпонт*.); ST(T); [Rs.] <Rx>
694. *Queria hispanica* L. - Кверия испанская = Ст,СК,П(Зап.др.средиз); ST,SD(T:eph); [R.]
695. *Minuartia hybrida*(Vill.)Schischk. - Минуарция гибридная = Ст,СК,П (Субсредиз*.); ST,SD(T); [R.]
696. *M. biebersteinii*(Rupr.)Schischk. - М. Биберштейна = Кисл(Эукавк.); Da(HK); [Pl.]
697. *M. circassica*(Albov)Woronow (*M. caucasica*(Adams ex Rupr.)Mattf.) - М. черкесская = П(Бештау),Кисл[Танфильев, Коннов, 1987](Кавк.); Da(HK); [Pl.]
698. *Eremogene saxatilis*(L.)Ikonn. (*Arenaria stenophylla* Ledeb.; *A. graminifolia* Schrad.) - Эремогене узколистная = Прик,ТБ,СК,П(Евро-Сиб.); ST(HK); [R.]
699. *E. longifolia*(Bieb.)Fenzl (*A. longifolia* Bieb.) - Э. длиннолистная = KE,Ст,СК (Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Sp.]
700. *Arenaria serpyllifolia* L. - Песчанка чебрецелистная = Все р-ны(Голаркт.); Db,Rb(T); [Pl.]
701. *Moehringia trinervia*(L.)Clairv. - Мерингия трёхжилковая = KE,Прик,ТБ,Ст, ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S(T); [Sp.]
702. *Spergula arvensis* L. (*S. vulgaris* Boenn.) - Торица обыкновенная = Ст,СК (Голаркт.); Db,Rb(T); [R.]
703. *Spergularia maritima*(All.)Chiov. (*S. media*(L.)C.Presl., *S. marginata*(DC) Kitr.) - Торичник морской = Все р-ны(Субтуран*.); Dc,Aa(T); [Pl.]
704. *S. rubra*(L.)J.et C.Presl (*S. campestris*(L.)Aschers.) - Т. красный = СК(Евро-Сиб.); Dc(T); [R.]
705. *S. salina* J.et C.Presl (*S. marina*(L.)Griseb.) - Т. солончаковый = Все р-ны (Плюрирег.); Dc(T); [Sp.]
706. *Agrostemma githago* L. - Куколь обыкновенный = Все р-ны(Палеаркт.); Ra(T); [Sp.] <Pt;Pm>
707. *Steris viscaria*(L.)Rafin. (*Viscaria viscosa*(Scop.)Aschers.; *V. vulgaris* Bernh.) - Стерис смолковый (Смолка обыкновенная) = Ст,П(Европ.); Pa(HK); [R.] <Pm>

708. ★ Oberna procumbens(Murr.)Ilkonn. (*Silene procumbens Murr.*) - Оберна (Смолёвка) лежачая = МД, АИ, Ст(Понт.-Южносиб.); S, Aa(HK); [Rs.] <Rg>
709. O. scerei(Baumg.)Ilkonn. (*S. scerei Baumg.*) - О.(C.) Сцера = СК, П(Понтич.); Pa(HK); [R.]
710. O. multifida(Adams)Ilkonn. (*S. multifida(Adams)Rohrh.*) - О.(C.) многорассечённая = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Кавк.); S(HK); [Pl.] <Rt>
711. O. behen(L.)Ilkonn. (*S. vulgaris(Moench)Garcke; S. latifolia(Mill.)Britt et Rendle*) - О.(C.) обыкновенная = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Плюрирег.); Pa(HK); [Pl.]
712. Silene dichotoma Ehrh. - Смолёвка вильчатая = [Ст, Лазьков, 1996], СК (Европ.); Pa(HK); [R.]
713. S. pendula L. - С. повислая = Ст(Субсредиз*.); S, Pa, Rb(HK); [R.] <Rg>
714. S. compacta Fisch.ex Hornem. - С. скученоцветковая = [ТБ, СК, Лазьков, 1996], П, Кисл(Субкавк*.); SD(HK); [Sp.]
715. S. chlorantha(Willd.)Ehrh. - С. зеленоцветковая = Ст, СК, П(Евро-Сиб.); ST(HK); [R.]
716. S. ruprechtii Schischk. (*S. saxatilis Bieb.*) - С. Рупрехта = П, Кисл(Субкавк*.); Pb, Pc(HK); [Pl.]
717. S. supina Bieb. - С. приземистая = Ст, СК, П(Понтич.); Da(HK); [Sp.] l.c. Пятигорск
718. S. linearifolia Otth - С. линейнолистная = [Прик, ТБ, Ст: Лазьков, 1996], П (Эукавк.); Da(HK); [Sp.]
719. ★ S. nutans L. - С. поникающая = Ст, П(Евро-Сиб.); Pa(HK); [Rs.] <Rg, Pm>
720. S. italica(L.)Pers. - С. итальянская = КЕ, [Прик, ТБ: Лазьков, 1996], Ст, ЛН, П, Кисл (Средиземн.); S, Pa(HK); [Sp.]
721. Otites wolgensis (Hornem.) Grossh. (*Silene. wolgensis(Hornem.)Bess.ex Spreng.*) - Отитес волжский = Все р-ны(Палеаркт.); ST, Da(T); [Pl.]
722. O. densiflora(D'Urv.)Grossh. (*S. densiflora D'Urv.*) - О. густоцветковый = КЕ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Понтич.); ST(T); [Sp.]
723. O. media(Litv.)Klok. (*S. media(Litv.)Kleop.*) - О. средний = КН(Ачикулак) (Понт.-Южносиб.); Db(T); [R.]
724. O. cyri(Schischk.)Grossh. (*S. cyri Schischk.*) - О. куринский = М, КН (Туранск.); ST(T); [Sp.]
725. O. parviflora(Ehrh.)Grossh. (*S. borystenica (Grun.)Walters S. parviflora (Ehrh.) Pers.*) - О. мелкоцветковый = М, [Ст, П: Лазьков, 1996], СК(Евро-Сиб.); Db(T); [R.]
726. Pleconax subconica(Friv.)Sourcova (*Silene subconica Friv.*) - Плеконакс почниконический = Все р-ны(Общедр. средиз.); ST, Rb(T); [Sp.]
727. ★ Coccyanthe flos-cuculi(L.)Fourr. (*Coronaria flos-cuculi(L.)R.Br.*) - Кукушник обыкновенный = Ст(Евро-Сиб.); Pa(HK); [R.] <Rg> <Pm>

728. *Elisanthe viscosa*(L.)Rupr. (*Silene viscosa* L.) - Элизанте клейкая = Все р-ны (Палеаркт.); ST(HK); [Pl.]
729. *E. noctiflora*(L.)Rupr. (*Silene noctiflora* L.) - Э. ночная = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Евро-Сиб.); Pa(HK); [Sp.]
730. *Melandrium album*(Mill.)Garcke - Дрёма белая = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(HK:pb); [Pl.] <Pm>
731. ★★ *Petrocoma hoeftiana*(Fisch.)Rupr. - Петрокома Гёффта = Кисл(Эукавк.); Da(HK); [Rs.] <Esub> l.c. Кисловодск (Берёзовка)
732. *Cucubalis baccifer* L. - Волдырник ягодный = М, Ст, ЛН(Палеаркт.); Aa(HK); [R.]
733. ★ *Gypsophila globulosa* Stev.ex Boiss. - Гипсолюбка шаровидная = Ст, СК, П, Кисл(Предкавк.); Da(HK); [Sp.] <Ee>
734. ★ *G. glomerata* Pall.ex Adams - Г. скученная = Прик, ТБ, НК, Ст, СК(Кр.-Новоросс.); Da(HK); [R.]
735. *G. altissima* L. - Г. высокая = НК, КН(Евро-Сиб.); Db(HK); [Sp.]
736. *G. paniculata* L. - Г. метельчатая = Все р-ны(Субтуран*); ST(HK); [Sp.] <Pm; Pmel; Po>
737. ★ *G. acutifolia* Fisch.ex Spreng. - Г. остролистная = СК, П(Предкавк.); Da(HK); [Sp.] l.c. Пятигорск
738. *G. trichotoma* Wend. - Г. триждывильчатая = МД, АИ, НК, КН(Понт.-Южносиб.); Dc(HK); [Sp.]
739. *G. scorzonerifolia* Ser. - Г. козелецелистная = Прик, ТБ, НК, М, КН (Предкавк.); Db(HK); [R.] l.c. Кизляр
740. *G. elegans* Bieb. - Г. изящная = П, Кисл(Субкавк*); Rb(T); [Pl.]
741. *Psammophiliella muralis*(L.)Ikonn. (*Gypsophila muralis* L.) - Псаммофилиелла постенная = Все р-ны(Евро-Сиб.); Rb(T); [R.]
742. *Kohlruschia prolifera*(L.)Kunth - Кольраушия побегоносная = Все р-ны (Понтич.); ST, Rb(T); [Sp.] <Pm>
743. *Vaccaria hispanica*(Mill.)Rauschert (*V. segetalis* Garcke) - Тысячеголов испанский = Все р-ны(Плюрирег.); Ra(T); [Sp.]
744. *Dianthus armeria* L. - Гвоздика армериевидная = Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa(HK:pb); [Sp.] <Pm>
745. *D. pseudoarmeria* Bieb. - Г. ложноармериевидная = Ст, СК, П, Кисл (Понтич.); ST, Da(HK:pb); [Sp.] <Po>
746. *D. capitatus* Balb.ex DC. - Г. головчатая = КЕ, Прик, ТБ, НК, М, Ст, СК, П, Кисл (Понтич.); Pa(HK); [Sp.] <Po>
747. *D. ruprechtii* Schischk. - Г. Рупрехта = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Эукавк.); Pa(HK); [Pl.] <Po>
748. *D. polymorphus* Bieb. - Г. изменчивая = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст(Понтич.); ST(HK); [R.] <Po>

749. *D. borbasii* Vandas - Г. Борбаша = КЕ, МД, АИ, НК, Ст(Понт.-Южносиб.); ST, Db(HK); [R.] <Po>
750. *D. imereticus*(Rupr.)Schischk. - Г. имеретинская = П(Эвксин.); Da(HK); [Sp.] <Rg; Po>
751. ★ *D. bicolor* Adams - Г. двуцветная = Ст, СК, П(Эукавк.); Pa, ST(HK); [R.] 1.c. Минеральные Воды
752. *D. pallidiflorus* Ser. - Г. бледноцветковая = Прик, ТБ, НК, М, Ст, СК, П, КН (Понтич.); ST(HK); [R.]
753. *D. pallens* Smith (*D. lanceolatus* Stev. ex Reichenb.) - Г. бледная = Все р-ны (Понтич.); ST, Db(HK); [Pl.]
754. *D. caucaseus* Smith (*D. discolor* Smith) - Г. кавказская = П, Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Pl.] 1.c. Бештау
755. *D. fragrans* Adams - Г. душистая = П, Кисл(Эукавк.); Pa, Db(HK); [Sp.] 1.c. Пятигорск
756. *D. arenarius* L. - Г. песчаная = М(Терек)(Европ.); Db(HK); [Rs.] <Rx>
757. *Saponaria officinalis* L. - Мыльнянка лекарственная = Все р-ны(Европ.); Aa, Rb(HK); [Sp.] <Po; Pm>

Сем. 67. NYMPHAEACEAE Salisb. - НИМФЕЙНЫЕ

758. ★ *Nymphaea alba* L. - Кувшинка белая = НК(Европ.); Ac(K); [Rs.] <Pm; Po>

Сем. 68. NUPHARACEAE - КУБЫШКОВЫЕ

759. ★ *Nuphar lutea*(L.)Smith - Кубышка жёлтая = НК(Палеаркт.); Ac(K); [R.] <Pm; Po>

Сем. 69. CERATOPHYLLACEAE S.F.Gray - РОГОЛИСТНИКОВЫЕ

760. *Ceratophyllum demersum* L. - Роголистник поргужённый = М, Ст, ЛН (Палеаркт.); Ac(K); [R.]
761. *C. submersum* L. - Р. полупогруженный = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М, Ст, СК (Палеаркт.); Ac(K); [R.]

Сем. 70. PAEONIACEAE Rudolphi - ПИОНОВЫЕ

762. ★★ *Paeonia caucasica*(Shipz.)Schipz. (*P. kavachensis* auct.) - Пион кавказский = Кисл(Эвксин.); S(K); [Rs.] <Rg; Rt; Po>
763. ★★ *P. tenuifolia* L. - П. узколистный = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Понтич.); Pa, ST(HK); [Pl.] <Pm; Po>
764. ★ *P. biebersteiniana* Rupr. - П. Биберштейна = КЕ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Предкавк.); Pa, ST(HK); [Sp.] <Esub> 1.c. Ставрополь

Сем. 71. RANUNCULACEAE Juss. - ЛЮТИКОВЫЕ

765. *Trollius ranunculinus*(Smith)Stearn (*T. patulus Salisb.*) - Купальница лютиковая
= П,Кисл(Субкавк*.); Pb,Pc(HK); [Sp.] <Pt>
766. ★ *Helleborus caucasicus* A.Br. - Морозник кавказский = Ст(Эвксин.);
S(HK:hv); [Rs.] <Rg;Rt;Pm;Po>
767. *Nigella arvensis* L. - Чернушка полевая = КЕ,Ст,ЛН,СК(Субсредиз*.); Rb(T);
[Sp.] <Po>
768. *N. sativa* L. - Ч. посевная = Все р-ны(Общедр.средиз.); Rb(T); [Sp.] <Pm;Po>
769. *N. damascena* L. - Ч. дамасская = Все р-ны(Средиземн.); Rb(T); [Sp.] <Po>
770. *Actaea spicata* L. - Воронец колосовидный = Ст,ЛН,П,Кисл(Евро-Сиб.);
S(HK); [Sp.] <Rt>
771. *Aquilegia caucasica* Bieb. - Водосбор кавказский = Кисл(Кавк.); Pb(HK); [R.]
772. *Consolida paniculata*(Host)Schur - Живокость метельчатая = Все р-ны
(Субпонт*.); ST(T); [Pl.] <Pm>
773. *C. regalis* S.F.Gray (*Delphinium consolida* L.) - Ж. великолепная = КЕ,МД,
АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК(Европ.); Ra,Rb(T); [Sp.]
774. *C. orientalis*(J.Gay)Schroding. - Ж. восточная = М,СК,П(Субсредиз*.);
ST,Rb(T); [Sp.]
775. *C. divaricata*(Ledeb.)Schroding. - Ж. растопыренная = МД,АИ,НК,Прик,
ТБ,М,Ст,СК,КН(Субпонт*.); Ra,Rb(T); [Pl.]
776. ★ ★ *Diedropetala punicea*(Pall.)Galushko (*Delphinium puniceum* Pall.) -
Диедропетала пунцовая = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,(Турansk.); ST(HK);
[Rs.] <Pt>
777. *D. schmalhausenii*(Albov)Galushko (*D. schmalhausenii* Albov) - Д.
Шмальгаузена = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Эвксин.); Pa,ST(HK); [Pl.] <Pt>
778. *Delphinium flexuosum* Bieb. - Дельфиниум извилистый = П,Кисл(Кавк.);
Pb(HK); [Sp.] <Pt>
779. *D. dasycarpum* Stev.ex DC. - Д. опущенноплодный = П,Кисл(Эукавк.);
Pb(HK); l.c. Кисловодск <Pt>
780. *Aconitum confectiflorum*(DC.)Gayer - Борец скученоцветковый = Кисл
(Евро-Сиб.); Pb(HK); [R.] <Pt>
781. *A. orientale* Mill. - Б. восточный = П,Кисл(Субкавк*.); Pb(HK); [Pl.]
782. *A. nasutum* Fisch.ex Reichenb. - Б. носатый = П,Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Sp.]
783. ★ *Anemonastrum fasciculatum*(L.)Holub (*Anemone fasciculata* L.) -
Анемонаструм (Ветреница) пучковатый = П,Кисл(Кавк.); Pb,Pc(HK); [Sp.]
784. *Anemonoides ranunculoides*(L.)Holub (*Anemone ranunculoides* L.) -
Анемоидес (Ветреница) лютичный = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-
Кавк.); S(K:ephd); [Pl.]
785. ★ *A. nemorosa*(L.)Holub (*Anemone nemorosa* L.) - А.(Б.) дубравный = П
(Биберштейн)(Европ.); S(K:ephd); [Rs.] <Rg>

786. ★ A. caucasica(Rupr.)Holub (*Anemone caucasica* Willd.ex Rupr.) - А.(Б.)
кавказский = Ст(Кавк.); S(K:ephd); [R.] <Rg>
787. ★★ A. blanda(Schott et Kotschy)Holub (*Anemone blanda* Schott et Kotschy) -
А.(Б.) приятный = Ст(Эвксин.); S(K:ephd); [R.] ,<Rg>
788. ★ *Anemone sylvestris* L. - Ветреница лесная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Сиб.);
Pa,ST(HK); [Sp.] <Po>
789. ★ *Pulsatilla albana*(Stev.)Bercht.et J.Presl - Сон албанский = П,Кисл(Кавк.);
Pb(HK:ephd); [Pl.] <Po>
790. ★ *Clematis integrifolia* L. - Ломонос цельнолистный = [КЕ, оз.Солёное:
Немирова, Данилевич, 1991],Ст,П,Кисл(Палеаркт.); Pa,Pb(Ch:sf); [Sp.]
<Po;Pmel>
791. ★ C. recta L. - Л. прямой = КЕ(ст.Рождественская),ЛН(Невинномысск)
(Европ.); S,Pa(Ch:sf); [Rs.]
792. ★ C. lathyrifolia Bess.ex Reichenb. (*C. pseudoflammula* Schmalh.ex Lipsky) - Л.
ложножгучий = КЕ,Ст,ЛН,СК,П(Понтич.); Pa,ST(Ch:sf); [Sp.]
793. ★ C. vitalba L. - Л. виноградолистный = Ст,ЛН,П(Субсредиз*.); S(Ch:ll); [R.]
<Pm;Pmel>
794. ★ C. orientalis L. - Л. восточный = М,СК,П(Общедр.средиз.); Pa(Ch:ll); [R.]
<Pmel>
795. Myosurus minimus L. - Мышиехвостник маленький = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН
(Плюрирег.); Aa(T); [R.]
796. Ceratocephala falcata(L.)Pers. - Рогоглавник серповидный = КЕ,МД,АИ,НК,
Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,СК,П(Общедр.средиз.); SD(T:eph); [R.] <Pm>
797. C. testiculata(Crantz)Bess. - Р. яйцевидный = Все р-ны(Палеаркт.);
SD,Dd(T:eph); [Pl.]
798. Ficaria calthifolia Reichenb. - Чистяк калужницилистный = Все р-ны
(Зап.др.средиз.); S,Pa(HK:ephd); [Pl.] <Pm>
799. Batrachium aquatile(L.)Dumort (*Batrachium triphyllum*(Wallr.) Dumort.;
Ranunculus aquatilis L.) - Водяной лютик водный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл
(Субсредиз*.); Ac(K); [R.]
800. B. rionii(Lagger)Nym. (*Ranunculus rionii* Lagger) - В.л. Риона = Все р-ны
(Палеаркт.); Ac(K); [Sp.]
801. B. trichophyllum(Chaix)Bosch (*B. divaricatum*(Schrank)Wimm.; *Ranunculus*
trichophyllum Chaix) - В.л. волосистолистный = Все р-ны(Панбор.); Ac(K); [R.]
802. ★ Buschia lateriflora(DC.)Ovcz. (*Ranunculus lateriflorus* DC.) - Бушня
бокоцветная = МД(Понт.-Южносиб.); Aa(T); [Rs.]
803. ★ *Ranunculus lingua* L. - Лютик длиннолистный = НК,Ст(оз.Кравцово)
(Палеаркт.); Aa(HK); [R.] <Rg>
804. ★ R. auricomus L. - Л. золотистый = Ст(Европ.); Aa(HK); [Rs.] <Rg>
805. R. sceleratus L. - Л. ядовитый = Все р-ны(Голаркт.); Aa(T); [Pl.] <Pt>

806. *R. repens* L. - Л. ползучий = Все р-ны(Голаркт.); Аа,Ab(К); [Pl.] <Pt;Pm>
807. *R. caucasicus* Bieb. - Л. кавказский = Ст,ЛН,П,Кисл(Кавк.); Pa,Aa(HK); [Sp.]
1.с. Пятигорск <Pt>
808. *R. baidarae* Rupr. - Л. Байдары = П,Кисл(Кавк.); Pb,Pc(HK); [Rs.] <Pt>
809. *R. oreophilus* Bieb. - Л. горный = Ст,ЛН,П,Кисл(Евро-Кавк.); Pb,Pc(HK); [Sp.]
<Pt>
810. *R. bulbosus* L. - Л. клубневой = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН(Палеаркт.); Pa(HK); [R.]
<Pt>
811. *R. meyerianus* Rupr. - Л. Мейера = Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa(HK); [Pl.] <Pt>
812. ★ *R. nemorosus* DC. - Л. дубравный = Ст[Танфильев, Кононов, 1987](Европ.);
S(HK); [R.] <Rg;Pt>
813. *R. arvensis* L. - Л. полевой = Ст(Общедр.средиз.); Db,Ra(T); [R.] <Pt>
814. *R. oxyspermus* Willd. - Л. остроплодный = Все р-ны(Ирано-Туран.); ST(HK);
[Pl.] <Pt>
815. *R. illiricus* L. (*R. meridionalis* Grossh.) - Л. иллирийский = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,
ЛН,СК(Зап.др.средиз.); Pa,ST(HK); [Sp.]
816. *R. pedatus* Waldst. et Kit. - Л. стоповидный = КЕ,Прик,ТБ,Ст,СК(Понт.-
Южносиб.); ST(HK); [R.]
817. *Thalictrum foetidum* L. - Василистник вонючий = П,Кисл(Палеаркт.);
Db(HK); [Sp.] <Pt;Pm>
818. *Th. minus* L - В. малый = Все р-ны(Голаркт); Pa,ST(HK); [Pl.] <Pt;Pm>
819. *Th. simplex* L. - В. простой = Кисл(Палеаркт.); Pb(HK); [R.]
820. *Th. flavum* L. - В. жёлтый = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,СК,П,КН
(Евро-Сиб.); Pa(HK); [R.] <Pm>
821. ★ *Adonis vernalis* L. - Горицвет весенний = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П(Евро-Сиб.);
Pa,ST(HK:ephd);[Sp.]< Pm;Po>
822. *A. aestivalis* L. - Г. летний = Все р-ны(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm>
823. *A. flammea* Jacq. - Г. пламенный = Все р-ны(Субсредиз*); Ra,Rb(T); [Pl.]

Сем. 72. BERBERIDACEAE Juss. – БАРБАРИСОВЫЕ

824. *Berberis vulgaris* L. - Барбарис обыкновенный = Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,
П,Кисл(Европ.); ST,Pb(Phn); [Pl.] <Pm;Pmel>

Сем. 73. HYPECOACEAE(Dumort.)Willk. - ГИПЕКОУМНЫЕ

825. *Hypocoum pendulum* L. - Гипекоум поникающий = НК(Зап.др.средиз.);
Ra,Rb(T); [R.]

Сем. 74. PAPAVERACEAE Juss. - МАКОВЫЕ

826. *Chelidonium majus* L. - Чистотел большой = Все р-ны(Палеаркт.); S,Rb(HK);
[Pl.] <Pm>

827. *Glaucium corniculatum*(L.)Rudolph - Мачок рогатый = Все р-ны
(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Sp.]
828. ★*Roemeria refracta* DC. - Ремерия отогнутая = П[Михеев, 1983](Ирано-Туран.); SD,Rb(T); [Rs.] <Po> <Rx>
829. ★*Papaver bracteatum* Lindl. - Мак прицветниковый = П(Предкавк.); Pa(НК); [Rs.] <Po> <Esub> l.c. Бештау
830. P. *ocellatum* Woronow - М. глазчатый = П[Михеев, 1993](Туранск.); Da,Dd,Rb(T:eph); [R.] <Rx>
831. P. *hybridum* L. - М. гибридный = Прик,ТБ,НК,М,Ст,П(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
832. P. *rhoeas* L. - М. самосейка = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,П
(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T:eph); [R.] <Pm>
833. P. *commutatum* Fisch.et C.A.Mey. - М. спутанный = КЕ,Ст,ЛН,СК,П
(Субкавк*.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
834. P. *arenarium* Bieb. - М. песчаный = Прик,ТБ,НК,М,Ст,СК,П(Туранск.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
835. P. *laevigatum* Bieb. (*P. maeoticum* Klok.) - М. голый = КЕ,Прик,ТБ,НК,М, СК,П(Понтич.); Ra,Rb(T:eph); [R.]
836. ★P. *alberti* A.D.Mikheev (*P. dubium* L. p.p.) - М. Альберта = Прик,П[Михеев, 1993](Кавк.); ST(T:eph); [R.] <Es> (рис. 3)
837. P. *stevenianum* A.D.Mikheev (*P. dubium* L. p.p.) - М. Стевена = КЕ,МД,АИ, Прик,ТБ,М[Михеев, 1993](Понтич); ST(T:eph); [R.] l.c. Пятигорск
838. P. *tichomirovii* A.D.Mikheev (*P. dubium* L. p.p.) - М. Тихомирова = Ст,П
[Михеев, 1993](Кр.-Новоросс.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.] l.c. Пятигорск
839. ★P. *paczoskii* A.D.Mikheev (*P. dubium* L. p.p.) - М. Пачосского = Прик,П[Михеев, 1993](Кавк.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.] <Es> l.c. Пятигорск (рис. 4)

Сем. 75. FUMARIACEAE DC. - ДЫМЯНКОВЫЕ

840. *Corydalis marschalliana*(Pall.ex Willd.)Pers - Хохлатка Маршалла = Ст,ЛН,П
(Субпонт*.); S(K:ephd); [Pl.]
841. ★C. *caucasica* DC. - Х. кавказская = Ст,ЛН,П,Кисл (Эвксин.); S(K:ephd); [Sp.]
842. C. *malkensis* Galushko - Х. малкская = П,Кисл(Эувак.); S(K:ephd); [Sp.]
843. ★C. *angustifolia*(Bieb.)DC. - Х. узколистная = Ст(Субкавк*.); S(K:ephd); [Rs.] <Rg>
844. *Fumaria officinalis* L. - Дымянка лекарственная = Ст(Палеаркт.); Rb(T:eph); [Rs.] <Pm>
845. F. *schleicheri* Soy.-Willem. - Д. Шлейхера = Все р-ны(Евро-Сиб.); Ra,Rb(T:eph); [Pl.]

846. *F. vaillantii* Loisel - Д. Вайланта = Все р-ны(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm>

Сем. 76. BRASSICACEAE Burnett - КАПУСТНЫЕ(КРЕСТОЦВЕТНЫЕ)

847. *Cardaria draba*(L.)Desv. (*Lepidium draba* L.) - Кардария крупка = Все р-ны (Палеаркт.); Rb(HK); [Pl.] <Pm;Pp>

848. *Lepidium campestre*(L.)R.Br. - Кресс(Клоповник) полевой = Все р-ны(Европ.); Ra,Rb(HK:pb); [Sp.]

849. *L. sativum* L. - К. посевной =

М,Ст,СК,П,Кисл(Адвент.[одичавш.культурное]); Rb(T); [R.]

850. *L. ruderale* L. - К. сорный = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pm>

851. *L. pinnatifidum* Ledeb. - К. перисторассечённый = П(Тамбукан)(Туранск.); Dc(T); [R.] <Rx>

852. *L. perfoliatum* L. - К. пронзённый = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,П (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]

853. *L. crassifolium* Waldst.et Kit. - К. толстолистный = Прик,ТБ(Субтуран*.); Dc(HK); [Sp.]

854. *L. latifolium* L. - К. широколистный = Все р-ны(Палеаркт.); Dc(HK); [Pl.] <Pm>

855. *Myagrum perfoliatum* L. - Полёвка пронзённолистная = П(Субсредиз*.); Ra,Rb(T); [R.]

856. *Isatis sabulosa* Stev.ex Ledeb. - Вайда песчаная = М,КН(Предкавк.); Db(HK:pb); [Sp.] 1.с. низовья Терека

857. *I. tinctoria* L. - В. красильная = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,СК,П(Палеаркт.); ST,Rb(HK:pb); [R.]

858. ★ *Iberis taurica* DC. - Иберийка крымская = Ст,П(Субкавк*.); Da(HK:pb); [Rs.] <Rx>

859. *Thlaspi arvense* L. - Ярутка полевая = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]

860. *Microthlaspi perfoliatum*(L.)F.K.Mey. (*Thlaspi perfoliatum* L.) - Ярутка пронзённолистная = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]

861. *Noccaea macrantha*(Lipsky)F.K.Mey. (*Thlaspi macranthum* (Lipsky) N.Busch) - Ярутка крупноцветковая = П,Кисл(Кр.-Новоросс.); ST(T); [R.]

862. *Pachyphragma macrophyllum*(Hoffm.)N.Busch - Толстостенка крупнолистная = Ст,ЛН,П(Эвксин.); S(HK:hv); [Sp.] <Rt;Rg>

863. *Capsella bursa-pastoris*(L.)Medik. - Пастушья сумка обыкновенная = Все р-ны(Плюрирег.); Rb(HK:pb); [Pl.] <Pm>

864. *Hymenolobus procumbens*(L.)Fourr. - Многосемянник простёртый = КН (Палеаркт.); Db(T); [R.]

865. *Alliaria petiolata*(Bieb.)Cavara et Grande - Чесночница черешковая = КЕ, МД,АИ,НК,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S(HK); [Pl.] <Pm>

866. *Sisymbrium officinale*(L.)Scop. - Гулявник лекарственный = Ст,СК,ЛН,П,
Кисл(Плюрир.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm>
867. *S. loeselii* L. - Г. Лёзелиев = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
868. *S. lipskyi* N.Busch - Г. Липского = П,Кисл[Танфильев, Кононов, 1987]
(Эукавк.); Pa,ST(HK:pb); [R.]
869. *S. irio* L. - Г. ирио = СК,П(Общедр.средиз.); ST(HK:pb); [R.]
870. *S. polymorphum*(Murr.)Roth - Г. полиморфный = КЕ,М,Ст,СК(Палеаркт.);
ST(HK); [R.]
871. *S. altissimum* L. - Г. высокий = Все р-ны(Голаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]
872. *S. wolgense* Bieb.ex Fourn. - Г. волжский = [ТБ, Дорофеев, 1994] (Понтич.);
ST,Rb(HK); [Sp.]
873. *Descurainia sophia*(L.)Webb ex Prantl - Дескурайния Софии = Все р-ны
(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pa;Pm>
874. *Neotorularia contortuplicata*(Steph.)Hedge et J.Leonard (*Torularia*
contortuplicata(Steph.)O.E.Schulz) - Чёточник скученный = Прик,ТБ,НК,КН
(Туранск.); Rb(T); [R.]
875. *Arabidopsis pumila*(Steph.)N.Busch - Резушка низкая = МД,АИ,НК,Прик,
ТБ,КН(Ирано-Туран.); Rb(T); [R.] l.c. Кизляр
876. *A. thaliana*(L.)Heynh. - Р. Таля = КЕ,Ст,СК,П(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
877. *Camelina sylvestris* Wallr. - Рыжик лесной = П,Прик,ТБ,НК(Палеаркт.);
Ra,Rb(T); [R.]
878. *C. microcarpa* Andrz. - Р. мелкоплодный = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T);
[Pl.]
879. *C. pilosa*(DC.)Zing. - Р. волосистый = Ст,СК,П(Европ.); Ra,Rb(T); [R.]
880. *C. sativa*(L.)Crantz (*C. glabrata*(DC.)Fritsch) - Р. посевной = Все р-ны
(Панбор.); Ra,Rb(T); [R.]
881. *C. alyssum*(Mill.)Thell. (*C. linicola* Schimp. et Spenn.) - Р. бурачковый = П
[Дорофеев, 1996](Европ.); Ra(T); [R.]
882. *Brassica campestris* L. - Капуста полевая = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T);
[Pl.]
883. *B. juncea*(L.)Czern. - К. сарептская = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
<Pm>
884. *B. napus* L. - К. рапс = ТБ[Дорофеев, 1994](Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]
885. *Erucastrum armoracioides*(Czern.ex Turcz.)Cruent (*Brassica armoracioides*
Czern.ex Turcz.; *B. elongata* Ehrh.) - К. удлинённая = Все р-ны(Палеаркт.);
ST(T); [Pl.]
886. *Sinapis arvensis* L. - Горчица полевая = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
<Pmel>
887. *S. alba* L. - Г. белая = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П(Палеаркт.); Ra,Rb(T);
[Sp.] <Pmel>

888. *Diplotaxis muralis*(L.)DC. - Двурядка постенная = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст, СК,П(Евро-Кавк.); Rb(T); [Pl.]
889. *D. viminea*(L.)DC. - Д. виминея = Ст,Прик[Дорофеев, 1994](Евро-Кавк.); Rb(T); [Sp.]
890. *Raphanus raphanistrum* L. - Редька обыкновенная = Все р-ны(Адвент. [Зап.Европа]); Ra,Rb(T); [Pl.]
891. ★★*Crambe cordifolia* Stev. - Катран сердцелистный = СК,П(Предкавк.); ST(HK); [R.] <Esub> l.c. Георгиевск
892. ★*C. pinnatifida* R.Br. - К. перистый = КЕ,Ст,СК,П(Понтич.); ST(HK); [R.] <Pa>
893. ★*C. gibberosa* Rupr. - К. бугорчатый = КЕ,Прик,ТБ,НК,М(Кавк.); ST(HK); [R.] <Pa>
894. ★*C. tatarica* Sebeok - К. татарский = КЕ,Прик,ТБ,Ст,СК,П(Понтич.); ST(HK); [R.] <Pa>
895. ★*C. grandiflora* DC. - К. крупноцветковый = МД,АИ,СК,Кисл(Предкавк.); ST(HK); [Rs.] l.c. Таманский п-ов <Esub>
896. ★★*C. steveniana* Rupr. - К. Стевена = Прик,ТБ,НК,Ст,СК,П,Кисл(Понтич.); ST(HK); [R.] l.c. Георгиевск
897. ★★*C. koktebelica*(Junge)N.Busch - К. коктебелийский = Ст,СК,П(Кр.-Новоросс.); ST,Dd(HK); [R.] <Rx>
898. *Rapistrum rugosum*(L.)All. - Репник морщинистый = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК, П(Субсредиз*); Pa,ST(T); [Sp.]
899. *Conringia orientalis*(L.)Dumort. - Конрингия восточная = Все р-ны (Общедр.средиз.); Pa(T); [Pl.]
900. *C. austriaca*(Jacq.)Sweet - К. австрийская = П(Европ.); Pa(T); [R.]
901. *Cardamine impatiens* L. - Сердечник недотрога = Ст,П,Кисл(Палеаркт.); S(T); [Sp.]
902. *C. hirsuta* L. - С. жестковолосистый = П,Кисл(Плюрирег.); S(T); [R.]
903. *C. uliginosa* Bieb. - С. болотный = Кисл(Зап.др.средиз); Ab(K); [Pl.]
904. *C. tenera* S.G.Gmel.ex C.A.Mey. - С. нежный = [Ст: Танфильев, Кононов, 1987](Субкавк*); Aa,S(HK); [R.]
905. *Dentaria bulbifera* L. - Зубянка луковиценоносная = П,Кисл(Евро-Кавк.); S(HK); [Sp.]
906. *D. quinquefolia* Bieb. - З. пятилистная = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,СК,П,Кисл (Евро-Кавк.); S(K:ephd); [Pl.]
907. *Barbarea vulgaris* R.Br. - Сурепка обыкновенная = СК,П(Европ.); Aa(HK); [R.] <Pm;Pmel>
908. *B. arcuata*(Opiz.ex J.et C.Presl.)Reichenb. - С. дуговидная = Все р-ны (Палеаркт.); Pa,Rb(HK:pb); [Pl.]
909. *Arabis turrita* L. - Резуха башенная = Ст(Субсредиз*); Pa(HK:pb); [R.]

910. *A. sagittata*(Bertol.)DC. (*A. hirsuta* auct.) - Р. стреловидная = КЕ,Прик, ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Панбор.); S(T); [Sp.]
911. *A. recta* Vill. (*A. auriculata* Lam.) - Р. прямая = М,Ст,СК,П(Общедр. средиз.); Pa(T); [Sp.]
912. *Turritis glabra* L. - Вяжечка голая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>
913. *Nasturtium officinale* R.Br. - Жеруха лекарственная = Ст,ЛН,СК,П (Палеаркт.); Ab(K); [R.] <Pm>
914. *Rorippa sylvestris*(L.)Bess. - Жерушник лесной = Ст,П,Кисл(Европ.); Ab(K); [R.]
915. *R. anceps*(Wahlenb.)Reichenb. (*R. prostrata*(J.P.Bergeret)Schinz et Thell) - Ж. обоюдоострый = ЛН,П,Кисл(Европ.); Aa(HK); [R.]
916. *R. barbareifolia*(DC.)Kitag. (*R. islandica*(Oed.)Schinz et Thell; *R. palustris*(Leyss.)Bess.) - Ж. сурепколистный = Все р-ны(Голаркт.); Aa(HK); [Pl.]
917. *R. brachycarpa*(C.A.Mey.)Hayek - Ж. короткоплодный = ЛН(Понт.-Южносиб.); Aa,Ab(K); [R.]
918. *R. amphibia*(L.)Bess. - Ж. земноводный = МД,НК(Палеаркт.); Aa,Ab(K); [R.]
919. *R. austriaca*(Crantz)Bess. - Ж. австрийский = Все р-ны(Европ.); Aa,Ab(K); [Sp.]
920. *Draba styralis* J.Gay ex Koch - Крупка столбиковая = П,Кисл(Европ.); ST(HK); [Sp.]
921. *D. sibirica*(Pall.)Thell. - К. сибирская = Ст,П,Кисл(Евро-Сиб.); Pb(HK); [Sp.]
922. *D. nemorosa* L. - К. перелесковая = Все р-ны(Панбор.); Pa(T); [Pl.] <Pm>
923. *D. muralis* L. - К. постенная = СК,П(Европ.); ST(T); [R.]
924. *Erophila verna*(L.)Bess. - Веснянка весенняя = Все р-ны(Палеаркт.); ST,SD(T:eph); [Pl.]
925. *E. krockeri* Andrz. - В. Крокера = Ст[Дорофеев, 1994](Европ.); ST(T:eph); [R.]
926. *Alyssum tortuosum* Waldst.et Kit. - Бурачок извилистый = Ст,ЛН,СК, П,Кисл(Вост.др.средиз.); ST(HK); [Pl.]
927. ★*A. obtusifolium* Stev.ex DC. - Б. туполистный = Ст(Кр.-Новоросс.); Db(HK); [Rs.] <Rx>
928. *A. murale* Waldst.et Kit. - Б. стенной = ЛН,Кисл(Зап.др.средиз.); ST(HK); [Pl.]
929. *A. trichostachium* Rupr. - Б. пушистый = П,Кисл(Кавк.); Pb(T); [Sp.] l.c.
Кисловодск
930. *A. rostratum* Stev. - Б. носатый = Ст(Понтич.); Da(HK:pb); [R.] <Rx>
931. *A. minutum* Schlecht.ex DC. - Б. маленький = КЕ(Субпонт*.); ST(T); [R.] <Rx>
932. *A. desertorum* Stapf - Б. пустынный = Все р-ны(Палеаркт.); ST,SD(T); [Pl.]
933. *A. hirsutum* Bieb. - Б. шершавый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субпонт*.); ST,SD(T); [Sp.]

934. *A. parviflorum* Fisch.ex Bieb. (*A. rothmaleri* Galushko.; *A. campestre* auct.) - Б. мелкоцветковый = П,Кисл(Арmeno-Иран.); ST(T); [Sp.] <Rx>
935. *A. calycinum* L. (*A. alyssoides*(L.)L.) - Б. чашечковый = Все р-ны (Общедр.средиз.); ST(T); [Pl.]
936. *Meniocus linifolius*(Steph.)DC. - Плоскoplодник линейнолистный = Все р-ны(Палеаркт.); SD(T); [Pl.]
937. *Berteroa incana*(L.)DC. - Икотник серый = Все р-ны(Евро-Сиб.); ST,Ra,Rb(HK:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
938. *Euclidium syriacum*(L.)R.Br. - Крепкоплодник сирийский = Все р-ны (Ирано-Туран.); Rb(T); [Pl.]
939. ★ *Litwinowia tenuissima*(Pall.)Woronow ex Pavl. - Литвиновия тончайшая = Прик,ТБ,HK(Туранск.); ST,Rb(T); [Rs.] <Rx>
940. *Neslia paniculata*(L.)Desv. - Неслия метельчатая = Все р-ны(Евро-Сиб.); ST,Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>
941. *Bunias orientalis* L. - Свербига восточная = Все р-ны(Евро-Кавк.); ST,Ra,Rb(HK:pb); [Pl.]
942. ★ *Strigosella africana*(L.)Botsch. (*Malcolmia africana*(L.)R.Br.) - Стригозелла африканская = КН(Кара-Тюбе)[Танфильев, Кононов, 1979] (Общедр. средиз.); Ra,Rb(T); [R.] <Rx>
943. *Hesperis caucasica* Rupr. (*H. matronalis* L.) - Ночная фиалка кавказская = П,Кисл (Евро-Кавк.); S(HK); [Sp.]
944. *H. sibirica* L. - Н.ф. сибирская = Ст(Евро-Сиб.); S(HK); [R.] <Rg>
945. *H. tristis*(L.)G.Beck. - Н. ф. мрачная = КЕ,Ст,СК,П(Понтич.); Pa,ST(HK); [R.]
946. *H. pycnotricha* Borb.et Degen - Н.ф. густоволосистая = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Евро-Сиб.); S(HK:pb); [Pl.]
947. ★ *Goldbachia laevigata*(Bieb.)DC. - Гольдбахия гладковатая = М(Орловка на Куре)(Туранск.); Rb(T); [Rs.] <Rx>
948. *Erysimum cuspidatum*(Bieb.)DC. - Желтушник щитовидный = Все р-ны (Общедр.средиз.); Pa,ST(HK:pb); [R.]
949. *E. aureum* Bieb. - Ж. золотистый = Все р-ны(Кавк.); S,Pa(HK:pb); [Sp.]
950. *E. meyerianum*(Rupr.)N.Busch - Ж. Мейера = Кисл(Эукавк.); SD(HK); [R.] <Esub.>
951. *E. brevistylum* Somm.et Levier - Ж. короткостолбиковый = Кисл(Эукавк.); ST(HK:pb); [R.] <Esub.>
952. *E. leptostylum* DC. - Ж. тонкостолбиковый = КЕ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Понтич.); ST(HK:pb); [R.] l.c. Бештау.
953. *E. substrigosum*(Rupr.)N.Busch - Ж. шершавый = П,Кисл(Эукавк.); Da(HK); [Sp.]
954. *E. repandum* L. - Ж. выгрызенный = Все р-ны(Общедр.средиз.); SD,Ra,Rb(T); [Sp.]

955. *E. leucanthemum*(Steph.)B.Fedtsch. - Ж. бледноцветковый = КЕ,Прик,ТБ,
НК,М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Ирано-Туран); ST(НК:pb); [Sp.]
956. *E. versicolor*(Bieb.)Andrz. - Ж. разноцветный = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,КН
(Палеаркт.); ST(НК); [R.]
957. *E. canescens* Roth (*E. diffusum* Ehrh.) - Ж. раскидистый = КЕ,Прик,ТБ,
Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Вост.др.средиз.); ST(НК:pb); [Sp.] <Pm>
958. *E. ucranicum* J.Gay - Ж. украинский = КЕ[г.Изобильный: Дорофеев, 1991]
(Евро-Кавк.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
959. *Syrenia siliculososa*(Bieb.)Andrz. - Сирения стручковая = МД,АИ,НК,Прик,
ТБ,Ст,СК,П(Субтуран*.); Db(НК:pb); [Pl.] l.c. Прикумские пустыни <Pm>
960. *S. montana*(Pall.)Klok. (*S. sessilifolia*(DC.)Lebed.) - С. горная = КЕ,МД,АИ,
НК,Прик,ТБ,Ст,СК(Понтич.); Db(НК:pb); [R.]
961. ★*Matthiola caspica*(N.Busch)Grossh - Левкой каспийский = Кисл
(Кисловодск) [Иванов,](Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Rx>
962. *Chorispora tenella*(Pall.)DC. - Хориспора нежная = Все р-ны
(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Pl.]
963. ★*Clausia aprica*(Steph.)Korn.-Tr. – Клаузия солнцепёчная = Кисл(г. Кольцо, г.
Медведка) (Понт.-Южносиб); Da(НК); [Rs.] <Rx>

Сем. 77. CAPPARACEAE Juss. - КАПЕРЦЕВЫЕ

964. ★*Capparis herbacea* Willd. (*C. spinosa* L.) - Каперцы травянистые
НК,Прик,Ст,ЛН,СК(Вост.др.средиз.); Dd(Ch:sf); [Sp.] <Pa;Pm;Pmel>

Сем. 78. RESEDACEAE S.F.Gray - РЕЗЕДОВЫЕ

965. *Reseda lutea* L. - Резеда жёлтая = Все р-ны(Зап.др.средиз.); Pa,Rb(НК:pb);
[Pl.] <Pm>

Сем. 79. CRASSULACEAE DC. - ТОЛСТЯНКОВЫЕ

966. *Sempervivum caucasicum* Rupr.ex Boiss. - Молодило кавказское = П,Кисл
(Эукавк.); Da(НК:ps); [Sp.] <Po>
967. *S. pumilum* Bieb. - М. низкое = П,Кисл(Кавк.); Da(НК:ps); [Pl.] <Po>
968. *Hylotelephium caucasicum*(Grossh.)H.Ohba (*Sedum caucasicum* Grossh.) -
Очиточник кавказский = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кавк.); Da(НК:ps); [Pl.] <Pm>
969. *Sedum spurium* Bieb. - Очток ложный = П,Кисл(Эвксин.); Da(НК:ps); [R.]
l.c. Пятигорск
970. *S. oppositifolium* Sims - О. супротиволистный = П,Кисл(Субкавк*.);
Da(НК:ps); [Sp.] <Pm>
971. *S. stoloniferum* S.G.Gmel. - О. побегоносный = П(Субкавк*.); S(НК:ps); [R.]
<Rg>
972. *S. album* L. - О. белый = Кисл(Понт.-Южносиб); Da(НК):ps); [R.]

973. *S. subulatum*(C.A.Mey.)Boiss. - О. шиловидный = Ст,П,Кисл(Субкавк*.); Da(HK:ps); [Sp.]
974. *S. acre* L. - О. едкий = Ст,П,Кисл(Европ.); Da(HK:ps); [Sp.] <Pt;Pm;Po>
975. *S. reflexum* L. - О. отогнутый = Ст,П[Мизирева, 1993](Европ.); Da(HK:ps); [R.] <Po>
976. *S. hispanicum* L. - О. испанский = Все р-ны(Средиземн.); ST,Da,Db(T:ps); [Pl.]
977. *S. pallidum* Bieb. - О. бледный = П(Арmeno-Иран.); ST,Rb(T:ps); [Pl.]
978. ★*Prometeum pilosum*(Bieb.)H.Ohba (*Rosularia pilosa*(Grossh.)Boriss.) - Прометеум (Розулярия) волосистый = П(Бештау)(Эукавк); Da(HK:ps); [Rs.] <Rx>

Сем. 80. SAXIFRAGACEAE Juss. - КАМНЕЛОМКОВЫЕ

979. ★*Saxifraga flagellaris* Willd.ex Sternb. - Камнеломка плетистая = П(Бештау) (Евро-Сиб.); Da(HK); [Rs.] <Rg>
980. *S. tridactylites* L. - К. трёхпалая = Ст,ЛН,П,Кисл(Европ.); Da(T); [Pl.]
981. *S. mollis* Smith - К. мягкая = Кисл(Арmeno-Иран.); Pc(HK); [Sp.]
982. *S. juniperifolia* Adams - К. можжевелолистная = Кисл(Кавк.); Da(HK); [R.]
983. *Chrysosplenium alternifolium* L. - Селезёночник очереднолистный = П,Кисл (Панбор.); S(T); [Pl.] <Pm>

Сем. 81. PARNASSIACEAE S.F.Gray - БЕЛОЗОРОВЫЕ

984. *Parnassia palustris* L. - Белозор болотный = П,Кисл(Голаркт.); Aa(HK); [R.] <Pm>

Сем. 82. GROSSULARIACEAE DC. - КРЫЖОВНИКОВЫЕ

985. *Ribes biebersteinii* Berl.ex DC. - Смородина Биберштейна = Кисл(Кавк.); S(Phn); [R.] <Pa>
986. *R. alpinum* L. - С. альпийская = П,Кисл(Европ.); S(Phn); [R.] <Pa>
987. *Grossularia reclinata*(L.)Mill. - Крыжовник отклонённый = П,Кисл(Европ.); S(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>

Сем. 83. ROSACEAE Juss. - РОЗОВЫЕ

988. *Spiraea crenata* L. - Спирея(Таволга) городчатая = Ст,ЛН,П,Кисл(Понт.-Южносиб.); Pa,ST(Phn); [Sp.] <Pmel>
989. *Aruncus vulgaris* Rafin. - Волжанка обыкновенная = П,Кисл(Европ.); S(HK); [Sp.] <Po>
990. *Cotoneaster melanocarpus* Fisch.ex Blytt - Кизильник черноплодный = П,Кисл (Палеаркт.); Da(Phn); [Sp.]

991. ★ *C. integerrimus* Medik. - К. цельнокрайний = Ст(Европ.); Pa, ST(Phn); [Rs.] <Rg>
992. ★ *C. nefedovii* Galushko - К. Нефёдова = П(Предкавк.); Pa(Phn); [Rs.] <Es>(рис.5)
993. *C. meyeri* Pojark. - К. Мейера = Ст, П, Кисл(Кавк.); Pa, ST(Phn); [R.]
994. *Pyrus caucasica* Fed. - Груша кавказская = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Кавк.); S(Phms); [Pl.] <Pa; Pmel>
995. *Malus orientalis* Uglitzk. - Яблоня восточная = Все р-ны(Субкав*.*); S(Phms); [Pl.] <Pa; Pm>
996. *Sorbus aucuparia* L. - Рябина обыкновенная = П, Кисл(Европ.); S(Phms); [Pl.] <Pm; Pa>
997. *S. caucasica* Zinserl. - Р. кавказская = П, Кисл(Кавк.); Pa, S(Phm); [Sp.] 1.с. Бештау
998. *S. graeca*(Spach)Lodd.ex Schauer. - Р. греческая = П(Машук), Кисл (Даргинские высоты)(Евро-Кавк.); S(Phm); [R.] <Rg>
999. ★ *S. terminalis*(L.)Crantz - Р. глоговина = П, Кисл(Европ.); S(Phms); [Sp.] <Rg; Rt>
1000. *Amelanchier ovalis* Medik. (*A. rotundifolia*(Lam.)Dum.-Cours. nom. illegit.) - Ирга овальная = П, Кисл(Средиземн.); Da(Phn); [Sp.] <Pa>
1001. *Mespilus germanica* L. - Мушмула германская = М(Терек), П(Общедр. средиз.); S(Phm); [R.] <Pm>
1002. *Crataegus pentagyna* Waldst. et Kit. - Боярышник пятилистичный = Все р-ны (Зап.др. средиз.); Pa, ST(Phm); [Pl.] <Pm; Pa; Pmel>
1003. *C. curvisepala* Lindm. (*C. kyrtostyla* auct.) - Б. согнуточашелистниковый = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Европ.); S(Phm); [Sp.] <Pm; Pa; Pmel>
1004. *C. pallasii* Griseb. - Б. Палласа = КН(Понтич.); Db(Phm); [Sp.] <Pmel>
1005. *C. monogyna* Jacq. - Б. однопестичный = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Европ.); S(Phm); [Sp.] <Pm; Pa; Pmel>
1006. *C. microphylla* C.Koch - Б. мелколистный = П(Субкав*.*); S(Phn); [R.] <Pmel>
1007. *C. ambigua* C.A.Mey.ex A.Beck. - Б. сомнительный = М, КН(Понтич.); Db(Phm); [Sp.] <Pmel>
1008. *Rubus saxatilis* L. - Костяника обыкновенная = П, Кисл(Панбор.); Pb(НК); [Sp.] <Pa; Pmel>
1009. *R. buschii* Grossh.ex Sinjakova - Малина Буша = Ст, П, Кисл(Кавк.); S(Ch); [Sp.] <Pm; Pa; Pmel>
1010. *R. candicans* Weihe - Ежевика беловатая = [Прик(г.Брык): Тан菲尔ев, Кононов, 1987](Европ.); S(Phn); [R.] <Pa; Pmel>
1011. *R. canescens* DC. (*R. tomentosus* Borkh. nom. illegit.) - Е. седоватая = П (Зап.др. средиз.); S(Phn); [R.] <Pa; Pmel>

1012. *R. caucasicus* Focke - Е. кавказская = П,Кисл(Эвксин.); S(Phn); [R.] <Pa;Pmel>
1013. *R. caesius* L. - Е. сизая = Все р-ны(Палеаркт.); S,Pa(Phn); [Pl.] <Pa;Pm;Pmel>
1014. *Fragaria viridis*(Duch.)Weston - Земляника зелёная = Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa(HK); [Pl.] <Pm;Pa>
1015. *F. vesca* L. - З. лесная = Все р-ны(Голаркт.); Pa(HK); [Pl.] <Pm;Pa>
1016. *F. moschata*(Duch)Weston - З. мускусная = Ст,ЛН,СК,П(Европ.); S(HK); [R.] <Pm;Pa>
1017. *Pentaphylloides fruticosa*(L.)O.Schwarz (*Dasiphora fruticosa*(L.) Rydb.) - Курильский чай кустарниковый = П,Кисл(Панбор.); Pb(Ch); [R.] <Pa>
1018. *Potentilla argentea* L. - Лапчатка серебристая = Все р-ны(Евро-Сиб.); ST(HK); [Pl.] <Pm>
1019. *P. canescens* Bess. (*P. inclinata* auct.) - Л. седая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(HK); [Sp.]
1020. *P. recta* L. - Л. прямая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(HK); [Pl.]
1021. *P. obscura* Willd. - Л. неясная = Все р-ны(Субкавк*); Pa,ST(HK); [Sp.]
1022. *P. astrachanica* Jacq. - Л. астраханская = КЕ,[Прик,ТБ,Ст,: Танфильев, Кононов, 1987](Понтич.); Da,Db(HK); [Sp.]
1023. *P. supina* L. - Л. низкая = Все р-ны(Голаркт.); Aa(T); [Pl.]
1024. *P. caucasica* Juz. - Л. кавказская = КЕ,Прик,ТБ,Ст,СК,П(Кавк.); Pa,ST(HK); [Sp.]
1025. *P. adscharica* Somm.et Levier - Л. аджарская = Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Субкавк*); Pa,ST(HK); [Sp.]
1026. *P. humifusa* Willd.ex Schlecht. - Л. распростёртая = Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Sp.]
1027. *P. adenophylla* Boiss.et Hohen. - Л. железистая = Ст,ЛН,Кисл(Субкавк*); ST(HK); [Sp.]
1028. *P. arenaria* Borkh. (*P. glaucescens* Schlecht.) - Л. песчаная = Ст,СК,П, Кисл(Понт.-Южносиб.); ST,Da(HK); [Sp.]
1029. *P. erecta*(L.)Raeusch. - Л. прямостоящая = Кисл(Европ.); Pb(HK); [Sp.]
1030. *P. reptans* L. - Л. ползучая = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(HK); [Pl.] <Pm;Pp>
1031. *P. anserina* L. - Л. гусиная лапка = П,Кисл(Плюрирег.); Aa(HK); [R.] <Pm;Pmel>
1032. *Geum urbanum* L. - Гравилат городской = Все р-ны(Палеаркт.); S,Rb(HK); [Pl.] <Pm;Pa>
1033. *G. allepicum* Jacq. (*G. strictum* Ait.) - Г. аллепский = Ст,ЛН,П,Кисл (Голаркт.); S(HK); [R.]
1034. *G. rivale* L. - Г. речной - Кисл(Голаркт.); Aa(HK); [Sp.]

1035. ★*Dryas caucasica* Juz. (*D. octopetala* L. *subsp. caucasica*(Juz.)*Hult.*) =
Куропаточья трава кавказская = Кисл(г. Кабан) [Михеев, 1976] (Эукавк);
Pc(Ch:hv); [R.]
1036. *Filipendula vulgaris* Moench (*F. hexapetala* Gilib.) - Лабазник обыкновенный
= Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa,ST(HK); [Pl.] <Pm;Pmel>
1037. *F. ulmaria*(L.)Maxim. - Л. вязолистный = П,Кисл(Евро-Сиб.); Aa(HK); [Pl.]
<Pm;Pmel>
1038. *Alchemilla sericata* Reichenb.ex Bus. - Манжетка шелковистая = П,Кисл
(Кавк.); Pc(HK); [Pl.]
1039. *A. rigida* Bus. - М. жёсткая = П(Бештау),Кисл(Кавк.); Pc(HK); [Pl.]
1040. *A. caucasica* Bus. - М. кавказская = П,Кисл(Кавк.); Pc(HK); [Pl.] <Pp>
1041. *A. languida* Bus. - М. вялая = П,Кисл(Эукавк.); Pc(HK); [Sp.] l.c. Кисловодск
1042. *A. divaricans* Bus. - М. растопыривающаяся = Кисл(Эукавк.); Pc(HK); [R.]
<Esub.> l.c. Кисловодск
1043. *A. tephroserica*(Bus.)Juz. - М. пепельно-шелковистая = Кисл(Эукавк.);
Pc(HK); [Sp.] <Esub>
1044. *A. microdonta* Juz. - М. мелкозубчатая = Кисл(Эукавк.); Pc(HK); [Sp.]
1045. *Agrimonia eupatoria* L. - Репейничек аптечный = Все р-ны(Евро-Кавк.);
Pa,ST(HK); [Pl.] <Pm>
1046. *Sanguisorba officinalis* L. - Кровохлёбка аптечная = П,Кисл(Голаркт.);
Pb(HK); [Sp.] <Pm;Pp>
1047. *Poterium polygamum* Waldst.et Kit. - Черноголовник многобрачный = Все р-ны
(Общедр.средиз.); Pa,ST(HK); [Pl.]
1048. ★*Rosa gallica* L. - Шиповник французский = П(Европ.); S(Ch:fl); [R.]
<Rg;Pmel>
1049. *R. pimpinellifolia* L. (*R. spinosissima* L.) - Ш. бедренецелистный = Все р-ны
(Палеаркт.); ST(Phn); [Pl.] <Pmel>
1050. *R. elasmocantha* Trautv. - Ш. плоскошипый = СК,П,Кисл(Эукавк.); ST(Phn);
[R.] <Pmel>
1051. *R. canina* L. - Ш. собачий = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(Phn); [Pl.]
<Pm;Pmel>
1052. ★*R. caesia* Smith (*R. coriifolia* Fries.) - Ш. сизый = Ст(Ставрополь)
[Танфильев, Кононов, 1987](Европ.); ST(Phn); [R.] <Pm;Pmel>
1053. ★*R. dolichocarpa* Galushko - Ш. удлинённоплодный = П(г.Развалка)
(Предкавк.); Da(Phn); [Rs.] <Es> l.c. Железноводск (рис. 6)
1054. *R. corymbifera* Borkh. - Ш. щитконосный = Все р-ны(Палеаркт.);
Pa,ST(Phn); [Pl.] <Pmel>
1055. *R. balsamina* Bess. (*R. klukii* Bess.) - Ш. Клюка = Все р-ны(Евро-Кавк.);
ST(Phn); [Sp.] <Pmel>

1056. *R. marschalliana* Sosn. - Ш. Маршалла = Все р-ны(Эукавк.); Pa,ST(Phn); [R.] <Pmel>
1057. *R. iberica* Stev.ex Bieb. - Ш. грузинский = Ст,СК,П,Кисл(Субкавк*.); ST(Phn); [Sp.] <Pmel>
1058. *R. pulverulenta* Bieb. (*R. glutinosa* auct.) - Ш. припудренный = П,Кисл (Зап.др.средиз.); ST(Phn); [Sp.] <Pmel> l.c. Кисловодск
1059. *R. tomentosa* Smith (*R. cuspidata* Bieb.) - Ш. войлочный = П,Кисл (Европ.); S(Phn); [Sp.] <Pmel>
1060. *R. mollis* Smith - Ш. мягкий = Ст,СК,Кисл(Евро-Кавк.); S(Phn); [R.] <Pmel>
1061. ★*R. praetermissa* Galushko - Ш. пропущенный = Кисл(Эукавк.); Pa,ST(Phn); <Esub>
1062. *R. boissieri* Crep. - Ш. Буасье = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субкавк*.); S(Phn); [Sp.] <Pmel>
1063. *R. jundzillii* Bess. - Ш. Юндзилла = КЕ,Ст,ЛН,СК,П(Европ.); ST(Phn); [R.] <Pmel>
1064. *Prunus spinosa* L. - Слива колючая = Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa,ST(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>
1065. *P. divaricata* Ledeb. - С. растопыренная(Алыча) = Все р-ны (Общедр.средиз.); S(Phm); [Pl.] <Pa;Pm>
1066. *Amygdalus nana* L. - Миндаль низкий = Все р-ны(Понтич.); ST(Ch); [Sp.]
1067. *Cerasus avium*(L.)Moench - Вишня птичья(Черешня) = Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Европ.); S(Phms); [Pl.] <Pa;Pmel>
1068. ★С. fruticosa Pall. - В. кустарниковая = Ст,СК(Понт.-Южносиб.); ST(Phn); [R.] <Po>
1069. ★С. incana(Pall.)Spach - В. серая = П(Арmeno-Иран.); ST(Phn); [R.] <Rx>
1070. *Armeniaca vulgaris* Lam. - Абрикос обыкновенный = Все р-ны(Адвент. [Средняя Азия, Китай]; S(Phms); [Pl.] <Pa,Pmel,Pm>

Сем. 84. CAESALPINIACEAE R.Br. - ЦЕЗАЛЬПИНИЕВЫЕ

1071. *Gleditsia triacanthos* L. - Гледичия трёхколючковая = Все р-ны(Адвент. [Сев.Америка]; S(Phms); [Sp.] <Po>

Сем. 85. FABACEAE Lindl. - БОБОВЫЕ

1072. *Amorpha fruticosa* L. - Аморфа кустарниковая = Все р-ны(Адвент.[Сев. Америка]; ST(Phm); [Sp.] <Po,Pm>
1073. *Robinia pseudoacacia* L. - Белая акация обыкновенная = Все р-ны(Адвент. [Сев. Америка]; S,ST(Phms); <Po>
1074. *Pseudosophora alopecuroides*(L.)Sweet (*Sophora alopecuroides* L.) - Псевдософора лисохвостная = М,КН(Вост.др.средиз.); Db(HK); [Sp.] <Pt>

1075. ★ *Argyrolobium biebersteinii* P.W.Ball (*A. calycinum*(Bieb.)Jaub.*et Spach*, nom. superfl.) - Аргиролобиум Биберштейна = СК, П, Кисл(Арmeno-Иран.); Pa(Ch:sf); [R.] <Rg>
1076. *Genista compacta* Schischk. (*G. albida* Willd.) - Дрок плотный = П, Кисл (Эукавк.); Da(Ch); [R.] <Po>
1077. ★ *G. angustifolia* Schischk. - Д. узколистный = П[Дубовик, 1990], Кисл (Предкавк.); Da(Ch:fl); [R.] <Esub>
1078. *G. patula* Bieb. - Д. отклонённый = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Кавк.); Pa(Ch); [Sp.] <Po>
1079. ★ *Cytisus austriacus* L. (*Chamaecytisus austriacus*(L.)Link) - Ракитник австрийский = Ст, СК(Георгиевск)(Понтич.); ST(Ch); [R.] <Po; Rg>
1080. *Chamaecytisus borystenicus*(Grun)Klaskova (*Cytisus borystenicus* Grun) - Ракитничек днепровский = КЕ, Ст(Понт.-Южносиб.); Db(Ch); [R.] <Po> <Rx>
1081. *Ch. lindemannii*(V.Krecz.)Klaskova (*C. lindemannii* V.Krecz.) - П. Линдеманна = Ст, СК, П, Кисл(Понтич.); Pa(Ch); [R.] <Po>
1082. *Ch. ruthenicus*(Fisch.ex Woloscz.)Klaskova (*Ch. caucasicus* (Grossh.) Holub) - Р. русский = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Понт.-Южносиб.); Pa(Ch); [Sp.] <Po>
1083. ★ *Ch. wolffii*(V.Krecz.)Klaskova (*C. wolffii* V.Krecz.) - П. Вульфа = Кисл (Понтич.); Da(Ch); [Rs.] <Rx>
1084. ★ *Ononis pusilla* L. - Стальник маленький = П, Кисл[Танфильев, Кононов, 1987](Средиз.); Pa(Ch:sf); [Rs.] <Rx>
1085. *O. arvensis* L. - С. пашенный = Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa(HK); [Pl.] <Pm; Pmel>
1086. *Trigonella orthoceras* Kar. et Kir. - Пажитник пряморогий = МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М, СК, КН(Вост.др.средиз.); ST(T); [Sp.]
1087. *T. monspeliaca* L. - П. монспельевский = М, Ст, КН(Субпонт*); SD, Rb(T); [R.]
1088. *T. procumbens*(Bess.)Reichenb. - П. простёртый = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, Ст, СК, КН(Палеаркт.); ST(T); [Sp.]
1089. *T. coerulescens*(Bieb.)Halacsy - П. голубоватый = Прик, ТБ, НК, М, КН (Зап.др.средиз.); SD(T); [R.] <Rx> л. с. Ачикулак
1090. *Medicago lupulina* L. - Люцерна хмелевидная = Все р-ны(Палеаркт.); Pa, Rb(HK); [Pl.] <Pp>
1091. ★★ *M. cancellata* Bieb. - Л. решётчатая = Прик, Ст(Понтич.); Db(HK); [R.] <Rx; Pp>
1092. *M. falcata* L. - Л. серповидная = Все р-ны(Палеаркт.); ST(HK); [Pl.] <Pp; Pmel>
1093. *M. romanica* Prod. - Л. румынская = КЕ, ЛН, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); ST(HK); [R.] <Pp>

1094. *M. sativa* L. - Л. посевная = Все р-ны(Голаркт.); Pa,ST(HK); [Sp.] <Pp;Pm;Pmel>
1095. *M. vardanis* Vass. - Л. варданикская = Кисл(Эукавк.); ST(HK); [R.] l.c.
Кисловодск
1096. *M. caerulea* Less.ex Ledeb. - Л. голубая = Все р-ны(Туранск.); ST,Db(HK); [Pl.] <Pp>
1097. *M. glutinosa* Bieb. - Л. клейкая = П,Кисл(Эукавк.); Pa,ST(HK); [R.] <Pp>
1098. *M. orbicularis*(L.)Bartalini - Л. округлая = Ст,СК,П(Зап.др.средиз.); ST,Rb(HK); [Sp.] <Pp>
1099. *M. rigidula*(L.)All. (*M. agrestis* Ten.)- Л. жестковатая = СК(Георгиевск и Новомарьевская)(Общедр.средиз.); ST,Rb(T); [R.]
1100. *M. minima*(L.)Bartalini - Л. мелкая = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST,Rb(T); [Pl.]
1101. *Melilotus polonicus*(L.)Pall. (*M. caspius* Grun.) - Донник каспийский = М,КН (Субтуран*); Db(HK); [Pl.] <Pp>
1102. *M. dentatus*(Waldst.et Kit)Pers. - Д. зубчатый = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(HK); [Sp.] <Pp>
1103. *M. albus* Medik. - Д. белый = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(HK); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
1104. *M. wolgicus* Poir. - Д. волжский = П,КН(Понт.-Южносиб.); Rb(T); [Rs.] <Pp> <Rx>
1105. *M. officinalis*(L.)Pall. - Д. лекарственный = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(HK); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
1106. *Amoria montana*(L.)Sojak (*Trifolium montanum* L.) - Амория (Клевер) горная = КЕ, Прик,ТБ,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(Евро-Сиб.); Pa(HK); [Pl.] <Pp>
1107. *A. ambigua*(Bieb.)Sojak (*T. ambiguum* Bieb.) - А. (К.) непостоянная = Все р-ны (Субпонт*); Pa(HK); [Pl.] <Pp>
1108. *A. repens*(L.)C.Presl (*T. repens* L.) - А. (К.) ползучая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(HK); [Pl.] <Pp;Pmel;Pm>
1109. *A. hybrida*(L.)C.Presl (*T. hybridum* L.) - А. (К.)гибридная = Ст,П,Кисл (Европ.); Pa(HK); [Sp.] <Pp;Pm>
1110. *A. angulata*(Waldst.et Kit.)C.Presl (*T. angulatum* Waldst.et Kit.) - А.(К.) угловатая = Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa(T); [R.] <Pp>
1111. *A. retusa*(L.)Dostal (*T. retusum* L.; *T. parviflorum* Ehrh.) - А.(К.) притупленная = Ст,СК,П,Кисл(Субсредиз*); Pa,Aa(T); [Sp.]
1112. *A. vesiculosa*(Savi)Roskov (*T. vesiculosum* Savi) - А.(К.) пузырчатая = КЕ,Ст, ЛН,СК(Субсредиз*); ST(T); [R.]
1113. *A. fragifera*(L.)Roskov (*T. fragiferum* L.) - А.(К.) земляничная = КЕ,Прик,ТБ, НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Aa(HK); [R.] <Pp>

1114. *A. bonannii*(C.Presl)Roskov (*T. bonnanii* C.Presl; *T. neglectum* C.A.Mey.) - А.(К.) Бонанна = Все р-ны(Общедр.средиз.); Aa(HK); [Sp.] <Pp>
1115. *A. tumens*(Stev.ex Bieb.)Roskov (*T. tumens* Stev.ex Bieb.) - А.(К.) вздутая = Ст, СК(Субкавк*.); Pa(HK); [R.] <Rg>
1116. *Chrisaspis spadicea*(L.)Greene (*Trifolium spadiceum* L.) - Хризаспис (Клевер) тёмно-каштановый = П,Кисл(Европ.); Pb,Pc(T); [Pl.]
1117. *Ch. aurea*(Poll.)Greene (*T. aureum* Poll.; *T. strepens* Crantz) - X.(К.) золотисто-жёлтый = Ст,П,Кисл(Евро-Сиб.); Pa(T); [Sp.]
1118. *Ch. campestris*(Schreb.)Desv. (*T. campestre* Schreb.) - X.(К.) полевой = Все р-ны (Палеаркт.); Pa(T); [Pl.]
1119. *Trifolium caucasicum* Tausch - Клевер кавказский = Ст,ЛН,П,Кисл(Субкавк*.); S,Pb(HK); [Sp.]
1120. *T. echinatum* Bieb. - К. иглистый = Ст,ЛН,П,Кисл(Средиземн.); Db(T); [R.]
1121. ★*T. angustifolium* L. - К. узколистный = П(Машук)[Танфильев, Кононов, 1987](Средиземн.); Pa(T); [Rs.] <Rg>
1122. *T. phleoides* Pourr. - К. батлачковый = П,Кисл(Средиземн.); Pb(T); [R.]
1123. *T. striatum* L. - К. ребристый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субсредиз*.); Pa(T); [R.]
1124. *T. medium* L. - К. средний = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Pa,Pb(HK); [Sp.] <Pm;Pp>
1125. *T. alpestre* L. - К. предальпийский = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Евро-Кавк.); Pa,Pb(HK); [Pl.] <Pp>
1126. *T. pratense* L. - К. луговой = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(HK); [Pl.] <Pp;Pm>
1127. *T. diffusum* Ehrh. - К. раскидистый = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Европ.); Pa(T); [Sp.]
1128. *T. apertum* Bobr. - К. открытый = КЕ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кавк.); Db(T); [Sp.] л.с. Майкоп
1129. *T. arvense* L. - К. пашенный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(T); [Sp.]
1130. *Anthyllis macrocephala* Wend. (*A. polypylla*(DC.)Kit.ex Loud.)- Язвенник крупноголовый = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); ST(HK); [Pl.] <Pm>
1131. *A. lachnophora* Juz.(*A. boissieri*(Sagor.)Grossh.) - Я. шерстеносный = Ст,П, Кисл[Гроссгейм, 1952](Кавк.); ST(HK); [Pl.]
1132. *Lotus angustissimus* L. - Лядвенец узкий = КН(Ачикулак)(Субсредиз*.); Db(T); [R.] <Rx>
1133. *L. corniculatus* L. - Л. рогатый = КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Ст,СК (Палеаркт.);ST(HK); [Sp.] <Pm;Pp>
1134. *L. tenuis* Waldst.et Kit. - Л. тонкий = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,Ст,П (Субсредиз*.); Aa(HK); [Sp.] <Pm;Pp>
1135. *L. caucasicus* Kuprian.ex Juz. - Л. кавказский = Все р-ны(Кавк.); Pa(HK); [Pl.] <Pp>

1136. *Galega officinalis* L. - Козлятник лекарственный = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субредиз*.); Аа(НК); [Sp.] <Pm>
1137. *G. orientalis* Lam. - К. восточный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кавк.); S(НК); [Pl.] <Pp>
1138. ★★ *Eremosparton aphyllum*(Pall.)Fisch. et C.A.Mey. - Эремоспартон безлистный = М,КН(Туранск.); Db(Ch); [Rs.] <Rx>
1139. *Caragana frutex*(L.)C.Koch - Карагана кустарник = Кисл(Кисловодск) (Понт.-Южносиб.); ST(Ch); [Rs.] <Rx;Pmel;Po>
1140. ★*C. mollis*(Bieb.)Bess. - К. мягкая = Прик,ТБ,Ст,СК,П(Понтич.); ST(Ch); [Sp.] <Rx;Pmel;Po>
1141. ★*C. grandiflora*(Bieb.)DC. - К. крупноцветковая = Кисл(Туран.)[авт.]; Da(Ch); [R.] <Rx>
1142. *C. arborescens* Lam. - К. древовидная = Все р-ны(Адвент.[Сибирь, Средняя Азия]; S,ST(Phm); <Po>
1143. ★★ *Calophaca wolgarica*(L.fil.)DC. - Майкараган волжский = [КЕ: Немирова, Данилевич, 1991],Ст(Понтич.); ST(Ch); [Rs.] <Rx>
1144. ★ *Astracantha aurea*(Willd.)Podlech (*Astragalus aureus* Willd.) - Астраканта золотистая = П[Г.Бештау: Галушко, 1989](Субкавк*.);Da(Ch:fl); [Rs.] <Rx>
1145. ★ *Astragalus contortuplicatus* L. - Астрагал свёрнутый = МД,НК,Кисл,КН (Понтич.); Aa(T); [R.]
1146. ★*A. striatellus* Pall.ex Bieb. - А. полосатый = МД(Большая Джалга)(Ирано-Туран.); Dd(T); [Rs.]
1147. *A. ucrainicus* M.Pop.et Klok. - А. украинский = КЕ(с.Подлужное)[Дубовик, Дзыбов, 1990](Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
1148. *A. cicer* L. - А. нутовый = Все р-ны(Европ.); Аа(НК); [Pl.] <Pp>
1149. *A. danicus* Retz. - А. датский = П,Кисл(Евро-Сиб.); Pb(НК); [Sp.]
1150. ★*A. albicaulis* DC. - А. белостебельный = Прик(г.Брык)(Понтич.); Db(Ch); [Rs.] <Rx>
1151. *A. brachytropis*(Stev.)C.A.Mey. - А. коротколодочковый = П(Эукавк.); Pc(НК); [Rs.] <Rg>
1152. *A. glycyphyllos* L. - А. сладколистный = Все р-ны(Европ.); S(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
1153. *A. glycyphylloides* DC. - А. ложносладколистный = П(Субкавк*.); S(НК); [R.] <Pp>
1154. ★*A. galeiformis* L. - А. козлятниковый = Ст,П,Кисл(Кавк.); Pa,ST(НК); [Sp.]
1155. ★*A. dasyanthus* Pall. - А. шерстистоцветковый = СК,П(Кума)(Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx;Pm>
1156. ★*A. longipetalus* Chater (*A. longiflorus* Pall. nom. illegit. superfl.) - А. длинноцветковый = М,[Ст: Сытин, 1991],П,КН(Туранск.); Db(Ch); [Sp.]

1157. ★*A. ponticus* Pall. - А. понтийский = КЕ(Субсредиз*); ST(НК); [Rs.] <Rx>
1158. ★*A. lehmannianus* Bunge - А. Леманна = М[Белоус, 1990], КН(Турansk.); Db(Ch); [Rs.] <Rx>
1159. *A. falcatus* Lam. - А. серповидный = Ст,ЛН,П,Кисл(Евро-Кавк.); Pb(НК); [Sp.] <Pp>
1160. *A. asper* Jacq. - А. шершавый = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Понтич.); ST(НК); [R.]
1161. *A. austriacus* Jacq. - А. австрийский = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
1162. ★*A. captiosus* Boriss. (*A. interpositus* Boriss.) - А. обманчивый = Ст, СК, П, Кисл(Эукавк.); ST(НК); [Sp.]
1163. ★*A. onobrychioides* Bieb. - А. эспарцетовидный = П[г. Юца: Сытин, 1986](Кавк.); Da(НК); [Rs.]
1164. ★*A. bungeanus* Boiss. - А. Бунге = Ст, СК, П, Кисл(Субкавк*); ST(НК); [Sp.] <Pp> l.c. Пятигорск
1165. *A. onobrychis* L. - А. эспарцетный = Все р-ны(Европ.); ST, Db(НК); [Pl.] <Pp>
1166. ★*A. lasioglottis* Stev.ex Bieb. - А. волосистый = СК, П, Кисл(Предкав.); Pa, Da(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск <Esub>
1167. *A. reduncus* Pall. - А. изогнутый = СК, П, Кисл(Понтич.); ST(НК); [R.]
1168. ★*A. lasiophyllum* Ledeb. - А. мохнатолистный = МД(Манычское, Белые Копани, Арзгир) [Белоус, 1997] (Туранс.); ST, Dd (НК); [Rs.] <Rx>
1169. *A. dolichophyllus* Pall. - А. длиннолистный = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, Ст, СК(Понтич.); ST(НК); [Sp.]
1170. *A. testiculatus* Pall. - А. яичкоплодный = МД, НК(Субтуран*); SD(НК); [R.] <Rx>
1171. *A. demetrii* Charadze - А. Дмитрия = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Предкав.); Da(НК); [Sp.] <Esub>l.c. Кисловодск
1172. ★*A. brachycarpus* Bieb. - А. короткоплодный = П, Кисл(Субкавк*); ST(НК); [R.] l.c. Бештау
1173. ★*A. brachylobus* Fisch. - А. коротколопастный = М, КН(Понт.-Южносиб.); Db(Phn); [Sp.] <Rx>
1174. *A. varius* S.G.Gmel. (*A. virgatus* Pall.) - А. разнообразный = М, СК, П, КН(Понт.-Южносиб.); Db(Ch); [R.] <Rx>
1175. ★*A. cornutus* Pall. - А. рогоплодный = М, КН(Терские пески)(Субтуран*); ST, SD(Ch); [R.] <Rx>
1176. *A. subuliformis* DC. (*A. subulatus* Pall.) - А. шилоподобный = СК, П, Кисл(Понт.-Южносиб.); Da(НК); [R.]
1177. ★*A. pseudotataricus* Boriss. - А. ложнотатарский = Прик, ТБ, Ст, СК(Понтич.); ST, Db(НК); [R.] <Rx> l.c. Ставрополь

1178. ★ *A. haesitabundus* Lipsky - Ф. ненадёжный = Кисл(Эукавк.); Da(HK); [Rs.] <Rx>
1179. ★★ *A. karakugensis* Bunge - А. каракугинский = М,КН[Белоус, 1990] (Туранск.); Db(Ch:sf); [Rs.] <Rx>
1180. ★ *A. calycinus* Bieb. - А. чашечный = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК (Кавк.); ST(HK); [R.] l.c. Маджар на Куме
1181. ★ *A. hennigii*(Stev.)Klok. - А. Хеннига = МД[Дубовик, Дзыбов, 1990] (Понтич.); ST(HK); [Rs.]
1182. *Oxytropis owerinii* Bunge - Остролодочник Оверина = ЛН,П,Кисл (Эукавк.); Pc(HK); [Pl.]
1183. *O. pilosa*(L.)DC. - О. волосистый = Все р-ны(Евро-Сиб.); ST(HK); [Pl.]
1184. *O. cyanea* Bieb. - О. синий = Кисл(Кавк.); Da(HK); [Pl.]
1185. *Glycyrrhiza glabra* L. - Солодка голая = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST(HK); [Pl.] <Pm;Pp>
1186. *G. aspera* Pall. - С. шершавая = Ст,СК,П(Туранск.); ST,SD(HK); [R.]
1187. *G. echinata* L. - С. щетинистая = Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК(Зап.др.средиз.); Aa(HK); [Sp.]
1188. *G. foetidissima* Tausch (*G. macedonica* Boiss.*et Orph.*) - С. зловонная = М,КН(Зап.др.средиз.); Aa(HK); [Sp.]
1189. *Coronilla coronata* L. - Вязель корончатый = П,Кисл(Евро-Кавк.); ST,Da(HK); [Sp.]
1190. *Securigera varia*(L.)Lassen (*Coronilla varia* L.) - Секуригера (Вязель) пёсткая = Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa(HK); [Pl.] <Pm>
1191. *Hedysarum sericeum* Bieb. - Копеечник шелковистый = Кисл(Эукавк.); Da(HK);]Rs.] <Rx>
1192. ★ *H. biebersteinii* Zertova (*H. argenteum* Bieb.) - К. Биберштейна = Ст,СК, П,Кисл(Предкавк.); Da(HK); [Sp.] <Esub>
1193. ★ *H. tauricum* Pall.ex Willd. - К. крымский = П(г.Кинжал)(Кр.-Новоросс.); Da(HK); [Rs.] <Rx>
1194. *Xanthobrychis vassilczenkoi* (Grossh.)Galushko (*Onobrychis vassilczenkoi* Grossh.) - Ксантобрихис Васильченко = Ст,СК,П,Кисл(Предкавк.); Da(HK); [Pl.] <Esub> l.c. Пятигорск
1195. ★ *X. majorovii*(Gross.)Galushko (*O. majorovii* Grossh.) - К. Майорова = НК(Зеленокумск)[гербарий БИН, сборы Новопокровского 1906 года] (Предкавк.); Db,ST(HK); [Rs.] <Rx>
1196. *Onobrychis petraea*(Bieb.ex Willd.)Fisch. - Эспарцет каменный = П,Кисл (Кавк.); Da(HK); [Sp.] <Pmel>
1197. *O. ruprechtii* Grossh. - Э. Рупрехта = П(Кавк.); Pc(HK); [Sp.] <Pp;Pmel>
1198. *O. biebersteinii* Sirj. - Э. Биберштейна = Кисл(Кавк.); Pc(HK); [Sp.]

1199. ★*O. hamata* Vass. - Э. крючковатый = Кисл(Эукавк.); Рс(НК); [R.] <Esub>
1.с. Кисловодск
1200. *O. cyri* Grossh. - Э. куриный = Все р-ны(Кавк.); ST(НК); [Pl.] <Pp;Pmel>
1201. *O. dielsii*(Sirj.)Vass. - Э. Дильтя = Ст,СК(Предкавк.); ST(НК); [R.] <Pp;Pmel>
<Esub> 1.с. Беслан
1202. *O. novopokrovskii* Vass. - Э. Новопокровского = М,КН(Предкавк.);
Db,Dd(НК); [Sp.] <Pmel> <Esub>
1203. *O. inermis* Stev. - Э. невооружённый = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл
(Предкавк.); Pa(НК); [Sp.] <Esub> 1.с. Пятигорск
1204. *O. tanaitica* Spreng. - Э. донской = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,(Субтуран*.);
ST(НК); [R.] <Pmel>
1205. *Alchagi pseudoalchagi*(Bieb.)Fisch. - Верблюжья колючка обыкновенная =
МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,СК(Ирано-Туран.); SD(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1206. *Vicia sepium* L. - Горошек заборный = Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.]
<Pmel;Pp>
1207. *V. abbreviata* Fisch.ex Spreng. (*V. truncatula* Fisch.ex Bieb.) - Г. обрубленный
= П,Кисл(Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]
1208. *V. ciliatula* Lipsky - Г. реснитчатый = КЕ,ЛН,П,Кисл(Кавк.); S(T); [Sp.] 1.с.
Армавир
1209. *V. pannonica* Crantz - Г. венгерский = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл
(Зап.др.средиз.); Pa,Rb(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
1210. *V. hybrida* L. - Г. гибридный = Ст,ЛН(Субсредиз*.); Ra,Rb(T); [Rs.]
1211. *V. lutea* L. - Г. жёлтый = Ст(Ставрополь)[Колмаков, 1928](Субсредиз*.);
S(T); [R.] <Rg>
1212. *V. grandiflora* Scop. - Г. крупноцветковый = Все р-ны(Субсредиз*.); Pa(T);
[Sp.] <Pmel>
1213. *V. sativa* L. - Г. посевной = Все р-ны(Европ.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
1214. *V. angustifolia* Reichard - Г. узколистный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Палеаркт.);
Ra,Rb(T); [Pl.] <Pmel;Pp>
1215. *V. cassubica* L. - Г. кашубский = П,Кисл(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
1216. *V. pisiformis* L. - Г. гороховидный = П(Железноводск)(Европ.); S,Pa(НК);
[Rs.] <Rg>
1217. *V. cracca* L. - Г. мышиный = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,П
(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
1218. *V. tenuifolia* Roth - Г. тонколистный = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,
Кисл(Палеаркт.); Pa(НК); [R.] <Pmel;Pp>
1219. *V. biennis* L. (*V. picta* Fisch. et C.A.Mey.) - Г. разукрашенный = НК,КН
(Понт.-Южносиб.); Aa(НК); [R.]
1220. *V. cinerea* Bieb. - Г. пепельный = М,КН(Туранск.); Ra,Rb(T); [R.]

1221. *V. varia* Host (*V. dasycarpa* Ten.) - Г. шерстистоплодный = Все р-ны (ЕвроКавк.); Pa,Ra(T); [Pl.]
1222. *V. villosa* Roth - Г. мохнатый = М,СК,КН(Палеаркт.); Da,Ra(T); [R.] <Pp>
1223. *V. hirsuta*(L.)S.F.Gray - Г. волосистый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Pa,Ra(T); [Sp.]
1224. *V. tetrasperma*(L.)Schreb. - Г. четырёхсеменной = КЕ,Прик,ТБ,НК, Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]
1225. *Lathyrus aphaca* L. - Чина безлисточковая = Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
1226. *L. nissolia* L. - Ч. Ниссоля = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субсредиз*); Pa(T); [Sp.]
1227. *L. hirsutus* L. - Ч. шершавая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
1228. *L. tuberosus* L. - Ч. клубненосная = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(HK:lh); [Pl.] <Pmel;Pp>
1229. *L. sylvestris* L. - Ч. лесная = КЕ,Прик,ТБ,НК, Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); S(HK:lh); [Sp.] <Pm;Pmel;Pp>
1230. *L. miniatus* Bieb.ex Stev. - Ч. киноваревая = Ст,ЛН,П,Кисл(Кавк.); S(HK:lh); [Sp.] l.c. Бештай <Pmel;Pp>
1231. *L. sphaericus* Retz - Ч. шаровидная = Кисл(Общедр.средиз.); Pa,Ra(T); [R.] <Pmel;Pp>
1232. *L. pratensis* L. - Ч. луговая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(HK:lh); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
1233. *L. pisiformis* L. - Ч. гороховидная = П(Палеаркт.); S(HK); [R.] <Pp>
1234. *L. palustris* L. - Ч. болотная = КЕ,Ст(Палеаркт.); Aa(HK); [R.] <Pmel;Pp>
1235. *L. incurvus*(Roth)Roth - Ч. согнутая = Все р-ны(Субтуран*); Aa(HK); [Sp.] <Pmel;Pp>
1236. ★*Orobus pannonicus* Jacq. (*Lathyrus pannonicus*(Jacq.)Garcke) - Сочевичник венгерский = Ст(Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Rs.] <Rx>
1237. *O. pallescens* Bieb. (*L. pallescens*(Bieb.)C.Koch) - С. бледнеющий = Ст, ЛН,СК,П(Понтич.); ST(HK); [R.]
1238. *O. cyaneus* Stev. (*L. cyaneus*(Stev.)C.Koch) - С. синий = Кисл (Зап.др.средиз.); Pb(HK); [Sp.]
1239. *Pisum elatius* Bieb. - Горох высокий = ЛН,П(Зап.др.средиз.); S(T); [R.]

Сем. 86. GERANIACEAE Juss. - ГЕРАНИЕВЫЕ

1240. *Geranium tuberosum* L. - Герань клубневая = КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Ст,СК,П (Субсредиз*); ST(HK); [Sp.]
1241. ★*G. linearilobum* DC. - Г. линейнолопастная = МД[авт.](Понтич.); ST(HK); [R.]

1242. *G. sanguineum* L. - Г. кроваво-красная = КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Ст,ЛН,СК, П,Кисл(Евро-Кавк.); Pa(HK); [Pl.] <Pm>
1243. *G. sylvaticum* L. - Г. лесная = П,Кисл(Евро-Сиб.); S(HK); [Pl.]
1244. *G. palustre* L. - Г. болотная = П,Кисл(Европ.); Aa(HK); [Sp.]
1245. *G. collinum* Steph. - Г. холмовая = КЕ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субтуран*.); Pa(HK); [Sp.]
1246. *G. depilatum*(Somm.et Levier)Grossh. - Г. безволосая = Ст,П,Кисл (Субкавк*.); Pa,Rb(HK); [Sp.]
1247. *G. sibiricum* L. - Г. сибирская = ЛН,П,Кисл(Панбор.); Pa(HK); [Sp.]
1248. *G. rotundifolium* L. - Г. круглолистная = П(Палеаркт.); Pa,Rb(T); [R.]
1249. *G. pusillum* L. - Г. маленькая = Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa,Rb(T); [Pl.]
1250. *G. columbinum* L. - Г. голубиная = Все р-ны(Европ.); Pa,Rb(T); [Pl.]
1251. *G. dissectum* L. - Г. рассечённая = Ст,П,Кисл(Субсредиз*.); Pa,Rb(HK); [R.]
1252. *G. divaricatum* Ehrh. - Г. раскидистая = Все р-ны(Общедр.средиз.); S,Rb(T); [Pl.]
1253. *G. bohemicum* L. - Г. богемская = Ст[Ставрополь: Танфильев, Кононов, 1987](Европ.); S(T); [R.] <Rg>
1254. *G. robertianum* L. - Г. Роберта = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Палеаркт.); S(T); [Pl.] <Pm>
1255. *G. lucidum* L. - Г. блестящая = П(Субсредиз*.); S,Aa(T); [Sp.]
1256. *Erodium malacoides*(L.)L'Her. - Журавельник (Аистник)мальвовидный = КН (Средиземн.); Db(T); [Sp.]
1257. *E. hoefftianum* C.A.Mey. - Ж. Гёффта = М,КН(Субтуран*.); Db(T); [Sp.] 1.c. Кизляр
1258. *E. ciconium*(L.)L'Her. - Ж. аистовый = Все р-ны(Субсредиз*.); ST,Rb(T); [Sp.]
1259. ★★ *E. stevenii* Bieb. - Ж. Стевена = Прик,Ст(Предкавк.); Db(HK); [Rs.] <Esub> 1.c. Бешпагир
1260. *E. cicutarium*(L.)L'Her.- Ж. цикутовый = Все р-ны(Палеаркт.); Db(T); [Sp.] <Pm;Pp>

Сем. 87. OXALIDACEAE R.Br. - КИСЛИЧНЫЕ

1261. *Oxalis acetosella* L. Кислица обыкновенная = Кисл(Голаркт.); S(HK); [Sp.] <Pa>
1262. *Xanthoxalis corniculata*(L.)Small (*Oxalis corniculata* L.) - Ксантоксалис рожковый = Ст(Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]
1263. *X. stricta*(L.)Small (*O. stricta* L.)- К. торчащий = Ст,П(Адвент.[Сев.Америка]); Rb(T); [R.]

Сем. 88. LINACEAE S.F.Gray - ЛЬНОВЫЕ

1264. *Linum catharticum* L. - Лён слабительный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); S,Pa(T); [Sp.]
1265. *L. austriacum* L. (*L. squamulosum Rudolphi*) - Л. австрийский = Все р-ны (Зап.др.средиз.); ST(HK); [Pl.]
1266. *L. bienne* Mill. (*L. angustifolium Huds.*) - Л. двулетний = Кисл (Общедр.средиз.); Pb(HK); [Sp.]
1267. *L. hypericifolium* Salisb. - Л. зверобоелистный = П,Кисл(Субкавк*.); Pb(HK); [Sp] <Po>
1268. *L. tenuifolium* L. - Л. тонколистный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Общедр.средиз.); ST,Da(HK); [Sp.]
1269. *L. nervosum* Waldst.et Kit. - Л. жилковатый = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Pa(HK); [Pl.]
1270. *L. nodiflorum* L. (*L. luteolum Bieb.*) - Л. желтоватый = Ст,ЛН,СК,П (Субкавк*.); ST(T); [Sp.]
1271. ★*L. tauricum* Willd. - Л. крымский = Ст,СК,П,Кисл(Понтич.); Da(HK); [Sp.] <Po;Rx>
1272. *L. alexeenkoanum* E.Wulf (*L. orientale auct.*) - Л. Алексеенко = Ст,СК, П,Кисл(Субкавк*.); Da(HK); [Sp.] <Po>

Сем. 89. PEGANACEAE (Engl.)Tiegh. - ГАРМАЛОВЫЕ

1273. *Peganum harmala* L. - Гармала обыкновенная = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М, Ст,КН(Общедр.средиз.); SD(HK); [R.] <Pt;Pm>

Сем. 90. TETRADICLIDIACEAE(Engl.)Takht. - ТЕТРАДИКЛИДИЕВЫЕ

1274. ★*Tetradiclis tenella*(Ehrenb.)Litv. - Тетрадиклис тонкий = Прик(р.Грачёвка), НК(Туранск.); Dc(T); [R.] l.c. р. Кума у Горькой <Rx>

Сем. 91. ZYGOPHYLLACEAE R.Br. - ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ

1275. *Zygophyllum fabago* L. - Парнолистник обыкновенный = Прик,ТБ,СК,П (Общедр.средиз.); ST(HK); [Sp.] <Pt;Pm>
1276. *Tribulus terrestris* L. - Якорцы стелющиеся = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М (Общедр.средиз.); Da,Rb(T); [Pl.] <Pm>

Сем. 92. NITRARIACEAE Bercht.et J.Presl - СЕЛИТРЯНКОВЫЕ

1277. *Nitraria schoberi* L. (*N. caspia Willd.*) - Селитрянка Шобера = НК(Ирано-Туран.); Dc(Ch); [R.] <Rx>

Сем. 93. RUTACEAE Juss. - РУТОВЫЕ

1278. ★*Haplophyllum villosum*(Bieb.)G.Don fil. - Цельнолистник мягковолосистый = МД[Немирова, Данилевич, 1995](Арmeno-Иран.); ST,SD(HK); [R.] <Rx>

1279. ★ *H. ciscaucasicum*(Rupr.)Grossh. et Vved. - Ц. предкавказский = П[Галушко, 1980](Предкавк.); Da(HK); [Rs.] <Esub> l.c. Джегута
1280. ★ *Dictamnus gymnostylis* Stev. - Ясенец голостолбиковый = П,Кисл (Эвксин.); S,Pb(HK); [R.] <Pt;Pm;Pmel>
1281. *D. caucasicus*(Fisch. et C.A.Mey.)Grossh. - Я. кавказский = Ст,ЛН,СК,П, Кисл(Субкавк*.); Pa(HK); [Pl.] l.c. Бештау <Pt;Pm;Pmel>

Сем. 94 POLYGALACEAE R.Br. - ИСТОДОВЫЕ

1282. ★ *Polygala sosnowskyi* Kem.-Nath. - Истод Сосновского = Кисл(Эукавк.); Db(HK); [R.] <Esub> <Pm> l.c. Кисловодск
1283. *P. mariamae* Tamamsh. - И. Мариам = Прик[Бешпагир: Танфильев, Кононов, 1987](Кавк.); ST(HK); [Rs.] <Pmel;Rx>
1284. *P. comosa* Schkuhr - И. хохлатый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); Pa(HK); [Sp.] <Pmel>
1285. *P. amoenissima* Tamamsch. - И. прелестнейший = [Ст: Танфильев, Кононов, 1987],П,Кисл(Средиземн.); Pa(HK); [Sp.] <Pmel>
1286. *P. alpicola* Rupr. - И. альпийский = Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Sp.]
1287. *P. anatolica* Boiss. et Heldr. - И. анатолийский = Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Субкавк*.); Pa(HK); [Pl.] <Pm;Pmel>
1288. *P. caucasica* Rupr. - И. кавказский = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кавк.); Pa(HK); [Pl.] <Pmel>

Сем. 95. SIMAROUBIACEAE DC. - СИМАРУБОВЫЕ

1289. *Ailanthus altissima*(Mill.)Swingle - Айлант высочайший = Все р-ны(Адвент. [Китай]); S,ST(Phms); [Sp.] <Po>

Сем. 96. EUPHORBIACEAE Juss. - МОЛОЧАЙНЫЕ

1290. *Mercurialis perennis* L. - Пролесник многолетний = НК[Кума, пос. Красный Октябрь, авт.](Европ.); Rb(HK); [R.]
1291. *Euphorbia dentata* Michx. (*Tithymalus dentatus*(Michx.)Gaertn.) - Молочай зубчатый = КЕ[Танфильев, Кононов, 1987],М,П(Адвент.); Rb(T); [Sp.]
1292. *E. helioscopia* L. (*T. helioscopius*(L.)Scop.) - М. солнечный = Все р-ны (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pt>
1293. *E. rhabdotosperma* A.Radcliffe-Smith (*T. rhabdotospermus*) - М. рабдотоспермум = М(Терек) [Гельтман, 1991](Кавк.); Da,Rb(T); [R.]
1294. ★ *E. glareosa* Pall.ex Bieb. (*T. glareosus*(Pall.ex Bieb.)Prokh.) - М. хрящеватый = КЕ,Ст(Кавк.); Da,Dd(HK); [Sp.] <Rx;Pt>
1295. *E. procera* Bieb. (*T. procerus*(Bieb.)Galushko) - М. мохнатый = ЛН,П,Кисл (Понтич.); Aa(HK); [Sp.] <Pt>

1296. ★★ *E. aristata* Schmalh. (*T. aristatus*(Schmalh.)Prokh.) - М. остистый = Прик, Ст(Предкавк.); ST(HK); [R.] <Es> <Pt> l.c. Ставрополь (рис. 7)
1297. *E. seguieriana* Neck. (*T. seguierianus*(Neck.)Prokh.) - М. Сегиеров = Все р-ны(Субтуран*); ST,SD(HK); [pl.] <Pt>
1298. *E. stepposa* Zoz (*T. stepposus*(Zoz)Prokh.) - М. степной = КЕ,Ст,ЛН,СК,П, Кисл(Понт.-Южносиб.); ST,Da(HK); [Sp.] <Pt>
1299. *E. stricta* L. (*E. micrantha* Steph., *T. micranthus*(Steph.)Sojak) - М. мелкоцветковый = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Кавк.); S(T); [Sp.]
1300. *E. condilocarpa* Bieb. (*T. condylocarpus*(Bieb.)Klotzch et Garcke ex Klotzch) - М. членистоплодный = ЛН,СК,П,Кисл(Субкавк*); ST(HK); [Sp.] <Pt> l.c. Кисловодск
1301. *E. squamosa* Willd. (*T. squamosus*(Willd.)Klotzch et Garcke ex Klotzch) - М. чешуйчатый = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кавк.); S(HK); [Pl.] <Pt>
1302. *E. falcata* L. (*E. acuminata* Lam., *T. falcatus*(L.)Klotzch et Garcke) - М. серповидный = Все р-ны(Общедр.средиз.); Dd,Ra,Rb(T); [Sp.] <Pt>
1303. ★ *E. normannii* Schmalh.ex Lipsky (*T. normannii*(Schmalh.ex Lipsky)Prokh.) - М. Норманна = Ст,ЛН(Предкавк.); ST,Rb(T); [Rs.]<Es;Pt> l.c. Невинномысск (рис.8)
1304. ★ *E. szovitsii* Fisch.et C.A.Mey. (*T. szovitsii*(Fisch.et C.A.Mey.) Klotzch et Garcke ex Klotzch) - М. Шовица = Прик[Галушко, 1989](Субкавк*); Da,Db(T); [Rs.] <Rx>
1305. ★ *E. petrophila* C.A.Mey. (*T. petrophilus*(C.A.Mey.)Sojak) - М. скалолюбивый = Ст,ЛН,П,Кисл(Кр.-Новоросс.); Da(HK); [Sp.] <Pt>
1306. *E. amygdaloïdes* L. (*T. amygdaloïdes*(L.)Gars.) - М. миндалевидный = П (Общедр.средиз.); S(HK); [R.] <Pt>
1307. ★ *E. praecox*(Fisch.ex Boiss.)B.Fedtsch.et Fler. (*E. astrachanica* C.A.Mey.ex Prokh., *T. astrachanicus* (C.A.Mey.)Prokh.) - М. ранний = МД,АИ,НК,Ст,СК (Туранск.); ST(HK); [R.] <Rx;Pt>
1308. ★ *E. tanaitica* Pacz. (*T. tanaiticus*(Pacz.)Galushko; *Euphorbia sareptana* Beck.) - М. донской = Ст(Понтич.); ST(HK); [Rs.] <Rx;Pt>
1309. *E. boissieriana* Woronow (*E. virgata* Waldst.et Kit.; *T. boissierianus* (Woronow)Prokh.) - М. Буасье = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М, Ст,ЛН,СК, П,Кисл(Армено-Иран.); ST(HK); [Sp.] <Pt>
1310. *E. iberica* Boiss. (*T. ibericus*(Boiss.)Prokh.) - М. грузинский = Все р-ны (Субкавк*); ST,Rb(HK); [Pl.] <Pt>
1311. *E. undulata* Bieb. (*T. undulatus*(Bieb.)Klotzch et Garcke ex Klotzch) - М. волнистый = МД,АИ,НК,КН(Туранск.); ST(HK); [R.] <Rx> <Pt>
1312. *E. leptocaula* Boiss. (*T. leptocaulis*(Boiss.)Prokh.) - М. тонкостебельный = КЕ,Прик,ТБ,Ст,СК,КН(Понтич.); ST(HK); [R.] <Pt>

1313. *E. esula* L. (*T. esulus*(L.)*Gaertn.*) - М. острый = Ст,П(Палеаркт.); Pa(HK); [R.] <Pt>
1314. *Chamaesyce humifusa*(Schlecht.)Prokh. (*Euphorbia humifusa* Schlecht.) - Хамезице приземистый = Прик,Ст,СК(Адвент.[Япония,Китай]); Rb(T); [Sp.] <Pt>
1315. *Ch. vulgaris* Prokh. (*E. chamaesyce* L.) - X. обыкновенный = П,КН (Субсредиз*.); Ra,Rb(T); [R.] <Pt>

Сем. 97. CALLITRICHACEAE Link - БОЛОТНИКОВЫЕ

1316. *Callitricha palustris* L. (*C. verna* L.)- Водяная звёздочка болотная = Ст,Кисл (Плюрирег.); Ac(K); [Sp.]

Сем. 98. ANACARDIACEAE Lindl. - СУМАХОВЫЕ

1317. *Cotinus coggygria* Scop. - Скумпия кожевенная = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Общедр.средиз.);Da(Phn); [Sp.] <Rt;Pm>
1318. ★*Rhus coriaria* L. - Сумах дубильный = П(Машук)(Общедр.средиз.); Db(Phn); [Rs.] <Rx;Pm>

Сем. 99. CELASTRACEAE R.Br. - БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ

1319. *Euonymus europaea* L. - Бересклет европейский = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Европ.); S(Phn); [Pl.] <Pm>
1320. *E. verrucosa* Scop. - Б. бородавчатый = Ст,П,Кисл(Европ.); S(Phn); [Sp.]
1321. *E. latifolia*(L.)Mill. - Б. широколистный = П(Субсредиз*.); S(Phn); [R.]
1322. ★★*E. nana* Bieb. - Б. карликовый = П(Бештау,Машук)(Понтич.); S,Da(Ch); [Rs.] <Rt;Rg> l.c. Бештау

Сем. 100. ACERACEAE Juss. - КЛЁНОВЫЕ

1323. ★*Acer laetum* C.A.Mey. - Клён светлый = Кисл(Эвксин.); S(Phms); [Sp.] <Rg;Rt;Pmel>
1324. *A. platanoides* L. - К. остролистный = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Европ.); S(Phmg); [Pl.] <Pmel>
1325. *A. campestre* L. - К. полевой = Все р-ны(Евро-Кавк.); S(Phms); [Pl.] <Pmel>
1326. *A. pseudoplatanus* L. - К. ложноплатанолистный (Явор) = Кисл(Европ.); S(Phms); [Sp.]
1327. *A. tataricum* L. - К. татарский = Ст,ЛН,П(Субпонт*.); S(Phm); [Sp.] <Pmel>
1328. *Negundo aceroides* Moench (*Acer negundo* L.) - Негундо клёновидный = Все р-ны(Адвент.[Сев.Америка]; S,ST(Phms); <Po>

Сем. 101. BALSAMINACEAE A.Rich. - БАЛЬЗАМИНОВЫЕ

1329. *Impatiens noli-tangere* L. - Недотрога обыкновенная = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Евро-Сиб.); S(T); [Pl.]

1330. *I. glandulifera* Royle – Н. железконосная = Ст, П, Кисл (Адвент. [Индия]); Rb, Aa(T); [R.]

Сем. 102. RHAMNACEAE Juss. - КРУШИНОВЫЕ

1331. *Paliurus spina-christi* Mill. - Держи-дерево христова колючка = П [Гроссгейм, 1962] (Общедр. средиз.); ST(Phn); [Rs.] <Pmel; Pm>

1332. *Frangula alnus* Mill. - Крушина ломкая = Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); S(Phn); [Sp.] <Pm>

1333. *Rhamnus cathartica* L. - Жостер слабительный = Все р-ны (Палеаркт.); S(Phm); [Pl.] <Pm>

1334. *Rh. pallasii* Fisch. et C.A.Mey. - Ж. Палласа = Все р-ны (Ирано-Туран.); Da(Phn); [Pl.]

1335. *Rh. spathulifolia* Fisch. et C.A.Mey. - Ж. лопатчатолистный = МД, АИ, НК, СК (Субкавк*); ST(Phn); [Sp.]

Сем. 103. VITACEAE Juss. - ВИНОГРАДОВЫЕ

1336. ★ *Vitis sylvestris* C.C.Gmel. - Виноград лесной = НК, М, ЛН, Ст, СК, КН (Субсредиз*); S(Phn:ll); [Sp.] <Pa>

Сем. 104. TILIACEAE Juss. - ЛИПОВЫЕ

1337. *Tilia platyphyllos* Scop. - Липа широколистная = П (Европ.); S(Phmg); [R.] <Pm; Pmel>

1338. *T. caucasica* Rupr. - Л. кавказская = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Кавк.); S(Phmg); [Pl.] <Pm; Pmel>

Сем. 105. MALVACEAE Juss. - МАЛЬВОВЫЕ

1339. *Abutilon theophrasti* Medik. - Канатник Теофраста = Все р-ны (Плюрирег.); Rb(T); [Sp.]

1340. *Malva sylvestris* L. - Просвирник лесной = КЕ, М, Ст, ЛН, СК, П, КН (Палеаркт.); Pa, ST, Rb(T); [Sp.] <Pm; Pmel>

1341. *M. nicaeensis* All. - П. ницкий = М, Ст, СК, П, Кисл (Общедр. средиз.); Rb(T); [R.] <Pmel>

1342. *M. neglecta* Wallr. - П. пренебрежённый = Все р-ны (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pa; Pmel>

1343. *M. pusilla* Smith - П. низкий = Все р-ны (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pa; Pmel>

1344. *Lavatera thuringiaca* L. - Хатьма тюрингенская = Все р-ны (Палеаркт.); Pa, ST(HK); [Pl.] <Pm; Po>

1345. *L. punctata* All. - Х. пятнистая = Ст,П[Меницкий, 1997](Туранск.); ST(НК); [Sp.]
1346. *Alcea rugosa* Alef. - Шток-роза морщинистая = Все р-ны(Понтич.); ST,Pa(НК); [Pl.] <Po>
1347. *Althaea hirsuta* L. - Алтей жёстковолосистый = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ, М,Ст,СК,П(Субредиз*); ST,Rb(T); [Sp.]
1348. *A. officinalis* L. - А. лекарственный = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pm>
1349. *A. armeniaca* Ten. - А. армянский = КЕ,Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Субтуран*); Pa,Aa(НК); [Sp.] <Pm>
1350. *A. cannabina* L. - А. коноплёвый = Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa,ST(НК); [Sp.]
1351. *Hibiscus trionum* L. - Гибискус тройчатый = Ст,ЛН,СК,П(Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Sp.]
1352. *Kitabelia vitifolia* Willd. - Китайбелия виноградолистная = Ст[Белоус, 1999](Средиземн.); Rb(НК); [R.]

Сем. 106. HYPERICACEAE Juss. - ЗВЕРОБОЙНЫЕ

1353. *Hypericum hirsutum* L. - Зверобой жёстковолосистый = КЕ,Прик,ТБ, Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.]
1354. *H. quadrangulum* L. (*H. tetrapherum* Fries; *H. acutum* Moench, nom. illegit.) - З. четырёхкрылый = КЕ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); Aa(НК); [Sp.]
1355. *H. elegans* Steph. - З. изящный = Все р-ны(Евро-Сиб.); ST(НК); [Sp.]
1356. *H. perforatum* L. - З. пронзённый = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm>

Сем. 107. ELATINACEAE Dumort. - ПОВОЙНИЧКОВЫЕ

1357. *Elatine alsinastrum* L. - Повойничек мокричный = СК,П(Европ.); Ab(T); [R.]

Сем. 108. FRANKENIACEAE S.F.Gray - ФРАНКЕНИЕВЫЕ

1358. *Frankenia pulverulenta* L. - Франкения порошистая = КЕ,МД,АИ,НК,Ст,П (Зап.др.средиз.); Dc(T); [R.]
1359. *F. hirsuta* L. - Ф. жестковолосистая = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,П (Зап.др.средиз.); Dc(Ch:sf); [R.]

Сем. 109. TAMARICACEAE Link - ГРЕБЕНЩИКОВЫЕ

1360. *Tamarix laxa* Willd. - Гребенщик рыхлый = МД,(Ирано-Туран.); Aa(Phn); [Rs.] <Rg>
1361. *T. gracilis* Willd. - Г. изящный = МД(Субтуран*); Aa(Phn); [Rs.] <Rg>

1362. *T. ramosissima* Ledeb. - Г. многоветвистый = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М, Ст, СК, П, КН(Вост.др.средиз.); Aa, Db(Phn); [Sp.] <Pm>
1363. *Myricaria bracteata* Royle (*M. alopecuroides* Schrenk) - Мирикария прицветниковая = Ст, П, Кисл(Общедр.средиз.); Aa(Phn); [Sp.]

Сем. 110. CISTACEAE Juss. - ЛАДАННИКОВЫЕ

1364. *Helianthemum ovatum*(Viv.)Dun. - Солнцецвет яйцевидный = П, Кисл (Европ.); Pb(Ch:sf); [Sp.]
1365. *H. nitidum* Clementi - С. блестящий = Кисл(Евро-Сиб.); Pb(Ch:sf); [Sp.]
1366. *H. ciscaucasicum* Juz. et Pozd. - С. предкавказский = П, Кисл (Эукавк.)Pb, ST(Ch:sf); [Pl.] <Pmel>
1367. *H. buschii*(Palib.)Juz.ex Pozd. - С. Буша = Кисл(Эвксин.); Da(Ch:sf); [Sp.]
1368. ★*Fumana procumbens*(Dun.)Gren.et Godr. - Фумана лежачая = П, Кисл (Средиземн.); Da (Ch:sf); [Rs.] <Rx>

Сем. 111. VIOLACEAE Batsch - ФИАЛКОВЫЕ

1369. *Viola caucasica* Kolenati - Фиалка кавказская = Кисл(Кавк.); Pb, Pc(HK:ephd); [Pl.]
1370. *V. alba* Bess. - Ф. белая = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Европ.); S(HK:ephd); [Sp.]
1371. *V. odorata* L. - Ф. душистая = Все р-ны(Евро-Кавк.); S(HK:ephd); [Pl.] <Pm>
1372. *V. wiedemannii* Boiss. - Ф. Вейдеманна = П(Бештау)(Субкавк*.); Pc(HK:ephd); [Sp.] <Rg>
1373. *V. suavis* Bieb. - Ф. приятная = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Субпонт*.); S(HK:ephd); [Sp.]
1374. *V. hirta* L. - Ф. коротковолосистая = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Евро-Сиб.); Pa(HK:ephd); [Pl.]
1375. *V. ambigua* Waldst. et Kit. - Ф. сомнительная = Все р-ны(Понтич.); Pa(HK:ephd); [Pl.]
1376. *V. elatior* Fries - Ф. высокая = Ст, П(Палеаркт.); S(HK:ephd); [R.]
1377. *V. pumila* Chaix - Ф. низкая = Ст, СК(Европ.); S(HK:ephd); [Rs.] <Rg>
1378. *V. canina* L. - Ф. собачья = Все р-ны(Евро-Сиб.); S(HK:ephd); [Pl.] <Pm>
1379. *V. rupestris* F.W.Schmidt - Ф. скальная = Кисл(Евро-Сиб.); Pb(HK:ephd); [R.]
1380. *V. reichenbachiana* Jord.ex Boreau (*V. silvescens* Lam.) - Ф. Рейхенбаха = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Европ.); S(HK:ephd); [Sp.]
1381. *V. mirabilis* L. - Ф. удивительная = П, Кисл(Палеаркт.); S(HK:ephd); [Sp.]
1382. *V. somchetica* C.Koch - Ф. сомхетская = [Ст: Танфильев, Кононов, 1987], П(Кавк.); Pc(HK:ephd); [Pl.]
1383. *V. kitaibeliana* Schult. - Ф. Китайбелева = Все р-ны(Понтич.); ST(T); [Pl.]
1384. *V. arvensis* Murr. - Ф. полевая = Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa, Rb(T); [Sp.] <Pm>

1385. *V. vespertina* Klok. - Ф. вечерняя = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Эукавк.); Pa(T); [Pl.]
l.c. Нальчик.

Сем. 112. THYMELAEACEAE Juss. - ВОЛЧНИКОВЫЕ

1386. *Thymelaea passerina*(L.)Coss.et Germ. - Лигия воробышная = Все р-ны
(Общедр.средиз.); ST,Da(T); [R.]

Сем. 113. ELAEAGNACEAE Juss. - ЛОХОВЫЕ

1387. *Hippophaë rhamnoides* L. - Облепиха крушиновидная = Все р-ны
(Палеаркт.); Aa(Phn); [Pl.] <Pm;Pa;Pmel>

1388. *Elaeagnus angustifolia* L. - Лох узколистный = Все р-ны(Общедр.средиз.);
Db(Phn); [Sp.] <Pa;Pm;Pmel>

Сем. 114. LYTHRACEAE J.St.-Hil. - ДЕРБЕННИКОВЫЕ

1389. ★*Lythrum thesioides* Bieb. - Дербенник ленецевидный = Ст(Понтич.); Aa(T);
[Rs.] <Rg> l.c. Ставрополь

1390. *L. virgatum* L. - Д. лозный = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(HK); [Sp.] <Pmel>

1391. *L. salicaria* L. - Д. иволистный = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(HK); [Pl.]
<Pm;Pmel>

Сем. 115. ONAGRACEAE Juss. - КИПРЕЙНЫЕ

1392. *Epilobium hirsutum* L. - Кипрей шерстистый = Все р-ны(Палеаркт.);
Aa(HK); [Pl.]

1393. *E. parviflorum* Schreb. - К. бледноцветковый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл
(Общедр.средиз.); Aa(HK); [Sp.]

1394. *E. montanum* L. - К. горный = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(HK); [Pl.]

1395. *E. lanceolatum* Seb.et Mauri - К. ланцетолистный = Кисл (Зап.др.средиз.);
S,Aa(HK); [R.]

1396. *E. tetragonum* L. (*E. adnatum* Griseb.) - К. четырёхугольный = Ст,ЛН,СК,
П,Кисл(Палеаркт.); Aa(HK); [R.]

1397. *E. nervosum* Boiss.et Buhse - К. жилковатый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл
(Вост.др.средиз.); Aa(HK); [Sp.]

1398. *E. algidum* Bieb. - К. холодный = П,Кисл(Субкавк*); Aa(HK); [Pl.]

1399. *Chamenerion angustifolium*(L.)Scop. (*Chamerion angustifolium* (L.) Holub) -
Иван-чай узколистный - Ст,П,Кисл(Голаркт.); S(HK); [Sp.] <Pa;Pm;Pmel>

1400. *Ch. dodonae*(Vill.)Kost. (*Ch. angustissimum*(Web.)Grossh.) - И.-ч. Додоны =
П,Кисл(Голаркт.); Aa(HK); [Sp.]

1401. *Oenothera biennis* L. (*Onagra biennis*(L.)Scop.) - Ослинник двулетний = Все
р-ны (Адвент.[Сев.Америка]); Rb(HK:pb); [Pl.] <Po;Pm>

1402. *Circaeа lutetiana* L. - Двулепестник парижский = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Евро-Сиб.); S(HK); [Sp.]

Сем. 116. HALORAGACEAE R.Br. - СЛАНОЯГОДНИКОВЫЕ(УРУТЕВЫЕ)

1403. *Myriophyllum verticillatum* L. - Уруть мутовчатая = Все р-ны(Голаркт.); Ac(K); [Sp.]

1404. *M. spicatum* L. - У. колосовая = Все р-ны(Голаркт.); Ac(K); [Sp.]

Сем. 117. HIPPURIDACEAE Link - ХВОСТНИКОВЫЕ

1405. *Hippuris vulgaris* L. - Хвостник обыкновенный = КН(Голаркт.); Ac(K); [R.]

Сем. 118. ARALIACEAE Juss. - АРАЛИЕВЫЕ

1406. *Hedera caucasigena* Pojark. - Плющ кавказский = П(Бештау)Кисл[авт.] (Эвксин.); S(Ch:ll); [R.] <Rg,Rt>

Сем. 119. APIACEAE Lindl. - СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ(ЗОНТИЧНЫЕ)

1407. *Sanicula europaea* L. - Подлесник европейский = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Сиб.); S(HK); [Pl.] <Pm>

1408. *Astrantia trifida* Hoffm. - Астраниця трёхнадрезанная = Кисл(Эукавк.); Pb(HK); [R.]

1409. *A. biebersteinii* Trautv. - А. Биберштейна = Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Pl.]

1410. *A. maxima* Pall. - А. наибольшая = П(Субкавк*); Pb(HK); [Sp.]

1411. *Eryngium giganteum* Bieb. - Синеголовник гигантский = [Ст,ЛН: Гроссгейм, 1967],П(Эвксин.); Pb(HK); [Sp.]

1412. *E. campestre* L. - С. полевой = Все р-ны(Субсредиз*); ST,Rb(HK); [Pl.] <Pm>

1413. *E. planum* L. - С. плосколистный = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Sp.] <Pm;Po>

1414. *E. caucasicum* Trautv. (*E. caeruleum* Bieb.; *E. biebersteinianum* Nevsky) - С. кавказский = П,Кисл(Арmeno-Иран.); ST(HK); [Sp.]

1415. *Physocaulis nodosus*(L.)Koch (*Myrrhoides nodosa*(L.)Cannon) - Вздутоплодник узловатый = Ст(Общедр.средиз.); S,Rb(T); [R.] <Rg>

1416. *Chaerophyllum aureum* L. (*Ch. maculatum* Willd. ex DC.) - Бутень золотистый = [ТБ,КН: Меницкий, 1991], Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Арmeno-Иран.); S(HK); [Sp.]

1417. *Ch. roseum* Bieb. (*Ch. millefolium* DC.) - Б. розовый = Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Pl.]

1418. *Ch. temulum* L. - Б. опьяняющий = КЕ[Меницкий, 1991],Ст,ЛН,СК,П, Кисл (Европ.); S(T); [Sp.]

1419. *Ch. bulbosum* L. (*Ch. caucasicum*(Hoffm.)Schischk.) - Б. клубненосный = Ст,СК,ЛН,П,Кисл(Евро-Кавк.); S,Rb(T); [Sp.]

1420. *Ch. prescottii* DC. - Б. Прескотта = Ст(Палеаркт.); S(НК:pb); [R.] <Rg>
1421. *Anthriscus nemorosa*(Bieb.)Spreng. - Купырь дубравный = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Субкавк*); S(НК); [Pl.]
1422. *A. sylvestris*(L.)Hoffm. - К. лесной = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Европ.); Rb(НК); [Sp.]
1423. *A. cereifolium*(L.)Hoffm. (*A. longirostris* Bertol.) - К. длинноносиковый = Все р-ны(Зап.др.средиз.); Rb(T); [R.]
1424. *Scandix pecten-veneris* L. - Скандикс гребенчатый = КЕ,[ТБ,НК,М,КН: Меницкий, 1991],Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Общедр.средиз.); Rb(T); [Sp.]
1425. *S. australis* L. (*S. falcata* Lordes, *S. grandiflora* auct.) - С. южный = П(Кр.-Новоросс.); Rb(T); [R.]
1426. *Myrrhis odorata*(L.)Scop. - Миррис душистый = П(Машук)[Галушко, 1980](Европ.); Pc(НК); [Rs.] <Rg>
1427. *Torilis japonica*(Houtt.)DC. - Торилис японский = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Палеаркт.); S(T); [Pl.]
1428. *T. arvensis*(Huds.)Link - Т. полевой = Все р-ны(Общедр.средиз.); S,Rb(T); [Pl.]
1429. *T. heterophylla* Guss. - Т. разнолистный = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Зап.др.средиз.); S(T); [R.]
1430. *T. leptophylla*(L.)Reichenb.fil. - Т. плосколистный = КЕ, Ст, П, Кисл (Общедр.средиз.); ST,Rb(T); [R.]
1431. *Astrodaucus orientalis*(L.)Drude - Морковница восточная = ЛН, СК, П, Кисл(Арmeno-Иран.); Dd,Rb(T); [Pl.]
1432. *Caucalis lappula*(Web.)Grande - Прицепник липучковый = Все р-ны (Палеаркт.); ST,Ra,Rb(T); [Sp.] <Pa>
1433. *Turgenia latifolia*(L.)Hoffm. - Тургеневия широколистная = КЕ,[ТБ,КН: Меницкий, 1991],Ст, (Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]
1434. *Coriandrum sativum* L.- Кориандр посевной = СК, П(Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]
1435. *Smyrnium perfoliatum* L. - Смирния пронзёнолистная = [Прик, ТБ, НК: Меницкий, 1991],Ст,ЛН,СК,П(Средиземн.); S(НК:pb); [Sp.]
1436. *Physospermum cornubiense*(L.)DC. (*Ph. danaa*(Bieb.)Schishk.; *Danaa nudicaulis*(Bieb.)Grossh.) - Вздутосемянник корнубский = ТБ, НК[Меницкий, 1991], СК, П, Кисл(Зап.др.средиз.); S(НК); [Sp.]
1437. *Conium maculatum* L. - Болиголов пятнистый = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(HK:pb); [Pl.] <Pt;Pm>
1438. *Eleutherospermum cicutarium*(Bieb.)Boiss. - Свободносемянник цикутовый = П, Кисл(Субкавк*); S(НК); [Sp.]

1439. *Bilacunaria microcarpa*(Bieb.)M.Pimen.et V. Tichomirov (*Hippomarathrum microcarpum*(Bieb.)V.Petrov; *Cachrys microcarpos* Bieb.) - Конский фенхель мелкоплодный = Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Субкавк*); Pa(НК); [Sp.]
1440. *Prangos odontalgica*(Pall.)Herrnst.et Heyn (*Cachris odontalgica* Pall.) - Прангос противозубной = МД, АИ, НК, М, Ст, СК(Субтуран*); Dc(НК); [R.]
1441. *Bupleurum rotundifolium* L. - Володушка круглолистная = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Палеаркт.); Pa, Rb(T); [Sp.]
1442. *B. exaltatum* Bieb. - Б. высокая = Ст, ЛН, П, Кисл(Вост.др.средиз.); Da(НК); [Pl.]
1443. *B. polyphyllum* Ledeb. - Б. многолистная = П, Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
1444. *B. gerardii* All. (*B. commutatum* Boiss. et Bal.) - Б. Жерарда = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, Ст, СК, КН(Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.]
1445. *B. affine* Sadl. - Б. родственная = КЕ[Меницкий, 1991], СК, П(Понтич.); ST(T); [R.]
1446. *B. brachiatum* C.Koch - Б. ветвистая = КЕ, Ст, СК, П(Эвксин.); ST(T); [R.]
1447. *B. asperuloides* Heldr.ex Boiss. - Б. ясменниковая = П(Железноводск) (Кр.-Новоросс.); Dc(T); [Rs.] <Rx>
1448. *B. tenuissimum* L. - Б. тончайшая = КЕ, Ст, СК(Субсредиз*); ST(T); [Sp.]
1449. *B. marschallianum* C.A.Mey. - Б. Маршалла = Прик, ТБ, НК, М, СК, КН (Субкавк*); Dc(T); [R.] l.c. Кизляр
1450. *Trinia multicaulis*(Poir.)Schischk. - Триния многостебельная = КЕ (Понтич.); ST(HK); [R.]
1451. *T. kitaibeli* Bieb. - Т. Китайбеля = КЕ, Ст, СК, П(Понтич.); ST(HK:pb); [R.]
1452. *T. leiogona*(C.A.Mey.)B.Fedtsch. - Т. гладкоплодная = КЕ, Прик, ТБ, НК, М, Ст, СК, П(Субкавк*); ST(HK); [Sp.]
1453. *T. hispida* Hoffm. - Т. щетинистоволосистая = КЕ, Прик, ТБ, НК, М, Ст, СК, П(Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Pl.]
1454. *Apium graveolens* L. - Сельдерей пахучий = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(HK:pb); [R.] <Pa>
1455. *Visnaga daucoides* Gaertn. (*Ammi visnaga*(L.)Lam.) - Визнага морковная (Амми зубная) = П (Пятигорск), КН(Средиземн.); ST(HK:pb); [R.] <Pm>
1456. *Falcaria vulgaris* Bernh. (*F. sioides*(Wib.)Aschrers.) - Резак обыкновенный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa, ST(HK); [Pl.] <Pm>
1457. *Carum carvi* L. - Тмин обыкновенный = Кисл(Палеаркт.); Pb, Rb(HK:pb); [Pl.] <Pm>
1458. *Elaeosticta lutea*(Hoffm.)Kljuikov,M.Pimen.et V.Tichomirov (*Muretia lutea*(Hoffm.)Boiss.) - Элеостикта (Муреция) жёлтая = МД(Понт.-Южносиб.); Dc, Rb(HK); [R.] <Rx>
1459. *Chamaesciadium acaule*(Bieb.)Boiss. - Низкозонтичник бесстебельный = П, Кисл(Субкавк*); Pb(HK); [Sp.] l.c. Бештау

1460. *Pimpinella pseudotragium* DC. (*P. confusa* Woronow) - Бедренец смешиваемый = КЕ, Прик, ТБ(Кавк.); Da(HK); [R.]
1461. *P. saxifraga* L. - Б. камнеломка = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Сиб.); Pb(HK); [Pl.] <Pm>
1462. *P. rhodantha* Boiss. - Б. розоцветный = П,Кисл(Субкавк*.); Pb(HK); [Pl.]
1463. *P. major*(L.)Huds. - Б. большой = Кисл(Евро-Сиб.); Pb(HK); [R.]
1464. *Albovia tripartita*(Kalen.)Schischk. (*Pimpinella tripartita* Kalen.) - Альбовия трёхраздельная = КЕ, Прик, ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субкавк*.); S(HK); [Sp.]
1465. *Aegopodium podagraria* L. - Сныть обыкновенная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Палеаркт.); S,Rb(HK); [Pl.] <Pm>
1466. *Sium latifolium* L. - Поручейник широколистный = ТБ,НК,КН[Меницкий, 1991](Палеаркт.); Da(HK); [Sp.] <Pt>
1467. *S. sisaroides* DC. - П. сизаровидный = Все р-ны(Субтуран*.); Aa(HK); [Pl.]
1468. *Berula erecta*(Huds.)Cov. (*Sium erectum* Huds.) - Берула прямая = АИ,НК, М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Кавк.); Ab(K); [Sp.]
1469. *Seseli dichotomum* Pall.ex Bieb. - Жабрица вильчатая = П(Бештау) (Понтич.); Db(HK); [R.] <Rx>
1470. *S. petraeum* Bieb. - Ж. каменистая = П,Кисл(Кавк.); Db(HK); [Sp.]
1471. *S. peucedanoides*(Bieb.)K.-Pol. - Ж. горичниквидная = Ст,ЛН,СК,П, Кисл(Субкавк*.); Pa(HK); [Sp.] l.c. Кисловодск
1472. *S. varium* Trev. - Ж. варьирующая = П,Кисл(Эукавк.); ST(HK); [Sp.]
1473. *S. tortuosum* L. (*S. campestre* Bess.) - Ж. извилистая = Все р-ны (Понтич.); Pa,ST(HK); [Sp.]
1474. *Libanotis transcaucasica* Schischk. (*Seseli libanotis*(L.)Koch) - Порезник кавказский = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субкавк*.); Pa,Pb(HK:pb); [Sp.] <Pm>
1475. *Oenanthe aquatica*(L.)Poir. - Омежник водяной = КЕ,МД,АИ,НК,Прик, ТБ,М,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Ab(K); [Sp.]
1476. *Aethusa cynapium* L. - Кокорыш собачья петрушка = КЕ,Прик,ТБ,НК, Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S,Rb(T); [Pl.]
1477. *Silaum silaus*(L.)Schinz et Thell. (*Silaum besseri*(DC.)Galushko) - Морковник обыкновенный = П(Понтич.); Pa(HK); [R.]
1478. *Macrosciadium alatum*(Bieb.)V.Tichomirov et Lavrova (*Ligusticum alatum*(Bieb.)Spreng.) - Макросциадиум (Лигустикум) крылатый = Ст,П,Кисл(Субкавк*.); Pb(HK); [Sp.] l.c. Кисловодск
1479. *Angelica sylvestris* L. (*Angelica pachyptera* Ave-Lall.) - Дягель лесной = Кисл (Палеаркт.); S,Aa(HK); [Sp.]
1480. *Archangelica officinalis* Hoffm. (*Angelica archangelica* L.) - Архангелика лекарственная = П(Европ.); S,Aa(HK:pb); [R.] <Pm>
1481. *Agasyllis latifolia*(Bieb.)Boiss. - Агазилис широколистный = П,Кисл (Кавк.); Pb(HK); [Sp.]

1482. ★★ *Eriosynaphe longifolia*(Fisch.ex Spreng.)DC. - Пушистоспайник
длиннолистный = КЕ,М,СК,П(Субтуран*.); ST(HK); [R.] <Rx>
1483. ★ *Ferula tatarica* Fisch.ex Spreng. - Ферула татарская = М,Ст,ЛН,СК
(Субтуран*.); Dc(HK); [Sp.] l.c. Ставрополь
1484. ★ *F. caspica* Bieb. - Ф. каспийская = М,Ст,СК,П,КН(Субтуран*.); Dc(HK);
[Sp.]
1485. *Ferulago campestris*(Bess.)Grec. - Ферульник полевой = Все р-ны
(Субпонт*.); Pa(HK); [R.]
1486. *Peucedanum ruthenicum* Bieb. - Горичник русский = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,
ЛН,СК,П,Кисл(Понт.-Южносиб.); Pa(HK); [Pl.]
1487. *P. tauricum* Bieb. - Г. крымский = КЕ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кр.-Новоросс.);
ST(HK); [Sp.]
1488. *P. adae* Woronow - Г. Ады = П(Эвксин.); Da(HK); [R.] <Rx>
1489. *P. carvifolia* Vill. (*P. podolicum*(Bess.)Todor) - Г. оленелистный = Ст,Кисл
(Европ.); S(HK); [R.]
1490. *P. pshawicum* Boiss. - Г. пшавский = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Эукавк.); Pb(HK);
[Sp.]
1491. *P. oreoselinum* (L.)Moench - Г. горный = П,Кисл(Европ.); S(HK); [R.]
1492. *Macro selinum latifolium*(Bieb.)Schur (*Peucedanum latifolium* (Bieb.)DC.) -
Макроселинум широколистный = [Прик: Тан菲尔ев, Кононов, 1987],Ст
(Эукавк.); S(HK); [R.]
1493. *Xanthoselinum alsaticum*(L.)Schur (*Peucedanum alsaticum* L.; *P. lubimen-koanum* Kotov) - Ксантоселинум альзатский = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Понт.-
Южносиб.); Pa(HK); [Sp.]
1494. *Cervaria rivinii* Gaertn. (*Peucedanum cervaria*(L.)Lapeyr.) - Цервария оленья =
П(Машук, Бештау)(Европ.); Pa(HK); [R.] <Rg>
1495. *C. caucasica*(Bieb.)M.Pimen. - Ц. кавказская = Кисл(Эвксин.); S(HK); [R.]
1496. *Laser trilobum*(L.)Borkh. - Лазурник трёхлопастный = Ст,ЛН,П,Кисл (Евро-
Кавк.); Pa,S(HK); [Sp.]
1497. *Pastinaca sylvestris* Mill. - Пастернак лесной = Ст,СК,П,Кисл(Палеаркт.);
Pa(HK:pb); [Sp.]
1498. *P. umbrosa* Stev.ex DC. - П. теневой = Кисл(Кисловодск)(Арmeno-Иран.);
Pa(HK); [Sp.]
1499. *P. pimpinellifolia* Bieb. - П. бедреницелистный = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,
СК,П,Кисл(Кавк.); Pa(HK); [Pl.]
1500. *P. armena* Fisch.et C.A.Mey. - П армянский = Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Sp.]
1501. *P. clausii*(Ledeb.)M.Pimen. (*P. biebersteinii* Galushko) - П. Клауса = Ст,
ЛН,СК,П,Кисл,КН(Понтич.); Pa(HK); [Sp.]
1502. *Heracleum sibiricum* L. - Борщевик сибирский = Ст,СК,П,Кисл (Палеаркт.);
Pa(HK); [Sp.] <Pt,Pm>

1503. *H. asperum*(Hoffm.)Bieb. - Б. жёсткий = П,Кисл(Кавк.); Pa(HK); [Pl.] <Pt>
l.c. Бештау
1504. *H. mantegazzianum* Somm.et Levier - Б. Мантегацци = Ст,ЛН,СК,П,Кисл
(Эвксин.); S,Pb(HK:pb); [Pl.] <Pt>
1505. *H. chorodanum*(Hoffm.)DC. - Б. аирный = П,Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Sp.] l.c.
Кисловодск
1506. *Zosima orientalis* Hoffm. (*Z. absinthifolia*(Vent.)Link) - Зосима восточная =
Ст,СК,П,Кисл(Общедр.средиз.); Da(HK); [Sp.]
1507. *Tordylium maximum* L. - Тордилиум крупный = Все р-ны (Общедр.средиз.);
Pa,Rb(T); [Sp.]
1508. *Laserpitium hispidum* Bieb. - Гладыш щетинистоволосистый = СК,П,Кисл
(Кавк.); Da(HK); [Sp.]
1509. *Daucus carota* L. - Морковь дикая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(HK:pb);
[Pl.] <Pm>

Сем. 120. CORNACEAE Dumort. - КИЗИЛОВЫЕ

1510. *Cornus mas* L. - Кизил обыкновенный = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл
(Общедр.средиз.); S(Phm); [Pl.] <Pa;Pm>
1511. *Swida australis*(C.A.Mey.)Pojark.ex Grossh. (*Thelycrania australis* auct.) -
Свидина южная = КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Общедр.средиз.);
S(Phm); [Pl.]

Сем. 121. PYROLACEAE Dumort. - ГРУШАНКОВЫЕ

1512. ★*Pyrola rotundifolia* L. - Грушанка круглолистная = Ст,П,Кисл(Голаркт.);
S(HK); [Rs.] <Rg;Pm>
1513. ★*Orthilia secunda*(L.)House - Ортилия маленькая = Ст,ЛН,П,Кисл (Панбор.);
S(HK); [Rs.] <Rg>

Сем. 122. MONOTROPACEAE Nutt. - ПОДЬЕЛЬНИКОВЫЕ

1514. ★*Hypopitis monotropa* Crantz - Подъельник обыкновенный = Ст,П,Кисл
(Голаркт.); S(HK:sap); [Rs.] <Rg>

Сем. 123. ERICACEAE Juss. - ВЕРЕСКОВЫЕ

1515. ★*Rhododendron luteum* Sweet - Рододендрон жёлтый = Ст[Гросгейм,
1967],П,Кисл(Евро-Кавк.); S,Pb(Phn); [Sp.] <Po;Pt>

Сем. 124. PRIMULACEAE Vent. - ПЕРВОЦВЕТНЫЕ

1516. ★*Primula amoena* Bieb. - Первоцвет приятный = П(Бештау)(Эукавк.);
Pa,Pb(HK); [Rs.] <Rg> <Po> l.c. Бештау

1517. *P. macrocalyx* Bunge - П. крупночашечковый = Все р-ны(Евро-Сиб.); S,Pa(HK); [Pl.] <Pm;Po>
1518. *P. ruprechtii* Kusn. - П. Рупрехта = Кисл(Кавк.); Pb(HK); [R.] <Po>
1519. *P. algida* Adams - П. холодный = Кисл(Евро-Сиб.); Pb,PC(HK); [Sp.]
1520. *Androsace barbulata* Ovcz. (*A. villosa* auct.; *A. koso-poljanskii* Ovcz.) - Проломник бородчатый = Кисл(Кавк.); Da(HK); [Pl.] <Po>
1521. *A. elongata* L. - П. удлинённый = Ст,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Pa(HK); [Pl.]
1522. *A. maxima* L. (*A. turczaninovii* Freyn.) - П. наибольший = Все р-ны (Палеаркт.); ST,Rb(T); [Pl.]
1523. ★ *Lysimachia nummularia* L. - Вербейник монетный = КЕ(Григорополисская), Ст(Ставрополь) (Европ.); S(HK); [R.] <Rg;Pm;Po>
1524. *L. verticillaris* Spreng. - В. мутовчатый = Все р-ны(Субкавк*); Pa(HK); [Pl.]
1525. *L. dubia* Soland. - В. сомнительный = М(Субкавк*); Aa(T); [Sp.]
1526. *L. vulgaris* L. - В. обыкновенный = Все р-ны(Палеаркт.); S,Aa(HK); [Sp.]
1527. *Anagallis arvensis* L. - Очный цвет полевой = М,Ст,СК(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [R.] <Pm>
1528. *A. foemina* Vill. (*A. caerulea* Schreb.) - О.ц. женский = КЕ,Ст,СК,П (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [R.]
1529. ★ *Samolus valerandi* L. - Северница Валеранда = НК,Ст,СК,П (Общедр.средиз.); Aa(HK); [R.]

Сем. 125. LIMONIACEAE Ser. - КЕРМЕКОВЫЕ

1530. *Goniolimon tataricum*(L.)Boiss. - Гониолимон татарский = Все р-ны (Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Sp.] <Po>
1531. ★ *G. besserianum*(Schult.)Kusn. - Г. Бессера = МД,АИ,НК,М,КН(Понтич.); Dc(HK); [Rs.] <Rx>
1532. *Limonium meyeri*(Boiss.)O.Kuntze - Кермек Мейера = Все р-ны (Субтуран*); Dc(HK); [Pl.] <Pm;Pmel;Po>
1533. *L. tomentellum*(Boiss.)O.Kuntze - К. опушённый = КН[Гроссгейм, 1967] (Понтич.); Dc,Aa(HK); [Sp.] <Pmel>
1534. *L. platyphyllum* Lincz. (*L. latifolium*(Smith)O.Kuntze) - К. широколистный = Все р-ны(Понтич.); ST(HK); [Pl.] l.c. Азов <Pmel;Po>
1535. *L. sareptanum*(A.Beck.)Gams - К. сарептский = МД[Танфильев, Кононов, 1987](Субтуран*); ST,Dc(HK); [Pl.] <Pmel;Po>
1536. *L. caspium*(Willd.)Gams - К. каспийский = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ, Ст,СК,КН(Субтуран*); Dc(HK); [Sp.] <Pmel;Po>
1537. *L. suffruticosum*(L.)O.Kuntze - К. полукустарниковый = МД(Субтуран*); Dc(Ch:sf); [R.] <Pmel>
1538. *Psylliostachys spicata*(Willd.)Nevski - Подорожникоцветник колосистый = НК,КН(Ирано-Туран.); Dc(T); [R.]

Сем. 126. OLEACEAE Hoffmigg. et Link - МАСЛИНОВЫЕ

1539. *Fraxinus excelsior* L. - Ясень обыкновенный = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Европ.); S(Phmg); [Pl.] <Pm>
1540. *Ligustrum vulgare* L. - Бирючина обыкновенная = Все р-ны(Европ.); S(Phn); [Pl.] <Po; Pm; Pmel>

Сем. 127. GENTIANACEAE Juss. - ГОРЕЧАВКОВЫЕ

1541. *Centaurium pulchellum*(Sw.)Druce - Золототысячник красивый = Ст[Танфильев, Кононов, 1987], П, Кисл(Палеаркт.); Aa(T); [Sp.] <Pm>
1542. *C. meyeri*(Bunge)Druce - З. Мейера = М, ЛН, СК, П, КН(Общедр. средиз.); Aa(T); [Sp.]
1543. *C. littorale*(D.Turner)Gilmour(*C. minus Moench*; *C. vulgare Rafn*) - З. прибрежный = Все р-ны(Европ.); Pa(HK:pb); [Pl.] <Pm>
1544. ★*C. spicatum*(L.)Fritsch - З. колосовидный = МД(Калаус), КН (Общедр. средиз.); Dc(T); [R.] <Rx>
1545. *Gentiana schistocalyx*(C.Koch)C.Koch - Горечавка раздельночашечная = П, Кисл(Кавк.); S(HK); [R.] <pm>
1546. *G. septemfida* Pall. - Г. семираздельная = П, Кисл(Субкавк*); S, Pb(HK); [Sp.]
1547. *G. cruciata* L. - Г. крестообразная = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); Pa(HK); [Sp.] <Pm>
1548. *G. dshimilensis* C.Koch - Г. джимильская = Кисл(Кавк.); Pa, Pb(HK); [Sp.]
1549. *G. aquatica* L. - Г. водная = П, Кисл(Голаркт.); Pb, Pc(T); [Sp.]
1550. *G. angulosa* Bieb. - Г. угловатая = Кисл(Субкавк.*); Pb?Pc(HK); [Sp.]
1551. ★*G. oschtenica*(Kusn.)Woronow - Г. оштенская = Кисл(Кисловодск) (Эукавк.); Pb, Pc(HK); [Rs.]
1552. *Gentianopsis blepharophora*(Bordz.)Galushko (*Gentiana blepharophora* Bordz.) - Горечавочник ресниченосный = П, Кисл(Субкавк*); ST(HK); [R.]
1553. *Gentianella biebersteinii*(Bunge)Holub (*Gentiana biebersteinii* Bunge) - Горечавочка Биберштейна = П, Кисл(Кавк.-Эвкс.); Pb, Pc(HK); [Sp.] l.c. Минеральные Воды
1554. *G. amarella*(L.)Boern. (*Gentianella axillaris*(F.W.Schmidt)A. et D.Love; *Gentiana axillaris*(F.W.Schmidt)Reichenb) - Г. горьковатая = П, Кисл(Евро-Сиб.); Pb(HK); [R.]
1555. *G. promethea*(Juz.)Holub (*Gentiana caucasica* Bieb.) - Г. Прометея = П, Кисл (Субкавк*); Pb, Pc(HK); [Sp.]
1556. *G. caucasea*(Lodd.ex Siros)Holub - Г. кавказская = Кисл(Эукавк.); Pb, Pc(HK); [Rs.]

Сем. 128. APOCYNACEAE Juss. - КУТРОВЫЕ

1557. *Vinca herbacea* Waldst.et Kit. - Барвинок травянистый = Все р-ны
(Субпонт*); Pa(HK); [Pl.] <Pt;Po>
1558. *Trachomitum sarmatiense* Woodson - Кендырь сарматский = Все р-ны
(Понт.-Южносиб.); Aa(HK); [Sp.]

Сем. 129. ASCLEPIADACEAE R.Br. - ЛАСТОВНЕВЫЕ

1559. *Asclepias siriaca* L. - Ваточник сирийский = Ст[авт.](Адвент.[Передняя Азия]); Ra,Rb(HK); [R.]
1560. ★*Periploca graeca* L. - Обвойник греческий = КЕ(Кубань)(Зап.др.средиз.); S(Ch:ll); [R.] <Pm;Po>
1561. *Vincetoxicum albovianum*(Kusn.)Pobed. (*V. stepposum*(Pobed.)A.et D.Love;
V. officinale Ledeb.) - Ластовень степной = Ст,П[Танфильев, Кононов, 1987](Эвксин.); ST(HK); [R.] <Rx>
1562. ★*V. stauropolianum* Pobed. - Л. ставропольский = Ст(Стрижамент), Прик(Брык)(Предкавк.); ST(HK); [Rs.] <Es> l.c. г.Брык (рис. 9)
1563. *V. scandens* Somm.et Levier - Л. лазящий = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Субкавк*); S(HK); [Pl.] <Pmel>
1564. *V. rehmannii* Boiss. - Л. Реманна = Ст,П,Кисл(Кавк.); S(HK); [Sp.] l.c. Владикавказ <Pmel>
1565. *V. laxum*(Bartl.)Gren.et Gord. - Л. рыхлый = КЕ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Субпонт*); Pa(HK); [Pl.] <Pmel>
1566. *V. funebre* Boiss.et Kotschy - Л. погребальный = Ст,П,Кисл(Субкавк*); Dd(HK); [R.] <Pmel>
1567. *V. schmalhausenii*(Kusn.)Stank. - Л. Шмальгаузена = Ст,СК,П,Кисл(Кавк.); Pa(HK); [Sp.] <Pmel>
1568. *Cynanchum acutum* L. - Цинанхум острый = Все р-ны(Субсредиз*); Db,Rb(HK:lh); [Sp.]

Сем. 130. CONVOLVULACEAE Juss. - ВЬЮНКОВЫЕ

1569. *Convolvulus cantabrica* L. - Вьюнок кантибрыйский = КЕ,П(Зап.др.средиз.); Da(HK); [R.]
1570. *C. lineatus* L. - В. узколистный = Ст,СК,П,Кисл(Общедр.средиз.); ST,Da(HK); [Sp.] <Pm>
1571. *C. arvense* L. - В. полевой = Все р-ны(Плюрирег.); ST,Ra,Rb(HK:lh); [Pl.] <Pm>
1572. *Calystegia sepium*(L.)R.Br. - Повой заборный = Все р-ны(Плюрирег.); S,Aa(HK:lh); [Sp.] <Pm>
1573. *C. silvatica*(Kit.)Griseb. (*Convolvulus silvaticus* Kit.; *Calystegia sylvestris*(Willd.)Roem.et Schult.) - П. лесной = Все р-ны(Зап.др.средиз.); S,Aa(HK:lh); [Sp.]

Сем. 131. CUSCUTACEAE Dumort. - ПОВИЛИКОВЫЕ

1574. *Cuscuta epithymum*(L.)L. - Повилика тимьяновая = Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Палеаркт.); ST(T:par); [Pl.]
1575. *C. approximata* Bab. (*C. cupulata* Engelm.) - П. сближенная = Все р-ны (Палеаркт.); ST(T:par); [Pl.]
1576. *C. europaea* l. - П. европейская = КЕ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Pa(T:par); [Sp.] <Pm>
1577. *C. epilinum* Weihe - П. льняная = Ст,П(Плюрирег.); Pa(T:par); [R.]
1578. *C. tinei* Insenga (*C. australis* R.Br.; *C. brevifolia* Vis.) - П. Тина = КЕ,Прик, ТБ(Общедр.средиз.); Ra(T:par); [R.]
1579. *C. campestris* Yunck. - П. полевая = Все р-ны(Адвент.[Дальний Восток]); Ra(T:par); [R.]
1580. *C. monogyna* Vahl. - П. одностолбиковая = Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa(T:par); [Sp.]
1581. *C. lupuliformis* Krock. - П. хмелевидная = П(Вост.др.средиз.); Pa(T:par); [R.]

Сем. 132. HYDROPHYLACEAE R.Br. - ГИДРОФИЛИЕВЫЕ

1582. *Phacelia tanacetifolia* Benth. - Фацелия пижмолистная = П(Адвент.[Сев. Америка]); Ra,Rb(T); [R.]

Сем. 133. HELIOTROPACEAE H.A.Schrader - ГЕЛИОТРОПОВЫЕ

1583. *Argusia sibirica*(L.)Dandy (*Tournefortia sibirica* L.) - Аргузия сибирская = МД,АИ,НК,М,СК(Палеаркт.); Db(НК); [Sp.]
1584. *Heliotropium ellipticum* Ledeb. (*Heliotropium lasiocarpum* Fisch. et C.A.Mey.) - Гелиотроп опушённоплодный = М,СК,КН(Общедр.средиз.); ST,Rb(T); [R.]
1585. *H. europaeum* L. - Г. европейский = Прик,ТБ,НК,М,Ст,СК,П(Субпонт*.); Rb(T); [Sp.]
1586. *H. suaveolens* Bieb. - Г. душистый = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,КН (Субпонт*.); ST,Dc(T); [Sp.]

Сем. 134. BORAGINACEAE Juss. - БУРАЧНИКОВЫЕ

1587. *Aegonichon purpureocaeruleum*(L.)Holub (*Lithospermum purpureocaeruleum* L.; *Buglossoides purpureocaerulea*(L.)Johnst.) - Эгонихон фиолетово-синий = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); S(НК); [Pl.]
1588. *Lithospermum officinale* L. - Воробейник лекарственный = Все р-ны (Палеаркт.); ST,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
1589. *Buglossoides arvensis*(L.)Johnst. (*Lithospermum arvense* L.) - Буглоссоид полевой = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(T); [Pl.] <Pm>

1590. *B. tenuiflora*(L.fil.)Johnst. (*L. tenuiflorum L.fil.*) - Б. тонкоцветковый = МД, АИ, Прик, ТБ, Ст, КН(Общедр.средиз.); Dc(T); [R.]
1591. *Aipyanthus echioides*(l.)Stev. - Айпиант синяковый = Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Sp.]
1592. *Onosma tinctoria* Bieb. (*O. polychroma Klok.ex M.Pop.*) - Оносма красильная = Все р-ны(Субтуран*); ST(T); [Sp.]
1593. *O. caucasica* Levin ex M.Pop. - О. кавказская = П, Кисл(Эукавк.); Pb(HK); [Pl.]
1594. *Cerinthe minor* L. - Восковник малый = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Субсредиз*); Pa, Rb(HK:pb); [Pl.]
1595. *Echium russicum* J.F.Gmel. (*E. rubrum Jacq.*) - Синяк русский = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Субпонт*); Pa(HK:pb); [Pl.]
1596. *E. biebersteinii*(Lacaita)Dobrocz. (*E. italicum L.*) - С. итальянский = КЕ, Ст, СК(Общедр.средиз.); Rb(HK:pb); [Sp.]
1597. *E. vulgare* L. - С. обыкновенный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa, Rb(HK:pb); [Pl.] <Pm; Pmel>
1598. *Symphytum officinale* L. - Окопник лекарственный = Прик, ТБ, НК, М, СК, П (Кума)(Европ.); Aa(HK); [R.] <Pm; Pmel>
1599. *S. caucasicum* Bieb. - О. кавказский = Ст, П, Кисл(Кавк.); S(HK); [Sp.] <Pmel>
1600. *S. asperum* Lepech. - О. шершавый = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Кавк.); S, Rb(HK); [Pl.] <Pmel; Pp>
1601. ★ *S. podcumicum* Frolov - О. подкумский = П, Кисл[Фролов, 1985] (Предкавк.); Aa(HK); [R.] <Pmel> <Es> 1.с. ст. Подкумок (рис.10)
1602. *S. tauricum* Willd. - О. крымский = Ст, ЛН, Кисл(Понтич.); S, Rb(HK:pb); [Sp.] <Pmel>
1603. *Lycopsis orientalis* L. - Кривоцвет восточный = Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa, Ra, Rb(T); [Pl.]
1604. *Borago officinalis* L. - Огуречная трава лекарственная = Ст, СК(Адвент [Европа].); Rb(HK:pb); [R.] <Pa; Pmel; Pm>
1605. *Anchusa officinalis* L. - Воловик лекарственный = Ст, СК(Европ.); Ra, Rb(HK:pb); [Sp.]
1606. *A. gmelinii* Ledeb. - В. Гмелина = КЕ(Понтич.); Db(HK:pb); [R.]
1607. *A. ochroleuca* Bieb. - В. бледно-жёлтый = КЕ, МД, АИ, НК, КН (Понтич.); Db(HK:pb); [Sp.]
1608. *A. azurea* Mill. (*A. italicica Retz.*) - В. итальянский = КЕ, Ст, СК (Общедр.средиз.); Ra, Rb(HK); [Sp.] <Pm>
1609. *Nonea lutea*(Desv.)DC. - Нонея жёлтая = МД, АИ, НК, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Субкавк*); Db, Rb(T); [Pl.]

1610. *N. setosa*(Lehm.)Roem.et Schult. - Н. щетинистая = Прик,ТБ,НК,Ст,П,КН
(Кавк.); ST,Dd(T); [Sp.]
1611. *N. rosea*(Bieb.)Link - Н. розовая = КЕ,Ст,СК(Кавк.); ST,Rb(T); [Sp.] l.c.
Кизляр
1612. *N. caspica*(Willd.)G.Don fil. - Н. каспийская = КН(Ирано-Туран.); ST(T); [R.]
1613. *N. rossica* Stev. (*N. pulla* auct.) - Н. русская = МД,АИ,Прик,ТБ,Ст,СК(Понт.-
Южносиб.); ST,Rb(HK); [Sp.]
1614. *Pulmonaria mollis* Wulf.ex Hornem. (*Pulmonaria mollissima* A.Kerner) -
Медуница мягкая = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Сиб.); S(HK); [Pl.] <Pm; Pmel>
1615. *Myosotis amoena*(Rupr.)Boiss. - Незабудка приятная = П,Кисл(Эвксин.);
S(HK); [Sp.]
1616. *M. sparsiflora* Pohl - Н. редкоцветковая = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл
(Палеаркт.); S,Aa(T); [Sp.]
1617. *M. palustris*(L.)L. - Н. болотная = Кисл(Голаркт.); Aa(HK); [Sp.]
1618. *M. cespitosa* K.F.Schultz - Н. дернистая = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Голаркт.);
Aa(HK); [Sp.]
1619. *M. micrantha* Pall.ex Lehm. - Н. мелкоцветковая = Ст,СК,П(Палеаркт.);
Db(T); [R.]
1620. *M. arvensis* (L.)Hill - Н. полевая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(T); [Pl.] <Pm>
1621. *M. sylvatica* Ehrh.ex Hoffm. - Н. лесная = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл
(Европ.); S(T); [Pl.]
1622. *M. lithospermifolia*(Willd.)Hornem. (*M. suaveolens* auct.) - Н.
воробейниколистная = Ст,СК,П(Палеаркт.); Pa,Pb(HK); [Sp.]
1623. *M. alpestris* F.W.Schmidt - Н. альпийская = П,Кисл(Евро-Кавк.); Pb(HK);
[Pl.]
1624. *Lappula squarrosa*(Retz.)Dumort. (*L. myosotis* Moench; *L. echinata* Gilib. nom.
invalid.) - Липучка ежевидная = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Rb(T); [Pl.]
1625. *L. heteracantha*(Ledeb.)Borb. - Л. разношипая = Ст,СК,П,Кисл(Понт.-
Южносиб.); ST(T); [R.]
1626. *L. barbata*(Bieb.)Guerke - Л. бородчатая = Все р-ны(Ирано-Туран.);
ST,Rb(T); [Pl.]
1627. *L. filiformis*(Godet)Kusn. - Л. нитевидная = Кисл(Эукавк.); ST(T); [R.]
1628. *L. patula*(Lehm.)Menyharth - Л. пониклая = Все р-ны(Общедр.средиз.);
Rb(T); [Sp.]
1629. *L. marginata*(Lehm.)Guerke - Л. окаймлённая = М,КН(Туранск.); ST(T); [R.]
1630. *Asperugo procumbens* L. - Асперуга простёртая = Все р-ны(Палеаркт.);
Rb(T); [Sp.]
1631. *Rochelia retorta*(Pall.)Lipsky - Рожелия согнутая = КЕ,Прик,ТБ,Ст,СК
(Субтуран*.); Pa(T); [R.]

1632. ★ *Rindera tetraspis* Pall. - Риндера четырёхщитковая = СК,П(Субтуран*.);
ST(HK); [Rs.] <Rx>
1633. ★ *Omphalodes scorpioides*(Haenke)Schrink - Пупочник ползучий =
Ст(Европ.); S(T); [Rs.] <Rg>
1634. ★ *Solenanthus biebersteinii* DC. - Трубкоцвет Биберштейна = Прик,Ст
(Стрижамент)(Эвксин.); S(HK); [Rs.] <Rg>
1635. *Cynoglossum officinale* L. - Чернокорень лекарственный = Все р-ны
(Палеаркт.); Rb(HK:pb); [Pl.] <Pm>
1636. *C. germanicum* Jacq. (*C. montanum* L.) - Ч. германский = Ст(Европ.);
S(HK:pb); [Sp.]

Сем. 135. VERBENACEAE J.St.-Hil. - ВЕРБЕНОВЫЕ

1637. *Verbena officinalis* L. - Вербена лекарственная = Все р-ны(Плюрирег.);
Rb(HK); [Pl.] <Pm>
1638. *V. supina* L. - В. лежачая = МД,АИ(Общедр.средиз.); Db,Dd(T); [R.]

Сем. 136. LAMIACEAE Lindl. - ЯСНОТКОВЫЕ(ГУБОЦВЕТНЫЕ)

1639. *Ajuga reptans* L. - Живучка ползучая = Ст(Палеаркт.); Pa(HK); [R.] <Pm>
1640. *A. genevensis* L. - Ж. женевская = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(HK); [Pl.] <Pm>
1641. *A. orientalis* L. - Ж. восточная = Все р-ны(Зап.др.средиз.); ST(HK:ephd);
[Pl.]
1642. *A. laxmannii*(L.)Benth. - Ж. Лаксмана = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Понтич.);
Pa(HK); [Sp.]
1643. *A. chia* Schreb. - Ж. хиосская = КН(Общедр.средиз.); ST(T); [R.] <Pm>
1644. *A. glabra* C.Presl. (*A. pseudochia* Shost.) - Ж. голая = КЕ,МД,АИ,
НК,Прик,ТБ,Ст,СК(Зап.др.средиз.); ST,Rb(T); [Pl.]
1645. *Teucrium orientale* L. - Дубровник восточный = Кисл(Субкавк.*); Da(Ch:sf);
[R.]
1646. *T. scordioides* Schreb. - Д. скордиевидный = Прик,ТБ,НК,СК,П
(Общедр.средиз.); Aa(HK); [Sp.]
1647. *T. nuchense* C.Koch - Д. нухинский = Все р-ны(Субкавк*.); Pa(HK); [Pl.]
1648. *T. chamaedrys* L. - Д. обыкновенный = Все р-ны(Субпонт*.); Pa(Ch:sf); [Sp.]
<Pm>
1649. *T. polium* L. - Д. белый = Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa,ST(Ch:sf); [Pl.]
<Pm>
1650. *Scutellaria galericulata* L. - Шлемник обыкновенный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл
(Палеаркт.); Aa(HK); [Sp.] <Pm>
1651. *S. hastifolia* L. - III. копьелистный = Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл
(Европ.); Aa(HK); [Sp.]

1652. *S. altissima* L. - Ш. высочайший = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субсредиз*.); S(НК); [Sp.]
1653. ★*S. polyodon* Juz. - Ш. многозубый = [Ст: Танфильев, Кононов, 1987],ЛН, П,Кисл(Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Po> л.с. Кисловодск
1654. *S. oreophila* Grossh. - Ш. горолюбивый = П,Кисл(Кавк.); Pb(Ch:sf); [Pl.]
1655. *Marrubium praecox* Janka - Шандра ранняя = Все р-ны(Понтич.); ST,Rb(НК); [Pl.] <Pmel>
1656. *M. vulgare* L. - Ш. обыкновенная = КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Общедр.средиз.); Pa,Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1657. *M. catariifolium* Desr. - Ш. котовниколистная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Субкавк*.); ST(НК); [Sp.]
1658. *M. leonuroides* Desr. - Ш. пустырниковая = СК,П,Кисл(Кавк.); ST,Rb(НК); [Pl.]
1659. *M. peregrinum* L. - Ш. чужеземная = КЕ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Понтич.); ST(НК); [Sp.]
1660. *Sideritis montana* L. - Железница горная = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST(T); [Pl.]
1661. *S. comosa*(Rochel ex Benth.)Stank. - Ж. хохлатая = Ст,СК,П,Кисл (Средиземн.); ST(T); [Sp.]
1662. *Nepeta cataria* L. - Котовник кошачий = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
1663. *N. grandiflora* Bieb. - К. крупноцветковый = ЛН,П,Кисл(Кавк.); Pa,Pb(НК); [Sp.]
1664. *N. kubanica* Pojark. - К. кубанский = СК,Кисл(Эвксин.); ST(НК); [R.]
1665. *N. pannonica* L. - К. венгерский = Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК); [Pl.]
1666. *N. parviflora* Bieb. - К. мелкоцветковый = МД,АИ,Прик,ТБ,НК,Ст (Понтич.); ST,Rb(НК); [R.]
1667. *Glechoma hederacea* L. - Будра плющевидная = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Палеаркт.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1668. *Dracocephalum thymiflorum* L. - Змееголовник чебрецоцветковый = Ст, ЛН,СК(Евро-Сиб.); Rb(T); [R.] <Pmel>
1669. *D. moldavica* L. - З. молдавский = СК,Кисл(Евро-Сиб.); Rb(T); [R.] <Pm;Pmel;Po>
1670. *D. ruyschiana* L. - З. Руйша = Ст,П,Кисл(Палеаркт.); Pb(НК); [Sp.] <Pmel;Po>
1671. *D. austriacum* L. - З. австрийский = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Кавк.); Pb(НК); [Pl.] <Pmel;Po>
1672. *Lallemandia iberica*(Bieb.)Fisch. et C.A.Mey. - Ляллемандия грузинская = Ст,СК(Средиземн.); ST,Rb(T); [R.] <Pmel>

1673. *Prunella vulgaris* L. - Черноголовка обыкновенная = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(HK); [Pl.] <Pm>
1674. *P. laciniata*(L.)L. - Ч. разрезная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Кавк.); Pa,Aa(HK); [R.]
1675. *P. grandiflora*(L.)Scholl. - Ч. крупноцветковая = П,Кисл(Европ.); S,Pa(HK); [Sp.]
1676. *Phlomis pungens* Willd. - Зопник колючий = Все р-ны(Субпонт*.); ST(HK); [Pl.] <Pm>
1677. ★*Ph. majkopensis*(Novopokr.)Grossh. - З. майкопский = Ст(Предкавк.); ST(HK); [R.] l.c. Майкоп <Esub>
1678. *Phlomoides tuberosa*(L.)Moench (*Phlomis tuberosa* L.) - Фломоидес (Зопник) клубненосный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(HK); [Pl.] <Pa;Pm>
1679. *Galeopsis ladanum* L. - Пикульник ладанниковый = Ст,СК,П(Евро-Кавк.); Ra,Rb(T); [R.] <Pmel>
1680. *G. bifida* Boenn. - П. двунадрезанный = КЕ,Ст,СК,П(Палеаркт.); S(T); [Sp.] <Pmel>
1681. *Lamium amplexicaule* L. - Яснотка стеблеобъемлющая = Все р-ны (Палеаркт.); Pa,Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>
1682. *L. paczoskianum* Worosch. - Я. Пачосского = МД,[Ст(Сенгилеевское оз.),авт.](Субтуран*.); ST,Rb(T); [Sp.]
1683. *L. maculatum*(L.)L. - Я. пятнистая = Ст,П,Кисл(Европ.); S,Pa(HK); [Sp.] <Pmel>
1684. *L. album* L. - Я. белая = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(HK); [Pl.] <Pm;Pmel>
1685. *L. purpureum* L. - Я. пурпурная = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(T); [Pl.] <Pmel>
1686. *Chaiturus marrubiastrum*(L.)Reichenb. - Гривохвост шандровый = МД,АИ, Ст,ЛН,П(Палеаркт.); Rb(HK); [Sp.]
1687. *Leonurus quinquelobatus* Gilib - Пустырник пятилопастный = Все р-ны (Евро-Сиб.); Rb(HK); [Sp.] <Pm;Pmel>
1688. *L. glaucescens* Bunge - П. сизый = МД,СК(Субтуран*.); Rb(HK); [R.] <Pmel>
1689. *Molucella laevis* L. - Молюцелла гладкая = КЕ,Ст,СК,П(Зап.др.средиз.); Rb(T); [R.]
1690. *Ballota nigra* L. - Белокудренник чёрный = Все р-ны(Европ.); S,Rb(HK); [Pl.] <Pm>
1691. *Stachys germanica* L. - Чистец германский = Все р-ны(Европ.); S,Pa,Rb(HK); [Sp.] <Pmel>
1692. *S. intermedia* Ait. - Ч. промежуточный = Ст,П,Кисл(Субкавк*); Pa,Pb(HK); [Sp.] <Pmel>
1693. *S. balansae* Boiss.et Kotschy - Ч. Балансы = Ст,ЛН,П,Кисл(Субкавк*); Pa(HK); [Sp.] <Pmel>

1694. *S. sylvatica* L. - Ч. лесной = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Евро-Сиб.); S(HK); [Pl.] <Pm; Pmel>
1695. *S. palustris* L. - Ч. болотный = Прик, ТБ, НК, Ст, СК, (Палеаркт.); Аа(HK); [R.] <Pmel>
1696. *S. atherocalyx* C.Koch - Ч. острочашечковый = Все р-ны (Субкавк*.*); Dc(HK); [Sp.] <Pmel>
1697. *S. pubescens* Ten. - Ч. пушистый = П(Субкавк*.*); Pa, ST(HK); [R.] <Pmel>
1698. *S. annua*(L.)L. - Ч. однолетний = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Евро-Кавк.); Ra, Rb(T); [Sp.] <Pmel>
1699. *Betonica macrantha* C.Koch (*B. grandiflora* Willd.; *Stachys macrantha* (C.Koch) Stearn) - Буквица крупноцветковая = П, Кисл (Ирано-Туран.); Pb(HK); [Pl.] <Po>
1700. *B. officinalis*L. (*S. officinalis*(L.)Trevis ; *B. peraucta* Klok.) - Б. сильно-расширенная = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); Pa(HK); [Pl.]
1701. *Salvia glutinosa* L. - Шалфей железистый = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Евро-Кавк.); S(HK); [Sp.] <Pm>
1702. *S. viridis* L. - Ш. зелёный = СК, П(Средиземн.); ST, Rb(T); [R.]
1703. *S. canescens* C.A.Mey. - Ш. седеющий = Кисл (Эукавк.); Da, Dd(HK); [Sp.] [l.c. Кисловодск]
1704. *S. aethiops* L. - III. эфиопский = Все р-ны (Общедр. средиз.); ST, Da(HK); [Pl.] <Pm>
1705. ★ *S. nutans* L. - III. поникающий = КЕ, Прик, ТБ, Ст, СК (Понтич.); ST(HK); [R.] <Po>
1706. *S. kuznetzovii* Sosn. - III. Кузнецова = Кисл (Эукавк.); Da(HK); [Sp.]
1707. *S. tesquicola* Klok. et Pobed. - Ш. сухостепной = Все р-ны (Субтуран*.*); ST(HK); [Pl.] <Pmel>
1708. *S. nemorosa* L. (*S. deserta* Schang.) - Ш. пустынный = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М (Туранск.); ST(HK); [R.]
1709. *S. fugax* Pobed. - III. опадающий = М, СК (Эукавк.); ST(HK); [R.] <Rx>
1710. *S. virgata* Jacq. - Ш. лозный = Кисл (Евро-Сиб.); Pb(HK); [R.]
1711. *S. reflexa* Hornem. - Ш. отогнутый = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М, Ст, СК (Адвент. [Европа]); Ra, Rb(T); [R.]
1712. *S. verticillata* L. - Ш. мутовчатый = Все р-ны (Понт.-Южносиб.); Pa, Rb(HK); [Pl.] <Pm; Pmel>
1713. *Ziziphora capitata* L. - Зизифора головчатая = П, Кисл (Субкавк*.*); Da, Db(T); [R.]
1714. *Melissa officinalis* L. - Мелисса лекарственная = П, Кисл (Общедр. средиз.); Pa(HK); [Sp.] <Pm>
1715. *Satureja hortensis* L. (*Satureja laxiflora* C.Koch) - Чабер садовый = Ст, П (Понтич.); Da, Rb(T); [Sp.] <Pmel>

1716. *S. pachyphylla* C.Koch - Ч. толстолистный = КН(Понтич.); ST(T); [R.] <Rx>
1717. *Calamintha caucasica* Somm.et Levier - Душевник кавказский = Кисл(Кавк.); Da(T); [R.]
1718. *C. grandiflora*(L.)Moench - Д. рупноцветковый = Ст(Евро-Кавк.); S(HK); [R.]
1719. *Clinopodium vulgare* L. - Пахучка обыкновенная = Все р-ны(Евро-Сиб.); S(HK); [Pl.] <Pm>
1720. *Acinos arvensis*(Lam.)Dandy (*A. thymoides* Moench) - Душевка полевая = Все р-ны(Евро-Кавк.); S,Pa(T); [Pl.]
1721. *A. rotundifolius* Pers. (*A. graveolens*(Bieb.)Link) - Д. округлолистная = Все р-ны(Субпонт*.); ST(T); [Sp.]
1722. *Hyssopus angustifolius* Bieb. - Иссоп узколистный = П(Субкавк*.); ST(HK); [R.]
1723. *Origanum vulgare* L. - Душица обыкновенная = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(HK); [Pl.] <Pm;Pmel>
1724. *Thymus marschallianus* Willd. (*Th. dimorphus* Klok.et Shost.) - Чебрец Маршаллов = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Pa,ST(Ch:sf); [Pl.] <Pm;Pmel>
1725. ★ *Th. pastoralis* Iljin ex Klok. - Ч. пастуший = СК,П,Кисл(Кавк.); ST(Ch:sf); [R.] <Pmel> 1.с. Кисловодск
1726. ★ *Th. markhotensis* Maleev - Ч. маркхотский = П(Машук)[Меницкий, 1986],Кисл(Кр.-Новоросс.); Da(Ch:sf); [Rs.] <Pmel> <Rx>
1727. ★ *Th. elisabethae* Klok.et Schost. - Ч. Елизаветы = П(Машук)[гербарий БИН, сборы С.С.Иконникова и Н.П.Литвинова](Эукавк.); ST(CH:sf); [Rs.]
1728. ★ *Th. pallasianus* H.Br. - Ч. Палласа = Прик(Донская Балка),П,КН(Европ.); Db(Ch:sf); [Rs.] <Pmel> <Rx>
1729. ★ *Th. daghestanicus* Klok.et Shost. (*Th. mashukensis* Klok.) - Ч. дагестанский = Прик(Донская балка, Бешпагир)[Меницкий, 1986],Ст,СК,П(Предкавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Pmel>
1730. ★ *Th. pseudopulegioides* Klok.et Shost. - Ч. ложноблошиный = Кисл(Эукавк.); Pb(Ch:sf); [R.] <Esub>
1731. *Lycopus europaeus* L. - Зюзник европейский = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(HK); [Sp.] <Pm>
1732. *L. exaltatus* L.fil. - З. высокий = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(HK); [R.]
1733. *Mentha arvensis* L. - Мята полевая = KE,Ст,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Aa(HK); [Sp.] <Pm;Pmel>
1734. *M. aquatica* L. - М. водная = НК,П,Кисл(Палеаркт.); Aa(HK); [Sp.] <Pmel>
1735. *M. caucasica* Gand. (*M. longifolia*(L.)Huds.) - М. кавказская = Все р-ны (Кавк.); Aa(HK); [Pl.] <Pm;Pmel>
1736. *M. spicata* L. - М. колосовая = Ст,ЛН,СК(Субсредиз*.); Aa,Rb(HK); [R.]
1737. *M. piperita* L. - М. перечная = Ст,П,Кисл(Адвент.[одичавшее культурное]); Rb(HK); [Sp.] <Pm>

Сем. 137. SOLANACEAE Juss. - ПАСЛЁНОВЫЕ

1738. *Nicandra physaloides*(L.)Gaertn. - Никандра физалисовидная = КЕ,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Адвент.[Южн.Америка]); Rb(T); [R.]
1739. *Lycium barbarum* L. - Дереза бородчатая = МД,АИ,Прик,ТБ,НК,Ст (Адвент. [Сев.Африка,Иран]); Rb(Ch); [Sp.]
1740. ★★ *Atropa caucasica* Kreyer - Красавка кавказская = П,Кисл(Субкавк.); S(HK); [R.] <Pm;Pt>
1741. ★ *Physochlaina orientalis*(Bieb.)G.Don fil. - Пузырница восточная = П,Кисл (Субкавк*); Pb(HK); [Sp.] <Pt> l.c. Кисловодск
1742. *Hyoscyamus niger* L. (*H. bohemicus* F.W.Schmidt) - Белена чёрная = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(HK:pb); [Pl.] <Pm;Pt>
1743. *Physalis alkekengi* L. - Физалис обыкновенный = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Европ.); S,Rb(HK); [Pl.] <Pa;Pm;Po>
1744. *Solanum nigrum* L. - Паслён чёрный = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pa;Pt;Pm>
1745. *S. schultesii* Opiz (*S. decipiens* Opiz) - П. Шультеца = СК(Евро-Кавк.); Rb(T); [R.] <Pt>
1746. *S. villosum* Mill. (*S. luteum* Mill.) - П. мохнатый = Ст(Субсредиз*); Rb(T); [R.] <Pt>
1747. *S. pseudopersicum* Pojark. - П. ложноперсидский = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Субкавк*); S,Rb(Ch:sf:lh); [Pl.] l.c. Машук <Pt;Pm>
1748. *S. persicum* Willd.ex Roem. - П. персидский = КН(Арmeno-Иран.); Aa(Ch); [Sp.]
1749. *S. cornutum* Lam. (*S. rostratum* Dun.) - П. рогатый = КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Ст, ЛН,КН(Адвент.[Сев.Америка]); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pt>
1750. *Datura stramonium* L. - Дурман обыкновенный = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.] <Pm;Pt>

Сем. 138. SCROPHULARIACEAE Juss. - НОРИЧНИКОВЫЕ

1751. *Verbascum phlomoides* L. - Коровяк лекарственный = КЕ,Ст(Европ.); Pa(HK:pb); [Sp.] <Pm>
1752. *V. densiflorus* Bertol. (*V. thapsiforme* Schrad.) - К. редкоцветковый = Ст(Европ.); ST(HK); [R.] <Pm>
1753. *V. thapsus* L. - К. обыкновенный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Rb(HK); [Pl.] <Pm>
1754. *V. lychnitis* L. - К. мучнистый = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Европ.); Pa(HK); [Sp.]
1755. *V. marschallianum* Ivanina et Tzvel. (*V. austriacum* Schott; *V. orientale* Bieb.) - К. Маршалла = Ст(Субтуран*); Pa(HK); [R.] <Rx>

1756. *V. laxum* Filar. et Jav. - К. раскидистый = Все р-ны(Кавк.); Pa(НК); [Pl.]
1757. *V. nigrum* L. - К. чёрный = Ст(Ставрополь)[Гроссгейм, 1967](Палеаркт.); Pa(НК); [Rs.] <Rg>
1758. *V. ovalifolium* Donn ex Sims - К. овальнолистный = КЕ,МД,АИ,НК,Прик, ТБ,М,Ст,КН(Понтич.); ST,Db(НК); [R.]
1759. *V. pyramidatum* Bieb. - К. пирамидальный = КЕ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Субкавк*.); Pa(НК); [Pl.]
1760. *V. blattaria* L. - К. тараканий = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,КН (Палеаркт.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pm>
1761. *V. phoeniceum* L. - К. фиолетовый = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Pl.]
1762. *Linaria vulgaris* Mill. - Льнянка обыкновенная = Все р-ны(Европ.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
1763. *L. biebersteinii* Bess. - Л. Биберштейна = КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Ст,СК (Понтич.); Pa(НК); [Sp.]
1764. *L. ruthenica* Blonski - Л. русская = КЕ,МД,АИ,Прик,ТБ,НК(Понт.- Южносиб.); ST(НК); [R.]
1765. *L. macroura*(Bieb.)Bieb. - Л. крупнохвостая = КЕ,МД,АИ(Понтич.); ST,Db(НК); [R.]
1766. *L. incompleta* Kuprian. - Л. неполноцветковая = Все р-ны(Туранск.); ST,Db(НК); [Sp.]
1767. *L. odora*(Bieb.)Fisch. - Л. душистая = НК(Понтич.); Db(НК); [R.]
1768. *L. genistifolia*(L.)Mill. (*L. pontica* Kuprian.) - Л. дроколистная = КЕ,МД,АИ, НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК(Кавк.); Pa(НК); [Pl.]
1769. *L. caucasigena* Kem.-Nath. - Л. кавказская = Кисл(Кавк.); Pb(НК); [R.]
1770. *Chaenorhinum minus*(L.)Lamge (*Ch. viscidum*(Moench)Simonk) - Хеноринум малый = П,Кисл(Евро-Кавк.); Da(T); [R.]
1771. ★*Scrophularia lateriflora* Trautv. - Норичник бокоцветный = Ст(Кавк.); Da(НК); [R.] <Rg>
1772. *S. scopolii* Hoppe ex Pers. - Н. Скополи = Ст,П,Кисл(Общедр.средиз.); S(НК); [R.]
1773. *S. divaricata* Ledeb. - Н. растопыренный = Ст,ЛН,П,Кисл(Кавк.); S(НК); [Sp.]
1774. *S. mollis* Somm. et Levier - Н. мягкий = Ст,П,Кисл(Эукавк.); Da(НК); [R.]
1775. *S. nodosa* L. - Н. узловатый = Все р-ны(Панбор.); S,Aa(НК); [R.] <Pm;Pmel>
1776. *S. umbrosa* Dumort. (*S. alata* Gilib. nom. invalid.) - Н. теневой = Ст,СК, П,Кисл(Палеаркт.); S(НК); [Sp.]
1777. *S. variegata* Bieb. - Н. пёстрый = П,Кисл(Субкавк*.); Da(НК); [Pl.]
1778. *S. rupestris* Bieb. ex Willd. - Н. скальный = СК,П,Кисл(Субкавк*.); Da(НК); [Pl.]

1779. *Dodartia orientalis* L. - Додарция восточная = МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М, СК, КН(Ирано-Туран.); Db, Dd(НК); [Sp.]
1780. *Gratiola officinalis* L. - Авран лекарственный = Ст(Голаркт.); Аа(Т); [Rs.] <Pm>
1781. *Veronica spicata* L. - Вероника колосистая = Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
1782. *V. orchidea* Crantz - В. орхидная = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Европ.); Pa(НК); [Sp.]
1783. *V. spuria* L. - В. ненастоящая = Ст, СК, П(Евро-Сиб.); Аа(НК); [R.]
1784. *V. longifolia* L. - В. длиннолистная = Ст, ЛН, СК, П(Палеаркт.); Аа(НК); [R.]
1785. *V. gentianoides* Vahl - В. горечавковая = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Кавк.); Pa(НК); [Pl.]
1786. *V. serpyllifolia* L. - В. тимьянолистная = НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]
1787. *V. monticola* Trautv. - В. горная = П, Кисл(Кавк.); Pb(НК); [R.] <Rg>
1788. *V. anagallis-aquatica* L. - В. ключевая = Все р-ны(Палеаркт.); Аа, Ab(К); [Pl.] <Pm>
1789. *V. anagalloides* Guss. - М. ложноключевая = П(Общедр.средиз.); Аа(НК); [R.]
1790. *V. beccabunga* L. - В. поточная = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.] <Pm>
1791. *V. officinalis* L. - В. лекарственная = Кисл(Евро-Сиб.); S(НК); [R.] <Pm>
1792. *V. magna* M.Fisch. (*V. melissifolia* Desf. ex Poir.) - В. большая = Ст, П, Кисл(Субкавк*); S(НК); [Sp.]
1793. *V. peduncularis* Bieb. - В. цветоножковая = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Субкавк*); S(НК); [Pl.]
1794. *V. umbrosa* Bieb. - В. теневая = П, Кисл(Субкавк*); S(НК); [Sp.]
1795. *V. chamaedrys* L. - В. дубравная = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Палеаркт.); S, Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1796. *V. caucasica* Bieb. - В. кавказская = П, Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
1797. *V. scutellata* L. - В. щитковая = Ст(Палеаркт.); Аа, Ab(НК); [R.]
1798. *V. teucrium* L. - В. широколистная = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); S, Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1799. *V. prostrata* L. - В. простёртая = КЕ(Кубань), П, Кисл(Палеаркт.); Pa, ST(НК); [R.]
1800. *V. jacquinii* Baumg (*V. austriaca* L.) - В. Жаквина = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Субкавк*); ST(НК); [Sp.]
1801. *V. multifida* L. - В. многораздельная = Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Субтуран*); ST, Da(НК); [Sp.]

1802. *V. orientalis* Mill. - В. восточная = Ст,П,Кисл(Субкавк*.); ST,Da(HK); [R.]
 <Pp>
1803. *V. ceratocarpa* C.A.Mey. - В. рогоплодная = СК(Кума)(Субкавк*.); Pa(T);
 [R.] <Rg>
1804. *V. arvensis* L. - В. полевая = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Ra(T); [Sp.]
1805. *V. verna* L. - В. весенняя = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Db(HK); [Sp.]
1806. *V. dillenii* Crantz - В. Дилленя = Ст,ЛН,П,Кисл(Палеаркт.); ST,Da(HK); [Sp.]
1807. *V. hederifolia* L. - В. плющелистная = Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл
 (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
1808. *V. triphyllus* L. - В. трёхлистная = КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Ст,СК,ЛН
 (Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.]
1809. *V. praecox* All. - В. ранняя = Все р-ны(Средиземн.); ST(T); [Sp.]
1810. *V. polita* Fries (*V. didyma* Ten.) - В. изящная = Все р-ны(Палеаркт.);
 Ra,Rb(T); [Pl.]
1811. *V. persica* Poir. - В. персидская = Все р-ны(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Pl.]
1812. *V. filiformis* Smith - В. нитевидная = Все р-ны(Субкавк*.); S,Pa(T); [Sp.]
1813. *Melampyrum elatius*(Boiss.)Soo - Марьинник высокий = П,Кисл(Эвксин.);
 Pb(N:hpar); [Sp.]
1814. *M. arvense* L. - М. полевой = Все р-ны(Европ.); Pa(T:hpar); [Pl.] <Pmel>
1815. *M. argyrocomum*(Fisch.ex Ledeb.)K.-Pol. - М. серебристохолмчатый = Ст,П
 (Европ.); [Попова, 1980]; Pa(T:hpar); [R.]
1816. *Euphrasia pectinata* Ten. (*Euphrasia tatarica* Fisch.ex Spreng.) - Очанка
 гребенчатая = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Pa(T:hpar); [Pl.]
1817. *E. hirtella* Jord.ex Rent. - О. волосистенькая = Ст,Кисл[Галушко,
 1980](Палеаркт.); Pb(T:hpar); [Sp.]
1818. *E. petiolaris* Wettst. - О. черешковая = Кисл(Кавк.); Pb(T:hpar); [Sp.]
1819. *Orthanthera lutea*(L.)Rauschert (*Orthantha lutea*(L.)A.Kerner ex Wettst.) -
 Ортанта жёлтая = Ст,П,Кисл(Понтич.); Pa(T:hpar); [R.]
1820. *Odontites vulgaris* Moench (*O. rubra*(Baumg.)Opiz; *O. serotina*(Lam.) Dumort.)
 - Зубчатка обыкновенная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Pa,Rb(T); [Sp.]
1821. *Rhinanthus minor* L. - Погремок малый = Кисл(Евро-Сиб.); Pb(T:hpar); [Pl.]
1822. *R. vernalis*(N.Zing.)Schischk.et Serg. (*R. aestivalis*(N.Zing.) Schischk.et Serg.) -
 П. весенний = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Сиб.); Pa(T:hpar); [Pl.]
1823. *Rh. subulatus*(Chabert)Soo - П. шиловидный = П,Кисл(Кавк.); Pa,ST(T:hpar);
 [Sp.]
1824. *Rhynchocorys orientalis*(L.)Benth. - Хоботник восточный = Ст,ЛН,СК,
 П,Кисл(Кавк.); Pb(T); [Sp.]
1825. ★*Pedicularis willhelmsiana* Fisch.ex Bieb. - Мытник Вильгельмса = П,Кисл
 (Субкавк*.); Pb(HK:hpar); [Sp.] <Rg> l.c. Бештау

1826. ★ *P. palustris* L. - М. болотный = Кисл(Кисловодск)(Евро-Сиб.); Аа(Т:hpar); <Rg>
1827. *P. kaufmannii* Pinzg. - М. Кауфмана = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Понт.-Южносиб.); Ра(НК:hpar); [Pl.]
1828. *Lathraea squamaria* L. - Петров крест чешуйчатый = Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); С(НК:par); [Pl.]

Сем. 139. MARTYNIACEAE Stapf - МАРТИНИЕВЫЕ

1829. *Proboscidea louisiana*(Mill.)Thell. - Пробосцидея луизианская = КЕ, Ст (Адвент.[Сев.Америка]); Ра, Рб(Т); [R.]

Сем. 140. OROBANCHACEAE Vent. - ЗАРАЗИХОВЫЕ

1830. ★ *Diphelipaea coccinea*(Bieb.)Nocolson (*Phelipaea coccinea*(Bieb.) Poir.) - Дифелипея красная = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Субкавк*); Ра(К:par); [Sp.]
1831. *Phelipanche ramosa*(L.)Pomel (*Orobanche ramosa* L.) - Фелипанхе (Заразиха) ветвистая = Все р-ны(Субсредиз*); Ра(Т:par); [Sp.] <Pm>
1832. *Ph. dalmatica*(G.Beck)Sojak (*O. dalmatica*(G.Beck)Tzvel.) - Ф.(З.) далматская = П(Эвксин.); Ра(Т:par); [R.]
1833. *Ph. mutelii*(F.Schultz)Czer. (*O. mutelii* F.Schultz) - Ф.(З.) Мутеля = П (Зап.др.средиз.); Ра(Т:par); [Sp.]
1834. *Ph. laevis*(L.)Holub (*O. arenaria* Borkh) - Ф.(З.) гладкая = Ст, СК, П(Понт.-Южносиб.); СТ(Т:par); [R.]
1835. *Ph. lanuginosa*(C.A.Mey.)Holub (*O. lanuginosa*(C.A.Mey.)Greuter et Burdet; *O. caesia* Reichenb.) - Ф.(З.) голубая = КЕ, Ст, СК, П, Кисл(Палеаркт.); СТ(Т:par); [Sp.]
1836. *Ph. purpurea*(Jacq.)Sojak (*O. purpurea* Jacq.) - Ф.(З.) пурпуровая = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Палеаркт.); Ра(Т:par); [Sp.]
1837. *Orobanche coerulescens* Steph. - Заразиха синеватая = Все р-ны(Палеаркт.); СТ(Т:par); [Sp.]
1838. *O. cernua* Loefl. - З. поникшая = Все р-ны(Зап.др.средиз.); Ра, Ра(Т:par); [Sp.]
1839. *O. cumana* Wallr. - З. подсолнечниковая = Все р-ны(Палеаркт.); Ра, Рб(Т:par); [Sp.]
1840. *O. picridis* F.Schultz - З. горчаковая = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Евро-Кавк.); С(Т:par); [R.]
1841. *O. alba* Steph. - З. белая = Ст, П, Кисл(Зап.др.средиз.); Ра(Т:par); [Pl.]
1842. *O. reticulata* Wallr. - З. сетчатая = Кисл(Палеаркт.); Ра(Т:par); [R.]
1843. *O. raddeana* G.Beck - З. Радде = П, Кисл(Субкавк*); Pb(Т:par); [Sp.]

1844. *O. crenata* Forrsk. (*O. owerinii*(*G. Beck*)*G. Beck*) - З. Оверина = Все р-ны
(Субкавк*.); S,Pa(T:par); [Sp.]
1845. *O. gamosepala* Reut. - З. сростночашелистниковая = П,Кисл(Кавк.);
Pa,Pb(T:par); [Sp.] l.c. Машук
1846. *O. lutea* Baumg. - З. жёлтая = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.);
Pa(T:par); [Sp.]
1847. *O. caryophyllacea* Smith (*O. vulgaris* Poir.) - З. гвоздичная = Все р-ны
(Зап.др.средиз.); Pa,ST(T:par); [Sp.]
1848. *O. elatior* Sutt. (*O. major* L. p.p.nom.abig.) - З. высокая = Все р-ны
(Палеаркт.); ST(T:par); [R.]
1849. *O. alsatica* Kirschl. - З. эльзасская = СК,П,Кисл(Палеаркт.); Pa(T:par); [Pl.]
1850. *O. inulae* Novopokr.et Abramov - З. девясиоловая = П,Кисл(Кавк.); Pb(T:par);
[Sp.]
1851. *O. gracilis* Smith. - З. тонкая = Кисл(Палеаркт.); Pa(T:par); [R.]
1852. *O. colorata* C.Koch - З. покрашенная = Ст,П(Субкавк*.); S(T:par); [R.]

Сем. 141. LENTIBULARIACEAE Rich. - ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ

1853. ★ *Utricularia vulgaris* L. - Пузырчатка обыкновенная = МД,НК,М,Ст,
(Голаркт.); Ac(T); [R.] <Pi><Rg>

Сем. 142. GLOBULARIACEAE DC. - ШАРОВНИЦЕВЫЕ

1854. ★★ *Globularia punctata* Lapeyr. (*G. elongata* Hegetschw.) - Шаровница
пятнистая = Прик,Ст(Зап.др.средиз.); Db(HK); [Rs.] <Rx>

Сем. 143. PLANTAGINACEAE Juss. - ПОДОРОЖНИКОВЫЕ

1855. *Plantago major* L. - Подорожник большой = Все р-ны(Палеаркт.);
Pa,Rb(HK:pb); [Pl.] <Pm>
1856. *P. tenuiflora* Waldst.et Kit. - П. тонкоколосый = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М
(Палеаркт.); Db,Dc(HK); [Sp.]
1857. *P. cornuti* Gouan - П. Корнута = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,КН(Палеаркт.);
Dc(HK); [R.]
1858. *P. media* L. - П. средний = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(HK); [Pl.] <Pm>
1859. *P. urvilei* Opiz (*P. stepposa* Kuprian.) - П. Урвиля = Все р-ны(Понт.-
Южносиб.); ST,Rb(HK); [Sp.]
1860. *P. maxima* Juss.ex Jacq. - П. крупный = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,ЛН,СК
(Евро-Сиб.); Dc(HK); [R.]
1861. *P. salsa* Pall. - П. солончаковый = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,КН
(Плюрирег.); Dc(HK); [Sp.]
1862. *P. lanceolata* L. - П. ланцетолистный = Все р-ны(Плюрирег.); ST(HK); [Pl.]
<Pm>

1863. *Psyllium scabrum*(Moench)Holub (*Plantago indica* L. ; *P. arenaria* Waldst.et Kit.) - Псилиум шершавый = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,КН
(Общедр.редиз.); Db(T); [Pl.]

Сем. 144. RUBIACEAE Juss. - МАРЕНОВЫЕ

1864. *Crucianella angustifolia* L. - Крестовница узколистная = П,СК(Средиземн.); Da(T); [R.]

1865. *Asperula molluginoides*(Bieb.)Reichenb. (*Crucianella molluginoides* Bieb.) - Ясменник моллюгообразный = П,Кисл(Субкавк*); Pa(HK); [Sp.] l.c.
Кисловодск

1866. *A. stevenii* V.Krecz. - Я. Стевена = КЕ,[ТБ,НК,КН: Михеев, 1992],Ст
(Предкавк); Da(HK); [R.] l.c. Ставрополь

1867. *A. biebersteinii* V.Krecz. - Я. Биберштейна = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,КН
[Михеев, 1992],П,Кисл(Предкавк.); Db(HK); [Sp.] l.c. Пятигорск

1868. *A. pedicellata* Klok. - Я. опушённоцветковый = П,Кисл(Предкавк.); Db(HK);
[R.] l.c. Бештау

1869. *A. graveolens* Bieb.ex Schult.et Schult.fil. - Я. пахучий = НК,КН[Михеев,
1992](Понтич.); Db(Ch:sf); [R.]

1870. *A. diminuta* Klok. - Я. уменьшенный = МД,АИ,НК,М,КН(Предкавк.);
Db(HK); [Sp.]

1871. *A. caucasica* Pobed. (*A. taurina* subsp. *caucasica*(Pobed.)Ehrend.) - Я.
кавказский = Ст(Субкавк*); S(HK); [R.] <Rg>

1872. *A. arvensis* L. - Я. полевой = КЕ,М,СК,П(Средиземн.); Pa(T); [Sp.]

1873. *Galium rubioides* L. (*G. articulatum* Lam.) - Подмаренник членистый =
КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); S,Pa,Aa(HK); [Sp.]

1874. *G. valantioides* Bieb. - П. валантиевидный = П,Кисл(Кавк.); Da(HK); [Pl.] l.c.
Кисловодск

1875. *G. odoratum*(L.)Scop.(*Asperula odorata* L.) - П. душистый = Ст,ЛН,
СК,П,Кисл(Палеаркт.); S(HK); [Pl.] <Pm>

1876. *G. rivale*(Smith)Griseb.(*Asperula rivalis* Sibth.et Smith) - П. ручейный =
КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); Pa(HK); [Sp.]

1877. *G. uliginosum* L. - П. топяной = Ст(Евро-Сиб.); Aa(HK); [R.] <Rg>

1878. *G. saturejifolium* Trev. - П. чаберолистный = КН[Михеев, 1992](Туранск.);
Pa(HK); [R.]

1879. *G. humifusum* Bieb. (*Asperula humifusa*(Bieb.)Bess.) - П. распростёртый = Все
р-ны(Вост.др.средиз.); ST,Rb(HK); [Pl.]

1880. *G. verum* L. - П. весенний = Все р-ны(Субсредиз*); ST(HK); [Pl.] <Pm>

1881. *G. ruthenicum* Willd. - П. русский = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Pa,ST(HK);
[Pl.]

1882. *G. mollugo* L. - П. мягкий = Ст(Голаркт.); Pa,Aa(HK); [R.] <Rg>

1883. *G. album* Mill. (*Galium erectum* Huds.) - П. белый = [КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М: Михеев, 1992] (Субсредиз*); S(HK); [R.]
1884. *G. flaviflorum* (Trautv.) A.D.Mikheev (*G. aureum* Vis.) - П. золотистый = Ст, П, Кисл (Субкавк*); Pa, Da(HK); [Sp.]
1885. *G. biebersteinii* Ehrend. (*Asperula galoides* Bieb.) - П. Биберштейна = Ст, П, Кисл [КН: Михеев, 1992] (Понтич.); ST(HK); [Pl.]
1886. *G. octonarium* (Klok.) Soo (*A. octonaria* Klok.) - П. восьмилистный = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, Ст, СК (Субтуран*); ST(HK); [Sp.]
1887. *G. aparine* L. (*Galium spurium* L.) - П. цепкий = Все р-ны (Голаркт.); Pa, Ra, Rb(T); [Sp.] <Pm>
1888. *G. tricornutum* Dandy (*G. rticorne* Stokes) - П. трёхрогий = Все р-ны (Палеаркт.); Ra, Rb(T); [Sp.]
1889. *G. tenuissimum* Bieb. - П. тончайший = [КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М: Михеев, 1992], Ст, П, Кисл (Субтуран*); Pa, ST(T); [Sp.]
1890. *G. verticillatum* Danth - П. мутовчатый = П, Кисл (Субсредиз*); Da(T); [R.]
1891. *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. - Круциата голая = Ст, П, Кисл (Палеаркт.); Pa, Pb(HK); [Pl.]
1892. *C. laevipes* Opiz (*Galium cruciata* (L.) Scop.) - К. гладенькая = Все р-ны (Зап.др.средиз.); Pa(HK); [Pl.] <Pm>
1893. *C. pedemontana* (Bell.) Ehrend. - К. пьемонтская = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Зап.др.средиз.); ST(T); [R.]
1894. *C. taurica* (Pall. ex Willd.) Soo - К. крымская = Кисл (Кр.-Новоросс.); Da(HK); [Sp.]
1895. *Rubia tinctorium* L. (*R. iberica* (Fisch. ex DC.) C. Koch) - Марена красильная = НК, М, Ст, СК, КН (Общедр.средиз.); Aa(HK); [R.]
1896. *R. tatarica* (Trev.) Fr. (*Galium tataricum* Trev.) - М. татарская [ТБ, НК, КН: Михеев, 1992], П (Понт.-Южносиб.); Pa, Aa(HK); [R.]

Сем. 145. SAMBUCACEAE Batsch ex Borkh - БУЗИНОВЫЕ

1897. *Sambucus nigra* L. - Бузина чёрная = Все р-ны (Европ.); S, Rb(Phn); [Pl.] <Pm; Pa>
1898. *S. ebulus* L. - Б. травянистая = Все р-ны (Зап.др.средиз.); S, Rb(HK); [Sp.] <Pt; Pm>

Сем. 146. VIBURNACEAE Rafin. - КАЛИНОВЫЕ

1899. *Viburnum lantana* L. - Калина гордовина = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Субсредиз*); S(Phn); [Pl.]
1900. *V. opulus* L. - К. обыкновенная = Все р-ны (Палеаркт.); S(Phn); [Pl.] <Pm; Pa; Pmel>

Сем. 147. CAPRIFOLIACEAE Juss. - ЖИМОЛОСТНЫЕ

1901. *Lonicera caprifolium* L. - Жимолость киприфоль = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Субкавк*); S(Ch:ll); [Pl.] <Po; Pm; Pmel>
1902. *L. orientalis* Lam. (*L. caucasica* Pall.) - Ж. восточная = П, Кисл(Кавк.); S(Phn); [Pl.] <Pmel>
1903. *L. steveniana* Fisch.ex Pojark. - Ж. Стевена = П, Кисл(Кавк.); S(Phn); [Pl.] <Pmel>

Сем. 148. VALERIANACEAE Batsch - ВАЛЕРИАНОВЫЕ

1904. *Valeriana tuberosa* L. - Валериана клубненосная = Ст, СК, П(Субтуран*); Pa(HK); [Sp.]
1905. *V. alliariifolia* Adams - В. чесночницевистная = П, Кисл(Кавк.-Эвкс.); Pb(HK); [Sp.]
1906. *V. tiliifolia* Troitzk. - В. липолистная = Кисл(Эукавк.); Pb(HK); [Sp.]
1907. *V. cardamines* Bieb. - В. сердечниковая = П, Кисл(Эукавк.); Pb, Db(HK); [Sp.]
1908. *V. grossheimii* Worosch. (*V. officinalis* L.) - В. Гроссгейма (лекарственная) = Все р-ны (Евро-Сиб.); S, Pa(HK); [Pl.] <Pm>
1909. *Valerianella locusta*(L.)Laterrade - Валерианица колосковая = Все р-ны (Субсредиз*); ST, Rb(T); [Sp.]
1910. *V. turgida*(Stev.)Betcke - В. вздутая = Все р-ны (Понтич.); Db, Rb(T); [R.]
1911. *V. carinata* Loisel. - В. килеватая = Все р-ны (Субсредиз*); Ra, Rb(T); [Pl.]
1912. *V. dentata*(L.)Poll. - В. зубчатая = Все р-ны (Зап. др. средиз.); Pa, Rb(T); [Pl.]
1913. *V. muricata*(Stev.ex Bieb.)J.W.Loud. - В. мягкоигольчатая = НК (Общедр. средиз.); Ra, Rb(T); [R.]
1914. *V. rimosa* Bast. - В. щелистная = Все р-ны (Субсредиз*); Pa, Ra, Rb(T); [R.]
1915. *V. pumila*(L.)DC. - В. маленькая = КЕ, Ст, СК, КН (Зап. др. средиз.); ST, Db, Rb(T); [Sp.]
1916. *V. coronata*(L.)DC. - В. увенчанная = Все р-ны (Зап. др. средиз.); ST, Rb(T); [Sp.]
1917. *V. lasiocarpa*(Stev.)Betcke - В. пушистоплодная = КЕ, МД, АИ, Прик, ТБ, М, Ст, СК, КН (Субпонт*); Da(T); [R.]

Сем. 149. DIPSACACEAE Juss. - ВОРСЯНКОВЫЕ

1918. *Knautia arvensis*(L.)Coul. - Короставник полевой = Все р-ны (Евро-Сиб.); Pa(HK); [Pl.] <Pm>
1919. *K. montana*(Bieb.)DC. - К. горный = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Кавк.); S, Pa(HK:pb); [Sp.] l.c. Кисловодск
1920. *K. involucrata* Somm.et Levier - К. крупнообёртковый = П, Кисл(Кавк.); Pb(HK:pb); [Sp.]

1921. *Dipsacus laciniatus* L. - Ворсянка разрезная = П,Кисл(Зап.др.средиз.); S,Pa,Aa(HK) [Sp.] <Po>
1922. *D. gmelinii* Bieb. - В. Гмелина = НК,КН(Субтуран*.); Aa(HK:pb); [R.] <Po>
1923. *D. pilosus* L. - В. волосистая = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Кавк.); S,Pa(HK); [Sp.]
1924. *D. strigosum* Willd.ex Roem.et Schult. - В. щетинистая = Все р-ны (Субпонт*.); S,Aa(HK); [Sp.] <Po>
1925. *Cephalaria uralensis*(Murr.)Schrad.ex Roem.et Schult. - Головчатка уральская = КЕ,Ст(Понт.-Южносиб.); Da(HK); [R.]
1926. *C. transsylvanica*(L.)Schrad.ex Roem.et Schult. - Г. транссильванская = Ст, СК,П(Субпонт*.); Pa(T); [Sp.]
1927. *C. gigantea*(Ledeb.)Bobr. - Г. гигантская = Ст,П,Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Pl.]
1928. *C. litvinovii* Bobr. - Г. Литвинова = Ст[Меницкий, 1992](Понтич.); Pb(HK); [R.]
1929. ★*C. coriacea*(Willd.)Steud. - Г. кожистая = П,Кисл(Кр.-Новоросс); Da(HK); [Sp.]
1930. *C. microdonta* Bobr. - Г. мелкозубцовая = Ст,СК(Кавк.); Pa(T); [R.]
1931. *Succisa pratensis* Moench - Сивец луговой = Кисл(Евро-Сиб.); Aa(HK); [R.] <Pm;Pmel>
1932. ★*Scabiosa isetensis* L. - Скабиоза исетская = КЕ,Прик,Ст(Субтуран*.); Da,Db(HK); [R.] <Pmel> <Rx>
1933. *S. ucranica* L. - С. украинская = Все р-ны(Понтич.); Da(HK:pb); [Pl.] <Pmel>
1934. *S. ochroleuca* L. - С. бледно-жёлтая = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Sp.] <Pmel>
1935. *S. bipinnata* C.Koch - С. дваждыперистая = П,Кисл(Кавк.); Pa(HK); [Pl.] <Pmel>
1936. *S. caucasica* Bieb. - С. кавказская = П,Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Sp.] l.c.
Кисловодск <Po;Pmel>
1937. ★*S. rotata* Bieb. - С. колесовидная = Ст(Ставрополь)(Арmeno-Иран.); ST(T); [Rs.] <Pmel;Rx>
1938. ★*S. micrantha* Desf. - С. мелкоцветковая = Ст(Арmeno-Иран.); ST(T); [R.] <Pmel;Rx>

Сем. 150. CUCURBITACEAE Juss. - ТЫКВЕННЫЕ

1939. *Echinocystis lobata*(Michx.)Torr.et Gray - Пузыреплодник лопастнолистный = Ст(Адвент.[Сев.Америка]); Rb(T); [R.]
1940. *Bryonia alba* L. - Переступень белый = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Палеаркт.); Rb(K:lh); <Pm;Pt>
1941. *B. dioica* Jacq. - П. двудомный = КЕ,МД,АИ,НК,М,Ст(Палеаркт.); Rb(K:lh); [R.] <Pm;Pt>

1942. *Ecballium elaterium*(L.)A.Rich. - Бешеный огурец обыкновенный = М
(Зап.др.средиз.); Rb(HK); [R.] <Pm>

Сем. 151. CAMPANULACEAE Juss. - КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ

1943. *Campanula praearcta* Galushko (*C. elatior*(*Fomin*)*Grossh.*) - Колокольчик
очень-высокий = Все р-ны(Понтич.); Pa(HK); [Pl.]

1944. *C. taurica* Juz. - К. крымский = П,Кисл(Понтич.); Db(HK); [Sp.]

1945. *C. latifolia* L. - К. широколистный = П,Кисл(Европ.); S,Pb(HK); [Sp.] <Po>

1946. *C. rapunculoides* L. - К. рапунцелевидный = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл
(Евро-Сиб.); S,Pa(HK); [Pl.]

1947. *C. cordifolia* C.Koch - К. сердцелистный = П,Кисл(Субкавк*); S,Pb(HK);
[Sp.]

1948. *C. bononiensis* L. - К. болонский = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-
Сиб.); S(HK); [Sp.]

1949. *C. trautvetteri* Grossh.ex Fed. - К. Траутфеттера = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,
П,Кисл(Кавк.); Pa(HK); [Pl.]

1950. *C. oblongifolioides* Galushko - К. продолговатолистный = Кисл(Кавк.);
ST(HK); [Sp.]

1951. *C. alliariifolia* Willd. (*C. ochroleuca* Kem.Nath.) - К. чесночницилистный =
П,Кисл(Субкавк*); Da(HK); [Sp.]

1952. *C. ochroleuca* Kem.-Nath. - К. бледно-жёлтый = Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Sp.]

1953. *C. sarmatica* Ker-Gawl. - К. сарматский = П,Кисл(Эукавк.); Db(HK); [Sp.]

1954. *C. collina* Sims. - К. холмлвой = Кисл(Палеаркт.); Pb(HK); [Sp.]

1955. *C. hohenackeri* Fisch.et C.A.Mey. - К. Гогенакера = Кисл(Кавк.); ST(HK);
[Sp.]

1956. *C. biebersteiniana* Schult. (*C. tridens* Rupr.) - К. Биберштейна = Кисл(г.
Кабан, гербарий СГУ, сборы Шильникова Д., 2001 г.) (Эукавк.); Pc(HK); [R.]

1957. ★*C. saxifraga* Bieb. - К. камнеломка = П(Бештау),Кисл(Эукавк.); Pb(HK);
[R.] <Rg>

1958. *C. rapunculus* L. - К. рапунцель = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.);
S,Rb(HK:pb); [R.]

1959. *C. lambertiana* A.DC. - К. Ламберта = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субкавк*);
S,Pa(HK); [R.]

1960. ★*C. persicifolia* L. - К. персиколистный = Ст(Ставрополь)(Европ.);
S,Pa(HK); [R.] <Rg:Po>

1961. *C. stevenii* Bieb. - К. Стевена = П,Кисл(Субкавк*); Pb(HK); [R.]

1962. *C. ciliata* Stev. - К. реснитчатый = Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Pl.]

1963. *Symphyandra pendula*(Bieb.)A.DC. (*Campanula pendula* Bieb.) - Зимфиандра
повислая = П,Кисл(Эукавк.); Db(HK); [Pl.] <Rt> 1.с. Железноводск

1964. *Asyneuma campanuloides*(Bieb.ex Sims)Bornm. - Азинеума колокольчиковая = П,Кисл(Кавк.); Pb(НК); л.с. Бештау и Кисловодск

Сем. 152. ASTERACEAE Dumort. - АСТРОВЫЕ(СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ)

1965. *Eupatorium cannabinum* L. - Посконник коноплевидный = Все р-ны (Палеаркт.); Aa(HK); [Sp.] <Pm.>

1966. *Solidago virgaurea* L. - Золотая розга обыкновенная = Ст,П,Кисл(ЕвроСиб.); Pa(HK); [Pl.] <Pm;Pmel>

1967. *Aster bessarabicus* Bernh.ex Reichenb. (*A. amelloides* Bess.) - Астра бессарабская = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Понтич.); Pa,ST(HK); [Pl.]

1968. *A. alpinus* L. - А. альпийская = П,Кисл[Галушко, 1980](Панбор.); Pb(HK); [Sp.] <Po>

1969. *Galatella dracunculoides*(Lam.)Nees - Солонечник эстрагоновидный = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Pl.]

1970. *G. pastuchovii*(Kem.-Nath.)Tzvel. - С. Пастухова = МД,АИ,НК,КН(Понтич.); Db,Dc(HK); [Sp.]

1971. *Crinitaria villosa*(L.)Grossh. (*Galatella villosa*(L.)Reichenb.) - Кринитария (Грудница) мохнатая = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Pl.] <Pm>

1972. *C. linosyris*(L.)Less. (*G. linosyris*(L.)Reichenb.) - К.(Г.) обыкновенная = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Pl.]

1973. *Tripolium vulgare* Nees - Триполиум обыкновенный = Все р-ны(Голаркт.); Aa(HK:pb); [Sp.] <Pm;Pp>

1974. *Erigeron orientalis* Boiss. - Мелколепестник восточный = Ст,П,Кисл (Субкавк*); ST(HK); [Pl.]

1975. *E. acris* L. (*E. acer auct.*) - М. едкий = Все р-ны(Голаркт.); Pa(HK:pb); [Sp.] <Pm>

1976. *Conyza canadensis*(L.)Cronq. (*Erigeron canadensis* L.) - Кониза (Мелколепестник) канадская = Все р-ны(Адвент.[Сев.Америка]); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>

1977. *Phalacrolum annuum*(L.)Dumort. (*Stenactis annua*(L.)Cass.) - Фалакролома (Стенактис) однолетняя = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Голаркт.); S,Pa,Rb(T); [Pl.]

1978. *Filago vulgaris* Lam. (*F. germanica* L.) - Жабник обыкновенный = Все р-ны (Зап.др.средиз.); Da,Db(T); [R.]

1979. *F. eriocephala* Guss. - Ж. шерстистоголовый = Ст,СК,Кисл (Зап.др.средиз.); Db(T); [R.]

1980. *F. arvensis* L. - Ж. полевой = Все р-ны(Палеаркт.); ST(T); [Pl.] <Pm>

1981. *Filaginella rossica*(Kirp.)Tzvel. (*Gnaphalium rossicum* Kirp.) - Сушеница русская = Ст(Палеаркт.); Aa,Rb(HK); [R.] <Rg>

1982. *Gnaphalium luteo-album* L. - Сушеница жёлто-белая = СК(Кума)(Плюрирег.); Da(T); [R.]
1983. *Omalotheca sylvatica*(L.)Sch.Bip. et F.Schultz (*Gnaphalium sylvaticum* L.) - Омалотека (Сушеница) лесная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Голаркт.); S(НК); [R.]
1984. *Helichrysum arenarium*(L.)Moench - Бессмертник (Цмин) песчаный = КЕ,МД,АИ, НК,Прик,ТБ,Ст,СК,П(Палеаркт.); Db(НК); [Sp.] <Pm>
1985. *Inula helenium* L. - Девясил высокий = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Aa(НК); [Pl.] <Pm>
1986. *I. orientalis* Lam. - Д. восточный = П,Кисл[Танфильев, Кононов, 1987](Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
1987. *I. hirta* L. - Д. жёстковолосистый = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
1988. *I. ensifolia* L. - Д. мечелистный = Все р-ны(Евро-Кавк.); ST(НК); [Pl.]
1989. *I. germanica* L. - Д. германский = Все р-ны(Евро-Кавк.); ST(НК); [Sp.]
1990. *I. aspera* Poir. - Д. шероховатый = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Pl.]
1991. *I. sabuletorum* Czern.ex Lavr. - Д. песчаный = Прик(Субтуран*); Db(НК); [R.] <Rx>
1992. *I. caspica* Blum ex Ledeb. - Д. каспийский = МД(Туранск.); Dc(НК:pb); [Sp.]
1993. *I. oculus-christi* L. - Д. христово око = Все р-ны(Зап.др.средиз.); ST(НК); [Sp.]
1994. *I. britannica* L. - Д. британский = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.] <Pm>
1995. *I. conyzoides* DC. (*I. vulgaris* Trevis.) - Д. блоший = П,Кисл(Понтич.); ST(НК); [Sp.]
1996. *I. thapsoides*(Bieb.)Spreng. - Д. коровяковый = Ст,П,Кисл(Армено-Иран.); Pa(НК); [Sp.]
1997. *Pulicaria vulgaris* Gaertn. (*P. prostrata*(Gilib.)Aschers. nom. illegit.) - Блошица обыкновенная = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(T); [Sp.] <Pm>
1998. *P. dysenterica*(L.)Bernh. (*P. uliginosa* Stev.ex DC.) - Б. дизентерийная = Все р-ны(Общедр.средиз.); Aa(НК); [Sp.]
1999. ★*Carpesium cernuum* L. - Карпезиум поникающий = СК(Георгиевск) (Общедр.средиз.); Aa(НК); [Rs.] <Rg>
2000. ★*Telekia speciosa*(Schreb.)Baumg. - Телекия видная = [Ст: Танфильев, Кононов, 1979],П,Кисл(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.] <Po>
2001. *Cyclachaena xanthiifolia*(Nutt.)Fresen. - Циклахена дурнишниковая = КЕ, Прик,ТБ,НК,Ст,СК,П(Адвент.[Сев. Америка]); Rb(T); [R.]
2002. *Ambrosia artemisiifolia* L. - Амброзия полынолистная = Все р-ны(Адвент. [Сев. Америка]); Ra,Rb(T); [Pl.]
2003. *A. psilostachya* DC. - А. голометельчатая = КЕ,Прик,ТБ,Ст(Адвент.[Сев. Америка]); Ra,Rb(НК); [Sp.]

2004. *Xanthium strumarium* L. - Дурнишник зобовидный = Все р-ны(Адвент. [космополитный]); Rb(T); [Pl.] <Pm>
2005. *X. californicum* Greene - Д. калифорнийский = Все р-ны(Адвент.[Сев. Америка]); Rb(T); [Pl.]
2006. *X. spinosum* L. - Д. колючий = Все р-ны(Адвент.[космополитный]); Rb(T); [Pl.] <Pm>
2007. *Sigesbeckia orientalis* L. - Сигезбекия восточная = П,Кисл(Адвент. [Средиземноморье]); Rb(T); [Sp.]
2008. *Bidens cernua* L. - Череда поникающая = Ст,П,Кисл(Голаркт.); Aa(T); [Sp.]
2009. *B. tripartita* L. - Ч. трёхраздельная = Все р-ны(Плюрирег.); Aa,Rb(T); [Pl.] <Pm>
2010. *Galinsoga parviflora* Cav. - Галинсога мелкоцветковая = Все р-ны(Адвент. [Южн.Америка]); Rb(T); [Pl.]
2011. *G. ciliata*(Rafin.)Blake (*G. quadriradiata* auct.) - Г. реснитчатая = П (Адвент. [Южн.Америка]); Rb(T); [R.]
2012. *Anthemis sosnovskyana* Fed. - Пупавка Сосновского = П,Кисл(Кавк.); Da(HK); [Sp.]
2013. *A. marschalliana* Willd. - П. Маршалла = Кисл(Кавк.); Da,Pb(HK); [Pl.]
2014. *A. arvensis* L. - П. полевая = КЕ(Евро-Кавк.); Rb(HK); [Sp.]
2015. *A. ruthenica* Bieb. - П. русская = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,СК(Понтич.); ST,Db,Dd(HK); [Pl.]
2016. *A. candidissima*Willd.ex Spreng. - П. белейшая = НК(Будённовск [Танфильев, Кононов, 1987](Туранск.); Rb(T); [R.]
2017. *A. subtinctoria* Dobrocz. (*A. tinctoria* L.) - П. кровельная = КЕ,Ст,СК,П (Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Sp.]
2018. *A. rigescens* Willd. - П. жёсткая = П,Кисл(Субкавк*.); Pb(HK); [Pl.]
2019. *A. dumetorum* Sosn. - П. кустарниковая = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Кавк.); Pa(HK); [Sp.]
2020. *A. altissima* L. - П. высочайшая = Ст[Галушко, 1980](Субкавк*.); Rb(T); [R.]
2021. *A. cotula* L. - П. собачья = Все р-ны(Евро-Кавк.); Rb(T); [Pl.]
2022. *Achillea nobilis* L. - Деревей (Тысячелистник) благородный = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Pl.] <Pm>
2023. *A. millefolium* L. - Д. тысячелистник = Все р-ны(Евро-Сиб.); ST(HK); [Pl.] <Pm>
2024. *A. setacea* Waldst.et Kit. - Д. щетинистый = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(HK); [Sp.] <Pm>
2025. *A. leptophylla* Bieb. - Д. тонколистный = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М (Понтич.); ST(HK); [R.]
2026. *A. micrantha* Willd. - Д. мелкоцветковый = Прик,ТБ,Ст,СК(Понт.- Южносиб.); Db(HK); [Sp.] <Pm>

2027. *A. biebersteinii* Afan. - Д. Биберштейна = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М (Вост.др.средиз.); ST, Da, Dd(HK); [Pl.]
2028. *Leucanthemum vulgare* Lam. - Нивянка обыкновенная = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Евро-Сиб.); Pa, S(HK); [Pl.] <Pm; Po>
2029. ★ *L. waldsteinii*(Sch.Bip.)Pouzar - Н. Вальдштейна = Ст(Стрижамент) [Михеев, 1983](Европ.); Pa(HK); [R.]
2030. *Matricaria recutita* L. (*Chamomilla recutita*(L.)Rauschert; *Matricaria chamomilla* L.) - Ромашка лекарственная = Все р-ны(Голаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pm>
2031. *Lepidotheca suaveolens*(Purch)Nutt. (*Matricaria suaveolens*(Pursh) Buschenau; *M. discoidea* DC.; *Chamomilla discoidea*(DC.)J.Gay ex A.Br.) - Лепидотека (Ромашка) пахучая = Все р-ны(Панбор.); Rb(T); [Pl.]
2032. *Tripleurospermum perforatum*(Merat)M.Lainz (*Matricaria perforata* Merat; *Tripleurospermum inodorum*(L.)Sch.Bip.nom.illegit.) - Трёхреберник пронзённый (Ромашка непахучая) = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
2033. *T. parviflorum*(Willd.)Pobed. (*M. parviflora*(Willd.)Poir.) - Т.(Р.) мелкоцветковый = МД, АИ, НК, КН(Арmeno-Иран.); ST(T); [R.]
2034. *Pyrethrum parthenifolium* Willd. - Пиретрум девичьелистный = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Общедр.средиз.); S, Da(HK); [Pl.] <Pm>
2035. *P. coccineum*(Willd.)Worosch. (*P. roseum*(Adams)Bieb.) - П. красный (розовый) = П, Кисл(Субкавк*); Pb(HK); [Sp.] <Pt; Po>
2036. *P. corymbosum*(L.)Scop. - П. щитковый = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Европ.); Pa(HK); [Sp.]
2037. *Tanacetum vulgare* L. - Пижма обыкновенная = Все р-ны(Голаркт.); Pa, Rb(HK); [Sp.] <Pm>
2038. *T. millefolium*(L.)Tzvel. - П. тысячелистная = Ст, СК(Понт.-Южносиб.); ST, Da(HK); [Sp.]
2039. *T. achilleifolium*(Bieb.)Sch.Bip. - П. деревеелистная = МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М, СК(Понт.-Южносиб.); ST, Dc(HK); [Pl.]
2040. *Artemisia vulgaris* L. - Полынь обыкновенная (Чернобыльник) = Все р-ны(Голаркт.); Rb(HK); [Pl.] <Pm>
2041. *A. verlotiorum* Lamotte - П. Верлотов = П[г.Машук: Дубовик, Мосякин, 1991](Адвент. [Япония, Китай]); Rb(HK); [R.]
2042. *A. abrotanum* L. (*Artemisia procera* Willd.; *A. elatior* Klok.) - П. рослая = П, КН(Понт.-Южносиб.); Db(Ch:sf); [R.]
2043. *A. chamaemelifolia* Vill. - П. ромашколистная = Ст, П, Кисл(Субкавк*); Da(HK); [Sp.]
2044. *A. pontica* L. - П. понтийская = Ст, П(Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Sp.] <Pm>
2045. *A. annua* L. - П. однолетняя = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [R.] <Pm>

2046. ★ *A. grossheimii* Krasn.ex Pojark. (*A. caucasica* Willd.) - П. Гросгейма = Прик(с. Тугулук), [г. Брык, Галушко, Мигненко, 1989]), П, Кисл(Субкавк*.); Da(HK); [R.] <Po; Rx>
2047. *A. austriaca* Jacq. - П. австрийская = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); SD, Db, Dd, Dc(HK); [Pl.]
2048. *A. absinthium* L. - П. горькая = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(HK); [Pl.] <Pm>
2049. *A. dracunculus* L. - П. эстрагон = НК(Голаркт.); ST, Dc(HK); [R.]
2050. ★★ *A. salsoloides* Willd. (*A. tanaitica* Klok.) - П. солянковая = П[Галушко, 1980](Понт.-Южносиб.); Da(Ch:sf); [Rs.] <Rx>
2051. *A. campestris* L. - П. полевая = Все р-ны(Голаркт.); ST(HK); [Sp.]
2052. *A. scoparia* Waldst. et Kit. - П. метельчатая(веничная) = Все р-ны (Палеаркт.); ST(T); [Pl.]
2053. *A. marschalliana* Spreng. (*A. sosnovskyi* Krasch. ex Novopokr.) - П. Маршалла = СК, П, Кисл(Палеаркт.); ST(HK); [Sp.]
2054. *A. tschernieviana* Bess. - П. Черняева = МД, АИ, НК, М, СК, П, КН(Понтич.); Db(Ch:sf); [Pl.]
2055. *A. lerchiana* Web. ex Stechm. (*A. fragrans* Willd.) - П. Лерхе = КН(Понт.-Южносиб.); ST, Dd(Ch:sf); [Pl.]
2056. *A. taurica* Willd. - П. крымская = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М, Ст, СК, П, КН (Понтич.); Dc, Dd(HK); [Pl.] <Pm; Pp>
2057. *A. santolina* L. - П. сантолинная = КЕ, МД, АИ, Прик, ТБ, НК(Турansk.); Dc(HK); [R.] <Pm>
2058. *Tussilago farfara* L. - Мать-и-мачеха обыкновенная = Все р-ны(Палеаркт.); Dd(HK); [Pl.] <Pm>
2059. *Petasites hybridus*(L.)Gaertn., Mey. et Schreb. - Белокопытник гибридный = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Евро-Кавк.); S, Aa(HK); [Pl.] <Pm>
2060. *P. albus*(L.)Gaertn. - Б. белый = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Евро-Кавк.); S, Aa(HK); [Pl.]
2061. ★ *Doronicum orientale* Hoffm. - Дороникум восточный = Ст(Евро-Кавк.); S(HK); [R.] <Po; Rg>
2062. *D. oblongifolium* DC. - Д. продолговатолистный = Кисл(Палеаркт); Pb(HK); [Pl.]
2063. *D. macrophyllum* Fisch. ex Hornem. - Д. крупнолистный = П, Кисл (Субкавк*.); Pb(HK); [Sp.] l.c. Бештау
2064. *Senecio vulgaris* L. - Крестовник обыкновенный = Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.] <Pm>
2065. *S. viscosus* L. - К. липкий = П, Кисл(Евро-Кавк.); Rb(T); [R.]
2066. *S. vernalis* Waldst. et Kit. - К. весенний = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Pl.]
2067. *S. noeanus* Rupr. - К. Ноя = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М, СК, КН(Ирано-Туран.); Dc(T); [Sp.]

2068. *S. jacobaea* L. - К. Якова = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Rb(T); [Sp.]
2069. *S. erucifolius* L. - К. эруколистный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Aa(HK); [Sp.]
2070. *S. grandidentatus* Ledeb. - К. крупнозубчатый = KE,Ct,LN,CK,P,Kisl
(Понт.-Южносиб.); Pa,ST(HK); [Pl.]
2071. *S. schischkinianus* Sof. - К. Шишкина = KE,Md,Ai,KH(Эукавк.); Dc(HK);
[Sp.]
2072. *S. macrophyllus* Bieb. - К. крупнолистный = П(Эукавк.); S(HK); [Sp.] l.c.
Терек и Кума
2073. *S. propinquus* Schischk. - К. близкий = П,Кисл(Кавк.); S,Pa(HK); [Sp.]
2074. *S. lapsanoides* DC. - К. бородавниквидный = Кисл(Кавк.); S(HK); [Sp.]
2075. *Tephroseris subfloccosus*(Schischk.)Czer. (*Senecio subfloccosus* Schischk.) - К.
почтиклочковатый = П,Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Sp.]
2076. *Dolichorrhiza renifolia*(C.A.Mey.)Galushko (*Senecio renifolia* C.A.Mey.) -
Долихориза почколистная = Кисл(Эукавк.); Pb,S(HK); [Sp.]
2077. *Echinops ruthenicus* Bieb. (*E. ritro* L.) - Мордовник обыкновенный = Ст
(Понт.-Южносиб.); ST(HK); [R.] <Pm>
2078. ★*E. viridifolius* Iljin - М. зеленолистный = П(Машук)(Предкавк.); Pa(HK);
[Rs.] <Es> l.c. Машук (рис. 11)
2079. *E. sphaerocephalus* L. - М. шароголовый = Все р-ны(Понт.-Южносиб.);
Pa(HK); [Sp.] <Pm; Pmel>
2080. *E. galaticus* Freyn - М. галатский = CK(Эвксин.); S,Pa(HK); [Sp.]
2081. *Xeranthemum annuum* L. - Сухоцвет однолетний = Все р-ны(Субпонт*.);
ST(T); [Pl.] <Po;Pm>
2082. *X. cylindraceum* Sibth.et Smith. - С. цилиндрический = Все р-ны
(Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.] <Po>
2083. *Carlina vulgaris* L. - Колючник обыкновенный = Ст,LN,CK,P,Kisl(Евро-
Кавк.); ST(HK:pb); [Pl.]
2084. *Arctium lappa* L. - Лопух репейник = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(HK:pb); [R.]
<Pm;Pmel>
2085. *A. nemorosum* Lej. - Л. дубравный = П(Европ.); S,Rb(HK:pb); [Sp.]
<Rg;Pmel>
2086. *A. tomentosum* Mill. - Л. войлочный = Ст,P(Палеаркт.); Rb(HK:pb); [Sp.]
<Pm;Pa;Pmel>
2087. *A. palladinii*(Marc.)Grossh. - Л. Палладина = Ст,P,Kisl(Кавк.); S,Rb(HK:pb);
[Pl.] <Pmel>
2088. *A. minus*(Hill)Bernh. - Л. малый = HK,CK(Кума)[Танфильев, Кононов,
1987](Понтич.); Rb(HK:pb); [Sp.] <Pmel>
2089. *Saussurea amara*(L.)DC. - Горькуша горькая = HK[Танфильев, Кононов,
1987](Субтуран*.); Dc(HK); [R.]

2090. *S. salsa*(Pall.ex Bieb.)Spreng. - Г. солончаковая = НК[Танфильев, Кононов, 1987](Вост.др.средиз.); Dc(HK); [R.]
2091. ★*Jurinea cyanoides*(L.)Reichenb. - Наголоватка васильковая = [Ст: Танфильев, Кононов, 1987],КН(Понт.-Южносиб.); Dd(HK); [R.]
2092. *J. polyclonus*(L.)DC. (*J. amplexicaulis*(S.G.Gmel.)Bobr.) - Н. многостебельная = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М(Понт.-Южносиб.); Db(HK); [Sp.]
2093. *J. multiflora*(L.)Bieb. - Н. многоцветковая = МД,АИ,Прик,ТБ,НК,Ст,СК,П, КН(Понт.-Южносиб.); Db,Dc,Dd(HK); [Pl.]
2094. *J. arachnoidea* Bunge - Н. паутинистая = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Pl.]
2095. ★*J. alata*(Desf.)Cass. - Н. крылатая = Кисл(Эукавк.); Da(HK); [Sp.]
2096. *J. ciscaucasica*(Sosn.)Iljin - Н. предкавказская = М,СК(Предкавк.); Db(HK); [Sp.] l.c. Нальчик
2097. ★*J. ewersmannii* Bunge - Н. Эверсмана = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,КН (Понтич); Db(HK); [R.]
2098. *Carduus nutans* L. - Чертополох поникающий = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(HK:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
2099. *C. acanthoides* L. - Ч. колючий = Все р-ны(Евро-Кавк.); SD,Rb(HK:pb); [Sp.] <Pmel>
2100. *C. crispus* L. - Ч. курчавый = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(HK:pb); [Sp.] <Pmel>
2101. *C. hamulosus* Ehrh. - Ч. крючочковый = Все р-ны(Субпонт*); ST(HK:pb); [Sp.] <Pmel>
2102. *C. uncinatus* Bieb. - Ч. крючковатый = Все р-ны(Субпонт*); Rb(HK:pb); [Sp.] <Pmel>
2103. *C. pseudocollinus*(Schmalh.)Klok. - Ч. ложнохолмовой = Ст,СК,П(Понтич.); ST(HK:pb); [R.] <Pmel>
2104. *C. seminudus* Bieb. - Ч. почтиголый = Все р-ны(Субкавк*); ST(HK:pb); [Sp.] <Pmel>
2105. *C. laciniatus* Ledeb. (*C. multijugus* C.Koch) - Ч. дольчатый = Ст,ЛН, П,Кисл(Кавк.); S,Pa(HK:pb); [Sp.] <Pmel>
2106. *C. albidus* Bieb. - Ч. беловатый = П(Ирано-Туран.); Rb(T); [R.] <Pmel>
2107. *C. cinereus* Bieb. - Ч. сероватый = М,[Ст: Портениер, 1997](Ирано-Туран.); Rb(T); [R.] <Pmel>
2108. *Cirsium vulgare*(Savi)Ten. - Бодяк обыкновенный = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(HK:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
2109. *C. ciliatum*(Murr.)Moench - Б. реснитчатый = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); S,Pa(HK); [Sp.] <Pmel>
2110. *C. canum*(L.)All. - Б. серый = Ст,ЛН,П,Кисл(Европ.); S,Pa(HK); [Sp.] <Pmel>
2111. *C. incanum*(S.G.Gmel.)Fisch. - Б. седой = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Rb(HK); [Sp.] <Pmel>

2112. *C. arvense*(L.)Scop. - Б. полевой = Все р-ны(Европ.); Rb(HK); [Sp.] <Pm;Pmel>
2113. *C. elodes* Bieb. - Б. болотолюбивый = M,KH(Субкавк*); Rb(HK); [R.] <Pmel>
2114. *C. pugnax* Somm. et Levier - Б. воинственный = Кисл(Кавк.); Pa,Rb(HK); [Sp.]
2115. *C. arachnoideum*(Bieb.)Bess. - Б. паутинистый = Ст,П,Кисл(Эукавк.); Pa(HK); [Sp.] l.c. Бештау <Pmel>
2116. *C. dealbatum* Bieb. - Б. беловатый = Кисл(Эукавк.); S,Rb(HK); [Pl.] <Esub> l.c. Кисловодск
2117. *C. uliginosum*(Bieb.)Fisch. - Б. болотный = П,Кисл(Эукавк.); Aa(HK); [Sp.] l.c. Кисловодск <Pmel>
2118. *C. obvallatum*(Bieb.)Fisch. - Б. окутанный = Кисл(Субкавк.*); Pb(HK); [Sp.]
2119. ★*Lamyra echinocephala*(Willd.)Tamamsch. (*Ptilostemon echinocephalus* (Willd.)Greuter) - Ламира ежеголовая = П(Машук),Кисл(Кисловодск)(Кр.-Новоросс.); Db(HK); [Rs.] <Po;Rx>
2120. *Onopordon acanthium* L. - Татарник колючий = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(HK:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
2121. *Crupina vulgaris* Cass. - Крупина обыкновенная = CK(Субтуран*); ST,Da(T); [R.]
2122. *Serratula coronata* L. - Серпуха венценосная = Ст,ЛН,CK,П,Кисл (Палеаркт.); Pa(HK); [Sp.] <Pm>
2123. *S. erucifolia*(L.)Boriss. - С. эруколистная = M,Ct,KH(Субтуран*); Dc(HK); [R.]
2124. *S. radiata*(Waldst.et Kit.)Bieb. (*S. bracteifolia*(Iljin ex Grossh.) Stank.) - С. лучистая = Ст,ЛН,CK,П,Кисл(Евро-Кавк.); Pa(HK); [Sp.]
2125. *S. quinquefolia* Bieb.ex Willd. - С. пятилистная = Ст,ЛН,CK,П,Кисл(Кавк.); S(HK); [Pl.]
2126. *Acroptilon repens*(L.)DC. - Горчак ползучий = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Ra,Rb(HK); [Sp.] <Pm>
2127. *Chartolepis intermedia* Boiss. - Хартолепис средний = МД,АИ,НК,KH (Субтуран*); Dc(HK); [R.]
2128. *Psephellus dealbatus*(Willd.)Boiss. (*Centaurea dealbata* Willd.) - Псефеллюс беловатый = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,CK,П,Кисл(Кавк.); Pa(HK); [Pl.] <Pmel;Po>
2129. ★*P. leucophyllus*(Bieb.)C.A.Mey. (*Centaurea leucophylla* Bieb.) - П. белолистный = CK,П(Понтич.); Da(HK); [Sp.] l.c. Пятигорск
2130. *P. anatolii* A.L.Ivanov - П. Анатолия = Кисл(Эукавк.); Da(HK); [Rs.] <Esub> l.c. Кисловодск

2131. ★ *P. annae* Galushko (*P. marschallianus*(*Spreng.*)*A.D.Mikheev*; *Centaurea marschalliana* *Spreng.*) - П. Анны = Прик,Ст(Предкавк.); Da(HK); [Sp.] <Po> <Ee> (рис. 12)
2132. *P. holophyllus* Socz. et Lipat. (*Centaurea holophylla*(*Socz./et Lipat*)*Socz. et Lipat.*) - П. цельнолистный = Кисл(Эукавк.); Da(HK); [R.]
2133. ★ *P. ciscaucasicus*(*Sosn.*)Galushko (*Centaurea ciscaucasica* *Sosn.*) - П. предкавказский = Кисл(Эукавк.); Da(HK); [Sp.] <Esub> 1.с. Кисловодск
2134. *Centaurea ruthenica* Lam. - Василёк русский = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М, Ст,СК,П(Субтуран*); ST(HK); [R.] <Pmel>
2135. ★ *C. pseudotanaitica* Galushko nom.nudum (*C. tanaitica* *Klok.*) - В. ложно - донской = Ст,СК(Понтич.); Pa,ST(HK); [R.]
2136. *C. depressa* Bieb. - В. прижатый = П,Кисл(Вост.др.средиз.); Ra,Rb(T); [R.] <Pmel>
2137. *C. cyanus* L. - В. синий = Все р-ны(Голаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm;Pmel>
2138. *C. substituta* Czer. - В. замещающий = Ст,ЛН(Понтич.); S,Pa(HK); [Sp.]
2139. *C. abbreviata*(*C.Koch*)*Hand.-Mazz.* - В. укороченный = П,Кисл(Субкавк*); S,Pa(HK); [Sp.]
2140. *C. alutacea* Dobrocz. - В. серовато-жёлтый = П,Кисл(Эукавк.); Pa,Pb(HK); [Sp.]
2141. *C. trichocephala* Bieb. - В. волосистоголовый = КЕ,П(Понт.-Южносиб.); ST(HK); [R.]
2142. *C. trinervia* Steph. - В. трёхжилковый = Ст,П(Понтич.); ST(HK); [Sp.]
2143. *C. orientalis* L. - В. восточный = Все р-ны(Понтич.); ST(HK); [Pl.]
2144. *C. apiculata* Ledeb. - В. шипиконосный = Ст,СК,П(Субсредиз*); Pa,ST(HK); [R.]
2145. *C. adpressa* Ledeb. - В. прижаточешуйчатый = Ст,СК,П(Понт.-Южносиб.); ST(HK); [R.]
2146. *C. diffusa* Lam. - В. раскидистый = Все р-ны(Понтич.); ST,Rb(HK:pb); [Pl.]
2147. *C. solstitialis* L. - В. солнечный = Все р-ны(Ирано-Туран.); SD(HK:pb); [Sp.]
2148. *C. iberica* Trev.ex *Spreng.* - В. грузинский = Все р-ны(Ирано-Туран.); Rb(HK:pb); [Pl.]
2149. *C. arenaria* Bieb. - В. песчаный = НК,КН(Туранск.); Dc(HK:pb); [R.] 1.с. р.Кума
2150. ★ *C. scripczinskyi* A.D.Mikheev - В. Скрипчинского = Прик,Ст,П[Михеев, 1997](Предкавк.); Db(HK); [Sp.] <Esub>
2151. *C. kubanica* Klok. - В. кубанский = Ст,ЛН,СК,П(Эукавк.); ST(HK:pb); [Sp.]
2152. *C. cheiranthifolia* Willd. - В. бледно-жёлтый = П,Кисл(Субкавк*); Pb(HK); [Sp.]
2153. *C. abnormis* Czer. - В. уклоняющийся = Ст,СК,П(Предкавк.); S,Pa(HK); [Sp.] 1.с. Майкоп <Esub>

2154. *C. salicifolia* Bieb. - В. иволистный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субкавк*.); S,Pa(HK); [Sp.] l.c. Владикавказ
2155. *Carthamus lanatus* L. - Софлор шерстистый = КЕ,Прик,ТБ, Ст,ЛН,СК, П,Кисл(Общедр.средиз.); Rb(T); [Pl.]
2156. *Cichorium intybus* L. - Цикорий обыкновенный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(HK); [Pl.] <Pa;Pm;Pmel>
2157. *Lapsana communis* L. - Бородавник обыкновенный = КЕ,Прик, ТБ,НК, Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S,Rb(T); [Sp.] <Pm>
2158. *L. intermedia* Bieb. - Б. промежуточный = КЕ,Прик, ТБ,НК, Ст,ЛН,СК, П,Кисл(Субкавк*.); S,Rb(HK); [Sp.]
2159. *L. grandiflora* Bieb. - Б. крупноцветковый = КЕ,Прик, ТБ,НК, Ст,ЛН,СК, П,Кисл(Субкавк*.); S(HK); [Pl.]
2160. *Hypochoeris radicata* L. (*Porcellites radicata*(L.)Cass.) - Гипохерис стержнекорневой = Ст(Субсредиз*.); Pa(HK); [R.] <Rg>
2161. *Trommsdorffia maculata*(L.)Bernh. (*Achyrophorus maculatus*(L.)Scop.) - Троммсдорфия (Пазник) крапчатая = Ст,П,Кисл(Евро-Сиб.); S(HK); [Pl.] <Pm>
2162. *Leontodon autumnalis* L. - Кульбаба осенняя = Ст(Евро-Сиб.); Pa,Rb(HK); [R.] <Pmel>
2163. *L. asperrimus*(Willd.)Endl. - К. шероховатейшая = П(Арmeno-Иран.); Da(HK); [R.] <Rx;Pmel>
2164. *L. caucasicus*(Bieb.)Fisch. - К. кавказская = Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Sp.]
2165. *L. danubialis* Jacq. - К. дунайская = Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa(HK); [Sp.] <Pmel>
2166. *L. hispidus* L. - К. щетинисто-волосистая = Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa(HK); [Pl.] <Pmel;Pp>
2167. *Picris hieracioides* L. - Горлюха ястребинковая = Все р-ны(Палеаркт.); ST(HK:pb); [Pl.]
2168. *P. strigosa* Bieb. - Г. щетинистая = Все р-ны(Арmeno-Иран.); ST(HK:pb); [Sp.]
2169. *P. canescens*(Stev.)V.Vassil. - Г. седоватая = Кисл(Кавк.); Rb(HK:pb); [Sp.]
2170. *Helminthotheca echioides*(L.)Holub (*Helminzia echioides*(L.)Juss.) - Гельминтотека румянковидная = СК(Зап.др.средиз); Ra,Rb(T); [Sp.]
2171. *Garhadiolus papposus* Boiss. et Buhse - Гарадиолус хохлатый = КН(Арmeno-Иран.); ST,Rb(T); [R.]
2172. *Podospermum laciniatum*(L.)DC. (*Scorzonera laciniata* L.) - Ножкосемянник разрезной = Все р-ны (Зап.др.средиз.); ST,Da(HK:pb); [Sp.]
2173. *P. lachnostegium* Woronow (*S. lachnostegia*(Woronow)Lipsch.) - Н. косматообёртковый = КЕ,Ст(Предкавк.); ST(HK:pb); [R.] <Esub>
2174. *Scorzonera parviflora* Jacq. - Козелец мелкоцветковый = КЕ,МД,АИ,НК, Прик,ТБ,М(Палеаркт.); Dc(HK:pb); [Sp.]

2175. *S. taurica* Bieb. - К. крымский = Ст,СК,П,Кисл(Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Sp.]
2176. *S. stricta* Hornem. - К. торчащий = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Sp.]
2177. *S. mollis* Bieb. - К. мягкий = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,П,Кисл (Субпонт*.); ST(HK); [Sp.]
2178. *S. biebersteinii* Lipsch. - К. Биберштейна = П,Кисл(Кавк.); Da,Db(HK); [Sp.] л.с. Пятигорск
2179. *S. ensifolia* Bieb. - К. мечелистный = МД,АИ,НК,КН(Субтуран*.); ST,Db(HK); [R.]
2180. *Tragopogon dasyrhynchus* Artemcz. - Козлобородник опушённоносый = Ст,СК,П(Понтич.); ST,Da(HK:pb); [Sp.]
2181. *T. dubius* Scop. - К. сомнительный = Все р-ны(Субсредиз*.); Pa(HK:pb); [Sp.]
2182. *T. filiformis* Rehm.ex Boiss. - К. нителистный = Кисл(Кавк.); Pa,Da(HK); [Sp.]
2183. *T. brevirostris* DC. - К. коротконосый = СК,П,Кисл(Кавк.); Pa,ST,Da(HK); [Sp.]
2184. *T. reticulatus* Boiss.et Huet - К. сетчатый = П,Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Sp.]
2185. *T. graminifolius* DC. - К. злаколистный = П,Кисл(Субкавк*.); Pb(HK); [Sp.]
2186. *T. orientalis* L. - К. восточный = Все р-ны(Европ.); Pa,ST(HK:pb); [Pl.]
2187. *T. ruthenicus* Bess.ex Krasch.et S.Nikit. - К. русский = КН(Субтуран*.); Db(HK:pb); [R.]
2188. *T. daghestanicus*(Artemcz.)Kuth. - К. дагестанский = КН(Субтуран*.); Db(HK:pb); [Sp.]
2189. *Sonchus palustris* L. - Осот болотный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Aa(HK); [Sp.] <Pmel>
2190. *S. arvensis* L. - О. полевой = Все р-ны(Плюрирег.); Ra,Rb(HK); [Pl.] <Pmel>
2191. *S. oleraceus* L. - О. овощной = Все р-ны(Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm;Pmel>
2192. *S. asper*(L.)Hill - О. колючий = Все р-ны(Голаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pmel>
2193. *Reichardia glauca* Matthews (*R. dichotoma*(Vahl)Freyn) - Рейхардия сизая = Ст,СК,П,Кисл(Арmeno-Иран.); ST,Da(HK); [Sp.]
2194. *Prenanthes purpurea* L. - Косогорник пурпуровый = Кисл(Субсредиз.*); S(HK); [Sp.]
2195. *P. cacaliifolia*(Bieb.)Beauverd - К. недоспелколистный = Кисл (Общедр. средиз.); S,Pb(HK); [Sp.]
2196. *Lactuca tatarica*(L.)C.A.Mey. - Молокан (Латук) татарский = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(HK); [Pl.]
2197. *L. serriola* L. - М. компасный = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>

2198. *L. saligna* L. - М. солончаковый = КЕ,МД,АИ,НК,М,Ст,СК,П,КН
(Субсредиз*.); Dc(HK:pb); [R.]
2199. *L. chaixii* Vill. - М. Хайкса = Ст,П,Кисл(Субсредиз*.); S,Pa(HK:pb); [Sp.]
2200. *Scariola viminea*(L.)F.W.Schmidt - Скариола прутьевидная = Все р-ны
(Зап.др.средиз.); ST,Rb(HK:pb); [Sp.]
2201. *Mycelis muralis*(L.)Dumort. - Мицелис стенной = КЕ,Прик,ТБ, Ст,ЛН,СК,
П,Кисл(Евро-Кавк.); Aa(HK); [Sp.]
2202. *Cicerbita macrophylla*(Willd.)Wallr. - Цицербита крупнолистная = П,Кисл
(Кавк.); S,Pb(HK); [Sp.]
2203. *C. prenanthoides*(Bieb.)Beauverd - Ц. косогорниковая = Ст,П,Кисл(Кавк.);
S,Pb(HK); [Pl.]
2204. *C. racemosa*(Willd.)Beauverd - Ц. кистистая = П,Кисл(Субкавк*.); S,Pb(HK);
[Sp.]
2205. *Taraxacum serotinum*(Waldst.et Kit)Poir. - Одуванчик поздний = МД,АИ,НК,
Прик,ТБ,М,СК,П(Субпонт*.); Pa,Rb(HK); [Sp.] <Pmel>
2206. *T. confusum* Schischk. - О. смешиваемый = П,Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Sp.]
2207. *T. divulsiforme* R. Doll - О. дивульсиформный = П(Эукавк.); Pa(HK); [Sp.]
<Esub> l.c. Пятигорск
2208. *T. bessarabicum*(Hornem.)Hand.-Mazz. - О. бессарабский = КЕ(Палеаркт.);
Dc(HK); [R.] <Pmel>
2209. *T. officinale* Wigg. - О. лекарственный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(HK);
[Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
2210. *T. mucronatum* Lindb.fil. - О. остроконечный = Все р-ны(Палеаркт.);
Pa,Rb(HK); [Pl.] <Pmel>
2211. *T. prilipkoi* Czer. (*T. praticola* Schischk.) - О. луговой = МД,АИ,НК,Прик,
ТБ,М,СК(Кавк.); ST(HK); [Sp.] <Pmel>
2212. *T. ciscaucasicum* Schischk. - О. предкавказский = КЕ,АИ,Прик(Предкавк.);
Dc(HK); [R.] <Ee> l.c. Благодатное <Pmel>
2213. *T. erythrospermum* Andrz. - О. красносемянный = КЕ(Европ.);
Pa,Dc,Db(HK); [Sp.] <Pmel>
2214. *Chondrilla juncea* L. - Хондрилла ситниквидная = Все р-ны(Субсредиз*.);
Da,Db(HK:pb); [Sp.] <Pm>
2215. *Ch. latifolia* Bieb. - Х. широколистная = Все р-ны(Субпонт*.);
Da,Db(HK:pb); [Sp.]
2216. *Crepis sibirica* L. - Скерда сибирская = Кисл(Палеаркт.); S,Pb(HK); [Sp.]
2217. *C. pannonica*(Jacq.)C.Koch - С. венгерская = КЕ,Ст,П(Понт.-Южносиб.);
ST, Da(HK); [Sp.]
2218. *C. tectorum* L. - С. кровельная = КЕ,Ст,П(Палеаркт.); Rb(HK:pb); [Pl.] <Pm>
2219. *C. pulchra* L. - С. красивая = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П(Зап.др.средиз.);
Da,Rb(T); [Pl.]

2220. *C. caucasigena* Czer. - С. кавказородная = П,Кисл(Эукавк.); Pb(HK); [Sp.]
2221. *C. glabra* Boiss. - С. голая = П,Кисл(Эукавк.); Pb(HK); [Sp.]
2222. *Barkhausia rhoeadifolia*(Bieb.)Reichenb. (*Crepis rhoeadifolia* Bieb.) -
Баркгаузия маколистная = Все р-ны(Субпонт*.); ST,Rb(HK:pb); [Pl.]
2223. *B. marschallii* C.A.Mey. (*C. marschallii*(C.A.Mey.)F.Schultz) - Б. Маршалла =
КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,КН(Субкавк*.); ST,Rb(HK:pb); [R.]
2224. *Lagoseris sancta*(L.)K.Maly (*Pterothaeca sancta*(L.)C.Koch) - Птеротека
палестинская = Все р-ны(Вост.др.средиз.); ST,Rb(T); [Pl.]
2225. *Hieracium virosum* Pall. - Ястребинка ядовитая = Все р-ны(Палеаркт.);
S,Pa,ST(HK); [Sp.]
2226. *H. robustum* Fries - Я. могучая = Все р-ны(Палеаркт.); S,Pa,ST(HK); [Sp.]
2227. *H. umbellatum* L. - Я. зонтичная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Голаркт.); Da,Db(HK);
[Pl.]
2228. *H. bupleurifolium* Tausch - Я. володушколистная = П(Субсредиз*.); S(HK);
[R.]
2229. *H. arvorum*(Naeg.et Peter)Pugls. - Я. пахотная = Ст,П(Евро-Кавк.); Pa(HK);
[Sp.]
2230. ★ *H. schmalhausenianum* Litv.et Zahn - Я. Шмальгаузена = П,Кисл(Эукавк.);
Pa(HK); [R.] 1.с. Кисловодск
2231. ★ *H. adenobrachion* Litv.et Zahn - Я. железистоветочковая = П,Кисл
(Предкавк.); Pa(HK); [R.] <Es> 1.с. Пятигорск (рис. 13)
2232. ★ *H. podkumokense* Juxip - Я. подкумская = Кисл(Эукавк.); Pa(HK); [R.]
<Es> 1.с. Кисловодск (рис. 14)
2233. ★ *H. gigantellum* Litv.et Zahn - Я. крупноватая = П,Кисл(Эукавк.); Pa(HK);
<Es> 1.с. Бештау (рис. 15)
2234. ★ *H. chaetothyrum*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. волосистосоцветная = Ст,П,Кисл
(Предкавк.); Pb(HK); [Sp.] <Ee> (рис. 16)
2235. *H. erythrocarpum* Peter - Я. красноплодная = Ст,П,Кисл(Субкавк*.); S(HK);
[Sp.]
2236. *H. macrolepis* Boiss. - Я. крупночешуйчатая = П,Кисл(Субкавк*.); S,Pb(HK);
[Sp.]
2237. *H. simplicicaule*(Somm.et Levier)Peter - Я. простостебельная = П,Кисл
(Кавк.); S,Pb(HK); [Sp.]
2238. ★ *H. rigidellum* Litv.et Zahn - Я. жестковатая = Ст,П(Предкавк.); Pa(HK);
[Sp.] <Ee> 1.с. Бештау (рис. 17)
2239. *H. terekianum*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. терекская = П,Кисл(Эукавк.); Pa(HK);
[R.]
2240. ★ *H. caucasiense* Arv.-Touv. - Я. предкавказская = П,Кисл(Предкавк.);
Da(HK); [R.] <Es> 1.с. Бештау (рис. 18)

2241. ★ *H. beschtavicum*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. бештаусская = Ст,П,Кисл
(Предкавк.); S(HK); [Sp.] <Ее> l.c. Бештау (рис. 19)
2242. ★ *H. beschtaviciforme* Juxip - Я. бештаускообразная = П(Предкавк.);
Pa(HK); [R.] <Es> l.c. Бештау (рис 20)
2243. ★ *H. acuminatifolium*(Litv.et Zahn)Juxip (*H. epichlorum*(Litv.et Zahn)Juxip) - Я.
заострённолистная = П(Предкавк.); S(HK); [R.] <Es> l.c. Железноводск (рис.
21)
2244. *H. pilosella* L. - Я. волосистая = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Кавк.);
Da,Db(HK); [Pl.] <Pm>
2245. *H. bifurcum* Bieb. (*H. longipes*(C.Koch ex Naeg et Peter)Juxip) - Я.
раздвоенная = Ст,П(Субкавк*.) ; Pa(HK); [Sp.]
2246. *H. caucasicum* Naeg. et Peter (*H. hohenackeri*(Naeg. et Peter)Juxip) - Я.
кавказская = Ст,СК,П,Кисл(Субкавк*.) ; ST(HK); [Sp.]
2247. ★ *H. maschukense* Litv.et Zahn - Я. машукская = Ст,П,Кисл(Субкавк*.) ;
ST(HK); [Sp.] l.c. Машук
2248. *H. echioides* Lumn. - Я. румянковая = Ст,ЛН,П,Кисл(Палеаркт.); ST(HK);
[Sp.]
2249. *H. arvense*(Naeg. et Peter)Juxip - Я. полевая = Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Европ.);
Pa(HK); [Sp.]
2250. *H. procerigenum*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. рослородственная = Ст,СК,П
(Субкавк*.) ; Pa(HK); [Sp.] l.c. Бештау
2251. ★ *H. stauopolitanum* Juxip (*H. piloselloides* Vill.) - Я. ставропольская = Ст
(Предкавк.); S,Pa(HK); [R.] <Es> l.c. Ставрополь (рис. 22)
2252. *H. auriculoides* Lang. (*H. lasiophorum*(Naeg. et Peter)Juxip, *H. amaura-*
basis(Litv.et Zahn)Juxip) - Я. ушастая = Ст,СК,П(Евро-Кавк.); S(HK); [Sp.]
2253. *H. endourovae* Juxip (*H. argillacioides*(Litv.et Zahn)Juxip, *H. quinque-*
monticola Juxip) - Я. Эндоуровой = Ст,П,Кисл(Эвксин.); Pa(HK); [Sp.]
2254. ★ *H. medianiforme*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. средняя = П(Кавк.); S(HK); [R.]
<Es> l.c. Бештау
2255. *H. strictissimum* Froel. - Я. прямейшая = П,Кисл(Общедр.средиз.); Pa(HK);
[R.]
2256. *H. verruculatum* Link. - Я. мелкобородчатая = П[Николаев, 1990]
(Субкавк*.) ; Pa(HK); [Sp.]
2257. *H. procerum* Fries - Я. рослая = П[Николаев, 1990](Вост.др.средиз.); Pa(HK);
[Sp.]

ЛИТЕРАТУРА

1. Аверьянов Л.В. Обзор видов семейства Orchidaceae флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1994, Т. 79, № 10. -С. 108-127.
2. Бакташова Н.М. Конспект флоры Калмыкии. Элиста: Изд-во КГУ, 1994. -81 с.
3. Белоус В.Н. Новые виды рода *Astragalus* L. во флоре Ставрополья // Охрана, обогащение, воспроизведение и использование растительных ресурсов. - Ставрополь, 1990а.-С. 308-310.
4. Белоус В.Н. Эколо-ценотические особенности и распространение видов рода *Astragalus* L. (Fabaceae) флоры Ставрополья // Активное воспроизведение генофонда флоры и растительности. Ставрополь, 1990б. -С. 75-86.
5. Белоус В.Н. *Kitaibelia vitifolia* Willd. (Malvaceae) - новый вид для флоры Ставрополья // Вестник СГУ, вып. 19, 1999. -С. 50-51.
6. Буданцев А.Л. Конспект рода *Verbascum* (Scrophulariaceae) флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1998, Т. 83, № 7. -С. 128-139.
7. Галушко А. И. Анализ флоры западной части Центрального Кавказа // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 1. -Ставрополь, 1976. -С. 5-130.
8. Галушко А.И. Флора Северного Кавказа. -Ростов: РГУ, 1978-1980: Т. 1, 1978. - 317 с. Т. 2, 1980. -350 с. Т. 3, 1980. -327 с.
9. Галушко А. И. Новые таксоны и номенклатурные комбинации // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 3. -Ставрополь, 1979. -С. 53-57.
10. Галушко А. И. Новые таксоны Северного Кавказа и новые находки // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 4. -Ставрополь, 1983. -С. 6-16.
11. Галушко А. И., Мигненко Т. И. Экологические реликты долины реки Калаус (Центральное Предкавказье) // Экологические проблемы Ставропольского края и сопредельных территорий. -Ставрополь, 1989. -С. 88-89.
12. Гельтман Д.В. Заметки о кавказских видах рода *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae) // Новости систематики высших растений, Т. 28, 1991. -С. 110-116.
13. Гроссгейм А.А. Флора Кавказа, 2-е изд., 1939-1967. Т. 1, -Баку: Изд. Азерб. ФАН СССР, 1939. -404 с. Т. 2, -Баку: Изд. Азерб. ФАН СССР, 1940. -284 с. Т. 3, -Баку: Изд. Азерб. ФАН СССР, 1944. -322 с. Т. 4, -М.-Л.: Изд. АН СССР, 1950. -314 с. Т. 5, -М.-Л.: Изд. АН СССР, 1952. -456 с. Т. 6, -М.-Л.: Изд. АН СССР, 1962. -424 с. Т. 7, -М.-Л.: Изд. АН СССР, 1967. -894 с.
14. Данилевич В. Г. О состоянии популяции *Gagea artemczukii* A.Krasnova в Приманычье // Вопросы экологии и охраны природы Ставропольского края и сопредельных территорий. -Ставрополь, 1995. -С. 81.
15. Данилевич В.Г. Обзор видов рода *Gagea* Salisb. Ставропольского края // Вестник СГУ, вып. 6, 1996. -С. 91-100.

- 16.Деревья и кустарники Северного Кавказа/Под ред. А.И.Галушко. Нальчик, 1967. -534 с.
- 17.Дикорастущие растения Ставропольского края. Часть 1 / Под редакцией В.В. Скрипчинского. Труды Ставропольского НИИСХ, вып. XXVI, 1977. -196 с.
- 18.Дикорастущие растения Ставропольского края. Часть 2 / Под редакцией М.И. Котова. Труды Ставропольского НИИСХ, 1979. -138 с.
- 19.Дорофеев В.И. Конспект рода *Erysimum* (Brassicaceae) Кавказа // Ботанический журнал, Т. 77, № 11, 1987. -С. 1533-1543.
- 20.Дорофеев В.И. Новые для Кавказа виды семейства Brassicaceae // Ботанический журнал, Т. 76, № 7, 1991. -С. 988-989.
- 21.Дорофеев В.И. Новые данные о крестоцветных Кавказа // Ботанический журнал, 1994, Т. 79, № 5. -С. 102-104.
- 22.Дорофеев В.И. Род *Brassica* (Brassicaceae) флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1996а, Т. 81, № 2. -С. 83-85.
- 23.Дорофеев В.И. Род *Barbarea* (Brassicaceae) флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1996б, Т. 81, № 3. -С. 130-137.
- 24.Дорофеев В.И. Род *Cardaria* (Brassicaceae) флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1996в, Т. 81, № 4. -С. 93.
- 25.Дорофеев В.И. Род *Camelina* (Brassicaceae) флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1996г, Т. 81, № 8. -С. 95-99.
- 26.Дорофеев В.И. Род *Sisymbrium* (Brassicaceae) флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1997, Т. 82, № 5. -С. 106.
- 27.Дорофеев В.И. Род *Rorippa* (Brassicaceae) во флоре Кавказа // Ботанический журнал, Т. 1998, 83, № 8. -С. 98-106.
- 28.Дубовик О.Н., Дзыбов Д.С. Географический анализ видов рода *Astragalus* (Fabaceae) Крымско-Новороссийской провинции и их флористические связи // Ботанический журнал, 1990. Т. 75, № 2. -С. 170-180.
- 29.Дубовик О.Н., Мосякин С.Л. *Artemisia verlotiorum* (Asteraceae) - новый аддентивный вид флоры Северного Кавказа // Ботанический журнал, 1991, Т. 76, № 10. -С. 1408-1411.
- 30.Дударь Ю.А., Андриянова Н.А. Распространение диких видов рода Лядвенец (*Lotus*) на Ставрополье // Вопросы географии и геоэкологии. Ставрополь: Изд-во СГУ, 1998. -С. 56-58.
- 31.Дударь Ю.А., Кононов В.Н., Скрипчинский В.В., Танфильев В.Г. Исследование флоры Ставропольского края // Материалы по изучению Ставропольского края, вып II. -Ставрополь: Ставроп. кн.изд-во, 1964. -С. 100-110.
- 32.Дударь Ю.А., Мигненко Т.И. Эремурус представительный (*Eremurus spectabilis* Bieb.) во флоре Ставрополья // Бюллетень ботанического сада "Белые ночи". Сочи, 1991. -С. 34-35

- 33.Егорова Т.В. Обзор подсемейств Cyperoideae и Rhynchosporoideae (Cyperaceae) флоры Кавказа // Новости систематики высших растений 1991. Т.28. -С. 5-21.
- 34.Иванов А.Л. К вопросу о нахождении *Adiantum capillus-veneris* L. на Ставропольской возвышенности // Современные вопросы экологии и природопользования на Ставрополье. -Ставрополь, 1993. -С. 36-37.
- 35.Иванов А.Л. О новом местонахождении *Ophrys oestifera* Bieb. на Северном Кавказе // Современные вопросы экологии и природопользования на Ставрополье. - Ставрополь, 1993. -С. 39-40.
- 36.Иванов А.Л. Редкие и исчезающие растения Ставрополья. Часть I. Ставрополь, 1995а. -180 с.
- 37.Иванов А.Л. Редкие и исчезающие растения Ставрополья. Часть II. Ставрополь, 1995б. -128 с.
- 38.Иванов А.Л. Конспект флоры Ставрополья. Ставрополь, 1997. -156 с.
- 39.Иванов А.Л. Флора Предкавказья и её генезис. Ставрополь: Изд-во СГУ, 1998. - 204 с.
- 40.Иванов А.Л. К вопросу о флористическом районировании Предкавказья // Вестник СГУ, вып.17, 1999. -С. 38-53.
- 41.Кононов В.Н., Танфильев В.Г. Новые и редкие растения во флоре Ставропольского края // Новости систематики высших растений, Т. 19, 1982. - С. 196-199.
- 42.Кононов В.Н., Танфильев В.Г. Новые и редкие виды растений Ставропольского края // Материалы по изучению Ставропольского края, вып. 15-16. Ставрополь: Ставропольское кн. изд-во, 1988. -С. 133-137.
- 43.Косенко И.С. Определитель высших растений Северо-Западного Кавказа и Предкавказья. М.: Колос, 1970. -614 с.
- 44.Кравцун Н.В. О нахождении *Pteridium tauricum*(C.Presl)V.Krecz. в верховьях р. Кумы (Северное Предэльбрусье) // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 4. -Ставрополь, 1983. -С. 103-104.
- 45.Кравцун Н.В. Реликтовые виды буковых лесов верховий рек Кумы и Дарьи и их притоков // Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране. -Ставрополь, 1986. -С. 46-47.
- 46.Кравцун Н.В. Нахождение на Северном Кавказе *Galanthus woronowii* и его охрана //Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране. Грозный, 1989.-С.49-51.
- 47.Кудряшова Г.Л. Конспект флоры рода *Allium* (Alliaceae) Кавказа // Ботанический журнал, Т. 77, № 4, 1991. -С. 86-88.

- 48.Кудряшова Г.Л. Конспект видов семейств Saxifragaceae и Parnassiaceae флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1995, Т. 80, № 8. -С. 104-108.
- 49.Кузьмина М.Л. Конспект видов семейств Caprifoliaceae, Viburnaceae, Sambucaceae и Adoxaceae флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1996, Т. 81, № 10. -С. 92-95.
- 50.Лавренко Е.М. Европейско-Сибирская лесостепная область // Геоботаническое районирование СССР.М.:Изд-во АН СССР, 1947а. -С. 87-94.
- 51.Лавренко Е.М. Евразиатская степная область // Геоботаническое районирование СССР. М.:Изд-во АН СССР, 1947б. -С. 95-110.
- 52.Лавренко Е.М. Основные черты ботанико-географического разделения СССР и сопредельных стран // Проблемы ботаники, вып. 1, М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. -С. 530-548.
- 53.Лазьков Г.А. Обзор рода *Silene* (Caryophyllaceae) флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1996а, Т. 81, № 8. -С. 99-111.
- 54.Лазьков Г.А. Обзор рода *Herniaria* (Caryophyllaceae) флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1996б, Т. 81, №. 9. -С. 90-92.
- 55.Лиховид Н.Г. Флора водно-болотных и переувлажненных местообитаний Предкавказья и перспективы её изучения // Вестник СГУ, 1966, вып. 6. -С. 134-137.
- 56.Магулаев А.Ю. О состоянии популяций редких видов бобовых Северного Кавказа // Экологические проблемы Ставропольского края и сопредельных территорий. Ставрополь, 1989. -С. 98-99.
- 57.Меницкий Ю.Л. Обзор видов рода *Thymus* L. (Lamiaceae) флоры Кавказа // Новости систематики высших растений, Т. 23, 1986. -С. 117-142.
- 58.Меницкий Ю.Л. Проект "Конспект флоры Кавказа". Карта районов флоры // Ботанический журнал, 1991а, Т. 76, № 11. -С. 1513-1521.
- 59.Меницкий Ю.Л. Конспект видов семейства Apiaceae (Umbelliferae) флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1991б, Т. 76, № 12. -С. 1749-1764.
- 60.Меницкий Ю.Л. Конспект видов семейства Lamiaceae (Labiatae) флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1992а, Т. 77, № 6. -С. 63-78.
- 61.Меницкий Ю.Л. Конспект видов семейства Dipsacaceae флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1992б, Т. 77, № 11. -С. 136-139.
- 62.Меницкий Ю.Л. Конспект видов семейства Chenopodiaceae флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1994, Т. 79, № 5. -С. 105-114.
- 63.Меницкий Ю.Л. Конспект видов рода *Cirsium* (Asteraceae) Кавказа // Ботанический журнал, 1996, Т. 81, № 9. -С. 92-105.
- 64.Меницкий Ю.Л. Конспект видов семейства Malvaceae Кавказа // Ботанический журнал, 1997, Т. 82, № 8. -С. 120-129.
- 65.Меницкий Ю.Л. Конспект кавказских видов *Linaria* (Scrophulariaceae) // Ботанический журнал, 1998, Т. 83, № 12. -С. 122-132.

- 66.Меницкий Ю.Л., Попова Т.Н. Конспект видов рода *Taraxacum* (Asteraceae) Кавказа // Ботанический журнал, 1996, Т. 81, № 8. -С. 83-94.
- 67.Мизирева О.М. О нахождении *Sedum reflexum* L. на территории Ставропольского края // Современные проблемы экологии и природопользования на Ставрополье. -Ставрополь, 1993. -С. 61-62.
- 68.Мизирева О.М., Дударь Ю.А. Толстянковые (Crassulaceae DC.): к изучению биоразнообразия на Предкавказье // Вестник СГУ, 1999, вып. 17. -С. 54-60.
- 69.Михеев А.Д. Дополнение к флоре района Кавказских Минеральных Вод // Ботанический журнал, Т. 61, № 7, 1976. -С. 973-979.
- 70.Михеев А.Д. Некоторые вопросы охраны ботанических объектов района Кавказских Минеральных Вод. // Бюллетень МОИП, отд. Биологии, Т. 84, вып. 2, 1979. -С. 101-110.
- 71.Михеев А.Д. Новые флористические находки на Северном Кавказе // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 4.-Ставрополь, 1983. -С. 95-98.
- 72.Михеев А.Д. Два новых вида *Papaver* L. из Центрального Предкавказья // Бюллетень МОИП, отд. биол., 1981, Т. 86, вып. 3. -С. 81-90.
- 73.Михеев А.Д. Белоцветковая раса из рода *Papaver dubium* L. на Северном Кавказе // Бюллетень МОИП, отд. биол., 1985, Т. 90, вып. 3. -С. 89-93.
- 74.Михеев А.Д. Виды секции *Rhoeodium* рода *Papaver* (Papaveraceae) на Северном Кавказе // Ботанический журнал, 1986, Т. 71, № 6. -С. 807-812.
- 75.Михеев А.Д. Конспект видов семейства Rubiaceae флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1992, Т. 77, № 10. -С. 68-74.
- 76.Михеев А.Д. Обзор видов семейства Papaveraceae флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1993, Т. 78, № 5. -С. 115-124.
- 77.Михеев А.Д. Конспект видов семейства Valerianaceae флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1994, Т. 79, № 6. -С. 104-113.
- 78.Михеев А.Д. Обзор видов рода *Psephellus* (Asteraceae) Северного Кавказа и Западного Закавказья // Ботанический журнал, 1996, Т. 81, № 7. -С. 110-118.
- 79.Михеев А.Д. Новый вид рода *Centaurea* (Asteraceae) с Северного Кавказа // Ботанический журнал, 1997, Т. 82, № 11. -С. 85-88.
- 80.Мордак Е.В. О *Fritillaria meleagroides* Partin ex Schult.et Schult.f. (Liliaceae) на Кавказе // Новости систематики высших растений, Т. 20, 1983. -С. 86-91.
- 81.Мордак Е.В. Что такое *Tulipa schrenkii* Regel и *T. heteropetala* Ledeb.(Liliaceae)? // Новости систематики высших растений, Т. 26, 1990. -С. 27-31.
- 82.Мцхвадзе Д.И. Конспект кавказских представителей родов *Arabis*, *Turritis* и *Alyssopsis* (Brassicaceae) // Ботанический журнал 1998, Т. 83, № 2. -С. 112-120.
- 83.Немирова Е.С. К экологии *Jurinea Cass.* Северного Кавказа // Вестник СГУ, 1999, вып. 19. -С. 45-49.

84. Немирова Е.С. Род *Jurinea* Cass. Северного Кавказа. Ставрополь: Изд-во СГУ, 1999. - 185 с.
85. Немирова Е.С., Данилевич В.Г. К флоре окрестностей озера Солёного // Актуальные вопросы экологии и охраны природы Ставропольского края и сопредельных территорий. Ставрополь, 1991. -С. 134-135.
86. Немирова Е.С., Данилевич В.Г. К флоре северо-восточных и восточных районов Ставропольского края // Вестник СГПУ, вып. 2. Ставрополь, 1995. -С. 23-26.
87. Николаев В.Я. Обзор кавказских видов *Hieracium* подрода *Pilosella* (Asteraceae) // Ботанический журнал, 1989, Т. 74, № 7. -С. 1040-1050.
88. Николаев В.Я. Обзор кавказских видов рода *Hieracium* подрода *Hieracium* - секции *Hieracium*, *Pannosa*, *Sparsiflora*, *Glauciformis* (Asteraceae) // Ботанический журнал, 1990а, Т. 75, № 3. -С. 419-429;
89. Николаев В.Я. Обзор кавказских видов *Hieracium* подрода *Hieracium* - секции *Prenanthesidea*, *Schmalhauseniana*, *Foliosa*, *Sabauda*, *Umbellata*, *Tridentata* (Asteraceae) // Ботанический журнал, 1990б, Т. 75, № 4. -С. 556-563.
90. Портениер Н.Н. Обзор видов рода *Carduus* (Asteraceae) флоры Кавказа. 1. Секции *Carduus* и *Carduastrum* // Ботанический журнал, 1997а, Т. 82, № 9. -С. 100-108.
91. Портениер Н.Н. Обзор видов рода *Carduus* (Asteraceae) флоры Кавказа. 2. Секция *Hamalolepidotii* и ключ для определения видов // Ботанический журнал, 1997б, Т. 82, № 10. -С. 143-150.
92. Проханов Я.И. Обзор растительности и флоры Будённовского района Ставропольского края // Материалы по изучению Ставропольского края, вып. 2-3, Ставрополь: Крайиздат, 1950. -С. 103-162.
93. Сорные растения Ставропольского края / Под редакцией С.Н. Быстрова и В.В. Скрипчинского. Труды Ставропольского НИИСХ, вып. XXXII, 1975. -290 с.
94. Сохраним для потомков / Под. ред. В. В. Скрипчинского.-Ставрополь: Ставр. кн. изд-во, 1984.-С. 57-177.
95. Сытин А.К. Ревизия кавказских астрагалов (*Astragalus* L., Fabaceae) секции *Hololeuce* Bunge // Новости систематики высших растений, 1986., Т. 23. -С. 79-86.
96. Сытин А.К. Ревизия кавказских астрагалов (*Astragalus* L., Fabaceae) секции *Myobroma* (Stev.)Bunge // Новости систематики высших растений, Т. 28, 1991. - С. 102-110.
97. Танфильев В.Г., Кононов В.Н. Дополнение к флоре Ставропольского края // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 3. -Ставрополь, 1979. -С. 85-89.

98. Танфильев В.Г., Кононов В.Н. Каталог дикорастущих растений Ставропольского края. -Ставрополь: СНИИСХ, 1987. -116 с.
99. Тахтаджян А.Л. Происхождение и расселение цветковых растений. Л.: Наука, 1970. -146 с.
100. Тахтаджян А.Л. Флористическое деление суши // Жизнь растений, Т. 1. М.: Просвещение, 1974. -С. 117-153.
101. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. Л.: Наука, 1978. -247 с.
102. Толмачёв А.И. Введение в географию растений. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1974. -224 с.
103. Флора Восточной Европы, Т. IX/Под. ред. Н.Н. Цвелёва. Санкт-Петербург: Мир и семья-95, 1996. 450 с.
104. Флора Европейской части СССР, Т. 1-8: Т. I, Л.: Наука, 1974. -404 с. Т. II, Л.: Наука, 1976. -235 с. Т. III, Л.: Наука, 1978. -257 с. Т. IV, Л.: Наука, 1979. -355 с. Т. V, Л.: Наука, 1981. - 379 с. Т. VI, Л.: Наука, 1987. -254 с. Т. VII, Санкт-Петербург: Наука, 1994. 319 с. Т. VIII, Л.:Наука, 1989.-411 с.
105. Фролов Ю.М. Новый вид рода *Symphytum* (Boraginaceae) с Кавказа // Ботанический журнал, 1985, Т. 70, № 4. -С. 533-534.
106. Цвелёв Н.Н. Злаки СССР. Л.: Наука, 1976. -788 с.
107. Цвелёв Н.Н. О некоторых новых для Кавказа видах растений // Новости систематики высших растений, 1990, Т. 27. -С. 179-183.
108. Цвелёв Н.Н. Обзор видов семейства Gentianaceae флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1993а, Т. 78, № 6. -С. 131-138.
109. Цвелёв Н.Н. Заметки о злаках (Poaceae) Кавказа // Ботанический журнал, 1993б, Т. 78, № 10. -С. 83-95.
110. Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. - С.-Пб.: Мир и семья-95, 1995. -990 с.
111. Чернева О.В. Обзор видов рода *Jurinea* (Asteraceae) флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1994, Т. 79, № 5. -С. 114-126.

Приложение

**РИСУНКИ ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ
ФЛОРЫ СТАВРОПОЛЬЯ**

**ICONES PLANTARUM ENDEMICUM
FLORAE STAUROPOLENSIS**




Рис. 1. *Bromopsis gordjagini* – Кострец Гордягина




Рис. 2. *Elytrigia dshinalica* – Пырей джинальский



Рис. 3. *Papaver albertii* – Мак Альберта




Рис. 4. *Papaver paczoskii* – Мак Пачоского




Рис. 5. *Cotoneaster nefedovii* – Кизильник Нефёдова




Рис. 6. *Rosa dolichocarpa* – Шиповник удлинённоплодный




Рис. 7. *Euphorbia aristata* – Молочай остистый




Рис. 8. *Euphorbia normannii* – Молочай Нормана




Рис. 9. *Vincetoxicum stauropolianum* – Ластовень ставропольский




Рис. 10. *Symphytum podcicum* – Окопник подкумский




Рис. 11. *Echinops viridifolius* – Мордовник зеленолистный



Рис. 12. *Psephellus annae* – Псефеллюс Анны




Рис. 13. *Hieracium adenobrachion* – Ястребинка железистоветочковая



Рис. 14. *Hieracium podkumokense* – Ястребинка подкумская



Рис. 15. *Hieracium gigantellum* – Ястребинка крупноватая




Рис. 16. *Hieracium chaetothyrum* – Ястребинка волосистосоцветная




Рис. 17. *Hieracium rigidellum* – Ястребинка жестковатая




Рис. 18. *Hieracium caucasiense* – Ястребинка предкавказский



Рис. 19. *Hieracium beschtavicum* – Ястребинка бештаусская




Рис. 20. *Hieracium beshtaviciiforme* – Ястребинка бештаускообразная




Рис. 21. *Hieracium acuminatifolium* – Ястребинка заострённолистная




Рис. 22. *Hieracium staupolianum* – Ястребинка ставропольская

Алфавитный указатель русских названий родов

А			
Абрикос.....	1066	Бассия.....	617
Авран.....	1774	Бедренец.....	1454
Агазилис.....	1475	Безвременник.....	367
Адамов корень.....	452	Бекмания.....	156
АЗинеума.....	1958	Белая акация.....	1069
Аирник.....	279	Белена.....	1736
Аистник.....	1251	Беллевалия.....	406
Айлант.....	1284	Белозор.....	980
Айпиант.....	1585	Белокопытник.....	2053
Алтей.....	1341	Белокудренник.....	1684
Альбовия.....	1458	Беломятлик.....	211
Амброзия.....	1996	Беотрион.....	281
Амми.....	1449	Берёза.....	518
Амория.....	1102	Бересклет.....	1314
Аморфа.....	1068	Берула.....	1462
Анабазис.....	647	Бескильница.....	206
Анакамптис.....	497	Бессмертник.....	1978
Анемонаструм.....	780	Бешеный огурец.....	1936
Анемоноидес.....	781	Бирючина.....	1534
Анизанта.....	231	Бисторт.....	584
Аргиролобиум.....	1071	Блимус.....	292
Аргузия.....	1577	Блитум.....	589
Аронник.....	343	Блошница.....	1991
Архангелика.....	1474	Бодяк.....	2102
Асперуга.....	1624	Болиголов.....	1431
Астра.....	1961	Болотница.....	293
Астрагал.....	1141	Бор.....	113
Астраканта.....	1140	Борец.....	777
Астронция.....	1402	Бородавник.....	2151
Асфоделина.....	369	Бородач.....	76
Б		Борщевик.....	1496
Баранец.....	1	Боярышник.....	998
Барбарис.....	821	Брахиария.....	85
Барвинок.....	1551	Бровник.....	477
Баркгаузия.....	2216	Буглоссоид.....	1583
		Будра.....	1661

Бузина.....	1891	Воронец.....	767
Бук.....	526	Вороний глаз.....	446
Буквица.....	1693	Ворсянка.....	1915
Бурачок.....	923	Восковник.....	1588
Бутень.....	1410	Вострец.....	275
Бухарник.....	143	Вудсия.....	17
Бушня.....	798	Вульпия.....	224
Бюфония.....	690	Выюнок.....	1563
В		Вяжечка.....	909
Вайда.....	853	Вязель.....	1184
Валериана.....	1898	Г	
Валерианица.....	1903	Габлиция.....	588
Валлинерия.....	73	Галимие.....	610
Василёк.....	2128	Галинсога.....	2004
Василистник.....	814	Гарадиолус.....	2165
Ваточник.....	1553	Гармала.....	1268
Вейник.....	136	Гвоздика.....	741
Венечник.....	373	Гелиотроп.....	1578
Вентената.....	148	Гельминтотека.....	2164
Вербейник.....	1517	Герань.....	1235
Вербена.....	1631	Гибискус.....	1345
Верблюдка.....	623	Гимнокарпиум.....	16
Верблюжья колючка.....	1200	Гипекоум.....	822
Вероника.....	1775	Гипохерис.....	2154
Веснянка.....	921	Гипсолюбка.....	730
Ветреница.....	785	Гладыш.....	1502
Вздутоплодник.....	1409	Гледичия.....	1067
Вздутосемянник.....	1430	Гнездовка.....	469
Визнага.....	1449	Головчатка.....	1919
Виноград.....	1330	Голосхенус.....	282
Вишня.....	1063	Гольдбахия.....	944
Водокрас.....	72	Гониолимон.....	1524
Водосбор.....	768	Горделимус.....	269
Водяная звёздочка.....	1311	Горечавка.....	1539
Водяной лютик.....	796	Горечавочка.....	1547
Волдырник.....	729	Горечавочник.....	1546
Волжанка.....	985	Горицвет.....	818
Воловик.....	1599	Горичник.....	1480
Володушка.....	1435	Горлюха.....	2161
Воробейник.....	1582	Горох.....	1234

Горошек.....	1201	Дрок.....	1072
Горчак.....	2120	Дуб.....	523
Горчица.....	883	Дубровник.....	1639
Горькуша.....	2083	Дурман.....	1744
Граб.....	516	Дурнишник.....	1998
Гравилат.....	1028	Душевка.....	1714
Гребенщик.....	1354	Душевник.....	1711
Гребневик.....	183	Душистый колосок.....	97
Гречиха.....	585	Душица.....	1717
Гречишка.....	570	Дымянка.....	841
Гриовохвост.....	1680	Дягель.....	1473
Гроздовник.....	11	Е	
Грудница.....	1965	Ежа.....	181
Груша.....	990	Ежевика.....	1006
Грушанка.....	1506	Ежеголовник.....	47
Грыжник.....	660	Ж	
Гулявник.....	863	Жабник.....	1972
Гусиный лук.....	374	Жабрица.....	1463
Д		Железница.....	1654
Двукисточник.....	95	Желтушник.....	945
Двулепестник.....	1396	Жеруха.....	910
Двурядка.....	885	Жерушник.....	911
Девясил.....	1979	Жестоколосница.....	184
Дельфиниум.....	775	Живокость.....	769
Дербенник.....	1383	Живучка.....	1633
Деревей.....	2016	Жимолость.....	1895
Дереза.....	1733	Житняк.....	260
Держи-дерево.....	1325	Жостер.....	1327
Дескурайния.....	870	Журавельник.....	1251
Джузгун.....	567	З	
Дивала.....	664	Занникеля.....	61
Диедропетала.....	773	Заразиха.....	1831
Дифелипия.....	1824	Звёздчатка.....	667
Диходон.....	686	Зверобой.....	1347
Додарция.....	1773	Земляника.....	1010
Долихориза.....	2070	Зизифора.....	1707
Донник.....	1097	Зимфиандра.....	1957
Дороникум.....	2055	Змеёвка.....	161
Дрёма.....	727	Змееголовник.....	1662
Дремлик.....	473	Золотая розга.....	1960

Золотобородник.....	78	Кермек.....	1526
Золототысячник.....	1535	Кизил.....	1504
Зопник.....	1670	Кизильник.....	986
Зосима.....	1500	Кипрей.....	1386
Зубровка.....	98	Кирказон.....	545
Зубчатка.....	1814	Кислица.....	1256
Зубянка.....	902	Китайбелия.....	1346
Зюзник.....	1725	Клевер.....	1115
И		Клён.....	1318
Иберийка.....	855	Климакоптера.....	645
Ива.....	499	Клоповник.....	845
Иван-чай.....	1393	Клубнекамыш.....	291
Икотник.....	934	Ковыль.....	99
Ильм.....	527	Козелец.....	2168
Императа.....	74	Козлобородник.....	2174
Ирга.....	996	Козлятник.....	1132
Ирис.....	455	Кокорыш.....	1470
Иссоп.....	1716	Кокушник.....	479
Истод.....	1277	Колокольчик.....	1937
К		Колосняк.....	276
Калина.....	1893	Кольподиум.....	199
Камнеломка.....	975	Кольраушия.....	739
Камфоросма.....	615	Колючник.....	2077
Камыш.....	283	Коммелина.....	350
Камышник.....	282	Кониза.....	1970
Канареечник.....	96	Конопля.....	537
Канатник.....	1333	Конригия.....	896
Кандык.....	388	Конский фенхель.....	1433
Каперцы.....	960	Копеечник.....	1186
Капуста.....	879	Копытень.....	544
Карагана.....	1135	Кориандр.....	1428
Кардария.....	844	Коровяк.....	1745
Каркас.....	532	Короствник.....	1912
Карпезиум.....	1993	Коротконожка.....	240
Каспия.....	644	Косогорник.....	2188
Катаброзелла.....	198	Костенец.....	28
Катран.....	888	Костенец.....	687
Каулиния.....	65	Костёр.....	233
Кверия.....	691	Кострец.....	225
Кендырь.....	1552	Костяника.....	1004

Котовник.....	1656	Лебеда.....	599
Кочедыжник.....	13	Левкой.....	958
Крапива.....	538	Леерсия.....	94
Красавка.....	1734	Ленец.....	542
Крепкоплодник.....	935	Лён.....	1259
Кресс.....	845	Леопольдия.....	407
Крестовник.....	2058	Лепидотека.....	2025
Крестовница.....	1858	Лещина.....	517
Кривоцвет.....	1597	Лигия.....	1380
Кринитария.....	1965	Лигустикум.....	1472
Кровохлёбка.....	1042	Лилия.....	396
Крупина.....	2115	Лимодорум.....	476
Крупка.....	917	Липа.....	1331
Круциата.....	1885	Липучка.....	1618
Крушина.....	1326	Лисохвост.....	123
Крыжовник.....	983	Листовник.....	32
Ксантобрихис.....	1189	Литвиновия.....	936
Ксантоксалис.....	1257	Ломкоостенник.....	274
Ксантоселинум.....	1487	Ломонос.....	787
Кубышка.....	756	Лопух.....	2078
Кувшинка.....	755	Лох.....	1382
Куколь.....	703	Лук.....	411
Кукушник.....	724	Льнянка.....	1756
Кульбаба.....	2156	Любка.....	480
Кумарчик.....	626	Лютик.....	800
Купальница.....	762	Люцерна.....	1086
Купена.....	441	Лядвенец.....	1128
Купырь.....	1415	Ляллеманция.....	1666
Курильский чай.....	1013	М	
Куриное просо.....	86	Майкараган.....	1139
Куропаточья трава.....	1031	Майник.....	440
Л		Мак.....	826
Лабазник.....	1032	Маклюра.....	535
Лазурник.....	1490	Макроселинум.....	1486
Лаконос.....	658	Макросциадиум.....	1472
Ламира.....	2113	Малина.....	1005
Ландыш.....	439	Манжетка.....	1034
Лапчатка.....	1014	Манник.....	201
Ластовень.....	1555	Марена.....	1889
Латук.....	2190	Марь.....	590

Марьянник.....	1807	Мятлик.....	185
Мать-и-мачеха.....	2052	Н	
Мачок.....	824	Наголоватка.....	2085
Медуница.....	1608	Наяда.....	64
Мелисса.....	1708	Негундо.....	1323
Мелколепестник.....	1968	Недотрого.....	1324
Мерендера.....	365	Незабудка.....	1609
Мерингия.....	698	Неслия.....	937
Метелица.....	141	Нивянка.....	2022
Меч-трава.....	299	Низкозонтичник.....	1453
Миндаль.....	1062	Никандра.....	1732
Минуарция.....	692	Ножкосемянник.....	2166
Мирикария.....	1357	Нонея.....	1603
Миррис.....	1420	Норичник.....	1765
Мицелис.....	2195	Ночная фиалка.....	940
Многобородник.....	129	О	
Многоножка.....	35	Обвойник.....	1554
Многорядник.....	24	Оберна.....	705
Многосемянник.....	861	Облепиха.....	1381
Можжевельник.....	38	Овсец.....	152
Молиния.....	163	Овсюг.....	149
Молодило.....	962	Овсяница.....	212
Молокан.....	2190	Огуречная трава.....	1598
Молочай.....	1286	Одуванчик.....	2199
Молюцелла.....	1683	Ожика.....	351
Мордовник.....	2071	Окопник.....	1592
Морковник.....	1471	Ольха.....	521
Морковница.....	1425	Омалотека.....	1977
Морковь.....	1503	Омежник.....	1469
Морозник.....	763	Омела.....	541
Мортук.....	263	Оносма.....	1586
Муреция.....	1452	Орех.....	514
Мушмула.....	997	Орляк.....	33
Мыльнянка.....	754	Ортанта.....	1813
Мытник.....	1819	Ортилия.....	1507
Мышехвостник.....	792	Ослинник.....	1395
Мышиный гиацинт.....	409	Осока.....	300
Мягковолосник.....	671	Осот.....	2183
Мята.....	1727	Остролодочник.....	1177
		Отитес.....	718

Офрис.....	498	Подснежник.....	448
Очанка.....	1810	Подъельник.....	1508
Очиток.....	965	Полевица.....	131
Очиточник.....	964	Полевичка.....	165
Очный цвет.....	1521	Полёвка.....	852
П		Пололепестник.....	478
Пажитник.....	1082	Полынь.....	2034
Пазник.....	2155	Порезник.....	1468
Пальчатокоренник.....	492	Портулак.....	659
Парнолистник.....	1270	Поручейник.....	1460
Паслён.....	1738	Поручейница.....	200
Пастернак.....	1491	Посконник.....	1959
Пастушья сумка.....	860	Постенница.....	540
Пахучка.....	1713	Поташник.....	627
Первоцвет.....	1510	Прангос.....	1434
Переступень.....	1934	Прибрежница.....	179
Перловник.....	171	Прицепник.....	1426
Персикария.....	579	Пробосцидея.....	1823
Песчанка.....	697	Пролеска.....	397
Петров крест.....	1822	Пролесник.....	1285
Петрокома.....	728	Проломник.....	1515
Петросимония.....	648	Прометеум.....	974
Пижма.....	2031	Просвирник.....	1334
Пикульник.....	1673	Просо.....	90
Пион.....	759	Прутняк.....	620
Пиптатерум.....	111	Псаммофилиелла.....	738
Пиретрум.....	2028	Псевдомускари.....	408
Плаунок.....	2	Псевдософора.....	1070
Плевел.....	243	Псефеллюс.....	2122
Плеконакс.....	723	Псилиум.....	1857
Плоскоплодник.....	933	Птеротека.....	2218
Плющ.....	1400	Птицемлечник.....	398
Повилика.....	1568	Пузыреплодник.....	1933
Пвой.....	1566	Пузырник.....	14
Пвойничек.....	1351	Пузырница.....	1735
Погремок.....	1815	Пузырчатка.....	1847
Подлесник.....	1401	Пупавка.....	2006
Подмаренник.....	1868	Пупочник.....	1627
Подорожник.....	1849	Пустырник.....	1681
Подорожникоцветник.....	1532	Пушистоспайник.....	1476

Пушкиния.....	405	Свободносемянник.....	1432
Пыльцеголовник.....	470	Северница.....	1523
Пырей.....	250	Секуригера.....	1185
Р		Селезёночник.....	979
Ракитник.....	1075	Селитрянка.....	1272
Ракитничек.....	1076	Сельдерей.....	1448
Рдест.....	51	Сердечник.....	898
Редька.....	887	Серпуха.....	2116
Резак.....	1450	Сеслерия.....	157
Резеда.....	961	Сивец.....	1925
Резуха.....	906	Сигезбекия.....	2001
Резушка.....	872	Синеголовник.....	1405
Рейхардия.....	2187	Синяк.....	1589
Ремерия.....	825	Сирения.....	956
Репейничек.....	1041	Ситник.....	354
Репник.....	895	Ситовник.....	280
Ризоматоптерис.....	15	Скабиоза.....	1926
Риндера.....	1626	Скандинкс.....	1418
Рогоглавник.....	793	Скариола.....	2194
Рогоз.....	42	Скерда.....	2210
Роголистник.....	757	Скребница.....	31
Рогоплодник.....	613	Скрытница.....	115
Рододендрон.....	1509	Скумпия.....	1312
Рожь.....	265	Слива.....	1060
Розулярия.....	974	Смирния.....	1429
Ромашка.....	2024	Смолёвка.....	709
Росичка.....	81	Смолка.....	704
Рохелия.....	1625	Смородина.....	981
Руппия.....	59	Сныть.....	1459
Рыжик.....	874	Солерос.....	632
Рябина.....	992	Солнцецвет.....	1358
Рябчик.....	393	Солодка.....	1180
Ряска.....	346	Солонечник.....	1963
С		Солянка.....	638
Сальвиния.....	36	Соляноколосник.....	630
Сарсазан.....	631	Сон.....	786
Сведа.....	633	Сорго.....	77
Свербига.....	938	Соровник.....	629
Свидина.....	1505	Софлор.....	2149
Свинорой.....	155	Сочевичник.....	1231

Спаржа.....	434	Трисетария.....	147
Спирея.....	984	Трищетинник.....	144
Стальник.....	1080	Троммсдорфия.....	2155
Стенактис.....	1971	Тростник.....	160
Стерис.....	704	Трубкоцвет.....	1628
Страусник.....	12	Трясунка.....	177
Стрелолист.....	70	Тургеневия.....	1427
Стригозелла.....	939	Тысячеголов.....	740
Сумах.....	1313	Тысячелистник.....	2016
Сурепка.....	904	Тюльпан.....	389
Сусак.....	71	У	
Сухоцвет.....	2075	Ужовник.....	10
Сушеница.....	1975	Урутъ.....	1397
Сыть.....	277	Ф	
Т		Фалакролома.....	1971
Таволга.....	984	Фаллопия.....	568
Тайник.....	468	Фацелия.....	1567
Тамус.....	452	Фелипанхе.....	1825
Татарник.....	2114	Ферула.....	1477
Телекия.....	1994	Ферульник.....	1479
Телиптерис.....	27	Фиалка.....	1363
Тельматофака.....	349	Физалис.....	1373
Терескен.....	612	Фломоидес.....	1672
Тетрадиклис.....	1269	Франкения.....	1352
Тимофеевка.....	118	Французский райграс.....	154
Тис.....	37	Фумана.....	1362
Тмин.....	1451	Х	
Толстостенка.....	859	Хамезице.....	1309
Тонконог.....	168	Хартолепис.....	2121
Тополь.....	509	Хатьма.....	1338
Тордилиум.....	1501	Хвостник.....	1399
Торилис.....	1421	Хвощ.....	3
Торица.....	699	Хеноринум.....	1764
Торичник.....	700	Хмелеграб.....	515
Трагус.....	79	Хмель.....	536
Траунштейнера.....	482	Хоботник.....	1818
Трехреберник.....	2026	Хондрилла.....	2208
Триния.....	1444	Хориспора.....	959
Триостенник.....	66	Хохлатка.....	837
Триполиум.....	1967	Хризаспис.....	1112

Хруплявник.....	586	Шерстняк.....	80
Ц		Шиповник.....	1044
Цельнолистник.....	1273	Шлемник.....	1644
Цервария.....	1488	Шпажник.....	465
Циклахена.....	1995	Штернбергия.....	451
Цикорий.....	2150	Шток-роза.....	1340
Цинанхум.....	1562	Щ	
Цингерия.....	130	Щавель.....	546
Цицербита.....	2196	Щетинник.....	91
Цмин.....	1978	Щирица.....	652
Ч		Щитовник.....	20
Чабер.....	1709	Э	
Частуха.....	67	Эгилопс.....	267
Чебрец.....	1718	Эгонихон.....	1581
Чемерица.....	364	Элеостиекта.....	1452
Череда.....	2002	Элизанте.....	725
Череш.....	372	Элимус.....	249
Черноголовка.....	1667	Эремогене.....	695
Черноголовник.....	1043	Эремоспартон.....	1134
Чернокорень.....	1629	Эремурус	372
Чернушка.....	764	Эриантус.....	75
Чертополох.....	2092	Эспарцет.....	1191
Чесночница.....	862	Эфедра.....	40
Чёточник.....	871	Я	
Чешуехвостник.....	248	Яблоня.....	991
Чий.....	110	Язвенник.....	1126
Чина.....	1220	Якорцы.....	1271
Чистец.....	1685	Ярутка.....	856
Чистотел.....	823	Ясенец.....	1275
Чистяк.....	795	Ясень.....	1533
Ш		Ясколка.....	672
Шалфей.....	1695	Ясменник.....	1859
Шандра.....	1649	Яснотка.....	1675
Шаровница.....	1848	Ястребинка.....	2219
Шафран.....	453	Ятрышник.....	484
Шелковица.....	533	Ячмень.....	270
Шеноплектус.....	284		

**Алфавитный указатель
латинских названий родов**

Abutilon.....	1333	Alopecurus.....	123
Acer.....	1318	Althaea.....	1341
Achillea.....	2016	Alyssum	923
Achnatherum.....	110	Amaranthus.....	652
Achyrophorus.....	2155	Ambrosia	1996
Acinos.....	1714	Amelanchier.....	996
Aconitum.....	777	Ammi.....	1449
Acorellus.....	279	Amorpha.....	1068
Acroptilon.....	2120	Amoria.....	1102
Actaea.....	767	Amygdalus.....	1062
Adonis.....	818	Anabasis.....	647
Aegonichon.....	1581	Anacamptis.....	497
Aegopodium.....	1459	Anagallis.....	1521
Aegylops.....	267	Anchusa.....	1599
Aeluropus.....	179	Androsace.....	1514
Aethusa.....	1470	Anemonastrum.....	780
Agasyllis.....	1475	Anemone.....	785
Agrimonia.....	1041	Anemonoides.....	781
Agriophyllum.....	626	Aneurolepidium.....	275
Agropyron.....	260	Angelica.....	1473
Agrostemma.....	703	Anisanta.....	321
Agrostis.....	131	Anthemis.....	2006
Ailanthus.....	1284	Anthericum.....	373
Aipyanthus.....	1585	Anthoxanthum.....	97
Ajuga.....	1633	Anthriscus.....	1415
Albovia.....	1458	Anthyllis.....	1126
Alcea.....	1340	Apera.....	141
Alchagi.....	1200	Apium.....	1448
Alchemilla.....	1034	Aquilegia.....	768
Alisma.....	67	Arabidopsis.....	872
Alliaria.....	862	Arabis.....	906
Allium.....	411	Archangelica.....	1474
Alnus.....	521	Arctium.....	2078
		Arenaria.....	697
		Argusia.....	1577
		Argyrolobium.....	1071
		Aristolochia.....	545
		Armeniaca.....	1066
		Arrhenantherum.....	154
		Artemisia.....	2034

Arum.....	343	Botriochloa.....	76
Aruncus.....	985	Botrychium.....	11
Asarum.....	544	Brachiaria.....	85
Asclepias.....	1553	Brachypodium.....	240
Asparagus.....	434	Brassica.....	879
Asperugo.....	1624	Briza.....	177
Asperula.....	1859	Bromopsis.....	226
Asphodeline.....	369	Bromus.....	233
Asplenium.....	28	Bryonia.....	1934
Aster.....	1961	Bufonia.....	690
Astracantha.....	1140	Buglossoides.....	1583
Astragalus.....	1141	Bunias.....	938
Astrantia.....	1402	Bupleurum.....	1435
Astrodaucus.....	1425	Buschia.....	799
Asyneuma.....	1958	Butomus.....	71
Athyrium.....	13	C	
Atriplex.....	599	Cachris.....	1434
Atropa.....	1734	Calamagrostis.....	136
Avena.....	149	Calamintha.....	1711
B		Calligonum.....	567
Baeotriion.....	281	Callitrichе.....	1311
Ballota.....	1684	Calophaca.....	1139
Barbarea.....	904	Capparis.....	960
Barkhausia.....	2216	Calystegia.....	1566
Bassia.....	617	Camelina.....	874
Batrachium.....	796	Campanula.....	1937
Beckmannia.....	156	Camphorosma.....	615
Bellevalia.....	406	Cannabis.....	537
Berberis.....	821	Capsella.....	860
Berteroa.....	934	Caragana.....	1135
Berula.....	1462	Cardamine.....	898
Betonica.....	1693	Cardaria.....	844
Betula.....	518	Carduus.....	2092
Bidens.....	2002	Carex.....	300
Bilacunaria.....	1433	Carlina.....	2077
Bistorta.....	584	Carpesium.....	1993
Blitum.....	589	Carpinus.....	516
Blymus.....	292	Carthamus.....	2149
Bolboschoenus.....	291	Carum.....	1451
Borago.....	1598	Caspia.....	644

Catabrosa.....	200	Clematis.....	787
Catabrosella.....	198	Climacoptera.....	645
Caucalis.....	1426	Clinopodium.....	1713
Caulinia.....	65	Coccyganthe.....	724
Celtis.....	523	Coeloglossum.....	478
Centaurea.....	2128	Colchicum.....	367
Centaurium.....	1535	Colpodium.....	199
Cephalanthera.....	470	Commelina.....	350
Cephalaria.....	1919	Conium.....	1431
Cerastium.....	672	Conringia.....	896
Cerasus.....	1063	Consolida.....	769
Ceratocarpus.....	613	Convallaria.....	439
Ceratocephala.....	793	Convolvulus.....	1563
Ceratoides.....	612	Conyza.....	1970
Ceratophyllum.....	757	Coriandrum.....	1428
Cerinthe.....	1588	Corispermum.....	623
Cervaria.....	1488	Cornus.....	1504
Ceterach.....	31	Coronilla.....	1184
Chaenorhinum.....	1764	Corydalis.....	837
Chaerophyllum.....	1410	Corylus.....	517
Chaiturus.....	1680	Cotinus.....	1312
Chamaecytisus.....	1076	Cotoneaster.....	986
Chamaesciadium.....	1453	Crambe.....	888
Chamaesyce.....	1309	Crataegus.....	998
Chamenerion.....	1393	Crepis.....	2210
Chamomilla.....	2024	Crinitaria.....	1965
Chartolepis.....	2121	Crocus.....	453
Chelidonium.....	823	Crucianella.....	1858
Chenopodium.....	590	Cruciata.....	1885
Chondrilla.....	2208	Crupina.....	2115
Chorispora.....	959	Crypsis.....	115
Chrisaspis.....	1112	Cucubalis.....	729
Chrysopogon.....	78	Cuscuta.....	1568
Chrysosplenium.....	979	Cyclachaena.....	1995
Cicerbita.....	2196	Cynanchum.....	1562
Cichorium.....	2150	Cynodon.....	155
Circaeа.....	1396	Cynoglossum.....	1629
Cirsium.....	2102	Cynosurus.....	183
Cladium.....	299	Cyperus.....	277
Cleistogenes.....	161	Cystopteris.....	14

Cytisus.....	1075	Elytrigia.....	250
D		Ephedra.....	40
Dactylis.....	181	Epilobium.....	1386
Dactylorhiza.....	492	Epipactis.....	473
Danaa.....	1430	Equisetum.....	3
Datura.....	1744	Eragrostis.....	166
Daucus.....	1503	Eremogene.....	695
Delphinium.....	775	Eremopyrum.....	263
Dentaria.....	902	Eremosparton.....	1134
Descurainia.....	870	Eremurus.....	372
Dianthus.....	741	Erianthus.....	75
Dichodon.....	686	Erigeron.....	1968
Dictamnus.....	1275	Eriochloa.....	80
Diedropetala.....	773	Eriosynaphe.....	1476
Digitaria.....	81	Erodium.....	1251
Diphelipaea.....	1824	Erophila.....	921
Diplachne.....	161	Erugastrum.....	882
Diplotaxis.....	885	Eryngium.....	1405
Dipsacus.....	1915	Erysimum.....	945
Dodartia.....	1773	Erythronium.....	388
Dolichorrhiza.....	2070	Euclidium.....	935
Doronicum.....	2055	Euonymus.....	1314
Draba.....	917	Eupatorium.....	1956
Dracocephalum.....	1662	Euphorbia.....	1286
Dryas.....	1031	Euphrasia.....	1810
Dryopteris.....	20	F	
E		Fagopyrum.....	585
Ecballium.....	1936	Fagus.....	526
Echinochloa.....	86	Falcaria.....	1450
Echinocystis.....	1933	Fallopia.....	568
Echinops.....	2071	Ferula.....	1477
Echinopsilon.....	617	Ferulago.....	1479
Echium.....	1589	Festuca.....	212
Elaeagnus.....	1382	Ficaria.....	795
Elaeosticta.....	1452	Filaginella.....	1975
Elatine.....	1351	Filago.....	1972
Eleocharis.....	293	Filipendula.....	1032
Eleutherospermum.....	1432	Fragaria.....	1011
Elisanthe.....	725	Frangula.....	1326
Elymus.....	249	Frankenia.....	1352

Fraxinus.....	1533	Haplophyllum.....	1273
Fritillaria.....	393	Hedera.....	1400
Fumana.....	1362	Hedysarum.....	1186
Fumaria.....	841	Helianthemum.....	1358
G		Helichrysum.....	1978
Gagea.....	374	Helictotrichon.....	152
Galanthus.....	448	Heliotropium.....	1578
Galatella.....	1963	Helleborus.....	763
Galega.....	1132	Helmintia.....	2116
Galeopsis.....	1673	Helminthotheca.....	2164
Galinsoga.....	2004	Heracleum.....	1496
Galium.....	1867	Herminium.....	477
Garhadiolus.....	2165	Herniaria.....	660
Genista.....	1072	Hesperis.....	940
Gentiana.....	1539	Hibiscus.....	1354
Gentianella.....	1547	Hieracium.....	2219
Gentianopsis.....	1546	Hierochloe.....	98
Geranium.....	1235	Hippophaë.....	1381
Geum.....	1028	Hippimarathrum.....	1433
Gladiolus.....	465	Hippuris.....	1399
Glaucium.....	824	Holcus.....	143
Glechoma.....	1661	Holoschoenus.....	282
Gleditsia.....	1067	Holosteum.....	687
Globularia.....	1848	Hordelymus.....	269
Glyceria.....	201	Hordeum.....	270
Glycyrrhiza.....	1180	Humulus.....	536
Gnaphalium.....	1976	Huperzia.....	1
Goldbachia.....	944	Hydrocharis.....	72
Goniolimon.....	1524	Hylotelephium.....	964
Gratiola.....	1774	Hymenolobus.....	861
Grossularia.....	983	Hyoscyamus.....	1736
Gymnadenia.....	479	Hypecoum.....	822
Gymnocarpium.....	16	Hypericum.....	1347
Gypsophila.....	730	Hypochoeris.....	2154
H		Hypopitidis.....	1508
Hablitzia.....	588	Hyssopus.....	1716
Halimione.....	610	I	
Halocnemum.....	631	Iberis.....	855
Halopeplis.....	629	Impatiens.....	1324
Halostachis.....	630	Imperata.....	74

Inula.....	1979	Libanotis.....	1468
Iris.....	455	Ligusticum.....	1472
Isatis.....	853	Ligustrum.....	1534
J		Lilium.....	396
Juglans.....	514	Limodorum.....	476
Juncellus.....	279	Limonium.....	1526
Juncus.....	354	Linaria.....	1756
Juniperus.....	38	Linum.....	1259
Jurinea.....	2085	Listera.....	468
K		Lithospermum.....	1582
Kalidium.....	627	Litwinowia.....	936
Kitaibelia.....	1346	Lolium.....	243
Knautia.....	1912	Lonicera.....	1895
Kochia.....	620	Lotus.....	1128
Koeleria.....	168	Luzula.....	351
Kohlrauschia.....	739	Lycium.....	1733
Krascheninnikovia.....	612	Lycopsis.....	1597
L		Lycopus.....	1725
Lactuca.....	2190	Lysimachia.....	1517
Lagoseris.....	2218	Lythrum.....	1383
Lallemantia.....	1666	M	
Lamium.....	1675	Maclura.....	535
Lamyra.....	2113	Macrosciadium.....	1472
Lappula.....	1618	Macroselinum.....	1468
Lapsana.....	2151	Majanthemum.....	440
Laser.....	1490	Malachium.....	671
Laserpitium.....	1502	Malus.....	991
Lathraea.....	1822	Malva.....	1334
Lathyrus.....	1220	Marrubium.....	1649
Lavatera.....	1338	Matricaria.....	2024
Leersia.....	94	Matteuccia.....	12
Lemna.....	346	Matthiola.....	958
Leontodon.....	2156	Medicago.....	1086
Leonurus.....	1681	Melampyrum.....	1807
Leopoldia.....	407	Melandrium.....	727
Lepidium.....	845	Melica.....	171
Lepidotheca.....	2025	Melilotus.....	1097
Leucanthemum.....	2022	Melissa.....	1708
Leucopoa.....	211	Menioces.....	933
Leymus.....	276	Mentha.....	1727

Mercurialis.....	1285	Oenothera.....	1395
Merendera.....	365	Omalotheca.....	1977
Mespilus.....	997	Omphalodes.....	1627
Microthlaspi.....	857	Onobrychis.....	1191
Milium.....	113	Ononis.....	1080
Minuartia.....	692	Onopordon.....	2114
Moehringia.....	698	Onosma.....	1586
Molinia.....	163	Ophioglossum.....	10
Molucella.....	1683	Ophrys.....	498
Morus.....	533	Orchis.....	484
Muretia.....	1452	Origanum.....	1717
Muscaria.....	409	Ornithogalum.....	398
Myagrum.....	852	Orobanche.....	1831
Mycelis.....	2195	Orobus.....	1231
Myosotis.....	1609	Orthantha.....	1813
Myosoton.....	671	Orthanthella.....	1813
Myosurus.....	792	Orthilia.....	1507
Myricaria.....	1357	Ostrya.....	515
Myriophyllum.....	1397	Otites.....	718
Myrrhis.....	1420	Oxalis.....	1256
Myrrhoides.....	1409	Oxytropis.....	1177
N		P	
Najas.....	64	Pachyphragma.....	859
Nasturtium.....	910	Paeonia.....	759
Negundo.....	1323	Paliurus.....	1325
Neotorularia.....	871	Panicum.....	90
Neottia.....	469	Papaver.....	826
Nepeta.....	1656	Parietaria.....	540
Neslia.....	937	Paris.....	446
Nicandra.....	1732	Parnassia.....	980
Nigella.....	764	Pastinaca.....	1491
Nitraria.....	1272	Pedicularis.....	1819
Noccaea.....	858	Peganum.....	1286
Nonea.....	1603	Pentaphylloides.....	1013
Nuphar.....	756	Periploca.....	1554
Nymphaea.....	755	Persicaria.....	579
O		Petasites.....	2053
Oberna.....	705	Petrocoma.....	728
Odontites.....	1814	Petrosimonia.....	648
Oenanthe.....	1469	Peucedanum.....	1480

Phacelia.....	1576	Prenanthes.....	2188
Phalacroloma.....	1971	Primula.....	1510
Phalaris.....	96	Proboscidea.....	1823
Phalaroides.....	95	Prometeum.....	974
Phelipaea.....	1842	Prunella.....	1667
Phelipanche.....	1825	Prunus.....	1060
Phleum.....	118	Psammophiliella.....	738
Phlomis.....	1670	Psathyrostachys.....	274
Phlomoides.....	1672	Psephellus.....	2122
Pholiurus.....	248	Pseudomuscari.....	408
Phragmites.....	160	Pseudosophora.....	1070
Phyllitis.....	32	Psylliostachys.....	1532
Physalis.....	1737	Psyllium.....	1857
Physocaulis.....	1409	Pteridium.....	33
Physochlaina.....	1735	Pteroterca.....	2218
Physospermum.....	1430	Ptilostemon.....	2113
Phytolacca.....	658	Puccinellia.....	206
Picris.....	2161	Pulicaria.....	1991
Pimpinella.....	1454	Pulmonaria.....	1608
Piptatherum.....	111	Pulsatilla.....	786
Pisum.....	1234	Pusckinia.....	405
Plantago.....	1849	Pycreus.....	280
Platanthera.....	480	Pyrethrum.....	2028
Pleconax.....	723	Pyrola.....	1506
Poa.....	185	Pyrus.....	990
Podospermum.....	2166	Q	
Polycnemum.....	586	Quercus.....	523
Polygala.....	1277	Queria.....	691
Polygonatum.....	441	R	
Polygonum.....	570	Ranunculus.....	800
Polypodium.....	35	Raphanus.....	887
Polypogon.....	129	Rapistrum.....	895
Polystichum.....	24	Reichardia.....	2187
Populus.....	509	Reseda.....	961
Porcellites.....	2154	Rhamnus.....	1327
Portulaca.....	659	Rhinanthus.....	1815
Potamogeton.....	51	Rhizomatopteris.....	15
Potentilla.....	1014	Rhododendron.....	1509
Poterium.....	1043	Rhus.....	1313
Prangos.....	1434	Rhynchosciurus.....	1818

Ribes.....	981	Securigera.....	1185
Rindera.....	1626	Sedum.....	965
Robinia.....	1069	Selaginella.....	2
Rochelia.....	1625	Sempervivum.....	962
Roemeria.....	825	Senecio.....	2058
Rorippa.....	911	Serratula.....	2116
Rosa.....	1044	Seseli.....	1463
Rosularia.....	974	Sesleria.....	157
Rubia.....	1889	Setaria.....	91
Rubus.....	1004	Sideritis.....	1654
Rumex.....	546	Sigesbeckia.....	2001
Ruppia.....	59	Silaum.....	1471
S		Silene.....	709
Sagittaria.....	70	Sinapis.....	883
Salicornia.....	632	Sisymbrium.....	863
Salix.....	499	Sium.....	1460
Salsola.....	638	Smyrnium.....	1429
Salvia.....	1695	Solanum.....	1738
Salvinia.....	36	Solenanthus.....	1628
Sambucus.....	1891	Solidago.....	1960
Samolus.....	1523	Sonchus.....	2183
Sanguisorba.....	1042	Sorbus.....	992
Sanicula.....	1401	Sorghum.....	77
Saponaria.....	754	Sparganium.....	47
Satureja.....	1709	Spergula.....	699
Saussurea.....	2083	Spergularia.....	700
Saxifraga.....	975	Spiraea.....	984
Scabiosa.....	1926	Stachys.....	1685
Scandix.....	1418	Stellaria.....	667
Scariola.....	2194	Stenactis.....	1971
Schoenoplectus.....	284	Steris.....	704
Scilla.....	397	Sternbergia.....	451
Scirpoides.....	282	Stipa.....	99
Scirpus.....	283	Strigosella.....	939
Scleranthus.....	664	Suaeda.....	633
Sclerochloa.....	184	Succisa.....	1925
Scorzonera.....	2168	Swida.....	1505
Scrophularia.....	1765	Symphyandra.....	1957
Scutellaria.....	1644	Sympytum.....	1592
Secale.....	265	Syrenia.....	956

T			
Tamarix.....	1354	Tussilago.....	2052
Tamus.....	452	Typha.....	42
Tanacetum.....	2031	U	
Taraxacum.....	2199	Ulmus.....	527
Taxus.....	37	Urtica.....	538
Telekia.....	1994	Utricularia.....	1847
Telmatophace.....	349	V	
Tephroseris.....	2069	Vaccaria.....	740
Tetradiclis.....	1269	Valeriana.....	1898
Teucrium.....	1639	Valerianella.....	1903
Thalictrum.....	814	Vallisneria.....	73
Thelycrania.....	1505	Ventenata.....	148
Thelypteris.....	27	Verathrum.....	364
Thesium.....	542	Verbascum.....	1745
Thlaspi.....	856	Verbena.....	1631
Thymelaea.....	1380	Veronica.....	1775
Thymus.....	1718	Viburnum.....	1893
Tilia.....	1331	Vicia.....	1201
Tordylium.....	1501	Vinca.....	1551
Torilis.....	1421	Vincetoxicum.....	1555
Torularia.....	871	Viola.....	1363
Trachomitum.....	1552	Viscum.....	541
Tragopogon.....	2174	Visnaga.....	1449
Tragus.....	79	Vitis.....	1330
Traunsteinera.....	482	Vulpia.....	224
Tribulus.....	1271	W	
Trifolium.....	1115	Woodsia.....	17
Triglochin.....	66	X	
Trigonella.....	1082	Xanthium.....	1998
Trinia.....	1444	Xanthobrychis.....	1189
Tripleurospermum.....	2026	Xanthoselinum.....	1487
Tripolium.....	1967	Xanthoxalis.....	1257
Trisetaria.....	147	Xeranthemum.....	2076
Trisetum.....	144	Z	
Trollius.....	762	Zannichellia.....	61
Trommsdorffia.....	2155	Zingeria.....	130
Tulipa.....	389	Ziziphora.....	1707
Turgenia.....	1427	Zosima.....	1500
Turritis.....	909	Zygophyllum.....	1270

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА.....	3
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	4
КОНСПЕКТ ФЛОРЫ.....	12
ЛИТЕРАТУРА.....	124
ПРИЛОЖЕНИЕ (рисунки эндемичных видов).....	131
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ РОДОВ.....	154
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РОДОВ.....	164

Иванов Александр Львович



**КОНСПЕКТ
ФЛОРЫ
СТАВРОПОЛЬЯ**

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Редактор Р.Н. Скворкина

Художественное оформление обложки А.А. Павлищев

Рисунки А.Л.Иванова

Изд. лиц. № 020061 от 9.10.96

Формат 60x84 1/16

Бумага офсетная

Усл.печ.л. 11,63

Тираж 300 экз.

Подписано вк печать 27.06.2001

Уч.-изд. л. 7,58

Отпечатано в Издательско-полиграфическом комплексе
Ставропольского государственного университета
355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1