


A.L. Ivanov
CONSPECTUS FLORÆ
CAUCASI ROSSICÆ
(plantae vasculares)




А.Л. Иванов
КОНСПЕКТ ФЛОРЫ
РОССИЙСКОГО КАВКАЗА
(сосудистые растения)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

A.L. Ivanov
CONSPECTUS FLORAE
CAUCASI ROSSICAE
(*plantae vasculares*)

А.Л. Иванов
КОНСПЕКТ ФЛОРЫ
РОССИЙСКОГО КАВКАЗА
(сосудистые растения)



Ставрополь 2019

УДК 582
ББК 28.0
И 21

Рецензенты:

доктор биологических наук, профессор Шхагапсоев С.Х.
доктор биологических наук, профессор Галкин М.А.

Иванов А.Л.

И 21 *Conspectus florum Caucasii Rossici (plantae vasculares)* / Конспект флоры Российского Кавказа (сосудистые растения). - Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2019. - 341 с: 1 ил.

ISBN 978-5-9296-1008-0

«Конспект флоры Российского Кавказа» содержит сведения о 4579 видах сосудистых растений, относящихся к 1075 родам, 184 семействам, 106 порядкам, 11 классам и 6 отделам царства Plantae (Растения).

Информация о каждом виде представлена условными сокращениями и включает: научное латинское и традиционное русское названия; распространение вида на территории Российского Кавказа согласно схеме флористического районирования; геоэлемент; флороценоэлемент; принадлежность к определённой биоморфе; встречаемость; дополнительные сведения.

Для ботаников (флористов, систематиков, геоботаников), а также для бакалавров, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений, выполняющих курсовые и выпускные квалификационные работы по соответствующей тематике.

ISBN 978-5-9296-1008-0

© Иванов А.Л., 2019
© ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», 2019

Предисловие

Изучением флоры Кавказа в целом, а также флоры Российского Кавказа, в частности, занималось не одно поколение ботаников - флористов, систематиков, фитоценологов и представителей других ботанических наук. Не смотря на её достаточно хорошую изученность, количество видов ежегодно пополняется за счёт новых описаний и новых флористических находок.

«Конспект флоры Российского Кавказа» представляет собой аннотированный список таксонов всех рангов: отделов, классов, порядков, семейств, родов и видов. Он составлен на основе данных, приведённых во «Флоре Северного Кавказа» А.И. Галушко (1978-1980), насчитывающей около 3900 видов, с использованием информации предшествующих капитальных сводок - «Флора СССР» (1936-1964) и «Флора Кавказа» (Гроссгейм, 1939-1967). Этот список значительно пополнен за счёт анализа региональных конспектов и флор, таких как: «Флора Керченско-Таманского региона» (Новосад, 1992), «Флора Северо-Западного Кавказа» (Зернов, 2006), «Конспект флоры Карачаево-Черкесии» (Шильников, 2010), «Сосудистые растения Карачаево-Черкесской республики» (Зернов, Онипченко, 2011), «Каталог дикорастущих растений Ставропольского края» (Танфильев, Кононов, 1987), «Конспект флоры Ставрополя» (Иванов, 2001), «Конспект флоры сосудистых растений района Кавказских Минеральных Вод и прилегающих территорий» (Михеев, 2009), «Конспект флоры бассейна реки Черек Безенгийский» (Портениер, 2012), «Конспект флоры Республики Ингушетии» (Дакиева, 2003), «Конспект флоры Чеченской республики» (Умаров, Тайсумов, 2011), «Конспект флоры Дагестана» (Муртазалиев, 2009). Для части территории Ростовской области и Республики Калмыкии, заходящей на Северный Кавказ, использованы данные, приведённые во «Флоре Нижнего Дона» (1984-1985) и в «Конспекте флоры Калмыкии» (Бакташева, 1994). Существенные дополнения внесены в список видов после выхода в свет «Конспекта флоры Кавказа» (2003-2012), разработанного коллективом авторов Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. Использована также информация о новых флористических находках и описаниях новых видов, приводимая в периодической печати, в материалах научных конференций, в текстах диссертаций, защищённых по флоре отдельных регионов, в региональных Красных книгах и других источниках. Часть видов и новых местонахождений включены в конспект на основе собственных наблюдений и сборов на территории Российского Кавказа за период 2003-2018 гг. Материал расположен по системе А. Энглера, используемой в большинстве флористических исследований для данной территории, латинские названия приведены в соответствии со сводкой С.К. Черепанова (1995), за исключением некоторых таксонов, принятых во «Флоре Северного Кавказа» А.И. Галушко (1978-1980). Все таксоны имеют сквозную нумерацию.

Условные обозначения

Распространение видов приводится согласно схеме флористических районов Российского Кавказа (карта-схема). Перечень районов даётся слева направо и сверху вниз в следующей последовательности:



I. Понтическая провинция

1. Западно-Предкавказский округ: ЗП - Западное Предкавказье

- НД - Нижне-Донской район;
- ЗПМ - Западно-Приманьчский район;
- АЕ - Азово-Егорлыкский район;
- АК - Азово-Кубанский район;
- КЕ - Кубано-Егорлыкский район;
- Тем - Темрюкский район;
- Т - Таманский район

2. Центральное-Предкавказский округ: ЦП - Центральное Предкавказье

- МД - Маньчско-Дадьинский район;
- АИ - Арзгирско-Ипатовский район;
- Прик - Прикалаусский район;
- ТБ - Тамузловско-Буйволинский район;
- НК - Нижне-Кумский район;
- М - Моздокский район

II. Туранская провинция

3. Восточно-Предкавказский округ: **ВП** - Восточное Предкавказье

КН - Кара-Ногайский район;

Кизл - Кизлярский район

III. Кавказская провинция

4. Кубанский округ: **КУБ** - Западный Кавказ

МА - Майкопско-Абинский район;

ЛН - Лабинско-Невинномысский район;

КР - Крымский район;

Х - Ходыженский район;

ВЛ - Верхне-Лабинский район;

ЧК - Чалмыкско-Кубанский район;

ТЗ - Тебердино-Зеленчукский район

Варианты объединения районов:

Куб - Кубанский левобережный - МА,ЛН;

ЗК - Западно-Кавказский - КР,Х,ВЛ,ЧК,ТЗ

5. Ставропольский округ: **Ст** - Ставропольские высоты

Ст - Ставропольский район

6. Эльбрусский округ: **Э** - Центральный Кавказ

ЦЭ - Центрально-Эльбрусский район;

Кисл - Кисловодский район;

П - Пятигорский район

Варианты объединения районов:

ЦК - Центральный Кавказ - ЦЭ,Кисл;

Э - ЦЭ,Кисл,П

7. Терский округ: **ТЕР** - Восточный Кавказ

СК - Средне-Кумский район;

Каб - Кабардинский район;

ТС - Терско-Сунженский район;

ЧО - Чечено-Осетинский район;

Л - Лескенский район;

УН - Унальский район;

Ч - Чеченский район;

Б - Балкарский район;

ОС - Осетинский район;

ВС - Верхне-Сунженский район

Варианты объединения районов:

СКТ - Средне-Кумско-Терский - СК,Каб,ТС,ЧО;

Тер - Каб,ТС,ЧО

ВК - Восточно-Кавказский - Л,УН,Ч,Б,ОС,ВС

IV. Эвксинская провинция

8. Новороссийский округ: **Н** - Анапа - Туапсе

Н - Новороссийский район;

9. Абхазский округ: **АБХ** - Туапсе - Адлер

ТА - Туапсинско-Адлеровский район

Варианты объединения районов:

СЗЗ - Северо-Западное Закавказье - Н,ГА

V. Дагестанская провинция

10. Дагестанский округ: **ДАГ** - Дагестан

БН - Брагуно-Новолакский район;

Касп - Каспийский район;

ЦД - Центральное-Дагестанский район

АС - Андийско-Самурский район;

Варианты объединения районов:

Даг - Дагестан - БН,Касп,ЦД,АС

Геоэлемент (по Н.Н. Портениеру, 2000, 2012):

Плюрирег.	- Плюрирегиональный
Голаркт.	- Голарктический
Палеаркт.	- Палеарктический
Панбор.	- Панбореальный
Евро-Сиб.	- Евро-Сибирский
Евро-Кавк.	- Евро-Кавказский
Кавк.	- Кавказский
<i>Общекавк.</i>	- <i>Общекавказский</i>
<i>Эукавк.</i>	- <i>Эукавказский</i>
<i>Предкавк.</i>	- <i>Предкавказский</i>
Эвксин.	- Эвксинский
Понт.-Южносиб.	- Понтичеко-Южносибирский
Понтич.	- Понтический
Общедр.средиз.	- Общедревнесредиземноморский
Зап.др.средиз.	- Западнодревнесредиземноморский
Средиземн.	- Средиземноморский
Кр.-Новоросс.	- Крымско-Новороссийский
Вост.средиз.	- Восточносредиземноморский
Ирано-Туран.	- Ирано-Туранский
Армено-Иран.	- Армено-Иранский
Туранск.	- Туранский
Субсредиз*.	- Субсредиземноморский
Субкавк*.	- Субкавказский
Субпонт*.	- Субпонтический
Субтуран*.	- Субтуранский
Адвент.	- Адвентивный

* связующие геоэлементы

1. Плюрирегиональный - виды, ареалы которых выходят за пределы Голарктического царства;

2. Голарктический - виды встречаются во всех (или почти во всех) областях Голарктического царства.

3. Палеарктический - виды, ареалы которых охватывают умеренные и субтропические области Голарктического царства Старого Света без определённой приуроченности к одному из подцарств.

4. Панбореальный - виды, распространённые во всех или почти во всех областях Бореального подцарства, включая Западное полушарие.

5. Евро-Сибирский - виды, распространённые в евразийской части Циркумбореальной области (Тахтаджян, 1978);

6. Евро-Кавказский - виды распространены в Кавказской, Эвксинской и европейских провинциях Евро-Сибирской области, т.е. тяготеют к Европейской широколиственной области Е.М.Лавренко (1950) или Среднеевропейской области А.И.Толмачёва (1974).

7. Европейский - объединяемые в этот элемент виды распространены в основном в умеренных частях европейских провинций А.Л.Тахтаджяна (1978) - Атлантическо-Европейской, Северо-Европейской, Центрально-Европейской и Восточно-Европейской, проникая в Кавказскую провинцию.

8. Кавказский - виды, распространённые в Кавказской провинции. Подразделяется на Общекавказский элемент, ареалы видов которого охватывает территорию всего Кавказа; Эукавказский - ареалы ограничены территорией Большого Кавказа; Предкавказский - основные ареалы видов находятся в Предкавказье;

9. Эвксинский - объединяет виды, основной ареал которых ограничен Эвксинской провинцией Циркумбореальной области (Тахтаджян, 1978).

10. Понтико-Южносибирский - включает виды, распространённые в Понтической провинции А.Л.Тахтаджяна (1970) или южных частях Восточно-Европейской и Западно-Сибирской провинциях А.Л. Тахтаджяна (1978) или Евразийской степной области Е.М.Лавренко (1950, 1970).

11. Понтический - объединяет виды, приуроченные к степным и лесостепным районам Восточноевропейской провинции, их восточные границы ареалов ограничены Поволжьем, реже доходят до Урала. Небольшая часть видов ограничена в своём распространении Крымом и Предкавказьем;

12. Общедревнесредиземноморский - виды, широко распространённые в Средиземноморской и Ирано-Туранской областях Древнесредиземно-морского подцарства (Тахтаджян, 1978);

13. Западнодревнесредиземноморский - виды, ареалы которых охватывают всю Средиземноморскую область или её большую часть, заходящие на востоке в западную часть Ирано-Туранской области;

14. Средиземноморский - виды, ареалы которых охватывают две и более провинций Средиземноморской области;

15. Крымско-Новороссийский - виды, распространённые в Крымско-Новороссийской провинции, иррадиирующие на территорию Предкавказья;

16. Восточнодревнесредиземноморский - виды, распространённые в Переднеазиатской и Центральноазиатской подобластях Ирано-Туранской области и широко иррадиирующие;

17. Ирано-Туранский - виды, характерные для Переднеазиатской подобласти Ирано-Туранской области;

18. Армено-Иранский - ареалы видов этого элемента приурочены к Армено-Иранской провинции Переднеазиатской подобласти Ирано-Туранской области;

19. Туранский - виды, распространённые в Туранской провинции;

20. Субсредиземноморский* - связующие виды более или менее равномерно распространены в северных и северо-восточных районах Средиземноморской области и в юго-западных районах Евро-Сибирской области;

21. Субкавказский* - связующие виды, основная часть ареалов которых охватывает Кавказскую провинцию, а также часто Эвксинскую провинцию Евро-Сибирской области и Армено-Иранскую провинцию Ирано-Туранской области;

22. Субпонтический* - связующие виды, основная часть ареалов которых находится в степных и лесостепных районах Восточно-Европейской и преимущественно западных районах Эвксинской провинции Евро-Сибирской области и в восточных районах Иллирийской, в Центрально-Анатолийской и Восточно-Средиземноморской провинциях Средиземноморской области;

23. Субтуранский* - связующие виды, ареалы которых охватывают лесостепную и степную часть Восточно-Европейской и Западно-Сибирской провинций Евро-Сибирской области и Туранскую провинцию Ирано-Туранской области (преимущественно северную часть);

24. Адвентивный - объединяет заносные виды.

Флороценоэлемент:

S (Silvaticus) - лесной

P (Pratensis) - луговой

Pa - равнинный

Pb - субальпийский

Pc - альпийский

ST (Stepposus) - степной

SD (Semidesertus) - полупустынный

D (Desertus) - пустынный

Da - кальцепетрофильный

Db - псаммофильный

Dc - галофильный

Dd - аргиллофильный

Do - оксифильный

A (Aquaticus) - аквальный

Aa - гигрофильный

Ab - гидрофильный

Ac - гидатофильный

R (Ruderalis) - сорный

Ra - сегетальный

Rb - рудеральный

Биоморфа (по Raunkiaer, 1934):

Ph (Phanerophyton) - фанерофит

Phmg (Megaphanerophyton) - мегафанерофит
Phms (Mesophanerophyton) - мезофанерофит
Phm (Microphanerophyton) - микрофанерофит
Phn (Nanophanerophyton) - нанофанерофит
Ch (Chamaephyton) - хамефит
HK (Hemicryptophyton) - гемикриптофит
K (Cryptophyton) - криптофит
T (Therophyton) - терофит

Дополнительные сведения о жизненных формах:

fl (fruticulus) - кустарничек
sf (suffrutex) - полукустарник
ll (liana lignosa) - одревесневающая лиана
lh (liana herbacea) - травянистая лиана
eph (ephemera) - эфемер
ephd (ephemeroid) - эфемероид
ep (epiphyton) - эпифит
par (parasitus) - паразит
hpar (hemiparasitus) - полупаразит
sap (saprophyton) - сапрофит
sv (sempervirens) - вечнозелёное растение
hv (hieme virens) - зимнезелёное растение
pb (planta biennis) - двулетнее растение
pi (planta insectivora) - насекомоядное растение
ps (planta succulenta) - суккулентное растение
ppul (planta pulvinaris) - растение-подушка

Встречаемость приводится в квадратных скобках:

[Soc.] (Sociales) - доминирует
[Pl.] (Plerumque) - обычно
[Sp.] (Sparse) - рассеянно
[R.] (Raro) - редко
[Rs.] (Rarissimo) - очень редко

Дополнительные сведения о родах:

<GM> (Genus monotipum) - монотипный род
<GMC> (Genus monotipum Caucasicum) - монотипный кавказский род
<GD> (Genus ditipum) - дитипный род
<GT> (Genus tritipum) - тритипный род

Дополнительные сведения о видах:

<Es> (Planta stenoendemica) - стеноэндемик
<Ee> (Planta euriendemica) - эвриэндемик
<Esub> (Planta subendemica) - субэндемик
<Rt> (Relictum tertiarium) - третичный реликт
<Rg> (Relictum glacialum) - гляциальный реликт

<Rx> (Relictum xerothermicum) - ксеротермический реликт

<Pt> (Planta toxica) - ядовитое растение

<Pm> (Planta medicinalis) - лекарственное растение

<Pp> (Planta pabularis) - кормовое растение

<Po> (Planta ornamentalis) - декоративное растение

<Pa> (Planta alimentaria) - пищевое растение

<Pmel> (Planta mellifera) - медоносное растение

* - одичавшее культурное растение

l.c. (locus classicus) - классическое место

★ - виды, занесённые в Красную книгу РСФСР (1988), Красную книгу РФ (2008)

КК - Красная книга

CONSPECTUS FLORAE CAUCASI ROSSICAE

DIVISIO I. LYCOPODIOPHYTA - ПЛАУНООБРАЗНЫЕ

Classis I. Lycopodiopsida - Плауновидные

Ordo 1. Lycopodiales - Плауноподобные

Familia 1. Huperziaceae Rothm. - Баранцовые

Genus 1. Huperzia Bernh. - Баранец

1. *H. selago* (L.) Bernh. ex Schrank et C.Mart. (*H. petrovii* Sipl.) - Б. обыкновенный = III(ЗК,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Плюрирег.); S(Ch:sv); [Sp.] <Pm;Rt>

Familia 2. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirbel - Плауновые

Genus 2. Lycopodium L. - Плаун

2. *L. annotinum* L. - П. годичный = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА): (Голаркт.); S(Ch:sv); [Pl.] <Pm;Rt>

3. *L. clavatum* L. - П. булабовидный = V(ТА): (Голаркт.); S(Ch:sv); [Rs.] <Pm;Rt>

Genus 3. Diphasiastrum Holub - Дифазиаструм

4. *D. alpinum* (L.) Holub (*Diphasium alpinum* (L.) Rothm., *Lycopodium alpinum* L.) - Д. альпийский = III([ВЛ - Б.Тхач, М. Бамбак, Псеашхо: КК Краснодарского края, 2007], [ТЗ - ущелья Голарыкол и Ариучат: Воробьева, Опищенко, 2001], Б, ОС); IV([ТА - хр. Ачишхо: КК Краснодарского края, 2007]): (Голаркт.); S(Ch:sv); [R.] <Rt>

Classis II. Isoëtopsida - Полушниковидные

Ordo 2. Selaginellales - Селагинеллоподобные

Familia 3. Selaginellaceae Willk. - Плаунковые

Genus 4. Selaginella Beauv. - Плаунок

5. *S. selaginoides* (L.) C.Mart. - П. плаунковый = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ, Б, ОС); IV(ТА): (Голаркт.); Pa(Ch:sv); [Sp.] <Rt>

6. *S. helvetica* (L.) Spring - П. швейцарский = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Палеаркт.); S(Ch:sv); [Sp.] <Rt>

DIVISIO II. EUISETOPHYTA - ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ

Classis III. Equisetopsida - Хвощевидные

Ordo 3. Equisetales - Хвощеподобные

Familia 4. Equisetaceae Rich. ex DC. - Хвощёвые

Genus 5. Equisetum L. - Хвощ

7. *E. arvense* L. - Х. полевой = I(Т,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,П,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); Pa, Aa, Ra(K); [Pl.] <Pm>
8. *E. telmateia* Ehrh. - Х. Тельматея = I(Прик,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Тер,ОС); IV(СЗЗ); V(Касп): (Субсредиз*.); S(K); [Pl.]
9. *E. pratense* Ehrh. - Х. луговой = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА): (Голаркт.); S, Aa(K); [R.]
10. *E. palustre* L. - Х. болотный = I(М); III(Х,ЦЭ,Кисл,Каб,ЧО,Л,УН); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Голаркт.); Aa(K); [Sp.]
11. *E. fluviatile* L. (*E. heleocharis* Ehrh.) - Х. топяной = III(ТЗ,Л - Голубые озёра,ЧО - Нижн.Сунжа); V(ЦД): (Голаркт.); Aa(K); [R.]
12. *E. ramosissimum* Desf. - Х. ветвистый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); Pa, Aa(K); [Pl.]
13. *E. hyemale* L. - Х. зимующий = I(Прик - Калаус); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,ЦЭ,ВК); IV(Н): (Палкаркт.); S, Aa(K: hv); [Sp.] <Rt>
14. *E. variegatum* Schleich. - Х. пёстрый = III(ЗК,ЦЭ,ВК); V(ЦД): (Голаркт.); Pa, Aa(K); [Sp.]
15. *E. trachyodon* A.Br. - Х. шершавозубый = III(ВЛ - район Лабы и Белой): (Европ.); S(K); [R.]

DIVISIO III. POLYPODIOPHYTA - ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ

Classis IV. Polypodiopsida - Папоротниковидные

Ordo 4. Osmundales - Осмундоподобные

Familia 5. Osmundaceae R.Br. - Осмундовые

Genus 6. Osmunda L. - Осмунда

16. *O. regalis* L. - О. королевская = IV(ТА): (Общедр.средиз); Aa(Ch); [R.]

Ordo 5. Pteridales - Птерисоподобные

Familia 6. Pteridaceae Reichenb. - Птерисовые

Genus 7. Pteris L. - Птерис

17. *P. cretica* L. - П. критский = IV(ТА): (Средиземн.); S(НК); [R.]

Familia 7. Adiantaceae (C.Presl) Ching - Адриантовые

Genus 8. Adiantum L. - Адриантум

18. *A. capillus-veneris* L. - А. венерин волос = III(ОС - верховья Терека); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Средиземн.); Da(НК); [Sp.]

Familia 8. Hypolepidaceae Pichi Sermolli (*Pteridaceae*) - Гиполеписовые

Genus 9. *Pteridium* Gled. ex Scop. - Орляк

19. *P. aquilinum* (L.) Kuhn - О. обыкновенный = III(ВЛ,П,Кисл - Малка); V(Даг): (Плюрирег.); S(К); [R.]

20. *P. tauricum* V.Krecz. - О. крымский = III(КР,Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,[Кисл - Кума: Кравцун, 1983]); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кр.-Новоросс.); S(К); [R.] <Rg;Rt>

Familia 9. Cryptogrammeae Pichi Sermolli - Криптограммовые

Genus 10. *Cryptogramma* R.Br. - Криптограмма

21. *C. crispa* (L.) R.Br. ex Hook. - К. курчавая = III(ЗК,Б,ВС - Армхи); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); S,Pb,Рс(НК); [Sp.]

Familia 10. Sinopteridaceae Koidz. - Синоптерисовые

Genus 11. *Cheilanthes* Sw. - Краекучник

22. *Ch. acrosticha* (Balb.) Tod. (*Ch. pteridioides* auct.; *Ch. fragrans* auct.) - К. орляковый = V(Касп): (Средиземн.); Da(НК); [R.]

23. *Ch. persica* (Bory) Mett. ex Kuhn - К. персидский = V(Касп): (Общедр.средиз.); Da(НК); [R.]

Genus 12. *Notholaena* R.Br. - Нотолена

24. *N. maranthae* (L.) Desv. - Н. Маранты = III(ВЛ,ЦЭ,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Зап.др.средиз.); Da(НК); [Sp.]

Ordo 6. Polypodiales - Многоножкоподобные

Familia 11. Polypodiaceae Bercht. et J.Presl. - Многоножковые

Genus 13. *Polypodium* L. - Многоножка

25. *P. australe* Fee (*P. serratum* (Willd.) Saut.) - М. южная = IV(ТА): (Средиземн.); S(НК:hv:ep); [Sp.]

26. *P. vulgare* L. - М. обыкновенная = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Плюрирег.); S,Do(НК:hv); [Sp.] <Rt;Pm>

27. *P. interjectum* Shivas - М. промежуточная = (III(П - Бештау,ТЗ - Теберда); IV(ТА - Красная Поляна, Лазаревское)): Литвинская, 2011): (Евро-Кавк.); S(НК); [R.] <Rg>

Ordo 7. Aspleniales - Костенцеподобные

Familia 12. Thelypteridaceae Pichi Sermolli - Телиптерисовые

Genus 14. *Thelypteris* Schmidel - Телиптерис

28. *Th. palustris* Schott (*Dryopteris thelypteris* (L.) A.Gray) - Т. болотный = I(НД - дельта Дона,Т,Тем,НК - Кума); II(ВП); III(Ст,ЦЭ - Бечасын,ЧО - Грозный); IV(Н): (Голаркт.); Ab(К); [R.]

Genus 15. *Oreopteris* Holub - Ореоптерис

29. *O. limbosperma* (All.) Holub. (*Dryopteris limbosperma* (All.) Becherer; *D. oreopteris* (Ehrh.) Maxon) - О. окаймлённый = III(Х,ВЛ); IV(ТА): (Голаркт.); S(НК); [R.]

Genus 16. Phegopteris (C.Presl.) Fee - Фегоптерис

30. *Ph. connectilis* (Michx.) Watt - Ф. связывающий = III(Куб,Э,Тер); IV(ТА); V(Дар): (Голаркт.); S(K); [Sp.]

Familia 13. Aspleniaceae Newm. - Костенцовые

Genus 17. Asplenium L. - Костенец

31. *A. septentrionale* (L.) Hoffm. - К. северный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Голаркт.); S,Da(НК:hv); [Pl.]

32. *A. viride* Huds. - К. зелёный = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Голаркт.); Pb,Do(НК:hv); [Pl.]

33. *A. trichomanes* L. - К. волосовидный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плюрирег.); S,Da(НК:hv); [Pl.] <Pm>

34. *A. ruta-muraria* L. - К. рута постенная = I(НД - Азов: КК Ростовской области, 2014); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Голаркт.); S,Da(НК:hv); [Pl.]

35. ★ *A. daghestanicum* H.Christ. - К. дагестанский = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК:hv); [R.] <Es> l.c. окр. а. Курах.

36. *A. woronowii* H.Christ (*A. pseudolanceolatum* Fomin) - К. Воронова = ([III(ВЛ - гора Житная, Фишт-Оштенский массив, Загедан); IV(ТА - гг. Фишт, Аутль, Ачишхо, Чугуш)]; Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Da(НК:hv); [R.] <Esub>

37. ★ *A. adiantum-nigrum* L. - К. чёрный = III(КР,ВЛ,Кисл - Малка,ВС); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Европ.); Da,Do(НК:hv); [Sp.]

Genus 18. Ceterach Willd. - Скребница

38. *C. officinarum* Willd. - С. аптечная = III(Ст,КР,Х,ВЛ,Э); IV(СЗЗ); V(Дар): (Общедр.средиз.); Da(НК:hv); [R.] <Rt>

Genus 19. Phyllitis Hill - Листовник

39. *Ph. scolopendrium* (L.) Newm. - Л. многоножковый = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); S,Da(НК:hv); [Sp.] <Rt;Pm>

Familia 14. Onocleaceae Pichi Sermolli - Оноклеевые

Genus 20. Matteuccia Tod. - Страусник

40. *M. struthiopteris* (L.) Tod. - С. обыкновенный = III(Ст,ЗК,Кисл,ЦЭ,ВК); V(Дар): (Голаркт.); S(НК); [Sp.]

Familia 15. Athyriaceae Alst. - Кочедыжниковые

Genus 21. Athyrium Roth - Кочедыжник

41. *Athyrium filix-femina* (L.) Roth - Кочедыжник женский = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плюрирег.); S(НК); [Sp.] <Pm>

42. *A. distentifolium* (L.) Roth (*A. alpestre auct.*) - К. расставленнолистный = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Голаркт.); Do(НК); [Sp.]

Genus 22. Cystopteris Bernh. - Пузырник

43. *C. fragilis* (L.) Bernh. (*C. filix-fragilis* (L.) Borb.) - П. ломкий = III(Ст,Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); S(НК); [Pl.]

44. *C. regia* (L.) Desv. - П. королевский = III (ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Европ.); Da(НК); [R.]

Genus 23. Rhizomatopteris A.Khokhr. - Ризоматоптерис

45. *Rh. sudetica* (A.Br. et Milde) A.Khokhr. (*Cystopteris sudetica* A.Br. et Milde) - Р. судетский = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС, ВС): (Европ.); S(К); [R.] <Rg>

46. *Rh. montana* (Lam.) A.Khokhr. (*C. montana* (Lam.) Desv.) - Р. горный = III(Х,ТЗ,Б,ОС): (Европ.); S,Do(К); [R.]

Genus 24. Gymnocarpium Newm. - Гимнокарпиум

47. *G. dryopteris* (L.) Newm. (*Dryopteris pumila* V.Krecz., *D. linneana* C.Chr.) - Г. коচেдыжник = III(Куб,Э,Тер); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); S(НК); [R.]

48. *G. robertianum* (Hoffm.) Newm. - Г. Роберта = III(ЗК,Кисл,ЦЭ,Б, ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД): (Голаркт.); S(НК); [R.]

Familia 16. Dryopteridaceae Ching - Щитовниковые

Genus 25. Polystichum Roth - Многорядник

49. *P. lonchitis* (L.) Roth - М. копьевидный = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД): (Голаркт.); Pb,Do (НК:hv); [R.]

50. *P. aculeatum* (L.) Roth (*P. lobatum* (Huds.) Bast.) - М. мелкошиповатый = III(Ст,Куб,ЗК,П,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субсредиз*.); S(НК:hv); [R.]

51. *P. setiferum* (Forssk.) Moore ex Woynar (*P. angulare* (Kit. ex Willd.) C.Presl.) - М. щетинконосный = III(Ст - ст. Темнолесская); (Субсредиз*.); S(НК:hv); [Rs.] <Rt;Rg>

52. *P. braunii* (Spenn.) Fee - М. Брауна = III(Ст,ЗК,П,Каб,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Панбор.); S(НК:hv); [Pl.] <Rt;Rg>

53. *P. woronowii* Fomin - М. Воронова = IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(НК:hv); [R.]

Genus 26. Dryopteris Adans. - Щитовник

54. *D. liliana* Golits. - Щ. Лилиана = [III(ВЛ - Гузерибль, г. Тыбга, г. Джуга); IV(ТА - оз. Кардывач, г. Ачишхо)]; Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.]

55. *D. assimilis* S.Walker (*D. austriaca* (Jacq.) Woynar; *D. expansa* (C.Presl) Fraser-Jenkins et Jermy) - Щ. схожий = III(ЗК,Э,ВК); IV(ТА); (Европ.); S(НК); [Sp.] <Pm>

56. *D. carthusiana* (Vill.) H.P.Fusch (*D. lanceolatocristata* (Hoffm.) Alst.; *D. spinulosa* (O.F.Muell.) O.Kuntze) - Щ. Каргузиуса = III(ЗК,П,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Голаркт.); S(НК); [Sp.] <Pm>

57. *D. remota* (A.Br. ex Doll) Druce - Щ. расставленный = IV(ТА): (Европ.); S(НК); [R.]

58. *D. filix-mas* (L.) Schott - Щ. мужской = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Голаркт.); S(НК); [Pl.] <Pm;Po>

59. *D. caucasica* (A.Br.) Fraser-Jenkins et Corley - Щ. кавказский = III(Ст, Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Sp.] <Po>

60. *D. oreades* Fomin (*D. abbreviata* (DC.) Newman ex Manton) - Щ. высокогорный = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S,Pa,Do(НК); [Pl.]

61. *D. pseudomas* (Wollaston) Holub et Pouzar (*D. affinis* (Lowe) Fraser-Jenkins, *D. borrieri* (Newman) Oberholzer et Tavel) - Щ. ложномужской = IV(СЗЗ): (Общедр.средиз.); S(НК); [R.]

62. *D. rigida* (Hoffm.) Underwood (*D. submontana* (Fraser-Jenkins et Jermy) Fraser-Jenkins; *D. villari* (Bell.) Woanar ex Schinz. et Thell.) - Щ. холодный = IV(ТА); (Европ.); Pb,Da(НК); [R.]

Familia 17. Woodsiaceae (Diels) Herter - Вудсиевые

Genus 27. Woodsia R.Br. - Вудсия

63. ★ *W. fragilis* (Trev.) Moore (*Hymenocystis fragilis* (Trev.) A. Askerov) - В. ломкая = III(ВЛ,ТЗ,Э,УН,Ч); IV(Н - Туапсинский р-н, ТА); V(Даг): (Кавк.: Эукавк.); S,Da(НК); [Sp.] <Esub>

64. *W. ilvensis* (L.) R.Br. - В. эльбская = III(Кисл): (Голаркт.): Da(НК); [R.]

65. *W. alpina* (Bolton) S.F.Gray - В. альпийская = III(ТЗ,ЦЭ,ВК); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Do(НК); [Sp.]

66. *W. glabella* R.Br. - В. гладковатая = III(Кисл,УН); V(ЦД): (Голаркт.); S,Da(НК); [Sp.]

Ordo 8. Blechnales - Дербянкоподобные

Familia 18. Blechnaceae Copel. - Дербянковые

Genus 28. Blechnum L. - Дербянка

67. *B. spicant* (L.) Roth - Д. колосистая = III(Х,ВЛ); IV(СЗЗ); (Голаркт.); S(НК:hv); [R.]

Classis V. Marsileopsida - Марсилиевидные

Ordo 9. Marsileales - Марсилиеподобные

Familia 19. Marsileaceae Mirb. - Марсилиевые

Genus 29. Marsilea L. - Марсилия

68. *M. quadrifolia* L. - М. четырёхлистная = I(Т - низ. Кубани, М - ст. Наурская); II(Кизл): (Плюрирег.); Ab,Ac(К); [R.] <Po;Rg;Rt>

Classis VI. Salviniopsida - Сальвиниевидные

Ordo 10. Salviniiales - Сальвиниеподобные

Familia 20. Salviniaceae T.Lest. - Сальвиниевые

Genus 30. Salvinia Seguiet - Сальвиния

69. *S. natans* (L.) All. - С. плавающая = I(НД,ЗПМ,Тем,НК,ТБ,М - Терек, ЧО - низ. Сунжи); II(ВП): (Плюрирег.); Ac(Т); [Sp.] <Po>

Classis VII. Ophioglossopsida - Ужовниковидные

Ordo 11. Ophioglossales - Ужовникоподобные

Familia 21. Ophioglossaceae (R.Br.) Agardh. - Ужовниковые

Genus 31. Ophioglossum L. - Ужовник

70. *O. vulgatum* L. - У. обыкновенный = III(Ст,МА,Х,Каб - Чёрная речка,М - леса по Тереку); V(БН,Касп): (Евро-Кавк.); S(K); <Rg;Rt>

Genus 32. Botrychium Sw. - Гроздовник

71. *B. lunaria* (L.) Sw. - Г. полулунный = III(ЗК,Кисл,ЦЭ,ВК); V(Даг): (Плю-рирег.); Pa,Pb(K); [R.] <Rt>

72. *B. multifidum* (S.G. Gmel.) Rupr. - Г. многораздельный = III(ТЗ - Архыз, р.Б.Дукка: Иванов, 2014): (Голаркт); Pb(K); [Rs.] <Rg>

73. *B. matricariifolium* A.Br. ex W.D.J.Koch (*B. ramosum* (Roth)Aschers.) - Г. ромашколистный = IV(ТА): (Европ.); S(K); [Rs.] <Rg>

74. *B. virginianum* (L.) Sw. - Г. виргинский = IV(ТА - г. Аибга): (Голаркт.); S(K); [Rs.] <Rg>

DIVISIO IV. PINOPHYTA - СОСНООБРАЗНЫЕ

Classis VIII. Pinopsida - Сосновидные

Ordo 12. Taxales - Тисоподобные

Familia 22. Taxaceae S.F.Gray - Тисовые

Genus 33. Taxus L. - Тис

75. ★*T. baccata* L. - Т. ягодный = III(ЗК,Э,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); S(Phms:sv); [Rs.] <Rt;Rg;Pt>

Ordo 13. Pinales - Сосноподобные

Familia 23. Pinaceae Lindl. - Сосновые

Genus 34. Abies Hill. - Пихта

76. *A. nordmanniana* (Stev.) Spach - П. Нордманна = III(ЗК,ЦЭ,Б); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(Phmg:sv); [Pl.]

Genus 35. Picea A.Dietr. - Ель

77. *P. orientalis* (L.) Link - Е. восточная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(Phmg:sv); [Pl.]

Genus 36. Pinus L. - Сосна

78. *P. sosnowskyi* Nakai (*P. hamata* (Stev.) Sosn.; *P. kochiana* Klotzsch) - С. Сосновского = III(ЗК,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S(Phmg:sv); [Pl.] <Pm>

79. *P. pallasiana* D.Don - С. Палласа = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(Phmg:sv); [R.]

80. ★*P. pityusa* Stev. - С. пицундская = IV(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phmg:sv); [Sp.] <Esub>

Ordo 14. Cupressales - Кипарисоподобные

Familia 24. Cupressaceae Rich. ex Bartl. - Кипарисовые

Genus 37. Platycladus Spach - Плоскоцветочник

81. **P. orientalis* (L.) Franco - П. восточный = III(П,ТЗ); IV(Н); (Адвент. [Юго-Вост.Азия]); Rb(Phms:sv); [Sp.]

Genus 38. Juniperus L. - Можжевельник

82. *J. oblonga* Bieb. (*J. communis* L.) - М. продолговатый = II([КН,Кизл: Им-ханицкая, 1990]); III(ЗК,Э,ВК); IV(Н); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Da,Db(Phn:sv); [Sp.] <Pa;Pm>

83. *J. hemisphaerica* J. et C.Presl (*J. depressa* Stev.) - М. полушаровидный = III(ЗК,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Зап.др.средиз.); Pb,Do(Phms:sv); [Pl.]

84. *J. rufescens* Link - М. рыжий = III(ОС); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Вост.средиз.); Da(Phms:sv); [R.]

85. ★*J. foetidissima* Willd. - М. вонючий = I(Т); III(КР); IV(Н); V(АС): (Вост.средиз.); Da(Phms:sv); [Pl.]

86. ★*J. excelsa* Bieb. - М. высокий = IV(Н): (Вост.средиз.); Da(Phms); [Pl.]

87. *J. isophyllos* C.Koch - М. равнолистный = V(Даг): (Туранск.); Da(Phms:sv); [Sp.]

88. *J. polycarpus* C.Koch - М. многоплодный = V(Даг): (Туранск.); Da(Phms:sv); [Sp.]

89. *J. sabina* L. - М. казацкий = III(Х,ТЗ,Э,Б,Л,Ч,ВС); IV(ТА); V(ЦД): (Понт.-Южносиб.); Da(Phn:sv); [R.] <Pt;Pm>

DIVISIO V. EPHEDROPHYTA - ЭФЕДРООБРАЗНЫЕ

Classis IX. Ephedropsida - Эфедровидные

Ordo 15. Ephedrales - Эфедроподобные

Familia 25. Ephedraceae Dumort. - Эфедровые

Genus 39. Ephedra L. - Эфедра

90. *E. distachia* L. - Э. двухколосная = I(АИ,Прик,ТБ,НК,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Понт.-Южносиб.); Da,Db(Ch:sv:fl); [Sp.] <Pm>

91. *E. equisetina* Bunge - Э. хвощевидная = V(Касп,ЦД): (Ирано-Туран.); Da(Ch:sv); [R.]

92. *E. procera* Fisch. et C.A.Mey. - Э. рослая = III(ТЗ,Э,ВК); V(Даг): (Ирано-Туран.); Da(Ch:sv); [Sp.] <Pm>

DIVISIO VI. MAGNOLIOPHYTA - МАГНОЛИЕОБРАЗНЫЕ

Classis X. Liliopsida - Лилиевидные (Однодольные)

Ordo 16. Typhales - Рогозоцветные

Familia 26. Typhaceae Juss. - Рогозовые

Genus 40. Typha L. Рогоз

93. *T. latifolia* L. - Р. широколистный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Голаркт.); Ab(K); [Pl.] <Po>
94. *T. shuttleworthii* C.Koch et Sond. - Р. Шуттлеворца = **II(ВП); III([ВЛ - Белая,ТЗ - Уруп); IV(Н): Цвелёв, 2006):** (Европ.); Ab(K); [R.]
95. *T. caspica* Pobed. - Р. каспийский = **IV(Касп - Самур: Муртазалиев, 2009):** (Субкавказ*.); Ab(K); [R.]
96. *T. laxmannii* Lerech. - Р. Лаксмана = **I(НД,ЗПМ,АК,АИ,НК); II(ВП); III(Ст,П); IV(Н); V(Касп):** (Палеаркт.); Ab(K); [Sp.]
97. *T. domingensis* Pers (*T. australis* Schum. et Thorn., *T. angustata* Bory et Chaub) - Р. южный = **II(КН); III(Ст):** (Общедр.средиз.); Ab(K); [R.]
98. *T. angustifolia* L. - Р. узколистный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,Каб,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Плурирег.); Ab(K); [Pl.] <Po>
99. *T. alexeevii* Mavrod. - Р. Алексеева = **II(Кизл - пос. Сулак)** (Кавк.: Общекавк.); Ab(K); [Rs.] <Rg> l.c. пос. Сулак
100. *T. minima* Funck - Р. малый = **I(Тем,КЕ,НК); II(Кизл); III(Куб,П,СК,Каб,ЧО); V(Касп):** (Общедр.средиз.); Ab(K); [R.]

Familia 27. Sparganiaceae Rudolphi - Ежеголовниковые

Genus 41. Sparganium L. - Ежеголовник

101. *S. angustifolium* Michx. (*S. affine* Schinzl.) - Е. узколистный = **I(НД,ЗПМ):** (Голаркт.); Ab(K); [R.]
102. *S. neglectum* Beeby - Е. незамеченный = **I(АЕ,МД,АИ,НК); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Европ.); Ab(K); [Sp.]
103. *S. erectum* L. (*S. polyedrum* (Achers. et Graebn.) Juz.; *S. ramosum* Huds.) - Е. прямой = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,Т,Тем,НК); II(ВП); III(Ст,ЛН,П); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Палеаркт.); Ab(K); [Sp.]
104. *S. microcarpum* (Neum.) Raunk. - Е. мелкоплодный = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК); III(Куб,ВЛ,ТЗ,СК,П):** (Евро-Сиб.); Ab(K); [R.]
105. *S. emersum* Rehm. (*S. simplex* Huds.) - Е. всплывающий = **III(Кисл,Б,Л,УН,ОС,ВС); V(ЦД):** (Палеаркт.); Ab(K); [R.]
106. *S. minimum* Wallr. - Е. малый = **I(НД,ЗПМ):** (Голаркт.); Ab(K); [R.]

Ordo 17. Zosterales - Взморникоцветные

Familia 28. Zosteraceae Dumort. - Взморниковые

Genus 42. Zostera L. - Взморник

107. *Z. noltii* Hornem. (*Z. minor* (Cavol.) Nolte ex Reichenb.) - В. Нольта = **I(АЕ - Таганрогский залив,Т); IV(Н):** (Субсредиз*.); Ac(K); [R.]

108. *Z. marina* L. - В. морской = I(АЕ,АК,Тем,Т); II(Кизл - Кизлярский залив: Муртазалиев, 2009); IV(СЗЗ): (Голаркт.); Ас(К); [Sp.]

Ordo 18. Potamogetonales - Рдестоцветные

Familia 29 Potamogetonaceae Dumort. - Рдестовые

Genus 43. Potamogeton L. - Рдест

109. *P. natans* L. - Р. плавающий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,ВЛ,Л): (Плюрирег.); Ас(К); [Sp.] <Pm>

110. *P. nodosus* Poir. - Р. узловатый = I(НД,ЗПМ,Тем - Краснодар,М); III(МА,ЛН,П), IV(СЗЗ): (Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]

111. *P. gramineus* L. (*P. heterophyllus* Schreb.) - Р. злаковый = I(НД,ЗПМ,Тем): (Голаркт.); Ас(К); [Rs.]

112. *P. lucens* L. - Р. блестящий = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,Тем); III(МА,ЛН,СК); IV(Н): (Голаркт.); Ас(К); [Sp.]

113. *P. alpinus* Balb. - Р. альпийский = III(УН): (Европ.); Ас(К); [R.] <Rg>

114. *P. praelongus* Wulf. - Р. длиннейший = I(Тем,Т); III(МА,Л - Голубые озёра): (Голаркт.); Ас(К); [R.]

115. *P. perfoliatus* L. - Р. стеблеобъемлющий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Каб,ТЗ,ЧК,Кисл,Л); IV(Н): (Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]

116. *P. acutifolius* Link - Р. остролистный = I(НД,ЗПМ,Тем): (Европ.); Ас(К); [R.]

117. *P. berchtoldii* Fieb. - Р. Берхтольда = I(НД,ЗПМ,АЕ,НК,МА); III(Ст,ЛН,П,Кисл,ЧО); IV(Н): (Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]

118. *P. pusillus* L. (*P. ranormitanus* Biv.) - Р. маленький = I(Тем,НК); III(Ст,МА,П,Кисл): (Плюрирег.); Ас(К); [R.]

119. *P. trichoides* Cham. et Schlecht. - Р. волосовидный = III(П,Кисл); IV(ТА); (Европ.); Ас(К); [R.]

120. *P. crispus* L. - Р. курчавый = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Тем,Т,НК); II(КН,Кизл); III(Ст); IV(СЗЗ): (Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]

121. *P. rectinatus* L. - Р. гребенчатый = I(НД,ЗПМ,АЕ,МД); II(КН,Кизл); III(Ст); IV(Н): (Плюрирег.); Ас(К); [R.]

122. *P. filiformis* Pers. - Р. нитевидный = I(НК,М); II(КН,Кизл): (Плюрирег.); Ас(К); [R.]

123. *P. amblyophyllus* С.А.Меу. - Р. туполистный = III(ОС): (Кавк.: Общекавк.); Ас(К); [R.]

Genus 44. Groenlandia J.Gay - Гренландия

124. *G. densa* (L.) Fourr. (*Potamogeton densus* L.) - Г. густая = I(Тем); III(МА - Майкоп,ЧО): (Субсредиз*.); Ас(К); [R.]

Familia 30. Ruppiaceae Hutch. - Руппиевые

Genus 45. Ruppia L. - Руппия

125. *R. maritima* L. (*R. brachypus* J.Gay.) - Р. приморская = I(ЗПМ,Тем,Т,МД,НК); II(Кизл); III(СК); IV(Н): (Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]

126. *R. drepanensis* Tineo - Р. трапанинская = I(ЗПМ): (Палеаркт.); Ас(К); [R.]

127. *R. spiralis* L.ex Dumort. (*R. cirrhosa* (Petanga) Grande) - Р. спиральная = I(Тем,Т,ТБ,НК); V(Касп): (Плюрирег.); Ас(К); [R.]

Ordo 19. Cymodoceales - Цимодоцветные

Familia 31. Zannichelliaceae Dumort. - Занникелиевые

Genus 46. Zannichellia L. - Занникелия

128. *Z. palustris* L. - З. болотная = I(ЗП,НК,ТБ,М); II(Кизл); III(Ст,СК,Каб,ЧО); V(Касп): (Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]

129. *Z. pedunculata* Reichenb. - З. стебельчатая = I(ЗП,МД,АИ,НК,Прик,ТБ); II(ВП); III(Ст,П): (Палеаркт.); Ас(К); [Sp.]

130. *Z. major* Voenn. - З. большая = I(АЕ,Тем,Т,МД,АИ,НК); II(Кизл - Аграханский залив: Муртазалиев, 2009); III(Ст,П); IV(Н): (Евро-Кавк.); Ас(К); [R.]

Genus 47. Althenia F.Petit - Альтения

131. *A. filiformis* F.Petit (*A. orientalis* (Tzvel.) G. Murillo et Talavera) - А. нителистная = I(ЗПМ - ст.Пролетарская): (Палеаркт.); Ас(К); [Rs.]

Ordo 20. Najadales - Наядоцветные

Familia 32. Najadaceae Juss. - Наядовые

Genus 48. Najas L. - Наяда

132. *N. marina* L. - Н. морская = I(Тем); II(Кизл); IV(Н): (Голаркт.); Ас(Т); [Sp]

133. *N. major* All. - Н. большая = I(НД,ЗПМ,КЕ - Новотроицкое вдхр.): (Плюрирег.); Ас(К); [R.] <В Ст - Rg>

Genus 49. Caulinia Willd. - Каулиния

134. *C. minor* (All.) Coss. et Germ. (*Najas minor* All.) - К. малая = I(НД,ЗПМ,Тем, КЕ - Новотроицкое вдхр.); II(Кизл): (Плюрирег.); Ас(К); [R.] <В Ст - Rg>

135. *C. orientalis* (Triest et Uolita) Tzvel. - К. восточная = I(Тем): (Адвент. [Вост.Азия]); Ас(К); [R.]

Ordo 21. Juncaginales - Ситничкоцветные

Familia 33. Juncaginaceae Rich. - Ситничковые

Genus 50. Triglochin L. - Триостенник

136. *T. maritimum* L. - Т. морской = I(НД,ЗПМ,Тем,Т); II(Кизл: Муртазалиев, 2009); III(ОС): (Голаркт.); Аа(НК); [R.]

137. *T. palustre* L. - Т. болотный = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Кисл,ЦЭ,Каб,Л,УН,Б,ОС); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]

Ordo 22. Alismatales - Частухоцветные

Familia 34. Alismataceae Vent. - Частуховые

Genus 51. Alisma L. - Частуха

138. *A. plantago-aquatica* L. - Ч. подорожниковая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Аа(К); [Pl.] <Pm>

139. *A. lanceolatum* With. - Ч. ланцетная = I(ЗП,НК,ТБ); II(Кизл); III(МА,ЛН,Ст,П); IV(Н): (Палеаркт.); Аа(К); [Pl.]

140. *A. gramineum* Lej. (*A. loeselii* Gorsky; *A. arcuatum* Michal.) - Ч. злаковая = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,М - Терек); II(Кизл); III(Ст,МА,ЛН,П,СК): (Палеаркт.); Аа(К); [R.]

Genus 52. Sagittaria L. - Стрелолист

141. *S. sagittifolia* L. - С. стрелолистный = I(НД,ЗПМ,Тем,НК); II(Кизл); III(Х,МА): (Палеаркт.); Аа,Аб,Ас(К); [R.]

142. *S. trifolia* L. - С. трёхлистный = III([КР,Х]: Зернов, 2006); IV(ТА: Портениер, Солодько, 2002): (Палеаркт.); Аб,Ас(К); [R.]

Ordo 23. Butomales - Сусакоцветные

Familia 35. Butomaceae Rich. - Сусаковые

Genus 53. Butomus L. - Сусак

143. *B. umbellatus* L. - С. зонтичный = I(ЗП,ЦП) II(ВП); III(Ст,Куб,П,СК,Ч); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Аб(К); [R.] <Pm>

Ordo 24. Hydrocharitales - Водокрасоцветные

Familia 36. Hydrocharitaceae Juss. - Водокрасовые

Genus 54. Hydrocharis L. Водокрас

144. *H. morsus-ranae* L. - В. лягушечий = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,НК); II(ВП); III(МА): (Палеаркт.); Ас(Т); [Sp.] <Pm>

Genus 55. Stratiotes L. - Телорез

145. *S. aloides* L. - Т. обыкновенный = I(НД,Тем): (Европ.); Ас(НК); [Sp.]

Genus 56. Elodea Michx. - Элодея

146. **E. canadensis* Michaux - Э. канадская = II(Кизл: Муртазалиев, 2009); III(МА: Зернов, 2006): (Адвент. [Сев.Америка]); Ас(К); [R.]

147. **E. densa* (Planch.) Caspari (*Eregia densa* Planch.) - Э. густая = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(МА); IV(Н): (Адвент. [Южн.Америка]); Ас(К); [Sp.]

Genus 57. Vallisneria L. - Валлиснерия

148. **V. spiralis* L. - В. спиральная = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,КЕ - Новотроицкое вдхр.); II(Кизл - Аграханский залив: Муртазалиев, 2009); III(КР,Х); IV(Н): (Адвент. [Средиземноморье]); Ас(К); [Sp.]

Ordo 25. Poales - Мятликоцветные

Familia 37. Poaceae Barnhart - Мятликовые (Graminea - Злаковые)

Genus 58. Pseudosasa Makino ex Nakai - Псевдосаза

149. **P. japonica* (Sieb. et Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai (*Arundinaria japonica* Sieb. et Zucc. ex Steud.) - П. японская = IV(ТА): (Адвент. [Япония]); Rb(НК); [Sp.]

Genus 59. Pleioblastus Nakai - Плейобластус

150. **P. distichus* (Mitf.) Nakai (*Bambusa disticha* Mitf.) - П. двурядный = IV(ТА): (Адвент. [Япония]); Rb(К); [Sp.]

Genus 60. Phyllostachys Siebold et Zucc. - Листоколосник

151. *Ph. bambusoides Siebold et Zucc. - Л. бамбуковидный = **IV(ТА)**: (Адвент. [Юго-Вост. Азия]); Rb(К); [Sp.]

152. *Ph. aurea A. et C. Riviere - Л. золотистый = **IV(ТА)**: (Адвент. [Китай]); Rb(К); [Sp.]

Genus 61. Brachypodium Beauv. - Коротконожка

153. B. pinnatum (L.) Beauv. - К. перистая = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,СКТ); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]

154. B. rupestre (Host.) Roem. et Schult - К. скальная = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,СКТ); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Евро-Кавк.); S(НК); [R.]

155. B. caespitosum (Host) Roem. et Schult. - К. дернистая = **III(ТЗ,ЦЭ); IV(СЗЗ)**: (Евро-Кавк.); Do(НК); [R.]

156. B. sylvaticum (Huds.) Beauv. - К. лесная = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,СКТ); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Палеаркт.); S(НК); [Pl.]

157. B. pubescens (Peterm.) S.G.Mussajev - К. пушистая = **II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]

Genus 62. Trachynia Link - Трахиния

158. T. distachya (L.) Link (*Brachypodium distachion (L.) Beauv.*) - Т. двухколосковая = **V(Касп)**: (Ирано-Туран.); Dd(Т); [R.]

Genus 63. Elymus L. - Пырейник

159. E. prokudinii (Seredin) Tzvel. (*Roegneria prokudinii Seredin*) - П. Прокудина = **III(ЦЭ,ВС,Ч); V(Даг)**: (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [R.] <Ee> l.c. с. Коказ

160. E. buschianus (Roshev.) Tzvel. (*R. buschiana (Roshev.) Nevski; Agropyron buschianum Roshev.*) - П. Буша = **III(Кисл,ЦЭ,Б,ОС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. ущелье р. Ирик

161. E. troctolepis (Nevski) Tzvel. (*R. troctolepis Nevski*) - П. выгрызенночешуйчатый = **III(ВЛ)**: (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>

162. E. caninus (L.) L. (*R. canina (L.) Nevski; Elytrigia canina (L.) Drob.; Agropyron caninum (L.) Beauv.*) - П. собачий = **I(Тем); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Палеаркт.); S(НК); [R.]

163. E. caucasicus (C.Koch) Tzvel. (*R. caucasica C.Koch, A. causicum (C.Koch) Grossh.*) - П. кавказский = **V(Касп,ЦД)**: (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.]

Genus 64. Elytrigia Desv. - Пырей

164. E. dshinalica Sablina - П. джинальский = **III(Кисл)**: (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Кисловодск, г. Джинал.

165. ★E. stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski (*Agropyron stipifolium Czern. ex Nevski*) - П. ковылелистный = **I(АК,КЕ,АИ,НК,Прик,ТБ); III(Ст,Каб,ТС)**: (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.]

166. E. gracillima (Nevski) Nevski (*A. gracillimum Nevski*) - П. стройный = **III(Куб,СК,П,ЧО,ОС); V(Даг)**: (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub> l.c. с. Микрах

167. E. elongata (Host) Nevski (*E. obtusiflora (DC.) Tzvel.; A. elongatum (Host) Beauv.*) - П. удлиненный = **I(Тем,Т,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЧО); IV(Н); V(Даг)**: (Средиземн.); Dс(НК); [Sp.] <Pp>

168. *E. bessarabica* (Savul. et Rayss) Prokud. (*E. juncea* (L.) Nevsky) - П. бессарабский = I(Т): (Понтич.); Db(НК); [R.]

169. *E. intermedia* (Host) Nevski (*A. intermedium* (Host) Beauv.) - П. средний = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЦЭ,СКТ); IV(Т); V(Дар): (Общедр.средиз.); ST(НК); [Sp.] <Pp>

170. *E. trichophora* (Link) Nevski (*A. trichophorum* (Link) K.Richt.) - П. волосоносный = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,УН,Ч); IV(Н); V(Дар): (Вост.средиз.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Pp>

171. *E. repens* (L.) Nevski (*A. repens* (L.) Beauv.) - П. ползучий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Дар): (Палеаркт.); Pa,ST,Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pp>

172. *E. pseudocesias* (Pacz.) Prokud. (*A. pseudocesium* (Pacz.) Zoz) - П. ложносивоватый = I(АК,КЕ,ЦП); III(Ст,СК): (Понт.-Южносиб.); Pa,Dc(НК); [Sp.] <Pp>

173. *E. elongatiformis* (Drob.) Nevski (*E. maeotica* (Prokud.) Prokud.; *A. maeoticum* Prokud.) - П. удлинённовидный = I(АК,КЕ,МД,НК,Прик,ТБ); II(КН); III(Ст): (Туранск.); Rb(НК); [Sp.] <Pp>

174. *E. pulcherrima* (Grossh.) Nevski (*A. pulcherrimum* Grossh.) - П. красивейший = III(П - г.Лысая: Танфильев, Кононов, 1987): (Армено-Иран.); ST(НК); [R.] <Rx>

Genus 65. Agropyron Gaertn. - Житняк

175. *A. sibiricum* (Willd.) Beauv. (*A. fragile* (Roth) P.Gandardy) - Ж. сибирский = I(КЕ,Прик,ТБ,НК,М); II(ВП); III(Ст,СК,ТС); V(Касп): (Понтич.); Db,Dd(НК); [Pl.] <Pp>

176. *A. tanaiticum* Nevski - Ж. донской = II(ВП); V(Касп): (Понтич.); Db(НК); [R.]

177. *A. desertorum* (Fisch. ex Link) Schult. - Ж. пустынный = I(ЗПМ,НК,Прик,ТБ); II(Кизл); III(Ст,СК,ТС); V(Касп): (Понтич.); Da,Dd(НК); [Sp.] <Pp>

178. *A. pectinatum* (Bieb.) Beauv. (*A. imbricatum* Roem. et Schult.; *A. dagnae* Grossh.) - Ж. гребневидный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Дар): (Палеаркт.); ST(НК) [Pl.] <Pp>

179. *A. pinifolium* Nevski (*A. cristatum* (L.) P.Beauv. subsp. *sclerophyllum* Novopokr.) - Ж. соснолистный = IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Pl.] <Es>

180. *A. lavrenkoanum* Prokud. - Ж. Лавренко = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Понтич.); Db(НК); [R.]

Genus 66. Eremopyrum (Ledeb.) Jaub. et Spach - Мортук

181. *E. orientale* (L.) Jaub. et Spach - М. восточный = I(ЗП,ЦП); II(Кизл); III(Ст,СК,ТС); V(Дар): (Общедр.средиз.); Db,Dc(Т); [Sp.]

182. *E. distans* (C.Koch) Nevski - М. расставленный = II(Кизл); V(Касп): (Ирано-Туран); Da(Т); [R.]

183. *E. triticeum* (Gaertn.) Nevski - М. пшеничный = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Т,ЦП); II(Кизл); III(Ст,Куб,СК); V(БН,Касп): (Субтуран*); Dc(Т); [Sp.]

Genus 67. Aegilops L. - Эгилопс

184. *Ae. cylindrica* Host - Э. цилиндрический = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Т); V(Дар): (Субтуран*.); Ra,ST,Rb(Т); [Pl.]**
185. *Ae. tauschii* Coss. (*Ae. squarrosa* L.) - Э. Тауша = **I(АК,КЕ - Армавир,Т,НК,М); II(КН,Кизл); V(Касп): (Ирано-Туран.); ST,Rb(Т); [Sp.]**
186. *Ae. strangulata* (Eig) Tzvel. - Э. перетянутый = **V(Касп - Дербент): (Ирано-Туран.); Ra,Rb(Т); [R.]**
187. *Ae. triuncialis* L. - Э. трёхдюймовый = **I(Т); III(МА - Майкоп,КР); IV(Н); V(Касп): (Вост.средиз.); ST(Т); [R.]**
188. *Ae. biuncialis* Vis. - Э. двухдюймовый = **I(Т); III(КР); IV(Н); V(Касп): (Зап.др.средиз.); ST(Т); [R.]**
189. *Ae. ovata* L. (*Ae. neglecta* Req. ex Bertol.) - Э. яйцевидный = **V(Касп - Дербент); (Вост.средиз.); Db(Т); [R.]**

Genus 68. Triticum L. - Пшеница

190. *T. boeoticum* Boiss. - П. беотийская = **I(Т): (Вост.средиз.); Ra,Rb(Т); [R.]**
191. *T. monosocum* L. - П. однозернянка = **V(Касп): (Зап.др.средиз.); Ra(Т); [R.]**
192. *T. dicoccon* (Schrank) Schreb. (*T. dicoccon* (Schrank) Schreb. subsp. *asiaticum* Vav.) - П. двузернянка азиатская = **V(Касп): (Зап.др.средиз.); Ra(Т); [R.]**
193. *T. turgidum* Desf. - П. тучная = **V(Касп): (Зап.др.средиз.); Ra(Т); [R.]**
194. **T. durum* Desf. - П. твёрдая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,Э,Тер); V(Дар): (Зап.др.средиз.); Ra,Rb(Т); [Sp.]**
195. *T. turanicum* Jakubz. - П. туранская = **V(Касп): (Туранск.); Ra(Т); [R.]**
196. *T. cartlicum* Nevski (*T. persicum* (Perciv.) Vav. ex Zhuk.) - П. карталинская = **III(ОС): (Субкавказ*.); Ra(Т); [R.]**
197. **T. aestivum* L. - П. безостая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Зап.др.средиз.); Rb(Т); [Sp.]**

Genus 69. Dasyphyrum (Coss. et Durieu) Durand - Дазипирум

198. *D. villosum* (L.) P.Candargy (*Haylandia villosa* (L.) Schur) - Д. мохнатый = **III(КР); IV(Н): (Средиземн.); Db(Т); [R.]**

Genus 70. Secale L. - Рожь

199. ★ *S. kuprijanovii* Grossh. (*S. montanum* Guss.) - Р. Куприянова = **III(Х,ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Вост.средиз.); S,Pb(НК); [R.]**
200. *S. segetale* (Zhuk.) Roshev (*S. dighoricum* (Vav.) Roshev.) - Р. сорнополевая = **I(КН); III(ОС,ВС); V(Дар): (Вост.средиз.); Rb(Т); [R.]**
201. *S. cereale* L. - Р. посевная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ); IV(ТА); V(Дар): (Туранск.); Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pp>**
202. *S. sylvestre* Host - Р. лесная = **I(КЕ,Т); II(ВП); IV(Н); V(Касп): (Субтуран*.); Db(Т); [Sp.] <Pp>**

Genus 71. Leymus Hochst. - Колосняк

203. *L. sabulosus* (Bieb.) Tzvel. (*Elymus sabulosus* Bieb.) - К. шиловидный = **I(НД,ЗПМ,АЕ,Т,МД); II(КН); V(Касп): (Субтуран*.); Db(НК); [Pl.]**

204. *L. racemosus* (Lam.) Tzvel. (*E. racemosus* Lam.) - К. кистистый = I(ЗПМ,НК); II(КН); V(Касп): (Субтуран*.); Db(НК); [Pl.]

Genus 72. Aneurolepidium Nevsky - Вострец

205. *A. ramosum* (Trin.) Nevski (*Leymus ramosus* (Trin.) Tzvel.; *Elymus giganteus* Vahl.) - В. ветвистый = I(АК,КЕ,Т); II(ВП); V(Касп): (Понтич.); Db(НК); [R.]

Genus 73. Psathyrostachys Nevsky - Ломкоколосник

206. ★*P. rupestris* (Alexeenko) Nevski (*Hordeum rupestris* Alexeenko) - Л. скальный = V(Касп,ЦД); (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Ее> l.c. окр. с. Акуша

207. ★*P. daghestanica* (Alexeenko) Nevski (*H. daghestanicum* Alexeenko; *Elymus daghestanicus* Alexeenko) - Л. дагестанский = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Ее> l.c. окр. с. Гимри

208. *P. juncea* (Fisch.) Nevski (*H. junceum* Fisch.) - Ломкоколосник ситниковый = II(КН - северная часть: Галушко, 1978): (Вост.средиз.); Dc(НК); [R.]

Genus 74. Hordeum L. - Ячмень

209. *H. violaceum* Boiss. et Huet - Я. фиолетовый = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ, ВК); V(Дар): (Армено-Иран.); Pb(НК); [Pl.]

210. **H. jubatum* L. - Я. гривастый = IV(Н): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(Т); [R.]

211. *H. glaucum* Steud. - Я. сизый = I(АК,КЕ,МД,АИ,НК); II(ВП): (Вост.средиз.); Dc(Т); [Sp.]

212. *H. murinum* L. - Я. мышинный = I(ЗП): (Зап.др.средиз.); Ra,Rb(Т); [Sp.]

213. *H. leporinum* Link - Я. заячий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Дар): (Вост.средиз.); Rb(Т); [Pl.]

214. *H. marinum* Huds. - Я. приморский = V(Касп): (Палеаркт.); Db,Dc(Т); [Sp.]

215. *H. geniculatum* All. (*H. hystrix* Roth) - Я. коленчатостебельный = I(Тем,Т,КЕ); II(ВП); III(Ст,Куб,П,СК); IV(Н); V(Касп): (Субсредиз*.); Db,Dc,Dd(Т); [Sp.]

216. *H. spontaneum* C.Koch - Я. дикий = V(Касп): (Вост.средиз.); Ra(Т); [R.]

217. *H. bulbosum* L. - Я. луковичный = III(ОС); V(Касп): (Средиземн.); Ra(НК); [Sp.]

218. *H. distichon* L. - Я. двурядный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,Э, Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плюрирег.); Ra(Т); [Sp.]

219. *H. vulgare* L. - Я. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб, Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плюрирег.); Ra(Т); [Pl.]

Genus 75. Hordelymus (Jess.) Harz - Горделимус (Ячменеволоснец)

220. ★*H. europaeus* (L.) Harz - Г. европейский = III(Ст,Куб,П,Кисл,Л,ТС,Ч); IV(ТА); V(Касп): (Европ.); S(НК); [R.]

Genus 76. Taeniatherum Nevsky - Лентоостник

221. *T. asperum* (Simonk.) Nevski (*Hordeum asperum* (Simonk) Degen ex Hayek) - Л. шероховатый = **I(T); III(KP); IV(H); V(Касп):** (Зап.др.средиз.); ST,Rb(T); [R.]

222. *T. crinitum* (Schreb.) Nevski (*H. crinitum* (Schreb.) Desf.) - Л. длинно-волосый = **IV(H):** (Вост.средиз.); ST,Rb(T); [R.]

Genus 77. Ceratochloa Beauv. - Роговник

223. *C. carinata* (Hook. et Arn.) Tutin (*Bromus carinatus* Hook. et Arn.) - Р. килеватый = **IV(TA):** (Адвент. [Сев. Америка]); Ra(HK:pb); [R.]

Genus 78. Bromus L. - Костёр

224. *B. arvensis* L. - К. полевой = **I(AK,KE,MD,AI,Прик,НК); III(Ст,Куб,П,ТС); IV(C33); V(Дар):** (Европ.); Pa,ST(T); [Sp.]

225. *B. racemosus* L. - К. кистистый = **II(BП); III(MA); V(Касп):** (Европ.); Db,Ra(T); [R.]

226. *B. commutatus* Schrad. - К. переменчивый = **I(ЗП,ЦП); II(BП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C3К); V(Дар):** (Европ.); Pa(T); [Sp.]

227. *B. secalinus* L. - К. ржаной = **III(Ст,Куб,ТЗ,СК):** (Палеаркт.); Ra(T); [R.]

228. *B. mollis* L. - К. мягкий = **I(ЗП,ЦП); II(BП); III(Ст,Куб,СКТ); IV(C3К); V(Дар):** (Голаркт.); Pa,Ra(T); [Sp.]

229. *B. japonicus* Thunb. - К. японский = **I(ЗП,ЦП); II(BП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C3К); V(Дар):** (Палеаркт.); ST,Ra(T); [Sp.]

230. *B. squarrosus* L. - К. растопыренный = **I(ЗП,ЦП); II(BП); III(Ст,Куб,СКТ); IV(C3К); V(Дар):** (Средиземн.); ST,Rb(T); [Sp.]

231. *B. briziformis* Fisch. et C.A.Mey. - К. трясуновидный = **V(Касп):** (Ирано-Туран.); Pa(T); [Sp.]

232. *B. lanceolatus* Roth (*B. macrostachys* Desf.) - К. ланцетный = **V(Касп):** (Средиземн.); Da,Db(T); [Sp.]

233. *B. scorpius* L. - К. метельчатый = **III(Куб,ЧО); V(Касп):** (Вост.средиз.); Aa,Rb(T); [Pl.]

Genus 79. Bromopsis Fourr. - Кострец

234. *B. benekenii* (Lange) Holub (*Zerna benekenii* (Lange) Lindm.) - К. Бенекена = **I(AK); III(Ст,Куб,П,Л,Ч); IV(C33); V(Дар):** (Палеаркт.); S(HK); [Sp.]

235. *B. biebersteinii* (Roem. et Schult) Holub (*Z. biebersteinii* (Roem. et Schult.) Holub) - К. Биберштейна = **III([П - Бештау: Танфильев, Кононов, 1987],Кисл,ЦЭ,Т,ОС,ВС); IV(TA); V(Дар):** (Кавк.: Общекавк.); Da(HK); [Sp]

236. *B. aristata* (C.Koch) Holub - К. остистый = **III(ЦЭ,Б,ОС); V(ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); S(HK); [R.] <Esub>

237. *B. variegata* (Bieb.) Holub (*Z. variegata* (Bieb.) Nevski) - К. пёстрый = **III(ЗК,Э,ВК); IV(TA); V(ЦД,АС):** (Ирано-Туран.); Pb,Pc(HK); [Sp.] <Pr>

238. *B. villosula* (Steud) Holub (*Z. adjarica* (Somm. et Levier) Nevski) - К. волосистый = **III(ЦЭ,Б):** (Армено-Иран.); Pb,Pc(HK); [R.]

239. *B. riparia* (Rehm.) Holub (*Z. riparia* (Rehm.) Nevski) - К. береговой = **I(ЗП,ЦП); II(BП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C3К); V(Дар):** (Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Pl.] <Pr>

240. *V. gordjaginii* (Tzvel.) Galushko - К. Гордягина = **III**(Ст,СК,П, Кисл): (Кавк.: Предкавказ.); Da(НК); [Sp.] <Ее> l.c. ст. Подкумок

241. *V. cappadocica* (Boiss. et Bal.) Holub - К. каппадокийский = **V**(ЦД): (Субкавказ*.); ST(НК); [R.]

242. *V. tomentella* (Boiss.) Holub (*Z. tomentella* (Boiss.) Nevski) - К. войлочный = **III**(ЧК); **V**(Касп - Махачкала): (Ирано-Туран.); Da,Do(НК); [R.]

243. *V. inermis* (Leyss.) Holub (*Z. inermis* (Leyss.) Lindm.) - К. безостый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗК); **V**(Даг): (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pp>

Genus 80. Anisantha С. Koch - Неравноцветник

244. *A. tectorum* (L.) Nevski (*Bromus tectorum* L., *Zerna tectorum* (L.) Lindm.) - Н. кровельный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗК); **V**(Даг): (Голаркт.); ST,Ra,Rb(T:eph); [Sp.]

245. *A. haussknechtii* (Boiss.) Holub (*B. haussknechtii* Boiss.) - Н. Гаусскнехта = **V**(Касп): (Зап.др.средиз.); ST,Rb(T); [R.]

246. *A. rubens* (L.) Nevski - (*B. rubens* L., *Z. rubens* (L.) Grossh.) - Н. краснеющий = **V**(Касп): (Средиземн.); Db(T); [R.]

247. *A. sterilis* (L.) Nevski (*B. sterilis* L., *Z. sterilis* (L.) Panz.) - Н. стерильный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СКТ); **IV**(СЗК); **V**(Даг): (Общедр.средиз.); ST,Rb(T:eph); [Sp.]

Genus 81. Avena L. - Овёс

248. *A. persica* Steud. (*A. ludoviciana* Durieu) - О. персидский = **I**(ЗП,ЦП); **II**(Кизл); **III**(Ст,СК,П,ЧО); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Sp.]

249. *A. sterilis* L. - О. стерильный = **IV**(ТА): (Средиземн.); Ra(T); [R.]

250. *A. fatua* L. - О. пустой, Овсяг = **I**(ЗП,ЦП); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,СКТ); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Голаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]

251. *A. sativa* L. - О. посевной = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Куб,Э,Тер); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Sp.]

252. *A. barbata* Pott ex Link - О. бородатый = **V**(Касп): (Средиземн.); Rb(T); [Sp.]

253. *A. clauda* Durieu - О. сомнительный = **V**(Касп - Махачкала, Дербент): (Средиземн.); ST(T); [R.]

254. *A. eriantha* Durieu (*A. pilosa* (Roem. et Schult.) Bieb.) - О. пушистоцветковый = **I**(М); **II**(КН: Цвелёв, 1976); **V**(БН,Касп): (Средиземн.); Ra,Rb(T); [Sp.]

Genus 82. Helictotrichon Bess. - Овсец

255. *H. armeniacum* (Schischk.) Grossh. (*H. pratense* auct.) - О. армянский = **III**(ТЗ,Э,ВК); **V**(Даг): (Субкавказ*.); Pa(НК); [Sp.]

256. *H. adzhagicum* (Albov) Grossh. (*H. asiaticum* auct.) - О. аджарский = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВК); **V**(Даг); (Субкавказ*.); Pb,Pc(НК); [Pl.]

257. *H. pubescens* (Huds.) Pilg. - О. опушённый = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(Н); **V**(Даг): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.]

Genus 83. Arrhenatherum Beauv. - Райграс

258. *A. elatius* (L.) J. et C. Presl - Р. высокий = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Европ.); Pa(НК); [Sp.] <Pp>

Genus 84. Ventenata Koel. - Вентената

259. *V. dubia* (Leers) Coss. - В. сомнительная = I(АЕ,АК,М); III(Ст, Куб,П,Каб,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Зап.др.средиз.); S(T); [Sp.]

Genus 85. Gaudinopsis Eig - Гаудинопсис

260. *G. macra* (Bieb.) Eig. - Г. большой = V(Касп): (Туранск.); ST(T); [R.]

Genus 86. Hierochloë - Зубровка

261. *H. arctica* C.Presl. - З. арктическая = III(ТЗ,ЦЭ,Л,Б,ОС): (Голаркт.); Pb(НК); [R.]

262. *H. stepporum* P.A.Smirm. (*H. repens* (Host.) Beauv.) - З. степная = I(АЕ,АК); III(Ст,СК,Л): (Голаркт.); Pa,ST(НК); [R.] <Pa>

Genus 87. Anthoxanthum L. - Пахучеколосник (Душистый колосок)

263. *A. odoratum* L. (*A. alpinum* A. et D.Love) - П. обыкновенный = III(П,[Ст: Колмаков, 1928],ЗК,Э,ВК); V(ЦД,АС): (Евро-Сиб.); Pb(НК); [Sp.] <Pa>

Genus 88. Trisetum Pers. - Трищетинник

264. *T. teberdense* (Litv.) Charadze - Т. тебердинский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. р. Теберда

265. *T. rigidum* (Bieb.) Roem. et Schult. - Т. жёсткий = III(ЛН - Невинномысск,ВЛ,ТЗ,Э,Тер); IV(ТА); V(Даг): (Армено-Иран.); Pa(НК); [Sp.]

266. *T. buschianum* Seregin - Т. Буша = III(Э,Тер); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.] <Ee> l.c. верх. Черка Безенгийского

267. *T. transcaucasicum* Seregin (*T. distichophyllum* auct.) - Т. закавказский = III(Б,ОС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Esub>

268. *T. turcicum* Chrtek (*T. sibiricum* auct.) - Т. турецкий = III(ТЗ,Э,Тер); V(Даг): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]

269. *T. flavescens* (L.) Beauv. (*T. pratense* Pers.) - Т. желтоватый = III(ВЛ,ТЗ,Э,[Ст - Ставрополь: Колмаков, 1928],Тер); IV(ТА); V(Даг): (Европ.); Pa(НК); [Sp.]

270. *T. parvispiculatum* (Tzvel.) Probatova - Т. короткоколосковый = III(Ч); V(БН,Касп): (Субтуран*); Pa(НК); [Sp.]

271. *T. ovatipaniculatum* (Hult.) Galushko (*T. spicatum* auct.) - Т. яйцевиднометельчатый = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); Рс(НК); [Sp.]

Genus 89. Trisetaria Foesk. - Трищетинница

272. *T. loeflingiana* (L.) Paunero (*T. cavanillesii* (Trin.) Maire; *Trisetum cavanillesii* Trin.) - Т. лефлингиевская = I(М - Терские пески); II(ВП); V(Касп): (Общедр.средиз.); Db(T); [Sp.]

Genus 90. Rostraria Trin. - Клювочешуйница

273. *R. cristata* (L.) Tzvel. (*Koeleria phleoides* (Vill.) Pers.) - К. гребенчатая = V(Касп): (Ирано-Туран.); Rb(T); [R.]

Genus 91. Koeleria Pers. - Тонконог

274. *K. cristata* (L.) Pers. (*K. gracilis* Pers.) - Т. гребенчатый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Голаркт.); ST(НК); [Pl.] <Pp>

275. *K. timuchinii* Tzvel. - Т. Тимухина = **IV**(Н: Цвелёв, 2010): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. окр. Новороссийска

276. *K. grossheimiana* (Tzvel.) Galushko (*K. nitidula* auct.) - Т. Гроссгейма = **III**(ЗК,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Ee> l.c. хр. Герпегем, между рр. Белая и Лаба.

277. *K. luersennii* (Domin) Domin (*K. monantha* Domin) - Т. Люерсена = **I**(Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб,СК,П,Кисл,Л,УН,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [Sp.] <Ee> l.c. окр. Теберды

278. *K. caucasica* (Domin) V.Fedtsch. (*K. buschiana* Gontsch.) - Т. кавказский = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **V**(Даг): (Вост.средиз.); Pb(НК); [Sp.]

279. *K. sabuletorum* (Domin) Klok. (*K. glauca* (Spreng.) DC.) - Т. песчаный = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Евро-Сиб.); Db(НК); [Sp.]

Genus 92. Deschampsia Beauv. - Луговик

280. *D. caespitosa* (L.) Beauv. = Л. дернистый = **III**(Куб,Э,Тер); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Голаркт.); Pb,Рс(НК); [Pl.]

281. *D. media* (Gouan) Roem. et Schult. - Л. средний = **III**(КР); **IV**(Н): (Средиземн.); Pa(НК); [Sp.]

Genus 93. Avenella Drej. - Авенелла

282. *A. flexuosa* (L.) Drej. (*Deschampsia flexuosa* (L.) Nees) - А. извилистая = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Голаркт.); Pb,Рс(НК); [Pl.]

Genus 94. Aira L. - Аира

283. *A. notarisiana* Steud. (*A. capillaris* Host) - А. нотарисианская = **V**(Касп): (Средиземн.); Db(Т); [R.]

284. *A. praesox* L. - А. ранняя = **I**(Т - Тамань: Гроссгейм, 1939): (Европ.); Db(Т); [R.]

Genus 95. Holcus L. - Бухарник

285. *H. lanatus* L. - Б. шерстистый = **III**(МА,ЛН - Невинномысск, Надзорное,Ст,ВЛ,ТЗ,Кисл,Л,УН,Ч): (Европ.); Pa(НК); [Sp.]

Genus 96. Milium L. - Бор

286. *M. effusum* L. - Б. развесистый = **III**(Ст: Танфильев, Кононов, 1987,ЗК,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Голаркт.); S(НК); [Sp.]

287. *M. schmidtianum* C.Koch - Б. Шмидта = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

288. *M. alexeenkoi* (Tzvel.) Tzvel. - Б. Алексеенко = **V**(Касп - Дербент): (Ирано-Туран.); Pa(Т); [R.]

289. *M. vernale* Vieb. - Б. весенний = **I**(АК,Прик,ТБ,[НК: Танфильев, Кононов,1987]); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,Каб,ЧО); **IV**(Н); **V**(Даг): (Субсредиз*.); Pa(Т); [Sp.]

290. *M. intermedium* (Probat.) Tzvel. - Б. промежуточный = **IV**(Н): (Средиземн.); S(Т); [R.]

Genus 97. Calamagrostis Adans. - Вейник

291. *C. arundinacea* (L.) Roth - В. тростниковый = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗК); **V**(Даг): (Палеаркт.); Pb(НК); [Sp.]

292. *C. subchalibae* Tzvel. - В. почтистальной = **III**(ЦЭ,Б,ОС,ВС,АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] l.c. Донгузун

293. *C. caucasica* Trin - В. кавказский = III(ТЗ,ЦЭ,ВК); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК); [Pl.]
294. *C. minarovii* Gussejnov - В. Минарова = V(ЦД - бассейн Казикумухского Койсу): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> l.c. с. Хосрех
295. *C. tzvelevii* Gussejnov - В. Цвелёва = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. с. Карекадани Левашинского р-на
296. *C. teberdensis* Litv. - В. тебердинский = III(ТЗ,Кисл,Л,Б,ОС): (Субкавк*.); S,Do(НК); [R.] l.c. р. Теберда, выше с. Верхняя Теберда
297. *C. canescens* (Web.) Roth (*C. lanceolata* Roth) - В. седеющий = III(Ст[оз.Кравцово: Колмаков, 1928]): (Европ.); Aa(НК); [Rs.] <Rg>
298. *C. epigeios* (L.) Roth - В. наземный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Дар): (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.]
299. *C. balkharica* P. Smirn. - В. балкарский = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [R.] <Es> l.c. г. Кюкюртлю
300. *C. pseudophragmites* (Hall fil.) Koel. - В. ложнотростниковый = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); III(Ст,Куб,Э,СКТ); IV(Н); V(Дар): (Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.]
301. *C. czerepanovii* Gussejnov - В. Черепанова = III(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Es> l.c. с. Карекадани Левашинского р-на
302. *C. paradoxa* Lipsky - В. своеобразный = III(Б); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК)[R.] <Es> l.c. ледник Безенги

Genus 98. *Apera* Adans. - Метлица

303. *A. spica-venti* (L.) Beauv. - М. обыкновенная = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем, Т,НК); II(ВП); IV(Н): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [R.]
304. *A. maritima* Klok. - М. приморская = I([АЕ,АК,Тем,Т - побережье Азовского моря]); IV(Н): (Европ.); Db(T); [R.]
305. *A. interrupta* (L.) Beauv. - М. прерывистая = I(НК,ТБ,М); II(КН); (Общедр.средиз.); Ra(T): [R.]

Genus 99. *Pentatherum* Nabel - Пятиостенник

306. *P. olympicum* (Boiss.) Nabel. (*P. ruprechtii* (Nevski) Nevski; *Calamagrostis olympica* Boiss.) - П. олимпийский = III(ВЛ,Б,ОС); V(ЦД): (Ирано-Туран.); Pс(НК); [Sp.]
307. *P. balansae* (Boiss.) Nevski (*Calamagrostis balansae* Boiss.) - П. Балансы = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pс(НК); [R.]

Genus 100. *Agrostis* L. - Полевица

308. *A. gigantea* Roth (*A. alba* L.) - П. гигантская = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Дар): (Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]
309. *A. tenuis* Sibth. (*A. capillaris* L.) - П. тонкая = III(Ст,Куб,ЗК,Э, Тер,ВК); IV(СЗК); V(Дар): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.]
310. *A. stolonifera* L. (*A. marcantha* Schischk.) - П. корневищная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Дар): (Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]
311. *A. lazica* Balansa - П. лазистанская = III(ВС); V(Касп): (Субкавк*.); Pb,Pс(НК); [R.]

312. *A. vinealis* Schreb. (*A. tenuifolia* Bieb.; *A. marschalliana* Seregin) - П. виноградниковая = III(Ст,Куб,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понтич.); Pb(НК); [Pl.]

313. *A. planifolia* C.Koch - П. плосколистная = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Субкавказ*.); S,Pb(НК); [Sp.]

314. *A. teberdensis* Litv. (*A. clavata* Trin.) - П. тебердинская = III(ТЗ,Б): (Кавк.: Эукавказ.); S(НК); [R.] <Esub> l.c. Теберда

Genus 101. Polypogon Desf. - Многобородник

315. *P. viridis* (Gouan) Breistr. (*P. semiverticillatus* (Forsk.) Hyl.) - М. зелёный = III(Куб,Каб); IV(Н); V(Даг): (Ирано-Туран.); Aa(НК); [R.]

316. *P. monspeliensis* (L.) Desf. - М. монспелиенский = I(М - Терек); II(КН - Киссык,Кизл); III(П,ЧО - Сунжа); IV(Н); V(Даг): (Общедр.средиз.); Aa(Т); [R.]

Genus 102. Gastridium Beauv. - Пузатик

317. *G. ventricosum* (Gouan) Schinz et Thell. (*G. lendigerum* (L.) Desv.) - П. вздутый = IV(ТА - Лазаревское, Сочи); (Средиземн.); Pa(Т); [Sp.]

Genus 103. Schedonorus Beauv. - Шедонорус

318. *Sch. giganteus* (L.) Soreng et Terrell (*Festuca gigantea* (L.) Vill.) - Ш. исполинский = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Палеаркт.); S(НК); [Pl.]

319. *Sch. pratensis* (Huds.) Beauv. (*F. pratensis* Huds.) - Ш. луговой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pp>

320. *Sch. arundinaceus* (Schreb.) Dumort (*F. regeliana* Pavl.; *F. orientalis* (Hack.) V.Krecz. et Bobr.; *F. arundinacea* Schreb.) - Ш. тростниковый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.]

Genus 104. Lolium L. - Плевел

321. *L. perenne* L. (*L. marschallii* Stev.) - П. многолетний = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ); IV(СЗК); V(Даг): (Голаркт.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pp>

322. *L. multiflorum* Lam. (*L. italicum* A.Br.) - П. многоцветковый = IV(СЗЗ): (Средиземн.); Rb(Т); [R.]

323. *L. loliaceum* (Bory et Chaub.) Hand.-Mazz. (*L. subulatum* Vis.) - П. плевеловый = IV(Н: [Зернов, 2006](#); ТА - Сочи: [Гроссгейм, 1939](#)): (Средиземн.); Db(Т); [R.]

324. *L. rigidum* Gaudin - П. жёсткий = I(Т); II(Кизл); III(Ст,Каб, ТС,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); ST,Db(Т); [Sp.]

325. *L. persicum* Boiss. et Hohen. - П. персидский = I(АК,КЕ, Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,СК,П,ЧО); V(Касп): (Ирано-Туран.); Db,Rb(Т); [Sp.]

326. *L. temulentum* L. - П. опьяняющий = II(Кизл); III(Ст,Куб); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Палеаркт.); Ra(Т); [R.]

327. *L. arvense* With. - П. полевой = V(Касп,ЦД): (Палеаркт.); Db,Rb(Т); [R.]

Genus 105. Drymochloa Holub - Дримохлора

328. *D. drymeja* (Mert. et Koch) Holub (*Festuca drymeja* Mert. et Koch; *F. montana* Bieb.) - Д. лесная = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Евро-Кавк.); S(НК); [Pl.]

329. *D. sylvatica* (Poll.) Holub (*F. altissima* All.; *F. sylvatica* (Poll.) Holub) - Д. лесная = III(Ст,ЗК,П,Л,Ч); IV(ТА); V(Даг): (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]

Genus 106. Leucorhoa Griseb. - Беломятлик

330. *L. sclerophylla* (Boiss. et Hohen.) V. Krecz. et Bobr. (*Festuca sclerophylla* Boiss. et Hohen.) - Б. жестколистный = III(СК,ЛН,Э,Л); V(ЦД): (Армено-Иран.); Do(НК); [R.]

331. *L. caucasica* (Hack.) V.Krecz. et Bobr. (*F. caucasica* Hack.) = Б. кавказский = III(ВЛ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); V(ЦД): Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. р. Терек, В.Ларс

332. *L. krivotulenkae* E.Alexeev - Б. Кривотуленко = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Es>

Genus 107. Festuca L. - Овсяница

333. *F. woronowii* Hack. (*F. varia auct.*) - О. Воронова = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.]

334. *F. djimilensis* Boiss. et Bal. - О. джимильская = III(ЦЭ,Б): (Кавк.: Общекавк.); Рс,Do(НК); [R.]

335. *F. heterophylla* Lam. - О. разнолистная = III(П - Машук); (Европ.); S(НК); [R.] <Rg>

336. *F. daghestanica* (Tzvel.) E.Alexeev - О. дагестанская = III(ВС); IV(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Ee> l.c. между сс. Леваши и Хаджалмахи

337. *F. rubra* L. - О. красная = III(Ст - Ставрополь,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb,Рс(НК); [Sp.]

338. *F. buschiana* (St.-Yves) Tzvel. (*F. frigida* (Hack.) Grossh.) - О. Буша = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Рс,Do(НК); [Sp.] l.c. Зап. Кавказ, истоки р. Черю-Кола

339. *F. primaе* E.Alexeev - О. Примы = III(ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс(НК); [R.] <Ee> l.c. верх. р. Тюалой (ЧР)

340. ★*F. sommieri* Litardiere (*F. longiaristata* Somm. et Levier) - О. Сомье = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Esub>

341. *F. tzvelevii* E.Alexeev - О. Цвелёва = III(ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> l.c. г. М.Азгара

342. *F. alexeenkoi* E.Alexeev - О. Алексеенко = V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Do(НК); [R.] l.c. Дагестан, верховья Самура, междуречье Дашагилчай и Гедим-чай, гора Чилим

343. *F. inguschetica* E.Alexeev - О. ингушская = III(ВС - массив Шон-Дон): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [Rs.] <Es> l.c. верх. р. Шон-Дон

344. *F. yaroschenkoi* (St.-Yves) E.Alexeev - О. Ярошенко = V(АС - верховья Самура); (Кавк.: Эукавк.); Рс(НК); [R.] <Esub>

345. *F. valesiaca* Gaudin (*F. sulcata* (Hack.) Nym.) - О. валецкая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Палеаркт.); ST(НК); [Pl.] <Pp>

346. *F. musbelica* (Reverd.) Ikonn. - О. мусбельская = III(ВС); IV(АС): (Субтуран.*); Рс(НК); [R.]

347. *F. pseudodalmatica* Krajina - О. ложнодалматская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
348. *F. karadagensis* Hadac et Chrtek - О. карадагская = V(АС): (Субкавказ*.); Pс(НК); [R.]
349. *F. rupicola* Neuff. - О. наскальная = I(КЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Do(НК); [Sp.]
350. *F. brunnescens* (Tzvel.) Galushko - О. буроватая = III(Э,ВК); V(Дар): (Кавк.: Общекавказ.); Do(НК); [Pl.]
351. *F. saxatilis* Schur. (*F. laevis auct.*) - О. скальная = III(Х,ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Субсредиз*.); Do(НК); [Sp.]
352. *F. azgarica* E.Alexeev - О. азгарская = III(ВЛ,ТЗ): (Кавк.: Эукавказ.); Pб(НК); [R.] <Es> l.c. г. М.Азгара, верх. р. Уруп
353. *F. elbrussica* E.Alexeev - О. эльбрусская = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавказ.); S(НК); [R.] <Es> l.c. Терскол (Эльбрус)
354. *F. callieri* (Hack.) Markgr. - О. Калье = I(Т); IV(СЗЗ): (Евро-Кавк.); ST(НК); [Sp.]
355. *F. polita* (Halacsy) Tzvel. - О. гладколистная = III(ВЛ,ТЗ): (Зап.др.средиз.); Da(НК): [Rs.]
356. *F. beckeri* (Hack.) Trautv. (*F. polezica Zapal.*) - О. Беккера = I(НД,ЗПМ,АЕ,Прик - Бешпагир); V(Касп): (Понт.-Южносиб.); Db(НК); [R.]
357. *F. ovina* L. - О. овечья = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Дар): (Европ.); ST(НК); [Sp.] <Pp>
358. *F. ruprechtii* (Boiss.) V.Krecz. et Bobr. - О. Рупрехта = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); PсDo(НК); [Sp.]
359. *F. airoides* Lam. (*F. supina Schur*) - О. приземистая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pс(НК); [Sp.]
360. *F. filiformis* Pourr. (*F. tenuifolia Sibth.*) - О. нителистная = III(ТЗ - Уруп): (Евро-Кавк.); S,Do(НК); [R.]

Genus 108. *Vulpia* C.C.Gmel. - Вульпия

361. *V. bromoides* (L.) S.F.Gray - В. костровидная = IV(ТА): (Зап.др.средиз.); Rb(Т); [R.]
362. *V. myuros* (L.) C.C.Gmel. - В. мышехвостниковая = III(Куб,П,Каб,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); SD(НК); [R.]
363. *V. ciliata* Link - В. реснитчатая = II(Кизл); V(Касп): (Средиземн.); Db(Т); [Sp.]

Genus 109. *Nardurus* Reichenb. - Белоусник

364. *N. maritimus* (L.) Murb. - Б. морской = V(ЦД,АС): (Средиземн.); Rb(Т); [R.]

Genus 110. *Scleropus* Griseb. - Жесткомятлик

365. *S. rigida* (L.) Griseb. - Ж. жёсткий = V(Касп): (Средиземн.); Da(Т); [R.]

Genus 111. *Cutandia* Willk. - Кутандия

366. *C. rigescens* (Grossh.) Tzvel. (*Scleropoa rigescens* (Trin.) Grossh.) - К. жестковатая = V(Касп - Самур: Муртазалиев, 2009): (Туранск.); ST,Db(T); [R.]

367. *C. memphitica* (Speng.) Benth. - К. мемфисская = V(Касп): (Средиземн.); Db(T); [R.]

Genus 112. *Sphenopus* Trin. - Булавоножка

368. *Sph. divaricatus* (Gouan) Reichenb. - Б. растопыренная = V(Касп): (Ирано-Туран.); Dc(T); [Sp.]

Genus 113. *Psilurus* Trin. - Голохвостник

369. *P. incurvus* (Gouan) Schinz et Thell. (*P. aristatus* (L.) Lange) - Г. согнутоколосый = IV(H): (Средиземн.); Da,Dc(T); [R.]

Genus 114. *Poa* L. - Мятлик

370. *P. badensis* Haenke (*P. alpina auct.*) - М. баденский = III(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Голаркт.); Pa(НК); [Pl.]

371. *P. imeretica* Somm. et Levier - М. имеретинский = IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>

372. *P. alpina* L. - М. альпийский = III(Ст: Гроссгейм, 1939,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Голаркт.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]

373. *P. elbrussica* Timrko - М. эльбрусский = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pc(НК); [R.] <Es> l.c. г. Эльбрус

374. *P. bulbosa* L. - М. луковичный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Касп,ЦД): (Палеаркт.); ST,Rb(НК:eph); [Pl.]

375. *P. crispa* Thuill. - М. курчавый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Палеаркт.); ST,Rb(НК:eph); [Pl.]

376. *P. pratensis* L. - М. луговой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Голаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pr>

377. *P. angustifolia* L. - М. узколистный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Pr>

378. *P. caucasica* Trin. (*P. naltchikensis Roshev.*) - М. кавказский = III(ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. верх. р. Ингушли (Эльбрус)

379. *P. iberica* Fisch. et C.A. Mey. - М. грузинский = III(ВЛ,ТЗ,Э,Каб,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.] <Pr>

380. *P. longifolia* Trin. - М. длиннолистный = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]

381. *P. primaе* Tzvel. - М. Примы = III(ВС,АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. Чечня, верховья реки Кериго, перевал Ваглбасах

382. *P. masenderana* Freyn et Sint. - М. мазендеранский = V(АС): (Субкавк*.); S(НК); [R.]

383. *P. remota* Forsell. - М. расставленный = III(ВЛ,ТЗ): (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]

384. *P. chaixii* Vill. - М. Хайкса = III(ЦЭ - верховья Чегема): (Европ.); S(НК); [R.] <Rg>

385. *P. trivialis* L. - М. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Палеаркт.); Pa,Aa(НК); [Pl.]

386. *P. sylvicola* Guss. - М. лесной = **I**(КЕ,Прик,ТБ,НК); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗК); **V**(Даг): (Зап.др.средиз.); S(НК); [Sp.]
387. *P. supina* Schrad. - М. простёртый = **III**(ЦЭ,Л); **V**(ЦД): (Европ.); Pс(НК); [R.]
388. *P. annua* L. - М. однолетний = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗК); **V**(Касп,ЦД): (Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]
389. *P. nemoralis* L. - М. боровой = **I**(НД,КЕ); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗК); **V**(Даг): (Панбор.); S(НК); [Pl.]
390. *P. seredinii* Galkin - М. Середина = **III**(ТЗ,ЦЭ,ОС); **V**(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [R.] <Ee> l.c. верх. р. Безенги
391. *P. rhomboidea* Roshev. - М. ромбический = **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Aa(НК); [R.] <Esub> l.c. р. Пслух (приток Мзымты)
392. *P. palustris* L. - М. болотный = **I**(ЗП,Прик,ТБ); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,СК,П,ЧО); **IV**(Н); **V**(Даг): (Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]
393. *P. pseudosterilis* Galkin - М. ложнобесплодный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Da,Do(НК); [R.] <Ee> l.c. пос. Каменно-мостский
394. *P. sterilis* Vieb. - М. бесплодный = **I**(Тем,Т); **III**(Ст,Куб,СК,П,Каб): (Понтич.); **IV**(СЗЗ); Da(НК); [R.]
395. *P. stepposa* (Kryl.) Roshev. - М. степной = **I**(ЗП,Прик,СК); **III**(Ст,П): (Вост.средиз.); ST(НК); [Sp.]
396. *P. glauca* Vahl. - М. сизый = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Голаркт.); Pс(НК); [Sp.]
397. *P. compressa* L. - М. сплюснутый = **I**(ЗП,Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб,СК,П,Л,ЧО): (Европ.); Pa(НК); [Sp.]

Genus 115. Eremopoa Roshev. - Пустынномятлик

398. *E. persica* (Trin.) Roshev. - П. персидский = **V**(Касп,ЦД: Мургазалиев, 2009): (Субкавк.*); Aa,Rb(T);

Genus 116. Catabrosella (Tzvel.) Tzvel. - Катабросочка

399. *C. variegata* (Boiss.) Tzvel. (*Colpodium variegatum* (Boiss.) Griseb.) - К. пёстрая = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pс(НК); [Sp.]
400. *C. humilis* (Bieb.) Tzvel. (*C. humile* (Bieb.) Griseb.) - К. низкая = **III**(Ст,П,СК,ТС); **V**(Касп,ЦД): (Субтуран*.); Db(НК); [R.] l.c. Бештау
401. *C. parviflora* (Boiss. et Buhse) Tzvel. ex Czoran. - К. мелкоцветковая = **V**([ЦД,Касп - бассейн р. Самур]): (Армено-Иран.); ST,Do(НК); [R.]

Genus 117. Nyalopoa (Tzvel.) Tzvel. - Плёнчатомятлик

402. *N. lakia* (Woronow) Tzvel. (*Colpodium lakium* Woronow) - П. лакский = **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> l.c. р. Ненкурачай, выше впадения её в Казикумухское Койсу.
403. *N. czirahica* Gussejnov - П. чирагский = **V**(ЦД - верховья р. Чирагчай): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> l.c. окр. с. Чираг.
404. *N. pontica* (Bal.) Tzvel. (*C. ponticum* (Bal.) Woronow) - П. понтийский = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс(НК); [Sp.]

Genus 118. Catabrosa Beauv. - Поручейница

405. *C. pseudoairoides* (Herrm.) Tzvel. - П. ложноаировидная = I(Кизл); V(Касп): (Субкавк*.); Aa(НК); [R.]

406. *C. aquatica* (L.) Beauv. - П. водная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Дар): (Голаркт.); Aa(НК); [Pl.]

Genus 119. Paracolpodium (Tzvel.) Tzvel. - Паракольподиум

407. *P. colchicum* (Albov) Tzvel. (*Colpodium colchicum* (Albov) Woronow) - П. колхидский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pс(НК); [Sp.]

Genus 120. Colpodium Trin.- Кольподиум

408. *C. versicolor* (Stev.) Schmalh. - К. разноцветный = III(ВЛ,Э,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

Genus 121. Zingeria P.A.Smirn. - Цингерия

409. ★*Z. biebersteiniana* (Claus) P.Smirn. (*Agrostis biebersteiniana* Claus) - Ц. Биберштейна = III(Кисл): (Понтич.); Pb(Т); [Rs.] <Rg>

Genus 122. Puccinellia Parl. - Бескильница

410. *P. poëcilantha* (C.Koch) Grossh. (*Atropis poëcilantha* (C.Koch) Grossh.) - Б. пестроцветковая = I(МД); II(КН); V(Касп): (Туранск.); Aa,Dc(НК); [Sp.]

411. *P. gigantea* (Grossh.) Grossh. (*A. gigantea* Grossh.) - Б. крупная = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(П,СК,Ч); V(БН,Касп): (Туранск.); Aa,Dc(НК); [R.]

412. *P. bulbosa* (Grossh.) Grossh. (*A. bulbosa* Grossh.) - Б. луковичная = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Dc(НК); [R.]

413. *P. bilykiana* Клок. - Б. Билыка = I(ЗП): (Понтич.); Dc(НК); [R.]

414. *P. dolicholepis* V.Krecz. (*A. dolicholepis* V. Krecz., *A. convoluta* (Horntm.) Griseb.) - Б. длинночешуйчатая = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); II(ВП); III(Ст,СК); V(Касп): (Субтуран*.); Aa,Dc(НК); [Sp.]

415. *P. fominii* Bilyk - Б. Фомина = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,МД); V(Касп): (Понтич.); Db,Dc(НК); [R.]

416. *P. choresmica* V. Krecz. (*A. choresmica* Krecz.) - Б. хорезмская = II(Кизл); V(Касп): (Туранск.); Db(НК); [R.]

417. *P. distans* (Jacq.) Parl. (*A. distans* (Jacq.) Griseb.) - Б. расставленная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,П); IV(СЗК); V(Дар): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]

Genus 123. Sclerochloa Beauv. - Жескоколосница

418. *S. dura* (L.) Beauv. - Ж. твёрдая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,ТЗ,П,Кисл); IV(СЗК); V(Дар): (Общедр.средиз.); Rb(Т); [Pl.]

Genus 124. Dactylis L. - Ежа

419. *D. glomerata* L. - Е. сборная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Дар): (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pr>

420. *D. polygama* Horvat. - Е. многобрачная = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(ЦД): (Европ.); S(НК); [Pl.] <Pr>

Genus 125. Synosurus L. - Гребневик

421. *S. cristatus* L. - Г. обыкновенный = III([Ст: Колмаков, 1928],[ВЛ: Зернов, 2006],Л,УН); IV(ТА: Зернов, 2006): (Субсредиз*.); S,Pa(НК); [R.]

422. *S. echinatus* L. - Г. ежовый = III(КР: Зернов, 2006,Ч); IV(ТА: Зернов, 2006); V(Касп,ЦД): (Средиземн.); ST(Т); [Sp.]

Genus 126. Briza L - Трясунка

423. *B. elatior* Sibth. et Smith (*B. australis* Prokud.; *B. media auct. non L.*) - Т. высокая = III(Куб,Э,Б,ОС); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Вост.средиз.); Pb(НК); [Sp.] <Po>

424. *B. marcowiczii* Woronow - Т. Марковича = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pc(НК); [R.]

425. *B. maxima* L. - Т. большая = IV(ТА: Зернов, 2006): (Средиземн.); Rb(Т); [R.]

Genus 127. Brizochloa Jiras. et Chrtek - Трясунковидка

426. *B. humilis* (Bieb.) Chrtek. et Hadac (*Briza spicata* Sibth. et Smith., *B. humilis* Bieb.) - Т. низкая = I(Т); IV(Н): (Вост.средиз.); Da(Т); [R.]

Genus 128. Cinna L. - Цинна

427. *C. latifolia* (Trev.) Griseb. - Ц. широколистная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Голаркт.); S(НК); [R.] <Rg>

Genus 129. Pholiurus Trin. - Чешуехвостник

428. *Ph. pannonicus* (Host) Trin. (*Lepturus pannonicus* (Host) Kunth.) - Ч. венгерский = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Тем,Т,МД); II(КН): (Субтуран*.); Dc(Т); [R.]

Genus 130. Parapholis C.E.Hubb. - Двучешуйник

429. *P. incurva* (L.) C.E.Hubb. (*Lepidurus incurvus* (L.) Janch.; *Lepturus incurvus* (L.) Grossh.) - Д. согнутоколосый = V(Касп): (Ирано-Туран.); Db(Т); [R.]

Genus 131. Sesleria Scop. - Сеслерия

430. *S. alba* Smith (*S. anatolica* Deyl., *S. autumnalis auct.*) - С. белая = III(КР,Х,Кисл); IV(СЗЗ): (Средиземн.); Da,Do(НК); [R.]

431. *S. heufleriana* Schur - С. Гейфлера = III(Кисл,Б): (Понтич); Da(НК); [R.]

432. *S. phleoides* Stev. ex Roem. et Schult. - С. тимофеевковидная = III(ЗК,Э,ВК); V(Дар): (Субкавк*.); Da(НК); [Sp.]

Genus 132. Echinaria Desf. - Игловик (Ежовница)

433. *E. capitata* (L.) Desf. - И. головчатый = V(Касп): (Средиземн.); ST(Т); [R.]

Genus 133. Phalaroides Wolf - Двукисточник

434. *Ph. arundinacea* (L.) Rauschert (*Digraphis arundinaceae* (L.) Trin.) - Д. тростниковый = I(ЗП,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,СК,П,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Голаркт.); Aa(К); [R.]

Genus 134. Phalaris L. - Канареечник

435. *Ph. aquatica* L. (*Ph. tuberosa* L.; *Ph. bulbosa auct.*) - К. водный = V(Касп): (Зап.др.средиз); Pa(НК); [R.]

436. *Ph. minor* Retz. - К. малый = IV(ТА - Адлер): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(Т); [R.]

437. *Ph. paradoxa* L. - К. парадоксальный = V(ЦД - Самур: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); ST(Т); [R.]

438. **Ph. canariensis* L. - К. канарский = III(Кисл - Кисловодск); IV(Н - Новороссийск); V(Касп): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(Т); [R.]

439. Ph. brachystachys Link - К. короткоколосый = V(Касп,ЦД - Самур: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); ST,SD(T); [R.]

Genus 135. Beckmannia Host - Бекманния

440. B. eruciformis (L.) Host - Б. гусеницевидная = I(НД,ЗПМ,АЕ, АК,КЕ,М); II(Ст,Куб,СК,Каб); IV(Н); (Субсредиз*.); Аа(К); [Sp.]

Genus 136. Phleum L. - Тимофеевка

441. Ph. phleoides (L.) Karst. - Т. степная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); ST(НК); [Pl.]

442. Ph. montanum C.Koch - Т. горная = III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); Ра(НК); [Sp.]

443. Ph. hirsutum Honck. (*Ph. michelii* All.; *Ph. tzvelevii* Dubovik) - Т. шерстистая = I(Т); IV(Н): (Средиземн.); ST,Da(НК); [Sp.]

444. Ph. paniculatum Huds. - Т. метельчатая = I(ТБ,НК,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Дар): (Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.]

445. Ph. nodosum L. (*Ph. bertolonii* DC.) - Т. узловатая = I(АК,КЕ, Тем,Т); II(Кизл); III(Ст, Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Ра,ST,Db(НК); [Sp.]

446. Ph. pratense L. - Т. луговая = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Палеаркт.); Ра,Pb(НК); [Pl.]

447. Ph. alpinum L. - Т. альпийская = III(ЗК,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pb(НК); [Pl.]

Genus 137. Alopecurus L. - Лисохвост

448. A. tiflisiensis (Westb.) Grossh. - Л. тифлисский = III(ВЛ,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

449. A. tuscheticus Trautv. - Л. тушетский = III(ВС); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Do(НК); [Sp.]

450. A. brevifolius Grossh. - Л. коротколистный = III(ВС); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pc,Do(НК); [R.]

451. A. albovii Tzvel. - Л. Альбова = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub>

452. A. dasyanthus Trautv. (*A. laguroides* Bal.) - Л. пушистоцветковый = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Do(НК); [Pl.]

453. A. vaginatus (Willd.) Pall.ex Kunth - Л. влагалищный = III(Куб, Э,Тер); IV(Н); V(Дар): (Общедр.средиз.); Pb(НК); [Sp.]

454. A. sericeus Albov - Л. шелковистый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]

455. A. glacialis C.Koch (*A. ponticus* C.Koch) - Л. ледниковый = III(Куб,Э,Тер); IV(ТА); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(НК); [Pl.]

456. A. pratensis L. - Л. луговой = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем); III(Ст,Куб,Э, СК,Л,УН,Б,ОС); IV(ТА): (Евро-Сиб.); Ра(НК); [Sp.] <Pr>

457. A. arundinaceus Poir. (*A. ventricosus* Pers.) - Л. тростниковый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]

458. A. armenus (C.Koch) Grossh. - Л. армянский = III(ЦЭ); V(Касп,ЦД): (Субкавк*.); Pb,Аа(НК); [Sp.]

459. *A. geniculatus* L. - Л. коленчатый = III(ТЗ); V(ЦД): (Панбор.); Pa(НК); [R.]

460. *A. aequalis* Sobol. - Л. равный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Палеаркт.); Aa(Т); [Sp.]

461. *A. myosuroides* Huds. - Л. мышехвостниковый = I(АК,КЕ, Тем,Т,М); II(Кизл); II(Ст,Куб,СК,П,Каб); IV(СЗЗ); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Aa(Т); [R.]

Genus 138. Glyceria R.Br. - Манник

462. *G. lithuanica* (Gorsky) Gorsky - М. литовский = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Палеаркт.); S(НК); [R.]

463. *G. arundinacea* Kunth - М. тростниковый = I(НД,ЗПМ,АЕ,ЦП); III(Каб): (Палеаркт.); Aa(НК); [R.]

464. *G. maxima* (С.Hartm.) Holub (*G. aquatica* (L.) Wachlenb.) - М. большой = I(ЗП,Прик,ТБ,НК,М); III(Ст,Куб,П,СК); IV(ТА): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]

465. *G. nemoralis* (Uechtr.) Uechtr. et Koern. - М. дубравный = III(Куб,П,СК,Л,Ч); V(Даг): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]

466. *G. notata* Chevall. (*G. plicata* (Fries) Fries, *G. acutiuscula* H.Scholz) - М. складчатый = I(НД,ЗПМ,АЕ,МД); III(Ст,Куб,П,СКТ); IV(Н); V(Даг): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]

467. *G. fluitans* (L.) R.Br. - М. наплывающий = I(ЗП,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,П,СКТ); IV(СЗЗ); V(Даг): (Европ.); Aa(НК); [Sp.]

Genus 139. Melica L. - Перловник

468. *M. uniflora* Retz. - П. одноцветковый = III(Куб,Л,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп): (Европ.); S(НК); [Sp.]

469. *M. minor* Hack. - П. малый = III(ОС); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. В.Ларс

470. *M. nutans* L. - П. понижающийся = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(Даг): (Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.]

471. *M. picta* С.Koch - П. пёстрый = I(Прик,М); III(Ст,Куб,СК,П,Каб,Л,ЧО); IV(Н); V(Даг): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]

472. *M. altissima* L. - П. высокий = I(НД,ЗПМ,АЕ,Прик,ТБ,М); III(Ст,Куб,П,СК,ЧО): (Субтуран*.); Pa(НК); [Sp.]

473. *M. transsilvanica* Schur - П. трансильванский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]

474. *M. taurica* С.Koch - П. крымский = I(АК,КЕ,Тем,Т,ЦП); II(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Вост.средиз.); ST(НК); [Sp.]

475. *M. jacquemontii* Deche. (*M. breviflora* Boiss.) - П. Джакмонта = V(Касп); (Ирано-Туран.); Pс,Do(НК); [R.]

Genus 140. Achnatherum Beauv. - Чий

476. *A. caragana* (Trin. et Rupr.) Nevski (*Stipa caragana* Trin., *Lasiagrostis caragana* (Trin.) Trin. et Rupr.) - Ч. карагана = III(ЦЭ,Л,УН,Б,ОС); V(Даг): (Туранск.); ST(НК); [Sp.]

477. *A. bromoides* (L.) P.Beauv. (*Aristella bromoides* (L.) Bertol., *S. bromoides* (L.) Doerfl.) - Ч. костровый = IV(Н); V(Касп): (Средиземн.); ST(НК); [R.]

478. *A. sibiricum* (L.) Keng ex Tzvel. (*S. sibirica* (L.) Lam.) - Ч. сибирский = V(ЦД): (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]

Genus 141. *Stipa* L. - Ковыль

479. *S. sosnowskyi* Seregin - К. Сосновского = IV(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Ее> l.c. окр. с. Курах

480. *S. daghestanica* Grossh. - К. дагестанский = III(Б,ОС); V(Даг): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.] <Ее> l.c. Андийский округ

481. *S. caspia* C.Koch - К. каспийский = II(ВП); V(Касп): (Туранск.); Db(НК); [Sp.]

482. *S. lessingiana* Trin. et Rupr. - К. Лессинга = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Субтуранск*.); ST(НК); [Pl.]

483. ★*S. ucrainica* P.Smirn. (*S. zalesskii* Wilensky) - К. украинский = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,ЦП); III(Ст,СК,Каб): (Понтич.); ST(НК); [Sp.]

484. *S. pontica* P.Smirn. - К. понтийский = III(Ст,П,ОС); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Da(НК); [R.]

485. ★*S. dasyphylla* (Lindem.) Trautv. - К. опушеннолистный = III(Ст): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.]

486. ★*S. pulcherrima* C.Koch - К. красивейший = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,ЗК,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]

487. *S. glabrinoda* Klok. (*S. lithophila* P.Smirn) - К. голоузловой = IV(Н - Дюрсо, Геленджик): (Кр.-Новоросс.); Da,ST(НК); [R.]

488. ★*S. syreistschikowii* P. Smirn. (*S. paradoxa* (Junge) P.Smirn.) - К. Сырейщикова = III(КР); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Sp.]

489. ★*S. pennata* L. (*S. joannis* Celac.) - К. перистый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Субтуран*.); ST,Db(НК); [Pl.] <Pm>

490. *S. borystenica* Klok. ex Prokud. - К. днепровский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); IV(ЦД,Касп): (Понтич.); ST(НК); [Sp.]

491. *S. tirsia* Stev. (*S. longifolia* Borb.; *S. stenophylla* (Lindem.) Trautv.) - К. пирамидальный = I(АЕ,АК); II(КН); III(Ст,П,Каб,ТС); IV(Н); V(Касп): (Суб-средиз*.); ST(НК); [Sp.]

492. *S. sareptana* A.Beck. - К. сарептский = II(ВП): (Субтуран*.); ST,Db(НК); [R.]

493. *S. capillata* L. - К. волосатик = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]

494. *S. caucasica* Schmalh. - К. кавказский = III(ЧК,П,ТЗ,ВК); V(Даг): (Ирано-Туран.); Da(НК); [R.]

Genus 142. *Piptatherum* Beauv. - Ломкоостник

495. *P. virescens* (Trin.) Boiss. (*Oryzopsis virescens* (Trin.) G.Beck) - Л. зеленатоватый = I(М); II(КН); III(Ст,Куб,СК,П,ЧО,ТС); IV(СЗЗ); V(Даг): (Вост.средиз.); S(НК); [Sp.]

496. *P. holciforme* (Bieb.) Roem. et Schult. (*O. holciformis* (Bieb.) Hack.) - Л. бухарниковый = I(Т); III(Куб,П); IV(Н): (Вост.средиз.); Da(НК); [R.]

Genus 143. *Nardus* L. - Белоус

497. *N. stricta* L. (*N. glabriculumis Sacalo*) - Б. торчащий = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Рс,До(НК); [Pl.]

Genus 144. *Leersia* Sw. - Леерсия

498. *L. oryzoides* (L.) Sw. - Л. рисовидная = I(НД,ЗПМ); III(Куб,П,Каб,ЧО): (Голаркт.); Ab(НК); [R.]

Genus 145. *Zizania* L. - Цицания

499. **Z. latifolia* (Griseb.) Stapf. - Ц. широколистная = I(Т: [Зернов, 2006](#)): (Адвент. [Вост. Азия]); Ab(К); [R.]

500. **Z. palustris* L. - Ц. болотная = I(Тем): (Адвент. [Сев. Америка]); Ab(К); [R.]

Genus 146. *Molinia* Schrank - Молиния

501. *M. caerulea* (L.) Moench - М. голубая = III(Куб,Э,Тер); IV(СЗК); V(Дар): (Палеаркт.); Pb(НК); [Sp.]

502. *M. litoralis* Host - М. прибрежная = III(Кисл,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп): (Европ.); Aa(НК); [R.]

Genus 147. *Danthonia* DC. - Дантония

503. *D. alpina* Vest (*D. calycina* (Vill.) Reichenb.) - Д. альпийская = IV(ТА): (Европ.); Rb(НК); [R.]

Genus 148. *Sieglingia* Bernh. - Трёхзубка (Зиглингя)

504. *S. decumbens* (L.) Bernh. - Т. распростёртая = IV(ТА): (Европ.); Pa,Rb(НК); [R.]

Genus 149. *Phragmites* Adans. - Тростник

505. *Ph. australis* (Cav.) Trin.ex Steud. (*Ph. communis* Trin.) - Т. южный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Дар): (Плурирег.); Aa,Ab(К); [Pl.] <Pm>

506. *Ph. altissimus* (Benth.) Nabile - Т. высочайший = I(Тем); II(Кизл): (Палеаркт.); Aa,Ab(К); [Pl.]

Genus 150. *Arundo* L. - Арундо

507. *A. donax* L. - А. тростниковый = IV(ТА): (Средиземн.); Db,Aa(НК); [R.]

Genus 151. *Cortaderia* Stapf - Пампасная трава

508. **C. selloana* (Schult. et Schult. fil.) Aschers. et Graebn. (*C. dioica* (Spreng) Speg.) - П.т. Селло = IV(ТА): (Адвент. [Южн. Америка]); Rb(НК); [Sp.]

Genus 152. *Aeluropus* Trin. - Прибрежница

509. *Ae. littoralis* (Gouan) Parl. - П. обыкновенная = I(ЗПМ,МД,АИ,НК,Прик); II(ВП): (Общедр.средиз.); Dc(НК); [Sp.]

510. *Ae. pungens*(Bieb.)C.Koch - П. колючая = I(ЗПМ); II(ВП): (Субтун-ран*.); Dc(НК); [R.]

Genus 153. *Cleistogenes* Keng - Змеёвка

511. *C. serotina* (L.) Keng (*Diplachne serotina* (L.) Link) - З. поздняя = I(М); III(ТС); IV(Н); V(Касп): (Средиземн.); ST,Pa(НК); [R.]

512. *C. bulgarica* (Bornm.) Keng (*D. bulgarica* (Bornm.) Bornm., *Cleistogenes maeotica* Klok. et Zoz) - З. болгарская = I(ЗП,ЦП); II(КН); III(Ст,Куб,П,СК,Э,Каб,ТС); V(Дар): (Понт.-Южносиб.); ST,Db(НК); [Sp.]

513. *C. squarrosa* (Trin.) Keng. (*D. squarrosa* (Trin.) Maxim.) - 3. растопыренная = I(НД,ЗПМ,АЕ); V(Касп): (Субтуран*.); Да(НК); [Sp.]

Genus 154. Boriskellera Terechov - Борискеллера <GM>

514. *B. arundinacea* (L.) Terechov (*Eragrostis collina* Trin.; *E. arundinacea* (L.) Roshev.) - Б. тростниковая = I(ТБ,М); II(ВП); III(П); V(Даг): (Субтуран*.); ST,Дс(НК); [Sp.]

Genus 155. Eragrostis Wolf - Полевичка

515. *E. pilosa* (L.) Beauv. - П. волосистая = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Куб,Л); IV(Н): (Голаркт.); Rb(Т); [R.]

516. *E. minor* Host. - П. малая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Голаркт.); ST,Ra(Т); [Sp.]

517. *E. cilianensis* (All.) Ving. (*E. megastachis* (Koel.) Link) - П. чилианская = I(Тем - Краснодар); IV(ТА: Зернов, 2006): (Голаркт.); Rb(Т); [R.]

Genus 156. Eleusine Gaertn. - Элеузина

518. **E. indica* (L.) Gaertn. - Э. индийская = III(Х); V(СЗЗ): (Адвент. [Юго-Вост.Азия]); Rb(Т); [R.]

Genus 157. Chloris Sw. - Хлорис

519. *C. virgata* Sw. - Х. лозный = V(ЦД - Карадаг: Гроссгейм, 1939): (Адвент. [Юго-Вост.Азия]); Rb(НК); [R.]

Genus 158. Cynodon Rich. - Свиной

520. *C. dactylon* (L.) Pers. - С. пальчатый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Общедр.средиз.); ST,Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pp;Pm>

Genus 159. Muhlenbergia Schreb. - Мюленбергия

521. **M. schreberi* J.F.Gmel. - М. Шребера = III(УН - с. Михайловское); IV(ТА): (Адвент. [Сев.Америка]); Ra,Rb(НК); [R.]

Genus 160. Cynopsis Ait. - Скрытница

522. *C. alopecuroides* (Pill. et Mitt.) Schrad. (*Heleochloa alopecuroides* (Pill. et Mitt.) Host ex Roem.) - С. лисохвостная = I(ЗП,М); II(Кизл); III(Куб,СК,П); (Зап.др.средиз.); Дс,Dd,Aa(Т); [Sp.]

523. *C. schoenoides* (L.) Lam. (*H. schoenoides* (L.) Host. ex Roem.) - С. камышевидная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Дс,Dd,Aa(Т); [Sp.]

524. *C. aculeata* (L.) Ait. - С. колючая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Dd(Т); [Sp.]

Genus 161. Tragus Hall. - Козлец (Трагус)

525. *T. racemosus* (L.) All. - К. кистевидный = I(ЗП,ЦП); II(КН); III(Ст,П,ТС,ЧО); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); Db,Ra(Т); [Pl.]

Genus 162. Oplismenus Beauv. - Остянка

526. *O. undulatifolius* (Ard.) Beauv. - О. волнистолистная = IV(СЗЗ); V(Касп - дельта Самура, l.n.): (Общ.др.средиз.); S(НК); [R.]

Genus 163. Panicum L. - Просо

527. *P. dichotomiflorum* Michx. - П. раздвоенноцветное = III(МА - Краснодар, Горячий ключ: **Зернов, 2006**); IV(СЗЗ): (Адвент. [Юго-Вост. Азия]); Rb(T); [R.]

528. *P. miliaceum* L. - П. посевное = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]

529. *P. capillare* L. - П. волосовидное = III(МА - Краснодар); IV(ТА - Сочи): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(T); [R.]

Genus 164. Echinochloa Beauv. - Куриное просо

530. *E. spiralis* Vasing. (*E. occidentalis* (Wiegand) Rydb.) - К.п. спиральное = I(Тем); II(Кизл); III(Куб,СК): (Адвент. [Япония]); Ab,Ra(T); [R.]

531. *E. crusgalli* (L.) Beauv. (*E. caudata* Roshev.) - К.п. обыкновенное = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Pl.]

532. *E. phylloporon* (Stapf) Kossenko (*E. oryzicola* (Vasing.) Vasing.) - К.п. волосистолистное = I(НД,ЗПМ,Тем,Т); II(Кизл); III(Куб,СК): (Адвент. [Китай]); Ab,Ra(T); [R.]

533. *E. oryzoides* (Ard.) Fritsch - К.п. рисовидное = I(НД,ЗПМ,Тем,Т); II(Кизл); III(СК): (Адвент. [Дальний Восток]); Ab,Ra(T); [R.]

Genus 165. Brachiaria (Trin.) Giseb. - Брахиария

534. *B. eruciformis* (Smith.) Griseb. - Б. гусеницевидная = III(Ст): (Вост.средиз.); Ra,Rb(T); [R.]

Genus 166. Eriochloa Kunth - Шерстяк

535. *E. succincta* (Trin.) Kunth - Ш. перехваченный = II(Кизл); V(Касп): (Туранск.); Rb(T); [R.]

536. *E. villosa* (Thunb.) Kunth - Ш. волосистый = I(Тем,Т); III(Куб,СК); V(Касп): (Адвент. [Китай]); Rb(T); [R.]

Genus 167. Paspalum L. - Гречка

537. *P. dilatatum* Poir. - Г. расширенная = III(УН); IV(СЗЗ): (Адвент. [Южн. Америка]); Ra,Rb(НК); [R.]

538. *P. thunbergii* Kunth ex Steud. - Г. Тунберга = III(УН); IV(СЗЗ): (Адвент. [Япония]); Ra,Rb(НК); [R.]

539. *P. setaceum* Michx. - Г. щетинистая = IV(ТА - Сочи): (Адвент. [Сев. Америка]); Ra,Rb(НК); [R.]

540. *P. paspalodes* (Michx.) Scribn. - Г. двуколосая = IV(СЗЗ): (Адвент. [Сев. Америка]); Ra,Rb(НК); [R.]

Genus 168. Digitaria Hall. - Росичка

541. *D. ciliaris* (Retz.) Koel. - Р. реснитчатая = III(Х); IV(ТА): (Плюрирег.); Db,Rb(T); [Sp.]

542. *D. sanguinalis* (L.) Scop. - Р. кровяная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Pl.]

543. *D. rectiniformis* (Henrard) Tzvel. - Р. гребенчатая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,П,Каб): (Субсредиз*.); Db(T); [R.]

544. *D. aegyptiaca* (Retz.) Willd. - Р. египетская = I(НД,ЗПМ,АЕ,М); III(СК,П,ТС,ЧО); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Субсредиз*.); Db,Rb(T); [Sp.]

545. *D. caucasica* Henr. - Р. кавказская = I(М - Терек); III(ТС, ЧО, УН, Ч); (Кавк.: Общекавк.); Rb(T); [R.]

546. *D. ischaemum* (Schreb.) Muehl (*D. linearis* (L.) Crep.) - Р. кровеостанавливающая = I(НД, ЗПМ, АЕ); II(ВП); III(Ст, Куб, СК, П, Каб, ЧО); IV(ТА); V(Касп): (Палеаркт.); Db, Rb(T); [Sp.]

Genus 169. *Setaria* Beauv. - Щетинник

547. *S. viridis* (L.) Beauv. - Щ. зелёный = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П); IV(СЗЗ); V(БН, Касп, ЦД): (Плюрирег.); Ra, Rb(T); [Pl.]

548. *S. verticillata* (L.) Beauv. (*S. ruscocoma* (Steud.) Hernard ex Nakai) - Щ. мутовчатый = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П); IV(СЗЗ); V(БН, Касп, ЦД): (Палеаркт.); Ra, Rb(T); [Pl.]

549. *S. italica* (L.) Beauv. (*S. germanica* (Mill.) Beauv.) - Щ. итальянский (Могар, Чумиза) = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Куб, Э, Тер); IV(СЗЗ); V(Даг): (Адвент. [Юго-Вост. Азия]); Ra, Rb(T); [Sp.]

550. *S. pumila* (Poir.) Schult. (*S. glauca* (L.) Beauv.) - Щ. низкий = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П); IV(СЗЗ); V(БН, Касп, ЦД): (Плюрирег.); Ra, Rb(T); [Pl.]

Genus 170. *Pennisetum* Rich. - Перистощетинник

551. **P. americanum* (L.) K. Schum. - П. американский (Африканское просо) = I(Тем); IV(ТА): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(T); [R.]

Genus 171. *Cenchrus* L. - Колючещетинник

552. **C. longispinus* (Hack.) Fern. (*C. pauciflorus* Benth.) - К. длинноколючковый = I(Тем - Краснодар): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(T); [R.]

Genus 172. *Erianthus* Michx. - Эриантус

553. *E. ravennae* (L.) Beauv. - Э. Равенны = I(М); II(ВП); III(П, Кисл); V(Касп): (Вост. средиз.); Aa(K); [R.]

Genus 173. *Imperata* Cyr. - Императа

554. *I. cylindrica* (L.) Raeusch. - И. цилиндрическая = I(М); II(ВП), IV(ТА); V(Касп): (Общедр. средиз.); Db(НК); [Sp.] <Po>

Genus 174. *Miscanthus* Anderss. - Мискантус

555. **M. sinensis* Anderss. - М. китайский = IV(ТА): (Адвент. [Япония, Китай]); Rb(K); [Sp.]

Genus 175. *Microstegium* Nees - Мелкочешуйник

556. **M. japonicum* (Miq.) Koidz. (*M. nudum* (Trin.) A. Gamus) - М. японский = IV(ТА); (Адвент. [Япония]); Rb(T); [Sp.]

557. **M. imberbe* (Nees) Tzvel. (*M. vimineum* (Trin.) A. Gamus) - М. лозный = IV(ТА): (Адвент. [Юго-Вост. Азия]); Rb(T); [Sp.]

Genus 176. *Sorghum* Moench - Сорго

558. *S. halepense* (L.) Pers. - С. гумай = I(АЕ, АК, М); II(Кизл); III(Куб, СК, П, Каб, ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр. средиз.); Rb(НК); [Pl.] <Pr>

559. *S. sudanense* (Piper) Stapf - С. суданское = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Куб, Э, Тер); IV(СЗЗ); V(Даг): (Средиземн.); Ra, Rb(T); [Sp.]

560. *S. technicum* (Koern.) Batt. et Trab. - С. техническое = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Куб, Э, Тер); IV(СЗЗ); V(Даг): (Средиземн.); Ra, Rb(T); [Sp.]

561. **S. saccharatum* (L.) Moench - С. сахарное = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Адвент. [Юго-Вост.Азия]); Ra,Rb(T); [Sp.]

562. **S. bicolor* (L.) Moench) - С. двуцветное = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Адвент. [Юго-Вост.Азия]); Ra,Rb(T); [Sp.]

563. *S. cernuum* (Ard.) Host - С. поникающее = **I(ЗП,ЦП); II(ВП):** (Средиземн.); Ra,Rb(T); [R.]

Genus 177. Chrysopogon Trin. - Золотобородник

564. *Ch. gryllus* (L.) Trin. - З. цикадовый = **III(Куб,Х):** (Зап.др.средиз.); ST(НК); [R.]

Genus 178. Botriochloa Kuntze - Бородач

565. *B. caucasica* (Trin.) C.E.Hubb. (*B. bladhii* (Retz.) S.T.Blake, *Andropogon causicum* Trin.) - Б. кавказский = **III(BC); IV(TA); V(Касп,ЦД):** (Ирано-Туран.); ST(НК); [R.]

566. *B. ischaemum* (L.) Keng (*A. ischaetum* L.) - Б. кровеостанавливающий = **I(AE,AK,KE,ЦП); III(Ст,ЛН,СК,П,Каб,ТС,ЧО); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Общедр.средиз.); ST(НК); [Soc.] <Pp>

Genus 179. Andropogon L. - Бородачевник

567. **A. virginicus* L. - Б. виргинский = **IV(TA):** (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(K); [Sp.]

Genus 180. Arthraxon Beauv. - Артраксон

568. **A. hispidus* (Thunb.) Makino - А. шиповатый = **IV(TA):** (Адвент. [Япония]); Rb(T); [Sp.]

Genus 181. Coix L. - Бусенник

569. **C. lacryma-jobi* L. - Б. обыкновенный = **I(Тем - Краснодар):** (Адвент. [Индия]); Ra,Rb(T); [R.]

Ordo 26. Cyperales - Осокоцветные

Familia 38. Cyperaceae Juss. - Осоковые

Genus 182. Scirpus L. - Камыш

570. *S. colchicus* Kimer. - К. колхидский = **III(ВЛ); IV(TA):** (Кавк.: Общекавк.); Aa,Ab(НК); [R.]

571. *S. sylvaticus* L. - К. лесной = **I(Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ТЗ,СК,П,Кисл,Л,УН,Ч,BC); IV(СЗЗ):** (Евро-Сиб.); S,Aa(НК); [Sp.]

Genus 183. Eriophorum L. - Пушица

572. *E. latifolium* Норре - П. широколистная = **III(ТЗ,OC):** (Голаркт.); Pс,Aa(НК); [R.]

573. *E. polystachion* L. (*E. angustifolium* Honck.) - П. многоколосковая = **III(ВЛ,ТЗ,Б,OC); IV(TA):** (Голаркт.); Pс,Aa(НК); [Sp.]

574. *E. vaginatum* L. - П. влагалищная = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,OC); V(ЦД,AC):** (Голаркт.); Pс,Aa(НК); [Sp.]

Genus 184. Trichophorum Pers. - Пухонос

575. *T. pumilum* (Vahl) Schinz et Thell. (*Baeotriton pumilum* (Vahl) A. et D.Love) - П. маленький = **III(Кисл,ЦЭ,Б,OC):** (Палеаркт.); Pс,Aa(НК); [R.]

Genus 185. *Bolboschoenus* (Aschers.) Palla - Клубнекамыш

576. *B. glaucus* (Lam.) S.G.Sm. - К. сизый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Касп,ЦД):** (Палеаркт.); Аа(К); [Sp.]

577. *B. maritimus* (L.) Palla (*B. compactus* (Hoffm.) Drob.) - К. морской = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Голаркт.); Аа,Ab(К); [Pl.]

578. *B. planiculmis* (F.Schmidt) Egor. - К. плоскостебельный = **III(СК - Георгиевск, Солдатская; II - Ессентуки); IV(ТА - Кривенковское):** (Плюрирег.); Аа,Ab(К); [R.]

579. *B. porovii* Egor. (*B. affinis* (Roth) Drob.) - К. Попова = **II([Кизл - п-ов Аграханский: Егорова, 1991]); V(Касп - Махачкала, Каспийск, Манаскент):** (Туранск.); Ab(К); [R.]

Genus 186. *Schoenoplectus* (Reichenb.) Palla - Шеноплектус

580. *Sch. litoralis* (Schrad.) Palla (*Scirpus litoralis* Schrad.) - Ш. приморский = **I(Тем,Т,МД,НК); II(ВП):** (Туранск.); Аа(НК); [R.]

581. *Sch. lacustris* (L.) Palla (*S. lacustris* L.) - Ш. озёрный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Панбор.); Ab(К); [Pl.]

582. *Sch. hippolyti* (V.Krecz.) V.Krecz. ex Grossh. (*S. hippolyti* V.Krecz.) - Ш. гиполитный = **III([ЛН - Невинномысск, II - Ессентуки]: Егорова, 1991):** (Палеаркт.); Ab(К); [Rs.]

583. *Sch. tabernaemontani* (C.C. Gmel.) Palla (*S. tabernaemontani* C.C. Gmel.) - Ш. Табернемонта = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД):** (Палеаркт.); Ab(К); [Sp.]

584. *Sch. triqueter* (L.) Palla (*S. triqueter* L.) - Ш. трёхгранный = **I(НД,АЕ,Тем,Т,МД,НК,ТБ); II(ВП); IV(ТА); V(Касп - Манаскент):** (Голаркт.); Аа(НК); [Sp.]

585. *Sch. micronatus* (L.) Palla. (*S. micronatus* L.) - Ш. остроконечный = **III([ЛН - Кочубеевское: Кононов, Танфильев, 1987]):** (Палеаркт.); Аа(НК); [R.] <Rg>

586. *Sch. supinus* (L.) Palla (*S. supinus* L.) - Ш. простёртый = **I(НД,Тем):** (Голаркт.); Аа(Т); [R.]

Genus 187. *Scirpoides Seguier* - Камышовник

587. *S. holoschoenus* (L.) Sojak (*Holoschoenus vulgaris* Link incl. *H. romanus* (L.) Fritsch) - К. обыкновенный = **I(ЗП); II(КН - Киссык,Кизл); III(Ст,Куб,СК,П); IV(СЗЗ); V(Касп - Сарыкум):** (Общедр.средиз.); Аа(НК); [Sp.]

Genus 188. *Isolepis* R.Br. - Изолепис

588. *I. setacea* (L.) R.Br. (*Schoenoplectus setaceus* (L.) Palla; *Scirpus setaceus* L.) - И. щетинковидный = **I(ЗПМ); III(Э,Б,ОС,Ч); V(Касп):** (Палеаркт.); Аа(Т); [Sp.]

Genus 189. *Blysmus* Panz. ex Schult. - Блисмус

589. *B. compressus* (L.) Panz. ex Link (*Schoenus compressus* L.) - Б. сжатый = **III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); V(Касп,ЦД,АС):** (Палеаркт.); Рс,Аа(НК); [Pl.]

Genus 190. Eleocharis R.Br. - Болотница

590. *E. quinqueflora* (F.X.Hartm.) O.Schwarz (*E. pauciflora* (Lightf.) Link) - Б. пятицветковая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Рс,Аа(НК); [R.]
591. *E. parvula* (Roem. et Schult.) Bluff, Nees et Schauer - Б. маленькая = I(АЕ,Тем,Т); II(Кизл. Егорова, 1991): (Голаркт.); Аа(К); [R.]
592. *E. austriaca* Hayek (*E. leptostylopodiata* Zinserl.) - Б. австрийская = III(Ст,Куб,СК,Э,Б,ОС); IV(ТА); V(Дар): (Палеаркт.); Аа,Аб(К); [Sp.]
593. *E. palustris* (L.) Roem. et Schult. (*E. eupalustris* Linld. fil., *E. crassa* Fisch. et C.A.Mey. ex Zinserl.; *E. intersita* Zinserl.) - Б. болотная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плюрирег.); Аа,Аб(К); [Sp.]
594. *E. mitracarpa* Steud. (*E. argyrolepidoides* Zinserl., *E. equisetiformis* (Meinsh.)B.Fedtsch.) - Б. колпачковая = II(Кизл - Кизляр: Гроссгейм, 1940); IV(Н - Новороссийск,ТА); V(Касп - Дербент): (Вост.средиз.); Аа,Аб(К); [R.]
595. *E. uniglumis* (Link) Schult. (*E. multiseta* Zinserl.) - Б. одночешуйчатая = I(ЗП,МД,НК,ТБ); II(ВП); III(Ст); IV(СЗЗ): (Голаркт.); Аа,Дс(НК); [R.]
596. *E. ovata* (Roth.) R.Br. - Б. яйцевидная = III(ВЛ,ТЗ): (Голаркт.); Рс,Аа(НК); [R.]
597. *E. acicularis* (L.) Roem. et Schult. - Б. игольчатая = I(НД,ЗПМ,МД); II(КН: Танфильев, Кононов, 1987); III([Кисл - Кума,Л - Карасу]: Егорова, 2006, ОС): (Голаркт.); Аа,Аб(К); [Sp.]

Genus 191. Cyperus L. - Сыть

598. *C. esculentus* L. - С. съедобная = IV(ТА): (Плюрирег.); Аа,Аб(Т); [R.]
599. *C. longus* L. - С. длинная = II(КН - Киссык,Кизл); V(Касп): (Общедр.средиз.); Аа(НК); [R.]
600. *C. badius* Desf. - С. тёмнокаштановая = IV(Н - с. Пиляково): (Средиземн.); Аа(Т); [R.]
601. *C. rotundus* L. - С. круглая = V(Касп): (Субсредиз.*); Аа(НК); [R.]
602. *C. glomeratus* L. - С. скученная = I(НД,Тем,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,ЧО): (Палеаркт.); Аа(Т); [R.]
603. *C. glaber* L. - С. гладкая = I(Т,Тем); II(Кизл); III(Куб,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Вост.средиз.); Аа(Т); [R.]
604. *C. capitatus* Vand. - С. головчатая = IV(ТА): (Средиземн.); Аа(К); [R.]
605. *C. eragrostis* Lam. - С. полевичковая = IV(ТА - Мацеста-Псоу): (Адвент. [Южн. Америка]); Аа(К); [R.]
606. *C. difformis* L. - С. разнородная = I(Тем): (Голаркт.); Аа,Ра(Т); [R.]
607. *C. fuscus* L. - С. чёрно-бурая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Аа(Т); [Sp.]

Genus 192. Dichostylis Beauv. ex Lestib. - Дихостилис

608. *D. micheliana* (L.) Nees (*Cyperus michelianu* (L.) Link) - Д. Микели = I(НД,Тем); II(Кизл - Кизляр: Егорова, 1991): (Палеаркт.); Аа(Т); [R.]

Genus 193. Juncellus (Griseb.) C.V.Clarke - Ситничек

609. *J. rannonicus* (Jacq.) Clarke (*Acorellus rannonicus* (Jacq.) Palla) - С. венгерский = I(Тем,Т); II(ВП); V(ЦД): (Субтуран*.); Аа(Т); [R.]

610. *J. serotinus* (Rottb.) Clarke (*Cyperus serotinus* Rottb.) - С. поздний = I(НД,АЕ - р. Кагальник,Тем); II(Кизл); V(Касп): (Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]

Genus 194. *Pycneus* Beauv. - Ситовник

611. *P. sanguinolentus* (Vahl) Nees - С. кровавопятнистый = IV(ТА): (Вост.средиз.); Аа(Т); [R.]

612. *P. flavidus* (Retz.) Т.Кoyama - С. желтеющий = II(Кизл - Кизляр); III(П - Пятигорск); IV(Н - Геленджик); V(Касп - Самур): (Плюрирег.); Аа(Т); [R.]

613. *P. flavescens* (L.) Beauv. ex Reichenb. - С. желтоватый = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,ЧО); IV(СЗЗ): (Голаркт.); Аа(Т); [Sp.]

Genus 195. *Cladium* P.Br. - Меч-трава

614. ★*C. mariscus* (L.) Pohl - М.-т. обыкновенная = II(Кизл); III(Ст,МА,П,Каб): (Зап.др.средиз.); Ab(К); [Rs.]

615. *C. martii* (Roem. et Schult.) K.Richt. - М.-т. Мартиуса = IV(Н - Новороссийск,ТА - Мзымта): (Общедр.средиз.); Аа(НК); [R.]

Genus 196. *Schoenus* L. - Схенус

616. *Sch. nigricans* L. - С. черноватый = I(Тем,Т); II(Кизл); III(П); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Субсредиз*.); Аа(НК); [R.]

Genus 197. *Rhynchospora* Vahl - Очеретник

617. *Rh. alba* (L.) Vahl - О. белый = III(П - Железноводск, ОС - басс. р. Камбилеевки): (Панбор.); Аа(НК); [R.]

Genus 198. *Kobresia* Willd. - Кобрезия

618. *K. schoenoides* (С.А.Мey.) Steud. (*Elyna schoenoides* С.А.Мey.) - К. камышевидная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pс(НК); [Pl.]

619. *K. macrolepis* Meinsh. (*K. capillifolia* (Decne) Clarke; *E. capillifolia* Decne) - К. крупночешуйчатая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pс(НК); [Pl.]

620. *K. persica* Kuk. et Bornm. (*K. humilis* (С.А.Мey. ex Trautv.) Serg.) - К. персидская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(Дар): (Субтуран*.); Pс(НК); [Sp.]

Genus 199. *Carex* L. - Осока

621. *C. pontica* Albov - О. понтийская = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pс(НК); [R.]

622. *C. tristis* Bieb. (*C. meinshauseniana* V.Krecz.) - О. печальная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pб,Pс(НК); [Pl.]

623. *C. hirta* L. - О. волосистая = I(Тем,Т,КЕ); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,П,Кисл,Тер); IV(СЗЗ); V(Касп): (Европ.); Аа(К); [Sp.]

624. *C. lasiocarpa* Ehrh. - О. волосистоплодная = III(Ст,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б); IV(ЦД - Хунзах): (Палеаркт.); Ab(К); [R.] <Rg - в окр. Ставрополя>

625. *C. rostrata* Stokes (*C. inflata* auct.) - О. носатая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pб,Аа(НК); [Pl.]

626. *C. vesicaria* L. (*C. inflata* Huds.) - О. пузырчатая = I(ЗП); II(КН); III(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); V(АС): (Палеаркт.); Ab(К); [Sp.]

627. *C. dichroa* Freyn (*C. pamirica* (O. Fedtsch.) O. et B. Fedtsch.) - О. двуцветная = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС, ВС); V(АС): (Палеаркт.); Pс,Аа(НК); [R.]

628. *C. acutiformis* Ehrh. - О. островатая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД):** (Палеаркт.); Ab(К); [Pl.]
629. *C. riparia* Curt. - О. береговая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Палеаркт.); Ab(К); [Pl.]
630. *C. melanostachya* Vieb. ex Willd. - О. черноколосая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД):** (Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.]
631. *C. songorica* Kar. et Kir. - О. джунгарская = **III(ОС,ВС); V(ЦД):** (Ирано-Туран.); Pa,Aa(НК); [R.]
632. *C. pseudocyperus* L. - О. ложносыть = **I(Т); II(ВП); III(Ст,Куб); IV(ТА); V(Касп):** (Голаркт.); Ab(К); [R.]
633. *C. hordeistichos* Vill. - О. ячменорядная = **[I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ); IV(СЗЗ); V(Даг):** Егорова, 1991]: (Субсредиз*.); Ab(К); [Sp.]
634. *C. secalina* Willd. ex Wachlenb. - О. ржаная = **III(Ст,П):** (Евро-Сиб.); Aa(НК); [R.] <Rg>
635. *C. latifrons* V.Krecz. - О. широколистная = **IV(ТА):** (Субкавказ*.); Pb,Pc(НК); [R.]
636. *C. sylvatica* Huds. - О. лесная = **I(КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл,ВЛ,ЦЭ,УН,ОС,ВС); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД):** (Европ.); S(НК); [Pl.]
637. *C. hyraneura* V.Krecz. - О. неясножилковая = **IV(ТА: Солодько, 2002); V(ЦД - Ньюджи: Литвинская, Муртазалиев, 2009):** (Кавк.: Общекавказ.); S(НК); [R.]
638. *C. pendula* Huds. - О. пониклая = **III(Ст,Куб,Х,ВЛ,П); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Субсредиз*.); S(НК); [Sp.]
639. *C. cuspidata* Host - О. заострённая = **III(Ст,Куб,ВЛ,Л, УН,Ч,Кисл,Л); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС):** (Зап.др.средиз.); S(НК); [Sp.]
640. *C. depauperata* Curt. ex With. - О. обеднённая = **III(Ст); IV(Н); V(Касп):** (Европ.); S(НК); [R.] <Rg>
641. *C. mingrelica* Kuk. - О. мингрельская = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА):** (Кавк.: Эукавказ.); Pb(НК); [R.] <Esub>
642. *C. michelii* Host. - О. Микели = **II(Кизл - Хасавьюрт); III(Ст,Куб,ТЗ,П,Кисл,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД):** (Европ.); Pa(НК); [Pl.]
643. *C. brevicollis* DC. - О. коротконосиковая = **II(Кизл: Егорова, 1991); III(ВЛ,МА - Майкоп); IV(ТА); V(Касп - Махачкала):** (Европ.); S(НК); [R.] <Pm>
644. *C. vaginata* Tausch. - О. влагалищная = **III([Ст - Ставрополь: Егорова,1991],ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС):** (Голаркт.); Ab(НК); [R.]
645. *C. panicea* L. - О. просьяная = **III(Ст [Ставрополь: Егорова, 1991],ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); V(ЦД,АС):** (Палеаркт.); Aa(НК); [R.]
646. *C. transilvanica* Schur (*C. depressa* Link; *C. euxina* (Woronow et Marc.) V.Krecz.) - О. трансильванская = **III(Ст,Куб,Л,УН,Ч,ВС); IV(ТА); V(ЦД):** (Субсредиз*.); S,Pa(НК); [R.]
647. *C. huetiana* Boiss. - О. Юэ = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС):** (Европ.); Pc(НК); [Pl.]

648. *C. caryophyllea* Latourr. (*C. verna* Chaix) - О. гвоздичная = **III**(Ст,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Палеаркт.); Ра,СТ(НК); [Pl.]
649. *C. diluta* Bieb. - О. светлая = **I**(АЕ,Т,Прик,ТБ,НК); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СК,П,ЧО); **IV**(Н); **V**(Дар): (Туранск.); Аб(К); [Pl.]
650. *C. distans* L. - О. расставленная = **I**(АК - Ейск); **IV**(Н); **V**(Касп - Каякент, Хосрех): (Европ.); Аа(НК); [Sp.]
651. *C. extensa* Good - О. растянутая = **I**([Т: Егорова, 1991], [Тем: Гроссгейм, 1940]); **IV**(Н); **V**(Касп): (Европ.); Аа,Db(НК); [R.]
652. *C. flava* L. - О. жёлтая = **III**(ТЗ,ЦЭ - Эльбрус): (Европ.); Рс,Аа(НК); [R.]
653. *C. serotina* Merat. - О. поздняя = **V**(ЦД - с. Гергебиль): (Панбор.); Рb(НК); [Rs.] <Rg>
654. *C. halleriana* Asso - О. Галлира = **III**(Ст,КР,Х,ВЛ); **IV**(Н); **V**(ЦД): (Средиземн.); Ра(НК); [R.]
655. *C. pediformis* С.А.Меу. - О. стоповидная = **V**(Касп - Леваши): (Палеаркт.); СТ(НК); [R.]
656. *C. rhizina* Blett ex Lindblom - О. корневищная = **I**(АК); **III**(Л); **V**(Касп): (Палеаркт.); S(НК); [R.]
657. *C. humilis* Leyss. (*C. buschiorum* V. Krecz.) - О. низкая = **III**(Ст,ТЗ,СК,П,Кисл,Л,УН,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Евро-Сиб.); Ра(НК); [Sp.] <Рр>
658. *C. digitata* L. - О. пальчатая = **III**(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Европ.); S(НК); [Pl.]
659. *C. pallescens* L. - О. бледноватая = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Голаркт.); Ра(НК); [Pl.]
660. *C. grioletii* Roem. - О. Гриолети = **IV**(ТА): (Средиземн.); S(НК); [R.]
661. *C. tomentosa* L. - О. шерстистая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ТЗ,П,Кисл,СКТ); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Евро-Сиб.); Ра,СТ(НК); [Pl.]
662. *C. ericetorum* Poll. - О. верещатниковая = **III**(Ст): (Евро-Сиб.); Ра(НК); [Rs.] <Rg>
663. *C. alba* Scop. - О. белая = **III**(Кисл,ТЗ,ЦЭ,Б); **V**(Дар): (Палеаркт.); Да(НК); [Pl.]
664. *C. bordzilowskii* V.Krecz. (*C. schkuhrii* Willd.; *C. liparocarpos* Gaudin) - О. Бордзиловского = **I**(Тем,Т); **II**(ВП); **III**(Ст,СК,П,ЧО); **IV**(Н); **V**(Дар): (Кавк.: Общекавк.); СТ(НК); [Sp.]
665. *C. supina* Willd. ex Wahlenb. - О. приземистая = **I**(АК,КЕ,ЦП); **II**(КН); **III**(Ст,Кисл,УН,ЧО,ТС); **V**(Касп): (Евро-Сиб.); СТ(НК); [Sp.]
666. *C. capillaris* L. - О. волосовидная = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Голаркт.); Рb,Рс(НК); [Sp.]
667. *C. irrigua* (Wahlenb.) Smith ex Horpe (*C. paupercula* Michx.; *C. magellanica* Lam. subsp. *irrigua* (Wahlenb.) Hiit.) - О. заливная = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС): (Голаркт.); Рс,Аа(НК); [Sp.]
668. *C. limosa* L. - О. топяная = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС); **IV**(ТА): (Голаркт.); Рс,Аа(НК); [Sp.]

669. *C. hartmanii* Cajand. - О. Гартмана = **III**(ТЗ,Б,ОС); **IV**(ЦД): (Палеаркт.); Pa(НК); [R.]
670. *C. buxbaumii* Wahlenb. - О. Буксбаума = **III**(ТЗ): (Европ.); Pb,Аа(НК); [R.]
671. *C. caucasica* Stev. - О. кавказская = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавказ*.); Pb(НК); [Pl.]
672. *C. medwedewii* Leskov (*C. aequivoca* V. Krecz.) - О. Медведева = **III**(ВЛ,ТЗ,Б,ОС); **IV**(ТА): (Субкавказ*.); Pb(НК); [Sp.]
673. *C. melananthiformis* Litv. - О. ложночерноцветковая = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б); **V**(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.]
674. *C. oligantha* Steud. - О. немногочетковая = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД): (Кавк.: Общекавказ.); Рс(НК); [Pl.]
675. *C. acuta* L. (*C. gracilis* Gurt., *C. dichandra* V. Krecz., *C. fuscovaginata* Kuk.) - О. острая = **I**(НД,ЗПИМ,АЕ); **III**(Ст,Куб,КР): (Евро-Сиб.); Ab(К); [R.]
676. *C. transcaucasica* Egor. - О. закавказская = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавказ.); Pb(НК); [R.] l.c. p. Муху (Тебердинский заповедник)
677. *C. omskiana* Meinsh. (*C. elata* All.) - О. омская = **I**(Тем); **II**(Кизл); **III**(МА – Майкоп: Егорова, 1991, П): (Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]
678. *C. buekii* Wimm. - О. Буека = **I**(НД); **III**(МА,ТЗ - верх. Урупа,ОС): (Европ.); Pa(НК); [R.]
679. *C. cespitosa* L.- О. дернистая = **III**(Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Палеаркт.); Pb,Аа(НК); [Sp.]
680. *C. kotschyana* Boiss. et Hohen. (*C. orbicularis* Boiss. et Hohen.) - О. Кочи = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавказ*.); Рс(НК); [R.]
681. *C. paniculata* L. - О. метельчатая = **III**(ТЗ - р. Кизгич, ЦЭ - р.Хурзук,П,Кисл): (Европ.); Ab(К); [R.]
682. *C. szovitsii* V.Krecz. - О. Шовица = **III**(ВЛ,ОС); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавказ.); Рс(НК); [R.]
683. *C. arropinquata* Schum. - О. сближенная = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС); **V**(ЦД): (Палеаркт.); Pb,Аа(НК); [R.]
684. *C. diandra* Schrank. - О. двухтычинковая = **III**(ЦЭ,Б,ОС); **V**(ЦД,АС): (Голаркт.); Pb,Аа(НК); [R.]
685. *C. vulpina* L. (*C. compacta* Lam.) - О. лисья = **I**(НД,АК,Тем - Краснодар,ТБ,СК,П); **IV**([СЗЗ: Зернов, 2006]): (Евро-Сиб.); Ab(К); [Sp.]
686. *C. otrubae* Podp. (*C. compacta auct. non Lam.*) - О. Отрубы = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СК,П,ЧО); **IV**(Н); **V**(Касп): (Субсредиз*.); Pa(НК); [Pl.]
687. *C. divulsa* Stokes - О. прерванная = **I**(Т,Тем); **III**(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ,ЧО,УН,ОС); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Голаркт.); S(НК); [Sp.]
688. *C. polyphylla* Kar. et Kir. - О. многолистная = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ,ВЛ,ТЗ); **IV**(СЗЗ); **V**([БН,Касп,ЦД]:Егорова, 1991): (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]

689. *C. muricata* L. (*C. cuprina* (Sandor ex Heuff.) Th.Nendtv. ex A.Kerner) - О. колючковатая = **I**([Прик - с. Спицевка: Егорова, 1991]); **III**(Ст - Ставрополь, МА - Майкоп, Кисл); **IV**(ТА); **V**(ЦД, АС): (Европ.); Ра(НК); [R.]
690. *C. contigua* Норре - О. соседняя = **I**(ЗПМ, Тем, Т); **II**(Кизл); **III**(Ст, Куб, ВЛ, ТЗ, СК, П, Кисл, Каб, Л, УН, Ч); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); S, Ра(НК); [Sp.]
691. *C. disticha* Huds. - О. двурядная = **III**([Ст - Ставрополь: Егорова, 1991]); **V**(АС - с. Хунзах и Кобос): (Палеаркт.); Аа(НК); [R.] <Rg>
692. *C. colchica* J.Gay - О. колхидская = **I**(Тем, Т, Ке, Прик, ТБ, НК); **II**(Кизл); **III**(Ст, Куб); **IV**(Н - Анапа, ТА - Дагомыс); **V**(Касп - Махачкала): (Понт.-Южносиб.); Db(НК); [Sp.]
693. *C. praesox* Schreb. - О. ранняя = **I**(ЗП, Прик, ТБ, НК); **II**(ВП); **III**(Ст, СК, П); **IV**(ТА - Сочи): (Палеаркт.); ST, Db(НК); [Pl.]
694. *C. divisa* Huds. - О. раздельная = **I**(МД, АИ, НК, М); **II**(ВП); **III**(ТЗ - М. Зеленчук, ЧО - Грозный); **IV**(Н); **V**(Касп): (Палеаркт.); Dc(НК); [Sp.]
695. *C. chordorrhiza* Ehrh. - О. тонкокорневая = **III**(ВЛ, ТЗ); **V**(АС): (Голаркт.); Pс(НК); [R.]
696. *C. stenophylla* Wahlenb. (*C. uralensis* Clarke; *C. dimorphotheca* Stschegl.; *C. stenophylloides* (V.Crecz.) Egor.) - О. узколистная = **I**(НД, ЗПМ, АЕ, ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст, СК, П): (Субтуран*.); ST, SD(НК); [R.]
697. *C. physodes* Vieb. - О. вздутая = **I**(НК); **II**([КН - р. Кума: Егорова, 1991]): (Туранск.); Db(НК); [R.]
698. *C. acrifolia* V. Crecz. (*C. enervis* С.А.Мей.) - О. остролистная = **III**(ТЗ, ЦЭ, Б, ОС); **V**(ЦД, АС): (Палеаркт.); Pb, Pс(НК); [Sp.]
699. *C. remota* L. - О. раздвинутая = **III**([Ст - Ставрополь: Егорова, 1991], П, Кисл, Куб, ЗК, ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(АС): (Палеаркт.); S, Аа(НК); [Sp.]
700. *C. leporina* L. - О. заячья = **III**(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД, АС): (Палеаркт.); S, Ра, Аа(НК); [Pl.]
701. *C. echinata* Murr. - О. ежовая = **III**(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС); **V**(Касп - Махачкала): (Плюрирег.); S, Ра(НК); [Sp.]
702. *C. elongata* L. - О. удлинённая = **III**(ВЛ, ТЗ, Б, УН, ОС): (Палеаркт.); Pb, Аа(НК); [R.]
703. *C. canescens* L. - О. сероватая = **III**(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); **IV**(ТА); **V**(АС): (Плюрирег.); Pb, Pс, Аа(НК); [Pl.]
704. *C. brunnescens* (Pers.) Poir. - О. буроватая = **III**(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); **V**(ЦД, АС): (Голаркт.); Pb, Pс(НК); [Pl.]
705. *C. tenuiflora* Wahlenb. - О. тонкоцветная = **III**(Кисл, ТЗ, Б, ОС); **V**(ЦД - с. Кули): (Голаркт.); Pс, Аа(НК); [R.]
706. *C. heleonastes* Ehrh. - О. болотолюбивая = **III**(ТЗ, ЦЭ, ОС): (Голаркт.); Pс, Аа(НК); [R.]
707. *C. phyllostachys* С.А.Мей. - О. листоколосая = **V**(Касп): (Субкавказ*.); S(НК); [Sp.]
708. *C. microglochis* Wahlenb. - О. мелкоостренниковая = **III**(ЦЭ, Б); **V**(ЦД, АС): (Голаркт.); Pс, Аа(НК); [R.]

709. *C. obtusata* Liljebl. - О. притупленная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); V(ЦД): (Голаркт.); Pb,Рс(НК); [R.]
710. *C. rupestris* All. - О. скальная = III(ТЗ,ЦЭ,ВС): (Голаркт.); Do(НК); [Rs.]
711. *C. micropodioides* V.Krecz. - О. ложнокоротконожковая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Рс(НК); [Sp.]
712. *C. capitellata* Boiss. et Bal. - О. мелкоголовчатая = III(ВЛ - Белая,ОС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Рс(НК); [R.]
713. *C. capitata* L. - О. головчатая = III(ЦЭ,Б,ОС): (Голаркт.); Рс,Аа(НК); [R.]
714. *C. oreophila* С.А.Меу. - О. горнолюбивая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Рс,Do(НК); [R.]

Ordo 27. Acorales - Аироцветные

Familia 39. Acoraceae С.А.Агардх - Аиоровые

Genus 200. Acorus L. - Аир

715. *A. calamus* L. - А. обыкновенный = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем); II(Кизл - Муртазалиев, 2009): (Голаркт.); Ab(К); [R.] <Pm>

Ordo 28. Arales - Ароидноцветные

Familia 40. Araceae Juss. - Аронниковые

Genus 201. Arum L. - Аронник

716. *A. orientale* Vieb. (*A. maculatum* L.) - А. восточный = I(Т,Прик); III(Ст,Куб,П,Каб,ЧО); IV(СЗЗ): (Субкавк*.); S(К); [Sp.] <Pm>
717. *A. consobrinum* Schott - А. консобрийский = V(Касп - южн. часть: Муртазалиев, 2009): (Субкавк*.); S(К); [R.]
718. *A. albispatum* Stev. ex Ledeb. (*A. italicum* Miller) - А. белокрылый = IV(СЗЗ): (Субкавк*.); S(К); [Pl.]
719. *A. nordmannii* Schott (*A. elongatum* Stev.) - А. Нордмана = I(Т,Тем); IV(Н); V(Касп: Галушко, 1978,АС: Гроссгейм, 1940): (Зап.др.средиз.); S(К); [Sp.]

Familia 41. Lemnaceae S.F.Gray - Рясковые

Genus 202. Spirodela Schleid. - Многокоренник

720. *S. polyrhiza* (L.) Schleid. - М. многокорневой = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т); III(МА); IV(Н): (Панбор.); Ас(К); [R.]

Genus 203. Lemna L. - Ряска

721. *L. minor* L. - Р. маленькая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,ЧК,Каб,ЧО); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Плюрирег.); Ас(К); [Pl.] <Pm>
722. *L. turionifera* Landolt - Р. туриононосная = III([Ст - Ставрополь: Цвелёв, 1990],Прик,УН); V(БН): (Панбор.); Ас(К); [Rs.] <Rg>
723. *L. trisulca* L. - Р. тройчатая = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,МД,НК); II(Кизл); III(Ст,Куб,[ЧО: Гроссгейм, 1940]); IV(Н): (Голаркт.); Ас(Р); [R.]

Genus 204. *Telmatophace* Schleid. - Тельматофака

724. *T. gibba* (L.) Schleid. (*Lemna gibba* L.) - Т. горбатая = I(Тем,Т); II(Кизл); III(Ст,Куб); IV(Н): (Голаркт.); Ас(К); [R.] <Rg>

Genus 205. *Wolffia* Horkel. ex Schleid. - Вольфия

725. *W. arrhiza* (L.) Horkel ex Wimm. - В. бескорневая = I(Тем,Т): (Адвент. [троп. Африка]); Ас(К); [R.]

Ordo 29. Commelinales - Коммелиноцветные

Familia 42. Commelinaceae R.Br. - Коммелиновые

Genus 206. *Commelina* L. - Коммелина

726. *C. communis* L. - К. синеглазка = I(НД); III(Ст,Куб,Х,ВЛ,Каб,ЧО,Кисл); IV(СЗЗ): (Адвент. [Дальний Восток]); Ra,Rb(Т); [R.]

Ordo 30. Pontederiales - Понтедериецветные

Familia 43. Pontederiaceae Kunth - Понтедериевые

Genus 207. *Monochoria* C.Presl - Монохория

727. *M. korsakowii* Regel et Maack - М. Корсакова = I(Тем -Кубань); III(МА): (Адвент. [Китай]); Ab,Ra(К); [R.] <Ро>

Ordo 31. Juncales - Ситникоцветные

Familia 44. Juncaceae Juss. - Ситниковые

Genus 208. *Juncus* L. - Ситник

728. *J. tenageia* Ehrh. ex L. fil. - С. мелководный = III(Кисл): (Европ.); Db,Аа(Т); [R.]

729. *J. sphaerocarpus* Nees - С. шароплодный = I(НД,АЕ); III(Кисл); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); Аа,Db(Т); [R.]

730. *J. bufonius* L. (*J. ranarius* Song. et Petr. ex Billot) - С. жабий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Голаркт.); Аа(Т); [Pl.]

731. *J. compressus* Jacq. - С. сплюснутый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,ЧО); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Сиб.); Аа(НК); [Pl.]

732. *J. gerardii* Loisel. - С. Жерара = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]

733. *J. fominii* Zoz. - С. Фомина = III(Ст): (Европ.); Аа(НК); [R.]

734. *J. soranthus* Schrenk - С. кучкоцветный = I(Т,МД,Прик): (Субтун-ран*.); Аа,Дс(НК); [R.]

735. *J. tenuis* Willd. - С. тонкий = III(Куб,Х,ВЛ,ТЗ,Л,УН,Ч,ОС); IV(СЗЗ): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(НК); [Sp.]

736. *J. inflexus* L. - С. отклоняющийся = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,ВЛ,ТЗ,СКТ); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]

737. *J. effusus* L. - С. развесистый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,П,Кисл,СКТ); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); Аа(НК); [Pl.]

738. *J. conglomeratus* L. (*J. leersii* Marss.) - С. скученный = III(Куб,КР,Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Европ.); S,Аа(НК); [Sp.]

739. *J. filiformis* L. - С. нитевидный = III(ВЛ,ТЗ,Б,ОС): (Голаркт.); Рс,Аа(НК); [R.]
740. *J. alpino-articulatus* Chaix (*J. alpinus* Vill.) - С. альпийский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Рс,Аа(НК); [Pl.]
741. *J. articulatus* L. (*J. lamprocarpus* Ehrh. ex Hoffm.) - С. членистый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,П,Кисл,СКТ); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]
742. *J. alpigenus* C.Koch - С. высокогорный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Вост.средиз.); Рс,Аа(НК); [R.]
743. *J. atratus* Krock. - С. темноцветный = I(АК,Тем,Т); III(Ст,ВЛ,ТЗ): (Палеаркт.); Аа(НК); [R.]
744. *J. fontanesii* J.Gay - С. Фонтанеза = V(Касп - Дербент): (Зап.др.средиз.); Аа(НК); [R.]
745. *J. acutus* L. - С. острый = I(Тем,Т); II(Кизл); IV(Н); V(Касп): (Общ.др.средиз.); Аа(НК); [R.]
746. *J. littoralis* C.A.Mey. - С. береговой = V(Касп): (Субкавказ*.); Db(НК); [R.]
747. *J. maritimus* Lam. - С. морской = I(Тем,Т); II(Кизл); IV(СЗЗ); V(Касп): (Средиземн.); Db(НК); [Sp.]
748. *J. triglumis* L. (*J. schischkinii* Kryl. et Sumn.) - С. трёхчешуйный = III(ВЛ,Т,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Рс,Аа(НК); [Pl.]
749. *J. elbrusicus* Galushko - С. эльбрусский = III(ЦЭ - Бечасын, Сурх): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Рс,Аа(НК); [R.] <Es> l.c. верх. р. Малка

Genus 209. *Luzula* L. - Ожика

750. *L. pilosa* (L.) Willd. - О. волосистая = III(Ст,Куб,ЗК,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Панбор.); S(НК); [Pl.]
751. *L. forsteri* (Smith) DC. (*L. caspica* Rupr. ex Bordz.) - О. Форстера = III(Куб,КР,Х,ВЛ); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Средиземн.); S(НК); [Sp.]
752. *L. sylvatica* (Huds.) Gaud. - О. лесная = III(ВЛ): (Европ.); S(НК); [R.]
753. *L. spicata* (L.) DC. - О. колосистая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Рс(НК); [Pl.]
754. *L. stenophylla* Steud. (*L. pseudosudetica* V.Crecz.; *L. sudetica* (Willd.) Schult.) - О. узколистная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); Рс(НК); [Pl.]
755. *L. abchasica* V.Novikov - О. абхазская = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Рс(НК); [R.] <Esub>
756. *L. pallescens* Sw. (*L. pallidula* J.Kirschner) - О. бледная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС): (Палеаркт.); Рс,Do(НК); [Sp.]
757. *L. taurica* (V.Krecz.) V.Novikov (*L. campestris* (L.) DC.; *L. subpilosa* Gilib.) - О. крымская = I(АЕ - окр. г. Городовиковска, пос. Южный: **КК Респ. Калмыкия, 2014**); III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Европ.); S,Pa(НК); [Sp.]
758. *L. multiflora* (Ehrh.) Lej. - О. многоцветковая = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Sp.]

Ordo 32. Melanthiales - Мелантиецветные

Familia 45. Melanthiaceae Batsch - Мелантиевые

Genus 210. Verathrum L. - Чемерица

759. *V. album* L. (*V. lobelianum* Bernh.) - Ч. белая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb,Рс(К); [Pl.] <Pm>

Genus 211. Narthecium Huds. - Нартециум

760. *N. balansae* Briq. (*N. caucasicum* Misch.) - Н. Балансы = III(ТЗ - ущ. р. Сев.Клухор: ОНИПЧЕНКО, 1995): (Субкавказ*.); Рс,Аа(К); [Rs.]

Ordo 33. Colchicales - Безвременникоцветные

Familia 46. Colchicaceae DC. - Безвременниковые

Genus 212. Merendera Ram. - Мерендера

761. *M. trigyna* (Stev. ex Adams) Stapf - М. трёхстолбиковая = I(М); II(Кизл); III(СК,ЛН,Э,ТС); V(Дар): (Ирано-Туран.); Pa,ST(К:ephd); [Sp.] <Po>

762. *M. eichleri* (Regel) Boiss. - М. Эйхлера = I(Прик,ТБ,НК,М); III(СКТ); V(БН,Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавказ.); Pa,ST(К:ephd); [R.] <Po>

763. *M. ghalgana* Otsch. - М. ингушская = III(ЦЭ,ВК); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Рс(К:ephd); [Sp.] <Ee> l.c. верх. р. Асса

Genus 213. Colchicum L. - Безвременник

764. ★*C. speciosum* Stev. (*C. woronowii* Bokeria) - Б. великолепный = III(ВЛ,ТЗ,Б,ОС); IV(ТА); V(АС): (Субкавказ*.); Pb(К:ephd); [Sp.]

765. ★*C. umbrosum* Stev. - Б. теневой = III(Ст,Куб,КР,СК,П,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп - Махачкала): (Субкавказ*.); S,Pa(К:ephd); [R.] <Pt;Pm;Po;Pmel>

766. ★*C. laetum* Stev. - Б. яркий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,ТС); V(Касп): (Понтич.); Pa,ST(К:ephd); [Sp.] <Pmel;Po> l.c. Терек

Ordo 34. Asphodelales - Асфodelоцветные

Familia 47. Asphodelaceae Juss. - Асфodelовые

Genus 214. Eremurus Vieb. - Череш

767. ★*E. spectabilis* Vieb. - Ч. представительный = I(Прик,ТБ); III(Ст,СК,П,Л,Ч); V(Касп): (Субкавказ*.); ST(К); [R.] l.c. рр. Кума и Сабля

768. *E. tauricus* Stev. - Ч. крымский = IV(Н - Новороссийск,ТА - г. Б.Псеушхо): (Кр.-Новоросс.); ST(К); [R.]

Genus 215. Asphodeline Reichenb. - Асфodelина

769. *A. lutea* (L.) Reichenb. - А. жёлтая = III(КР,ЧК,Кисл); IV(СЗЗ); (Вост.средиз.); ST(К); [R.] <Rx>

770. ★*A. tenuior* (Vieb.) Ledeb. - А. тонкая = III(ЧК,П,Кисл): (Кавк.: Предкавказ.); Pa,ST,Da(К); [Rs.] l.c. Бештау <Ee>

771. ★*A. taurica* (Pall. ex Vieb.) Endl. - А. крымская = III(Куб,КР,ЧК,П,Кисл); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Pa,ST(К); [Sp.] <Rx>

Familia 48. Anthericaceae J.G.Agardh - Венечниковые

Genus 216. Anthericum L. - Венечник

772. *A. ramosum* L. - В. ветвистый = III(ЧК,Кисл,[П: Танфильев, Кононов, 1987]): (Европ.); Pa,ST(К); <Rx> <Po>

Familia 49. Nemerocallidaceae R.Br. - Красодневоыы

Genus 217. Nemerocallis L. - Красоднев

773. **N. fulva* (L.) L. - К. рыжий = III(Ст,[МА,ЧК]: Зернов, 2006): IV(ТА): (Адвент. [Вост. Азия]); Rb(К); [R.]

Ordo 35. Liliales - Лилиецветныы

Familia 50. Liliaceae Juss. - Лилиевыы

Genus 218. Gagea Salisb. - Гусиный лук

774. *G. bulbifera* (Pall.) Salisb. - Г.л. луковиценосный = I(АЕ,ЦП); III(Ст,П): (Вост.средиз.); ST,Dd(К:ephd); [Sp.]

775. *G. chlorantha* (Bieb.) Schult. et Schult. fil. - Г.л. зеленоватоцветковый = II(Кизл); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pa(К:ephd); [R.]

776. *G. minima* (L.) Ker-Gawl. - Г. л. малый = I(Прик,ТБ); III(Ст,СК,П,ЧО): (Европ.); S(К:ephd); [R.]

777. *G. lutea* (L.) Ker.-Gawl. - Г.л. жёлтый = I(НД,АК,КЕ); III(Ст,Куб,ТЗ,П,СК,ТС,Ч); IV(Н): (Панбор.); S(К:ephd); [Sp.] <Pm>

778. *G. bezenginensis* Levichev - Г.л. безенгийский = III(Б): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К:ephd); [R.] <Es> l.c. окр. с. Безенги

779. *G. chanae* Grossh. - Г.л. Ханы = I(АК,КЕ,ЦП); III(Ст,П,СК,ТС); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); ST(К:ephd); [Sp.]

780. *G. helenae* Grossh. - Г.л. Елены = III(П,Кисл,Л,УН,ТС): (Кавк.: Общекавк.); S(К:ephd); [R.]

781. *G. germanae* Grossh. - Г.л. Жермены = III(Э); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Pb(К:ephd); [R.]

782. *G. cuneata* Levichev et Murtazaliev - Г.л. клиноватый = II(КН,Кизл); III(Ст,ЛН,СК); V(Касп): (Кавк.: Эукавк.); Pa(К:ephd); [R.] l.c. окр. Кизляра

783. *G. daghestanica* Levichev et Murtazaliev - Г.л. дагестанский = V(БН): (Кавк.: Эукавк.); Pa,Ra(К:ephd); [R.] <Es> l.c. окр. с. Гертма

784. *G. podolica* Schult. et Schult. fil. - Г.л. подольский = II(КН): (Понтич.); ST(К:ephd); [R.]

785. *G. pusilla* (F.W.Schmidt) Schult. et Schult. fil. - Г.л. маленький = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,ЦП); III(Ст,СК,П,ТС); IV(Н); V(БН): (Понт.-Южносиб.); ST(К:ephd); [Sp.]

786. *G. artemczukii* A.Krasnova - Г.л. Артемчука = I(ЗП,[МД: Данилевич, 1995,1996]): (Понтич.); Dd(К:ephd); [R.] <Rx>

787. *G. scythica* Artemczuk - Г.л. сцитский = I(Прик,ТБ,АИ): (Понтич.); ST(К:ephd); [R.]

788. *G. maeotica* Artemczuk - Г.л. донской = I(ЗП); III(Ст,П,Кисл): (Понтич.); ST(К:ephd); [R.]

789. *G. sarmentosa* C.Koch - Г.л. хворостовидный = I(КЕ,ЦП); II(ВП); III(СК,П,Каб); V(Касп): (Субкавк*.); ST(К:ephd); [R.]

790. *G. taurica* Stev. - Г.л. крымский = I(Т); III(Ст,ЛН,ЧК,СК,П); IV(Н); V(БН): (Субкавк*.); ST(К:ephd); [R.]

791. *G. eleonora* Levichev - Г.л. Элеоноры = I(КЕ,Прик,ТБ); III(ЛН,СК): (Субкавк*.); ST(К:ephd); [R.]

792. *G. alexeenkoana* Misch. - Г.л. Алексеенко = III(ТЗ,П,ЧО,Б,ОС); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Pс(К:ephд); [R.]
793. *G. reticulata* (Pall.) Schult. et Schult. fil. - Г.л. сетчатый = I(Т,М); III(Ст,Куб,СК,П); V(БН,Касп): (Туранск.); Da,Db(К:ephд); [R.]
794. *G. tenuifolia* (Boiss.) Fomin - Г.л. тонколистный = III(НК); V(Касп): Субкавк*.; ST,Da,Db(К:ephд); [Rs.]
795. *G. quasitenuifolia* Levichev - Г.л. как-бы-тонколистный = II(Кизл); V(Касп): (Туранск.); ST(К:ephд); [R.]
796. *G. fibrosa* (Desf.) Schult. et Schult. fil. (*G. commutata* C. Koch) - Г.л. фиброзный = I(Прик,ТБ,М); II(КН); III(Ст); V(Касп): (Субкавк*.); ST(К:ephд); [R.]
797. *G. anisanthos* C. Koch (*G. liotardii* (Sternb.) Schult. et Schult. fil.) - Г.л. неравноцветковый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); V(ЦД,АС): (Общедр.средиз.); Pс(К:ephд); [Sp.]
798. *G. sulfurea* Misch. - Г.л. серно-жёлтый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pс(К:ephд); [R.] <Esub> l.c. Теберда, Клухорский перевал
799. *G. joannis* Grossh. - Г.л. Иоанна = V(Касп - Дербент): (Субкавк*.); Pa(К:ephд); [R.]
800. *G. glacialis* C. Koch - Г.л. ледниковый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Субкавк*.); Pс(К:ephд); [Sp.]
801. *G. villosa* (Bieb.) Duby (*G. arvensis* Dumort.) - Г.л. мохнатый = I(ЗП); III(Ст,СК,П,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Европ.); ST(К:ephд); [R.]
802. *G. dubia* Terr. - Г.л. сомнительный = I(АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст): (Субпонт*.); ST(К:ephд); [R.]
803. *G. bohémica* (Zauschn.) Schult. et Schult. fil. - Г.л. богемский = II(Кизл); V(Касп): (Зап.др.средиз.); ST(К:ephд); [R.]

Genus 219. *Lilium* L. - Лилия

804. ★*L. caucasicum* Misch. ex Grossh. - Л. кавказская = III(КР,Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); S(К:ephд); [Sp.] <Esub>
805. *L. szovitsianum* Fisch. et Ave-Lall. - Л. Шовица = III(ОС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К:ephд); [Sp.]
806. *L. monadelphum* Bieb. - Л. однобратственная = III(Куб,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [Sp.] <Esub> l.c. г. Бештау
807. ★*L. kesselringianum* Misch. - Л. Кессельринга = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К:ephд); [R.]

Genus 220. *Fritillaria* L. - Рябчик

808. *F. latifolia* Willd. - Р. широколистный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС): (Кавк.: Общекавк.); Pс(К:ephд): [Sp.]
809. *F. collina* Adams (*F. ophioglossifolia* Freyn et Sint.; *F. lutea* Bieb.) - Р. холмовой = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Л,УН,Б,ОС,ВС); IV(ТА): (Вост.средиз.); Pb,Pс(К:ephд); [Sp.]
810. *F. lagodechiana* Charkev. - Р. лагодехский = III(ТЗ - Домбай); IV(ТА - г. Б.Псеушо: **КК Краснодарского края, 2007**): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К:ephд); [R.] <Esub>

811. ★*F. orientalis* Adams - Р. восточный = III(ВЛ - Фишт-Оштен; Кисл - Малка; Каб, Л, УН, ВС - Армхи): (Кавк.: Эукавк.); Рс(К:ephd); [Sp.] <Esub>

812. *F. meleagriodes* Partin ex Schult. et Schult. fil. - Р. малый = III([МА - Горячий Ключ, Ст - х. Калюжный, СК - Янкульское леснич.]: Мордак, 1983): (Субтуран*.); ST, Аа(К:ephd); [R.] <Rg>

813. ★*F. caucasica* Adams - Р. кавказский = III(П, Кисл, Каб, Б, ОС); V(БН, Касп - хр. Нарат-Тюбе, ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Ра(К:ephd); [Rs.] l.c. Пятигорск <Ро>

814. ★*F. ruthenica* Wikstr. - Р. русский = I(НД): (Субтуран*.); ST, Ра(НК:ephd); [Rs.]

Genus 221. *Tulipa* L. - Тюльпан

815. *T. eichleri* Regel - Т. Эйхлера = V(Касп - южная часть: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Db(К:ephd); [R.] <Esub>

816. ★*T. gesneriana* L. (*Tulipa schrenkii* Regel) - Т. Геснера = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, СК, П, ТС); IV(Н); V(БН, Касп): (Субтуран*.); ST(К:ephd); [Sp.] <Ро>

817. *T. quercetorum* Klok. et Zoz. (*T. sylvestris* L.) - Т. дубравный = I(НК, ТБ); III(Ст, СК, П): (Понтич.); S(К:ephd); [Sp.] <Ро> l.c. с. Саблинское

818. *T. biebersteiniana* Schult. et Schult. fil. - Т. Биберштейна = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СК, П, ТС); IV(Н); V(Дар): (Субтуран*.); ST(К:ephd); [Sp.] l.c. м-ду Моздоком и Кизляром <Ро>

819. *T. australis* Link (*T. hypanica* Klok. et Zoz) - Т. южный = V(Н): (Кр.-Новоросс.); Да(НК:ephd); [R.]

820. *T. biflora* Pall. (*T. polychroma* Stapf.) - Т. двуцветковый = I(МД): (Туранск.); ST(К:ephd); [Rs.] <Ро>

821. ★ *T. lipskyi* Grossh. (*T. humilis* auct. non Herb.) - Т. Липского = III(ВЛ - междуречья М.Лабы и Уруштена, Б. и М.Лабы: Алтухов, 1964, ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Рс(К:ephd); [R.] <Ее> l.c. р. Учкулан

Genus 222. *Lloydia* Reichenb. - Ллойдия

822. *L. serotina* (L.) Reichenb. - Л. поздняя = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); V(ЦД, АС): (Палеаркт.); Рс, До(К:ephd); [Sp.]

Genus 223. *Erythronium* L. - Кандык

823. ★*E. caucasicum* Woronow - К. кавказский = III(Ст - Ставрополь, Куб, КР, ВЛ); IV(СЗЗ): (Субкавк*.); S(К:ephd); [R.] <Ро>

Ordo 36. Amaryllidales - Амариллисоцветные

Familia 51. Hyacinthaceae Batsch - Гиацинтовые

Genus 224. *Ornithogalum* L. - Птицемлечник

824. *O. ponticum* Zahar. (*O. pyrenaicum* auct.) - П. понтийский = I(АК, КЕ, Прик, ТБ, НК); II(Кизл); III(Ст, Куб, СКТ); IV(СЗЗ); V(Касп, ЦД): (Средиземн.); Ра(К:ephd); [Pl.]

825. *O. flavescens* Lam. - П. желтеющий = I(Т): (Европ.); ST(К:ephd); [R.]

826. *O. fischerianum* Krasch. - П. Фишера = I(МД): (Субтуран*.); ST, Dd(К:ephd); [R.]

827. ★*O. arcuatum* Stev. (*O. magnum* Krasch. et Schischk.) - П. дугообразный = III(Ст,Куб,КР,СК,П,ТС); IV(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); S(К:ephhd); [Sp.] l.c. Бештау <Esub>

828. *O. balansae* Boiss. (*O. schmalhauseni* Albov) - П. Балансы = III(Ст,ВЛ - р. Белая,ТЗ); IV(ТА): (Субкавк*.); Pс(К:ephhd); [R.]

829. *O. sintenisii* Freyn - П. Синтениса = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Pa(К:ephhd); [Sp.]

830. *O. woronowii* Krasch. - П. Воронова = III(Ст,Куб,КР,СК,П,ЧО); IV(Н): (Кавк.: Общекавк.); Pa(К:ephhd); [R.]

831. *O. navaschirii* Agarova (*O. kochii* Parl.; *O. gussonii* Ten.; *O. tenuifolium* auct.) - П. Навашина = I(ЗП,ЦП); II(КН); III(Ст,ЛН,СК,П,ТС,ЦЭ); IV(Н); V(Касп): (Субпонт*.); ST(К:ephhd); [Pl.]

Genus 225. Scilla L. - Пролеска

832. *S. bifolia* L. (*S. nivalis* Boiss.) - П. двулистная = III(КР,ТЗ,ЦЭ,Л,ЧО); IV(СЗЗ): (Европ.); S(К:ephhd); [R.]

833. *S. monanthos* C.Koch - П. одноцветковая = III(ОС - Алагир); IV(Н - Новороссийск,ТА): (Субкавк*.); S(К:ephhd); [R.]

834. *S. siberica* Haw. - П. сибирская = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); S(К:ephhd); [Pl.] <Po>

Genus 226. Prospero Salisb. - Просперо

835. *P. autumnale* (L.) Speta (*Scilla autumnalis* L.) - П. осенний = III(МА - Майкоп,КР); IV(Н,ТА): (Средиземн.); S(К:ephhd); [R.] <Po>

Genus 227. Puschkinia Adams - Пушкиния

836. *P. scilloides* Adams - П. пролесковая = III(Э,Б,ОС): (Субкавк*.); Pb(К:ephhd); [Sp.] <Po>

Genus 228. Bellevalia Lapeyer. - Беллевалия

837. *B. macrobotrys* Boiss. (*B. zygomorpha* Woronow) - Б. крупноцветная = V(ЦД - южная часть): (Субкавк*.); ST(К:ephhd): [R]

838. ★*B. speciosa* Woronow ex Grossh. (*B. sarmatica* (Georgi) Woronow) - Б. великолепная (сарматская) = I(НД,ЗПМ,АК,Тем,Т,Прик,ТБ,НК,М); II(КН); III(Ст,П,СК): (Понтич.); ST(К:ephhd); [R.]

Genus 229. Leopoldia Parl. - Леопольдия

839. *L. tenuiflora* (Tausch) Heldr. (*Muscari tenuiflorum* Tausch) - Л. тонкоцветная = III(П); IV(Н - р. Дюрсо); V(ЦД - Самурский хребет): (Зап.др.средиз.); ST(К:ephhd); [Rs.] <Rx> <Po>

Genus 230. Muscari Mill. - Мышиный гиацинт

840. *M. armeniacum* Leichtlin ex Baker (*M. szovitsianum* Baker) - М.г. армянский = III(П - Бештау: Танфильев, Кононов, 1987,МА - Майкоп,ТЗ - Теберда,ОС,ВС); IV(ТА - Туапсе); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Dd(К:ephhd); [Rs.]

841. ★*M. dolichanthum* Woronow et Tron - М.г. длинноцветковый = IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S,Da(К:ephhd); [R.] <Esub> l.c. г. Аибга

842. *M. neglectum* Guss. (*M. muscarimi* Medik.; *M. racemosum* (L.) Mill.; *M. leucostomum* Woronow) - М.г. незамеченный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ): (Субсредиз*.); Pa,ST(К:ephhd); [Pl.] <Po>

Genus 231. *Pseudomuscari Garbari et Greuter* - Псевдомускари

843. *P. pallens* (Bieb.) Garbari (*Muscari pallens* (Bieb.) Fisch.) - П. бледный = III(ТЗ,Э); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); ST(К:ephd); [Sp.] <Po>

844. ★*P. coeruleum* (Losinsk.) Garbari (*M. coeruleum* Losinsk.) - П. голубой = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(К:ephd); [R.] <Esub> l.c. Балкария, р. Сукан-су

Familia 52. *Alliaceae J.Agardh* - Луковые

Genus 232. *Allium L.* - Лук

845. *A. victorialis* L. - Л. победный = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(Даг): (Голаркт.); Pb(К); [Pl.]

846. *A. albidum* Fisch. ex Bieb. - Л. беловатый = I(КЕ,Прик,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(Даг): (Евро-Кавк.); ST(К); [Pl.]

847. *A. schoenoprasum* L. - Л. скорода = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС): (Голаркт.); Pb(К); [Sp.]

848. *A. saxatile* Bieb. - Л. каменный = III(ВЛ,ТЗ,П,Кисл,Б,ОС); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субтуран*.); Da(К); [Sp.]

849. *A. ruprechtii* Boiss. - Л. Рупрехта = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Кисл,Б,ОС,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(К); [Sp.] <Esub>

850. *A. globosum* Bieb. ex Redoute - Л. шаровидный = III(Ст,СК,ВЛ,ТЗ,Э,ОС); V(ЦД): (Понт.-Южносиб.); Da(К); [Sp.]

851. *A. psebaicum* Mikheev - Л. псебайский = III(ВЛ - Псебай: Михеев, 2004); IV(Н: <http://www.plantarium.ru/page/image/id/404306.html>): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [R.] <Ee> l.c. окр. пос. Псебай

852. *A. lineare* L. - Л. линейный = I(АЕ): (Понтич.); Pa,ST(К); [R.]

853. ★*A. gunibicum* Misch. ex Grossh. - Л. гунибский = III(ВС - р. Фортанга); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(К); [Sp.] <Ee> l.c. Гуниб

854. *A. mirzajevii* Tscholokaschvili - Л. Мирзаева = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(К); [R.] <Es>

855. *A. daghestanicum* Grossh. - Л. дагестанский = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pa(К); [R.] <Es> l.c. окр. с. Данух

856. *A. samurense* Tscholokaschvili - Л. самурский = V(АС - р. Самур, Рутул, Лучек, Кича, Миджах, р. Курах): (Кавк.: Эукавк.); Do(К); [R.] <Ee> l.c. окр. с. Лучек

857. *A. pseudostrictum* Albov - Л. ложноторчащий = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb(К); [Sp.]

858. *A. rotundum* L. (*A. scorodoprasum* L.; *A. jajlae* Vved.; *A. waldsteinii* G.Don fil.) - Л. круглый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субпонт*.); Pa(К); [Sp.]

859. *A. erubescens* C.Koch - Л. краснеющий = III(КР,СК,П,Кисл.); V(ЦД,Касп): (Субкавк*.); Pa(К); [Sp.]

860. *A. pervestitum* Klok. - Л. переодетый = I(Т: Серёгин, 2004): (Понтич.); ST(К); [R.]

861. *A. ponticum* Misch. ex Grossh. - Л. понтийский = IV(ТА: Косенко, 1970): (Кавк.: Общекавк.); Pa(К); [Rs.]

862. *A. leucanthum* C.Koch - Л. белоцветковый = **I**(МД,АИ,НК, Прик,ТБ,М.); **II**(КН); **IV**(ТА: **КК Краснодарского края, 2017**); **V**(Касп): (Кавк.: Общекавк.); ST(K); [R.]
863. *A. atroviolaceum* Boiss. - Л. чёрно-фиолетовый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Туранск.); Dd(K); [Sp.]
864. *A. fuscoviolaceum* Fomin - Л. коричнево-фиолетовый = **III**(СК,П,ВЛ,ТС,ВС); **V**(Касп,ЦД,АС): (Ирано-Туран.); ST(K); [Sp.]
865. ★*A. regelianum* A.Beck. - Л. регелевский = **I**(НД,ЗПМ,АК,МД): (Понтич.); Dc(K); [R.]
866. *A. sphaerocephalon* L. - Л. шароголовый = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т); **II**(Кизл); **III**(Ст,КР,ТЗ,СК,П,Кисл,ЧО,ТС); **IV**(Н); **V**(Даг): (Европ.); ST(K); [Sp.]
867. *A. affine* Ledeb. - Л. родственный = **V**(Касп): (Субкавк*.); Pa(K); [Sp.]
868. *A. auscheri* Boiss. - Л. Оше = **V**(ЦД): (Субкавк*.); Pb(K); [R.]
869. *A. moschatum* L. - Л. мускатный = **II**(Кизл); **III**(Кисл,УН,ВС); **IV**(Н); **V**(Даг): (Средиземн.); ST(K); [Sp.]
870. *A. inaequale* Janka - Л. неравный = **I**(Тем,Т,Прик); **II**(ВП); **III**(Ст,КР,ЧК,СК,П,ТС); **IV**(Н); **V**(Даг): (Субтуран*.); ST, Da(K); [Sp.]
871. *A. rubellum* Vieb. - Л. красноватый = **III**(П,ТС); **V**(БН,Касп): (Субкавк*.); ST(K); [R.]
872. *A. razzoskianum* Tuzs. (*A. pulchellum* G.Don fil.) - Л. Пачоского = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Понтич.); ST(K); [Sp.]
873. *A. kunthianum* Vved. - Л. Кунта = **III**(ЗК,Э,ВК); **V**(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); ST, Da(K); [Pl.]
874. *A. rupestre* Stev. - Л. скальный = **III**(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,П,Кисл, Каб,ЧО); **IV**(СЗЗ); **V**(ЦД): (Субкавк*.); Pa(НК); [Sp.]
875. *A. paniculatum* L. - Л. метельчатый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст, Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Понт.-Южносиб.); ST(K); [Pl.]
876. *A. oleraceum* L. - Л. огородный = **I**(НД,ЗПМ,АЕ); **III**(Ст); **V**(Касп): (Европ.); Pa, ST(K); [Sp.]
877. *A. podolicum* (Aschers. et Graebn.) Blocki ex Rasib. - Л. подольский = **I**([Т - Темрюк, Приморско-Ахтарск]: **КК Краснодарского края, 2017**): (Понтич.); ST(K); [R.]
878. *A. lencoranicum* Misch. ex Grossh. - Л. ленкоранский = **III**(П - г. Бештау: **Немирова, Троцкая, 2003**): (Субкавк*.); S(K:ephd); [Rs.] <Rg>
879. *A. candolleianum* Albov - Л. Декандоля = **III**(ВЛ,ТЗ,ОС); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc(K); [R.] <Esub>
880. *A. circassicum* Kolak. - Л. черкесский = **IV**(ТА - южн. часть): (Кавк.: Эукавк.); Pb(K); [R.] <Es> l.c. Красная Поляна, г. Аибга.
881. ★*A. paradoxum* (Vieb.) G.Don fil. - Л. странный = **II**(Кизл - Сулак); **III**(ТС - восточная часть); **V**(БН,Касп,ЦД): (Субкавк*.); S(K); [R.]
882. *A. ursinum* L. - Л. медвежий (Черемша) = **III**(Ст,Куб,ВЛ,П, Л,УН,Ч); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Европ.); S(K); [Pl.] <Pa;Pm>

883. *A. oreophilum* C.A.Mey. - Л. горнолюбивый = III(OC,BC); V(Даг): (Ирано-Туран.); Pc(K); [Sp.]

884. *A. caspium* (Pall.) Vieb. - Л. каспийский = II(Кизл); V(Касп): (Туранск.); Db(K); [Rs.] l.c. низ. реки Кумы

885. *A. decipiens* Fisch. et Schult. et Schult.fil. - Л. обманывающийся = II(КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,КР,ЧК,Кисл,СК,КАБ); IV(Н): (Субтуран*.); ST(K); [Sp.]

886. ★*A. grande* Lipsky - Л. крупный = V(Касп - окрестности Махачкалы): (Кавк.: Эукавк.); S(K); [R.] <Es> l.c. г. Тарки-Тау

Genus 233. Nectaroscordum Lindl. - Нектароскордум

887. ★*N. tripedale* (Trautv.) Grossh. - Н. трёхфутовый = V(Касп - Дербент, низ. Самура): (Армено-Иран.); S(K); [R.]

Familia 53. Amaryllidaceae J.St.-Hil. - Амариллисовые

Genus 234. Pancratium L. - Панкраций

888. ★*P. maritimum* L. - П. морской = IV(ТА - Адлер): (Средиземн.); Db(K); [R.] <Po>

Genus 235. Sternbergia Waldst. et Kit. - Штернбергия

889. ★*S. colchiciflora* Waldst. et Kit. - Ш. безвременниковая = I(Т,КЕ - х. Родионов); II(Кизл - Новогеогриевское: Муртазалиев, 2009); III(Ст,СК,П, ТС); IV(Н - Геленджик): (Средиземн.); ST(K:ephd); [Rs.] <Rx>

890. *S. lutea* (L.) Ker Gawl. ex Spreng. - Ш. жёлтая = V(Касп - дельта Самура): (Субтуран*.); ST(K); [Rs.]

Genus 236. Leucojum L. - Белоцветник

891. ★*L. aestivum* L. - Б. летний = I(Тем); III(МА - Кубань); IV(СЗЗ): (Зап.др.средиз.); S,Аа(K:ephd); [R.] <Po;Pm>

Genus 237. Galanthus L. - Подснежник

892. ★*G. plicatus* Vieb. - П. складчатый = IV(Н: Зернов, 2006): (Кр.-Новоросс.); S(K:ephd); [R.] <Po>

893. ★*G. caucasicus* (Baker) Grossh. (*G. alpinus* Sosn.) - П. кавказский = III(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,П,ОС,ВС); IV(ТА); IV(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S(K:ephd); [Sp.] <Pm;Po>

894. ★*G. bortkewitschianus* G.Koss - П. Борткевича = III(Каб): (Кавк.: Предкавк.); S(K:ephd); [R.] <Es> l.c. р. Каменка

895. ★*G. angustifolius* G.Koss. - П. узколистный = III(П,Каб,Л,УН,Ч); V(БН - Гертма: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Предкавк.); S(K:ephd); [Rs.] <Ee> l.c. Кабарда <Pm>

896. ★*G. woronowii* Losinsk. - П. Воронова = III(Кисл: Кравцун, 1989,ВЛ - Гузерибль); IV(СЗЗ): (Эвксин.); S(K:ephd); [Sp.] <Pm;Po>

897. ★*G. platyphyllus* Traub et Moldenke (*G. latifolius* Rupr.) - П. широколистный = III(ОС,ВС); IV(ТА - г. Ачишхо: Солодько, Кирий, 2002): (Кавк.: Эукавк.); Pc(K:ephd); [Sp.] l.c. Сев. Осетия, Гудгора <Po>

898. *G. rizehensis* Stern (*G. glaucascens* A.Khokhr.; *G. cilicicus* auct. non Baker) - П. ризенский = IV(ТА - Хоста): (Субкавк*.); S(K:ephd); [R.] <Po>

899. ★*G. lagodechianus* Kem.-Nath. (*G. cabardensis* G.Koss.) - П. лагодехский = III(Каб,Л,ТС,ЧО); V(БН,Касп): (Кавк.: Эукавк.); S(К:ephd); [R.] <Esub><Po>

Ordo 37. Asparagales - Спаржецветные

Familia 54. Asparagaceae Juss. - Спаржевые

Genus 238. Asparagus L. - Спаржа

900. *A. verticillatus* L. - С. мутовчатая = I(ЗП,НК,М); II(ВП); III(Ст,СК,П,Л,УН,ТС); IV(СЗЗ); V(Даг): (Ирано-Туран.); Pa,ST(К); [Sp.]

901. *A. officinalis* L. (*A. polyphyllus* Stev.; *A. caspius* Schult. et Schult. fil.) - С. лекарственная = I(ЗП,КЕ,Прик,СК); III(Ст,Куб,П,Кисл,Л,УН,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Евро-Сиб.); Pa(К); [Pl.] <Pm;Po>

902. *A. persicus* Baker - С. персидская = II(ВП); V(Касп,ЦД): (Туранск.); Dd(К); [R.]

903. *A. breslerianus* Schult. et Schult. fil. - С. Бреслера = II(КН - р. Кума); V(Касп): (Туранск.); Dd(К); [R.]

904. *A. ledebourii* Misch. - С. Ледебюра = V(Касп - Дербент): (Туранск.); ST(К); [R.]

Familia 55. Ruscaceae Hitch. - Иглицевые

Genus 239. Ruscus L. - Иглица

905. *R. aculeatus* L. (*R. ponticus* Woronow ex Grossh.) - И. заострённая = IV(СЗЗ): (Вост.средиз.); S(Ch:sf:sv); [Sp.]

906. ★*R. colchicus* P.F.Yeo (*R. hypophyllum* L.) - И. колхидская = III(Х,ВЛ); IV(ТА): (Эвксин.); S(Ch:sf:sv); [Sp.]

Familia 56. Convallariaceae Horan. - Ландышевые

Genus 240. Polygonatum Mill. - Купена

907. *P. multiflorum* (L.) All. - К. многоцветковая = III(ВЛ,Э,Л,УН,Ч); IV(Н): (Голаркт.); S(К); [Sp.]

908. *P. orientale* Desf. (*P. polyanthemum* (Bieb.) A.Dietr.) - К. восточная = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Субкавк*.); S(К); [Sp.]

909. *P. glaberrimum* C.Koch (*P. ovatum* Misch. ex Knorr.; *P. odoratum* (Mill.) Druce; *P. officinale* All.) - К. гладкая = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S(К); [Pl.]

910. *P. verticillatum* (L.) All. - К. мутовчатая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Европ.); S(К); [Pl.]

Genus 241. Majanthemum Wigg. - Майник

911. *M. bifolium* (L.) F.W.Schmidt - М. двулистный = III([П - окр. Железноводска: Галушко, 1979]); V(АС - Тлярятинский р-н): (Панбор.); S(К); [Rs.] <Rg;Pm>

Genus 242. Convallaria L. - Ландыш

912. *C. transcaucasica* Utkin ex Grossh. (*C. majalis* L.) - Л. кавказский = I(М - Терек); III(Ст,Куб,СК,П); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Pl.] <Pm;Po>

Ordo 38. Trilliales - Триллиецветные

Familia 57. Trilliaceae Lindl. - Триллиевые

Genus 243. Paris L. - Вороний глаз

913. *P. quadrifolia* L. - В.г. четырёхлистный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); S(К); [Pl.] <Pm;Pt>

914. *P. incompleta* Bieb. - В.г. неполный = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(К); [Sp.]

Ordo 39. Smilacales - Сассапарилецветные

Familia 58. Smilacaceae Vent. - Сассапарилевые

Genus 244. Smilax L. - Сассапариль

915. *S. excelsa* L. - С. высокая = III(X); IV(СЗЗ); V(Касп): (Вост.средиз.); S(К:ll); [R.] <Pa>

Ordo 40. Dioscoreales - Диоскореецветные

Familia 59. Dioscoreaceae R.Br. - Диоскореевые

Genus 245. Dioscorea L. - Диоскорейя

916. ★*D. caucasica* Lipsky - Д. кавказская = IV(Н: Гроссгейм,1940,ТА): (Кавк.: Эукавк.); S(К:ll); [Sp.] <Esub> <Pm>

Genus 246. Tamus L. - Тамус

917. *T. communis* L. - Т. обыкновенный (Адамов корень) = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Средиземн.); S(К:lh); [Pl.] <Pm>

Ordo 41. Iridales - Ирисоцветные

Familia 60. Iridaceae Juss. - Ирисовые (Касатиковые)

Genus 247. Crocus L. - Шафран

918. *C. scharojanii* Rupr. - Ш. Шарояна = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc(К:ephd); [Sp.] <Esub> l.c. верх. р. Белой (гибридная форма *C. scharojanii* и *C. vallicola* известна под названием *C. suworowianus* С. Koch, встречается везде, где эти два вида обитают совместно.)

919. ★*C. vallicola* Herb. - Ш. долинный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К:ephd); [R.]

920. *C. reticulatus* Stev. ex Adams (*C. variegatus* Hoppe et Hornsch.) - Ш. сетчатый = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ТЗ,СК,П,Кисл,ТС,ОС); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); Pa,ST,S(К:ephd); [Pl.]

921. *C. adamii* J.Gay - Ш. Адама = V(Касп): (Зап.др.средиз.); Pa(К:ephd); [R.]

922. ★*C. tauricus* (Trautv.) Puring (*C. biflorus* Mill. s. str.) - Ш. крымский = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); ST(К:ephd); [R.]

923. ★*C. speciosus* Bieb. - Ш. видный = III(Ст,Куб,ОС); IV(СЗЗ); V(Касп): (Армено-Иран.); S(К:ephd); [Rs.] <Rx> <Po>

Genus 248. Juno Tratt. - Юнона

924. *J. caucasica* (Hoffm.) Tratt. (*Iris caucasica* Stev.) - Ю. кавказская = V(АС - Самур [сс. Ахты, Луткун]: КК Респ. Дагестан, 2009): (Субкавк*); ST(К); [R.] <Po>

Genus 249. *Iridodictyum* Rodionenko - Иридодиктиум

925. ★*I. reticulatum* (Vieb.) Radionenko (*Iris reticulata* Vieb.) - И. сетчатый = V(ЦД,АС - Самур [сс. Мугерган, Гильяр], р. Симбирисхеви: **КК Респ. Дагестан, 2009**): (Субкавказ*.); ST(К); [Rs.]

Genus 250. *Iris* L. - Касатик (Ирис)

926. *I. sibirica* L. - К. (И.) сибирский = III(Куб,Э,ЧО,Б,ОС); V(АС): (Евро-Сиб.); Ра,Аа(НК); [Sp.] <Ро>

927. *I. pseudacorus* L. - К.(И.) жёлтый = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,МД,НК,М); II(Кизл); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Ab(К); [R.] <Ро;Рм>

928. ★*I. notha* Vieb. - К.(И.) ненастоящий = I(АЕ); III(Ст,Куб,СК,П,Л,УН,ТС); V(БН,Касп): (Кавк.: Предкавказ.); Ра(К); [R.] <Ее><Ро> l.c. г. Бештау

929. *I. halophila* Pall. - К.(И.) солелюбивый = I(ЗП,Прик); III(Ст,Куб,П,ЧО,ТС): (Понт.-Южносиб.); ST,Dc(К); [Sp.] <Ро>

930. *I. cartaliniae* Fomin (*I. musulmanica* Fomin; *I. violacea* Klatt) - К.(И.) карталинский = V(БН,Касп): (Субкавказ*.); Аа(К); [R.] <Ро>

931. *I. pseudonotha* Galushko - К.(И.) ложноненастоящий = I(НК,М,Каб,ТС,ЧО); II(ВП): (Субтуран*.); ST,Аа(К); [Sp.] <Ро> l.c. Величаевское

932. *I. colchica* Kem.-Nath. - К.(И.) колхидский = III(ВЛ,ТЗ,П,Кисл,Л,УН); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Эвксин.); Ра(К); [Sp.] <Ро>

933. *I. marschalliana* Vobr. (*I. pontica* Zapal, *I. humilis* Vieb.) - К. (И.) Маршалла = III(СК,П,ЧК,Кисл): (Кавк.: Эукавказ.); Ра(К:ephd); [R.] <Ее> l.c. окр. г. Кисловодска <Ро>

934. ★*I. taurica* Lodd. (*I. pumila* L.) - К.(И.) крымский = I(НД,ЗПМ,АЕ,Т,КЕ,Прик,НК); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Субкавказ*.); Ра,ST(К:ephd); [Sp.] <Ро>

935. *I. alexeenkoi* Grossh. - К.(И.) Алексеенко = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); ST(К); [R.] <Ро>

936. ★*I. timofejewii* Woronow - К.(И.) Тимофеева = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); ST,Da(К:ephd); [R.] <Ро> <Ее> l.c. г. Буцрах

937. ★*I. scariosa* Willd. ex Link (*I. astrachanica* Rodionenko) - К.(И.) кожистый = I(МД,АИ,НК,М); II(ВП): (Туранск.); ST,Db,Dd(К:ephd); [Sp.] <Ро>

938. *I. furcata* Vieb. (*I. aphylla* L.) - К.(И.) вильчатый = III(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,Тер); V(Даг): (Евро-Кавк.); Ра(К:ephd); [Sp.] <Ро>

939. ★*I. acutiloba* С.А.Меу. - К.(И.) заострённолопастный = V(Касп): (Субкавказ*.); Da,Db(К); [Rs.] <Ро>

Genus 251. *Gladiolus* L. - Шпажник

940. *G. italicus* Mill. (*G. segetum* Ker-Gawl.; *G. imbricatus* auct. non L.) - Ш. итальянский = V(Касп): (Зап.др.средиз.); ST(К); [R.] <Ро>

941. *G. tenuis* Vieb. (*G. apterus* Klok.) - Ш. тонкий = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); Ра(К); [Sp.] <Ро>

Ordo 42. Orchidales - Ятрышниковцветные

Familia 61. Orchidaceae Juss. - Ятрышниковые (Орхидные)

Genus 252. *Cypripedium* L. - Башмачок

942. ★*C. calceolus* L. - Б. настоящий = III(Ч - Хоби-Шауданские высоты); V(БН,Касс: Раджи, 1998): (Палеаркт.); S(К); [Rs.] <Rg><Po>

Genus 253. *Liparis* Rich. - Лосняк

943. ★*L. loeselii* (L.) Rich. - Л. Лозеля = I(НД): (Голаркт.); Аа(К); [Rs.]

Genus 254. *Epipactis* Zinn - Дремлик

944. *E. helleborine* (L.) Crantz (*E. latifolia* (L.) All.) - Д. морозниковый = I(НД); III(Ст,ЛН,СК,ЗК,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S(К); [R.]

945. *E. condensata* Boiss. ex D.P.Young - Д. уплотнённый = ([III(КР); IV(Н)] - Efimov, 2008): (Вост.средиз.); S(К); [R.]

946. *E. atrorubens* (Hoffm. ex Bernh.) Bess. - Д. ржавый = III(Куб,Э,Б); IV(Н): (Европ.); S(К); [R.]

947. *E. microphylla* (Ehrh.) Sw. - Д. мелколистный = IV(Н - Геледжик): (Европ.); S(К) [Rs.]

948. *E. pontica* Taubenheim - Д. понтийский = IV(ТА - Хоста: Аверьянова, 2013): (Европ.); S(К); [R.]

949. *E. palustris* (L.) Crantz - Д. болотный = I(НД); II(КН); III(Ст,ЛН,ЗК,Э,ТС); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); S(К); [R.]

Genus 255. *Sephalanthera* Rich. - Пыльцеголовник

950. *S. kurdica* Bornm. ex Kraenzl. (*S. floribunda* Woronow; *S. epipactoides* auct., *S. cucullata* Boiss. et Heldr. ex Reichenb.) - П. курдский = IV(Н): (Вост.средиз.); S(К); [Rs.]

951. ★*S. rubra* (L.) Rich. - П. красный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Панбор.); S(К); [R.]

952. ★*S. damasonium* (Mill.) Druce - П. дамасонский (крупноцветковый) = I(АЕ - с. Александровка: КК Ростовской области, 2014, Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); S(К); [Sp.]

953. ★*S. longifolia* (L.) Fritsch - П. длиннолистный = III(Куб,ЦЭ,Кисл,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Панбор.); S(К); [R.]

954. *S. caucasica* Kraenzl. - П. кавказский = V(Касп - дельта Самура): (Кавк.: Общекавк.); S(К); [R.]

Genus 256. *Limodorum* Boehm. - Лимодорум

955. ★*L. abortivum* (L.) Sw. - Л. недоразвитый = III(Куб,Х,ВЛ,П,Л); IV(СЗЗ); V(Касп): (Евро-Кавк.); S(К:sap); [R.]

Genus 257. *Listera* R.Br. - Тайник

956. *L. ovata* (L.) R.Br. - Т. овальный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Сиб.); S(К); [Sp.]

957. *L. cordata* (L.) R.Br. - Т. сердцевидный = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Л,БН,УН,ОС); IV(ТА); (Голаркт.); S(К); [R.]

Genus 258. *Neottia* Gurt. - Гнездовка

958. *N. nidus-avis* (L.) Rich. - Г. обыкновенная = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Панбор.); S(К:sap); [Sp.] <Pm>

Genus 259. *Goodyera* R.Br. - Гудайера

959. *G. repens* (L.) R.Br. - Г. ползучая = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ, ВК); IV(ТА); V(Даг): (Голаркт.); S(K); [R.]

Genus 260. *Spiranthes* Rich. - Скрученный

960. ★*S. spiralis* (L.) Chevall. - С. спиральный = IV(ТА); V(ЦД): (Зап.др.средиз.); Pa(K); [R.]

Genus 261. *Herminium* Guett. - Бровник

961. *H. monorchis* (L.) R.Br. - Б. одноклубневой = III(ТЗ,Э,ВК); V(Даг): (Палеаркт.); Pb(K); [R.]

Genus 262. *Coeloglossum* C.Hartm. - Пололепестник

962. *C. viride* (L.) C.Hartm. - П. зелёный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Панбор.); Pa,Pb(K); [Sp.] <Pm>

Genus 263. *Platanthera* Rich. - Любка

963. *P. bifolia* (L.) Rich. - Л. двулистная = III(Куб,П,Х,КР,Л,УН,ОС,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); S(K); [R.] <Pm>

964. *P. chlorantha* (Cust.) Reichenb. - Л. зеленоцветная = I(Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); S,Pa(K); [Pl.] <Pm>

Genus 264. *Gymnadenia* R.Br. - Кокушник

965. *G. conopsea* (L.) R.Br. - К. комарниковый = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pb(K); [Sp.] <Pm>

Genus 265. *Comperia* K.Koch - Комперия

966. *C. comperiana* (Stev.) Aschers. et Graebn. - К. Компера = IV(ТА - р. Хоста, с. Илларионовка: Макарова, Шулаков, 2011): (Средиземн.); S(K); [Rs.]

Genus 266. *Dactylorhiza* Neck. ex Nevsky - Пальчатокоренник

967. *D. incarnata* (L.) Soo (*Orchis latifolia* L.) - П. мясокрасный = II(КН); III(Ст,Куб,П,Л,Б,ОС,Ч): (Палеаркт.); Aa(K); [R.] <Pm>

968. *D. euxina* (Nevski) Czer. (*D. caucasica* (Klinge) Soo) - П. черноморский = III(Куб,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pb(K); [R.] <Pm>

969. *D. salina* (Turcz. ex Lindl.) Soo (*D. sanasunitensis* (Fleischm.) Soo) - П. солончаковый = III(Э,ЧО,ВК); V(Даг): (Субкавк*.); Pb(K); [Sp.] <Pm>

970. ★*D. urvilleana* (Steudel) Baumann et Kunkele (*D. triphylla* (C.Koch) Czer.) - П. Дюрвиля = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субкавк*.); Pb(K); [Sp.] <Pm>

971. *D. flavescens* C.Koch - П. желтоватый = III(Ст,Куб,ТЗ,П,СК,КР,ЧК,Л,ОС); IV(Н); V(Касп): (Субкавк*.); Pb(K); [R.] <Pm>

972. *D. iberica* (Bieb. ex Willd.) Soo - П. грузинский = III(Ст: Колмаков, 1928); V(ЦД - Хунзахское плато: Теймуров, 2015): (Зап.др.средиз.); Aa(K); [Rs.] <Rg>

973. *D. amblyoloba* (Nevsky) Aver. - П. туполопастный = III(Х,Л,УН,Ч,АС); V(ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S(K); [R.] <Pm>

Genus 267. *Orchis* L. - Ятрышник

974. ★*O. palustris* Jacq. - Я. болотный = II(Кизл - Кизилюртовский р-н); IV(СЗЗ); V(Касп): (Субсредиз*.); Aa(K); [Rs.]

975. ★*O. cognophora* L. - Я. клопоносный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Средиземн.); Pb(K); [R.] <Pm>

976. ★*O. picta* Loisel. (*O. morio* L. subsp. *picta* (Loisel.) K.Richt.) - Я. разукрашенный = I(Прик); II(КН); III(Ст, **Куб**, СКТ, П, Л, УН); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субсредиз*.); Pa(К); [Sp.] <Pm>
977. *O. chlorotica* Woronow (*O. collina* Banks et Sol.) - Я. зеленовато-жёлтый = V(Касп - Дербент, ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pa(К); [R.]
978. *O. caspia* Trautv. - Я. каспийский = V(Касп): (Субкавк*.); Pb(К); [R.]<Pm>
979. ★*O. mascula* (L.) L. - Я. мужской = III(Ст, **Куб**, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Pa, Pb(К); [R.] <Pm>
980. ★*O. provincialis* Balb. - Я. прованский = IV(СЗЗ): (Зап.др.средиз.); Pb(К); [Rs.]<Pm>
981. *O. x colemanii* Cortesi - Я. Колемана = IV(ТА - аул Ахинтам и хр. Ахштырь: **Тимухин, 2010**): (Средиземн.); S(К); [Rs.]
982. ★*O. pallens* L. - Я. бледный = III(ВЛ - Закан); IV(ТА): (Евро-Кавк.); S, Pb(К); [Rs.]<Pm>
983. *O. spitzelii* Saut. ex Koch (*O. viridifusca* Albov) - Я. Шпитцеля = III(ВЛ - гг. Фишт, Оштен: **КК Республики Адыгеи, 2012**); IV(ТА): (Европ.); Pb(К); [R.]
984. ★*O. ustulata* L. - Я. обожжённый = III(**Куб**, Э, ЧО, ВК); IV(Н); V(Дар): (Европ.); Pb(К); [R.] <Pm>
985. ★*O. tridentata* Scop. - Я. трёхзубчатый = I(КЕ - Изобильный, Прик, ТБ); III(Ст, **Куб**, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субсредиз*.); Pa(К); [Pl.] <Pm>
986. ★*O. militaris* L. (*O. stevenii* Reichenb. fil. p.p.) - Я. вооружённый = III(Ст, **Куб**, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); S, Pa(К); [R.] <Pm>
987. ★*O. simia* Lam. - Я. обезьяний = III(**Куб**, П, КР, Ч); IV(СЗЗ): (Субсредиз*.); Pb(К); [Rs.] <Pm>
988. ★*O. purpurea* Huds. - Я. пурпурный = III(Ст, **Куб**, П, КР, Л, УН, ОС, Ч); IV(СЗЗ); V(Касп): (Европ.); S, Pa(К); [Rs.] <Pm>
989. ★*O. punctulata* Stev. ex Lindl. (*O. schelkownikowii* Woronow) - Я. мелкоточечный = IV(СЗЗ): (Зап.др.средиз.); S(К); [R.]<Pm>
990. *O. x wulfiana* Soo - Я. Вульфа = IV(ТА - басс. р. Аше: **Тимухин, 2010**): (Средиземн.); Pa(К); [R.]

Genus 268. Anacamptis Rich. - Анакамптис

991. ★*A. pyramidalis* (L.) Rich. - А. пирамидальный = III(**Куб**, Э, ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субсредиз*.); Pb(К); [R.] <Pm>

Genus 269. Traunsteinera Reichenb. - Траунштейнера

992. ★*T. globosa* (L.) Reichenb. - Т. шаровидная = III(П, Кисл, Б, ОС); IV(СЗЗ); V(БН, Касп, ЦД): (Евро-Кавк.); Pb(К); [Rs.] <Pm>
993. *T. sphaerica* (Bieb.) Schlechter - Т. сферическая = III(ЗК, Э, ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [R.] <Pm>

Genus 270. Steveniella Schlechter - Стевениелла

994. ★*S. satyrioides* (Stev.) Schlechter - С. сатириовидная = III(КР, ВЛ); IV(СЗЗ); V(Касп): (Субкавк*.); S, Pa(К); [Rs.]

Genus 271. Himantoglossum W.D.J.Koch - Ремнелепестник

995. ★*H. caprinum* (Bieb.) C.Koch - Р. козий = IV([Н: Малый Утриш, Литвинская, 2004]): (Кр.-Новоросс.); Pb(К); [Rs.]

996. ★*H. formosum* (Stev.) C.Koch - Р. прекрасный = II(Кизл); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Pa(К); [Rs.] <Rg>

Genus 272. Serapias L. - Серапиас

997. ★*S. vomeracea* (Burm. fil.) Briq. - С. сошниковый = IV(ТА): (Зап.др.средиз.); Aa(К); [Rs.] <Pm>

Genus 273. Ophrys L. - Оффрис

998. ★*O. caucasica* Woronow ex Grossh. - О. кавказская = II(Кизл - с.Нечаевка); IV(СЗЗ); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Pa(К); [Rs.] <Pm>

999. ★*O. taurica* (Agg.) Nevsky - О. крымская = IV(ТА): (Кр.-Новоросс.); S,Pa(К); [Rs.] <Pm>

1000. ★*O. oestifera* Bieb. - О. оводоносная = III(КР,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп): (Эвксин.); Pa(К); [Rs.] <Pm>

1001. ★*O. apifera* Huds. - О. пчелоносная = IV(СЗЗ): (Средиземн.); S,Pb(К); [Rs.] <Pm>

Genus 274. Epipogium J.S.Gmel. ex Borkh. - Надбородник

1002. ★*E. aphyllum* (F.M.Schmidt) Sw. - Н. безлистный = III(ВЛ,ТЗ); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Палеаркт.); S(К:sap); [R.]

Genus 275. Corallorhiza Chatel. - Ладьян

1003. *C. trifida* Chatel. - Л. трёхнадрезанный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Л,УН,Ч,Б,ОС,ВС); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Голаркт.); S(К:sap); [R.]

Classis XI. Magnoliopsida - Магнолиевидные (Двудольные)

Ordo 43. Salicales - Ивоцветные

Familia 62. Salicaceae Mirb. - Ивовые

Genus 276. Populus L. - Тополь

1004. *P. alba* L. - Т. белый (Белолистка) = I(НД,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,П): (Палеаркт.); Aa(Phms); [Pl.]

1005. *P. canescens* (Ait.) Smith (*P. hybrida* Bieb.) - Т. сереющий = I(НК: Проханов, 1950,М); II(ВП); III(Куб,П,Каб,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Aa(Phmg); [Sp.]

1006. *P. tremula* L. - Т. дрожащий (Осина) = I(НД); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); S(Phmg); [Pl.] <Pm>

1007. *P. villosa* Lang. - Т. мохнатый = III(ЦЭ); V(ЦД): (Европ.); S(Phmg); [R.]

1008. *P. nigra* L. - Т. чёрный (Осокорь) = I(НД,НК,М - Терек); II(ВП); III(Куб,П,Каб); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Палеаркт.); Aa(Phms); [Sp.] <Pm>

1009. *P. sosnovskyi* Grossh. - Т. Сосновского = I(Прик,НК); II(КН); III(П,Каб); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); S,Aa(Phmg); [R.]

Genus 277. *Salix* L. - Ива

1010. *S. triandra* L. (*S. medvedevii* Dode) - И. трёхтычинковая = I(НД,ЗПМ,АЕ,МД,НК,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,СК,П,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Aa(Phn); [Sp.] Pmel
1011. *S. pentandra* L. - И. пятитычинковая (Чернотал) = I(НД): (Палеаркт.); Aa(Phn); [Sp.] <Pmel>
1012. *S. pentandroides* A. Skvorts. - И. пятитычинковидная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phm); [Sp.] <Esub>
1013. *S. alba* L. - И. белая = I(Тем,Т,КЕ,Прик,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Aa(Phm); [Pl.] <Pm;Pmel>
1014. *S. excelsa* S.G.Gmel. (*S. australoir* Anderss.) - И. возвышенная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Л,БУН,Б,ОС); V(Касп): (Ирано-Туран.); Aa(Phms); [Sp.] <Pmel>
1015. *S. fragilis* L. - И. ломкая = II(Кизл); III(Ст,Куб,П,Кисл,ЧО); IV(Н): (Палеаркт.); Aa(Phm); [Sp.] <Pmel>
1016. *S. hastata* L. (*S. apoda* Trautv.) - И. копьевидная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); V(АС): (Палеаркт.); Pс(Phn); [Pl.]
1017. *S. kuznetzowii* Laksch. ex Goerz - И. Кузнецова = III(ТЗ,ЦЭ,ВК); V(Дар): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phn); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Кураг
1018. *S. caucasica* Anderss. - И. кавказская = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(Phn); [Pl.]
1019. *S. caprea* L. - И. козья = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,ЦЭ,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); S(Phm); [Pl.] <Pm;Pmel>
1020. *S. cinerea* L. - И. серая = I(Т,Тем,Прик,ТБ); II(КН); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Aa,S(Phn); [Sp.] <Pmel>
1021. *S. phlomoides* Vieb. (*S. aegyptiaca* L.; *S. pseudomedemii* E.Wolf) - И. железняковидная = II(Кизл - Кизляр: Муртазалиев, 2009); III(ЛН,ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,Л,Ч): (Кавк.: Общекавк.); S(Phn); [R.] <Pmel>
1022. *S. bebbiana* Sarg. (*S. xerophila* B. Floder., *S. pseudodepressa* Skvortzs.; *S. starkeana* Willd.) - И. Бебба = [III(ЦЭ - Малка); V(АС)]: Гроссгейм, 1945): (Голаркт.); Pс(Phn); [R.] <Rg>
1023. *S. kazbekensis* A. Skvorts. (*S. arbuscula* L.) - И. казбекская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Phn); [Pl.] <Esub> l.c. г. Казбек
1024. *S. viminalis* L. - И. корзиночная = I(НД,КЕ); III(Ст,П,Х): (Палеаркт.); Aa(Phn); [R.] <Pm;Pmel>
1025. *S. pantosericea* Goerz - И. шелковистая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pс(Phn); [Sp.] <Esub> l.c. верх. р. Теберды
1026. *S. acutifolia* Willd. - И. остролистная = I(Прик); II(КН); V(Касп): (Европ.); Db(Phm); [R.]
1027. *S. purpurea* L. - И. пурпурная = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(Касп,ЦД,АС): (Палеаркт.); Aa(Phm); [Pl.] <Pmel>
1028. *S. caspica* Pall. - И. каспийская = I(М); II(Кизл); III(Э,УН,ОС); V(Касп,ЦД): (Субтуран*.); Aa(Phn); [Sp.] <Pmel>

1029. *S. wilhelmsiana* Goerz - И. Вильгельмса = II(КН); V(БН): (Ирано-Туран.); Aa(Phm); [R.]

Ordo 44. Juglandales - Орехоцветные

Familia 63. Juglandaceae A.Rich. ex Kunth - Ореховые

Genus 278. Pterocarya Kunth - Лапина

1030. ★*P. pterocarpa* (Michx.) Kunth ex Iljinsk. (*P. fraxinifolia* (Poir.) Spach) - Л. крылоплодная = IV(ТА); V(Касп - низ. Самура): (Субкавказ*.); S(Phms); [R.]

Genus 279. Juglans L. - Орех

1031. **J. regia* L. - О. грецкий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЦЭ,Тер); IV(СЗЗ); V(Даг): (Вост.средиз.); S(Phms); [Sp.] <Pa>

Ordo 45. Coryales - Лещиноцветные

Familia 64. Corylaceae Mirb. - Лещиновые

Genus 280. Carpinus L. - Граб

1032. *C. caucasica* Grossh. (*C. betulus* L.) - Г. кавказский = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавказ.); S(Phms); [Soc.]

1033. *C. orientalis* Mill. - Г. восточный = III(КР); IV(СЗЗ); V(Касп): (Вост.средиз.); Da(Phm); [Sp.]

Genus 281. Ostrya Scop. - Хмелеграб

1034. ★*O. carpinifolia* Scop. - Х. обыкновенный = III(Х,МА,ТЗ,Кисл, Л,Ч); IV(СЗЗ): (Вост.средиз.); S(Phmg); [R.]

Genus 282. Corylus L. - Лещина

1035. *C. avellana* L. - Л. обыкновенная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>

1036. ★*C. iberica* Wittm. ex Kem.-Nath. (*C. colurna* L.) - Л. грузинская = III(ТЗ,ОС); IV(ТА); V(ЦД): (Кавк.: Общекавказ.); S(Phmg); [Rs.]

Familia 65. Betulaceae S.F.Gray - Берёзовые

Genus 283. Betula L. - Берёза

1037. ★*B. raddeana* Trautv. - Б. Радде = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); S, Da(Phms); [Sp.] <Esub> l.c. Гуниб

1038. *B. litwinowii* Doluch. - Б. Литвинова = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавказ*.); S(Phms); [Pl.]

1039. *B. pubescens* Ehrh. - Б. пушистая = III(Ст,П: Танфильев, Кононов, 1987,Каб,ЧО): (Евро-Сиб.); S(Phms); [Sp.] <Pm>

1040. *B. pendula* Roth (*B. verrucosa* Ehrh.) - Б. плакучая = III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S(Phms); [Sp.] <Pm>

Genus 284. Alnus Mill. - Ольха

1041. *A. incana* (L.) Moench - О. серая = III(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Панбор.); S(Phms); [Pl.] <Pm>

1042. *A. glutinosa* (L.) Gaertn. - О. клейкая = III(Куб,ЗК,ЦЭ,Тер,ВК); IV(СЗЗ): (Палеаркт.); S(Phms); [Pl.] <Pm>

1043. *A. barbata* С.А.Меу. - О. бородастая = I(М - Терек); III(Куб,Л, УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Субкавказ*.); Aa(Phms); [R.]

Ordo 46. Fagales - Букоцветные

Familia 66. Fagaceae Dumort. - Буковые

Genus 285. Fagus L. - Бук

1044. *F. orientalis* Lipsky - Б. восточный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавказ*.); S(Phmg); [Sp.]

Genus 286. Castanea Hill - Каштан

1045. *C. sativa* Mill. - К. съедобный = III(Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Средиземн.); S(Phmg); [R.]

Genus 287. Quercus L. - Дуб

1046. *Q. robur* L. (*Q. pedunculata* Ehrh.; *Q. pedunculiflora* C. Koch; *Q. longipes* Stev.; *Q. imeretina* Stev. ex Woronow) - Д. черешчатый (сильный) = I(НД,АК,КЕ,Т,НК,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); S(Phms); [Pl.] <Pm>

1047. *Q. petraea* L. ex Liebl. (*Q. iberica* Stev.; *Q. medwedewii* Sosn.; *Q. dalechampii* Ten.; *Q. calcarea* Troitz.) - Д. скальный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); S(Phms); [Pl.] <Pm>

1048. *Q. hartwissiana* Stev. - Д. Гартвиса = III(МА,Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Эвксин.); S(Phms); [R.]

1049. *Q. macranthera* Fisch. et C.A.Mey. - Д. крупнопыльниковый = III(ЦЭ,ОС,ВС); V(Касп,ЦД,АС): (Субкавказ*.); S(Phms); [Sp.]

1050. *Q. pubescens* Willd. (*Q. crispata* Stev.) - Д. пушистый = II(Кизл - севернее Махачкалы: Меницкий, 1984); III(Ст,МА,КР,ЧК,П,УН,Ч); IV(Н); V(Касп): (Субсредиз*.); Da(Phms); [Sp.]

Ordo 47. Urticales - Крапивоцветные

Familia 67. Ulmaceae Mirb. - Ильмовые

Genus 288. Ulmus L. - Ильм

1051. *U. laevis* Pall. - И. гладкий = I(НД,КЕ); III(Ст,Куб,Х,ВЛ,П): (Европ.); S(Phms); [R.]

1052. *U. glabra* Huds. (*U. scabra* Mill., *U. sukaczewii* Andron.) - И. шершавый = III(Ст,Куб,ТЗ,П,ЧО); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); S(Phms); [R.]

1053. *U. minor* Mill. (*U. carpinifolia* Rupr. ex Suckow, *U. campestris* L., *U. foliacea* Gilib.) - И. малый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); S,Аа(Phm); [Sp.] <Pm>

1054. *U. suberosa* Moench - И. пробковый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл,Л); IV(СЗЗ); V(Дар): (Зап.др.средиз): S(Phm); [Sp.]

Genus 289. Celtis L. - Каркас

1055. *C. caucasica* Willd. - К. кавказский = III(Ч); V(Дар): (Ирано-Туран.); Da(Phm); [R.]

1056. *C. glabrata* Stev. ex Planch. (*C. planchoniana* K.I.Chr.) - К. оголённый = III(Ст,П,ЦЭ,ВС); V(Дар): (Субкавказ*.); Da(Phn); [R.]

Familia 68. Moraceae Link - Тутовые

Genus 290. Morus L. - Шелковица

1057. **M. alba* L. - Ш. белая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Адвент. [Китай]); Rb(Phms); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>

1058. **M. nigra* L. - М. чёрная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Адвент. [Передняя Азия]; Rb(Phms); [Sp.]<Pm;Pa,Pmel.>

Genus 291. Maclura Nutt. - Маклюра

1059. **M. pomifera* (Rafin.) Schneid. (*M. aurantiaca* Nutt.) - М. яблочная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СКТ); IV(СЗЗ):** (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(Phms); [R.] <Pm>

Genus 292. Ficus L. - Инжир

1060. **F. carica* L. - И. обыкновенный = **IV(СЗЗ); V(Касп):** (Адвент. [Малая Азия]); S,Rb(Phm); [Sp.]<Pa>

Familia 69. Cannabaceae Endl. - Коноплёвые

Genus 293. Humulus L. - Хмель

1061. *H. lupulus* L. - Х. обыкновенный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Голаркт.); S,Аа(НК:lh); [Pl.] <Pa;Pm>

Genus 294. Cannabis L. - Конопля

1062. *C. ruderalis* Janisch. (*C. sativa* L.) - К. сорная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Понт.-Южносиб.); Ra,Rb(T); [Sp.]

Familia 70. Urticaceae Juss. - Крапивовые

Genus 295. Urtica L. - Крапива

1063. *U. urens* L. - К. жгучая = **I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,Х,ТЗ,П,СК,Л,ЧО); IV(Н):** (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.] <Pm>

1064. *U. dioica* L. - К. двудомная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pa>

Genus 296. Parietaria L. - Постенница

1065. *P. officinalis* L. (*P. erecta* Mert. et Koch) - П. лекарственная = **V(Касп):** (Зап.др.средиз); S(НК); [R.]

1066. *P. judaica* L. - П. иудейская = **III(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); V(Дар):** (Общедр.средиз.); Da(НК); [Pl.]

1067. *P. caespitosa* Jarm. (*P. elliptica* C.Koch) - П. дернистая = **V(ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Цудахар

1068. *P. serbica* Panc. (*P. chersonensis* (Lang et Szov.) Jarm.) - П. сербская = **III(Куб,Кисл,Тер); IV(Н); V(Касп):** (Вост.средиз.); S(T); [R.]

1069. *P. micrantha* Ledeb. - П. мелкоцветковая = **III(ЗК,Э,ВК); IV(ТА); V(АС):** (Палеаркт.); S(T); [Sp.]

Ordo 48. Santalales - Сандалоцветные

Familia 71. Viscaceae Batsch (*Loranthaceae*) - Омёловые

Genus 297. *Arceuthobium* Vieb. - Арцеутобиум

1070. *A. oxycedri* (DC.) Vieb. (*Razoumofskya oxycedri* (DC.) F.Schultz) - А. можжевельниковый = III(КР,ОС); IV(Н); V(Даг): (Ирано-Туран.); S(Phn); [R.]

Genus 298. *Viscum* L. - Омёла

1071. *V. album* L. - О. белая = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); S(Phn:hpar:ep); [Sp.] <Pm>

Familia 72. Santalaceae R.Br. - Сандаловые

Genus 299. *Thesium* L. - Ленец

1072. *Th. maritimum* C.A.Mey. - Л. приморский = ([II(Кизл); V(Касп - Сарыкум): Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Db(НК); [R.] <Esub>

1073. *Th. szowitsii* DC. - Л. Шовица = V(АС - Мискинджа: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [R.]

1074. *Th. procumbens* C.A.Mey. - Л. простёртый = I(АК - ст. Шкуринская, КЕ - ст. Рождественская); III(ТЗ,П,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(Даг): (Евро-Кавк.); Pa(НК:hpar); [Sp.]

1075. *Th. arvense* Horvatovszky (*Th. ramosum* Hayne) - Л. полевой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субтуран*.); Pa(НК:hpar); [Pl.]

1076. *Th. brachyphyllum* Boiss. - Л. коротколистный = V(ЦД: Муртазалиев, 2009): (Вост.средиз.); ST(НК): [R.]

1077. *Th. alpinum* L. - Л. альпийский = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС): (Европ.); Pb,Pc(НК:hpar); [Sp.]

Ordo 49. Aristolochiales - Кирказоноцветные

Familia 73. Aristolochiaceae Juss. - Кирказоновые

Genus 300. *Asarum* L. - Копытень

1078. *A. ibericum* Stev. ex Ledeb. (*A. intermedium* (C.A.Mey.) Grossh.; *A. caucasicum* (Dusch.) N.Busch) - К. грузинский = III(ВЛ,ТЗ,Э,Л); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.] <Pt;Pm>

Genus 301. *Aristolochia* L. - Кирказон

1079. *A. iberica* Fisch. et C.A.Mey. ex Boiss. - К. грузинский = IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(К); [R.]

1080. *A. steurii* Woronow - К. Штейпа = III(Куб,Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); S(К); [R.] <Esub> l.c. окр. Сочи

1081. *A. clematitis* L. - К. ломоносовидный = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,Л,ЧО,Ч): (Евро-Кавк.); S(НК); [Pl.] <Pt;Pm>

Ordo 50. Polygonales - Гречишкоцветные

Familia 74. Polygonaceae Juss. - Гречишковые

Genus 302. *Rumex* L. - Щавель

1082. *R. acetosella* L. - Щ. воробьиный = III(Ст,Х): (Евро-Сиб.); Pa,Rb(НК); [Pl.]

1083. *R. acetoselloides* Bal. - Щ. кисловатый = **III**(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Эвксин.); Pb(НК); [Pl.] <Pm>
1084. *R. hastifolius* Bieb. (*R. scutatus* L.) - Щ. копельистный = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); **IV**(СЗЗ); **V**(ЦД,АС): (Общедр.средиз.); Da(НК); [Sp.]
1085. *R. acetosa* L. - Щ. кислый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Голаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pa,Pm>
1086. *R. arifolius* All. - Щ. аронниколистный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Средиземн.); Pb(НК); [Pl.]
1087. *R. thyriflorus* Fingerh. - Щ. пирамидальный = **III**(Ст,Куб,СК,П,Кисл,ЧО,ТС); **V**(Касп): (Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.]
1088. *R. euxinus* Klok. (*R. tuberosus* L.) - Щ. черноморский = **III**(Ст,КР,ТЗ,СК,П,ТС,Л,Ч); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Общедр.средиз.); Pa(НК); [Pl.]
1089. *R. hydrolapathum* Huds. - Щ. прибрежный = **I**(Т,Тем,НК); **II**(КН): (Европ.); Aa(НК); [R.]
1090. *R. crispus* L. - Щ. курчавый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Голаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
1091. *R. stenophyllus* Ledeb. - Щ. узколистный = **I**(ЗП,МД,НК); **II**(КН); **III**(Ст): (Субтуран*.); Aa(НК); [R.]
1092. *R. patientia* L. - Щ. шпинатный = **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЧК,СКТ,П,Кисл,Ч); **V**(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]
1093. *R. aquaticus* L. - Щ. водяной = **I**(НК); **II**(ВП); **V**(ЦД - Аракани: Муртазалиев, 2009): (Палеаркт.); Aa(НК); [R.] <Pm>
1094. *R. alpinus* L. - Щ. альпийский = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Европ.); Pb,Pc(НК); [Pl.] <Pm>
1095. *R. confertus* Willd. - Щ. конский = **I**(НД,ЗПМ,АЕ); **III**(Ст,Куб,ЧК,Кисл,Л,Ч): (Палеаркт.); Pa,Pb(НК); [R.] <Pm>
1096. *R. sanguineus* L. - Щ. кровавой = **III**(Ст,Куб,Х,ВЛ,ТЗ,П,Л,Ч); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Палеаркт.); S,Aa(НК); [Sp.]
1097. *R. conglomeratus* Murr. - Щ. клубковатый = **I**(Тем,Т); **III**(Куб); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Европ.); S,Aa(НК); [R.]
1098. *R. obtusifolius* L. - Щ. туполистный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Палеаркт.); S,Pa(НК); [Sp.] <Pm>
1099. *R. pulcher* L. - Щ. красивый = **I**(Тем,МД,НК); **II**(ВП); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп - Башлыкент, Гиджиятаг: Муртазалиев, 2009): (Субсредиз*.); Aa(НК); [R.]
1100. *R. halaczii* Rech. (*R. dentatus* L.) - Щ. Галачи = **I**(МД,НК); **II**(ВП); **III**(Куб: Зернов, 2006): (Ирано-Туран.); Aa(Т); [R.]
1101. *R. reticulatus* Bess. - Щ. сетчатый = **I**(МД,НК,М); **II**(ВП); **III**(СК); **V**(Касп,ЦД): (Армено-Иран.); Aa(Т); [R.]
1102. *R. maritimus* L. - Щ. морской = **I**(ЗП,ЦП); **II**(КН); **III**(Куб,СК); **IV**(Н): (Палеаркт.); Aa(НК); [R.]
1103. *R. marschallianus* Reichenb. - Щ. Маршалла = **I**(НД,АЕ - ст. Шкуринская); **II**(КН - Камыш-Бурун,Кизл): (Субтуран*.); Dc(НК); [R.]
1104. *R. longifolius* DC. (*R. domesticus* C.Hartm.) - Щ. длиннолистный = **III**(Куб,Л): (Голаркт.); Pa(НК); [R.]

1105. *R. ucranicus* Fisch. ex Spreng. - Щ. украинский = I(НД): (Палеаркт.); Db, Dc(T); [Sp.]

Genus 303. *Oxyria* Hill. - Кисличник

1106. *O. digyna* (L.) Hill (*O. elatior* R.Br. ex Meissn.) - К. двухпестичный = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Голаркт.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]

Genus 304. *Persicaria* Hill - Персикария (Гречишка)

1107. *P. amphibia* (L.) S.F.Gray (*Polygonum amphybiium* L.) - П.(Г.) земноводная = I(ЗП, МД, НК); II(ВП); III(Ст, Куб, ТЗ, СК, П, Каб); IV(СЗЗ): (Голаркт.); Aa, Ab(К); [R.]

1108. *P. orientalis* (L.) Spach. (*P. orientale* L.) - П.(Г.) восточная = I(Тем - Темрюк); II(Кизл); V(Касп): (Адвент. [Юго-Вост. Азия]); Rb(T); [R.]

1109. *P. lapathifolia* (L.) S.F.Gray (*P. lapatifolium* L., *P. tomentosum* Schrank) - П.(Г.) щавелелистная = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плюрирег.); Aa(T); [Sp.]

1110. *P. scabra* (Moench) Moldenke (*P. scabrum* Moench) - П.(Г.) шершавая = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(ТС); V(Дар): (Голаркт.); Rb(T); [Sp.]

1111. *P. maculata* (Rafin.) A. et D.Love (*P. maculatum* Rafin.; *P. persicaria* L.) - П.(Г.) почечуйная = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Aa, Ra, Rb(T); [Pl.] <Pm>

1112. *P. hydropiper* (L.) Spach (*P. hydropiper* L.) - П.(Г.) водяной перец = I(ЗП, ЦП); III(Ст, Куб, ТЗ, СК, П, Л, УН, Ч, ЧО); IV(СЗЗ): (Голаркт.); Aa(T); [Sp.]

1113. *P. minor* (Huds.) Opiz (*P. minus* Huds.) - П.(Г.) малая = I(НД, ЗПМ, АЕ, Тем, Т); III(Ст, Куб, П, ЧО): (Палеаркт.); Aa, Dc(T); [R.]

Genus 305. *Bistorta* Hill - Бисторта (Гречишка)

1114. *B. carnea* (C.Koch) Kom. (*Polygonum carneum* C.Koch) - Б.(Г.) мяскокрасная = III(ВЛ, ТЗ, Кисл, ЦЭ, Б, ОС, ВС); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Субкавк*.); Pb(НК); [Pl.] <Pm>

1115. *B. vivipara* (L.) S.F.Gray (*P. viviparum* L.) - Б.(Г.) живородящая = III(ВЛ, ТЗ, Кисл, ЦЭ, Б, ОС, ВС); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Голаркт.); Pb, Pc(НК); [Pl.]

Genus 306. *Aconogonon* (Meissn.) Reichenb. - Аконогонон

1116. *A. panjutinii* (Charkev.) Sojak (*Polygonum panjutinii* Charkev., *P. alpinum* All.) - А. Панютинна = III(ВЛ, ТЗ, Кисл, ЦЭ, Б, ОС, ВС); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

Genus 307. *Fagopyrum* L. - Гречиха

1117. *F. tataricum* (L.) Gaertn. - Г. татарская = II(Кизл); III(П); V(ЦД - Самур): (Палеаркт.); Ra(T); [Sp.]

Genus 308. *Polygonum* L. - Гречишка

1118. *P. maritimum* L. (*P. mesembricum* Chryek) - Г. морская = I(ЗП); IV(СЗЗ): (Голаркт.); Db(НК); [R.]

1119. *P. euxinum* Chrtek (*P. robertii* Loisel.) - Г. черноморская = IV(СЗЗ): (Средиземн.); Db(НК); [Sp.]

1120. *P. alpestre* C.A.Mey. (*P. ammanioides* Jaub. et Spach) - Г. предальпийская = III(ТЗ, Кисл, Б, ОС); V(ЦД, АС): (Субкавк.*); Do, Rb(НК); [Sp.]

1121. *P. arenastrum* Boreau (*P. littorale* Meissn.) - Г. прибрежная = I(Тем, Т, АК); III(Куб); IV(СЗЗ): (Субсредиз*.); Db(T); [R.]

1122. *P. aviculare* L. (*P. heterophyllum* Lindem.) - Г. птичья = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pm>

1123. *P. propinquum* Ledeb. - Г. близкая = **II(Кизл - низовья Терека: Цвелёв, 2012в):** (Понтич.); Dc(T); [R.]

1124. *P. neglectum* Bess. - Г. незамеченная = **I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Куб); IV(СЗЗ):** (Палеаркт.); Db,Rb(T); [Pl.]

1125. *P. ratuliforme* Vorosch. - Г. отклонённовидная = **II(Кизл); V(БН - Миатли: Муртазалиев, 2009):** (Понтич.); Db(T); [R.]

1126. *P. salsugineum* Vieb. - Г. солонцеватая = **I(ЗП,М); II(ВП); III(СК,П); V(Касп):** (Туранск.); Dc(T); [Sp.]

1127. *P. aschersonianum* H.Gross - Г. Ашерсона = **I(Тем):** (Зап.др.средиз.); Dc(T); [R.]

1128. *P. novoascanicum* Klok. - Г. новоасканийская = **I(НД,ЗПМ,АЕ, НК,М); II(ВП):** (Понтич.); Aa,Dc(T); [Sp.]

1129. *P. ratulum* Vieb. - Г. раскидистая = **I(Тем,Т,МД,АИ,НК); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,Л,ЧО); IV(Н); V(Касп):** (Палеаркт.); Aa,Rb(T); [Sp.]

1130. *P. bellardii* All. - Г. Белларда = **I(ЗП,ЦП); III(Ст,СКТ); IV(Н):** (Средиземн.); Rb(T); [Sp.]

1131. *P. pseudoarenarium* Klok. - Г. ложнопесчаная = **I(ЗП,МД,НК); II(ВП); III(Куб):** (Туранск.); Db(T); [Pl.]

1132. *P. argyroleon* Steud. ex G.Kunze - Г. серебристая = **I(М); II(ВП); III(ЧО); V(Касп):** (Туранск.); Rb(T); [R.]

Genus 309. Fallopia Adans. - Фаллопия

1133. *F. convolvulus* (L.) A.Love (*Polygonum convolvulus* L.; *Bilderdikia convolvulus* (L.) Dumort.) - Ф. вьюнковая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб, ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm>

1134. *F. dumetorum* (L.) Holub (*P. dumetorum* L.; *B. dumetorum* (L.) Dumort.) - Ф. кустарниковая = **I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ТЗ,Э,Тер); V(СЗЗ):** (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]

Genus 310. Atraphaxis L. - Курчавка

1135. *A. replicata* Lam. (*A. spinosa* L.) - К. отогнутая = **III(КР - Горячий Ключ); V(Даг):** (Ирано-Туран.); Da(Phn); [R.]

1136. *A. caucasica* (Hoffm.) Pavl. - К. кавказская = **III(ОС - верховья Терека):** (Ирано-Туран.); Da(Phn); [R.]

1137. *A. daghestanica* (O.Lovel.) O.Lovel. (*A. tournefortii* Joubert. et Spach.) - К. дагестанская = **V(Касп,ЦД,АС):** (Субкавказ*.); Da(Phn); [R.]

Genus 311. Calligonum L. - Джузгун

1138. *C. aphyllum* (Pall.) Guerke - Д. безлистный = **II(КН); V(Касп,ЦД):** (Туранск.); Db(Ch); [R.]

Genus 312. Reynoutria Hoult. - Рейнутрия

1139. **R. sachalinensis* (Fr.Schmidt) Nakai (*Polygonum sachalinense* Fr.Schmidt) - Р. сахалинская = **III(Ст,П,Кисл,[ЧО - Владикавказ: Комжа, 2004]); IV(СЗЗ):** (Адвент. [Сахалин, Северная Япония]; Rb(НК); [R.]

Ordo 51. Caryophyllales - Гвоздикоцветные

Familia 75. Chenopodiaceae Vent. - Маревые

Genus 313. Polycnemum L. Хруплявник

1140. *P. arvense* L. - Х. полевой = **I(ЗП,НК,М); II(ВП); V(Касп,ЦД)**: (Палеаркт.); Db,Rb(T); [R.]

1141. *P. majus* A.Br. - Х. большой = **I(ЗП); III(Ст,ЧК,СК,П,ЦЭ,ЧО,Б,ОС); V(БН,Касп,ЦД)**: (Субсредиз*.); ST,Rb(T); [R.]

Genus 314. Hablitzia Vieb. - Габлиция <GM>

1142. *H. tamnoides* Vieb. - Г. тамусовидная = **III(Ст,П,Кисл,Л,УН,Ч); V(Даг)**: (Субкавказ*.); Da(НК); [Sp.] l.c. окр. Пятигорска

Genus 315. Beta L. - Свекла

1143. *B. maritima* L. (*B. perennis* (L.) Freyn) - С. морская = **III(ВЛ); IV(Н); V(Касп - Гаджиятаг: Муртазалиев, 2009)**: (Евро-Кавк.); Db(НК); [Sp.]

1144. *B. macrorrhiza* Stev. - С. крупнокорневая = **V(Касп,ЦД)**: (Субкавказ*.); Da,Rb(НК); [R.]

1145. ★*B. trigyna* Waldst. et Kit. (*B. corolliflora* Zosimovic et Buttler) - С. трёхстолбиковая = **IV(Н)**: (Субкавказ*.); Rb(НК); [Sp.]

Genus 316. Chenopodium L. - Марь

1146. *Ch. botrys* L. - М. душистая = **III(Куб,ЧК,ТЗ,ЦЭ,Б,Л,ЧО); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Общедр.средиз.); Db(T); [Sp.]

1147. *Ch. chenopodioides* (L.) Aell. - М. толстолистная = **I(АК,МД,АИ,НК,Прик,ТБ); II(ВП)**: (Голаркт.); Aa,Dc(T); [R.]

1148. *Ch. glaucum* L. - М. сизая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Плюрирег.); ST,Rb(T); [Sp.]

1149. *Ch. rubrum* L. - М. красная = **I(НД,ЗПМ,АЕ,МД,АИ,НК); II(ВП); III(Ст,СК,ТС)**: (Голаркт.); Rb(T); [Sp.] <Pm>

1150. *Ch. polyspermum* L. - М. многосеменная = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Т,М); II(Кизл); III(Ст,ЛН,СК); IV(СЗЗ)**: (Евро-Сиб.); Dc(T); [R.]

1151. *Ch. hybridum* L. - М. гибридная = **I(Т,КЕ); III(Ст,Куб,ЧК,СКТ); IV(Н); V(Касп,ЦД)**: (Голаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]

1152. *Ch. urbicum* L. - М. городская = **I(АК,Т); III(Куб,ЧК,СК,ЧО); IV(Н); V(Касп)**: (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]

1153. *Ch. album* L. - М. белая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Плюрирег.); Rb(T); [Pl.] <Pm>

1154. *Ch. opulifolium* Schrad. - М. калинолистная = **I(МД,АИ,НК); III(Ст,Куб,П)**: (Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]

1155. *Ch. strictum* Roth. - М. торчащая = (**I(НК); II(ВП); IV(Касп)**): **Менцикий, 1994**: (Общ.др.средиз.); Rb(T); [R.]

1156. *Ch. vulvaria* L. - М. вонючая = **I(Тем,Т); II(КН); III(Ст,Куб,ЧК,СК,ЧО); V(Касп)**: (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.] <Pm>

1157. *Ch. sosnowskyi* Karpell. - М. Сосновского = **I(КЕ); III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); V(ЦД,АС)**: (Субкавказ*.); Rb(НК); [R.]

Genus 317. Blitum Scop. - Блитум

1158. *B. virgatum* L. (*Chenopodium foliosum* Aschers.) - Б. прутьевидный = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); V(Даг): (Палеаркт.); Da,Rb(T); [Pl.] <Pa>

Genus 318. Axyris L. - Аксирис

1159. *A. caucasica* (Somm. et Levier) Lipsky - А. кавказский = III(Кисл,ЦЭ,Б,ОС); V(ЩД,АС): (Кавк.: Эукавк.); ST,Do(T); [Sp.] <Ее> l.c. окр. сс. Учкулан и Хурзук

Genus 319. Atriplex L. - Лебеда

1160. *A. sagittata* Borkh. (*A. nitens* Schkuhr) - Л. копьелистная = I(Т,Тем,ЦП); II(Кизл); III(Ст,Куб,СК,П,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]

1161. *A. hortensis* L. - Л. садовая = I(НК); II(КН); III(АК,ТЗ); IV(СЗЗ): (Европ.); Rb(T); [R.]

1162. *A. aucheri* Moq. (*A. amblyostegia* Turcz.) - Л. Оше = I(АЕ - Азовское море,МД,НК); II(ВП): (Ирано-Туран.); Dc(T); [R.]

1163. *A. oblongifolia* Waldst. et Kit. - Л. удлинённолистная = I(НД,АЕ,АК,МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(Ст,СК,П); IV(Н); V(БН): (Евро-Кавк.); Rb(T); [R.]

1164. *A. patula* L. - Л. раскидистая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST,Da(T); [Pl.]

1165. *A. littoralis* L. (*A. transcontinentalis* Sukhor.) - Л. прибрежная = I(ЗП,М); III(Ст,Куб,СК,П): (Палеаркт.); Dc(T); [R.]

1166. *A. patens* (Litv.) Iljin - Л. поникшая = I(МД,АИ,НК,Прик,ТБ); III(Ст,П): (Субтуран*.); Dc(T); [Sp.]

1167. *A. calotheca* (Rafin) Fries (*A. hastata* L. nom. ambig.) - Л. красивоплодная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.]

1168. *A. micrantha* С.А.Меу. (*A. heterosperma* Bunge) - Л. мелкоцветная = I(НД,ЗПМ,АЕ,МД,АИ,НК,Прик); III(Ст); V(Касп): (Туранск.); Rb(T); [R.]

1169. *A. rosea* L. - Л. розовая = I(Т,МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(СК); IV(Н); V(БН,Касп): (Европ.); Rb(T); [R.] <Pm>

1170. *A. sphaeromorpha* Iljin - Л. шаровидная = I(МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(Ст,СК): (Субпонт*.); Db(T); [R.]

1171. *A. tatarica* L. - Л. татарская = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST,Da(T); [Pl.]

1172. *A. fominii* Iljin - Л. Фомина = V(Касп): (Ирано-Туран.); Db(T); [R.]

Genus 320. Halimione Aell. - Галимионе

1173. *H. verrucifera* (Bieb.) Aell. (*Atriplex verrucifera* Bieb.) - Г. бородавчатый = I(ЗП,МД,АИ,НК,М); II(Кизл); III(Ст,СК,П); IV(Н); V(Касп): (Вост.средиз.); Dc(Ch:sf); [Sp.]

1174. *H. pedunculata* (L.) Aell. (*A. pedunculata* L.) - Г. черешчатый = I(ЗП,ЦП); II(ВП): (Палеаркт.); Dc(T); [R.]

Genus 321. Krascheninnikovia Gueldenst. - Крашенинниковия (Терескен)

1175. *K. ceratoides* (L.) Gueldenst. (*Ceratoides papposa* Botsch. et Ikonn., *Eurotia ceratoides* (L.) C.A.Mey.) - К.(Т.) хохлатая = I(Прик - г.Брык,НК); III(Б,ОС); V(Даг): (Общедр.средиз.); ST, Da(Ch:sf); [R.]

Genus 322. Ceratocarpus L. - Рогоплодник

1176. *C. arenarius* L. - Р. песчаный = I(АЕ,АК,КЕ,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,П,ТС); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); SD(T); [Pl.]

1177. *C. utriculosus* Bluk (*C. turkestanicus* Sav.-Rucz. ex Iljin) - Р. мешочковый I(МД,АИ,НК); II(ВП); III(СК); V(Касп,АС): (Туранск.); ST,SD(T); [R.]

Genus 323. Panderia Fisch. et C.A.Mey. - Пандерия

1178. *P. pilosa* Fisch. et C.A.Mey. - П. волосистая = II(КН: Муртазалиев, 2009); V(Касп): (Субкавказ*.); Dc(T); [R.]

Genus 324. Camphorosma L. - Камфоросма

1179. *C. monspeliaca* L. - К. марсельская = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,ЦП); II(Кизл); III(Ст,СК); V(Касп): (Общедр.средиз.); Dc(Ch:sf); [R.] <Pp>

1180. *C. lessingii* Litv. - К. Лессинга = I(МД,АИ,НК,ТС); II(ВП); V(Касп): (Туранск.); SD(Ch:sf); [R.]

Genus 325. Kochia Roth - Прутняк

1181. *K. prostrata* (L.) Schrad. - П. простёртый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Общедр.средиз.); ST, Da(Ch:sf); [Pl.] <Pp>

1182. *K. laniflora* (S.G.Gmel.) Borb. - П. шерстистоцветковый = I(Прик,ТБ,НК,М); II(ВП); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Db(T); [R.]

1183. *K. scoraria* (L.) Schrad. - П. веничный = I(ЗП); III(Ст); IV(Н); V(Касп): (Общедр.средиз.); Rb(T); [Sp.] <Pm>

Genus 326. Bassia L. - Бассия

1184. *B. hyssopifolia* (Pall.) O.Kuntze (*Echinopsilon hyssopifolium* (Pall.) Moq.) - Б. иссополистная = I(НД,ЗПМ,МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(СК); IV(Н); V(Касп): (Общедр.средиз.); Dc(T); [R.]

1185. *B. sedoides* (Pall.) Aschers. (*E. sedoides* (Pall.) Moq.) - Б. очитковая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,П); IV(Н); V(Касп): (Вост.средиз.); Dc(T); [Sp.]

1186. *B. hirsuta* (L.) Aschers. (*E. hirsutum* (L.) Moq.) - Б. волосистая = I(ЗПМ,Тем,Прик - г.Брык); III(СК); IV(Н); (Общедр.средиз.); Dc(T); [R.]

Genus 327. Corispermum L. - Верблюдка

1187. *C. caucasicum* (Iljin) Iljin (*C. aralo-caspicum* Iljin) - В. кавказская = I(М); II(ВП); V(Касп): (Туранск.); Db(T); [Sp.]

1188. *C. nitidum* Schult. - В. лоснящаяся = I(НД,Тем); II([КН: Танфильев, Кононов, 1987]); IV(Н): (Понтич.); Db(T); [R.]

1189. *C. marschallii* Stev. - В. Маршалла = I(НД): (Европ.); Db(T); [R.]

1190. *C. orientale* Lam. - В. восточная = II(Кизл - южная часть); V(Касп): (Субпонт*.); Db(T); [R.]

1191. *C. hyssopifolium* L. - В. иссополистная = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Понтич.); Db(T); [R.]

Genus 328. Agriophyllum Bieb. ex C.A. Mey. - Кумарчик

1192. *A. squarrosus* (L.) Moq. (*A. arenarium* Bieb. ex C.A. Mey.) - К. оттопыренный = I(МД,АИ,НК,М); II(ВП); V(Касп): (Субтуран*.); Db(T); [Sp.]

Genus 329. Halopeplis Bunge ex Ung. Sternb. - Сорovníк

1193. *H. pygmaea* (Pall.) Bunge ex Ung.-Sternb. - С. низкий = II(ВП): (Туранск.); Dc(T); [R.] l.c. низовья Кумы

Genus 330. Kalidium Moq. - Поташник

1194. *K. foliatum* (Pall.) Moq. - П. олиственный = II(ВП); V(Касп): (Туранск.); Dc(Ch); [R.]

1195. *K. caspicum* (L.) Ung.-Sternb. - П. каспийский = II(ВП); V(Касп): (Ирано-Туран.); Dc(Phn); [R.]

Genus 331. Halocnemum Bieb. - Сарсазан

1196. *H. strobilaceum* (Pall.) Bieb. - С. шишковатый = I(ЗПМ,Тем,Т,ЦП); II(ВП); V(Касп): (Общедр.средиз.); Dc(Ch:fl); [Sp.]

Genus 332. Halostachys C.A. Mey. - Соляноколосник

1197. *H. caspica* C.A. Mey. (*H. belangeriana* (Moq.) Botsch.) - С. каспийский = I(МД,АИ,НК); II(ВП); V(Касп): (Ирано-Туран.); Dc(Ch); [R.]

Genus 333. Salicornia L. - Солерос

1198. *S. europaea* L. (*S. herbacea* (L.) L.) - С. европейский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,П,ТС); IV(Н); V(Касп): (Голаркт.); Dc(T:ps); [Sp.]

Genus 334. Suaeda Forssk. ex Scop. - Сведа

1199. *S. microphylla* Pall. - С. мелколистная = I(МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(Ст); V(Касп): (Ирано-Туран.); Dc(Ch:fl); [Sp.] l.c. побережья Каспия между Кумой и Терекон

1200. *S. altissima* (L.) Pall. - С. высокая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК); V(Касп): (Ирано-Туран.); Dc(T); [Sp.]

1201. *S. dendroides* (C.A. Mey.) Moq. - С. древовидная = IV(Кизл); V(Касп): (Туранск.); Dc(Phn); [R.]

1202. *S. confusa* Iljin (*S. acuminata* (C.A. Mey.) Moq.) - С. запутанная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК); IV(Н); V(Касп): (Субтуран*.); Dc(T); [Pl.]

1203. *S. physophora* Pall. - С. вздутоплодная = V(Касп): (Туранск.); Dc(Phn); [R.]

1204. *S. salsa* (L.) Pall. - С. солончаковая = I(АК,КЕ,МД,АИ,НК,М); II(Кизл); III(Ст,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Туранск.); Dc(T); [R.]

1205. *S. prostrata* Pall. - С. простёртая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(СК); IV(Н): (Палеаркт.); Dc(T); [Sp.] <Pm>

Genus 335. Bienertia Bunge - Бинерция

1206. *B. cycloptera* Bunge ex Boiss. - Б. окружнокрылая = II(КН - Кума: Муртазалиев, 2009): (Ирано-Туран.); Dc(T); [R.]

Genus 336. Noaea Moq. - Ноэя

1207. *N. mucronata* (Forsk.) Aschers. et Schweif. - Н. остроконечная = V(Касп): (Вост.средиз.); ST(Phn:sf); [Sp.]

Genus 337. *Salsola* L. - Солянка

1208. *S. australis* R.Br. (*S. ruthenica* Iljin; *S. iberica* (Sennen et Pau) Botsch.; *S. pestifer* Nels.) - С. южная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб, СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Дар)**: (Общедр.средиз.); ST,SD,Rb(T); [Pl.]

1209. *S. tragus* L. (*S. kali* L.) - С. сорная (Курай) = **I(T); IV(СЗЗ)**: (Палеаркт.); Dc(T); [R.]

1210. *S. pontica* (Pall.) Degen - С. понтийская = **I(АК,Т); IV(СЗЗ)**: (Понтич.); Db(T); [R.]

1211. *S. paulsenii* Litv. (*S. pellucida* Litv.) - С. Паульсена = **I(КЕ - х. Родионов); II(Кизл); V(Касп)**: (Туранск.); Dc(T); [R.]

1212. *S. soda* L. - С. содоносная = **I(ЗП,МД,АИ,НК); II(Кизл); IV(Н); V(Касп)**: (Общедр.средиз.); Dc(T); [Sp.]

1213. *S. tamariscina* Pall. - С. тамарисковидная = **I(АЕ); II(ВП); V(Касп - устье р.Рубас)**: (Вост.средиз.); Da,Dc(T); [Sp.]

1214. *S. laricina* Pall. - С. лиственничная = **I(НД,ЗПМ,МД,АИ,НК,М); II(ВП); V(БН,Касп)**: (Туранск.); Dc(Ch:fl); [Sp.]

1215. *S. orientalis* S.G.Gmel. (*S. rigida* Pall.) - С. восточная = **II(КН: Танфильев, Кононов, 1987); V(Касп - Тарки: Муртазалиев, 2009)**: (Ирано-Туран.); Dc(Ch); [R.]

1216. *S. nitraria* Pall. - С. натронная = (**II(ВП); V(Касп)**): **Меницкий, 1994**): (Ирано-Туран.); Dc(T); [Sp.]

1217. *S. incanescens* С.А.Меу. - С. сероватая = **V(Касп)**: (Ирано-Туран.); Dc(T); [R.]

1218. *S. dendroides* Pall. - С. древовидная = **I(МД,АИ,НК,М); II(ВП); V(БН,Касп,[ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009)**: (Ирано-Туран.); Dc(Ch); [Sp.] <Pr>

1219. *S. ericoides* Vieb. - С. вересковидная = **II(ВП); V(БН,Касп,[ЦД - Ботлих: Муртазалиев, 2009])**: (Субкавказ*.); Dc(Phn); [R.] l.c. между р.р. Кура и Кума <Pr>

1220. *S. daghestanica* (Turcz.) Turcz. - С. дагестанская = **V(Касп,ЦД)**: (Кавк.: Эукавказ.); Dc,Dd(Ch); [R.] <Ее> l.c. Дагестан

Genus 338. *Halothamnus* Jaub. et Spach - Галотамнус

1221. *H. glaucus* (Bieb.) Botsch. (*Salsola glauca* Bieb.) - Г. сизый = **II(Кизл)**: (Ирано-Туран.); Dc(Phn); [R.]

Genus 339. *Caspia* Galushko - Каспия <GM>

1222. *C. foliosa* (L.) Galushko (*Salsola foliosa* (L.) Schrad.) - К. олиственная = **I(НК); II(ВП)**: (Субтуран*.); Dc(T); [R.]

Genus 340. *Climacoptera* Botsch. - Климакоптера

1223. *C. crassa* (Bieb.) Botsch. (*Salsola crassa* Bieb.) - К. мясистая = **I(М); II(ВП); V(Касп)**: (Туранск.); Dc(T); [Sp.]

1224. *C. brachiata* (Pall.) Botsch. (*S. brachiata* Pall.) - К. супротиволистная = **I(ЗПМ); II(ВП)**: (Вост.средиз.); Dc(T); [Sp.]

Genus 341. *Anabasis* L. - Анабазис

1225. *A. aphylla* L. - А. безлистный = **I(ЗПМ); II(ВП); V(Касп)**: (Ирано-Туран.); SD(Ch:sf); [Sp.] <Pt;Pm>

Genus 342. *Halanthium* C.Koch - Соляноцветник

1226. *H. kulpianum* (C.Koch) Bunge - С. кульпский = V(Касп - Сарыкум: Муртазалиев, 2009): (Субкавк*.); Dd(T); [R.]

1227. *H. rarifolium* C.Koch (*H. rariflorum* C.Koch) - С. редколистный = V(Касп - южн. часть: Муртазалиев, 2009): (Субкавк*.); Dd(T); [R.]

Genus 343. *Ofaiston* Rafin. - Офайстон <GD>

1228. *O. monandrum* (Pall.) Moq. - О. однотычинковый = ([I(АИ - Арзгир); II(КН - Терекли, Бажиганские пески)]; Меницкий, 1994): (Понтич.); Dc(T); [R.]

Genus 344. *Gamanthus* Bunge - Спайноцветник

1229. *G. pilosus* (Pall.) Bunge - С. волосистый = ([II(ВП); V(Касп)]; Муртазалиев, 2009): (Туранск.); Dc(T); [R.]

Genus 345. *Petrosimonia* Bunge - Петросимония

1230. *P. triandra* (Pall.) Simonk. - П. трёхтычинковая = I(ЗП,М); II(КН); III(Ст,СК,[П: Танфильев, Кононов, 1987]); IV(Н); V(Касп): (Субтуран*.); Dc(T); [Sp.] <Pr>

1231. *P. oppositifolia* (Pall.) Litv. (*P. crassifolia* (Pall.) Bunge) - П. супротиволистная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст); V(Касп): (Субтуран*.); Dc(T); [Sp.]

1232. *P. glaucescens* (Bunge) Ijin - П. сизоватая = I(Прик: Танфильев, Кононов, 1987); V(Касп): (Туранск.); Dc(T); [R.]

1233. *P. brachiata* (Pall.) Bunge - П. раскидистая = I(Тем,Т,МД,АИ,НК); II(ВП); IV(Н); V(Касп): (Ирано-Туран.); Dc(T); [R.] <Pr>

Familia 76. *Amaranthaceae* Juss. - Щирицевые

Genus 346. *Amaranthus* L. - Щирица

1234. *A. caudatus* L. - Щ. хвостатая = IV(ТА): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(T); [R.]

1235. *A. retroflexus* L. - Щ. запрокинутая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]

1236. *A. cruentus* L. (*A. paniculatus* L.; *A. hybridus* L.) - Щ. кровавая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ): (Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]

1237. *A. powellii* S.Wats. - Щ. Пауэла = IV(ТА): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(T); [R.]

1238. *A. hypochondriacus* L. - Щ. красноколосая = IV(ТА): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(T); [R.]

1239. *A. blitum* L. (*A. lividus* L.) - Щ. синеватая = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,СК,П): (Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]

1240. *A. viridis* L. - Щ. зелёная = III(МА); IV(ТА): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(T); [R.]

1241. *A. deflexus* L. - Щ. согнутая = IV(Н); V(Касп): (Адвент. [Южн.Америка]); Rb(T); [R.]

1242. *A. graecizans* L. - Щ. маскированная = I(М); II(КН); III(Куб,СК,П,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(T); [R.]

1243. *A. blitoides* S.Wats. - Щ. жминдовидная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(T); [Sp.]

1244. *A. albus* L. - Щ. белая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,П,ТС); IV(СЗЗ); V(Даг): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(T); [R.]

Familia 77. Cactaceae Juss. - Кактусовые

Genus 347. Opuntia Mill. - Опуния

1245. **O. humifusa* (Rafin.) Rafin. - О. распростёртая = III(Каб); IV(Н): (Адвент. [Сев.Америка]); ST, Da(Ch:sv:ps); [R.]

1246. **O. samanchica* Engelm. et Bigel. - О. каманчей = IV(ТА: Зернов, 2006); (Адвент. [Сев.Америка]); Da(Ch:sv:ps); [R.]

Familia 78. Phytolaccaceae R.Br. - Лаконосовые

Genus 348. Phytolacca L. - Лаконос

1247. *Ph. americana* L. - Л. американский = III(Ст - Ставрополь, Куб,П - Пятигорск); IV(СЗЗ): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(НК); [R.] <Pm>

Familia 79. Nyctaginaceae Juss. - Никтагиновые

Genus 349. Oxybaphus L'Her. ex Willd. - Оксифафус

1248. **O. nyctagineus* (Michx.) Sweet - О. никтагиниевый = III(Ст - Ставрополь): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(K); [R.]

Genus 350. Mirabilis L. - Мирабилис

1249. **M. jalapa* L. - М. слабительный (Ночная красавица) = I(НД); III(КР); IV(ТА): (Адвент. [Сев. и Юж. Америка]); Rb(K); [R.] <Po;Pm>

Familia 80. Molluginaceae Hutch. - Моллюговые

Genus 351. Mollugo L. Мутовчатка

1250. *M. cerviana* (L.) Ser. - М. маленькая = I(НД); IV(ТА - Сочи: Татанов, 2012): (Плюрирег.); Db(T); [R.]

Familia 81. Portulacaceae Juss. - Портулаковые

Genus 352. Portulaca L. - Портулак

1251. *P. oleracea* L. - П. огородный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pa;Pm>

Familia 82. Caryophyllaceae Juss. - Гвоздиковые

Genus 353. Spergula L. - Торица

1252. *S. arvensis* L. (*S. vulgaris* Boenn.) - Т. полевая = I(Т - Анапский р-н: Зернов, 2006); II(Кизл - Кочубей: Гусейнов, 1990); III(Ст,Куб,СКТ,Ч); IV(Касп - Махачкала: Муртазалиев, 2009): (Голаркт.); Db,Rb(T); [R.]

Genus 354. Spergularia (Pers.) L. et C.Presl. - Торичник

1253. *S. salina* J. et C.Presl (*S. marina* (L.) Griseb.) - Т. соляной = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,П); IV(Н); V(БН,Касп,[ЦД - Ахты: Муртазалиев, 2009]): (Плюрирег.); Dc(T); [Sp.]

1254. *S. rubra* (L.) J. et C.Presl (*S. campestris* (L.) Aschers.) - Т. красный = II(ВП); III(ЛН,СК); IV(Н); V(БН,Касп): (Евро-Сиб.); Dc(T); [R.]

1255. *S. maritima* (All.) Chiov. (*S. media* (L.) C.Presl., *S. marginata* (DC.) Kitt.) - Т. морской = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,П); IV(Н); V(БН,Касп):** (Субсредиз*.); Dc, Aa(T); [Pl.]

Genus 355. Paronichia Hill - Приноготовник

1256. ★*P. cephalotes* (Vieb.) Bess. - П. головчатый = **IV([Н - Новоросийск: Зернов, 2006]):** (Средиземн.); Da(НК); [Rs.]

Genus 356. Herniaria L. - Грыжник

1257. *H. glabra* L. (*H. suavis* Klok.) - Г. голый = **III(Ст: Лазьков, 1996б, ТЗ):** (Евро-Сиб.); Db, Rb(T); [R.] <Pm>

1258. *H. caucasica* Rupr. - Г. кавказский = **III(BC); V(ЦД, AC):** (Субкавказ*.); Do(Ch:sf); [Sp.]

1259. *H. hirsuta* L. (*H. cinerea* DC.) - Г. волосистый = **I(АК: Лазьков, 1996б, Тем, Т); III(Ст, Куб, Л, УН, Ч); IV(Н); V(Касп):** (Общедр.средиз.); Db, Dd(T); [R.] <Pm>

1260. *H. besseri* Fisch. ex Hornem (*H. incana* Lam.) - Г. Бессера = **I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ТЗ, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Общедр.средиз.); ST, Db(Ch:sf); [Pl.]

1261. *H. polygama* J.Gay - Г. многобрачный = **I(НД, ЗПМ, АЕ); III(Ст, СК):** (Понт.-Южносиб.); Da, Db(НК); [R.]

Genus 357. Arenaria L. - Песчанка

1262. *A. serpyllifolia* L. - П. чебрецелистная = **I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Голаркт.); Db, Rb(T); [Pl.]

1263. *A. uralensis* Pall. ex Spreng. - П. уральская = **I(НД, АЕ, АК, Тем):** (Европ.); Da, Db(T); [Sp.]

1264. *A. leptoclados* (Reichenb.) Guss. - П. тонковетвистая = **III(ОС); IV(Н); V(БН, Касп, ЦД):** (Европ.); Db, Rb(T); [R.]

1265. *A. rotundifolia* Vieb. - П. круглолистная = **III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); V(ТА); V(AC):** (Субкавказ*.); Pb(НК); [R.]

1266. *A. lychnidea* Vieb. - П. горицветная = **III(ЗК, ЦЭ, ВК); IV(ТА); V(ЦД, AC):** (Кавк.: Эукавказ.); Pc, Do(НК); [Pl.] <Esub>

Genus 358. Eremogone Fenzl - Пустынница

1267. *E. graminea* (C.A.Mey.) C.A.Mey. (*Arenaria graminea* C.A.Mey.) - П. злачная = **V(ЦД - Леваши: Муртазалиев, 2009):** (Субкавказ*.); Da(НК); [R.]

1268. *E. longifolia* (Vieb.) Fenzl (*A. longifolia* Vieb.) - П. длиннолистная = **I(НД, ЗПМ, АЕ, АК); III(Ст, ЛН, СК):** (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]

1269. *E. saxatilis* (L.) Ikonn. (*A. stenophylla* Ledeb.) - П. каменная = **I(Прик, ТБ); III(СК, П); V(ЦД - с. Чох: Гусейнов, 1990):** (Евро-Сиб.); ST(НК); [R.]

1270. *E. steveniana* (Boiss.) Ikonn. (*A. steveniana* Boiss.) - П. Стевена = **V(AC - Ахты): ST(НК);** (Субкавказ*.); ST(НК); [Sp.]

1271. *E. dianthoides* (Smith) Ikonn. (*A. dianthoides* Smith) - П. гвоздичная = **V([Касп - Чирюрт, AC - Хпедж, Микрах]: Муртазалиев, 2009):** (Субкавказ*.); Pb, Pc(НК); [R.]

1272. *E. holostea* (Vieb.) Rupr. (*A. holostea* Vieb.) = П. ланцетолистная = **III(ЦЭ, Б, ОС); V(ЦД, AC):** (Кавк.: Эукавказ.); Pb, Pc, Do(НК); [Sp.] <Esub>

1273. *E. biebersteinii* (Schlecht.) Holub (*A. biebersteinii* Schlecht.) - П. Биберштейна = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК); III(П): (Понтич.); ST(НК); [Sp.]

Genus 359. Dichodon (Bartl.) Reichenb. - Диходон

1274. *D. cerastoides* (L.) Reichenb. (*Cerastium cerastoides* (L.) Britt.; *C. trigyum* Vill.) - Д. ясколковый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Кисл,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(Даг): (Голаркт.); Pс(НК); [Pl.]

1275. *D. viscidum* (Bieb.) Holub (*C. dubium* (Bast.) Guepin; *C. anomalum* Waldst. et Kit.) - Д. клейкий = I(НД,Тем,МД,М - Терек); II(ВП); III(Ст,Куб,КР,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Субсредиз*.); Аа(Т); [R.]

Genus 360. Moehringia L. - Мерингия

1276. *M. trinervia* (L.) Clairv. - М. трёхжилковая = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); S(Т); [Sp.]

Genus 361. Bufonia L. - Бюфония

1277. *B. oliveriana* Ser. (*B. parviflora* Griseb.; *B. tenuifolia* L.) - Б. Оливье = I(КЕ - ст. Рождественская); IV(Н): (Субпонт*.); ST(Т); [Rs.] <Rx>

Genus 362. Cerastium L. - Ясколка

1278. *C. holosteoides* Fries (*C. caespitosum* Gilib) - Я. костенцевидная = I(КЕ,Прик); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Плюрирег.); Ра,Аа(НК); [Pl.]

1279. *C. arvense* L. - Я. полевая = I(ЦП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); Ра(НК); [Pl.]

1280. *C. argenteum* Vieb. - Я. серебристая = V(АС - Рутул: Гусейнов, 1990): (Кавк.: Эукавк.); Da,Do,Pb(НК); [R.] <Esub>

1281. *C. ponticum* Albov - Я. понтийская = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pс(НК); [Rs.] <Esub>

1282. *C. daghestanicum* Schischk. - Я. дагестанская = V(Касп): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. окр. с. Ахты

1283. *C. polymorphum* Rupr. - Я. полиморфная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б, ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [Pl.] <Esub>

1284. *C. glomeratum* Thuill. - Я. скученноцветковая = I(Т); III(КР,Куб,ТЗ,СК,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Плюрирег.); Db(Т); [Sp.]

1285. *C. brachypetalum* Desp. ex Pers. (*C. tauricum* Spreng.; *C. strigosum* Fries) - Я. короткопестная = I(Тем,Т); III(КР,СК,П); IV(Н); V(БН,Касп): (Евро-Кавк.); Rb(Т); [Sp.]

1286. *C. glutinosum* Fries (*C. pumilum* Curtis) - Я. липкая = I(Т); III(Ст,Куб,КР); IV(Н); V(БН,Касп): (Евро-Кавк.); Db,Dc(Т); [R.]

1287. *C. semidecandrum* L. - Я. пятитычинковая = I(Тем,Т,АЕ); III(Куб,ТЗ,СК,П); IV(Н); V(Даг): (Европ.); Ра(Т); [R.]

1288. *C. balearicum* F.Herm. (*C. dentatum* Moschl.) - Я. балерийская (зубчатая) = I(КЕ,Тем,Т); II(Кизл); III(Ст,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Субтуран*.); ST(Т); [Sp.]

1289. *C. sivaschikum* Kleorov - Я. сивашская = I(Т,Тем); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); ST(Т); [R.]

1290. *C. purpurascens* Adams - Я. пурпурная = III(Куб,ВЛ,ТЗ,Кисл,Э,Тер); IV(ТА); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.] <Pp>

1291. *C. ruderale* Vieb. - Я. сорная = **I**(АК,КЕ,М); **II**(ВП); **III**(СК,П,ТС); **V**(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Pa(T); [Sp.] l.c. Кизляр
1292. *C. dichotomum* L. - Я. вильчатая = **III**(Каб - Эльхотово: Соколова, 2012): (Европ.); Pa(T); [R.]
1293. *C. undulatifolium* Somm. et Levier - Я. волнистолистная = **III**(ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. г. Эльбрус
1294. *C. multiflorum* С.А.Меу. - Я. многоцветковая = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. окр. с. Коби
1295. *C. kasbek* Parrot - Я. казбекская = **III**(ЦЭ - Эльбрус,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. г. Казбек
1296. *C. davuricum* Fisch. ex Spreng. - Я. даурская = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Субтуран*.); S,Pa(НК); [Sp.]
1297. *C. hemschinicum* Schischk. - Я. хемшинская = **III**(ВЛ,ЦЭ,ВС - Арм-хи); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]
1298. *C. oreades* Schischk. - Я. горная = **III**(ТЗ,ЦЭ); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [R.]
1299. *C. holosteam* Fisch. ex Hornem. - Я. костенцовая = **III**(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,Э,Тер); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S(T); [Pl.]
1300. *C. meyerianum* Rupr. - Я. Мейера = **III**(П,Кисл,ТЗ,ЦЭ,Б,УН,ОС); **V**(АС: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. Владикавказа
1301. *C. nemorale* Vieb. - Я. лесная = **I**(ЗП,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **V**(Даг): (Евро-Кавк.); Rb(T); [Pl.]
1302. *C. perfoliatum* L. - Я. пронзённолистная = **I**(НД,МД,АИ,НК); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб); **IV**(Н); **V**(Касп): (Зап.др.средиз); Pa(T); [R.]
1303. *C. schmalhauseni* Pasz. - Я. Шмальгаузена = **I**(КЕ - Кавказская: Гроссгейм, 1945): (Понтич.); Db(T); [R.] <Rx>
- Genus 363. Stellaria L. - Звёздчатка**
1304. *S. media* (L.) Vill. - З. средняя = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Голаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pa,Pm>
1305. *S. neglecta* Weihe - З. незамеченная = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
1306. *S. pallida* (Dumort.) Pire (*Alsine pallida* Dumort.) - З. бледная = **I**(Т: Зернов, 2006): (Общердр.средиз.); Rb(T); [R.]
1307. *S. nemorum* L. - З. лесная = **III**(Куб,ВЛ,ТЗ,ЦЭ); **IV**(ТА); **V**(Касп): (Европ.); S(НК); [R.]
1308. *S. anagalloides* С.А.Меу. ex Rupr. - З. курослепная = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Sp.]
1309. *S. graminea* L. - З. злачная = **III**(Ст,Куб,ТЗ,ЧК,СКТ,Э); **IV**(Н): (Палеаркт.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1310. *S. persica* Boiss. - З. персидская = **III**(ЧК,ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА: Зернов, 2006); **V**(АС - верх. Самура): (Кавк.: Общекавк.); Pc(НК); [Sp.]
1311. *S. holostea* L. - З. ланцетовидная = **I**(М); **III**(Куб,ЧО,Ч); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); S(НК); [Sp.] <Pm>

Genus 364. *Holosteum* L. Костенец

1312. *H. glutinosum* (Bieb.) Fisch. et C.A.Mey. - К. липкий = I(M); III(Ст,СК); V(БН,Касп): (Ирано-Туран.); ST,SD(T:eph); [R.]

1313. *H. marginatum* Fisch. et C.A.Mey. - К. окаймлённый = III(П - Машук); V(Касп): (Субкавказ*.); ST,SD(T:eph); [R.]

1314. *H. umbellatum* L. - К. зонтичный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST,SD(T:eph); [Pl.]

Genus 365. *Myosoton* Moench - Мягковолосник <GM>

1315. *M. aquaticum* (L.) Moench (*Malachium aquaticum* Fries) - М. водный = I(Тем,Т,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]

Genus 366. *Minuartia* L. - Минурция

1316. *M. biebersteinii* (Rupr.) Schischk. - М. Биберштейна = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Да(НК); [Pl.] <Esub> l.c. окр. с. Садон

1317. *M. glomerata* (Bieb.) Degen - М. скученная = IV(Н): (Вост.средиз.); Да(Т); [R.]

1318. *M. buschiana* Schischk. (*M. setacea* (Thuill.) Hayek; *M. abchasica* Schischk.) - М. Буша = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавказ.); Да(НК); [Sp.] <Esub> l.c. г. Баранаха

1319. *M. sclerantha* (Fisch. et C.A.Mey.) Thell. - М. жёсткоцветковая = V(ЦД: Лазьков, 2012а): (Субкавказ*.); Pb(НК); [R.]

1320. *M. wiesneri* (Stapf) Schischk. - М. Визнера = III(КР); IV(Н); V(Касп,АС - Ахты): (Ирано-Туран.); Да(Т); [R.]

1321. *M. oreina* (Mattf.) Schischk. - М. горная = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавказ*.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]

1322. *M. hybrida* (Vill.) Schischk. - М. гибридная = III(Ст,СК,П); V(БН,Касп): (Субсредиз*.); ST,SD(Т); [R.]

1323. *M. viscosa* (Schreb.) Schinz et Thell. - М. липкая = I(НД,Тем,Т): (Европ.); Db(Т); [R.]

1324. *M. aizoides* (Boiss.) Bornm. - М. айзовидная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Субкавказ*.); Рс,Do(НК); [Sp.]

1325. *M. circassica* (Albov) Woronow (*M. caucasica* (Adams ex Rupr.) Mattf.) - М. черкесская = III(ВЛ,ТЗ,[П - Бештау: Танфильев, Кононов, 1987], Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавказ.); Да(НК); [Pl.]

1326. *M. rhodocalyx* (Albov) Woronow - М. красночашечная = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавказ.); Рс,Да(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Фишт

1327. *M. pseudoimbricata* Lazkov - М. ложночерепитчатая = III(ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавказ.); Рс,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. верх. р. Малки, г. Эльбрус

1328. *M. imbricata* (Bieb.) Woronow - М. черепитчатая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавказ.); Pb,Рс,Do(Ch:ppul); [Pl.]

1329. *M. inamoena* (C.A.Mey.) Woronow (*M. colchica* Charadze) - М. неприятная = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Рс,Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. г. Эльбрус

1330. *M. brotheriana* (Trautv.) Woronow (*M. trautvetteriana* Sosn. et Charadze) - М. Бротеруса = III(Б,ОС); V(АС - сс. Эчеда, Мокок, Кидеро: Гусейнов, 1990): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Ch:ppul); [R.] <Esub>

1331. *M. charadzeae* Lazkov (*M. ruprechtiana* Charadze) - М. Харадзе = III([ТЗ,ОС]: Лазьков, 2012а): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. с. Коби

1332. *M. verna* (L.) Hiern - М. весенняя = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pb,Pс,Do(НК); [Pl.]

Genus 367. Queria L. - Кверия

1333. *Q. hispanica* L. (*Minuartia hamata* (Hauskn. et Bornm.) Mattf.) - К. испанская = I(Т: Новосад, 1992); III(Ст,Прик - Бешпагир, СК,П,Л,УН,Ч,ТС); V(БН,Касп): (Зап.др.средиз); ST,SD(Т:eph); [R.]

Genus 368. Sagina L. - Мшанка

1334. *S. apetala* Ard. (*S. oxusepala* Boiss.) - М. безлепестная = IV(ТА: Зернов, 2006): (Кавк.: Общекавк.); Rb(НК); [R.]

1335. *S. procumbens* L. - М. лежачая = III(ВЛ,ТЗ,Б,ОС,ВС): (Палеаркт.); Pb,Pс,Do(НК); [Sp.]

1336. *S. saginoides* (L.) Karst. - М. обыкновенная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Палеаркт.); Pс,Do(НК); [Pl.]

1337. *S. nodosa* (L.) Fenzl - М. узловатая = III(ОС - Казбек); V(ЦД): (Голаркт.); Db(НК); [R.]

Genus 369. Scleranthus Boiss. - Дивала

1338. *S. annuus* L. - Д. однолетняя = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST,Rb(Т); [Pl.]

1339. *S. polycarpus* L. - Д. многоплодная = I(Тем,Т); III(Куб,КР,СК,П,Кисл,ЧО,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Субсредиз*.); Pa(Т); [Sp.]

1340. *S. uncinatus* Schur - Д. крючковатая = III(Ст,Куб,ВЛ, ТЗ,П,ЦЭ,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Общедр.средиз.); Da,Rb(Т); [Pl.]

Genus 370. Gypsophila L. - Гипсолюбка

1341. *G. elegans* Vieb. - Г. изящная = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Rb,Da,Do(Т); [Pl.]

1342. *G. heteropoda* Freyn - Г. разноногая = V(Касп: Лазьков, 2012б): (Туранск.); ST(НК); [R.]

1343. *G. silenoides* Rupr. - Г. смолёвковидная = IV(ТА: Зернов, 2006): (Субкавк*.); Pс(НК); [R.]

1344. *G. capitata* Vieb. - Г. головчатая = V([Касп,ЦД]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Pl.] <Esub>

1345. *G. glomerata* Pall.ex Adams - Г. скупенная = I(НД,Прик,ТБ,НК); III(Ст,КР,СК,П,Кисл); IV(Н): (Понтич.); Da(НК); [R.]

1346. *G. globulosa* Stev. ex Boiss. - Г. шаровидная = I(КЕ,Прик); III(Ст,ЧК,СК,П,Кисл): (Кавк.: Предкавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. г. Пятигорск

1347. *G. pallasii* Ikonn. - Г. Палласа = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [R.]

1348. *G. tenuifolia* Vieb. (*G. steurpii* Schischk.) - Г. узколистная = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pс,Do(НК); [Pl.]

1349. *G. altissima* L. - Г. высокая = **I(НК); II(ВП); V(БН,Касп):** (Евро-Сиб.); Db(НК); [Sp.]

1350. *G. paniculata* L. (*G. bicolor* (Freyn et Sint.) Grossh.) - Г. метельчатая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СКТ); IV(Н); V(БН,Касп):** (Субтуран*.); ST(НК); [Sp.] <Pm;Pmel;Po>

1351. *G. acutifolia* Fisch. ex Spreng. (*G. glauca* Stev. ex DC.; *G. stevenii* Fisch. ex Schrank) - Г. остролистная = **III(ЧК,СК,П,Кисл,ОС,ВС); V(Дар):** (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. г. Пятигорска

1352. *G. meyeri* Rupr. - Г. Мейера = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б); IV(ТА - верх. р. Бзыбь: Зернов, 2006):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. верх. Кубани

1353. *G. perfoliata* L. (*G. trichotoma* Wend.) - Г. пронзеннолистная = **I(Тем,МД,АИ,НК); II(ВП); IV(Н):** (Понт.-Южносиб.); Dc(НК); [Sp.]

1354. *G. scorzonerifolia* Ser. - Г. козелецелистная = **I(Прик,ТБ,НК,М); II(ВП); III(ТС); V(БН,Касп):** (Кавк.: Предкавк.); Db(НК); [R.] <Ee> l.c. Кизляр

1355. *G. imbricata* Rupr. - Г. черепитчатая = **III(ЦЭ,ОС); V(ЦД: Муртазалиев, 2009):** (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:ppul); [Sp.] l.c. р. Ардон выше Алагира. <Ee>

1356. *G. glandulosa* (Boiss.) Walp. - Г. железистая = **III(ЦЭ: Лазьков, 20126):** (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [R.]

Genus 371. Psammophilliella Иконн. - Псаммофилиелла

1357. *P. muralis* (L.) Иконн. (*Gypsophila muralis* L.) - П. постенная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,П,МА,СКТ); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД):** (Евро-Сиб.); Rb(Т); [R.]

Genus 372. Vaccaria N.M.Wolf - Тысячеголов

1358. *V. hispanica* (Mill.) Rauschert (*V. segetalis* Garcke; *V. pyramidata* Medik.) - Т. испанский = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ); IV(Н); V(БН: Муртазалиев, 2009):** (Плюрирег.); Ra(Т); [Sp.]

Genus 373. Saponaria L.- Мыльнянка

1359. *S. glutinosa* Vieb. - М. железистая = **I(Т); IV(Н):** (Вост.средиз.); ST(НК:pb); [Sp.]

1360. *S. officinalis* L. - М. лекарственная = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ):** (Европ.); Aa,Rb(НК); [Sp.] <Po;Pm>

1361. *S. orientalis* L. - М. восточная = **V(ЦД,АС):** (Вост.средиз.); ST(Т); [R.]

Genus 374. Dianthus L. - Гвоздика

1362. *D. armeria* L. - Г. армериевидная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,ТЗ,СКТ); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Евро-Кавк.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pm>

1363. *D. pseudoarmeria* Vieb. - Г. ложноармериевидная = **I(НД,АЕ); III(Ст,КР,СК,П,Кисл,ТС); IV(Н): V(Дар):** (Понтич.); ST,Da(НК:pb); [Sp.] <Po>

1364. *D. borbasii* Vandas - Г. Борбаша = **I(АК,Т); III(Ст); IV(Н):** (Понт.-Южносиб.); ST,Db(НК); [R.] <Po>

1365. *D. capitellatus* Klok. (*D. pseudomembranaceus* Schischk. ex Grossh.) - Г. мелкоголовчатая = **I(НД,[АК - Ейск: Гроссгейм, 1945]):** (Понтич.); ST,Rb(НК); [R.]

1366. *D. polymorphus* Vieb. - Г. изменчивая = **I**(ЗП,Прик,ТБ,НК); **II**(КН: Гусейнов, 1990); **III**(Ст,ЦЭ) **IV**(Н): (Понтич.); ST(НК); [R.] <Po>
1367. *D. ruprechtii* Schischk. - Г. Рупрехта = **III**(Куб,Э,Тер); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Pl.] <ESub> l.c. верх. р. Самур <Po>
1368. *D. capitatus* Balb. ex DC. - Г. головчатая = **I**(ЗП,Прик,ТБ,НК,М); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(Н); **V**(Даг): (Понтич.); Pa(НК); [Sp.] <Po>
1369. *D. caucaseus* Smith. (*D. discolor* Smith) - Г. кавказская = **III**(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.] l.c. Бештау
1370. *D. oshtenicus* Galushko - Г. оштенская = **III**(ВЛ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.] <Es> l.c. г. Оштен
1371. *D. vladimiri* Galushko - Г. Владимира = **V**(Касп,ЦД - г. Шалбуздаг): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <ESub> l.c. г. Шалбуздаг
1372. ★*D. acantholimonoides* Schischk. - Г. акантолимоновидная = **IV**(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Новороссийск
1373. *D. kubanensis* Schischk. - Г. кубанская = **I**(АК,КЕ); **III**(Куб); **IV**(Н): (Кавк.: Предкавк.); Pa(НК); [Sp.] l.c. Энем-Тохтамукай
1374. *D. kusnezovii* Marcowicz - Г. Кузнецова = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); **V**(АС - Самур: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [Sp.] <ESub>
1375. *D. imereticus* (Rupr.) Schischk. - Г. имеретинская = **III**(ВЛ,П,Л,Ч,ВС); **IV**(ТА); **V**(Касп - Терменлик: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Da(НК); [Sp.] <ESub> <Po>
1376. *D. campestris* Vieb. - Г. полевая = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Понт.-Южносиб.); Pa,Db,ST(НК); [Sp.]
1377. *D. pallidiflorus* Ser. - Г. бледноцветковая = **I**(НД,Прик,ТБ,НК,М); **II**(ВП); **III**(Ст,СК,П,ТС); **V**(БН): (Понтич.); ST(НК); [R.]
1378. *D. bicolor* Adams - Г. двуцветная = **III**(Ст,Куб,СК,П,ЧО); **V**(Касп): (Кавк.: Эукавк.); Pa,ST(НК); [R.] <Ee> l.c. Пятигорск
1379. *D. cretaceus* Adams - Г. меловая = **III**(ЧК,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК); [R.]
1380. *D. integerrimus* Bunge - Г. цельнокрайная = **III**(ВЛ,ТЗ,Б,ОС,ВС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
1381. *D. tlaratensis* Husseinov - Г. тляратинская = **V**(АС: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Es> l.c. с. Тлярата
1382. *D. daghestanicus* Charadze - Г. дагестанская = **III**(ОС,ВС,Ч); **IV**(АС): (Кавк.: Общекавк.); ST,Do(НК); [Sp.] <ESub> l.c. окр. с. Цуриб
1383. *D. elbrusensis* Charadze - Г. эльбрусская = **III**(ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); ST,Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. верх. р. Ирик
1384. *D. fragrans* Adams - Г. душистая = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Do(НК); [Sp.] l.c. Пятигорск
1385. *D. arenarius* L. - Г. песчаная = **I**(М - Терек): (Европ.); Db(НК); [Rs.] <Rx>
1386. *D. tichomirovii* Deviatov, Taisumov et Teimurov - Г. Тихомирова = **V**(ЦД - с. Курах): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Rs.] <Es> l.c. окр. с. Курах

1387. *D. awaricus* Charadze - Г. аварская = III(Ч,BC); V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Верхний Гуниб
1388. *D. pallens* Smith (*D. lanceolatus* Stev. ex Reichenb.) - Г. бледная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Понтич.); ST,Db(НК); [Pl.]
1389. *D. leptopetalus* Willd. - Г. тонколепестная = I(АИ - Турксад: Танфильев, Кононов, 1987): (Туранск.); ST(НК); [R.] <Rx>
1390. *D. schemachensis* Schischk. - Г. шемахинская = ([II(Кизл - Хасавюрт); V(БН,Касп,ЦД - Гимры,АС - Ахты]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); ST,Do(НК); [R.] <Esub>
1391. *D. inamoenus* Schischk. - Г. непривлекательная = V(ЦД - Агвали: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [R.]
1392. *D. jaroslavii* Galushko - Г. Ярослава = III(ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); ST,Da(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. с. Верхний Чегем
1393. *D. crinitus* Sm. - Г. косматая = V(ЦД - Гимринский хр.: Муртазалиев, 2009): (Субкавк*.); ST(НК); [R.]
1394. *D. orientalis* Adams - Г. восточная = IV(ЦД): (Субкавк*.); Do(НК); [R.]

Genus 375. Kohlrauschia Kunth - Кольраушия

1395. *K. prolifera* (L.) Kunth - К. побегоносная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); ST,Rb(T); [Sp.]

Genus 376. Petrorrhagia (Ser. ex DC.) Link - Петрорагия

1396. *P. saxifraga* (L.) Link (*Kohlrauschia saxifraga* (L.) Dandy; *Tunica saxifraga*(L.) Scop.) - П. камнеломка = III(ВЛ,ТЗ,Каб,ЧО); IV(ТА: Зернов, 2006): (Армено-Иран.); Db(T); [R.]

Genus 377. Velezia L. - Велезия

1397. *V. rigida* L. - В. жёсткая = I(Т: Зернов, 2006); II(Кизл - Кизляр: Муртазалиев, 2009); IV(Н: Зернов, 2006); V(Касп,[ЦД - Курах: Муртазалиев, 2009]): (Вост.средиз.); Da,Db(T); [R.]

Genus 378. Oberna Adans. - Оберна

1398. *O. cserei* (Baumg.) Ikonn. (*Silene cserei* Baumg.) - О. Черей = III(КР,СК,П); IV(СЗЗ); V(Касп,[ЦД - г. Маара: Муртазалиев, 2009]): (Понтич.); Da,Dd(НК); [R.]
1399. *O. behen* (L.) Ikonn. (*S. vulgaris* (Moench) Garcke; *S. latifolia* (Mill.) Britt et Rendle) - О. обыкновенная = I(НД,АЕ); III(Ст,П,СК,МА,ВЛ,Кисл,Л,УН.); IV(СЗЗ); V(Даг): (Плюрирег.); Pa(НК); [Pl.]
1400. *O. wallichiana* (Klotzsch) Ikonn. (*S. wallichiana* Klotzsch) - О. Уоллича = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb(НК); [Pl.]
1401. *O. pubicaulis* (Galushko ex Taisumov) Taisumov (*S. pubicaulis* Galushko nonen nudum) - О. опушенностебельная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.] l.c. окр. оз. Донгуз-орун
1402. *O. lacera* (Stev.) Ikonn. (*S. lacera* (Stev.) Sims.) - О. разрезная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [Sp.]

1403. *O. multifida* (Adams) Ikonn. (*S. multifida* (Adams) Rohrh.) - О. много-
рассечённая = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС):** (Кавк.:
Общекавк.); S(НК); [Pl.] <Rt>

1404. *O. procumbens* (Murr.) Ikonn. (*S. procumbens* Murr.) - О. лежачая =
III(Ст): (Понт.-Южносиб.): Db,Аа(НК); [Rs.] <Rg>

Genus 379. *Silene* L. - Смолёвка

1405. *S. nutans* L. - С. поникающая = **III(Ст,П):** (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Rs.]
<Rg;Pm>

1406. *S. italica* (L.) Pers. - С. итальянская = **I(АК,КЕ,[Прик,ТБ: Лазьков,
1996]); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Средиземн.); S,Pa(НК);
[Sp.]

1407. *S. alpicola* Schischk. - С. альпийская = **III(ВЛ); IV(ТА):** (Кавк.:
Эукавк.); Pc(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Большой Бамбак

1408. *S. caucasica* (Bunge) Boiss. - С. кавказская = **V(ЦД,АС):** (Кавк.: Об-
щекавк.); Pc(НК); [R.]

1409. *S. cerphalanth*a Boiss. - С. цветкоголовая = **V(ЦД: Лазьков, 2012в):**
(Кавк. Общекавк.); Pb,Pc(НК); [R.]

1410. *S. caespitosa* Stev. - С. дернистая = **V(АС - Базардюзю: Муртазалиев,
2009):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Da(НК:ppul); [R.] <Esub>

1411. *S. humilis* С.А.Мей. - С. низкая = **III(Б,ОС,ВС); IV(ЦД,АС):** (Кавк.:
Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>

1412. *S. ikonnikovii* Lazkov - С. Иконникова = **V(АС - пер. Кокмадаг:
Муртазалиев, 2009):** (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Rs.] <Es> l.c. Дагестан, Агуль-
ский р-н, пер. Кокмадаг

1413. *S. kubanensis* Somm. et Levier - С. кубанская = **III(ТЗ,ЦЭ):** (Кавк.:
Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Es> l.c. Теберда, Эльбрус

1414. *S. linearifolia* Otth - С. линейнолистная = **III(Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС);
IV(ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>

1415. *S. melikjanii* Taisumov et Teimurov (*S. austrodahestanica* Teimurov et
Taisumov nom. nudum) - С. Меликяна = **V(ЦД - Джуфудаг):** (Кавк.: Эукавк.);
Do(НК); [R.] <Es> l.c. г. Джуфудаг

1416. *S. lipskyi* Lazkov - С. Липского = **III(ЦЭ,Б,ОС):** (Кавк.: Эукавк.);
Do(НК); [R.] <Ee> l.c. г. Казбек

1417. *S. lychnidea* С.А.Мей. - С. горицветовидная = **III(ВЛ,ТЗ, ЦЭ,Б,ОС);
IV(ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. г. Эльбрус

1418. *S. rugmaea* Adams - С. карликовая = **III(ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС);
V(ЦД,АС):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub>

1419. *S. spergulifolia* (Desf.) Vieb. - С. торичниколистная = **III(ЦЭ,ОС,ВС);
V(ЦД,АС):** (Субкавк*.); Da(НК); [Sp.]

1420. *S. supina* Vieb. - С. приземистая = **II(Ст,СК,П,ОС):** (Понтич.);
Da(НК); [Sp.] l.c. Пятигорск

1421. *S. chlorifolia* Smith - С. зеленолистная = **III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); V(Даг):**
(Ирано-Туран.); Da(НК); [Sp.]

1422. *S. solenantha* Trautv. - С. трубчаточетковая = **V(АС):** (Кавк.:
Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Шалбуздаг

1423. *S. tatarica* (L.) Pers. - С. татарская = I(М - Терек: Гроссгейм, 1945, сборы Гюльденштедта): (Европ.); Db(НК); [R.]
1424. *S. compacta* Fisch.ex Hornem. - С. скученноцветковая = III([СК: Лазьков, 1996], ВЛ, ТЗ, Э, Б, ОС, ВС); IV(СЗЗ); V(ЦД, АС): (Субкавказ*.); SD(НК); [Sp.]
1425. *S. chlorantha* (Willd.) Ehrh. - С. зеленоцветковая = III(Ст, СК, П): (Евро-Сиб.); ST(НК); [R.]
1426. *S. chloropetala* Rupr. (*S. longipetala* Vent.) - С. зелёнолепестковая = V(Касп, ЦД, АС): (Кавк.: Эукавказ.); Da, Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. верх. р. Аварское Койсу
1427. *S. daghestanica* Rupr. - С. дагестанская = V(Касп, ЦД): (Кавк.: Эукавказ.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. окр. с. Бежта
1428. *S. ranjutinii* Kolak. - С. Панютина = IV(ТА - верх. р. Мзымты: Косенко, 1970): (Кавк.: Эукавказ.); Da, Pb(НК); [R.] <Esub>
1429. *S. ruprechtii* Schischk. (*S. saxatilis* Bieb.) - С. Рупрехта = II([Кизл: Лазьков, 1996]); III(ВЛ, ТЗ, Э, Б, ОС, ВС); IV(СЗЗ); V(ЦД, АС): (Субкавказ*.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]
1430. *S. propinqua* Schischk. - С. близкая = V(ЦД - Гимры: Гусейнов, 1990): (Кавк.: Обшекавказ.); Da(НК); [Rs.]
1431. *S. dianthoides* Pers. - С. гвоздиковидная = V(ЦД - Чираг: Гусейнов, 1990): (Субкавказ*.); Pb, Pc, Do(НК); [R.]
1432. *S. marcowiczii* Schischk. - С. Марковича = III([ВЛ - Оштен: Гроссгейм, 1945], ЦЭ, Б, ОС); V(ЦД - Чираг: Гусейнов, 1990): (Кавк.: Эукавказ.); Pc, Do(НК); [R.] l.c. Мамисонский перевал <Esub>
1433. *S. dichotoma* Ehrh. - С. вильчатая = I(АЕ, Тем, Т); III([Ст: Лазьков, 1996], Куб, СК, Б, ОС); IV(Н): (Европ.); Pa(НК); [R.]
1434. *S. iberica* Bieb. - С. грузинская = V(АС): (Субкавказ*.); Rb(Т); [Sp.]
1435. *S. gallica* L. (*S. anglica* L.) - С. французская = III(Каб, УН, ЧО): (Средиземн.); Rb(НК:pb); [R.]
1436. *S. pendula* L. - С. повислая = III(Ст): (Субсредиз*.); S, Pa, Rb(НК:pb); [R.] <Rg>
1437. *S. karatschaika* Galushko nomen nudum - С. карачаевская = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавказ.); Pc, Do(НК); [R.] <Es> l.c. верх. Кубани

Genus 380. *Otites* Adans. - **Отитес**

1438. *O. parviflora* (Ehrh.) Grossh. (*Silene borystenica* (Grun.) Walters, *S. parviflora* (Ehrh.) Pers.) - О. мелкоцветковый = I(АЕ, [Т: Новосад, 1992], М); II(ВП); III([Ст, П] - Лазьков, 1996, СК): (Евро-Сиб.); Db(Т); [R.]
1439. *O. cyri* (Schischk.) Grossh. (*S. cyri* Schischk.) - О. куринский = I(М); II(ВП); III(ВС); V(Касп, ЦД): (Туранск.); ST(Т); [Sp.]
1440. *O. densiflora* (D'Urv.) Grossh. (*S. densiflora* D'Urv.; *S. chersonensis* (Zapal.) Kleop.; *S. helmannii* Claus) - О. густоцветковый = I(КЕ, Тем, Т); II(Касп - окр. Махачкалы: Гусейнов, 1990); III(Ст, Куб, СК, П, Кисл); IV(Н): (Понтич.); ST(Т); [Sp.]
1441. *O. donetzica* (Клеоп.) Клеоп. (*S. donetzica* Kleop.) - О. донецкий = I([АЕ, МД, КЕ, Прик, АИ]: Лазьков, 2012в): (Понтич.); ST(НК); [R.]

1442. *O. wolgensis* (Hornem.) Grossh. (*S. wolgensis* (Hornem.) Bess. ex Spreng.) - О. волжский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Понтич.); ST,Da(T); [Pl.]

1443. *O. media* (Litv.) Klok. (*S. media* (Litv.) Kleop.) - О. средний = II(КН - Ачикулак: Танфильев, Кононов, 1987): (Понт.-Южносиб.); Db(T); [R.]

Genus 381. Pleconax Rafin. - Плеконакс

1444. *P. conica* (L.) Sourkova (*P. subconica* (Friv.) Sourkova; *Silene subconica* Friv.; *S. conica* L.) - П. конический = I(Тем,Т,КЕ,Прик); II(ВП); III(П,Кисл,Каб); IV(Н); V(Касп): (Общедр.средиз.); ST,Rb(T); [Sp.]

1445. *P. conoidea* (L.) Sourkova (*S. conoidea* L.) - П. конусовидный = V(АС - Ахты, Рутул: Муртазалиев, 2009): (Общ.др.средиз.); ST,Do(T); [R.]

Genus 382. Steris Adans. - Смолка

1446. *S. viscaria* (L.) Rafin. (*Viscaria viscosa* (Scop.) Aschers.; *V. vulgaris* Bernh.; *Lychnis viscaria* L.) - С. обыкновенная = III(Ст,П,Кисл,Л): (Европ.); Pa(НК); [R.] <Pm>

Genus 383. Cossyganthe (Reichenb.) Reichenb. - Кукушник <GT>

1447. *C. flos-cuculi* (L.) Fourr. (*Coronaria flos-cuculi* (L.) R.Br.) - К. обыкновенный = III(Ст): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [R.] <Rg> <Pm>

Genus 384. Elisanthe (Fenzl) Reichenb. - Элизанта

1448. *E. viscosa* (L.) Rupr. (*Silene viscosa* (L.) Pers.) - Э. клейкая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СКТ,Э); V(Дар): (Палеаркт.); ST(НК); [Pl.]

1449. *E. noctiflora* (L.) Rupr. (*S. noctiflora* L.) - Э. ночецветная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Сиб.); Rb(НК); [Sp.]

Genus 385. Charesia N.Busch - Харезия <GD>

1450. ★*Ch. akinfievii* (Schmalh.) E.Busch (*Silene akinfievii* Schmalh.; *Elisanthe akinfievii* (Schmalh.) Grossh.) - Х. Акинфиева = III(ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Esub>

Genus 386. Petrosoma Rupr. - Петрокома <GMC>

1451. ★*P. hoefftiana* (Fisch.) Rupr. - П. Гёффта = III(ЧК,Кисл,Л,УН,Ч); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. p. Берёзовка

Genus 387. Melandrium Roehl. - Дрёма

1452. *M. album* (Mill.) Garcke - Д. белая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

1453. *M. latifolium* (Poir.) Maire (*M. balansae* Boiss.) - Д. широколистная = III(ВЛ); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); Rb(НК:pb); [R.]

1454. *M. dioicum* (L.) Coss. et Germ. (*M. sylvestre* (Schkuhr) Roehl. nom illegit; *M. rubrum* (Weig.) Garcke; *Silene dioica* (L.) Clairv.) - Д. двудомная = III(П - Машук); IV(ТА -?): (Евро-Сиб.); Rb(НК); [R.]

Genus 388. Cucubalus L. - Волдырник

1455. *C. baccifer* L. - В. ягодный = I(НД,Тем,Т,М); III(Ст,КР,Куб,ЧО); IV(СЗЗ): (Палеаркт.); Aa(НК); [R.]

Genus 389. Agrostemma L. - Куколь

1456. *A. githago* L. - К. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Палеаркт.); Ra(T); [Sp.] <Pt;Pm>

Ordo 52. Nymphaeales - Нимфецветные

Familia 83. Nymphaeaceae Salisb. - Нимфеевые

Genus 390. Nymphaea L. - Кувшинка

1457. *N. alba* L. - К. белая = I(НД,МД,Тем,НК); II(Кизл); III(МА); IV(Н): (Европ.); Ac(K); [Rs.] <Pm;Po>

1458. *N. candida* J.Presl - К. чисто-белая = (I(АК,Тем); III(X)): Шванова, 2012): (Палеаркт.); Ab(K); [R.]

Familia 84. Nupharaceae Nakai - Кубышковые

Genus 391. Nuphar L. - Кубышка

1459. *N. lutea* (L.) Smith - К. жёлтая = I(НД,Тем,Т,НК); II(Кизл); III(X): Шванова, 2012): (Палеаркт.); Ac(K); [R.] <Pm;Po>

Ordo 53. Ceratophyllales - Роголистникоцветные

Familia 85. Ceratophyllaceae S.F.Gray - Роголистниковые

Genus 392. Ceratophyllum L. - Роголистник

1460. *C. submersum* L. - Р. полупогружённый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК); V(ЦД): (Палеаркт.); Ac(K); [R.]

1461. *C. demersum* L. - Р. погружённый = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,М); II(Кизл); III(Ст,Куб); IV(СЗЗ): (Палеаркт.); Ac(K); [R.]

1462. *C. tanaiticum* Sapeg. - Р. донской = I(НД,ЗПМ): (Понтич.); Ac(K); [R.]

Ordo 54. Nelumbonales - Лотосоцветные

Familia 86. Nelumbonaceae Dumort. - Лotosовые

Genus 393. Nelumbo Hill - Лотос

1463. ★*N. caspica* (DC.) Fisch. (*N. nucifera* Gaertn.) - Л. каспийский = I(Тем - низ. Кубани до Краснодара); II(Кизл - Аграханский залив, Крайновка); V(Касп - дельта Самура): (Субкавказский*.); Ac(K); [Sp.] <Po>

Ordo 55. Paeoniales - Пионоцветные

Familia 87. Paeoniaceae Rudolphi - Пионовые

Genus 394. Paeonia L. - Пион

1464. ★*P. caucasica* (Schipcz.) Schipcz. (*P. kavachensis* Aznav.) - П. кавказский = III(X,ВЛ,ТЗ,Кисл); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.): S(K); [Sp.]

1465. *P. daurica* Andr. (*P. triternata* Pall. ex DC., *P. taurica* Andr.) - П. даурский (крымский) = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); S(K); [R.]

1466. *P. mlokosewitschii* Lomak. - П. Млокосевича = V([ЦД - Сергокалинский р-н, с. Мамааул: Муртазалиев, 2009], AC): (Кавк.: Общекавк.); S(K); [R.]

1467. ★*P. wittmanniana* Hartwiss ex Lindl. (*P. abchasica* Miscz.; *P. marsophylla* (Albov) Lomakin) - П. Витмана = III(ТЗ - р. Кизгыч: Воробьёва, Онопченко, 2001); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(K); [R.]

1468. *P. x litvinskajae* Mordak, Punina et Timukhin - П. Литвинской = IV(ТА - басс. р. Мзымты: Пунина и др., 2011): (Кавк.: Эукавк.); S(K); [R.]

1469. *P. arietina* G.Anderson (*P. officinalis* L.) - П. баранорогий = ([III(ТЗ - Малая Хатипара); IV(ТА - Кавказский заповедник)]: Пунина, Мордак, 2009): (Эвксин.); S(K); [R.]

1470. ★*P. tenuifolia* L. - П. узколистный = I(AE,AK,KE,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,КР,ЧК,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН): (Понтич.); Pa,ST(K);[Pl.] <Pm;Po>

1471. *P. biebersteiniana* Rupr. - П. Биберштейна = I(AK,KE); III(Ст,ЛН,СК,П,ЧО): (Кавк.: Предкавк.); Pa,ST(K); [Sp.] <Ee> l.c. Ставрополь

Ordo 56. Ranunculales - Лютикоцветные

Familia 88. Ranunculaceae Juss. - Лютиковые

Genus 395. *Aquilegia* L. - Водосбор

1472. *A. caucasica* Vieb. (*A. olympica* Boiss.) - В. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Субкавк*.); S,Pb(K); [Sp.]

1473. *A. kubanica* I.M.Vassiljeva - В. кубанский = III(ЦЭ: Васильева, 2012): (Кавк.: Эукавк.); Do(K); [Rs.] <Es> l.c. а. Учкулан

Genus 396. *Thalictrum* L. - Василистник

1474. *Th. triternatum* Rupr. - В. триждытройчатый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(K); [R.] <Esub> l.c. верх. р. Белой

1475. *Th. alpinum* L. - В. альпийский = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Л,Б,ОС); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pc,Do(K); [Pl.]

1476. *Th. foetidum* L. - В. вонючий = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb,Do(K); [Sp.] <Pm;Pt>

1477. *Th. minus* L. - В. малый = I(ЗП,Прик,НК); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); Pa,ST(K); [Pl.] <Pt;Pm>

1478. *Th. simplex* L. - В. простой = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Куб,ТЗ,Кисл,Л,УН,Ч,Б,ОС,ВС); V(Даг): (Палеаркт.); Pb(K); [R.]

1479. *Th. flavum* L. - В. жёлтый = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [R.] <Pm>

Genus 397. *Actaea* L. - Воронец

1480. *A. spicata* L. - В. колосовидный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Евро-Сиб.); S(K); [Sp.] <Rt>

Genus 398. *Caltha* L. - Калужница

1481. *C. palustris* L. - К. болотная = I(НД - окр. Азова); V(АС - Куруш: Муртазалиев, 2009): (Голаркт.); Aa,Ab(K); [R.] <Pt;Po;Rg>

1482. *C. polypetala* Hochst. - К. многолепестная = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb,Pc,Aa(K); [Sp.]

Genus 399. *Trollius* L. - Купальница

1483. *T. ranunculinus* (Smith) Stearn (*T. patulus* Salisb.) - К. лютиковая = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): П(Субкавк*.); Pb,Pc(НК); [Sp.] <Pt>

Genus 400. *Aconitum* L. - Борец

1484. *A. orientale* Mill. - Б. восточный = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb(K); [Pl.]

1485. *A. confertiflorum* (DC.) Worosch. - Б. скученноцветковый = III(ВЛ, ТЗ, Кисл, ЦЭ, Б, ОС, ВС, Ч); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Палеаркт.); Pb, Pс(К); [Pl.]

1486. *A. nasutum* Fisch. ex Reichenb. (*A. pubiceps* (Rupr.) Trautv.) - Б. носатый = III(ВЛ, ТЗ, Э, Б, ОС, ВС, Ч); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [Sp.]

1487. *A. cymbulatum* (Schmalh.) Lipsky - Б. ладьевидный = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС); IV(ЦД, АС): (Кавк.: Эукавк.): Pb, Pс(К); [Sp.] <Esub> l.c. г. Эльбрус

Genus 401. Delphinium L. - Дельфиниум

1488. *D. caucasicum* С.А.Мей. - Д. кавказский = III(ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС, Ч); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс, Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. г. Казбек

1489. *D. speciosum* Bieb. (*D. osseticum* N.Busch; *D. linearilobum* (Trautv.) N.Busch) - Д. красивый = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [Sp.]

1490. *D. dasycarpum* Stev. ex DC. - Д. опушенноплодный = III(Х, ВЛ, ТЗ, Э, Б, ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [Pl.] <Esub> l.c. г. Бештау

1491. *D. megalanthum* Nevski - Д. крупноцветковый = III(Кисл, ЦЭ, Б, ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [Sp.] <Esub> l.c. ледник Безенги

1492. *D. bracteosum* Somm. et Levier (*D. ruprechtii* Nevski) - Д. прицветниковый = III(ЦЭ, Б, ОС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [Sp.] <Esub> l.c. ледник Цей

1493. *D. arcuatum* N.Busch - Д. дуговидный = V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [R.] <Esub> l.c. окр. с. Куруш

1494. *D. pyramidatum* Albov - Д. пирамидальный = III(ВЛ, ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [R.]

1495. *D. crispulum* Rupr. (*D. mariae* N.Busch; *D. fedorovii* Dimitrova) - Д. курчавенький = V(ЦД, АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [Pl.] <Ee> l.c. с. Данух

1496. *D. tomentellum* N.Busch - Д. войлочный = III(ОС - Унал); V(АС - г. Базардюзи, г. Шалбуздаг, Куруш: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pс(К); [Rs.] <Esub> l.c. г. Базардюзи

1497. *D. darginicum* Dimitrova - Д. даргинский = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [R.] <Es> l.c. с. Акуша

1498. *D. flexuosum* Bieb. (*D. charadzeae* Kem.-Nath.) - Д. извилистый = III(ЧК, ВЛ, ТЗ, Э, ВК); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [Sp.] <Pt>

1499. *D. prokhanovii* Dimitrova (*D. gelmetzicum* Dimitrova) - Д. Проханова = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> l.c. окр. с. Данух

1500. *D. leonidae* Kem.-Nath. - Д. Леонида = III(ЦЭ - Хурзук): (Кавк.: Эукавк.); Pс(К); [Rs.] <Es> l.c. ущ. р. Хурзук

Genus 402. Diedropetala Galushko - Дидропеталя

1501. *D. schmalhauseni* (Albov) Galushko (*Delphinium schmalhauseni* Albov) - Д. Шмальгаузена = I(АК, КЕ); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ): (Эвк-син.); Pa(К); [Pl.] <Pt>

1502. *D. freynii* (Cornath) Galushko (*D. freynii* Cornath) - Д. Фрейна = III([ТС, ЧО]: Гроссгейм, 1950); V(БН, Касп, ЦД): (Субкавк*.); Pa(К); [R.]

1503. *D. albiflora* (DC.) Galushko (*D. albiflorum* DC.; *D. ochroleucum* Stev. ex DC.) - Д. белоцветковая = III(ВЛ); IV(ТА); V(АС): (Субкавк*.); Pa(К); [R.]

1504. *D. macropogon* (Prokh.) Galushko (*D. macropogon Prokh.*) - Д. крупнобородая = V(Касп): (Кавк.: Эукавк.); ST(К); [R.] <Es> l.c. окр. Махачкалы

1505. *D. fissa* (Waldst.) A.L.Ivanov comb. nova (*Delphinium fissum Waldst.*) - Д. расщеплённая = IV(ТА - басс. р. Мзымты: **КК Краснодарского края, 2017**): (Эвксин.); Pb(К); [R.]

1506. ★*D. punicea* (Pall.) Galushko (*D. puniceum Pall.*) - Д. пунцовая = I(АЕ,Т,МД); II(ВП); III(Ст,СК,ТС); V(БН,Касп): (Туранск.); ST(К); [Rs.] <Pt>

Genus 403. *Consolida* (DC.) S.F.Gray - Живокость

1507. *C. regalis* S.F.Gray (*Delphinium consolida L.*) - Ж. великолепная = I(АК,КЕ,ЦП); II(Кизл); III(Куб,СКТ,ЧО); IV(Н); V(БН): (Европ.); Ra,Rb(T); [Sp.]

1508. *C. paniculata* (Host) Schur (*D. paniculatum Host*) - Ж. метельчатая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,КР,П); IV(Н); V(Касп): (Субпонт*.); ST(T); [Pl.] <Pm>

1509. *C. divaricata* (Ledeb.) Schroding. (*D. divaricatum Ledeb.*) - Ж. растопыренная = I(ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,ТС,ЧО); V(БН,Касп): (Субпонт*.); Ra,Rb(T); [Pl.]

1510. *C. ajacis* (L.) Schur (*D. ajacis L.*) - Ж. Аякса = I(АК - ст. Шкуринская); III(Ст,СК,Кисл - Кисловодск); IV(Касп - Буйнакск): (Средиземн.); Rb(T); [R.]

1511. *C. orientalis* (J.Gay) Schroding. (*D. orientalis J.Gay*) - Ж. восточная = I(М); II(Кизл); III(П,СК,ЧО,ВС); V(Дар): (Субсредиз*.); Ra,Rb(T); [Sp.]

Genus 404. *Nigella* L. - Чернушка

1512. *N. arvensis* L. - Ч. полевая = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); III(Ст,Куб,КР,СК,ЧО); IV(Н); V(БН,Касп): (Субсредиз*.); Rb(T); [Sp.] <Po>

1513. *N. segetalis* Vieb. - Ч. пашенная = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Субпонт*.); ST,Rb(T); [Sp.] <Po>

1514. *N. sativa* L. - Ч. посевная = III(Ст,МА): (Общедр.средиз.); Rb(T); [Sp.] <Pm;Po>

1515. *N. damascena* L. (*N. elata Boiss.*) - Ч. дамасская = III(МА: **Зернов, 2006**); IV(Н,[ТА: **Портениер, 2003**]): (Средиземн.); Rb(T); [Sp.] <Po>

Genus 405. *Garidella* L. Гариделла

1516. *G. nigellastrum* L. (*Nigella garidella Spenn., N. nigellastrum (L.) Willk.*) - Г. чернушкоцветная = IV(Н); V(Касп): (Средиземн.); Pa(T); [R.]

Genus 406. *Helleborus* L. - Морозник

1517. *H. caucasicus* A.Br. - М. кавказский = III(Ст,Х,ВЛ,ТЗ,Л,Ч); IV(СЗЗ); V(АС - с. Кидеро Цунтинского р-на): (Эвксин.); S(К:hv); [Rs.] <Rt;Pm;Po>

1518. *H. abchasicus* A.Br. - М. абхазский = IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(К:hv); [R.]

Genus 407. *Anemone* L. - Ветреница

1519. *A. sylvestris* L. - В. лесная = III(Ст,СК,Э,Л,УН,ОС,ВС,Ч); V(ЦД): (Евро-Сиб.); Pa,ST(К); [Sp.] <Po>

Genus 408. *Anemonastrum* Holub - Анемонаструм

1520. *A. fasciculatum* (L.) Holub (*Anemone fasciculata L.*) - А. пучковатый = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(К); [Sp.]

1521. *A. speciosum* (Adams ex G.Pritz.) Galushko (*A. speciosa Adams ex G.Pritz.*) - А. видный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pс(К); [Pl.]

Genus 409. Anemonoides Mill. - Ветреничка

1522. *A. ranunculoides* (L.) Holub (*Anemone ranunculoides L.*) - В. лютичная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); S(К:ephd); [Pl.]

1523. *A. nemorosa* (L.) Holub (*A. nemorosa L.*) - В. дубравная = III([П - Бештау: Гроссгейм, 1950]): (Европ.); S(К:ephd); [Rs.] <Rg>

1524. ★*A. blanda* (Schott et Kotschy) Holub (*A. blanda Schott et Kotschy*) - В. приятная = III(Ст,Куб,КР,Л,Ч); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Эвксин.); S(К:ephd); [R.] <Rg>

1525. *A. caucasica* (Rupr.) Holub (*A. caucasica Willd. ex Rupr.*) - В. кавказская = III(Ст,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); S(К:ephd); [R.]

Genus 410. Anetilla Galushko - Анетилла <GMC>

1526. *A. aurea* (Somm. et Levier) Galushko (*Pulsatilla aurea Somm. et Levier*) - А. золотистая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pс(К); [Sp.]

Genus 411. Pulsatilla Hill - Сон

1527. *P. albana* (Stev.) Bercht. et J.Presl - С. албанский = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК:ephd); [Pl.] <Po>

1528. *P. violacea* Rupr. - С. фиолетовый = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pс,Do(НК); [Sp.]

1529. *P. andina* (Rupr.) Woronow - С. андийский = III(Ч); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pс(НК); [R.] <Esub> l.c. окр. Гимры

1530. *P. grandis* Wend. - С. крупный = I(КЕ - Кропоткин): (Европ.); ST(НК:ephd); [Rs.] <Po> <Rg>

1531. ★*P. pratensis* (L.) Mill. - С. луговой = I(КЕ - Кропоткин): (Европ.); ST(НК:ephd); [Rs.] <Rg;Pm;Po>

Genus 412. Clematis L. - Ломонос

1532. *C. vitalba* L. - Л. виноградолистный = III(Ст,Куб,П); IV(СЗЗ); V(Касп - южная часть): (Субсредиз*.); S(Ch:ll); [R.] <Pm;Pmel>

1533. *C. orientalis* L. - Л. восточный = I(КЕ,М); II(ВП); III(СК,П); V(Дар): (Общедр.средиз.); Pa(Ch:ll); [R.] <Pmel>

1534. *C. lathyrifolia* Bess. ex Reichenb. (*C. pseudoflammula Schmalh. ex Lipsky*) - Л. чинолистный = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); II(Кизл); III(Ст,ЛН,СК,П,ТС,ЧО); IV(Н); V(БН,Касп): (Понтич.); Pa,ST(Ch:sf); [Sp.]

1535. *C. integrifolia* L. - Л. цельнолистный = I([КЕ - оз.Солёное: Немирова, Данилевич, 1991]); III(Ст,КР,ЧК,П,Кисл,ОС,ВС,Ч); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); Pa,Pb(Ch:sf); [Sp.] <Po;Pmel>

1536. *C. recta* L. - Л. прямой = I(КЕ - ст. Рождественская); III(ЛН - Невинномысск): (Европ.); S,Pa(Ch:sf); [Rs.]

Genus 413. Ranunculus L. - Лютик

1537. *R. suukensis* N.Busch - Л. суукский = III(Л): (Кавк.: Эукавк.); Do(К); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Суук-ауз

1538. *R. subtilis* Trautv. - Л. слабый = **III**(ТЗ,Кисл,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(К); [R.] <Esub> l.c. г. Нахар
1539. *R. auricomus* L. - Л. золотистый = **III**(Ст,ОС,ВС): (Европ.); Аа(К); [Rs.] <Rg>
1540. *R. villosus* DC. - Л. волосистый = **V**(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Аа(К); [R.]
1541. *R. constantinopolitanus* (DC.) D'Urv. - Л. константинопольский = **I**(К); **III**(МА,КР); **IV**(Н): (Армено-Иран.); S(НК); [R.]
1542. *R. elegans* C.Koch - Л. изящный = **III**(ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [Sp.]
1543. *R. grandiflorus* L. (*R. anemonifolius* DC.; *R. georgicus* Kem.-Nath.) - Л. крупноцветковый = **III**(КР,Х); **IV**(СЗЗ): (Субкавк*.); S,Аа(К); [R.]
1544. *R. cappadocicus* Willd. (*R. ampelophyllus* Somm. et Levier; *R. grandiflorus auct. non L.*) - Л. каппадокийский = **III**(Х,ВЛ,ТЗ); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(К); [Sp.]
1545. *R. repens* L. - Л. ползучий = **I**(АЕ,КЕ,Тем,Т,Прик,НК); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Голаркт.); Аа,Аб(К); [Pl.] <Pt;Pm>
1546. *R. meyerianus* Rupr. (*R. polyanthemos* L.) - Л. Мейера = **I**(ЗП,Прик,НК); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Евро-Кавк.); Ра(К); [Pl.] <Pt>
1547. *R. nemorosus* DC. - Л. дубравный = **III**(КР,[Ст: [Ганфильев, Кононов, 1987](#)]): (Европ.); S(К); [R.] <Rg;Pt>
1548. *R. brutius* Ten. - Л. Брута = **III**(ТЗ - Н.Ермоловка: [Еленевский, 2012](#)): (Европ.); S(К); [Rs.] <Rg>
1549. *R. caucasicus* Vieb. - Л. кавказский = **III**(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Ра,Аа(К); [Sp.] l.c. Пятигорск <Pt>
1550. *R. raddeanus* Regel - Л. Радде = **III**(ВЛ,ТЗ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(К); [Sp.]
1551. *R. sommieri* Albov - Л. Сомье = **III**(ВЛ,ТЗ); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Рс(К); [R.] <Esub>
1552. *R. buhsei* Boiss. (*R. trisectilis* Ovcz.) - Л. Бузе = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **V**(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb(К); [Sp.]
1553. *R. arachnoideus* С.А.Меу. - Л. паутинистый = **III**(ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(К); [Pl.] <Esub>
1554. *R. oreophilus* Vieb. (*R. acutilobus* Ledeb.) - Л. горный = **III**(Куб,ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Евро-Кавк.); Pb,Рс(К); [Sp.] <Pt>
1555. *R. baidarae* Rupr. - Л. Байдары = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(К); [Rs.] <Pt>
1556. *R. crassifolius* (Rupr.) Grossh. - Л. толстолистный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Рс,Да(К); [R.]
1557. *R. abchasicus* Freyn (*R. sartorianus* Boiss. et Heldr.) - Л. абхазский = **III**([ВЛ: [Зернов, 2006](#)],[ТЗ - верх.Теберды: [Гроссгейм, 1950](#)]): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(К); [Rs.] <Esub>
1558. *R. brachylobus* Boiss. et Nohen. - Л. коротколопастный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Армено-Иран.); Рс,Do(НК); [Sp.]

1559. *R. tebulosicus* Prima - Л. тебулосский = III(BC - истоки Аргуна): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Es>
1560. *R. lojkae* Somm. et Levier - Л. Лойки = III(ВЛ,ТЗ,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(К); [R.] <Esub>
1561. *R. balkharicus* N.Busch - Л. балкарский = III(ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [R.] <Ee> l.c. p. Рцывашки
1562. *R. bulbosus* L. - Л. клубневой = III(Ст,Куб,КР,Х); IV(СЗЗ): (Палеаркт.); Pa(К); [R.] <Pt>
1563. *R. sardous* Crantz - Л. сардинский = I(АК); III(КР,МА); IV(СЗЗ): (Средиземн.); Pa(К); [Sp.]
1564. *R. trachycarpus* Fisch. - Л. ворсинчатоплодный = I(Тем,Т); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); Аа(Т); [R.]
1565. *R. muricatus* L. - Л. шиповатый = IV(ТА): (Субсредиз*.); Аа(Т); [R.]
1566. *R. helenae* Albov - Л. Елены = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc(К); [Sp.] <Esub>
1567. *R. lingua* L. - Л. длиннолистный = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,НК); II(Кизл); IV(Н); III(Ст - оз.Кравцово): (Палеаркт.); Аа(К); [R.] <Rg>
1568. *R. ophioglossifolius* Vill. - Л. ужовниколистный = IV(СЗЗ): (Средиземн.); Аа(Т); [R.]
1569. *R. pedatus* Waldst. et Kit. - Л. стоповидный = I(АК,КЕ,Прик); III(Ст,СК): (Понт.-Южносиб.); Pa(К); [R.]
1570. *R. illiricus* L. (*R. meridionalis* Grossh.) - Л. иллирийский = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЧК,ТЗ,СК,П,Л,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Зап.др.средиз.); Pa,ST,Da(К); [Sp.]
1571. *R. cicutarius* Schlecht. - Л. цикутовый = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Da(К); [R.]
1572. *R. oxyspermus* Willd. - Л. остроплодный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,П,ТС,Ч); V(БН,Касп): (Ирано-Туран.); ST(К); [Pl.] <Pt>
1573. *R. sceleratus* L. - Л. ядовитый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп): (Голаркт.); Аа(Т); [Pl.] <Pt>
1574. *R. arvensis* L. - Л. полевой = I(Тем,Т); III(Ст,Куб,КР,СК); IV(Н); V(Касп): (Общедр.средиз.); Db,Ra(Т); [R.] <Pt>
1575. *R. chius* DC. - Л. хиосский = IV(ТА): (Средиземн.); Аа(Т); [R.]
- Genus 414. *Batrachium* (DC.) S.F.Gray - Водяной лютик**
1576. *B. rionii* (Lagger) Nym. (*Ranunculus rionii* Lagger) - В.л. Риона = I(КЕ,Т); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,Б,ОС,ВС); IV(Н): (Палеаркт.); Ас(К); [Sp.]
1577. *B. trichophyllum* (Chaix) Bosch (*B. divaricatum* (Schrank) Wimm.; *Ranunculus trichophyllus* Chaix) - В.л. волосистолистный = I(КЕ,Т); III(Ст,Куб,ТЗ,СК,П,Кисл,Б,ОС,ВС); IV(Н): (Панбор.); Ас(К); [R.]
1578. *B. aquatile* (L.) Dumort (*B. triphyllum* (Wallr.) Dumort.; *R. aquatilis* L.) - В. л. водный = III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,Б,ОС,ВС); IV(Н); V(ЦД,АС): (Европ.); Ас(К); [R.]
1579. *B. circinatum* (Sibth.) Spach (*B. foeniculaceum* (Gilib.) V.Krecz; *R. circinatus* Sibth.) - В. л. завитой = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Палеаркт.); Ас(К); [R.]

Genus 415. *Ficaria* Guett. - Чистяк

1580. *F. calthifolia* Reichenb. (*F. ledebourii* Grossh. et Schischk.) - Ч. калужницелистный = I(ЗП, Прик, НК); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Зап.др.средиз.); S, Pa(НК:eph); [Pl.] <Pm>

1581. *F. stepporum* P.A.Smirn (*F. verna auct. mon Huds.*) - Ч. степной = I(АК - Кушевский р-н): (Европ.); Pa(НК); [R.]

Genus 416. *Buschia* Ovcz. - Бушия <GM>

1582. *B. lateriflora* (DC.) Ovcz. (*Ranunculus lateriflorus* DC.) - Б. бокоцветная = I(МД, АК - Краснодар); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); Aa(T); [Rs.]

Genus 417. *Ceratocephala* Moench - Рогоглавник

1583. *C. falcata* (L.) Pers. - Р. серповидный = I(ЗП, ЦП); III(Ст, ЛН, К, П): (Общедр.средиз.); SD(T:eph); [R.] <Pm>

1584. *C. testiculata* (Crantz) Bess. - Р. яйцевидный = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ); V(БН, Касп): (Палеаркт.); SD, Dd(T:eph); [Pl.]

Genus 418. *Myosurus* L. - Мышехвостник

1585. *M. minimus* L. - М. маленький = I(ЗП, Прик, ТБ, НК); III(Ст, Куб, ЧО): (Плюрирег.); Aa(T); [R.]

Genus 419. *Adonis* L. - Горицвет

1586. *A. vernalis* L. - Г. весенний = I(АЕ, АК, КЕ, Прик, ТБ); III(Ст, КР, Куб, СКТ, П); IV(Н): (Евро-Сиб.); Pa, ST(К:eph); [Sp.] <Pm; Po>

1587. *A. wolgensis* Stev. - Г. волжский = I(АЕ); IV(Н): (Понтич.); ST(НК:eph); [R.] <Po; Pm>

1588. *A. aestivalis* L. - Г. летний = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, СКТ, П); IV(Н); V(БН, Касп): (Общедр.средиз.); Ra, Rb(T); [Sp.] <Pm>

1589. *A. parviflora* Fisch. ex DC. - Г. немногочетковый = III(ТС): (Туранск.); ST(T); [R.]

1590. *A. flammea* Jacq. - Г. пламенный = I(ЗП); III(ЛН); IV(Н): (Субсредиз*.); Ra, Rb(T); [Pl.]

Ordo 57. *Berberidales* - Барбарисоцветные

Familia 89. *Berberidaceae* Juss. - Барбарисовые

Genus 420. *Berberis* L. - Барбарис

1591. *B. vulgaris* L. - Б. обыкновенный = I(НД, Прик, ТБ, НК); III(Ст, Куб, К, Э, Тер, ВК); IV(Н); V(Дар): (Европ.); ST, Pb(Phn); [Pl.] <Pm; Pmel; Pa>

1592. *B. iberica* Stev. et Fisch. - Б. грузинский = V(Касп, ЦД): (Армено-Иран.); ST(Phn); [Sp.] <Pm; Pmel; Pa>

Genus 421. *Epimedium* L. - Горянка

1593. ★*E. colchicum* (Boiss.) Trautv. - Г. колхидская = IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(НК:hv); [Sp.]

1594. *E. circinnato-cucullatum* Sosn. - Г. закрученноклубочковая = IV([ТА - Сочи: Гроссгейм, 1950], [Псезуапсе-Шахе: Тимухин, 2000]): Кавк.: Эукавк.); S(НК:hv); [R.] <Es>

Genus 422. *Bongardia* С.А.Меу. - Бонгардия

1595. *B. chrysogonum* (L.) Sprach - Б. золотистая = V(Касп): (Вост.средиз.); ST, Rb(К); [Sp.]

Ordo 58. Papaverales - Макоцветные

Familia 90. Nymphaeaceae (Dumort.) Willk. - Гипекоумовые

Genus 423. Nymphaeum L. - Гипекоум

1596. *N. pendulum* L. - Г. поникающий = I(НК); II(ВП); V(Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); Ra,Rb(T); [R.]

Familia 91. Papaveraceae Juss. - Маковые

Genus 424. Chelidonium L. - Чистотел

1597. *Ch. majus* L. - Ч. большой = I(АК,КЕ,Тем,Т,Прик); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pm>

Genus 425. Glaucium Hill - Мачок

1598. *G. corniculatum* (L.) Rudolph - М. рогатый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ,П); IV(Н); V(Даг): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Sp.]

1599. ★*G. flavum* Crantz - М. жёлтый = I(Т: Михеев, 1993); IV(СЗЗ): (Субсредиз*.); Db(НК:pb) [Sp.]

1600. *G. elegans* Fisch. et C.A.Mey. - М. изящный = V(ЦД,АС): (Ирано-Туран.); ST(T); [R.]

Genus 426. Papaver L. - Мак

1601. ★*P. lisaе* N.Busch - М. Лизы = III(ЦЭ - Зап. Кинжал,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Es> l.c. ущ. р. Рцывашки

1602. *P. oreophilum* Rupr. (*P. lateritium* C.Koch) - М. горный = III(ВЛ,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]

1603. ★*P. bracteatum* Lindl. - М. прицветниковый = III(П,Каб,ТС,ЧО): (Кавк.: Предкавк.); Pa(НК); [Rs.] <Po> <Ee> l.c. Бештау

1604. ★*P. orientale* L. (*P. lasiothrix* Fedde) - М. восточный = III(ВЛ - г. Закан; хр. Сергиев Гай): (Армено-Иран.); Pb(НК); [R.]

1605. *P. paucifoliatum* (Trautv.) Fedde - М. малолистный = V(ЦД,АС): (Армено-Иран.); Pb,Do(НК); [R.]

1606. *P. fugax* Poir. (*P. caucasicum* Bieb.) - М. летучий = III(ОС,ВС); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [Pl.]

1607. *P. tuberculatum* V.I.Dorof. et Murtazaliev - М. бугорчатый = V(АС - Хнов: Дорофеев, Муртазалиев, 2014): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. с. Хнов, р. Ахтычай

1608. *P. ocellatum* Woronow - М. глазчатый = III(П: Михеев, 1993); V(БН,Касп): (Туранск.); Da,Dd,Rb(T:eph); [R.] <Rx - П>

1609. *P. minus* (Bel.) Meikle - М. малый = V(Касп - Махачкала: Михеев, 2012): Туранск.); ST(T:eph); [R.]

1610. *P. hybridum* L. - М. гибридный = I(Т,Прик,ТБ,НК,М); II(ВП); III(Ст,П,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]

1611. *P. macrostomum* Boiss. et Huet - М. крупнокоробочковый = II(Кизл); V(Касп): (Армено-Иран.); ST,Ra,Rb(T:eph); [R.]

1612. *P. rhoeas* L. - М. самосейка = I(ЗП,ЦП); III(Ст,СК,П,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T:eph); [R.] <Pm>

1613. *P. commutatum* Fisch. et C.A.Mey. (*P. schelkownikowii* N.Busch) - М. спутанный = **I**(АК,КЕ); **III**(Ст,ЛН,КР,СК,П,ТС); **IV**(Н); **V**(Даг): (Субкавказ*.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
1614. *P. arenarium* Bieb. - М. песчаный = **I**(Прик,ТБ,НК,М); **III**(ВП); **III**(Ст,СК,П,ТС); **V**(БН,Касп): (Туранск.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
1615. *P. bipinnatum* C.A.Mey. - М. дваждыперистый = **V**(Касп,[АС: Мургазалиев, 2009]): (Армено-Иран.); ST,Ra,Rb(T); [R.]
1616. *P. litwinowii* Fedde ex Porov - М. Литвинова = **V**(Касп - Талги: Михеев, 2012): (Туранск.); ST(T:eph); [R.]
1617. *P. laevigatum* Bieb. (*P. taeoticum* Klok.) - М. голый = **I**(Тем,Т,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М); **III**(СК,П); **IV**(Н); **V**(Касп - Талги): (Понтич.); Ra,Rb(T:eph); [R.]
1618. *P. alberti* A.D.Mikheev - М. Альберта = [**I**(Прик); **III**(П)]: Михеев, 1993): (Кавк.: Предкавказ.); ST(T:eph); [R.] <Ее> л.с. окр. г. Пятигорска
1619. *P. stevenianum* A.D.Mikheev - М. Стевена = ([**I**(ЗП,ЦП); **III**(П)] - Михеев, 1981): (Понтич); ST(T:eph); [R.] л.с. г. Пятигорск (Провал)
1620. *P. dubium* L. - М. сомнительный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ГЗ,СКТ,П); **IV**(Н); **V**(БН,Касп): (Общ.др.средиз.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
1621. *P. tichomirovii* A.D.Mikheev - М. Тихомирова = **III**(Ст,П: Михеев, 1981]): (Кр.-Новоросс.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.] л.с. окр. г. Пятигорска
1622. *P. raczoskii* A.D.Mikheev - М. Пачоского = ([**I**(Прик,ТБ); **III**(П)]: Михеев, 1993): (Кавк.: Предкавказ.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.] <Ее> л.с. окр. г. Пятигорска
1623. *P. maschukense* A.D.Mikheev - М. машукский = **III**(П: Михеев, 2012): (Кавк.: Эукавказ.); Rb(T:eph); [R.] <Ес> л.с. г. Машук

Genus 427. Roemeria Medik. - Ремерия

1624. *R. refracta* DC. - Р. отогнутая = **III**([П:Михеев, 1983]; **V**(Касп,ЦД): (Ирано-Туран.); SD,Rb(T:eph); [Rs.] <Ро> <Рх>
1625. *R. hybrida* (L.) DC. - Р. гибридная = **V**(Касп): (Ирано-Туран.); ST,Ra(T:eph); [R.]

Familia 92. Fumariaceae DC. - Дымянковые

Genus 428. Corydalis DC. - Хохлатка

1626. *C. caucasica* DC. - Х. кавказская = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ): (Эвксин.); S(K:eph); [Sp.]
1627. *C. malkensis* Galushko nomen nudum - Х. малкская = **III**(П,Кисл,Л,УН): (Кавк.: Эукавказ.); S(K:eph); [Sp.] <Ее> л.с. р. Малка, а. Хабаз
1628. *C. solida* (L.) Chairv. (*C. halleri* (Willd.) Willd.) - Х. плотная = **I**(НД): (Европ.); S(K:eph); [Pl.]
1629. *C. angustifolia* (Bieb.) DC. - Х. узколистная = **III**(Ст); **V**(Касп): (Субкавказ*.); S(K:eph); [Rs.] <Rg>
1630. ★*C. tarkiensis* Prokh. - Х. таркинская = **V**(Касп - Махачкала): (Кавк.: Эукавказ.); S(K:eph); [Rs.] <Ес> л.с. г. Тарки-Тау, Махачкала

1631. *C. vittae* Kolak. - Хохлатка Витты = **IV**(ТА - верх. Мзымты: **Тимухин, 2012**): (Кавк.: Эукавк.); S(K:ephd); [Rs.] <Esub>
1632. *C. teberdensis* Khokhr. - Х. тебердинская = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); S(K:ephd); [Rs.] <Esub> l.c. а. В.Теберда
1633. *C. raczorskii* N.Busch - Х. Пачоского = **IV**(Н); (Кр.-Новоросс.); S(K:ephd); [R.] <Rg>
1634. *C. marschalliana* (Pall. ex Willd.) Pers - Х. Маршалла = **I**(НД,М); **III**(Ст,Куб,КР,Х,СКТ,П,Ч); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Субпонт*.); S(K:ephd); [Pl.]
1635. *C. roseo-purpurea* (Rupr.) Galushko nomen nudum - Х. розово-пурпуровая = **I**(М); **III**(ТС,ЧО); **V**(Касп - Талгинское ущелье): (Кавк.: Предкавк.); S(K:ephd); [Sp.] <Ee> l.c. окр. г. Грозного
1636. *C. conorhiza* Ledeb. - Х. коническкорневая = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(K:ephd); [Sp.]
1637. *C. alpestris* С.А.Мей. (*C. bayerniana* Rupr.) - Х. альпийская = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(K:ephd); [Sp.]
1638. *C. emanuelii* С.А.Мей. - Х. Эммануэля = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(K:ephd); [Sp.]
1639. *C. dautica* Mikhailova - Х. даутская = **III**(ЦЭ - ущ. р. Даут): (Кавк.: Эукавк.); Pб(K:ephd); [Rs.] <Es> l.c. верх. р. Даут
1640. *C. pallidiflora* (Rupr.) N.Busch - Х. бледноцветковая = **III**(Б,ОС); **V**(АС: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Do(K:ephd); [Sp.] <Esub>
1641. *C. heteropetala* Otsch. - Х. разнолепестная = **III**(ВС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(K:ephd); [Rs.] <Es> l.c. верховья р. Ассы
1642. *C. portenieri* Mikhailova - Х. Портениера = **III**(Б): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(K:ephd); [Rs.] <Es> l.c. Балкария
- Genus 429. Fumaria L. - Дымянка**
1643. *F. officinalis* L. - Д. лекарственная = **III**(Ст); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Палеаркт.); Rb(T:eph); [Rs.] <Pm>
1644. *F. schleicheri* Soy.-Willem. - Д. Шлейхера = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,,Э,Тер,ВК); **IV**(Н); **V**(Даг): (Евро-Сиб.); Ra,Rb(T:eph); [Pl.]
1645. *F. vaillantii* Loisel - Д. Вайланта = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.] <Pm>
1646. *F. densiflora* DC. (*F. micrantha* Lag.) - Д. редкоцветковая = **V**(Касп): (Средиземн.); Ra,Rb(T:eph); [R.]
1647. *F. capreolata* L. - Д. козья = **IV**(ТА): (Средиземн.); Rb(T:eph); [R.]
1648. *F. daghestanica* Mikhailova - Д. дагестанская = **V**(ИД - Хучни: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); S(T:eph); [Rs.] <Es> l.c. окр. с. Хучни

Ordo 59. Brassicales - Капустоцветные

Familia 93. Brassicaceae Burnett - Капустовые (Cruciferae - Крестоцветные)

Genus 430. Brassica L. - Капуста

1649. *B. nigra* (L.) Koch - К. чёрная = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(МА - Майкоп); V(Касп): (Палеаркт.); Rb(T); [R.] <Pm>

1650. *B. juncea* (L.) Czern. - К. сарептская = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Даг): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>

1651. *B. sisymbrioides* (Fisch.) Grossh. - К. гулявниковая = V(Касп - Дербент: Муртазалиев, 2009); (Субкавк.); Db(T); [R.]

1652. *B. campestris* L. - К. полевая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Даг): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]

1653. *B. napus* L. - К. рапс = I([Т: Зернов, 2006],АК,[ТБ: Дорофеев, 1994]); III(Куб: Зернов, 2006); IV(Н: Зернов, 2006): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]

Genus 431. Sinapis L. - Горчица

1654. *S. alba* L. (incl. *S. dissecta* Lag.) - Г. белая = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,КР,СК,П,Каб); IV(Н): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pmel>

1655. *S. arvensis* L. - Г. полевая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pmel>

Genus 432. Erucastrum C.Presl - Рогачка

1656. *E. armoracioides* (Czern. ex Turcz.) Cruent (*Brassica armoracioides* Czern. ex Turcz.; *B. elongata* Ehrh.) - Р. хреновидная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); ST(T); [Pl.]

1657. *E. cretaceum* Koton. - Р. меловая = III([ВЛ,ТЗ,Кисл,ВС]: Дорофеев, 2012); IV(Касп: Муртазалиев, 2009): (Евро-Кавк.); Da(НК); [R.]

Genus 433. Eruca Hill - Индау

1658. *E. sativa* Mill. - И. посевной = V(Касп): (Ирано-Туран.); Ra,Rb(T); [R.]

Genus 434. Hirschfeldia Moench - Гиршфельдия

1659. *H. incana* (L.) Lagr.-Foss. - Г. серая = III([П,Кисл]: Дорофеев, 2012); V(Касп - Дербент): (Средиземн.); Ra,Rb(T); [R.]

Genus 435. Rapistrum Crantz - Репник

1660. *R. rugosum* (L.) All. - Р. морщинистый = I(ЗП,Прик,ТБ); II(Кизл); III(Ст,Куб,КР,ЧК,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субсредиз*.); Ra,ST(T); [Sp.]

Genus 436. Conringia Adans. - Конрингия

1661. *C. orientalis* (L.) Dumort. - К. восточная = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Rb(T); [Pl.]

1662. *C. austriaca* (Jacq.) Sweet - К. австрийская = I(T); III(КР,МА,П); IV(Н): (Европ.); Rb(T); [R.]

1663. *C. planisiliqua* Fisch. - К. плоскостручковая = V(Касп - Талгинское ущелье: Муртазалиев, 2009): (Ирано-Туран.); ST(T); [R.]

Genus 437. Diplotaxis DC. - Двурядка

1664. *D. muralis* (L.) DC. - Д. постенная = I(НД,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,СК,П); IV(СЗЗ): (Европ.); Rb(T); [Pl.]

1665. *D. tenuifolia* (L.) DC. - Д. тонколистная = ([I(T); IV(C33)]: Зернов, 2006): (Адвент. [Западная Европа]); Rb(НК:pb); [R.]

1666. *D. viminea* (L.) DC. - Д. прутяная = ([I(АК,Прик); III(Ст)]: Дорофеев, 1994): (Евро-Кавк.); Rb(T); [Sp.]

Genus 438. *Euclidium* R.Br. - Крепкоплодник

1667. *E. syriacum* (L.) R.Br. - К. сирийский = I(ЗП,ЦП); II(Кизл); III(Ст,Куб,СКТ,П,ЧК,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Ирано-Туран.); Rb(T); [Pl.]

Genus 439. *Goldbachia* DC. - Гольдбахия

1668. *G. laevigata* (Bieb.) DC. (*G. pendula* Botsch.; *G. torulosa* DC.) - Г. гладковатая = I(М - Орловка на Куре); V(Касп - Дербент): (Туранск.); Rb(T); [Rs.] <Rx>

Genus 440. *Sobolewskia* Vieb. - Соболевския

1669. *S. caucasica* (Rupr.) N.Busch - С. кавказская = III(ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК:pb); [Sp.] <Esub>

1670. *S. truncata* N.Busch - С. усечённая = V(АС - верх. Самура; верх. Андийского Койсу): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК:pb); [R.] <Es> l.c. между сс. Хупро и Шаури.

Genus 441. *Myagrum* L. - Полёвка

1671. *M. perfoliatum* L. - П. пронзённолистная = I(T); IV(Н); V(Касп): (Субсредиз*.); Ra,Rb(T); [R.]

Genus 442. *Isatis* L. - Вайда

1672. *I. latisiliqua* Stev. - В. широкоплодная = III([ОС,ВС]: Дорофеев, 2012); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub>

1673. *I. reticulata* С.А.Меу. - В. сетчатая = III(ОС - Казбек): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Казбек

1674. *I. campestris* Stev. ex DC. (*I. maeotica* DC.) - В. полевая = ([II(АК); III(Ст,Прик,ТЗ,Каб); V(Касп)]: Дорофеев, 2012): (Евро-Кавк.); ST,Db(T); [R.]

1675. *I. caucasica* (Rupr.) N.Busch - В. кавказская = III(Б,ОС,Ч); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc(НК); [Sp.] <Ee> l.c. хр. Салатау, окр с. Чирката

1676. *I. pseudoararatica* Galushko nomen nudum - В. ложноараратская = III(Ч - Скалистый хр., г. Хахалги): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> l.c. г. Хахалги

1677. *I. brachycarpa* С.А.Меу. - В. короткоплодная = III([ТЗ,ЦЭ,Б,ОС]: Дорофеев, 2012): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Rb(НК:pb); [R.]

1678. *I. sabulosa* Stev. ex Ledeb. - В. песчаная = I(М); II(ВП): (Кавк.: Предкавк.); Db(НК:pb); [Sp.] <Es> l.c. низовья Терека

1679. *I. taurica* Vieb. - В. крымская = I(АЕ,АК,Тем,Т - Приазовские степи): (Понтич.); ST(НК:pb); [R.]

1680. *I. tinctoria* L. - В. красильная = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,СК,П): (Палеаркт.); ST,Rb(НК:pb); [R.]

Genus 443. *Sameraria* Desv. - Самерария

1681. *S. cardiocarpa* Trautv. - С. сердцеплодная = V(Касп): (Туранск.); ST(T); [R.] <Esub>

Genus 444. *Clypeola* L. - Щитница

1682. *C. jonthlasi* L. - Щ. яруточная = I(T); II(Кизл); V(Касп): (Субсредиз*.); SD(T); [R.]

Genus 445. *Raphanus* L. - Редька

1683. *R. maritimus* Smith. - Р. приморская = IV(C33): (Средиземн.); Db(НК:pb); [Sp.]

1684. *R. raphanistrum* L. - Р. обыкновенная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Касп): (Адвент. [Зап.Европа]); Ra,Rb(T); [Pl.]

Genus 446. *Crambe* L. - Катран

1685. *C. maritima* L. - К. морской = I(АЕ,АК,Тем,Т); IV(C33): (Средиземн.); Db(НК); [Sp.] <Pa>

1686. *C. pinnatifida* R.Br. - К. перистый = I(АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,ЛН,СК,П,ТС): (Понтич.); ST(НК); [R.] <Pa>

1687. *C. aspera* Vieb. - К. шершавый = I(ЗПМ,АЕ): (Понтич.); ST(НК); [R.]

1688. ★*C. cordifolia* Stev. - К. сердцелистный = III(СК,Каб,П,Кисл): (Кавк.: Предкавк.); ST(НК); [R.] <Es> l.c. Георгиевск

1689. *C. gibberosa* Rupr. - К. бугорчатый = I(АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ,НК,М); II(Кизл); III(Каб,ТС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [R.] <Pa>

1690. *C. grandiflora* DC. - К. крупноцветковый = I(Т,МД,АИ); III(СК,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Кавк.: Предкавк.); ST(НК); [Rs.] l.c. Таманский п-ов <Ее>

1691. *C. tatarica* Sebeok - К. татарский = I(АЕ,АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ); II(ВП); III(Ст,СК,П,ТС); V(Касп,ЦД): (Понтич.); ST(НК); [R.] <Pa>

1692. ★*C. steveniana* Rupr. - К. Стевена = I(Т,Прик,ТБ,НК); III(Ст,СК,П); IV(Н): (Понтич.); ST(НК); [R.] l.c. Георгиевск

1693. ★*C. koktebelica* (Junge) N.Busch - К. коктебелыйский = I(ЗПМ,Т,МД,Прик); III(Ст,СК,П); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); ST,Dd(НК); [R.] <Rx

Genus 447. *Sakile* Mill. - Морская горчица

1694. *S. euxina* Pobed. - М.г. черноморская = I([АЕ,АК,Тем,Т] - побер. Азовского моря); II(Кизл: Теймуров и др., 2013); IV(C33); V(Касп - дельта Самура): (Субсредиз*.); Db(T); [Sp.]

Genus 448. *Bunias* L. - Свербига

1695. *B. orientalis* L. - С. восточная = I(Т,КЕ,Прик,НК); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(C33); V(Даг): (Евро-Кавк.); ST,Ra,Rb(НК:pb); [Pl.]

Genus 449. *Calerina* Adans. - Калепина

1696. *C. irregularis* (Asso) Thell. - К. неравномерная = I(ЗП); III(МА, КР); IV(Н); V(БН,Касп): (Субсредиз*.); Rb(T); [R.]

Genus 450. *Neslia* Desv. - Неслия

1697. *N. apiculata* Fisch. et C.A.Meу. - Н. остроконечная = V(Касп,ЦД): (Ирано-Туран.); ST,Ra,Rb(T); [R.]

1698. *N. paniculata* (L.) Desv. - Н. метельчатая = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); V(Даг): (Евро-Сиб.); ST,Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>

Genus 451. Litwinowia Woronow - Литвиновия

1699. *L. tenuissima* (Pall.) Woronow ex Pavl. - Л. тончайшая = I(Прик, ТБ, НК); II(КН - р. Кума): (Туранск.); ST, Rb(T); [Rs.] <Rx>

Genus 452. Coluteocarpus Boiss. - Пузыреплодник

1700. *C. vesicaria* (L.) Holmboe - П. сетчатый = III(ОС - Заккинский перевал); V(ЦД - с. Гочоб, Чародинский р-н): (Армено-Иран.); Pb, Do(НК); [R.]

Genus 453. Lunaria L. - Лунник

1701. *L. annua* L. - Л. однолетний = III(Ст, Куб, П); VI(ТА): (Адвент. [Южная Европа]); Rb(T); [R.]

Genus 454. Matthiola R.Br. - Левкой

1702. *M. caspica* (N.Busch) Grossh. - Л. каспийский = III(Кисл): (Кавк.: Эукавк.); V(Касп, ЦД, АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub> I.с Чир-юрт

1703. *M. daghestanica* (Conti) N.Busch - Л. дагестанский = V(БН, Касп, ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Ee>

1704. *M. odoratissima* (Bieb.) R.Br. - Л. душистый = III(ЦЭ, ОС); IV(ТА: Дорощев, 2012); V(БН, Касп): (Ирано-Туран.); Dd(НК); [R.]

1705. *M. taurica* (Conti) Grossh. (*M. tatarica* (Pall.) DC.) - Л. крымский = I(T); III(КР); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Sp.]

Genus 455. Sperihedium V.I.Dorof. - Сперихедиум

1706. *S. tristis* (L.) V.I.Dorof. (*Hesperis tristis* (L.) G.Beck.; *Hesperidium tristis* (L.) Beck) - С. мрачный = I(T, АЕ, АК, КЕ); III(Ст, Куб, СК, П); IV(Н): (Понтич.); Pa, ST(НК); [R.]

Genus 456. Sterigmostemum Bieb. - Стеригма

1707. *S. incanum* Bieb. (*S. torulosum* (Bieb.) Stapf) - С. серая = III(ЦЭ, Ч); V(ЦД): (Армено-Иран.); ST(НК:pb); [R.]

1708. *S. tomentosum* (Willd.) Bieb. - С. войлочная = V(Касп, ЦД - Ашильта: Муртазалиев, 2009): (Ирано-Туран.); Dd(НК:pb); [R.]

Genus 457. Strigosella Boiss. - Стригозелла

1709. *S. africana* (L.) Botsch. (*Malcolmia africana* (L.) R.Br.) - С. африканская = II([КН - Кара-Тюбе: Танфильев, Кононов, 1979]); III(ЦЭ - Былым); V(Касп): (Общедр.средиз.); Ra, Rb(T); [R.] <Rx>

1710. *S. laxa* (Lam.) Galushko (*M. laxa* (Lam.) DC.) - С. рыхлая = V(Касп): (Туранск.); Ra, Rb(T); [R.]

1711. *S. intermedia* (С.А.Мей.) Botsch. (*M. intermedia* С.А.Мей.; *M. taraxacifolia* auct. non. Balb.) - С. промежуточная = V(Касп): (Туранск.); Dd, Rb(T); [R.]

Genus 458. Hesperis L. - Ночная фиалка

1712. *H. adzharica* Tzvel. - Н.ф. аджарская = IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

1713. *H. ciscaucasica* F.Dvorak et V.I.Dorof. - Н.ф. предкавказская = I(М - с. Эдиссия: Дорощев, 2012); III(ЛН, СК, Каб): (Кавк.: Предкавк.); Pa(НК); [R.] <Ee> I.с. - р. Кура, с. Эдиссия

1714. *H. matronalis* L. (*H. caucasica* Rupr.) - Н.ф. обыкновенная = I(АК, КЕ, Т); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]

1715. *H. pycnotricha* Borb. et Degen - Н.ф. густоволосистая = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ): (Евро-Сиб.); S(НК:pb); [Pl.]
1716. *H. sibirica* L. - Н.ф. сибирская = **III**(Ст,[П,Кисл]: Дорощеев, 2012); **IV**(ТА: Дорощеев, 2012): (Евро-Сиб.); S(НК); [R.] <Rg>
1717. *H. voronovii* N.Busch - Н.ф. Воронова = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); **IV**(ТА); **V**([ЩД,АС]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.] l.c. г. Фишт
1718. *H. meyeriana* (Trautv.) N.Busch - Н.ф. Мейера = **III**(Кисл,ВС,Ч); **V**(ЩД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК:pb); [Sp.] <Esub>
1719. *H. steveniana* DC. (*H. pseudocinerea* V.I.Dorof.) - Н.ф. Стевена = **IV**(Н): (Кр.-Новоросс.); ST(НК); [R.]
- Genus 459. Clausia Korn.-Tr. - Клаузия**
1720. *C. aprica* (Stroph.) Korn.-Tr. - К. солнцепёчная = **III**(Кисл): (Понтич.); Da(НК); [Rs.]
- Genus 460. Erysimum L. - Желтушник**
1721. *E. babadagense* Prima - Ж. бабадагский = **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub>
1722. *E. anceps* Stev. - Ж. обоюдоострый = **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub>
1723. *E. meyerianum* (Rupr.) N.Busch - Ж. Мейера = **III**(ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЩД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Ee> l.c. г. Эльбрус
1724. *E. substrigosum* (Rupr.) N.Busch - Ж. шершавый = **III**(Э,Каб,ЧО,Б,ОС,ВС); **IV**(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Sp.] l.c. окр. с. Гимры
1725. *E. armeniacum* (Sims) J.Gay - Ж. армянский = **III**(ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ЩД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(НК); [R.]
1726. *E. callicarpum* Lipsky - Ж. красивоплодный = **III**(КР); **IV**(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК:pb); [Sp.] <Es> l.c. орк. Новороссийска
1727. *E. ibericum* (Adams) DC. (*E. quasiibericum* Galushko) - Ж. грузинский = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **V**(ЩД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]
1728. *E. canescens* Roth (*E. diffusum* Ehrh.) - Ж. серый = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,КЕ,Прик,ТБ,Тем); **III**(Ст,СК,П,Кисл,ТС); **IV**(БН): (Вост.средиз.); ST(НК:pb); [Sp.] <Pm>
1729. *E. ucranicum* J.Gay - Ж. украинский = **I**([КЕ - г. Изобильный: Дорощеев, 2012]): (Европ.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
1730. *E. leptostylum* DC. - Ж. тонкостолбиковый = **I**(АЕ,АК,КЕ); **III**(Ст,СК,П,Кисл): (Понтич.); ST(НК:pb); [R.] l.c. Бештау.
1731. *E. brevistylum* Somm. et Levier - Ж. короткостолбиковый = **III**(Кисл,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Da,Do(НК:pb); [R.] <Ee> l.c. р. Кюкюртлю (Эльбрус)
1732. *E. repandum* L. - Ж. выгрызенный = **I**(АЕ,АК,КЕ,Тем,Т,Прик); **III**(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Общедр.средиз.); ST,Rb(Т); [Sp.]
1733. *E. gelidum* Bunge - Ж. холодный = **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [R.]

1734. *E. krynitzkii* Bordz. (*E. subnivale Prima*) - Ж. Кринитского = III(BC - Тебулосмта, [Снеговой хр.: Муртазалиев, 2009]): (Кавк.: Общекавк.); Pc, Do(НК); [Rs.]

1735. *E. aureum* Vieb. - Ж. золотистый = I(AE, KE, Тем, Т); II(Кизл); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S, Pa(НК:pb); [Sp.]

1736. *E. cheiranthoides* L. - Ж. левкойный = I(НД, [Т: Зернов, 2006]): (Евро-Сиб.); Rb(Т); [R.] <Pm>

1737. *E. leptophyllum* (Vieb.) Andrz. - Ж. узколистный = V(ЦД: Муртазалиев, 2009): (Субкавк.); Pb, Do(НК); [R.]

1738. *E. collinum* (Vieb.) Andrz. - Ж. холмовой = I(М - Терек); IV(Н - Зернов, 2006): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК:pb); [R.] l.c. ст. Галюгаевская

1739. *E. leucanthemum* (Steph.) B.Fedtsch. (*E. versicolor (Vieb.) Andrz.*) - Ж. бледноцветковый = I(KE, Прик, ТБ, НК, М); II(ВП); III(Ст, СК, П, ЧО); V(Касп): (Ирано-Туран.); ST(НК:pb); [Sp.]

1740. *E. hieracifolium* L. (*E. marschallianum Andrz.*) - Ж. ястребинколиственный = I(НД); III(П - г. Лысая: Дорофеев, 2003): (Евро-Сиб.); ST(НК:pb); [R.]

Genus 461. Acachmena Н.Р.Fuchs - Акачмена <GD>

1741. *A. cuspidata* (Vieb.) Н.Р.Fusch (*Erysimum cuspidatum (Vieb.) DC.*) - А. щитовидная = I(ЗП, ЦП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(АС): (Общедр.средиз.); Pa, ST(НК:pb); [R.]

Genus 462. Syrenia Andrz. - Сирения

1742. *S. cana* (Pill. et Mitt.) Neilr. (*S. angustifolia (Ehrh.) Reichenb.*) - С. седая = I(Т: Зернов, 2006); III([П, Кисл, ЧО]): Дорофеев, 2003); IV(Н - Дорофеев, 2012): (Понт.-Южносиб.); ST, Db, Pa(НК:pb); [R.]

1743. *S. montana* (Pall.) Klok. (*S. sessilifolia (DC.) Ledeb.*) - С. горная = I(АК, KE, ЦП); III(Ст, СК); IV(Н): (Понтич.); Db(НК:pb); [R.]

1744. *S. siliculosa* (Vieb.) Andrz. - С. стручковая = I(ЦП); II(ВП); III(Ст, СК, П); V(Касп): (Субтуран*); Db(НК:pb); [Pl.] l.c. Прикумские пустыни <Pm>

Genus 463. Fibigia Medik. - Фибигия

1745. *F. eriocarpa* (DC.) Voiss. - Ф. опушенноплодная = I(Т); III(КР); IV(Н): (Средиземн.); Da(НК); [R.]

Genus 464. Alyssoides Hill - Алиссоидес

1746. *A. utriculata* (L.) Medik. (*Alyssum utriculatum L., Vesicaria graeca Reut.*) - А. вздутый = III([ВЛ: Дорофеев, 2012], [ТЗ - хребты Гоначхир, Б. и М. Хатипара: Воробьева, Онипченко, 2001]): (Вост.средиз.); Pb, Do(НК); [Rs.]

Genus 465. Berteroa DC. - Икотник

1747. *B. incana* (L.) DC. - И. серый = I(ЗП, ЦП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Сиб.); ST, Ra, Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm; Pmel>

1748. *B. mutabilis* (Vent.) DC. (*B. ascendens C.Koch*) - И. переменчивый = IV(ТА - Сочи: Дорофеев, 2012): (Средиземн.); Rb(НК); [R.]

Genus 466. Meniocus Desv. - Плоскоплодник

1749. *M. linifolius* (Steph.) DC. - П. линейнолистный = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); SD(Т:eph); [Pl.]

Genus 467. *Lobularia* Desv. - Лобулярия

1750. *L. maritima* (L.) Desv. (*Koniga maritima* (Desv.) R.Br.) - Л. морская = IV(ТА: Дорофеев, 2012); V(ЦД - Кумух: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); Rb(НК); [R.]

Genus 468. *Alyssum* L. - Бурачок

1751. *A. gehamense* Fed. - Б. гегамский = V(АС - гг. Базардюзи, Шалбуздаг, Шахдаг: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [R.]

1752. *A. daghestanicum* Rupr. - Б. дагестанский = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Da(НК); [Pl.] <Ee> l.c. окр. с. Эрпели

1753. *A. andinum* Rupr. - Б. андийский = III(Ч); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc, Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. хр. Салатау, пер. Хырки

1754. *A. rostratum* Stev. - Б. носатый = I(Т); III(Ст,КР); IV(Н): (Понтич.); Da(НК:pb); [R.] <Rx>

1755. *A. trichostachyum* Rupr. - Б. пушистый = III(ЗК,Э,Л,УН,Б,ОС); IV(СЗЗ): (Субкавк*.); Pb, Do(Т); [Sp.] l.c. Кисловодск

1756. *A. oshtenicum* (N.Busch) Kharkev. - Б. оштенский = III(ВЛ - гг. Фишт, Оштен: Дорофеев, 2012): (Кавк.: Эукавк.); Pc, Da(НК); [Rs] <Es> l.c. г. Оштен

1757. *A. parviflorum* Fisch. ex Vieb. (*A. rothmaleri* Galushko.; *A. campestre auct.*) - Б. мелкоцветковый = III(П,ТС); IV(Даг): (Армено-Иран.); ST(Т:eph); [Sp.]

1758. *A. strigosum* Banks et Soland. (*A. campestre auct.*) - Б. щетинистый = V(Касп: Муртазалиев, 2009): (Зап.др.средиз.); Rb(Т:eph); [R.]

1759. *A. hirsutum* Vieb. - Б. шершавый = I(Т); III(Ст,ЛН,ЧК,КР,СК,П,Кисл, ОС,ВС); IV(Н); V(Даг): (Субпонт*.); ST,SD(Т); [Sp.]

1760. *A. desertorum* Stapf - Б. пустынный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Даг): (Палеаркт.); ST,SD(Т:eph); [Pl.]

1761. *A. minutum* Schlecht. ex DC. - Б. маленький = III(КЕ): (Субпонт*.); ST(Т:eph); [R.]

1762. *A. calycinum* L. (*A. alyssoides*(L.)L.) - Б. чашечковый = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); ST(Т:eph); [Pl.]

1763. *A. murale* Waldst. et Kit. - Б. стеной = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Зап.др.средиз.); ST, Da(НК); [Pl.]

1764. *A. tortuosum* Waldst. et Kit. - Б. извилистый = III(Ст,ЛН,КР,ЧК,СК,Э,ВК); IV(Н); V(Даг): (Вост.средиз.); ST, Da(НК); [Pl.]

1765. *A. obtusifolium* Stev. ex DC. - Б. туполистный = I(Т); III(Ст); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Rs.] <в Ст - Rx>

Genus 469. *Arabis* L. - Резуха

1766. *A. sagittata* (Bertol.) DC. (*A. gerardii* (Bess.) Koch; *A. planisiliqua* (Pers.) Reichenb.; *A. hirsuta* auct., *A. nemorensis* (Wolf. et Hoffm.) Reichenb.) - Р. стреловидная = I(АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Европ.); ST(НК:pb); [Sp.]

1767. *A. laxa* Sibth. et Smith - Р. рыхлая = II(Кизл); V(БН,Касп): (Вост.средиз.); Pb(НК:pb); [Sp.]

1768. *A. turrita* L. - Р. башенная = I(Т); III(Ст); IV(Н); V(Касп): (Субсредиз.); Ра(НК:pb); [R.]

1769. *A. kazbegi* Mtskhvet. - Р. казбегская = III(ОС: Дорофеев, 2012): (Кавк. Эукавк.); Рс,Do(НК); [Rs.] <Es>

1770. *A. caucasica* Schlecht. (*A. flaviflora* Bunge) - Р. кавказская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавк*.); Рb,Рс,Do(НК); [Sp.]

1771. *A. farinacea* Rupr. - Р. мучнистая = (III(ВС); V(ЦД,АС): Дорофеев, 2012): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. Богосский хр.

1772. *A. sachokiana* (N.Busch) N.Busch (*A. magna* (N.Busch) Grossh.; *Cardamine sachokiana* N.Busch) - Р. Сахокия = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Da(НК); [R.] <Esub>

1773. *A. brachycarpa* Rupr. - Р. короткоплодная = V(АС - г. Шалбуздаг: Муртазалиев, 2009): (Субкавк*.); Рс,Do(НК); [Rs.]

1774. *A. mollis* Stev. (*A. christianii* N.Busch) - Р. мягкая = V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S,Do(НК); [Sp.]

1775. *A. nordmanniana* Rupr. - Р. Нордманна = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Sp.]

1776. *A. recta* Vill. (*A. auriculata* Lam.) - Р. прямая = I(НД,ЗПМ,АЕ, М,Т); II(Кизл); III(Ст,КР,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Ра(Т); [Sp.]

Genus 470. *Turritis* L. - Вяжечка

1777. *T. glabra* L. (*Arabis glabra* (L.) Bernh.) - В. голая = I(АК,КЕ,Тем,Т); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Ра,Ра,Rb(Т); [Pl.] <Pm>

Genus 471. *Arabidopsis* (DC.) Heynh. - Резушка

1778. *A. thaliana* (L.) Heynh. - Р. Таля = I(ЗП); II(Кизл); III(Ст,Куб,ТЗ,КР,СК,П,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Rb(Т); [Sp.]

1779. *A. pumila* (Steph.) N.Busch (*Thellungiella pumila* (Steph.) V.I. Dorof.) - Р. низкая = I(ЗПМ,ЦП); II(ВП); V(БН,Касп): (Ирано-Туран.); Rb(Т); [R.] l.c. Кизляр

1780. *A. toxophylla* (Bieb.) N.Busch - Р. стрелолистная = I(ЗПМ): (Понт.-Южносиб.); Dc(НК:pb); [Sp.]

Genus 472. *Draba* L. - Крупка

1781. *D. brunifolia* Stev. (*D. diversifolia* Boiss. et Huet.) - К. бруниелистная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Рс,Do(НК); [R.]

1782. *D. bryoides* DC. (*D. imbricata* C.A.Mey.) - К. моховидная = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Рb,Рс,Do(Ch:ppul); [Pl.]

1783. *D. scabra* C.A.Mey. - К. шероховатая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Рb,Рс,Do(НК); [Pl.] <Esub>

1784. *D. elisabethae* N.Busch - К. Елизаветы = III(ЧК,ТЗ,Кисл,Л): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [Pl.] <Es> l.c. ущ. р. Даут

1785. *D. sibirica* (Pall.) Thell. - К. сибирская = III(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); V(АС): (Евро-Сиб.); Рb(НК); [Sp.]

1786. *D. mollissima* Stev. - К. мягчайшая = III(OC,BC,Ч); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(Ch:ppul); [Pl.] <Esub>
1787. *D. supranivalis* Rupr. - К. приснежная = III(ТЗ,ЦЭ,Б,OC,BC); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Богосский хребет
1788. *D. longisiliqua* Schmalh. - К. длинностручковая = III([ВЛ - верх. Лаб-бы: Гроссгейм, 1950],ЧК,Кисл,Л,Б,OC); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:ppul); [Pl.] <Ee> l.c. р. Псежан-су
1789. *D. ossetica* (Rupr.) Somm. et Levier - К. осетинская = III(ТЗ,ЦЭ,Б,OC,BC): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:ppul); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Са-дон
1790. *D. hispida* Willd. - К. щетинистоволосистая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,OC,BC); IV(ТА): (Субкавк*.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]
1791. *D. incompta* Stev. - К. неубранная = IV(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Туфандаг (Азербайджан)
1792. *D. siliquosa* Vieb. - К. стручковая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл, ЦЭ,Б,OC,BC,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]
1793. *D. stylaris* J.Gay ex Koch - К. столбиковая = III(ТЗ,Э,Б,OC,BC,Ч); V(ЦД,АС): (Европ.); ST,Do(НК); [Sp.]
1794. *D. subsecunda* Somm. et Levier - К. однобокая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [R.] l.c. р. Теберда
1795. *D. muralis* L. - К. постенная = I(Тем,Т); III(КР,СК,П); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Европ.); ST(Т); [R.]
1796. *D. nemorosa* L. - К. перелесковая = I(ЗП,ЦП); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Панбор.); Pa(Т); [Pl.] <Pm>
- Genus 473. *Erophila* DC. - Веснянка**
1797. *E. krockeri* Andr. - В. Крокера = (III(Ст,ТЗ); IV(ТА)): Дорощеев, 2012): (Европ.); ST(Т:eph); [R.]
1798. *E. minima* С.А.Меу. - В. карликовая = V(Касп: Муртазалиев, 2009): (Ирано-Туран.); SD(Т:eph); [R.]
1799. *E. praesox* (Stev.) DC. - В. ранняя = I(Т); III(КР,ЧК); IV(ТА: Дорощеев, 2003); V(Касп): (Вост.средиз.); ST(Т:eph); [R.]
1800. *E. verna* (L.) Bess. - В. обыкновенная = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST,SD(Т:eph); [Pl.]
- Genus 474. *Barbarea* R.Br. - Сурепка**
1801. *B. arcuata* (Opiz. ex J. et C.Presl.) Reichenb. (*B. vulgaris* R.Br.) - С. ду-говидная = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Па-леаркт.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.]
1802. *B. grandiflora* N.Busch - С. крупноцветковая = V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Аа(НК:pb); [R.] <Esub> l.c. окр. с. Хупро
1803. *B. minor* С. Koch - С. малая = III(ЧК,ВЛ); IV(ТА): (Армено-Иран.); Pb,Аа(НК); [R.]
1804. *B. plantaginea* DC. - С. подорожниковая = III([ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,OC]: До-рощеев, 2012); V(АС: Муртазалиев, 2009): (Субкавк.*); Pd,Аа(НК:pb); [R.]
1805. *B. stricta* Andr. - С. торчащая = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Куб,ЧК); V(Даг): (Палеаркт.); Аа(НК:pb); [R.]

Genus 475. *Rorippa* Scop. - Жерушник

1806. *R. amphibia* (L.) Bess. - Ж. земноводный = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,МД,НК); II(КН); III(Куб); IV(ТА): (Палеаркт.); Аа,Аб(НК); [R.]

1807. *R. ampullicarpa* V.I. Dorof. - Ж. пузыреплодный = II(КН - Кума: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Аа,Аб(НК); [R.] <Esub> l.c. пос. Мечеть Джембулат на Куме

1808. *R. austriaca* (Crantz) Bess. - Ж. австрийский = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ТЗ,КР,СК,П,Кисл,Л,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Европ.); Аа,Аб(К); [Sp.]

1809. *R. vallicola* V.I. Dorof. - Ж. долинный = I(НД - Азов: Дорофеев, 2012): (Европ.); Аа,Рb(НК); [R.]

1810. *R. anceps* (Wahlenb.) Reichenb. (*R. prostrata* (J.P.Bergeret) Schinz et Thell) - Ж. обоюдоострый = I(Тем); III(Куб,ЧК,П,Кисл,Каб); IV(Н): (Европ.); Аа(НК); [R.]

1811. *R. armoracioides* (Tausch) Fuss - Ж. хреновидный = (III(ВЛ); IV(ТА - Сочи): Дорофеев, 2012): (Понт.-Южносиб.); Аа,Рb(НК); [R.]

1812. *R. sylvestris* (L.) Bess. - Ж. лесной = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Куб,П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(ТА); V(АС): (Европ.); Аб(К); [R.]

1813. *R. brachycarpa* (С.А.Мей.) Hayek - Ж. короткоплодный = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т); III(ЛН,КР,ЧК): (Понт.-Южносиб.); Аа,Аб(НК:pb); [R.]

1814. *R. palustris* (Leyss.) Bess. (*R. barbareaifolia* (DC.) Kitag.; *R. islandica* (Oed.) Schinz et Thell) - Ж. болотный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ,Э); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Голаркт.); Аа(НК); [Pl.]

Genus 476. *Nasturtium* R.Br. - Жеруха

1815. *N. officinale* R.Br. (*Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek; *Sisymbrium nasturtium* L.) - Ж. лекарственная = I(Тем); III(Ст,Куб,СК,П,Каб); IV(ТА); V(Касп - Ялама: Муртазалиев, 2009): (Палеаркт.); Аб(К); [R.] <Pm>

Genus 477. *Armoracia* Gaertn., Mey. et Scherb. - Хрен

1816. *A. rusticana* Gaertn., Mey. et Scherb. - Х. деревенский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,Тер); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Европ.); Ра,Рb(К); [Sp.]

Genus 478. *Cardamine* L. - Сердечник

1817. *C. lazica* Boiss. et Balansa - С. лазистанский = (III(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(СЗЗ)): Дорофеев, 2012): (Кавк.: Общекавк.); S,Аа(НК); [R.]

1818. *C. amara* L. - С. горький = III(ВЛ - Камышова поляна: Дорофеев, 2012): (Европ.); S,Аа(НК); [R.]

1819. *C. seidlitziana* Albov - С. Зейдлица = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Рс,Аа(НК); [Sp.]

1820. *C. uliginosa* Vieb. - С. болотный = III(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Рb,Рс,Аа(НК); [Pl.]

1821. *C. tenera* S.G.Gmel. ex С.А.Мей. - С. нежный = I(Тем); III([Ст: Танфильев, Кононов, 1987],Куб,КР,Х,Л); IV(СЗЗ); V([БН,Касп]: Муртазалиев, 2009): (Субкавк*.); Аа,S(НК); [R.]

1822. *C. parviflora* L. - С. мелкоцветковый = I(НД,Тем - Краснодар): (Палеаркт.); Аа,Аб(Т); [R.]

1823. *C. hirsuta* L. - С. жестковолосистый = III(Куб,Э,Тер); IV(ТА); V(Касп): (Плурирег.); S(Т); [R.]

1824. *C. impatiens* L. - С. недотрога = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Даг)**: (Палеаркт.); S(T); [Sp.]

1825. *C. pectinata* Pall. ex DC. - С. гребенчатый = **III(ВЛ,ОС,Ч); IV(ТА); V(ЦД)**: (Кавк.: Общекавк.); S(T); [Sp.]

Genus 479. Murbeckiella Rothm. - Мурбекиелла

1826. *M. huetii* (Boiss.) Rothm. (*Phryne huetii* (Boiss.) O.E.Schultz) - М. Хьюта = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(АС)**: (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК); [Pl.]

Genus 480. Dentaria L. - Зубянка

1827. *D. quinquefolia* Vieb. - З. пятилистная = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,КР,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Евро-Кавк.); S(K:ephd); [Pl.]

1828. *D. bipinnata* С.А.Мей. - З. дваждыперистая = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. г. Эльбрус

1829. *D. bulbifera* L. (*Cardamine bulbifera* (L.) Crantz) - З. луковиценосная = **III(Куб,Э,Тер); IV(ТА); V(Даг)**: (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]

1830. *D. microphylla* Willd. - З. мелколистная = **III(ВЛ,ОС); IV(ТА)**: (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК); [R.]

Genus 481. Pseudovesicaria (Boiss.) Rupr. - Лжепузырник <GMC>

1831. ★*P. digitata* (С.А.Мей.) Rupr. - Л. пальчатый - **III(ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК:pb); [Sp.] <Esub> l.c. г. Туфандаг (Азербайджан)

Genus 482. Chorispora R.Br. ex DC. - Хориспора

1832. *Ch. iberica* (Vieb.) DC. - Х. грузинская = **V(Касп,ЦД)**: (Субкавк*.); ST,Rb(T); [Sp.]

1833. *Ch. tenella* (Pall.) DC. - Х. нежная = **I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Pl.]

Genus 483. Alliaria Heist. ex Fabr. - Чесночница

1834. *A. brachycarpa* Vieb. (*A. taurica* (Adams) V.I.Dorof.) - Ч. короткоплодная = **III(ОС,ВС); V(Касп,ЦД)**: (Кавк.: Эукавк.); Pб,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. верх. Терека

1835. *A. petiolata* (Vieb.) Cavara et Grande (*A. officinalis* Andrz. ex Vieb.) - Ч. черешковая = **I(НД,АК,КЕ,ЦП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Палеаркт.); S(НК); [Pl.] <Pm>

Genus 484. Sisymbrium L. - Гулявник

1836. *S. altissimum* L. - Г. высокий = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,П); IV(Н); V(Касп)**: (Голаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]

1837. *S. orientale* L. (*S. daghestanicum* Vass.) - Г. восточный = **IV(Н); V(Касп,ЦД; Муртазалиев, 2009)**: (Средиземн.); Rb(НК:pb); [R.]

1838. *S. erucastrifolium* (Rupr.) Trautv. - Г. эруколистный = **III(ОС,ВС); V(Касп,ЦД,АС)**: (Кавк.: Эукавк.); ST,Rb(НК:pb); [Sp.] <Esub> l.c. окр. г. Алагир

1839. *S. lipskyi* N.Busch - Г. Липского = **III([П: Танфильев, Кононов, 1987],Кисл,ЦЭ,Б,ОС); V(АС: Муртазалиев, 2009)**: (Кавк.: Эукавк.); Pб,Do(НК:pb); [R.] <Esub> l.c. Хуламский перевал

1840. *S. loeselii* L. - Г. Лёзелиев = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]

1841. *S. irio* L. - Г. ирио = **III(МА - Майкоп,ЧК,СК,П); V(Касп,ЦД,АС):** (Общедр.средиз.); Rb(НК:pb); [R.]

1842. *S. polymorphum* (Murr.) Roth - Г. полиморфный = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,М); III(Ст,КР,Прик,СК,ТС):** (Понтич.); ST(НК); [R.]

1843. *S. volgense* Bieb. ex Fourn. - Г. волжский = **I(НД,ЗПМ,АЕ,[ТБ: Дорощеев, 2012]):** (Понтич.); ST(НК); [Sp.]

Genus 485. Velarum (DC.) Reichenb. - Велярум

1844. *V. tzvelevii* V.I.Dorof. (*V. officinale* (L.) Reichenb.; *Sisymbrium officinale* (L.) Scop.) - В. лекарственный = **I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Куб,КР,ТЗ,Э,СКТ); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm>

Genus 486. Descurainia Webb et Berth. - Дескурайния

1845. *D. sophia* (L.) Webb ex Prantl - Д. Софии = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pa;Pm>

Genus 487. Neotorularia Hedge et J.Leonard - Новочётчик

1846. *N. contortuplicata* (Steph.) Hedge et J.Leonard (*N. ledebouri* (Boiss.) V.E.Avet.; *Dischasianthus contortuplicatus* (Steph. ex Willd.) Sojak; *Torularia contortuplicata* (Steph.) O.E.Schulz; *T. ledebouri* (Boiss.) Grossh.) - Н. скрученный = **I(Прик,АИ,ТБ,НК); II(ВП); V(БН,Касп):** (Туранск.); Rb(T); [R.]

1847. *N. torulosa* (Desf.) Hedge et J.Leonard (*D. torulosa* (Desf.) Sojak; *T. torulosa* (Desf.) O.E.Schulz.) - Н. бугорчатый = **V(Касп: Муртазалиев, 2009):** (Вост.средиз.); Dd(T); [R.]

Genus 488. Camelina Crantz - Рыжик

1848. *C. microcarpa* Andr. - Р. мелкоплодный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД):** (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]

1849. *C. sylvestris* Wallr. - Р. лесной = **I(АК,Прик,ТБ,НК); II(ВП); III(П,ОС); V(Касп):** (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [R.]

1850. *C. sativa* (L.) Crantz (*C. glabrata* (DC.) Fritsch) - Р. посевной = **I(ЗП); II(ВП); III(Ст,ЧК,СК,П); IV(Н); V(Касп,ЦД):** (Панбор.); Ra,Rb(T); [R.]

1851. *C. alyssum* (Mill.) Thell. (*C. linicola* Schimp. et Spann.) - Р. бурачковый = (**III(П); V(ЦД): Дорощеев, 2012**): (Европ.); Ra(T); [R.]

1852. *C. pilosa* (DC.) Zing. - Р. волосистый = **I(Т: Гроссгейм, 1950); II(Кизл: Муртазалиев, 2009); III(Ст,СК,П); IV(Н: Гроссгейм, 1950); V(Касп,[ЦД: Муртазалиев, 2009]):** (Европ.); Ra,Rb(T); [R.]

1853. *C. rumelica* Velen. (*C. albiflora* (Boiss.) N.Busch) - Р. румелийский = **I([АК: Дорощеев, 2012]); IV(Н - Анапа); V(Касп - Махачкала):** (Вост.средиз.); Ra,Rb(T); [R.]

Genus 489. Capsella Medik. - Пастушья сумка

1854. *C. bursa-pastoris* (L.) Medik. - П.с. обыкновенная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Плюрирег.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

Genus 490. *Hymenolobus* Nutt. ex Torr. et Gray - Многосемянник

1855. *H. procumbens* (L.) Fourr. - М. простёртый = I(Т); II(Кизл); IV(Н); V(Касп - хр. Нараттубе: Муртазалиев, 2009): (Палеаркт.); Db(Т); [R.]

1856. *H. puberulus* (Rupr.) N.Busch - М. пушковатый = III(Б); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Rb,Do(Т); [R.] <Ее> l.c. окр. с. Карата

Genus 491. *Andrzejowskia* Reichenb. - Андржеевския <GM>

1857. *A. cardamine* Reichenb. (*A. cardaminifolia* (DC.) Prantl) - А. сердечниковая = IV(ТА - Сочи): (Вост.средиз.); Aa,Rb(Т); [R.]

Genus 492. *Thlaspi* L. - Ярутка

1858. *Th. argense* L. - Я. полевая = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Ra,Rb(Т); [Pl.]

1859. *Th. huetii* Boiss. - Я. Хьюта = V(ЦД - Гимры: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Rb(Т); [R.]

Genus 493. *Neurotropis* (DC.) F.K.Mey. - Невротропис

1860. *N. orbiculata* (Stev.) F.K.Mey. (*Thlaspi orbiculatum* Stev.) - Н. округлый = III(Х,ВЛ): (Кавк.: Общекавк.); Pa(Т); [R.]

1861. *N. szowitsiana* (Boiss.) F.K.Mey. (*Th. szowitsianum* Boiss.) - Н. Шовица = III(Ч: Дорофеев, 2012): (Кавк.: Общекавк.); Pa(Т); [Rs.]

Genus 494. *Microthlaspi* F.K.Mey. - Яруточка

1862. *M. perfoliatum* (L.) F.K.Mey. (*Thlaspi perfoliatum* L.) - Я. пронзённолиственная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Ra,Rb(Т); [Pl.]

1863. *M. umbellatum* (Stev.) F.K.Mey. (*Th. umbellatum* Stev.) - Я. зонтичная = V([Касп - Тарки-Тау, Дербент,ЦД]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Rb(Т); [R.]

Genus 495. *Nossaea* Moench - Ноккея

1864. *N. macrantha* (Lipsky) F.K.Mey. (*Thlaspi macranthum* (Lipsky) N.Busch) - Н. крупноцветковая = III(Куб,КР,ЧК,П,Кисл); IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); ST(Т); [R.] <Ее> l.c. окр. Новороссийска

Genus 496. *Pachyphragma* (DC.) Reichenb. - Толстостенка <GM>

1865. *P. macrophyllum* (Hoffm.) N.Busch - Т. крупнолистная = III(Ст,Куб,П,Л); IV(ТА): (Эвксин.); S(НК:hv); [Sp.] <Rt;Rg>

Genus 497. *Apterigia* Galushko - Аптеригия

1866. *A. pumila* (Stev.) Galushko (*Thlaspi pumilum* (Stev.) Ledeb.) - А. маленькая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. г. Эльбрус

Genus 498. *Eunomia* DC. - Эвномия

1867. *E. rotundifolia* C.A.Mey. - Э. круглолистная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] l.c. г. Эльбрус

Genus 499. *Hornungia* Reichenb. - Двусемянка

1868. *H. angustilimbata* V.I. Dorof. - Д. узкоотгибная = V(Касп - Талги, Карабудахкент: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); ST(Т); [R.] <Es> l.c. Талгинское ущелье

Genus 500. Iberis L. - Иберийка

1869. *I. taurica* DC. - И. крымская = III(Ст,ЧК,КР,ВЛ,Э); IV(СЗЗ): (Субкавк.); Da(НК:pb); [Rs.] <Rx>

Genus 501. Campyloptera Boiss. - Крылотычиночник

1870. *C. carnea* (Banks et Soland.) Botsch. et Vved. (*Aethionema carneum* (Banks et Soland.) B.Fedtsch.; *Thlaspi carneum* Soland.) - К. красный = V(ЦД: Муртазалиев, 2009): (Вост.средиз.); Do(T); [Rs.]

Genus 502. Lepidium L. - Кресс (Клоповник)

1871. *L. crassifolium* Waldst. et Kit. (*L. cartilagineum* (J.C.Mey.) Thell.) - К. (К.) толстолистный = I(ЗПМ,АЕ,Т,Прик,ТБ,М); II(ВП); IV(Н); V(БН,Касп): (Субтуран*.); Dc(НК); [Sp.]

1872. *L. latifolium* L. - К. (К.) широколистный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЧК,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Dc(НК); [Pl.] <Pm>

1873. *L. lyratum* L. - К. (К.) лировидный = V(Касп,ЦД): (Армено-Иран.); ST(НК); [R.]

1874. *L. ruderale* L. - К. (К.) сорный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,ЧК,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп,ЦП): (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pm>

1875. *L. pinnatifidum* Ledeb. - К. (К.) перисторассечённый = III(П - Тамбукан); II(Кизл): (Туранск.); Dc(T); [R.] <Rx>

1876. *L. virginicum* L. - К. (К.) виргинский = (IV(ТА); V(Касп)): Дорофеев, 2003): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(НК:pb); [R.]

1877. *L. densiflorum* Schrad. - К. (К.) густоцветковый = (III(МА); IV(ТА)): Зернов, 2006): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(T); [R.]

1878. *L. perfoliatum* L. - К. (К.) пронзённый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,П,ТС); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]

1879. *L. campestre* (L.) R.Br. - К. (К.) полевой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,ЧК,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦП): (Европ.); Ra,Rb(НК:pb); [Sp.]

1880. **L. sativum* L. - К. (К.) посевной = I(М); II(Кизл); III(Ст,ЧК,СК,Кисл,Л,ТС,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Адвент. [родина неизвестна]); Rb(T); [R.]

Genus 503. Cardaria Desv. - Кардария

1881. *C. draba* (L.) Desv. (*Lepidium draba* L.) - К. крупковидная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЧК,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦП): (Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pp>

1882. *C. propinqua* (Fisch. et C.A.Mey.) N.Busch (*L. propinquum* Fisch. et C.A.Mey.) - К. близкая = III(ЧО); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Rb(НК); [R.]

Genus 504. Didymophysa Boiss. - Двойчатка <GD>

1883. ★*D. aucheri* Boiss. - Д. Оше = V(АС - г. Шалбуздаг): (Армено-Иран.); Pc,Do(НК); [R.]

Genus 505. Coronopus Zinn - Коронопус

1884. *C. didymus* (L.) Smith - К. двойчатый = IV(ТА: Зернов, 2006): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(T); [R.]

1885. *C. squamatus* (Forsk.) Aschers. (*C. procumbens* Gilib.) - К. чешуйчатый = IV([Н - Новороссийск: Гроссгейм, 1950],[ТА: Зернов, 2006]); V(Касп,АС): (Средиземн.); Db(Т); [R.]

Familia 94. Carragaceae Juss. - Каперсовые

Genus 506. Carraris L. - Каперсы

1886. *C. herbacea* Willd. (*C. spinosa* L.) - К. травянистые = I(НК,Прик); II(Кизл); III(Ст,ЛН,СК); V(Даг): (Вост.средиз.); Dd(Ch:sf); [Sp.] <Pa;Pm;Pme1>

Genus 507. Cleome L. - Клеома

1887. *C. daghestanica* (Rupr.) Tzvel. (*C. ornithopodioides* L.) - К. дагестанская = III(Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(Т); [R.] <Ee> l.c. окр. с. Тинди

1888. *C. circassica* Tzvel. - К. черкесская = IV(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); Da,Db(Т); [R.] <Es> l.c. Новороссийск

Familia 95. Resedaceae S.F.Gray - Резедовые

Genus 508. Reseda L. - Резеда

1889. *R. luteola* L. - Р. желтоватая = V(Касп): (Средиземн.); ST(НК:pb); [R.]

1890. *R. lutea* L. - Р. жёлтая = I(АК,КЕ,Тем,Т,Прик,НК); III(Ст,Куб,КР,ТЗ,СКТ,П,Кисл,Л); IV(СЗЗ); V(Даг): (Зап.др.средиз.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

1891. *R. globulosa* Fisch. et С.А.Меу. - Р. шароцветная = III(ОС); V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК:pb); [Sp.]

Ordo 60. Droserales - Росянкоцветные

Familia 96. Droseraceae Salisb. - Росянковые

Genus 509. Drosera L. - Росянка

1892. *D. rotundifolia* L. - Р. круглолистная = III([ВЛ: Цвелёв, 2012б],ВС): (Голаркт.); Pb,Aa(НК); [R.] <Rg>

Genus 510. Aldrovanda L. - Альдрованда <GD>

1893. ★*A. vesiculosa* L. - А. пузырчатая = I(Тем - низ. Кубани): (Плюрирег.); Ac(НК:pi); [R.]

Ordo 61. Saxifragales - Камнеломкоцветные

Familia 97. Crassulaceae DC. - Толстянковые

Genus 511. Chistophyllum (Ledeb.) Stapf. ex Berger - Хиастофиллум <GMC>

1894. *Ch. oppositifolium* (Ledeb.) Berger (*Umbilicus oppositifolius* (Ledeb.) Ledeb.) - Х. супротиволистный = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S,Do(НК:ps); [Sp.] <Esub>

Genus 512. Sempervivum L. - Молодило

1895. *S. caucasicum* Rupr. ex Boiss. - М. кавказское = III(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК:ps); [Sp.] <Po> <Esub>

1896. *S. altum* Turill - М. высокое = III(ЦЭ - Баксан,ОС - Казбек,ВС); V([ЦД,АС: Муртазалиев, 2009]): (Кавк.: Общекавк.); Do(НК:ps); [R.] l.c. Армхи

1897. *S. ossetiense* Wale - М. осетинское = **III(OC)**: (Кавк.: Эукавк.); Do(НК:ps); [R.] <Es> l.c. верх. р. Ардон
1898. *S. pumilum* Bieb. - М. низкое = **III(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС)**; **IV(ТА)**; **V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Общекавк.); Da(НК:ps); [Pl.] <Po> l.c. ущ. р. Терек
1899. *S. borissovae* Wale - М. Борисовой = **III(ЦЭ - Адыр-Су)**: (Кавк.: Эукавк.); Do(НК:ps); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Адыр-Су
1900. *S. ingwersenii* Wale - М. Ингерсена = **III(ЦЭ - Адыл-Су)**: (Кавк.: Эукавк.); Do(НК:ps); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Адыл-Су

Genus 513. Hylotelephium Н.Омба - Очиточник

1901. *H. caucasicum* (Grossh.) Н.Омба (*Sedum caucasicum* Grossh.) - О. кавказский = **I(Тем,Т)**; **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК)**; **IV(СЗЗ)**; **V(Даг)**: (Кавк.: Общекавк.); Da(НК:ps); [Pl.] <Pm>
1902. *H. maximum* (L.) Holub. (*S. maximum* (L.) Hoffm.; *S. telephium*) - О. наибольший = **I(НД)**: (Европ.); Db(НК:ps); [R.]

Genus 514. Prometheum (Berger) Н.Омба - Прометеум

1903. *P. pilosum* (Bieb.) Н.Омба (*Rosularia pilosa* (Grossh.) Boriss., *Sedum pilosum* Bieb.) - П. волосистый = **III(ЧК,ТЗ,[П-Бештау], ЦЭ,Б,ОС,ВС)**; **V(АС)**: (Субкавк*.); Pb,Do(НК:ps); [Sp.]
1904. *P. sempervivoides* (Fisch. ex Bieb.) Н. Омба (*R. sempervivoides* (Fisch. ex Bieb.) Boriss.; *S. sempervivoides* Fisch. ex Bieb.) - П. молодилевидный = **V(Касп,[ЦД: Муртазалиев, 2009])**: (Субкавк.); Da(НК:pb:ps); [R.]

Genus 515. Sedum L. - Очиток

1905. *S. stevenianum* Rouy et Camus - О. Стевена = **III(Б,ОС,ВС)**; **V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК:ps); [Sp.] <Esub>
1906. *S. involucratum* Bieb. - О. обёртковый = **III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС)**; **V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК:ps); [Sp.] <Esub>
1907. *S. spurium* Bieb. - О. ложный = **III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч)**; **IV(СЗЗ)**; **V(АС)**: (Кавк.: Общекавк.); Da(НК:ps); [R.] l.c. Пятигорск
1908. *S. oppositifolium* Sims - О. супротиволистный = **III(Э,ВК)**; **V(Даг)**: (Субкавк*.); Da(НК:ps); [Sp.] <Pm>
1909. *S. stoloniferum* S.G.Gmel. - О. побегоносный = **III(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,П,Л,УН,Ч)**; **IV(СЗЗ)**; **V(АС)**: (Субкавк*.); S(НК:ps); [R.]
1910. *S. tenellum* Bieb. - О. тоненький = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч)**; **IV(ТА)**; **V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pс,Do(НК:ps); [Pl.]
1911. *S. album* L. - О. белый = **III(ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС)**: (Европ.); Do(НК:ps); [Sp.]
1912. *S. gracile* С.А.Меу. - О. стройный = **III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС)**; **IV(ТА)**; **V(Даг)**: (Субкавк*.); Pb,Do(НК:ps); [Sp.]
1913. *S. subulatum* (С.А.Меу.) Boiss. - О. шиловидный = **III(Ст,ТЗ,Э,ОС)**; **V(Касп,ЦД,АС)**: (Субкавк*.); Da(НК:ps); [Sp.]
1914. *S. acre* L. - О. едкий = **I(Т)**; **III(Ст,КР,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС)**; **IV(Н)**: (Европ.); Da(НК:ps); [Sp.] <Pt;Pm;Po>
1915. *S. abchasicum* Kolak. - О. абхазский = [**III(ВЛ - Фишт-Оштен, Лагонаки)**; **IV(ТА - хр. Аибга)**]: **Литвинская, Муртазалиев, 2009**: (Кавк.: Эукавк.); Da,Pb,Pс(НК:ps); [R.] <Esub>

1916. *S. reflexum* L. - О. отогнутый = III([Ст,П: Мизирева, 1993]); IV(Н): (Европ.); Da(НК:ps); [R.] <Ро>
1917. *S. hispanicum* L. - О. испанский = I(КЕ,Тем,ТБ,Прик); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Средиземн.); ST, Da, Db(Т:ps); [Pl.]
1918. *S. pallidum* Bieb. - О. бледный = III(Куб,ВЛ,Э,ЧО,ОС); IV(ТА); V(Касп): (Армено-Иран.); ST, Rb(Т:ps); [Pl.]
1919. *S. argunense* Galushko - О. аргунский = III(Ч - р.Аргун): (Кавк.: Эукавк.); S, Do(Т:ps); [R.] <Es> l.c.
1920. *S. corymbosum* Grossh. - О. щитковидный = V(Касп,АС): (Армено-Иран.); ST(Т:ps); [R.]
1921. *S. annuum* L. - О. однолетний = III(ОС,ВС); V(АС): (Европ.); Do(Т:ps); [R.]
1922. *S. caespitosum* (Cav.) DC. (*S. rubrum* (L.) Thell.) - О. дернистый = II(Кизл); V(Касп): (Средиземн.); ST(Т:ps); [Sp.]
1923. *S. tetramerum* Trautv. - О. четырёхчленный = V(БН,Касп): (Ирано-Туран.); ST, Do(Т:ps); [R.]
- Genus 516. Rosularia (DC.) Stapf - Розеточница**
1924. *R. sempervivum* (Bieb.) Berger - Р. вечнозелёная = V(Касп): (Армено-Иран.); Da, Do(НК:ps); [R.]

Familia 98. Saxifragaceae Juss. - Камнеломковые

Genus 517. Saxifraga L. - Камнеломка

1925. *S. hirculus* L. - К. болотная = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pc, Aa(НК); [Sp.]
1926. *S. flagellaris* Willd. ex Sternb. - К. плетистая = III(ВЛ,ТЗ,[П - Бештау],ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Евро-Сиб.); Do(НК); [Sp.] <Rg - на Бештау>
1927. *S. repanda* Willd. ex Sternb. (*S. coriifolia* (Somm. et Levier) Grossh.) - К. широковыемчатая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S, Do(НК); [Sp.]
1928. *S. cymbalaria* L. - К. кимвальная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Вост.средиз.); S, Do(НК); [Sp.]
1929. *S. tridactylites* L. - К. трёхпалая = III(Ст,ЛН,КР,ВЛ,ТЗ,Э, Б,ОС,ВС); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); Da(Т); [Pl.]
1930. *S. adscendens* L. - К. восходящая = III(ВЛ,ТЗ,Э,ОС); IV(ТА); V(АС): (Средиземн.); Do, Aa(НК:pb); [R.]
1931. *S. mollis* Smith - К. мягкая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Армено-Иран.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]
1932. *S. moschata* Wulf - К. мускусная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Европ.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]
1933. *S. pontica* Albov - К. понтийская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc, Do(НК); [Sp.]
1934. *S. exarata* Vill. - К. рыхлая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Европ.); Pb, Do(НК); [Pl.]
1935. *S. adenophora* C.Koch - К. железистая = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Армено-Иран.); Pb, Do(НК); [R.]

1936. *S. verticillata* Losinsk. - К. мутовчатая = III(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [R.] <Ее> l.c. ущелье р. Клухор
1937. *S. cartilaginea* Willd. - К. хрящеватая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pб,Pс,Do(НК); [Pl.]
1938. *S. kolenatiana* Regel - К. Коленати = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pб,Pс,Do(НК); [Sp.] l.c. г. Казбек
1939. *S. juniperifolia* Adams - К. можжевелолистная = III(ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pб,Do(Ch); [Pl.]
1940. *S. subverticillata* Boiss. (*S. kuznezowiana* Oetting.) - К. почтимутовчатая = III(ОС,ВС); IV(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Ch); [Sp.] <Esub>
1941. *S. colchica* Albov - К. колхидская = III(ВЛ,[ЦЭ - Учкулан: Гроссгейм, 1950]); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Do(НК); [R.] <Esub>
1942. *S. meyeri* Manden (*S. caspica* Sipliv.; *S. laevis* Bieb.) - К. Мейера = III(ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Ch); [R.] <Esub>
1943. *S. ruprechtiana* Manden. - К. Рупрехта = III(ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [Sp.] <Esub>
1944. *S. pseudolaevis* Oetting. (*S. laevis* Bieb.) - К. ложногладкая = III(ЦЭ,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Ch); [R.] <Esub>
1945. *S. charadzeae* Otschiauri - К. Харадзе = III(УН,Ч): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Do(НК); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Ассы, хр. Цей-лам
1946. *S. scleropoda* Somm. et Levier - К. сухоногая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Do(Ch); [Pl.] <Esub> l.c. верх. Теберды
1947. *S. abchasica* Oetting. - К. абхазская = III(ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Da(НК); [R.] <Esub>
1948. *S. caucasica* Somm. et Levier - К. кавказская = III(ТЗ,ЦЭ,Б): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Do(НК); [R.] <Es> l.c. Клухорский перевал
1949. *S. desoulavy* Oetting. - К. Десулави = III(Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Ch); [R.] <Ее> l.c. р. Штулу
1950. *S. carinata* Oetting. - К. килеватая = III(Б - Черек Балкарский, Штулу): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Ch); [R.] <Es> l.c. верх. р. Черек Балкарский
1951. *S. oettingenii* Galushko et G.Kudrjaschova - К. Эттингена = III(Л - Сукан-Су): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Do(Ch); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Сукан-Су в области Скалистого хребта
1952. *S. akinfieyii* Galushko et G.Kudrjaschova - К. Акинфиева = III(Л - Сукан-Су): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Do(НК); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Сукан-Су в области Скалистого хр.
1953. ★*S. columnaris* Schmalh. - К. колончатая = III(Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Da(Ch); [R.] <Es> l.c. верх. р. Сукан-Су
1954. ★*S. dinnikii* Schmalh. - К. Динника = III(ЦЭ,Б): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Ch); [R.] <Es> l.c. верх. р. Сукан-Су

Genus 518. Chrysosplenium L. - Селезёночник

1955. *Ch. alternifolium* L. - С. очереднолистный = III(Куб,КР,ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Панбор.); S(К); [Pl.] <Pm>

1956. *Ch. dubium* J.Gay ex Ser. - *C. сомнительный* = III(ВЛ): (Вост.средиз.); S(K); [R.]

Familia 99. Hydrangeaceae Dumort. - Чубушниковые

Genus 519. Philadelphus L. - Чубушник

1957. *Ph. caucasicus* Koehne - *Ч. кавказский* = III(МА,КР,Х,ВЛ,ТЗ); IV(C33); V(AC): (Субкавказ*); S(Phn); [Sp.]

Familia 100. Parnassiaceae S.F.Gray - Белозоровые

Genus 520. Parnassia L. - Белозор

1958. *P. palustris* L. - *Б. болотный* = III(Куб,Э,Тер); IV(ТА); V(Даг): (Голаркт.); Аа(НК); [R.] <Pm>

Familia 101. Grossulariaceae DC. - Крыжовниковые

Genus 521. Ribes L. - Смородина

1959. *R. biebersteinii* Berl. ex DC. - *С. Биберштейна* = III(ВЛ,ТЗ,Э,Каб,ЧО,ВК); V(ЦД,AC): (Кавк.: Общекавказ.); S,(Phn); [Pl.]

1960. *R. orientale* Desf. - *С. восточная* = III(ЦЭ,Б,ОС); V(Даг): (Субкавказ*); Do(Phn); [Sp.]

1961. *R. alpinum* L. - *С. альпийская* = III(Х,ВЛ,ТЗ,П); IV(ТА): (Европ.); Do(Phn); [R.] <Pa>

Genus 522. Grossularia Hill - Крыжовник

1962. *G. reclinata* (L.) Mill. - *К. отклонённый* = III(ТЗ,Э,ВК); V(Даг): (Европ.); Do(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>

Ordo 62. Rosales - Розоцветные

Familia 102. Rosaceae Juss. - Розовые

Genus 523. Spiraea L. - Спирея (Таволга)

1963. *S. crenata* L. - *С.(Т.) городчатая* = III(Ст,ЛН,ТЗ,Э,ВК); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); Pa,ST,Da(Phn); [Sp.] <Pmel>

1964. *S. hypericifolia* L. - *С.(Т.) зверобоелистная* = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Л,Б,УН,ОС,Ч,ВС); V(Даг): (Туранск.); ST,Da(Phn); [Sp.]

Genus 524. Aruncus Hill - Волжанка

1965. *A. vulgaris* Rafin. - *В. обыкновенная* = III(Куб,ЦЭ,ВК); IV(C33); V(Даг): (Европ.); S(НК); [Sp.] <Po>

Genus 525. Cotoneaster Medik. - Кизильник

1966. *C. melanocarpus* Fisch. ex Blytt - *К. черноплодный* = III(Э,ОС,Ч,ВС); V(Касп,ЦД,AC): (Палеаркт.); Da(Phn); [Sp.]

1967. *C. integerrimus* Medik. - *К. цельнокрайний* = III(Ст,ЗК,ЦЭ,ВК); IV(C33); V(Даг): (Европ.); Pb(Phn); [Pl.]

1968. *C. nefedovii* Galushko - *К. Нефёдова* = III(П): (Кавк.: Предкавказ.); Da(Phn); [Rs.] <Es> l.c. г. Бештау

1969. *C. meyeri* Pojark. (*C. multiflora* Bunge) - *К. Мейера* = III(Ст,Э,Б,ОС,ВС); V(Даг): (Кавк.: Общекавказ.); Do(Phn); [R.]

1970. *C. suavis* Pojark. (*C. racemiflorus* (Desf.) Booth ex Bosse) - К. приятный = II(Кизл); III(Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Ирано-Туран.); Da(Phn); [R.]

1971. *C. morulus* Pojark. - К. тёмный = V(Касп - Леваши,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); ST, Da(Phn); [R.]

1972. *C. soczavianus* Pojark. - К. Сочавы = III(ВЛ,Л,УН): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn); [R.] <Esub>

1973. *C. anatolii* Teimurov et Taisumov - К. Анатолия = V(АС - верх. р. Кара-Самур: Тайсумов, Теймуров, 2010): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Es> l.c. р. Кара-Самур

Genus 526. Cydonia Hill - Айва

1974. *C. oblonga* Mill. - А. продолговатая = I(Т,АЕ); II(КН - Терек); III(ЧО - Сунжа); IV(СЗЗ); V(Даг): (Общедр.средиз.); S(Phm); [Sp.] <Pa>

Genus 527. Pyrus L. - Груша

1975. *P. caucasica* Fed. - Г. кавказская = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S(Phms); [Pl.] <Pa;Pmel>

1976. *P. salicifolia* Pall. - Г. иволистная = II(КН - Киссык); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Db(Phm); [Sp.] <Rx> l.c. Червлёная

1977. *P. x georgica* Kuth. - Г. грузинская (*P. salicifolia* x *P. caucasica*) = V(Касп: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); S(Phm); [R.]

Genus 528. Malus Hill - Яблоня

1978. *M. orientalis* Uglitzk. - Я. восточная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субкавк*.); S(Phms); [Pl.] <Pa;Pm>

Genus 529. Sorbus L. - Рябина

1979. *S. aucuparia* L. (*S. caucasigena* Kom. et Gatsch.) - Р. обыкновенная = III(ЗК,Э,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Европ.); S(Phms); [Pl.] <Pm;Pa>

1980. *S. domestica* L. - Р. садовая = IV([Н - Анапа-Новороссийск, г. Орёл]: Литвинская, 2011): (Средиземн.); S(Phm); [R.]

1981. *S. hajastana* Gabr. - Р. айстанская = III(ВС - Аргун, Шатили: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(Phm); [R.] <Esub>

1982. *S. subfusca* (Ledeb.) Boiss. (*S. albovii* Zinserl.) - Р. буроватая = III(ВЛ,ТЗ,[ЦЭ - западная часть]); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(Phn); [R.]

1983. *S. velutina* (Albov) Schneid. - Р. бархатистая = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phn); [R.]

1984. *S. armeniaca* Hedl. - Р. армянская = V(Касп - Джеми: Гроссгейм, 1962): (Кавк.: Общекавк.); Da(Phn); [R.]

1985. *S. kusnetzovii* Zinserl. - Р. Кузнецова = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА); V(АС: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Do(Phn); [R.]

1986. *S. buschiana* Zinserl. (*S. subtomentosa* (Albov) Zinserl.) - Р. Буша = III(ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phm); [R.] <Esub>

1987. *S. colchica* Zinserl. - Р. колхидская = III(ВЛ,ТЗ); V(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb(Phn); [R.] <Esub>

1988. *S. graeca* (Sprach) Lodd. ex Schauer. - Р. греческая = III(П - Машук, ВЛ,ТЗ,Ч); IV(ТА): (Евро-Кавк.); Da(Phm); [R.]

1989. *S. taurica* Zinserl. - Р. крымская = III(КР); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); S(Phm); [R.]

1990. *S. caucasica* Zinserl. (*S. stankovii* Juz.) - Р. кавказская = III(П,Кисл,КР,Х,ВЛ,ТЗ,ОС); IV(ТА); V(Касп,[ЦД - Берхани-када, г. Шамхалдаг, Миджах: Муртазалиев, 2009]): (Кавк.: Общекавк.); Pa,S,Do(Phm); [Sp.] l.c. г. Бештау

1991. *S. migarica* Zinserl. - Р. мигарская = III(ВЛ,ТЗ): (Кавк.: Общекавк.); Da(Phn); [R.]

1992. *S. fedorovii* Zaikonn. - Р. Фёдорова = III(Х,ВЛ,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn); [R.] <Esub>

1993. *S. torminalis* (L.) Crantz - Р. глоговина = III(Х,ВЛ,ТЗ,П,Кисл,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Европ.); S(Phms); [Sp.] <Rg;Rt>

Genus 530. Amelanchier Medik. - Ирга

1994. *A. ovalis* Medik. (*A. rotundifolia* (Lam.) Dum.-Cours.nom. illegit.) - И. овальная = III(ЗК,Э,ВК); V(Дар): (Средиземн.); Da(Phn); [Sp.] <Pa>

Genus 531. Pyracantha M.Roem. - Пираканта

1995. *P. coccinea* (L.) M.Roem. - П. красная = IV(СЗЗ); V(Касп - низовья Самура): (Зап.др.средиз.); S,Pa(Phn); [R.]

Genus 532. Mespilus L. - Мушмула

1996. *M. germanica* L. - М. германская = II(М - Терек); III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Общедр.средиз.); S(Phm); [R.] <Pm>

Genus 533. Crataegus L. - Боярышник

1997. *C. meyeri* Rojark. - Б. Мейера = V([Касп - Манасаул, Терменлик]: Залибеков, 2015): (Субкавк*.); ST(Phm); [R.] <Rx>

1998. *C. taurica* Rojark. - Б. крымский = (II(Т); IV(Н - Новороссийск]): Литвинская, 2011): (Кр.-Новоросс.); ST(Phm); [R.]

1999. *C. ambigua* С.А.Меу. ex А.Веск. - Б. сомнительный = I(М); II(ВП): (Понтич.); Db(Phm); [Sp.] <Pmel>

2000. *C. atrosanguinea* Rojark. - Б. тёмно-красный = V(Касп - Сарыкум, Дубки: Залибеков, 2015): (Субкавк*.); Phm(ST); [R.] <Rx>

2001. *C. caucasica* С.Коч - Б. кавказский = V([Касп - Гарах, Самур]: Залибеков, 2015): (Субкавк*.); ST(Phm); [R.] <Rx>

2002. *C. songarica* С.Коч - Б. сонгарский = II(Кизл - Червлёные Буруны: Асадулаев, Залибеков, 2013): (Туранск.); ST(Phm); [R.] <Rx>

2003. *C. curvisepala* Lindm. (*C. kyrtostyla* auct.; *C. rhipidophylla* Gand.) - Б. согнуточашелистниковый = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э, Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); S(Phm); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>

2004. *C. pallasii* Griseb. (*C. beckeriana* Rojark.) - Б. Палласа = II(ВП); V(БН,Касп): (Понтич.); Db(Phm); [Sp.] <Pmel>

2005. *C. stevenii* Rojark - Б. Стевена = V(Касп - Нарын-Кала: Залибеков, 2015): (Вост.средиз.); ST(Phm); [R.] <Rx>

2006. *C. monogyna* Jacq. - Б. однопестичный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); S(Phm); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>

2007. *C. pseudoheterophylla* Rojark. - Б. ложнораздельнолистный = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da(Phm); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>

2008. *C. microphylla* C.Koch (*C. lagenaria* Fisch. et. C.A.Mey.) - Б. мелколистный = **III(Куб,КР,ЧК,П,Каб); IV(СЗЗ); V(БН - Зубутли: Залибеков, 2015):** (Субкавказ*.); S(Phn); [R.] <Pmel>

2009. *C. daghestanica* Gladkova - Б. дагестанский = **V([Касп - Кумторкала, ЦД - Арахани, Хлют]: Залибеков, 2015):** (Кавк.: Эукавказ.); ST(Phm); [R.] <Ee>

2010. *C. pentagyna* Waldst. et Kit. (*C. astrofusca* (C.Koch) Kassumova) - Б. пятипестичный = **I(КЕ,Прик,ТБ,НК); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Зап.др.средиз.); Pa,ST(Phm); [Pl.] <Pm;Pa;Pmel>

2011. *C. tzvelevii* Ufimov - Б. Цвелёва = **V([Касп - Гарах, Межгюль, Хив, Хоредж]: Залибеков, 2015):** (Кавк.: Эукавказ.); ST(Phm); [R.] <Ee>

Genus 534. Rubus L. - Костяника, Малина, Ежевика

2012. *R. saxatilis* L. - К. обыкновенная = **III(Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); V(Даг):** (Панбор.); Pb(НК); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>

2013. *R. idaeus* L. (*R. buschii* Grossh. ex Sinjakova) - М. обыкновенная = **III(Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Даг):** (Европ.); S(Phn); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>

2014. *R. discernendus* Sudre - Е. различимая = **III(ТА - хр. Аибга: Голгофская, 1977):** (Кавк.: Эукавказ.); S(Phn); [R.] <Esub>

2015. *R. anatolicus* (Focke) Focke ex Hausskn. (*R. sanguineus* auct.; *R. sanctus* Schreb.) - Е. азиатская = **III(Куб,КР); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Субкавказ*.); Aa(Phn); [Sp.] <Pa;Pmel>

2016. *R. ibericus* Juz. - Е. грузинская = **III(Л,Ч - Шали,Ножай-Юрт); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавказ.); S(Phn); [R.] <Pa;Pmel>

2017. *R. sandicans* Weihe (*R. praecox* Bertol.) - Е. беловатая = **I([Прик (г.Брык): Танфильев, Кононов, 1987]); III(Куб,КР,Х,ВЛ,Ч); IV(Н); V(БН,Касп):** (Европ.); S(Phn); [R.] <Pa;Pmel>

2018. *R. Lloydianus* Genev. (*R. tomentosus* Borkh.) - Е. Ллойда = **III(КР,Х,МА,ВЛ,П,Кисл); IV(Н):** (Кавк.: Общекавказ.); S(Phn); [R.] <Pa;Pm;Pmel>

2019. *R. canescens* DC. (*R. tomentosus* Borkh. nom. illegit.) - Е. седоватая = **III(Куб,КР,ЧК,П,Кисл,Каб); IV(СЗЗ):** (Зап.др.средиз.); S(Phn); [R.] <Pa;Pmel>

2020. *R. caucasicus* Focke - Е. кавказская = **III(ЗК,П); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Субкавказ*.); S(Phn); [R.] <Pa;Pmel>

2021. *R. platyphyllos* C. Koch - Е. широколистная = **III(УН - Алагир):** (Кавк.: Эукавказ.); S(Phn); [R.] <Esub> <Pa;Pm;Pmel>

2022. *R. caesius* L. - Е. сизая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); S,Pa(Phn); [Pl.] <Pa;Pm;Pmel>

2023. *R. hirtus* Waldst. et Kit. - Е. щетинистая = **III(КР,Х,ВЛ,ТЗ,ВК); IV(СЗЗ):** (Средиземн.); S(Phn); [Sp.] <Pa;Pm;Pmel>

2024. *R. serpens* Weiche ex Lej. et Court. - Е. змеевидная = **IV(ТА); V(БН):** (Европ.); S(Phn); [R.]

Genus 535. Fragaria L. - Земляника

2025. *F. viridis* (Duch.) Weston - З. зелёная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pa>

2026. *F. vesca* L. - З. лесная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Голаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pa>

2027. *F. moschata* (Duch) Weston - З. мускусная = I(M); III(Ст,Куб,П,СК,ЧО); V(БН): (Европ.); S(НК); [R.] <Pm;Pa>

Genus 536. Comarum L. - Сабельник

2028. *C. palustre* L. (*Potentilla palustris* (L.) Scop.) - С. болотный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б): (Голаркт.); Pb,Аа(НК); [R.] <Pm>

Genus 537. Duschesnea Smith - Дюшенея

2029. *D. indica* (Andr.) Focke - Д. индийская = IV(ТА): (Адвент. [Индия, Китай]; S,Аа(НК); [Sp.]

Genus 538. Pentaphylloides Hill. - Курильский чай

2030. *P. fruticosa* (L.) O.Schwarz (*Dasiphora fruticosa* (L.) Rydb., *Potentilla fruticosa* L.) - К.ч. кустарниковый = III(ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); V(Даг): (Панбор.); Pb(Ch); [R.] <Pa>

Genus 539. Potentilla L. - Лапчатка

2031. *P. orientalis* Juz. (*P. bifurca* L.) - Л. восточная = III(ЧК,ЦЭ); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da,Dd(НК); [Sp.]

2032. *P. elatior* Willd. ex Schlecht. - Л. высокая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ, Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

2033. *P. divina* Albov - Л. чудесная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>

2034. *P. ghalgana* Juz. (*P. oweriniana* Boiss.) - Л. ингушская = III(Л,УН,Ч): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Ee> l.c. г. Джерашки (Ингушетия)

2035. *P. brachypetala* Fisch. et C.A.Meу. ex Lehm. - Л. коротколепестная = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>

2036. *P. samillae* Kolak. - Л. Камиллы = IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>

2037. *P. sterilis* (L.) Garcke - Л. бесплодная = I(Тем - Краснодар); III(Ч - Алкун: [Галушко, 1980](#)): (Европ.); S(НК); [R.] <Rg>

2038. *P. micrantha* Ramond ex DC. - Л. мелкоцветковая = III(Куб,ЦЭ,ЧО,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Средиземн.); S(НК); [Sp.]

2039. *P. foliosa* Somm. et Levier - Л. олиственная = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [R.]

2040. *P. multifida* L. - Л. многонадрезанная = III(ОС); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb,Pc,Do(НК); [R.]

2041. *P. alexeenkoi* Lipsky - Л. Алексеенко = III(Б - Безенги, ВС - Шаро-Аргун) V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Rs.] <Ee>

2042. *P. agrimonioides* Bieb. - Л. репейниколистная = III(ЦЭ,ОС,ВС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Do(НК); [Pl.]

2043. *P. nivea* L. - Л. снежная = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(Даг): (Голаркт.); Pc,Do(НК); [R.]

2044. *P. argentea* L. - Л. серебристая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Сиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>

2045. *P. canescens* Bess. (*P. inclinata* auct.) - Л. седая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.]

2046. *P. svanetica* Siegfr. et R.Keller - Л. сванетская = **III**(ВЛ - Гузериплъ: **Косенко, 1970**,ТЗ,ЦЭ); **IV**(ТА: **Солодько, 2002**); (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
2047. *P. pimpinelloides* L. (*P. tanaitica* Zing.) - Л. бедреницелистная = **III**(ЦЭ,Б,ОС); **V**(Дар): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
2048. *P. recta* L. - Л. прямая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.]
2049. *P. obscura* Willd. - Л. неясная = **III**(Ст,Куб,П,Кисл); **V**(БН,Касп): (Субкавк*.); Pa,ST(НК); [Sp.]
2050. *P. semilaciniosa* Vob. - Л. полунадрезанная = **III**(ЧО); **V**(БН,Касп): (Евро-Кавк.); Pa(НК); [R.]
2051. *P. taurica* Willd. ex Schlecht. - Л. крымская = **III**(КР,ВЛ -Псебай,ЦЭ - Кубань); **IV**(Н): (Кр.-Новоросс.); ST,Da(НК); [R.] <Rx>
2052. *P. astrachanica* Jacq. - Л. астраханская = **I**(НД,КЕ,Т); **III**(Ст: **Танфильев, Кононов, 1987**); **IV**(СЗЗ): (Понтич.); Da,Db(НК); [Sp.]
2053. *P. callieri* Juz. - Л. Калье = **IV**(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [R.] <Rx>
2054. *P. supina* L. - Л. низкая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,П,Кисл); **V**(Касп,ЦД): (Голаркт.); Aa(T); [Pl.]
2055. *P. norvegica* L. - Л. норвежская = **III**(ТЗ): (Палеаркт.); Aa(T); [R.] <Rg>
2056. *P. ruprechtii* Boiss. - Л. Рупрехта = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Sp.] l.c. Мамисонский перевал
2057. *P. nordmanniana* Ledeb. - Л. Нордмана = **III**(ВЛ): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
2058. *P. caucasica* Juz. - Л. кавказская = **I**(КЕ,Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pa,ST(НК); [Sp.]
2059. *P. sphenophylla* Th. Wolf - Л. клинолистная = **IV**(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] l.c. Новороссийск <Es>
2060. *P. orbiculata* Th. Wolf - Л. округлая = **III**(ВЛ,ТЗ,УН); **IV**(ТА); **V**(БН - В.Казанище: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
2061. *P. adscharica* Somm. et Levier - Л. аджарская = **III**(Ст,ЛН,СКТ,Э); **V**(Дар): (Субкавк*.); Pa,ST(НК); [Sp.]
2062. *P. gelida* C.A.Mey. - Л. холодная = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Субкавк*.); Do(НК); [Pl.]
2063. *P. crantzii* (Crantz) G.Beck ex Fritsch (*P. verna* L.) - Л. Кранца = **III**(ЗК,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.]
2064. *P. humifusa* Willd. ex Schlecht. - Л. распростёртая = **I**(НД); **III**(Ст,Куб,ТЗ,СК,П,Кисл): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
2065. *P. boreo-caucasica* Kechaykin - Л. северо-кавказская = **III**(П - Машук: Кечайкин, 2017): (Кавк.: Предкавк.); ST(НК); [Rs.] <Es> l.c. г. Машук
2066. *P. adenophylla* Boiss. et Hohen. - Л. железистая = **III**(Ст,КР,ЧК,ЦЭ,ОС); **V**(Дар): (Субкавк*.); ST(НК); [Sp.]
2067. *P. pilosa* Willd. - Л. волосистая = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Европ.); ST(НК); [Pl.]

2068. *P. leucotricha* (Borb.) Borb. - Л. беловолосистая = I(НД,АЕ): (Европ.); ST(НК); [Pl.]

2069. *P. crassa* Tausch - Л. толстая = I(НД,АЕ): (Европ.); ST(НК); [Sp.]

2070. *P. collina* Wib. (*P. wibeliana* Th. Wolf) - Л. холмовая = I(ЗПМ): (Европ.); Аа(НК); [R.]

2071. *P. arenaria* Borkh. (*P. glaucescens* Schlecht.; *P. cinerea* auct.) - Л. песчаная = III(Ст,ТЗ,СК,П,Кисл,ЦЭ - Баксан,УН,Ч): (Европ.); ST,Da(НК); [Sp.]

2072. *P. erecta* (L.) Ralusch. - Л. прямостоящая = III(Куб,Э,Тер); IV(ТА); V(Дар): (Палеаркт.); Ра(НК); [Pl.] <Pm>

2073. *P. reptans* L. - Л. ползучая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.] <Pm;Pp>

2074. *P. anserina* L. - Л. гусиная лапка = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Куб,П,Кисл); V(Дар): (Плюрирег.); Аа(НК); [R.] <Pm;Pmel>

Genus 540. Sibbaldia L. - Зиббальдия

2075. *S. parviflora* Willd. - З. редкоцветковая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Субкавказ*); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]

2076. *S. semiglabra* С.А.Меу. - З. полуголая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Субкавказ*); Рс,Do(НК); [Sp.]

Genus 541. Geum L. - Гравилат

2077. *G. urbanum* L. - Г. городской = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pa>

2078. *G. aleppicum* Jacq. (*G. strictum* Ait.) - Г. алеппский = III(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Голаркт.); S(НК); [R.]

2079. *G. latilobum* Somm. et Levier - Г. широколопастный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавказ.); Ра(НК); [Sp.]

2080. *G. rivale* L. - Г. речной = III(Х,ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(АС): (Голаркт.); Pb,Аа(НК); [Pl.]

Genus 542. Woronowia Juz. - Вороновия

2081. *W. speciosa* (Albov) Juz. (*Geum speciosum* Albov) - В. красивая = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА); (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Рс(НК); [Sp.] <Esub>

Genus 543. Dryas L. - Куропаточья трава (Дриада)

2082. *D. caucasica* Juz. - К.т.(Д.) кавказская = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,Л,УН,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Эукавказ.); Рс,Do(Ch:sv); [Pl.] <Esub> l.c. г. Столовая, окр. Владикавказа

Genus 544. Filipendula Mill. - Лабазник

2083. *F. vulgaris* Moench (*F. hexapatala* Gilib.) - Л. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Сиб.); Ра,ST(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

2084. *F. ulmaria* (L.) Maxim. - Л. вязолистный = III(Куб,Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Евро-Сиб.); Аа(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

Genus 545. Alchemilla L. - Манжетка

2085. *A. sericea* Willd. - М. шелковая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Субкавказ*); Рс,Do(НК); [Pl.]

2086. *A. chlorosericea* (Buser) Juz. - М. зелёно-шёлковая = III(ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавказ.); Рс,Do(НК); [R.] <Ee>

2087. *A. sericata* Reichenb. ex Bus. (*A. tephroserica* (Buser) Juz.) - М. шелко-
вистая = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.);
Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]
2088. *A. rigida* Bus. - М. жёсткая = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **V**(ЦД,АС): (Кавк.:
Общекавк.); Рс,Do(НК); [Pl.] l.c. Эльбрус, массив Кюкюртлю
2089. *A. elisabethae* Juz. - М. Елизаветы = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС):
(Кавк.: Эукавк.); Рс(НК); [Pl.] <Esub> l.c. Балкария (?)
2090. *A. jaroschenko*i Grossh. - М. Ярошенко = **V**(ЦД,АС: Муртазалиев,
2009): (Кавк.: Эукавк.); Рс(НК); [R.] <Esub>
2091. *A. taurica* (Buser) Juz. - М. крымская = **III**(КР,Х): (Европ.); Pb(НК);
[R.]
2092. *A. caucasica* Bus. - М. кавказская = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); **V**(АС):
(Кавк.: Общекавк.); Рс,Do(НК); [Pl.] <Pp>
2093. *A. languida* Bus. - М. вялая = **III**(П,Кисл,ЦЭ,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС):
(Кавк.: Общекавк.); Рс(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск
2094. *A. grossheimii* Juz. - М. Гроссгейма = **III**(ОС): (Субкавк*.); Pb(НК);
[Sp.]
2095. *A. insignis* Juz. - М. замечательная = (**III**(ВЛ); **IV**(ТА)): Алтухов,
1971): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
2096. *A. valdehirsuta* Buser - М. очень-жестковолосистая = **III**(ТЗ,ЦЭ,
Б,ОС); **V**(АС): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]
2097. *A. sedelmeyeriana* Juz. - М. Зедельмейера = **V**(АС): (Субкавк*.);
Pb,Рс(НК); [R.]
2098. *A. minusculiflora* Buser - М. мелкоцветковая = **III**(ВЛ): (Кавк.: Эу-
кавк.); Рс(НК); [R.] <Esub>
2099. *A. microdonta* Juz. - М. мелкозубчатая = **III**(ЧК,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,
ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.] l.c. окр. Владикавказа
2100. *A. urceolata* Juz. - М. мешочковая = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); **IV**(ТА - Красная
Поляна): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Ачишхо.
2101. *A. derexa* Juz. - М. приглаженная = **III**(ВЛ: Литвинская, Муртазали-
ев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
2102. *A. psilocaula* Juz. - М. лысостебельная = **III**(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.:
Эукавк.); Pb,Рс(НК); [Sp.] <Es> l.c. хр. Малая Хатипара (Теберда)
2103. *A. tamarae* Juz. - М. Тамары = **III**(Л,УН,Ч): (Кавк.: Эукавк.); Pa(НК);
[Sp.]
2104. *A. frondosa* Juz. - М. олиственная = **III**(ТЗ - ущ. р. Сев. Клухор:
Юзепчук, 1941): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Rs.] <Es> l.c. Сев. Клухор
2105. *A. daghestanica* Juz. - М. дагестанская = **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.);
Pb(НК); [R.] <Es> l.c. окр. с. Камидух
2106. *A. diversipes* Juz. - М. разностолбиковая = **III**(Б,ОС); **V**(АС): (Кавк.:
Общекавк.); Pb(НК); [R.]
2107. *A. persica* Rothm. (*A. oxysepala* Juz.) - М. персидская =
III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(АС): (Субкавк*.); Pb(НК): [Sp.]
2108. *A. laeta* Juz. - М. светлая = **III**(ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(НК); [R.]
<Esub> l.c. ущ. р. Азгек

2109. *A. circassica* Juz. - М. черкесская = (III(ВЛ - Лагонаки); IV(ТА - г. Аибга): Алтухов, 1971): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Ee>

2110. *A. epipsila* Juz. - М. сверхголая = III(ВЛ - г. Б.Бамбак: Алтухов, 1971, ЦЭ, [ОС - Цейское ущ.: Амирханов и др., 1998]): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

2111. *A. divaricans* Buser - М. растопырывающаяся = III(Кисл, ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Ee> л.с. окр. Кисловодска

2112. *A. epidasys* Rothm. (*A. pseudomollis* Juz.) - М. сверху-опушённая = III(ТЗ, ЦЭ, Б); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub> л.с. г. Аибга

2113. *A. orthotricha* Rothm. (*A. holotricha* Juz.; *A. oxysepala* Juz.) - М. прямоволосистая = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Аа(НК); [R.] <Esub> л.с. Клухорский перевал

2114. *A. speciosa* Buser - М. видная = III(Б, ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Do(НК); [R.] <Esub>

2115. *A. stellulata* Juz. - М. звёздочковая = III(ТЗ, ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> л.с. окр. г. Теберда

2116. *A. venosa* Juz. - М. жилковатая = III(ОС: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pb, Pc(НК); [R.]

2117. *A. abchasica* Buser - М. абхазская = IV(ТА - верх. р. Мзымты: Тимухин, 2012): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc, Do(НК); [R.] <Esub>

2118. *A. tredecimloba* Buser - М. тринадцатиллопастная = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Аа(НК); [Sp.] <Esub>

2119. *A. dura* Buser - М. твёрдая = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.] л.с. г. Эльбрус, массив Кюкюртлю

2120. *A. retinervis* Buser - М. сетчатожилковая = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); IV(ТА); V(АС): (Субкавк*.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]

2121. *A. debilis* Juz. - М. слабая = V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc, Do(НК); [R.]; <Esub> л.с. Южный Дагестан (?)

2122. *A. dombaica* Juz. - М. домбайская = III(ТЗ: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es>

Genus 546. *Aphanes* L. - Невзрачница

2123. *A. arvensis* L. (*Alchemilla arvensis* Scop.) - Н. полевая = IV(Н); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Pa(T); [R.]

Genus 547. *Agrimonia* L. - Репейничек

2124. *A. pilosa* Ledeb. - Р. волосистый = III(ВЛ, ТЗ); V(ЦД): (Палеаркт.); Pa(НК); [R.]

2125. *A. eupatoria* L. - Р. аптечный = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); Pa, ST(НК); [Pl.] <Pm>

Genus 548. *Sanguisorba* L. - Кровохлёбка

2126. *S. officinalis* L. - К. аптечная = I(НД); III(Куб, Э, Тер); IV(ТА): (Голаркт.); Pb(НК); [Sp.] <Pm; Pp>

Genus 549. *Poterium* L. - Черноголовник

2127. *P. polygamum* Waldst. et Kit. - Ч. многобрачный = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Общедр.средиз.); Pa, ST(НК); [Pl.]

Genus 550. *Rosa* L. - Шиповник

2128. *R. gallica* L. (*R. taurica* Chrshan.) - Ш. французский = III(КР,Куб,П,Л); IV(Н): (Европ.); ST(Ch:fl); [R.] <Rx;Pmel>
2129. *R. pimpinellifolia* L. (*R. spinosissima* L.) - Ш. бедреницелистный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST(Phn); [Pl.] <Pmel>
2130. *R. elongata* Galushko - Ш. удлинённый = III(ЦЭ - Баксан, Адыл-Су): (Кавк.: Эукавк.); S(Phn); [R.] <Es> l.c. верх. р. Баксан
2131. *R. elasmacantha* Trautv. - Ш. плоскошипый = III(ТЗ,СК,П,Кисл.); V(БН,Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Pmel>
2132. *R. myriacantha* DC. - Ш. многошипый = III(П,ЦЭ - Кубань); V(Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); Da(Phn); [Sp.]
2133. *R. praetermissa* Galushko - Ш. пропущенный = III(Кисл): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Es> l.c. р. Кичмалка
2134. *R. baxanensis* Galushko - Ш. баксанский = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phn); [R.] <Es>
2135. *R. adenophylla* Galushko - Ш. железистолистный = III(ЦЭ - Баксан): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Баксан
2136. *R. obtegens* Galushko - Ш. сближенный = III(ЦЭ - Баксан): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Es> l.c. р. верх. р. Баксан
2137. *R. balcarica* Galushko - Ш. балкарский = III(ЦЭ - Чегем,Адыл-Су): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn); [R.] <Es> l.c. р. Адыл-Су в месте впадения р. Шхельда
2138. *R. oxyodon* Boiss. - Ш. острозубчатый = III(Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pb(Phn); [Sp.]
2139. *R. majalis* Herrm. - Ш. майский (коричный) = III(П - г. Развалка): (Европ.); S(Phn); [R.] <Rg>
2140. *R. prokhanovii* Galushko - Ш. Проханова = III(ЦЭ - Чегем, ОС - Урух): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Ee> l.c. окр. с. Актопрак (р. Чегем)
2141. *R. buschiana* Chrshan. - Ш. Буша = III(ЦЭ,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(Phn); [Sp.] <Esub>
2142. *R. sosnovskiana* Tamamsch. - Ш. Сосновского = V(ЦД - Карахская дача, Кули: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); S(Phn); [R.]
2143. *R. teberdensis* Chrshan. - Ш. тебердинский = III(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phn); [R.] <Esub>
2144. *R. canina* L. (*R. corymbifera* Borkh.; *R. didoensis* Boiss.) - Ш. собачий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); Pa,ST(Phn); [Pl.] <Pm;Pmel>
2145. *R. irinae* Demurova - Ш. Ирины = III(ОС - верх. басс. р. Фиагдон: КК РСО-А, 1999): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn); [Rs.] <Es>
2146. *R. dumalis* Beshst. (*R. afzeliana* Fries) - Ш. рощевой = III(Э,Б,ОС,ВС); IV(Касп): (Европ.); Pa(Phn); [Sp.]
2147. *R. prilipkoana* Sosn. = Ш. Прилипко = V(АС - Тлярата, Телетль: Муртазалиев, 2009): (Кавк. Общекавк.); S(Phn); [R.]

2148. *R. zaramagensis* Demurova - Ш. зарамагский = **III**(ОС - верх. Ардона): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Da(Phn); [R.] <Es> l.c. окр. с. Зарамаг (верх. р. Ардон)
2149. *R. caesia* Smith (*R. coriifolia* Fries.) - Ш. сизый = **III**(Ст - Ставрополь: **Танфильев, Кононов, 1987**): (Европ.); Pa(Phn); [R.] <Pm; Pmel> <Rg>
2150. *R. dolichocarpa* Galushko - Ш. удлинённоплодный = **III**(П - г.Развалка): (Кавк.: Предкавк.); Da(Phn); [Rs.] <Es> l.c. Железноводск, г. Развалка
2151. *R. balsamica* Bess. (*R. klukii* Bess.; *R. rubiginosa* L. p.p.) - Ш. бальзамический = **I**(**ЗП, ЦП**); **II**(**ВП**); **III**(**Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК**); **IV**(**СЗЗ**); **V**(**Даг**): (Евро-Кавк.); ST(Phn); [Sp.] <Pmel>
2152. *R. hirtissima* Lonacz. - Ш. щетинистоволосистый = **III**(ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phn); [R.] <Esub>
2153. *R. pubicaulis* Galushko - Ш. опушённостебельный = **III**(ТЗ - Джемагат, ЦЭ - Адыл-Су): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Es> l.c. р. Джемагат в месте впадения р. Эпчик
2154. *R. tschegemensis* Galushko - Ш. чегемский = **III**(ЦЭ - Чегем): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Do(Phn); [R.] <Es> l.c. окр. с. Верхний Чегем
2155. *R. brotherorum* Chrshan. - Ш. Бротерусов = **III**(Б, ОС); **V**(АС - Кулушац, г. Дидо: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn); [R.] <Esub>
2156. *R. uniflora* Galushko - Ш. одноцветковый = **III**(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Da, Do(Phn); [R.] <Es> l.c. окр. с. Лахран по р. Малке
2157. *R. terscolensis* Galushko - Ш. терскольский = **III**(ЦЭ - Баксан): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Терскол
2158. *R. marschalliana* Sosn. - Ш. Маршалла = **I**(**ЗП, ЦП**); **II**(**ВП**); **III**(**Ст, П**); **IV**(**Н**); **V**(**Касп**): (Кавк.: Эукавк.); Pa, ST(Phn); [R.] <Esub>
2159. *R. komarovii* Sosn. - Ш. Комарова = **V**([Касп, ЦД - Рутул, АС - Курруш]: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phn); [R.] <Esub>
2160. *R. micrantha* Sumn. - Ш. мелкоцветковый = **III**(Ст, Кисл, УН); **IV**(Н); **V**(Касп): (Европ.); Da(Phn); [R.]
2161. *R. turcica* Rouy (*R. horrida* Fisch. ex Crep.) - Ш. турецкий = **I**(Т); **IV**(Н): (Вост.средиз.); Da(Phn); [R.]
2162. *R. tuschetica* Boiss. - Ш. тушетский = **V**([ЦД - В.Гуниб, Леваши, Цингази]: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк. Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Esub>
2163. *R. iberica* Stev. ex Vieb. - Ш. грузинский = **III**(**СКТ, ТЗ, Э, ВК**); **V**(**Даг**): (Субкавк*); ST, Da(Phn); [Sp.] <Pmel>
2164. *R. pulverulenta* Vieb. (*R. glutinosa* auct.) - Ш. припудренный = **III**(**ВЛ, ТЗ, Э, ВК**); **V**(**Даг**): (Зап.др.средиз.); ST, Do(Phn); [Sp.] <Pmel> l.c. Кисловодск
2165. *R. sachokiana* P.Jarosch. - Ш. Сахокия = **V**([ЦД - Хоредж, В. Гуниб, АС - Рутул, Узни]: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Esub>
2166. *R. nisami* Sosn. - Ш. Низами = **V**([ЦД - Курах, АС - Куру-кал]: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Общекавк.); S(Phn); [R.]
2167. *R. zangezura* P.Jarosch. - Ш. зангезурский = **V**([ЦД - В.Гуниб, Телетль, АС - Тлярош]: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Общекавк.); Pb(Phn); [R.]

2168. *R. khasautensis* Galushko - Ш. хасаутский = **III**(Кисл - Долина нарзанов): (Кавк.: Эукавк.); Da,Do(Phn); [R.] <Es> l.c. верх. р. Хасаут
2169. *R. cuneicarpa* Galushko et Bagath. - Ш. клиноплодный = **V**(Касп): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Es>
2170. *R. danaiorum* Bagath. - Ш. данайцев = **V**(ЦД - Хоредж: Муртазалиев, 2009, Карадах: Галушко, 1980): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Es>
2171. *R. valentinae* Galushko - Ш. Валентины = **III**(ЦЭ - Баксан, Б - Чегем): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Es>
2172. *R. galushkoi* Demurova - Ш. Галушко = **III**(ОС - Ардон): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Es>
2173. *R. pseudovalentinae* Bagath. - Ш. лже-Валентины = **V**(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [Sp.] <Es>
2174. *R. tomentosa* Smith (*R. cuspidata* Bieb.) - Ш. войлочный = **I**(Т); **II**(Кизл); **III**(Куб,КР,ЧК,Э,ОС,Ч); **V**(Даг): (Европ.); S(Phn); [Sp.] <Pmel>
2175. *R. mollis* Smith (*R. ruprechtii* Boiss.) - Ш. мягкий = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(Даг): (Евро-Кавк.); S(Phn); [R.] <Pmel>
2176. *R. kossii* Galushko - Ш. Коса = **III**(Б - Чегем): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Es> l.c. окр. с. Актопрак (р. Чегем)
2177. *R. villosa* Pall. (*R. pomifera* Herrm.) - Ш. мохнатый (яблочный) = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Европ.); Da,Do(Phn); [Sp.]
2178. *R. borissovae* Chrshan. - Ш. Борисовой = **III**(ЧК,ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Es> l.c. р. Б.Зеленчук
2179. *R. azerbaijdzhanica* Novorokr. - Ш. азербайджанский = **V**([ЦД - Мана, Кули]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.]
2180. *R. boissieri* Crep. - Ш. Буасье = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(Н); **V**(Даг): (Субкавк*.); S(Phn); [Sp.] <Pmel>
2181. *R. arensii* Juz. et Galushko - Ш. Аренса = **III**(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [Sp.] <Es> l.c. р. Джемагат в месте впадения р. Эпчик
2182. *R. oplistes* Boiss. (*R. svanetica* Crep.) - Ш. сванетский = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ОС); **IV**(ТА): (Субкавк*.); Pb(Phn); [Sp.]
2183. *R. tscherekensis* (Galushko) Galushko - Ш. черекский = **III**(Б): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn); [R.] <Es> l.c. верх. р. Черек Балкарский
2184. *R. jundzillii* Bess. - Ш. Юндзилла = **I**(АК,КЕ); **III**(Ст,Куб,СК,П,ЧО): (Европ.); ST(Phn); [R.] <Pmel>
2185. *R. tschatyrdagi* Chrshan. - Ш. чатырдагский = **I**(М - Моздок); **II**(Кизл - Сулак); **V**([Касп,ЦД]: Муртазалиев, 2009): (Субпонт*.); Da(Phn); [R.] <Rx;Pmel>
2186. *R. altidaghestanica* Gussejnov - Ш. верхне-дагестанский = **V**(АС: Муртазалиев, 2009): (Кавк. Эукавк.); Pb(Phn); [R.] <Es>
2187. *R. awarica* Gussejnov - Ш. аварский = **V**(АС: Муртазалиев, 2009): (Кавк. Эукавк.); S(Phn); [R.] <Es> l.c. Цунтинский р-н, с. Бежта
2188. *R. cziragensis* Gussejnov - Ш. чирагский = **V**(ЦД: Чираг: Муртазалиев, 2009): (Кавк. Эукавк.); Pb(Phn); [R.] <Es>
2189. *R. darginica* Gussejnov - Ш. даргинский = **V**(ЦД - Усиша: Муртазалиев, 2009): (Кавк. Эукавк.); S(Phn); [R.] <Es>

2190. *R. kamelinii* Gussejnov - Ш. Камелина = V(АС - Тлярата: Муртазалиев, 2009); (Кавк. Эукавк.); S(Phn); [R.] <Es> l.c. Тляратинский р-н, с. Тлярата.

2191. *R. subbuschiana* Gussejnov - Ш. почти-Буша = V(ЦД - Усиша: Муртазалиев, 2009); (Кавк. Эукавк.); S(Phn); [R.] <Es>

2192. *R. tlaratensis* Gussejnov - Ш. тляратинский = V([АС - Хадиял, Тлядаль]: Муртазалиев, 2009); (Кавк. Эукавк.); Pb(Phn); [R.] <Es>

2193. *R. usischensis* Gussejnov - Ш. усишинский = V(ЦД - Усиша: Муртазалиев, 2009); (Кавк. Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Es>

Genus 551. Prunus L. - Слива

2194. *P. spinosa* L. - С. колючая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); Pa,ST(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>

2195. *P. divaricata* Ledeb. - С. растопыренная (Алыча) = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Общедр.средиз.); S(Phm); [Pl.] <Pa;Pm>

2196. *P. caspica* Koval. et Ekim. - С. каспийская = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S(Phm); [Sp.]

Genus 552. Amygdalus L. - Миндаль

2197. *A. nana* L. - М. низкий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН): (Понтич.); ST(Ch); [Sp.]

Genus 553. Cerasus Hill - Вишня

2198. *C. avium* (L.) Moench (*Prunus avium* L.) - В. птичья (Черешня) = III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл,Ч); IV(СЗЗ); V(Даг): (Европ.); S(Phms); [Pl.] <Pa;Pmel>

2199. *C. fruticosa* Pall. - В. кустарниковая = I(Т); III(Ст,СК,П); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); ST(Phn); [R.] <Po>

2200. *C. incana* (Pall.) Spach - В. серая = III(П,ОС,ВС); V(Даг): (Армено-Иран.); ST(Phn); [R.] <Rx>

Genus 554. Padellus Vass. - Махалебка

2201. *P. mahaleb* (L.) Vassilcz. (*Cerasus mahaleb* (L.) Mill.; *Prunus mahaleb* L.) - М. обыкновенная = I(АЕ); III(Ст,П,Кисл); IV(Н); V(Касп - Сарыкум): (Средиземн.); S, Da(Phm); [R.] <Pm>

Genus 555. Padus Hill - Черёмуха

2202. *P. avium* Mill. (*P. racemosus* (Lam.) Gilib.; *Prunus padus* L.) - Ч. обыкновенная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ЦД,АС): (Палеаркт.); S(Phm); [Pl.] <Pm>

Genus 556. Laurocerasus Hill - Лавровишня

2203. *L. officinalis* M. Roes. - Л. лекарственная = III(Х,ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Субкавк*.); S(Phm:sv); [Sp.] <Pm>

Genus 557. Armeniaca Hill - Абрикос

2204. **A. vulgaris* Lam. - А. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Адвент. [Центр.Азия]); Da(Phm); [Pl.] <Pa;Pm>

Ordo 63. Fabales - Бобоцветные

Familia 103. Caesalpinaceae R.Br. - Цезальпиниевые

Genus 558. Cercis L. - Багряник (Иудино дерево)

2205. *C. siliquastrum L. - Б. рожковый (И.д. рожковое) = IV(C33): (Средиземн.); Da(Phm); [Sp.]

Genus 559. Gleditsia J.Claiton - Гледичия

2206. *G. triacanthos L. - Г. трёхколючковая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ,Л,УН,Ч); IV(C33); V(БН,Касп): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(Phm); [Sp.]

Familia 104. Fabaceae Lindl. (Leguminosae) - Бобовые

Genus 560. Pseudosophora (DC.) Sweet - Псевдософора <GD>

2207. P. alopecuroides (L.) Sweet (*Sophora alopecuroides* L., *Goebelia alopecuroides* (L.) Bunge) - П. лисохвостная = I(M); II(ВП); V(БН,Касп - Самур): (Вост.средиз.); Db(НК); [Sp.] <Pt>

Genus 561. Sophora L. - Софора

2208. S. jaubertii Spach (*Goebelia prodanii* (E.Anders.) Grossh.) - С. Жобера = IV(TA): (Европ.); Pa(НК); [R.]

Genus 562. Argyrolobium Eckl. et Zeih. - Аргиролобиум

2209. A. biebersteinii P.W.Ball (*A. calycinum* (Bieb.) Jaub. et Spach, nom. superfl.) - А. Биберштейна = III(КР,ЧК,СК,П,Кисл); IV(C33): (Армено-Иран.); Pa(Ch:sf); [R.] <Rg>

Genus 563. Spartium L. - Метельник (Испанский дрок)

2210. *S. junceum L. - М. ситниковый = IV(C33): (Адвент. [Средиземноморье]); Da,Db,Do(Phn); [Sp.]

Genus 564. Teline Medik. - Телина

2211. T. monspessulana (L.) C.Koch - Т. монпельская = IV(TA): (Средиземн.); Do(Phn); [R.]

Genus 565. Genista L. - Дрок

2212. ★G. albida Willd. (*G. compacta* Schischk.; *G. angustifolia* Schischk.) - Д. беловатый = I(Тем); III(ЧК,ВЛ,ТЗ,СК,П,Кисл); IV(C33): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch); [R.] <Po> <Ee>

2213. ★G. humifusa L. (*G. lipskyi* Novopokr. et Schischk.; *G. glaberrima* Novopokr.) - Д. распростёртый = IV(C33): (Субкавк*.); Da(Ch:fl); [R.] <Ee>

2214. ★G. suanica Schischk. - Д. сванетский = III(MA - Горячий Ключ); IV(C33): (Субкавк*.); Da(Ch); [R.]

2215. G. abchasica Sachok. - Д. абхазский = IV(TA - Сочи, хр. Дзыхра: КК Краснодарского края, 2007): (Кавк.: Эукавк.); S, Da(Ch:sf); [R.] <Esub>

2216. G. kolakowskyi Sachokia - Д. Колаковского = IV(TA - ущ. р. Мзымты: Тимухин, 2012): (Кавк.: Эукавк.); Da, S(Ch:sf); [R.] <Esub>

2217. G. tanaitica P.Smirn. - Д. донской = I(НД - КК СССР, 1984): (Понтич.); Da(Ch); [R.] <Esub>

2218. G. patula Bieb. (*G. tinctoria auct. non L.*) - Д. отклонённый = I(T); III(Ст,Куб,КР,ЧК,СК,П,Кисл); IV(C33): (Кавк.: Общекавк.); Pa(Ch); [Sp.] <Po>

Genus 566. *Cytisus* L. - Ракитник

2219. *C. austriacus* L. (*Chamaecytisus austriacus*(L.)Link) - Р. австрийский = III(Ст,СК- Георгиевск,П): (Понтич.); ST(Ch); [R.] <Po> <Rg>

Genus 567. *Chamaecytisus* Link - Ракитничек

2220. *Ch. borystenicus* (Grun) Klaskova (*Cytisus borystenicus* Grun) - Р. днепровский = I(НД,АК,КЕ); III(Ст): (Понт.-Южносиб.); Db(Ch); [R.] <Po> <Rx>

2221. *Ch. lindemannii* (V.Krecz.) Klaskova (*C. lindemannii* V.Krecz.) - Р. Линдемманна = III(Ст,СК,П,Кисл): (Понтич.); Pa(Ch); [R.] <Po>

2222. *Ch. ruthenicus* (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova (*C. caucasicus* (Grossh.) Holub) - Р. русский = III(Ст,КР,ЛН,ЧК,СК,П,Кисл); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); Pa(Ch); [Sp.] <Po>

2223. *Ch. ponomarjovii* (Seredin) Czer. (*C. ponomarjovii* Seredin) - Р. Пономарёва = IV(Н - Джубга): (Кавк.: Эукавк.); Da(CH); [R.] <Es> l.c. с. Джубга

2224. *Ch. hirsutissimus* (С.Коч) Galushko (*C. hirsutissimus* С.Коч; *C. colchicus* Albov) - Р. густоволосистый = III(Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); Da(Ch:fl); [R.]

2225. *Ch. wulfii* (V.Krecz.) Klaskova (*C. wulfii* V. Krecz.) - Р. Вульфа = III(КР,ЧК,Кисл); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(Ch:sf); [R.] <Rx>

Genus 568. *Ononis* L. - Стальник

2226. *O. pusilla* L. - С. маленький = III(КР,ЧК,[П: Танфильев, Кононов, 1987],Кисл,УН - Ардон); IV(Н); V(БН,Касп): (Средиземн.); Pa(Ch:sf); [Rs.] <Rx>

2227. *O. arvensis* L. - С. пашенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

2228. *O. antiquorum* L. (*O. leiosperma* Boiss.) - С. древних = I(Т); V(Касп - Махачкала): (Средиземн.); Ra(Ch:sf); [R.]

2229. *O. intermedia* С.А.Меу. - С. промежуточный = II(Кизл); V(Касп): (Средиземн.); ST(НК); [R.]

Genus 569. *Melilotoides* Heist. ex Fabr. - Мелилотоидес

2230. *M. cretacea* (Bieb.) Sojak (*Trigonella cretacea* (Bieb.) Taliev) - М. меловой = I(Т); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(Ch:sf); [R.] <Rx>

Genus 570. *Trigonella* L. - Пажитник

2231. *T. calliceras* Fisch. - П. красиворогий = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Da,Do(Т); [R.]

2232. *T. spicata* Sibth. et Smith - П. колосковый = V(Касп): (Вост.средиз.); ST(Т); [R.]

2233. *T. striata* L. (*T. tenuis* Fisch.) - П. полосатый = V([Касп,ЦД]: Мургазалиев, 2009): (Вост.средиз.); Ra,Rb(Т); [R.]

2234. *T. arcuata* С.А.Меу. - П. дугообразный = IV(Касп,ЦД): (Понтич.); ST,Rb(Т); [R.]

2235. *T. orthoceras* Kar. et Kir. - П. пряморогий = I(АЕ - Егорлык,ЦП); II(ВП); III(ЛН,СК); V(Касп,АС): (Вост.средиз.); ST(Т); [Sp.]

2236. *T. monspeliaca* L. - П. монпельевский = I(Т,М); II(Кизл); IV(Н); V(БН,Касп): (Субпонт*.); SD,Rb(Т); [R.]

2237. *T. procumbens* (Bess.) Reichenb. - П. простёртый = **I**(АК,КЕ,Т,ЦП); **II**(КН); **III**(СТ); **V**(Касп): (Палеаркт.); ST(T); [Sp.]
2238. *T. caerulea* (L.) Ser. - П. голубой = **I**(ЗП,ЦП): (Вост.средиз.); Ra,Rb(T); [R.]
2239. *T. coerulescens* (Bieb.) Halaczy - П. голубоватый = **I**(Прик,ТБ,НК,М); **II**(КН); (Вост.средиз.); SD(T); [R.] <Rx> l.c. Ачикулак
2240. *T. gladiata* Stev. ex Bieb. - П. мечевидный = **I**(Т); **IV**(Н); **V**(Касп): (Вост.средиз.); Da(T); [Sp.]

Genus 571. Medicago L. - Люцерна

2241. *M. lupulina* L. - Л. хмелевидная = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,БК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pp>
2242. *M. rupestris* Bieb. - Л. скальная = **IV**(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [R.] <Rx>
2243. ★*M. cancellata* Bieb. - Л. решётчатая = **I**(Прик); **III**(Ст): (Понтич.); Db(НК); [R.] <Rx;Pp>
2244. *M. falcata* L. - Л. серповидная = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,БК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Палеаркт.); ST(НК); [Pl.] <Pp;Pmel>
2245. *M. difalcata* Sinsk. - Л. дважды-серповидная = **V**(Касп: Муртазалиев, 2009): (Туранск.); Pb(НК); [R.]
2246. *M. caucasica* Vassilcz. - Л. кавказская = **V**(ЦД: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Do(НК); [R.]
2247. *M. romanica* Prod. - Л. румынская = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); **III**(Ст,ЛН,ЧК,СК,П,Кисл,ТС); **V**(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); ST(НК); [R.] <Pp>
2248. *M. sativa* L. - Л. посевная = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп,ЦД): (Голаркт.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Pp;Pm;Pmel>
2249. *M. gunibica* Vass. - Л. гунибская = **III**(ЧО); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); ST,Da(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. с. Гуниб
2250. *M. vardanis* Vass. - Л. варданикская = **III**(ВЛ,ТЗ,П,Кисл,ЦЭ,Б); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Кисловодск
2251. *M. karatschaica* Latsch. - Л. карачаевская = **III**(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Es>
2252. *M. glandulosa* Davidov - Л. железистая = **I**(Т); **III**(КР); **IV**(СЗЗ): (Евро-Кавк.); ST,Rb(НК); [R.] <Pp>
2253. *M. hemicycla* Grossh. - Л. полукруглая = **V**([Касп,ЦД]: Муртазалиев, 2009): (Субкавк*.); Pa(НК); [R.]
2254. *M. caerulea* Less. ex Ledeb. - Л. голубая = **I**(АК,КЕ,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,СК,П,Кисл,Каб,ЧО,ТС); **V**(БН,Касп,ЦД): (Туранск.); ST,Db(НК); [Pl.] <Pp>
2255. *M. hemicoerulea* Sinsk. - Л. почтиголубая = **V**(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Pl.] <Esub> l.c. с. Ахты (р. Самур)
2256. *M. polychroa* Grossh. - Л. разноцветная = **V**([ЦД - В.Дженгутай, АС]: Муртазалиев, 2009): (Вост.средиз.); Pb(НК); [R.]
2257. *M. subfalcata* Sinsk. - Л. почтисерповидная = **III**(ЧК,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Sp.]

2258. *M. glutinosa* Bieb. (*M. subfalcata* Sinsk.) - Л. клейкая = **III**(X,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **V**(Даг): (Кавк.: Эукавк.); Pa,ST(НК); [R.] <Esub>
2259. *M. virescens* Grossh. - Л. зеленоватая = **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
2260. *M. marina* L. - Л. морская = **IV**(ТА: **Зернов, 2006**): (Средиземн.); Db(НК); [R.]
2261. *M. orbicularis* (L.) Bartalini - Л. округлая = **I**(Т); **III**(Ст,Куб,ЧК,П,ЧО); **IV**(Н); **V**(БН,Касп): (Зап.др.средиз.); ST,Rb(Т); [Sp.] <Pp>
2262. *M. truncatula* Gaertn. (*M. tribuloides* Desr.) - Л. обрубленная = **III**(ОС): (Средиземн.); Rb(Т); [R.]
2263. *M. rigidula* (L.) All. (*M. agrestis* Ten.) - Л. жестковатая = **I**(Т); **III**(СК - Георгиевск и Новомарьевская,ЧО); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Общедр.средиз.); ST,Rb(Т); [R.]
2264. *M. littoralis* Rohde ex Loisel. - Л. прибрежная = **IV**(ТА - Адлер: **Гроссгейм, 1952**): (Средиземн.); Db(Т); [R.]
2265. *M. arabica* (L.) Huds. - Л. аравийская = **IV**(ТА: **Зернов, 2006**); **V**(Касп): (Средиз.); ST,Rb(Т); [R.]
2266. *M. denticulata* Willd. - Л. зубчатая = **I**(Т); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); Db,Rb(Т); [Sp.]
2267. *M. daghestanica* Rupr. - Л. дагестанская = **III**(ВС - Итумкале); **V**(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Гимры
2268. *M. minima* (L.) Bartalini - Л. маленькая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Общедр.средиз.); ST,Rb(Т); [Pl.]

Genus 572. Melilotus Hill - Донник

2269. *M. neapolitanus* Ten. - Д. неаполитанский = **IV**(Н - Новороссийск: **Гроссгейм, 1952**): (Средиземн.); Da(Т); [R.]
2270. *M. indicus* (L.) All. - Д. индийский = **V**(Касп - Дербент): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(Т); [R.]
2271. *M. polonicus* (L.) Pall. (*M. caspius* Grun.) - Д. польский = **I**(М); **II**(ВП); **V**(Касп): (Туранск.); Db(НК:pb); [Pl.] <Pp>
2272. *M. dentatus* (Waldst. et Kit) Pers. - Д. зубчатый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,П,Кисл,СКТ); **V**(Даг): (Палеаркт.); Pa,Aa(НК:pb); [Sp.] <Pp>
2273. *M. albus* Medik. - Д. белый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,ТЗ,П,Кисл,СКТ); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
2274. *M. wolgicus* Poir. (*M. ruthenicus* Bieb.) - Д. волжский = **II**(ВП): (Понт.-Южносиб.); Rb(НР:pb); [R.] <Pp>
2275. *M. officinalis* (L.) Pall. - Д. лекарственный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
2276. *M. hirsutus* Lipsky - Д. волосистый = **III**(Куб,ЧК); **IV**(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК:pb); [R.] <Esub> l.c. Новороссийск

Genus 573. Lupinaster Fabr. - Люпинастер

2277. *L. polyphyllum* (C.A.Mey.) Latsch. (*Trifolium polyphyllum* C.A.Mey.) - Л. многолистный = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,Л,ОС,ВС); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]

Genus 574. *Amoria* C.Presl - Амория (Клевер)

2278. *A. montana* (L.) Sojak (*Trifolium montanum* L.) - А.(К.) горная = I(АЕ,АК,КЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА): (Евро-Сиб.); Ра(НК); [Pl.] <Pp>

2279. *A. elizabethae* (Grossh.) Roskov (*T. elizabethae* Grossh.) - А.(К.) Елизаветы = III(ЦЭ,Б,ОС,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Рс(НК); [Pl.] <Ее> l.c. Балкария (?)

2280. *A. egrissica* (Mikheev et Magulaev) Roskov - А.(К.) эгрисская = III(ОС: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Рb(НК); [R.]

2281. *A. ambigua* (Bieb.) Sojak (*A. ruprechtii* (Tamamsch. et Fed.) Roskov; *T. ruprechtii* Tamamsch. et Fed.; *T. ambiguum* Bieb.) - А.(К.) непостоянная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субпонт*.); Ра(НК); [Pl.] <Pp>

2282. *A. repens* (L.) C.Presl (*T. repens* L.) - А.(К.) ползучая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Ра,Рb(НК); [Pl.] <Pp;Pmel;Pm>

2283. *A. hybrida* (L.) C.Presl (*T. hybridum* L.) - А.(К.) гибридная = I(Тем,Т); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V([БН - Буртунай,Касп - Касумкент]: Муртазалиев, 2009): (Европ.); Ра(НК); [Sp.] <Pp;Pm>

2284. *A. angulata* (Waldst. et Kit.) C.Presl (*T. angulatum* Waldst. et Kit.) - А.(К.) угловатая = I(Тем,Т); III(Ст,МА,П,Кисл, ЧО): (Евро-Кавк.); Ра(Т); [R.] <Pp>

2285. *A. retusa* (L.) Dostal (*T. retusum* L.; *T. parviflorum* Ehrh.) - А.(К.) при-тупленная = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,М); III(Ст,Куб,ЧК,СК,П,Кисл,ЧО); V(БН,Касп): (Субсредиз*.); Ра,Аа(Т); [Sp.]

2286. *A. glomerata* (L.) Sojak (*T. glomeratum* L.) - А.(К.) скученная = V(Касп - Самур: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); Db(Т); [R.]

2287. *A. vesiculosa* (Savi) Roskov (*T. vesiculosum* Savi) - А.(К.) пузырчатая = I(АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,ЛН,СК): (Субсредиз*.); ST(Т); [R.]

2288. *A. spumosa* (L.) Roskov (*T. spumosum* L.) - А.(К.) пенистая = V(Касп - Дербент: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); Ра(Т); [R.]

2289. *A. fragifera* (L.) Roskov (*T. fragiferum* L.) - А.(К.) земляничная = I(ЗП,Прик,ТБ,НК,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл); V(БН,Касп): (Палеаркт.); Ра,Аа(НК); [R.] <Pp>

2290. *A. bonannii* (C.Presl) Roskov (*T. bonannii* C.Presl; *T. neglectum* C.A.Mey.) - А.(К.) Бонанна = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Общедр.средиз.); Аа(НК); [Sp.] <Pp>

2291. *A. raddeana* (Trautv.) Roskov (*T. raddeanum* Trautv.) - А.(К.) Радде = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(Т); [Sp.] <Es> l.c. с. Сомода (Аварское Койсу)

2292. *A. tumens* (Stev. ex Bieb.) Roskov (*T. tumens* Stev. ex Bieb.) - А.(К.) вздутая = II(Кизл); III(Ст,СК,Ч); IV(Н); V(БН,Касп): (Субкавк*.); Ра(НК); [R.]

2293. *A. resupinata* (L.) Roskov (*T. resupinatum* L.) - А.(К.) опрокинутая = III(МА - Майкоп,ЧК); V(Касп): (Средиземн.); Db(Т); [Sp.] <Pp>

Genus 575. *Chrysaspis* Desv. - Хризаспис (Клевер)

2294. *Ch. spadicea* (L.) Greene (*Trifolium spadiceum* L.) - Х.(К.) тёмно-каштановый = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); V(Даг): (Европ.); Рb,Рс(Т); [Pl.]

2295. *Ch. aurea* (Poll.) Greene (*T. aureum* Poll.; *T. strepens* Crantz) - X.(К.) золотистый = III(Ст,Куб,Э,ВК); IV(ТА); V(Касп,ЦД,АС): (Евро-Сиб.); Pa(T); [Sp.]

2296. *Ch. campestris* (Schreb.) Desv. (*T. campestre* Schreb.) - X.(К.) полевой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Pa(T); [Pl.]

2297. *Ch. sebastianii* (Savi) Hendrych (*T. sebastianii* Savi) - X.(К.) Себастьяна = III(ЧО); V(БН,Касп): (Вост.средиз.); Pa(T); [R.]

2298. *Ch. micrantha* (Viv.) Hendrych (*T. micranthum* Viv.) - X.(К.) мелкоцветковый = IV(ТА: Зернов, 2006); V(Касп: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); Db(T); [R.]

2299. *Ch. rytidosemia* (Boiss. et Hohen.) Roskov (*T. rytidosemium* Boiss. et Hohen.; *T. badium* Schreb.) - X.(К.) морщинистый = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ, Б,ОС,ВС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(T); [Pl.]

Genus 576. *Trifolium* L. - Клевер

2300. *T. trichosephalum* Bieb. - К. волосистоголовый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ, Кисл,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(НК); [Pl.]

2301. *T. caucasicum* Tausch - К. кавказский = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавк*.); S,Pb(НК); [Sp.]

2302. *T. canescens* Willd. - К. седоватый = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавк*.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]

2303. *T. leucanthum* Bieb. - К. бледноцветковый = I(Тем - Темрюк: Гроссгейм, 1952): (Средиземн.); Pa(T); [Rs.]

2304. *T. echinatum* Bieb. - К. иглистый = III(Ст,Куб,ЧК,П,Кисл,ЧО); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Средиземн.); Db(T); [R.]

2305. *T. angustifolium* L. - К. узколистный = III(П - Машук: Танфильев, Кононов, 1987); IV(СЗЗ); V(Касп): (Средиземн.); Pa(T); [R.] <Rх>

2306. *T. stellatum* L. - К. звездчатый = V(Касп - Дербент: Гроссгейм, 1952): (Средиземн.); ST(T); [R.]

2307. *T. incarnatum* L. - К. мясокрасный = IV(ТА: Зернов, 2006): (Средиземн.); (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(T); [R.]

2308. *T. phleoides* Roug. - К. батлачковый = III(СК,П,Кисл,ТС); V(БН,Касп): (Средиземн.); Pb(T); [R.]

2309. *T. striatum* L. - К. ребристый = I(Т,Тем); III(Ст,ЛН,ЧК,СК, П,Кисл,ТС, ЧО,Ч); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Субсредиз*.); Pa(T); [R.]

2310. *T. scabrum* L. - К. шершавый = IV(СЗЗ: Зернов, 2006); V(Касп - Тарки-Тау: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); ST(T); [R.]

2311. *T. medium* L. - К. средний = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб, ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Pa,Pb(НК); [Sp.] <Pm;Pp>

2312. *T. alpestre* L. - К. предальпийский = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст, Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); Pa,Pb(НК); [Pl.] <Pp>

2313. *T. pratense* L. - К. луговой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК, Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pp;Pm>

2314. *T. fontanum* Vobr. - К. ключевой = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

2315. *T. diffusum* Ehrh. - К. раскидистый = I(ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЧК,СК,П,Кисл,ЧО); V(БН,Касп): (Европ.); Pa(T); [Sp.]

2316. *T. apertum* Bobr. - К. открытый = I(НД,АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб,ЧК,СК,Э); IV(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); Db(T); [Sp.] <Esub> l.c. Майкоп

2317. *T. lappaceum* L. - К. репейниковый = IV(СЗЗ); V(Касп): (Средиземн.); ST(T); [R.]

2318. *T. arvense* L. - К. пашенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Pa,ST(T); [Sp.]

2319. *T. subterraneum* L. - К. подземный = I(T); V(Касп): (Субсредиз*.); Db(T); [R.] <Pp>

2320. *T. borysthenicum* Grun. - К. днепровский = I(НД): (Понтич.); Pa,Дс(НК); [Sp.] <Pp>

Genus 577. Anthyllis L. - Язвенник

2321. *A. variegata* Boiss. ex Grossh. (*A. caucasica* (Grossh.) Juz.; *A. vulneraria auct. fl. cauc.*) - Я. пёстрый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Л,Б,УН,ОС,ВС); IV(ТА: Зернов, 2006); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]

2322. *A. macrocephala* Wend. (*A. polyphylla* (DC.) Kit.ex Loud.) - Я. крупно-головый = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,КР,ЧК,СКТ,П, Кисл,Ч); V(Касп,ЦД): (Европ.); ST(НК); [Pl.] <Pm>

2323. *A. lachnophora* Juz. (*A. boissieri* (Sagor.) Grossh.) - Я. шерстеносный = III(ВЛ,ТЗ,Э,Тер); IV(ТА); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Pb,Do(НК); [Pl.]

Genus 578. Dorycnium Mill. - Дорикниум

2324. *D. graecum* (L.) Ser. - Д. греческий = I(Т,Тем); III(МА,КР,Х,ОС); IV(СЗЗ); V(Касп: Муртазалиев, 2009): (Эвксин.); Pa(НК); [Sp.]

2325. *D. intermedium* Ledeb. - Д. промежуточный = I(Т,Тем,МА); IV(СЗЗ); V(Касп): (Субкавк*.); Pa(НК); [R.]

Genus 579. Lotus L. - Лядвенец

2326. *L. angustissimus* L. - Л. узкий = I(ЗПМ,АК,Т); II(КН - Ачикулак); IV(СЗЗ): (Субсредиз*.); Db(T); [R.]

2327. *L. corniculatus* L. - Л. рогатый = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М); III(Ст,МА,ЧК,СК,Каб,ТС); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.] <Pm;Pp>

2328. *L. tenuis* Waldst. et Kit. - Л. тонкий = I(ЗП,ЦП); II(Кизл); III(Ст,П); IV(Н); V(БН,Касп): (Субсредиз*.); Db,Аа(НК); [Sp.] <Pp>

2329. *L. elisabethae* Opperm. ex Wissjul. - Л. Елизаветы = I(Тем): (Понтич.); Db,Аа(НК); [R.] <Rg>

2330. *L. caucasicus* Kurpian.ex Juz. - Л. кавказский = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавк*.); Pa(НК); [Pl.] <Pp>

Genus 580. Psoralea L. - Псоралея

2331. *P. acaulis* Stev. (*Bituminaria acaulis* (Stev.) Stirton) - П. бесстебельная = III(МА,ЧК,ВЛ); IV(ТА): (Эвксин.); S(НК); [R.]

2332. *P. bituminosa* L. (*B. bituminosa* (L.) Stirton) - П. смолистая = III(КР,Х,[ВЛ: Зернов, 2006]); IV(СЗЗ): (Средиземн.); Da(НК); [R.]

Genus 581. *Amorpha* L. - Аморфа

2333. **A. fruticosa* L. - А. кустарниковая = I(КЕ,Прик); III(Ст): (Адвент. [Сев.Америка]); ST(Phn); [Sp.]

Genus 582. *Galega* L. - Козлятник

2334. *G. officinalis* L. - К. лекарственный = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,МА,СК,П,Кисл,Л,УН); IV(СЗЗ): (Субсредиз*.); Аа(НК); [Sp.] <Pm>

2335. *G. orientalis* Lam. - К. восточный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Pl.] <Pp>

Genus 583. *Robinia* L. - Робиния

2336. **R. pseudoacacia* L. - Р. лжеакация = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(Phm); [Sp.]

Genus 584. *Eremosparton* Fisch. et С.А.Меу. - Эremosпартон

2337. ★*E. aphyllum* (Pall.) Fisch. et С.А.Меу. - Э. безлистный = I(М); II(КН); V(Касп): (Туранск.); Db(Ch); [Rs.] <Rx>

Genus 585. *Sphaerophysa* DC. - Сферофиза

2338. *S. salsula* (Pall.) DC. - С. солянковая = V(Касп): (Понтич.); Rb(НК); [R.]

Genus 586. *Colutea* L. - Пузырник

2339. *C. arborescens* L. - П. древовидный = III(Кисл): (Средиземн.); S(Phn); [R.]

2340. *C. cilicica* Boiss. et Bal. (*Colutea acutifolia* Shar.) - П. киликийский = III(КР,МА); IV(Н): (Субкавк*.); ST(Phn); [R.]

2341. *C. orientalis* Mill - П. восточный = III(ВС - Итумкале); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da,Do(Phn); [Sp.]

Genus 587. *Caragana* Fabr. - Карагана

2342. *C. frutex* (L.) С. Koch - К. кустарниковая = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК); III(Кисл): (Понт.-Южносиб.); ST(Ch); [Rs.] <Rx;Pmel;Po>

2343. *C. mollis* (Bieb.) Bess. - К. мягкая = I(АЕ,Прик,ТБ); III(Ст,СК,П,ТС); IV(БН): (Понтич.); ST(Ch); [Sp.] <Rx;Pmel;Po>

2344. *C. grandiflora* (Bieb.) DC. - К. крупноцветковая = III(ЧК,Кисл,ЦЭ,ОС): (Субкавк*.); Da(Phn); [R.]

2345. *C. scythica* (Kom.) Rojark. - К. скифская = I([НД,ЗПМ,АЕ]: **КК Ростовской области, 2014**): (Понтич.); ST(Ch); [R.]

Genus 588. *Calophaca* Fisch. ex DC. - Майкараган

2346. ★*C. wolgarica* (L.fil.) DC. - М. волжский = I(НД,ЗПМ,АЕ,[КЕ: **Немирова, Данилевич, 1991**]); II(КН,Кизл - север); III(Ст): (Понтич.); ST(Ch); [Rs.] <Rx>

Genus 589. *Acanthophasa* Galushko - Акантофака

2347. *A. beckeriana* (Trautv.) Galushko (*Astragalus beckerianus* Trautv.) - А. Беккера = V([АС - горы Шахдаг-Базардюзи, сёла Куруш, Ихир]: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Ch:fl); [R.] <Esub>

Genus 590. *Astracantha* Podlech - Астраканта

2348. *A. caucasica* (Pall.) Podlech (*Tragacantha caucasica* Stev., *Astragalus caucasicus* Pall.) - А. кавказская = III(ОС); V(БН,Касп): (Кавк.: Общекавк.); Da(Ch); [R.]

2349. *A. aurea* (Willd.) Podlech (*T. aurea* Stev., *Astragalus aureus* Willd.) - А. золотистая = III(П[г.Бештау: Галушко, 1989],ТЗ,ЦЭ,ОС,ВС); V(ЦД): (Субкавк*.); Da(Ch:fl); [R.] <в П - Rx>

2350. *A. caspica* (Bieb.) Podlech (*T. caspica* Stev., *A. caspicus* Bieb.) - А. каспийская = V(Касп,ЦД): (Субкавк*.); Da(Ch:fl); [R.]

2351. *A. denudata* (Stev.) Podlech (*T. denudata* (Stev.) Stev., *A. denudatus* Stev., *A. marschallianus* Fisch.) - А. обнажённая = III(ЦЭ,Б,УН,ОС,ВС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Esub> l.c. В. Ларс

2352. *A. microcephala* (Willd.) Podlech (*T. microcephala* (Willd.) O.Kuntze, *A. microcephalus* Willd., *A. erinaceus* (Fisch. et C.A.Mey.) Podlech) - А. мелкоголовчатая = III(УН,ОС); V(ЦД – Самур): (Ирано-Туран.); Da(Ch); [R.]

2353. ★*A. arnacanthoides* (Boriss.) Podlech (*T. arnacanthoides* Boriss., *A. arnacanthoides* Boriss.) - А. колючковидная = III(КР); IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Es> l.c. окр. Новороссийска

Genus 591. *Astragalus* L. - Астрагал

2354. *A. asterias* Stev. ex Ledeb. (*A. cruciatus* Link.) - А. звёздчатый = V(Касп - хр. Нарат-Тюбе,[Мугерган,ЦД - Рутул: Муртазалиев, 2009]): (Субкавк.); ST(Т:eph); [R.]

2355. *A. ammophilus* Kar. et Kir. (*A. persepolitani* Boiss.) - А. песколобец = V(БН - Чир-юрт): (Ирано-Туран.); ST,SD(Т:eph); [R.]

2356. *A. contortuplicatus* L. - А. свёрнутый = I(НД,МД,НК); II(КН); III(Кисл,ЧО): (Понтич.); Aa(Т:eph); [R.]

2357. *A. guttatus* Banks et Sol. (*A. striatellus* Pall. ex Bieb.) - А. капельный = I(МД - Большая Джалга); II(Кизл); V(БН,Касп): (Ирано-Туран.); Dd(Т:eph); [Rs.]

2358. *A. hamosus* L. (*A. brachyceras* Ledeb.) - А. крючковатый = II(Кизл); III(ЧО); V(БН,Касп): (Ирано-Туран.): ST,Rb(Т:eph); [R.]

2359. *A. flexicaulis* Sosn. - А. извилистостебельный = III(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); ST,Do(НК); [R.] <Esub>

2360. *A. ucrainicus* M.Pop. et Klok. - А. украинский = I(АК - ст. Шкуринская, [КЕ - с. Подлужное: Дубовик, Дзыбов, 1990]): (Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx>

2361. *A. cicer* L. - А. нутовый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); Pa(НК); [Pl.] <Pr>

2362. *A. ciceroideus* Sosn. - А. нутовидный = III(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> l.c. верх. р. Теберда

2363. *A. tshegemensis* Galushko - А. чегемский = III(ЦЭ - Учкулан, Чегем): (Кавк.: Эукавк.); ST,Do(НК); [R.] <Es> l.c. верх. р. Чегем

2364. *A. freynii* Albov - А. Фрейна = III(Х,ВЛ,ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(НК); [Sp.] <Ее> l.c. г. Оштен

2365. *A. bachmarensis* Grossh. - А. бахмаринский = III(ТЗ - ущ. Кышкаджер: Воробьёва, Онипченко, 2001): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(НК); [R.]

2366. *A. oreades* C.A.Mey. - А. горный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. г. Казбек

2367. *A. supinus* Bunge - А. прилегающий = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [Sp.] <Ее>
2368. *A. chordorrhizus* Fisch. ex Bunge - А. тонкокорневой = **III**(Б - Хызыны-Су, ОС - Казбек): (Кавк.: Общекавк.); Pс(НК); [R.]
2369. *A. danicus* Retz. - А. датский = **I**(Т); **II**(Кизл); **III**(ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **V**(ЦД): (Евро-Сиб.); Pb(НК); [Sp.]
2370. *A. raddeanus* Regel (*A. flaccidus* Bieb.) - А. Радде = **III**(ЦЭ): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК); [Rs.]
2371. *A. viciifolius* DC. - А. горошколистный = **III**(ЦЭ); (Субкавк*.); Do(НК); [R.]
2372. *A. eugenii* Grossh. (*A. andreji-sytinii* Podl.) - А. Евгения = **V**(АС - Курш: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>
2373. *A. brachytropis* (Stev.) C.A.Mey. - А. коротколодочковый = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [R.] <Esub>
2374. *A. alpinus* L. - А. альпийский = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Голаркт.); Pс,Do(НК); [Pl.]
2375. *A. glycyphyllos* L. - А. сладколистный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Европ.); S(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
2376. *A. glycyphylloides* DC. - А. ложносладолистный = **III**(Куб,КР,ЧК,П,Л); **IV**(СЗЗ): (Вост.средиз.); S(НК); [R.] <Pp>
2377. *A. galegiformis* L. - А. козлятниковый = **III**(Ст,ЧК,Э,ВК); **V**(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pa,ST(НК); [Sp.]
2378. *A. dasyanthus* Pall. - А. шерстистоцветковый = **I**(АЕ - с. Чапаевское: **КК Респ. Калмыкии, 2014**); **III**(СК-Кума,П): (Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx;Pm>
2379. *A. utriger* Pall. - А. пузыристый = **IV**(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [R.] <Rx>
2380. *A. fabaceus* Bieb. - А. бобовидный = **V**([Касп - Дербент, ЦД - Цедатли]: **Муртазалиев, 2009**): (Субкавк*.); Db(НК); [R.]
2381. *A. longipetalus* Chater (*A. longiflorus* Pall. nom. illegit. superfl.) - А. длиннолепестковый = **I**(М); **II**(ВП); **III**([Ст: **Сытин, 1991**],П); **V**(Касп): (Туранск.); Db(НК); [Sp.]
2382. *A. polyphyllus* Bunge - А. многолистный = **III**(ЦЭ - Баксан); **V**(Касп,АС): (Кавк.: Эукавк.); ST,Da(НК); [R.] <Esub>
2383. *A. daghestanicus* Grossh. - А. дагестанский = **V**(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> I.с. Ботлих
2384. *A. ponticus* Pall. - А. понтийский = **I**(АЕ,КЕ): (Субсредиз*.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
2385. *A. maximus* Willd. - А. большой = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД - пер. Харамы,АС - г. Шалбуздаг): (Субкавк*.); Pa,Pb(НК); [Sp.]
2386. *A. lehmannianus* Bunge - А. Леманна = **I**(М: **Белоус, 1990а**); **II**(КН); **V**(Касп): (Туранск.); Db(Ch); [Rs.] <Rx>
2387. *A. falcatus* Lam. - А. серповидный = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [Sp.] <Pp>
2388. *A. odoratus* Lam. - А. душистый = **V**([Касп,ЦД]: **Муртазалиев, 2009**): (Ирано-Туран.); Pa,Pb(НК); [R.]

2389. *A. asper* Jacq. - А. шершавый = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,ЛН,ЧК,СК,П,Кисл,ТС); V(БН,Касп): (Понтич.); ST(НК); [R.]
2390. *A. austriacus* Jacq. - А. австрийский = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,ЛН,ЧК,СК,Э,ВК); V(БН,Касп): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
2391. *A. captiosus* Boriss. (*A. interpositus* Boriss.; *A. klukhoricus* Sosn.) - А. обманчивый = III(Ст,СК,П,ТЗ,ЦЭ,ЧО,Б,ОС,ВС); V(Дар): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [Sp.]
2392. *A. onobrychioides* Bieb. - А. эспарцетовидный = III(П - г.Юца: **Сытин, 1986**); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Rs.]
2393. *A. bungeanus* Boiss. - А. Бунге = III(Ст,СК,П,ТС); IV(БН,Касп): (Субкавк*.); ST(НК); [Sp.] <Pp> l.c. Пятигорск
2394. *A. circassicus* Grossh. - А. черкесский = III(КР); IV(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] l.c. Новороссийск <Esub>
2395. *A. onobrychis* L. - А. эспарцетный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ): (Европ.); ST,Db(НК); [Pl.] <Pp>
2396. *A. lasioglottis* Stev. ex Bieb. - А. волосистый = III(ЧК,ТЗ,СК,Э,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pa,Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Кисловодск
2397. *A. lunatus* Pall. - А. полулунный = V(Касп,[АС: **Муртазалиев, 2009**]): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [Sp.]
2398. *A. levieri* Freyn ex Somm. et Levier - А. Левье = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. верх. р. Теберды
2399. *A. juzepczukii* (Galushko) Galushko - А. Юзепчука = III(Б - Хызы-Су): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Хызы-Су
2400. *A. incertus* Ledeb. - А. неопределённый = III(ТЗ,ЦЭ,Б); V(Касп,ЦД,АС): (Субкавк.*); Pb,Do(НК); [Pl.]
2401. *A. ruprechtii* Bunge - А. Рупрехта = V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.] <Esub> l.c. с. Гимры
2402. *A. psoraloides* Lam. (*A. gjuniacus* Grossh.) - А. псоралеевидный = III(ТЗ - пойма р. Горалыкол: **Воробьёва, Онипченко, 2001**): (Субкавк*.); Pc(НК); [Rs.]
2403. *A. owerinii* Bunge - А. Оверина = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.] <Esub>
2404. *A. resupinatus* Bieb. (*A. fragrans* Willd.) - А. перевернутый = III(Ст,КР,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Армено-Иран.); Pb,Da(НК); [Sp.]
2405. *A. reduncus* Pall. - А. изогнутый = I(ЗПМ); III(СК,Э): (Понтич.); ST(НК); [R.]
2406. *A. sytinii* V.Belous et A.Laktionov - А. Сытина = I([МД,АИ - Манычское, Белые Копани, Дивное, Арзгир, Новорагулинский]: **КК Ставропольского края, 2013**): (Понтич.); ST, Dd(НК); [Rs.] <Rx> l.c. окр. г. Арзгир
2407. *A. physodes* L. - А. пузырчатый = I(АИ - Арзгир: **Белоус, 2016**); II(Кизл - Хамаматюрт: **Муртазалиев, 2009**): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
2408. *A. biebersteinii* Bunge - А. Биберштейна = V(АС - Рутул: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); Dd(НК); [R.] <Esub>

2409. *A. dolichophyllus* Pall. - А. длиннолистный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,КР,СК); V(БН,Касп):** (Понтич.); ST(НК); [Sp.]
2410. *A. humilis* Vieb. (*A. theodori* Grossh.) - А. низкий = **III(ЦЭ - Баксан); V(Касп,АС - Самур):** (Кавк.: Эукавк.); Dd,Do(НК); [R.] <Esub>
2411. *A. testiculatus* Pall. - А. яичкоплодный = **I(ЗП,МД,НК):** (Субтуран*.); SD(НК); [R.] <Rx>
2412. *A. alexandri* Charadze - А. Александра = **III(ОС,УН,ВС,Ч); V(Касп,ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Гуниб.
2413. *A. kazbeki* Charadze - А. казбекский = **III(ТЗ,ЦЭ,ОС,ВС); V(АС - г. Дюльтыдаг: Муртазалиев, 2009):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. г. Казбек
2414. *A. charadzeae* Grossh. - А. Харадзе = **V(ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc(НК); [R.] <Es> l.c. Гунибский р-н, сс. Чарах и Карах
2415. *A. buschiorum* Galushko - А. Бушей = **III(Л,УН):** (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Pl.] <Es> l.c. ущ. р. Хызны-Су.
2416. *A. demetrii* Charadze - А. Дмитрия = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ТЗ,КР,ЧК,СК,П,Кисл,Л):** (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Кисловодск
2417. *A. sanguinolentus* Vieb. - А. кровавопятнистый = **V(Касп,ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(НК); [Sp.]
2418. *A. salatavicus* Bunge - А. салатавский = **V([ЦД - Буртунай, хр. Салатау, оз. Кезенойам]: Муртазалиев, 2009):** (Кавк. Эукавк.); Pc(НК); [R.] <Es> l.c. г. Ханахой-тау
2419. *A. frickii* Bunge (*A. teberdensis* Grossh.) - А. Фрика = **III(ВЛ,ТЗ,ОС):** (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Sp.]
2420. *A. cuscutae* Bunge - А. повиликовый = **V([ЦД - Башлыкент, г. Джавандаг),АС]: Муртазалиев, 2009):** (Кавк.: Эукавк.); Dd(НК); [R.] <Esub>
2421. *A. brachycarpus* Vieb. - А. короткоплодный = **III(ЧК,ТЗ,Э,ТС,ОС); V(БН,Касп):** (Субкавк*.); ST,Da(НК); [R.] l.c. Бештау
2422. *A. brachylobus* Fisch. - А. коротколопастный = **I(М); II(КН); V(Касп):** (Понт.-Южносиб.); Db(Phn); [Sp.] <Rx>
2423. *A. varius* S.G.Gmel. (*A. virgatus* Pall.) - А. разнообразный = **I(НД,ЗПМ,АЕ,М,СК,П); II(КН); V(Касп):** (Понт.-Южносиб.); Db(Ch); [R.] <Rx>
2424. *A. cornutus* Pall. - А. рогоплодный = **I(М); II(КН - Терские пески); V(Касп,ЦД):** (Субтуран*.); ST,SD(Ch); [R.] <Rx>
2425. *A. subuliformis* DC. (*A. subulatus* Pall.) - А. шилоподобный = **I(НД,ЗПМ,АЕ,КЕ); III(СК,П,ТС,ЧО); IV(Н); V(Дар):** (Понт.-Южносиб.); Da(Ch); [R.]
2426. *A. pseudotataricus* Boriss. - А. ложнотатарский = **I(Прик,ТБ); III(Ст,СК):** (Понтич.); ST,Db(НК); [R.] <Rx> l.c. Ставрополь
2427. *A. haesitabundus* Lipsky - А. ненадёжный = **III(Кисл,ЦЭ); V(Касп,ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Esub> l.c. окр. с. Чир-Юрт
2428. ★ *A. fissuralis* Alexeenko - А. щельный = **V(ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:fl); [R.] <Es> l.c. окр. с. Акуша

2429. *A. pallescens* Bieb. - А. бледнеющий = I(АИ - Арзгир: Белоус, 2016): (Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx>

2430. ★*A. karakugensis* Bunge - А. каракугинский = [I(М); II(КН): Белоус, 1990б]; V(Касп): (Туранск.); Db(Ch:sf); [Rs.] <Rx>

2431. *A. hircanus* Pall. - А. гирканский = II(Кизл) - южная часть); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Db(Ch:sf); [Sp.] <Esub>

2432. *A. calycinus* Bieb. - А. чашечный = I(ЦП); III(Ст,СК,ЦЭ - Былым, ТС,ОС); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [R.] l.c. Маджар на Куме

2433. *A. albicaulis* DC. - А. белостебельный = I(Прик - г.Брык): (Понтич.); Db(Ch); [Rs.] <Rx>

2434. *A. henningii* (Stev.) Klok. - А. Хеннига = I(НД,ЗПМ,АЕ,[МД: Дубовик, Дзыбов, 1990]): (Понтич.); ST(НК); [Rs.]

2435. *A. tanaiticus* C.Koch - А. донской = I(ЗПМ,АЕ): (Понтич.); ST,Db(НК); [Sp.]

2436. *A. balkaricus* Sytin - А. балкарский = III(Б - Безенги: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Da,Do(НК); [Rs.] <Es>

Genus 592. *Oxytropis* DC. - Остролодочник

2437. *O. owerinii* Bunge - О. Оверина = III(ЛН,П,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС, ВС,Ч); IV(ТА); V(Даг): (Кавк.: Эукавк.); Pс(НК); [Pl.] <Esub> l.c. г. Казбек

2438. *O. meyeri* Bunge - О. Мейера = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [Sp.] <Ee> l.c. верх. р. Кубань

2439. *O. lazica* Boiss. - О. лазистанский = III(ВЛ - Трю-Ятыргварта: Алтухов, 1967): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК); [Sp.]

2440. *O. pilosa* (L.) DC. - О. волосистый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Сиб.); ST(НК); [Pl.]

2441. *O. pallasii* Pers. - О. Палласа = I(Т); III(КР); IV(Н): (Эвксин.); Da(НК); [R.]

2442. *O. kubanensis* Leskov - О. кубанский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс(НК); [Sp.] <Ee> l.c. г. Пшекиш

2443. *O. cyanea* Bieb. (*O. albana* Stev.) - О. синий = III(ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Pl.]

2444. *O. dasypoda* Rupr. - О. шерстистоногий = III(ЦЭ - Чегем,Б,ОС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pб(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Кутиша

Genus 593. *Glycyrrhiza* L. - Солодка

2445. *G. glabra* L. - С. голая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ, П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); ST(НК); [Pl.] <Pm;Pp>

2446. *G. aspera* Pall. - С. шиповатая = II(Касп); III(Ст,СК,П,ТС); V(БН,Касп): (Туранск.); ST,SD(НК); [R.]

2447. *G. echinata* L. - С. щетинистая = I(НД,ЗПМ,Прик,ТБ,НК); II(Кизл); III(Ст,Куб,СК,ЧО); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Pa,Аа(НК); [Sp.]

2448. *G. foetidissima* Tausch (*G. macedonica* Boiss. et Orph.) - С. зловонная = I(Тем,М); II(ВП); III(Куб,ЧО); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Аа(НК); [Sp.]

Genus 594. *Hippocrepis* L. - Подковник

2449. *H. emeroides* (Boiss. et Sprun.) Czer. (*Coronilla emeroides* Czer.) - П. эмеровидный = V(Н: Зернов, 2006): (Средиземн.); ST(Phn); [R.]

Genus 595. Coronilla L. - Вязель

2450. *C. coronata* L. - В. корончатый = III(Куб,ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,ЧО,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); ST, Da(НК); [Sp.]

2451. *C. scorpioides* (L.) Koch - В. завитой = IV(Н): (Средиземн.); ST, Rb(T); [R.]

Genus 596. Securigera DC. - Секироплодник

2452. *S. orientalis* (Mill.) Lassen (*Coronilla orientalis* Vill.) - С. восточный = III(ЧК,ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Армено-Иран.); S, Pa(НК); [Sp.]

2453. *S. balansae* (Boiss.) Czer. (*C. balansae* (Boiss.) Grossh.) - С. Балансы = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pc(НК); [Sp.]

2454. *S. varia* (L.) Lassen (*C. varia* L.) - С. пёстрый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>

2455. *S. securidaca* (L.) Degen et Doerfl. - С. мечевидный = V(Касп,ЦД): (Средиземн.); Pa(T); [R.]

Genus 597. Hedysarum L. - Копеечник

2456. *H. sericeum* Bieb. - К. шелковистый = III(Кисл - р-н Кисловодска); V(ЦД - хр. Чонкатау): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Rs.] <Rx - Кисловодск>

2457. *H. biebersteinii* Zertova (*H. argenteum* Bieb.) - К. Биберштейна = III(Ст,ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,СК,ОС,ВС); IV(Касп): (Кавк.: Предкавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Северный Кавказ (?)

2458. ★ *H. daghestanicum* Rupr. ex Boiss. - К. дагестанский = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c.

2459. ★ *H. candidum* Bieb. - К. белый = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [R.]

2460. *H. caucasicum* Bieb. - К. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc(НК); [Pl.] <Esub>

2461. *H. tauricum* Pall. ex Willd. - К. крымский = I(T); III(П - г. Кинжал); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Rs.] <Rx>

Genus 598. Dendrobrychis Galushko - Дендробрихис

2462. *D. cornuta* (L.) Galushko (*Onobrychis cornuta* (L.) Desv.) - Д. рогатый = III(ОС - Ардон); V(Касп,ЦД): (Армено-Иран.); Da(Ch:ppul); [Sp.]

Genus 599. Xanthobrychis Galushko - Ксантобрихис

2463. *X. vassilczenkoi* (Grossh.) Galushko (*Onobrychis vassilczenkoi* Grossh.) - К. Васильченко = III(Ст,ЧК,СК,Э,Б,ОС): (Кавк.: Предкавк.); Da(НК); [Pl.] <Ee> l.c. Пятигорск

2464. *X. majorovii* (Grossh.) Galushko (*O. majorovii* Grossh.) - К. Майорова = I(АИ - Арзгир); III(СК - Зеленокумск,Каб,ТС); V(БН,Касп,ЦД): (Кавк.: Предкавк.); Db, ST(НК); [Sp.] <Ee>

2465. *X. bobrovii* (Grossh.) Galushko (*O. bobrovii* Grossh.) - К. Боброва = III(ЦЭ,Б,ОС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Db, ST(НК); [R.] <Esub> l.c. Кумух

2466. *X. radiata* (Desf.) Galushko (*O. radiata* (Desf.) Bieb.) - К. лучистый = V(АС: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

Genus 600. Onobrychis Hill - Эспарцет

2467. *O. oxytropoides* Bunge - Э. остролодочниковый = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb, Pc(НК); [R.]

2468. *O. petraea* (Bieb. ex Willd.) Fisch. - Э. каменный = III(ЧК,Э,Б,ОС,ВС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Sp.] <Pmel>
2469. *O. ruprechtii* Grossh. - Э. Рупрехта = III(ЦЭ,Б,ОС); V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Гимры.
2470. *O. daghestanica* Grossh. - Э. дагестанский = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. с. Данух
2471. *O. biebersteinii* Sirj. - Э. Биберштейна = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.]
2472. *O. hamata* Vass. - Э. крючковатый = III(Кисл,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pc(НК); [R.] <Ee> l.c. Кисловодск
2473. *O. syri* Grossh. - Э. куринский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [Pl.] <Pp;Pmel>
2474. *O. dielsii* (Sirj.) Vass. - Э. Дильса = III(Ст,СК,ТС,ЧО); V(БН,Касп): (Кавк.: Предкавк.); ST(НК); [R.] <Pp;Pmel> <Ee> l.c. Беслан
2475. *O. novorokrovskii* Vass. - Э. Новопокровского = I(М); II(КН); III(ТС); V(БН): (Кавк.: Предкавк.); Db,Dd(НК); [Sp.] <Pmel> <Ee> l.c. ст. Червлёная
2476. *O. miniata* Stev. - Э. киноварно-красный = I(АК,КЕ,Тем,Т); III(ЧК,КР); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); ST(НК); [Rs.] <Pp;Pmel>
2477. *O. inermis* Stev. - Э. невооружённый = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); II(Кизл); III(Ст,Куб,ТЗ,П,Кисл,СКТ); IV(Н); V(БН,Касп): (Кавк.: Предкавк.); Pa(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Пятигорск
2478. *O. iberica* Grossh. - Э. грузинский = V([Касп,ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
2479. *O. kluchorica* Chinth. - Э. клухорский = III(ТЗ,ЦЭ: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Esub>
2480. *O. arenaria* (Kit.) DC. (*O. tanaitica* Spreng.) - Э. песчаный = I(НД,ЗПМ,АЕ,МД,АИ,Прик,ТБ,НК); (Понтич.); ST(НК); [R.] <Pmel>
- Genus 601. Alchagi Hill - Верблюжья колючка**
2481. *A. pseudalchagi* (Bieb.) Fisch. - В.к. обыкновенная = I(ЗПМ,ЦП); II(Кизл); III(СК); V(Касп): (Ирано-Туран.); SD(Ch); [Pl.] <Pm;Pmel>
- Genus 602. Cicer L. - Нут**
2482. *C. balcaricum* Galushko - Н. балкарский = III(ЦЭ - с. Эльбрус): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. - с. Эльбрус
2483. ★*C. minutum* Boiss. et Nohen. - Н. маленький = V(АС - горы Несиндаг, Базардюзи): (Армено-Иран.); Pc,Do(НК); [R.]
- Genus 603. Vicia L. - Горошек**
2484. *V. seripum* L. - Г. заборный = I(КЕ,ПРИК,ТБ,НК,СКТ); II(КН); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Касп,ЦД,АС): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel;Pp>
2485. *V. truncatula* Fisch. ex Bieb. - Г. обрубленный = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(Дар): (Субкавк*.); S(НК); [Sp.] l.c. г. Бештау
2486. *V. balansae* Boiss. - Г. Балансы = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.]

2487. *V. ciliatula* Lipsky - Г. реснитчатый = **I**(АК,КЕ,Тем); **III**(Ст,Куб,КР,ЧК,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**([БН - Эндирей,Касп - Мюрего]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); S(T); [Sp.] l.c. Армавир
2488. *V. pannonica* Crantz - Г. венгерский = **I**(ЗП,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,КР,ЧК,СКТ,П,Кисл); **IV**(H): (Зап.др.средиз.); Pa,Rb(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
2489. *V. hybrida* L. - Г. гибридный = **III**(Ст,Куб,Л,Ч); **IV**(H); **V**(Касп: Муртазалиев, 2009): (Субсредиз*.); Ra,Rb(T); [Rs.]
2490. *V. grandiflora* Scop. - Г. крупноцветковый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЧК,КР,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Субсредиз*.); Pa(T); [Sp.] <Pmel>
2491. *V. sativa* L. - Г. посевной = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Европ.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
2492. *V. angustifolia* Reichard - Г. узколистный = **I**(Тем,Т); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,КР,ТЗ,Э,ТС,ВК); **IV**(H); **V**(Касп): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pmel;Pp>
2493. *V. cordata* Wulf. ex Horre - Г. сердцевидный = **IV**(H); **V**(Касп): (Армено-Иран.); Rb(T); [R.]
2494. *V. lathyroides* L. - Г. чинovidный = **I**(Т); **IV**(H): (Европ.); Pa(T); [R.]
2495. *V. peregrina* L. - Г. иноземный = **I**(Т); **III**(КР); **IV**(H); **V**(БН,Касп): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Rs.] <Pp>
2496. **V. faba* L. (*Faba bona* Medik.) - Г. бобовый (Конские бобы) = **V**(Касп - окр. Махачкалы): (Адвент. [Средиземноморье]); Ra(T); [R.]
2497. *V. narbonensis* L. - Г. нарбонский = **II**(Кизл: Муртазалиев, 2009); **IV**(H); **V**(БН,Касп): (Средиземн.); Pa,Ra,Rb(T); [R.]
2498. *V. serratifolia* Jacq. - Г. зубчатоллиственный = **I**(АК,КЕ,Тем,Т); **III**(Куб,КР,ЧК); **IV**(H): (Средиземн.); Rb(T); [R.]
2499. *V. crocea* (Desf.) Fritsch - Г. оранжевый = **III**(КР,ВЛ,ТЗ); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Субкавк*.); S(НК); [R.]
2500. *V. cassubica* L. - Г. кашубский = **I**(НД); **III**(Куб,КР,ВЛ,ТЗ, Э,УН,Ч); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
2501. *V. abbreviata* Fisch. ex Spreng. - Г. укороченный = **III**(Х,ВЛ,ТЗ); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [Sp.]
2502. *V. pisiformis* L. - Г. гороховидный = **I**(НД); **III**(МА - Краснодар,П - Железноводск): (Европ.); S,Pa(НК); [Rs.] <Rg>
2503. *V. caucasica* Evktim - Г. кавказский = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub>
2504. *V. sosnowskyi* Ekvim. - Г. Сосновского = **III**(ЦЭ,[ОС: Комжа, 2000]); **IV**(ТА: Солодько, 2002): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc(НК); [R.]; <Esub>
2505. *V. larissae* Prima - Г. Ларисы = **III**(ВС); **V**(АС - г. Ярыдаг: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>
2506. *V. semiglabra* Rupr. ex Boiss. - Г. полуголый = **V**(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. с. Гимры
2507. *V. alpestris* Stev. - Г. предальпийский = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]

2508. *V. cracca* L. - Г. мышинный = **I(ЗП,ЦП); III(Ст,ЛН,ТЗ,П,СК,ТС); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД):** (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
2509. *V. grossheimii* Evkzim - Г. Гроссгейма = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС, ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.] l.c. г. Казбек
2510. *V. tenuifolia* Roth (*V. variabilis* Freyn et Sint.) - Г. тонколистный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Палеаркт.); Pa(НК); [R.] <Pmel;Pp>
2511. *V. bithynica* (L.) L. - Г. вифийский = **IV(ТА: [Зернов, 2006](#)):** (Средиземн.); Db(Т); [R.]
2512. *V. biennis* L. (*V. picta* Fisch. et C.A.Mey.) - Г. двулетний = **I(НД,АК,КЕ,Тем,НК); II(КН):** (Понт.-Южносиб.); Aa(НК); [R.]
2513. ★*V. hololasia* Woronow - Г. плотноволосистый = **V(Касп):** (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [R.]
2514. *V. cinerea* Vieb. (*V. calcarata* Desf.) - Г. пепельный = **I(М); II(КН); III(ТС); V(БН,Касп):** (Туранск.); Ra,Rb(Т); [R.]
2515. *V. varia* Host (*V. dasycarpa* Ten.) - Г. изменчивый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Евро-Кавк.); Pa,Ra(Т); [Pl.]
2516. *V. villosa* Roth - Г. мохнатый = **I(ЗП,М); II(ВП); III(СК); IV(СЗЗ); V(БН,Касп):** (Палеаркт.); Da,Ra(Т); [R.] <Pp>
2517. *V. hirsuta* (L.) S.F.Gray - Г. волосистый = **I(ЗПМ); III(Ст,Куб,ТЗ,КР,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп):** (Палеаркт.); Pa,Ra(Т); [Sp.]
2518. *V. loiseleurii* (Vieb.) Litv. (*V. meyeri* Boiss.) - Г. Лаузелёра = **IV(Н,[ТА: [Гроссгейм, 1952](#)]):** (Вост.средиз.); Rb(Т); [R.]
2519. *V. tetrasperma* (L.) Schreb. - Г. четырёхсеменной = **I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,КР,ЧК,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД):** (Палеаркт.); Ra,Rb(Т); [Sp.]
- Genus 604. Ervilia Link - Эрвилия**
2520. *E. sativa* Link (*Vicia ervilia* (L.) Willd.) - Э. посевная = **V(Касп):** (Средиземн.); ST,Da(Т); [Sp.]
- Genus 605. Lens Mill. - Чечевица**
2521. *L. orientalis* (Boiss.) Schmalh. - Ч. восточная = **IV(Н);** (Вост.средиз.); ST(Т); [R.]
- Genus 606. Lathyrus L. - Чина**
2522. *L. aphaca* L. - Ч. безлисточковая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Общедр.средиз.); Pa(Т); [Sp.] <Pmel;Pp>
2523. *L. nissolia* L. - Ч. Ниссоля = **I(ЗПМ,Тем,Т); III(Ст,Куб,КР,ЧК,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп):** (Субсредиз*.); Pa(Т); [Sp.]
2524. *L. colchicus* Lipsky - Ч. колхидская = **IV(ТА - Сочи);** (Кавк.: Эукавк.); ST(Т); [R.] <Es> l.c. Сочи
2525. *L. cicera* L. - Ч. нутовая = **III(КР); IV(Н); V(Касп):** (Средиземн.); Ra,Rb(Т); [Sp.]
2526. *L. sativus* L. - Ч. посевная = **I(Тем,КЕ); III(МА,СК); IV(СЗЗ):** (Средиземн.); Ra,Rb(Т); [R.]
2527. *L. hirsutus* L. - Ч. шершавая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп):** (Палеаркт.); Pa,Rb(Т); [Sp.] <Pmel;Pp>

2528. *L. roseus* Stev. - Ч. розовая = **III(Куб, КР, ВЛ, ТЗ, ЦЭ); IV(СЗЗ)**: (Субкавказ*.); S(НК); [R.] <Pmel>
2529. *L. tuberosus* L. - Ч. клубненосная = **I(ЗП, ЦП); III(Ст, Куб, СКТ, П); IV(СЗЗ); V(БН, Касп, ЦД)**: (Палеаркт.); Ra, Rb(НК:lh); [Pl.] <Pmel; Pp>
2530. *L. sylvestris* L. - Ч. лесная = **I(АК, КЕ, Прик, ТБ, НК); III(Ст, Куб, СКТ, П, Ч); IV(СЗЗ); V(БН)**: (Европ.); S(НК:lh); [Sp.] <Pm; Pmel; Pp>
2531. *L. miniatus* Vieb. ex Stev. - Ч. киноваревая = **I(М); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(Н); V(Даг)**: (Кавк.: Общекавказ.); S(НК:lh); [Sp.] <Pmel; Pp> l.c. Бештау
2532. *L. sphaericus* Retz - Ч. шаровидная = **I(Тем, Т); III(Кисл, Л); IV(СЗЗ); V(БН, Касп)**: (Общедр. средиз.); Pa, Ra(Т); [R.] <Pmel; Pp>
2533. *L. pratensis* L. - Ч. луговая = **I(АК, КЕ, Тем, Т, Прик, М); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Палеаркт.); Pa(НК:lh); [Pl.] <Pm; Pmel; Pp>
2534. *L. pisiformis* L. - Ч. гороховидная = **III(П - Бештау, Машук)**: (Палеаркт.); S(НК); [R.] <Rg>
2535. *L. palustris* L. - Ч. болотная = **I(НД, АК, КЕ, Тем); III(Ст)**: (Палеаркт.); Aa(НК); [R.] <Pmel; Pp>
2536. *L. incurvus* (Roth) Roth - Ч. согнутая = **I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, Э); IV(СЗЗ); V(БН, Касп, ЦД)**: (Субтуран*.); Pa, Aa(НК); [Sp.] <Pmel; Pp>

Genus 607. Orobus L. - Сочевичник

2537. *O. rannonicus* Jacq. (*Lathyrus rannonicus* (Jacq.) Garcke) - С. венгерский = **I(НД, ЗПМ, АЕ, АК, КЕ); III(Ст)**: (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
2538. *O. pallescens* Vieb. (*L. pallescens* (Vieb.) C.Koch) - С. бледнеющий = **I(АЕ, АК, КЕ, Тем, Т); III(Ст, ЛН, КР, СК, П); IV(Н); V([БН, Касп]: Муртазалиев, 2009)**: (Понтич.); ST(НК); [R.]
2539. *O. cyaneus* Stev. - С. синий = **III(Х, ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС, Ч); IV(ТА); V(ЦД, АС)**: (Субкавказ*.); Pb, Pc(НК); [Pl.]
2540. *O. vernus* L. (*L. vernus* (L.) Bernh.) - С. весенний = **III(Куб); IV(СЗЗ); V(Касп)**: (Палеаркт.); S(НК); [R.] <Pm; Pmel>
2541. *O. niger* L. (*L. niger* (L.) Bernh.) - С. чёрный = **I(Тем, Т); III(КР, Х, [ВЛ: Зернов, 2006]); IV(Н, [ТА - Зернов, 2006])**: (Европ.); S(НК); [Sp.]
2542. *O. hirsutus* L. (*O. laxiflorus* Desf.) - С. жёстковолосистый = **III(КР, Х, ВЛ); IV(СЗЗ)**: (Субсредиз.*); S(НК); [R.]
2543. *O. aureus* Stev. - С. золотой = **III(Куб, Х, ВЛ, ТЗ); IV(ТА)**: (Армено-Иран.); S(НК); [R.]

Genus 608. Pisum L. - Горох

2544. *P. elatius* Vieb. - Г. высокий = **I(Тем, М); III(ЛН, ЧК, П, Ч); IV(Н); V(Касп)**: (Зап. др. средиз.); S(Т); [R.]

Genus 609. Vavilovia Fed. - Вавиловия <GD>

2545. ★ *V. formosa* (Stev.) Fed. - В. красивая = **III(ЦЭ, Б, ОС, ВС); V(АС)**: (Кавк.: Эукавказ.); Pc, Do(НК); [Sp.] <Esub>

Ordo 64. Geraniales - Гераниецветные

Familia 105. Geraniaceae Juss. - Гераниевые

Genus 610. Geranium L. - Герань

2546. *G. tuberosum* L. - Г. клубневая = **I**(ЗП, Прик, ТБ, НК, М); **III**(Ст, КР, СК, П, ТС); **IV**(Н): (Субсредиз*.); ST(НК:ephd); [Sp.]
2547. *G. linearilobum* DC. - Г. линейнолопастная = **III**(МД); **V**(БН, касп): (Понтич.); ST(НК:ephd); [R.]
2548. *G. sanguineum* L. - Г. кроваво-красная = **I**(АК, КЕ, Прик, ТБ, НК, М); **III**(Ст, **Куб, ЗК, Э, Тер, ВК**); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Евро-Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
2549. *G. gracile* Ledeb. - Г. стройная = **III**(Х, ВЛ, ТЗ); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.]
2550. *G. albanum* Vieb. - Г. азербайджанская = **V**(Касп, ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Sp.]
2551. *G. pallens* Vieb. - Г. бледная = **IV**(ТА - Сочи: Гроссгейм, 1962): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.]
2552. *G. ibericum* Cav. - Г. грузинская = **III**(ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); **V**(АС): (Субкавк*.); Pb, Pc(НК); [R.]
2553. *G. platypetalum* Fisch. et C.A.Mey. - Г. плосколепестная = **III**(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]
2554. *G. renardii* Trautv. - Г. Ренарда = **III**(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.] <Esub>
2555. *G. gymnocaulon* DC. - Г. голостебельная = **III**(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc(НК); [Pl.]
2556. *G. psilostemon* Ledeb. - Г. мелкоотычиночная = **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb, Pc(НК); [R.]
2557. *G. sylvaticum* L. - Г. лесная = **III**(**Куб, ЗК, Э, ВК**); **IV**(ТА); **V**(БН, ЦД, АС): (Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.]
2558. *G. palustre* L. - Г. болотная = **III**(ВЛ, ТЗ, Э, Каб, ЧО, **ВК**); **IV**(ТА); **V**(ЦД, АС): (Европ.); Aa(НК); [R.]
2559. *G. collinum* Steph. - Г. холмовая = **I**(НД, ЗПМ, АЕ, АК, КЕ); **III**(Ст, **Куб, КР, ТЗ, Э, СК, ТС, Б, ОС, ВС**); **IV**(Н); **V**(Касп, ЦД): (Субтуран*.); Pa(НК); [Sp.]
2560. *G. kemulariae* Charadze - Г. Кемулярии = **III**(ТЗ, Кисл, Б, ВС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Ee> I.c. Учкулан
2561. *G. ruprechtii* (Woronow) Grossh. - Г. Рупрехта = **III**(ВЛ, ТЗ, Кисл, ЦЭ, Б, ОС, ВС, Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД, АС): (Кавк.: Общекавк.); Pa, Pb(НК); [Pl.]
2562. *G. depilatum* (Somm. et Levier) Grossh. - Г. безволосая = **III**(**ЗК, Э, ВК**); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Субкавк*.); Pa, Rb(НК); [Sp.]
2563. *G. sibiricum* L. - Г. сибирская = **III**(ВЛ, ТЗ, Э, **ВК**); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Панбор.); Pa(НК); [Sp.]
2564. *G. rotundifolium* L. - Г. круглолистная = **I**(Тем, Т); **III**(П); **IV**(СЗЗ); **V**(БН, Касп): (Палеаркт.); Pa, Rb(Т); [R.]
2565. *G. pusillum* L. - Г. маленькая = **I**(ЗП, ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст, **Куб, ЗК, Э, Тер, ВК**); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Евро-Кавк.); Pa, Rb(Т); [Pl.]

2566. *G. molle* L. - Г. мягкая = **I(T)**; **IV(C33)**; **V(Касп)**: (Средиземн.); Rb(T); [R.]
2567. *G. columbinum* L. - Г. голубиная = **I(ЗП,ЦП)**; **II(ВП)**; **III(Ст,Куб,СКТ,П)**; **IV(C33)**; **V(БН,Касп)**: (Европ.); Pa,Rb(T); [Pl.]
2568. *G. dissectum* L. - Г. рассечённая = **I(Тем,Т)**; **II(Кизл)**; **III(Ст,Куб,ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,Тер)**; **IV(C33)**; **V(БН,Касп)**: (Субсредиз*.); Pa,Rb(T); [R.]
2569. *G. divaricatum* Ehrh. - Г. раскидистая = **I(ЗП,ЦП)**; **II(ВП)**; **III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл)**; **IV(ТА)**; **V(БН,Касп)**: (Общедр.средиз.); S,Rb(T); [Pl.]
2570. *G. bohemicum* L. - Г. богемская = **III(Ст - Ставрополь: Танфильев, Кононов, 1987, ВЛ: Зернов, 2006)**: (Европ.); S(T); [R.] <Rg>
2571. *G. robertianum* L. - Г. Роберта = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК)**; **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК)**; **IV(C33)**; **V(Даг)**: (Палеаркт.); S(T); [Pl.] <Pm>
2572. *G. purpureum* Vill. - Г. пурпурная = **III(Каб)**; **IV(C33)**; **V(Касп)**: (Средиземн.); Db(T); [Sp.]
2573. *G. lucidum* L. - Г. блестящая = **III(Куб,КР,П,ЧО)**; **IV(C33)**; **V(Касп)**: (Субсредиз*.); S,Аа(T); [Sp.]

Genus 611. *Erodium* L'Her. - Журавельник

2574. *E. malacoides* (L.) L'Her. - Ж. мальвовидный = **V(Касп - Дербент)**: (Средиземн.); Db(T); [Sp.]
2575. *E. strigosum* Kar. ex Ledeb. (*E. laciniatum* (Cav.) Willd.) - Ж. щетинистый = **V(Касп: Муртазалиев, 2009)**: (Вост.средиз.); Db(T); [R.]
2576. *E. ruthenicum* Bieb. (*E. serotinum* Stev.) - Ж. русский = **I(T)**: (Понтич.); Db(НК); [R.]
2577. *E. hoefftianum* С.А.Меу. - Ж. Гёффта = **I(М - Ачикулак, Моздок)**; **II(ВП)**; **V(Касп)**: (Субтуран*.); Db(T); [Sp.] l.c. Кизляр
2578. *E. ciconium* (L.) L'Her. - Ж. айстовый = **I(Т,АК,КЕ)**; **II(ВП)**; **III(Ст,СК)**; **IV(Н)**; **V(БН,Касп,ЦД)**: (Субсредиз*.); ST,Rb(T); [Sp.]
2579. *E. fumarioides* Stev. - Ж. дымянковидный = **III(Ч)**; **V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Da,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Шахдаг
2580. ★*E. stevenii* Bieb. - Ж. Стевена = **I(Прик,М - Моздок)**; **III(Ст)**: (Кавк.: Предкавк.); Db(НК); [Rs.] <Ee> l.c. Бешпагир
2581. *E. cicutarium* (L.) L'Her.- Ж. цикутовый = **I(ЗП,ЦП)**; **II(ВП)**; **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК)**; **IV(C33)**; **V(Даг)**: (Палеаркт.); Db(T); [Sp.] <Pm;Pp>

Familia 106. Oxalidaceae R.Br. - Кислицевые

Genus 612. *Oxalis* L. - Кислица

2582. *O. acetosella* L. - К. обыкновенная = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч)**; **IV(ТА)**; **V(ЦД,АС)**: (Голаркт.); S(НК); [Pl.]

Genus 613. *Xanthoxalis* Small - Ксаноксалис

2583. *X. corniculata* (L.) Small (*Oxalis corniculata* L.) - К. рожковый = **III(Ст,ЧО - Терек)**; **IV(C33)**: (Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]
2584. **X. stricta* (L.) Small (*O. stricta* L.) - К. торчащий = **III(Ст,П,Каб,ОС)**: (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(НК); [R.]

Ordo 65. Linales - Льноцветные

Familia 107. Linaceae S.F.Gray - Льновые

Genus 614. Linum L. - Лён

2585. *L. catharticum* L. - Л. слабительный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Европ.); S,Pa(T); [Sp.]

2586. *L. perenne* L. - Л. многолетний = I(Т: **Зернов, 2006**); IV(Н): (Палеаркт.); Pa(НК); [R.]

2587. *L. austriacum* L. (*L. squamulosum Rudolphi*) - Л. австрийский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Зап.др.средиз.); ST(НК); [Pl.]

2588. *L. euxinum* Juz. - Л. черноморский = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [R.] <Rx>

2589. *L. bienne* Mill. (*L. angustifolium Huds.*) - Л. двулетний = III(Кисл); V(БН,Касп): (Средиземн.); ST(НК:pb); [Sp.]

2590. *L. lanuginosum* Juz. (*L. hirsutum* L.) - Л. шерстистый = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); ST, Da(НК); [R.]

2591. *L. hypericifolium* Salisb. - Л. зверобоелистный = III(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.] <Po>

2592. *L. tenuifolium* L. - Л. тонколистный = III(Ст,ЧК,КР,ТЗ,СК,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД,АС): (Общедр.средиз.); ST, Da(НК); [Sp.]

2593. *L. nervosum* Waldst. et Kit. (incl. *L. jalicola* Juz.) - Л. жилковатый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Pl.]

2594. *L. corymbulosum* Reichenb. (*L. liburnicum Scop.*) - Л. щиточковатый = III(ТС); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Средиземн.); Pa(T); [R.]

2595. *L. trigynum* L. (*L. gallicum* L.) - Л. трёхпестичный = IV(ТА: **Зернов, 2006**): (Средиземн.); Pa(T); [Rs.]

2596. *L. nodiflorum* L. (*L. luteolum Bieb.*) - Л. узловатоцветковый = III(Ст,ЛН,СК,П,УН); IV(Н); V(БН,Касп): (Субкавк*.); ST(T); [Sp.]

2597. *L. tauricum* Willd. - Л. крымский = III(Ст,ЧК,КР,СК,П,Кисл): (Понтич.); Da(НК); [Sp.] <Po> <Rx>

2598. *L. alexeenkoanum* E.Wulf (*L. orientale auct.*) - Л. Алексеенко = III(Ст,ЧК,КР,СК,Э,Б,ОС,ВС); IV(Н); V(Дар): (Субкавк*.); Da(НК); [Sp.] <Po>

Ordo 66. Zygophyllales - Парнолистникоцветные

Familia 108. Peganaceae (Engl.) Tiegh. - Гармаловые

Genus 615. Peganum L. - Гармала

2599. *P. harmala* L. - Г. обыкновенная = I(ЦП); II(ВП); III(Ст); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); SD(НК); [R.] <Pt;Pm>

Familia 109. Tetradiclidiaceae (Engl.) Takht. - Тетрадиклидиевые

Genus 616. Tetradiclis Stev. - Тетрадиклис

2600. *T. tenella* (Ehrenb.) Litv. - Т. тонкий = I(Прик - р.Грачёвка,НК); V(Касп): (Туранск.); Dc(T); [R.] l.c. р. Кума у балки Горькой <Rx>

Familia 110. Zygophyllaceae R.Br. - Парнолистниковые

Genus 617. Zygophyllum L. - Парнолистник

2601. *Z. fabago* L. - П. обыкновенный = I(Т,Прик,ТБ,НК); II(Кизл); III(СК,П); IV(Н); V(Касп,ЦД,АС): (Общедр.средиз.); ST,Dd,Rb(НК); [Sp.] <Pt;Pm>

Genus 618. Tribulus L. - Якорцы

2602. *T. terrestris* L. - Я. стелющиеся = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(КР,СК,ТС); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Da,Rb(Т); [Pl.] <Pm>

Familia 111. Nitrariaceae Bercht. et J.Presl - Селитрянковые

Genus 619. Nitraria L. - Селитрянка

2603. *N. schoberi* L. (*N. caspia Willd.*) - С. Шобера = I(НК); II(Кизл); V(Касп,ЦД - Ботлих): (Ирано-Туран.); Dc(Ch); [R.] <Rx>

Ordo 67. Rutales - Рутоцветные

Familia 112. Rutaceae Juss. - Рутовые

Genus 620. Harpophyllum Adr.Juss. - Цельнолистник

2604. *H. villosum* (Bieb.) G.Don fil. - Ц. мягковолосистый = I(МД: **Немирова, Данилевич, 1995**); IV(Н); V(БН,Касп): (Армено-Иран.); ST,SD(НК); [R.] <Rx>

2605. *H. ciscaucasicum* (Rupr.) Grossh. et Vved. - Ц. предкавказский = III(ЧК,КР,Э); IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Ee> l.c. Усть-Джегута

2606. *H. thesioides* (Fisch. et DC.) G.Don fil. (*H. suaveolens* (DC.) Boiss., *H. tauricum Spach*) - Ц. ленецевиндый = III(КР); IV(Н): (Понтич); Da(НК); [Sp.]

Genus 621. Dictamnus L. - Ясенец

2607. *D. gymnostylis* Stev. - Я. голостолбиковый = III(Куб,КР,П); IV(Н); (Эвксин.); S,Pb(НК); [R.] <Pt;Pm;Pmel>

2608. *D. caucasicus* (Fisch. et C.A.Mey.) Grossh. - Я. кавказский = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Субкавк*.); Pa(НК); [Pl.] l.c. Бештау <Pt;Pm;Pmel>

Genus 622. Poncirus Rafin. - Понцирус <GD>

2609. **P. trifoliata* (L.) Rafin. - П. трёхлисточковый = IV(ТА): (Адвент. [Китай]); S,Rb(Phn); [R.]

Familia 113. Simaroubaceae DC. - Симарубовые

Genus 623. Ailanthus Desf. - Айлант

2610. **A. altissima* (Mill.) Swingle - А. высочайший = I(КЕ,Прик); III(Ст,МА,КР,СК,П,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп): (Адвент. [Китай]); Pa(Phm); [Sp.]

Familia 114. Anacardiaceae Lindl. - Сумаховые

Genus 624. Pistacia L. - Фисташка

2611. *P. mutica* Fisch. et C.A.Mey. - Ф. туполистная = IV(Н): (Вост.средиз.); Da(Phm); [Sp.]

Genus 625. *Cotynus* Hill - Скумпия

2612. *C. coggygia* Scop. - С. коженная = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ, Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,КР,Х,ЧК,СК,П,Кисл,ВС); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Da(Phn); [Sp.] <Rt;Pm>

Genus 626. *Rhus* L. - Сумах

2613. *Rh. coriaria* L. - С. дубильный = III(КР,П - Машук,ОС); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); Da(Phn); [R.] <Rх - в П и ОС; Pm>

Ordo 68. Polygalales - Истодоцветные

Familia 115. Polygalaceae R.Br. - Истодовые

Genus 627. *Polygala* L. - Истод

2614. *P. sosnowskyi* Kem.-Nath. (*P. sibirica auct. non L.*) - И. Сосновского = III(Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>

2615. *P. amoenissima* Tamamsch. (*P. alata (Tamamsch.) Galushko*) - И. прелестнейший = I(Тем); III([Ст: Танфильев, Кононов, 1987],ЗК,Э,ВК); IV(СЗЗ): (Средиземн.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>

2616. *P. comosa* Schkuhr - И. хохлатый = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Европ.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>

2617. *P. alpicola* Rupr. - И. альпийский = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ, Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(НК); [Pl.]

2618. *P. anatolica* Boiss. et Heldr. - И. анатолийский = III(Ст,Куб,ЗК,Э, Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субкавк*.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

2619. *P. caucasica* Rupr. - И. кавказский = I(Прик); II(Кизл); III(Ст,Куб, ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel>

Ordo 69. Euphorbiales - Молочаецветные

Familia 116. Euphorbiaceae Juss. - Молочаевые

Genus 628. *Leptopus* Desne. - Лептопус

2620. ★*L. colchicus* (Fisch. et. С.А.Мей. ex Boiss.) Pojark. (*Arachne colchica (Fisch. et. С.А.Мей. ex Boiss.) Pojark.*) - Л. колхидский = III([ОС: Гроссгейм, 1962]); IV(ТА - Хоста): (Субкавк*.); ST,Do(Phn); [Rs.]

Genus 629. *Andrachne* L. Андрахна

2621. *A. telephioides* L. - А. телефиевидная = I(Т); III(КР); IV(Н): (Средиземн.); Db,Rb(НК); [R.]

2622. *A. rotundifolia* С.А.Мей. - А. круглолистная = V(ЦД - Гимры): (Армено-Иран.); ST(НК); [R.] <Rх>

Genus 630. *Chrozophora* Adr.Juss. - Хрзофора

2623. *Ch. tinctoria* (L.) Adr.Juss. (*Ch. hierosolimitana Spreng.*) - Х. красильная = I(М - ст.Наурская); II(КН - Червлёные Буруны,Кизл); IV(Н - Геленджик: Зернов, 2006); V(Касп): (Средиземн.); Rb(Т); [Sp.]

Genus 631. *Mercurialis* L. - Пролесник

2624. *M. ovata* Sternb. et Норре - П. яйцевидный = [III(ВЛ - Даховская); IV(ТА - Адлер)]; Гельтман, 2012б): (Субсредиз*.); S(НК); [Sp.]

2625. *M. perennis* L. - П. многолетний = III(КР); IV(Н): (Европ.); S(К); [R.]

2626. *M. pachii* Graebn. (*M. ovata* Sternb. et Hoppe x *M. perennis* L.; *M. taurica* Juz.) - П. Пакса = III(КР - Крымск); IV(Н): (Евро-Кавк.); S(К); [R.]

2627. *M. annua* L. - П. однолетний = III(КР); IV(Н): (Средиземн.); Rb(T); [R.] <Pm;Pt>

Genus 632. Acalypha L. - Акалифа

2628. *A. australis* L. - А. южная = I(Тем - Краснодар); III(КР,Х,ЧО - Грозный); IV(ТА - Джубга, l.n.): (Адвент. [Юго-Вост.Азия]); Rb(T); [R.]

Genus 633. Agaloma Raf. - Агалома

2629. *A. marginata* A.Love et D.Love (*Euphorbia marginata* Pursch) - А. окаймлённая = III(Ст,П); IV(ТА): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(T); [R.]

Genus 634. Poinsettia Graham - Пуансетия

2630. *P. dentata* (Michx.) Klotzsch et Garcke (*Euphorbia dentata* Michx.; *E. davidii* Subils.) - П. зубчатая (Молочай зубчатый) = I([АЕ,АК: Гельтман, 2012,КЕ: Танфильев, Кононов, 1987],[НК - Кума, пос. Красный Октябрь]),М; III(Ст,П,ТЗ,Каб,ЧО); IV(Н,[ТА: Зернов, 2006]): (Адвент. [Сев. и Центр. Америка]); Rb(T); [Sp.]

Genus 635. Tithymalus Gaertn. - Титималюс (Молочай)

2631. *T. squamosus* (Willd.) Klotzsch et Garcke ex Klotzsch (*Euphorbia squamosa* Willd.) - Т.(М.) чешуйчатый = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Pl.] <Pt>

2632. *T. czerepanovii* (Geltman) A.L. Ivanov comb. nova (*E. czerepanovii* Geltman) - Т.(М.) Черепанова = V(ЦД - хр. Салатау): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub> l.c. хр. Салатау, окр. с. Бурунтай

2633. *T. scriptus* (Somm. et Levier) Prokh. (*E. scripta* Somm. et Levier) - Т.(М.) исписанный = III(ТЗ - Гоначхир, Домбай); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pс(НК); [R.] <Esub>

2634. *T. ardonensis* (Galushko) Galushko - Т.(М.) ардонский = III(УН): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. р. Ардон, Скалистый хребет

2635. *T. paluster* (L.) Garsault (*E. palustris* L.) - Т.(М.) болотный = I(Тем); III(МА - Краснодар); IV(Н): (Европ.); Аа(НК); [R.]

2636. ★*T. aristatus* (Schmalh.) Prokh. (*E. aristata* Schmalh.) - Т.(М.) остистый = III(Ст): (Кавк.: Предкавк.); ST(НК); [R.] <Es><Pt> l.c. Ставрополь

2637. *T. procerus* (Bieb.) Galushko (*E. procera* Bieb., *E. villosa* Waldst. et Kit.) - Т.(М.) высокий = III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Понтич.); Аа(НК); [Sp.] <Pt>

2638. *T. tauricolus* (Prokh.) Prokh. (*E. tauricola* Prokh.) - Т.(М.) крымский = III(КР); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Ра(К); [R.]

2639. *T. eugeniae* (Prokh.) Prokh. (*E. eugeniae* Prokh.) - Т.(М.) Евгении = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Ачишхо

2640. *T. condylocarpus* (Bieb.) Klotzsch et Garcke ex Klotzsch (*E. condylocarpa* Bieb.) - Т.(М.) членистоплодный = III(ЧК,КР,СК,Э,ТС); IV(Н); V(БН): (Субкавк*.); ST(НК); [Sp.] <Pt> l.c. Кисловодск

2641. *T. strictus* (L.) Prokh. (*T. micranthus* (Steph.) Sojak; *E. micrantha* Steph.; *E. stricta* L.; *E. serratula* Thuill.) - Т.(М.) прямой =

I(Т,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп,ЦД): (Европ.); Rb(Т); [Sp.]

2642. *T. platyphyllus* (L.) Prokh. (*E. platyphyllus* L.) - Т.(М.) плосколистный = **IV**(ТА): (Европ.); Rb(Т); [R.]

2643. *T. rhabdotospermus* (A.Radcliffe-Smith) Klotzsch et Garcke (*E. rhabdotosperma* A.Radcliffe-Smith) - Т.(М.) рабдотоспермус = **I**(М - Терек); **II**(Кизл - Терек,Сулак); Гельтман, 1991]; **III**(ТС,ЧО); **V**(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da,Rb(Т); [R.]

2644. *T. helioscopius* (L.) Scop. (*E. helioscopia* L.) - Т.(М.) солнечный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,КР,СКТ); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Rb(Т); [Pl.] <Pt>

2645. *T. seguierianus* (Neck.) Prokh. (*E. seguieriana* Neck.) - Т.(М.) Сегьеров = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,КР,СК,П,Кисл,Б,ОС); **IV**(Н); **V**(БН,Касп,ЦД): (Суб-туран*.); ST,SD(НК); [pl.] <Pt>

2646. *T. novorossicus* (Dubovik) A.L. Ivanov comb. nova (*E. novorossica* Dubovik; *E. pannonica* Host.) - Т.(М.) новороссийский = **IV**(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. г. Лысая (Анапский р-н)

2647. *T. stepposus* (Zoz) Prokh. (*E. stepposa* Zoz) - Т.(М.) степной = **I**(ЗП); **III**(Ст,Куб,ЧК,Э,Б,ОС,ВС); **IV**(Н); **V**(Касп,ЦД): (Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.] <Pt>

2648. *T. glareosus* (Pall. ex Bieb.) Prokh. (*E. glaeosa* Pall. ex Bieb., *E. maleevii* Tamamsch.) - Т.(М.) хрящеватый = **I**(КЕ); **III**(Ст,Кисл - Кичи-Балык); **V**(БН,Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); Da,Dd(НК); [Sp.] <Rx><Pt>

2649. *T. petrophilus* (С.А.Мей.) Sojak (*E. petrophila* С.А.Мей.) - Т.(М.) скалолюбивый = **III**(Ст,ЧК,КР,П,Кисл); **IV**(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Sp.] <Pt>

2650. *T. oschtenicus* (Galushko) Galushko (*E. oschtenica* Galushko; *E. erythron Boiss.*) - Т.(М.) оштенский = **III**(ВЛ - Оштен): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Es> l.c. г. Оштен

2651. *T. panjutinii* (Grossh.) A.L. Ivanov comb. nova (*E. panjutinii* Grossh.) - М. Панютина = **III**(ВЛ - г. Оштен: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Da,Pc(НК); [R.]; <Esub>

2652. ★*T. rigidus* (Bieb.) Sojak. (*E. rigida* Bieb., *E. biglandulosa* Desf.) - Т.(М.) жёсткий = **IV**(СЗЗ): (Вост.средиз.); Da(НК); [R.] <Rx>

2653. *T. myrsinites* (L.) Hill (*E. myrtsinites* L.) - Т.(М.) миртолистный = **IV**(ТА - Хоста, Орлиные скалы): (Средиземн.); Da(НК:hv); [R.] <Rx>

2654. *T. paralias* (L.) Klotzsch et Garcke (*E. paralias* L.) - Т.(М.)прибрежный = **I**(Т); **IV**(СЗЗ): (Средиземн.); Db(НК); [R.]

2655. *T. macroceras* (Fisch. et С.А.Мей.) Klotzsch et Garcke (*E. macroceras* Fisch. et С.А.Мей.) - Т.(М.) длиннорогий = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Sp.]

2656. *T. oblongifolius* (С.Koch) Klotzsch et Garcke ex Klotzsch (*E. oblongifolia* (С.Koch) С.Koch) - Т.(М.) продолговатолистный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.]

2657. *T. glaberrimus* (С.Koch) Klotzsch et Garcke (*E. glaberrima* С.Koch) - Т.(М.) оголённый = **III**(ВЛ,ТЗ); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [R.] <Esub>

2658. *T. amygdaloides* (L.) Garsault (*E. amygdaloides* L.) - Т.(М.) миндалевидный = **IV**(ТА); **V**(Касп): (Субредиз*.); S,Pa(НК); [R.]
2659. *T. ibericus* (Boiss.) Prokh. (*E. iberica* Boiss.; *T. kemulariae* (S.L.Chatschat.) Galushko; *E. kemulariae* S.L.Chatschat.) - Т.(М.) грузинский = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Субкавказ*.); ST,Rb(НК); [Pl.] <Pt>
2660. *T. dubovikiae* (Oudejans) A.L. Ivanov comb. nova (*E. dubovikiae* Oudejans) - Т.(М.) Дубовик = **IV**(Н): (Кавк.: Эукавказ.); S(НК); [R.] <Es> l.c. пос. Архипо-Осиповка
2661. *T. lucidus* (Waldst. et Kit.) Prokh. (*E. lucida* Waldst. et Kit.) - Т.(М.) блестящий = **III**(ТЗ); **IV**(Н - Новороссийск): (Понтич.); Rb(К); [R.]
2662. *T. boissierianus* (Woronow) Prokh. (*E. boissieriana* Woronow, *E. virgata* Waldst. et Kit.) - Т.(М.) Буасье = **I**(АК,КЕ,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,КР,СК,ТС); **IV**(Н); **V**(Касп,ЦД): (Армено-Иран.); ST(НК); [Sp.] <Pt>
2663. *T. tanaiticus* (Pacz.) Galushko (*E. tanaitica* Pacz., *E. sareptana* Beck.) - Т.(М.) донской = **I**(АЕ,АК,Тем,Т); **III**(Ст): (Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx> <Pt>
2664. *T. meyerianus* (Galushko) Galushko (*E. meyeriana* Galushko) - Т.(М.) Мейера = **III**(Кисл,ЦЭ): (Кавк.: Эукавказ.); Da,Do(НК); [R.] <Es> l.c. р. Хасаут, Долина Нарзанов
2665. *T. baxanicus* (Galushko) Galushko (*E. baxanica* Galushko) - Т.(М.) баксанский = **III**(ЦЭ): (Кавк.: Эукавказ.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. р. Баксан, Былым
2666. *T. subtilis* Prokh. (*E. subtilis* (Prokh.) Prokh.) - М. тонкий = (**I**(АК,КЕ); **IV**(Н)): **КК Краснодарского края, 2017**): (Понтич.); ST(НК); [R.]
2667. *T. daghestanicus* (Geltman) A.L. Ivanov comb. nova (*E. daghestanica* Geltman) - Т.(М.) дагестанский = **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Da,Do(НК); [R.] <Ee>
2668. *T. leptocaulis* (Boiss.) Prokh. (*E. leptocaula* Boiss.) - Т.(М.) тонкостебельный = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); **II**(КН); **III**(Ст,СК); **IV**(Н); **V**(БН): (Понтич.); ST(НК); [R.] <Pt>
2669. *T. astrachanicus* (С.А.Мей.) Prokh. (*E. astrachanica* С.А.Мей. ex Prokh., *E. praecox* (Fisch. ex Boiss.) B.Fedtsch. et Fler.) - Т.(М.) астраханский = **I**(МД,АИ,НК); **II**(КН); **III**(Ст,СК): (Туранск.); ST(НК); [R.] <Rx> <Pt>
2670. *T. undulatus* (Bieb.) Klotzch et Garcke ex Klotzch (*E. undulata* Bieb.) - Т.(М.) волнистый = **I**(МД,АИ,НК); **II**(КН): (Туранск.); ST(НК); [R.] <Rx> <Pt>
2671. *T. buschianus* (Grossh.) Sojak (*E. buschiana* Grossh.) - Т.(М.) Буша = **III**(ЦЭ - Чегем,Л,Б): (Кавк.: Эукавказ.); Pс,Do(НК); [R.] <Ee> l.c. верх. р. Сукан-су
2672. *T. exiguous* (L.) Lam. (*E. exigua* L.) - Т.(М.) ничтожный = **IV**(Н): (Средиземн.); Rb(Т); [R.]
2673. *T. szovitsii* (Fisch. et С.А.Мей.) Klotzch et Garcke ex Klotzch (*E. szovitsii* Fisch. et С.А.Мей.) - Т.(М.) Шовица = **I**(Прик: **Галушко, Мигненко, 1989**); **III**(ОС - Армхи); **V**(Касп,ЦД): (Субкавказ*.); Da,Db(Т); [Rs.] <Rx>
2674. *T. normannii* (Schmalh. ex Lipsky) Prokh. (*E. normannii* Schmalh. ex Lipsky) - Т.(М.) Норманна = **III**(ЛН,Ст): (Кавк.: Предкавказ.); ST,Rb(Т); [Rs.] <Es> <Pt> l.c. Ставрополь (Сенгилеевское оз.)

2675. *T. graecus* (Boiss. et Sprun.) Prokh. (*E. graeca* Boiss. et Sprun.; *E. taurinensis* All.) - Т.(М.) греческий = IV(Н): (Вост.средиз.); Rb(T); [R.]

2676. *T. replus* (L.) Hill (*E. replus* L.) - Т.(М.) бутерлаковый = IV(ТА); V(Касп): (Палеаркт.); Rb(T); [R.]

2677. *T. aulacospermus* (Boiss.) Klotzsch et Garcke ex Klotzsch (*E. aulacosperma* Boiss.) - Т.(М.) бороздчатосемянный = IV(Н): (Вост.средиз.); Rb(T); [R.]

2678. *T. falcatus* (L.) Klotzsch et Garcke (*E. falcata* L., *E. acuminata* Lam.) - Т.(М.) серповидный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,КР,СКТ,П,Кисл,Б,ОС); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Dd,Ra,Rb(T); [Sp.] <Pt>

Genus 636. Chamaesyce S.F.Gray - Хамезице (Молочай)

2679. *Ch. nutans* (Lag.) Prokh. (*Euphorbia nutans* Lag.) - X.(М.) поникающий = IV(Н): (Адвент. [Америка]); Rb(T); [R.]

2680. *Ch. replis* (L.) Prokh. (*E. replis* L.) - X.(М.) бутерлак = I(T); IV(СЗЗ); (Субсредиз*.); Db(T); [R.]

2681. *Ch. humifusa* (Schlecht.) Prokh. (*E. humifusa* Schlecht.) - X.(М.) приземистый = I(Тем,Т,Прик); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ); IV(СЗЗ); V([ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009): (Адвент. [Китай]); Rb(T); [Sp.] <Pt;Pm>

2682. *Ch. vulgaris* Prokh. (*E. chamaesyce* L.) - X.(М.) обыкновенный = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК); II(КН); III(П); IV(Н); V(БН,Касп): (Субсредиз*.); Ra,Rb(T); [R.] <Pt>

2683. *Ch. canescens* (L.) Prokh. (*E. canescens* L.) - X.(М.) сереющий = III(ЧО); IV(Н); V(Касп): (Ирано-Туран.); Rb(T); [R.]

2684. *Ch. maculata* (L.) S.F.Gray (*E. maculata* L.) - X.(М.) пятнистый = I(Т,Тем,АК); III(МА); IV(СЗЗ): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(T); [R.]

Familia 117. Callitrichaceae Link - Болотниковые

Genus 637. Callitriche L. - Болотник

2685. *C. palustris* L. (*C. verna* L.) - Б. болотный (Водяная звездочка весенняя) = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Плюрирег.); Ac(T); [Sp.]

2686. *C. stagnalis* Scop. - Б. прудовой = III(Куб,ВЛ): (Европ.); Ac(T); [R.]

Ordo 70. Vuxales - Самшитоцветные

Familia 118. Vuxaceae Dumort. - Самшитовые

Genus 638. Vuxus L. - Самшит

2687. ★*V. colchica* Pojark. - С. колхидский = III(Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(Phm); [R.] <Rt>

Familia 119. Empetraceae S.F.Gray - Водяниковые

Genus 639. Empetrum L. - Водяника

2688. *E. caucasicum* Juz. - В. кавказская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb,Pc,Do(Phn:sv); [Pl.]

Ordo 71. Celastrales - Бересклетоцветные

Familia 120. Aquifoliaceae Bartl. - Падубовые

Genus 640. Ilex L. - Падуб

2689. *I. colchica* Pojark. - П. колхидский = **IV(C33)**: (Эвксин.); S(Phn:sv); [R.] <Rt>

2690. *I. stenocarpa* Pojark. - П. узкоплодный = **III(X,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС)**: (Кавк.: Эукавк.); S(Phn:sv); [R.] <Rt> <Esub>

2691. *I. hircana* Pojark. - П. гирканский = **V(Касп - с. Гурхунь Табасаранского р-на: Теймуров, 1998)**: (Кавк.: Общекавк.); S(Phn:sv); [Rs.] <Rt;Rg>

Familia 121. Celastraceae R.Br. - Бересклетовые

Genus 641. Euonymus L. - Бересклет

2692. *E. europaea* L. - Б. европейский = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C33); V(Даг)**: (Европ.); S(Phn); [Pl.] <Pm>

2693. *E. verrucosa* Scop. - Б. бородавчатый = **III(Ст,КР,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(Н); V(Даг)**: (Европ.); S(Phn); [Sp.]

2694. *E. leiophloea* Stev. - Б. гладкокорый = **III(ВЛ); IV(ТА)**: (Кавк.: Общекавк.); S(Phn); [Sp.]

2695. *E. latifolia* (L.) Mill. - Б. широколистный = **III(ВЛ,ТЗ,Э,Л,УН,Ч); IV(C33); V(Касп)**: (Субсредиз*.); S(Phn); [R.]

2696. ★*E. nana* Vieb. - Б. карликовый = **III(П - Бештау,Машук,ТЗ - Б.Хатипара,ЦЭ - Кубань, Б - Черек Безенгийский)**: (Общ.др.средиз); S, Da(Ch); [Rs.] <Rt;Rg> l.c. Бештау

Ordo 72. Sapindales - Сапindoцветные

Familia 122. Staphyleaceae Lindl. - Клекачковые

Genus 642. Staphylea L. - Клекачка

2697. ★*S. pinnata* L. - К. перистая = **III(X); IV(C33)**: (Субсредиз*.); S(Phm); [R.] <Pa>

2698. ★*S. colchica* Stev. - К. колхидская = **III(X); IV(C33)**: (Кавк.: Общекавк.); S(Phm); [R.] <Pa>

Familia 123. Aceraceae Juss. - Клёновые

Genus 643. Acer L. - Клён

2699. *A. laetum* C.A. Mey. - К. светлый = **III(Куб,КР,Х,ВЛ,ТЗ,Кисл,Ч); IV(C33); V(Касп)**: (Субкавк*.); S(Phms); [Sp.] <Rt;Pme1>

2700. *A. platanoides* L. - К. остролистный = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C33); V(Даг)**: (Европ.); S(Phmg); [Pl.] <Pme1>

2701. *A. campestre* L. - К. полевой = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C33); V(Даг)**: (Евро-Кавк.); S(Phms); [Pl.] <Pme1>

2702. *A. pseudoplatanus* L. - К. ложноплатановидный = **IV(ТА)**: (Европ.); S(Phms); [R.]

2703. *A. trautvetteri* Medw. - К. Траутфеттера = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Общекавк.); S(Phms); [Pl.]

2704. *A. sosnowskyi* Doluch. - К. Сосновского = **IV**([ТА - ущелья рек Мзымта (Ахцу), Псоу, Шахе]: **КК Краснодарского края, 2007**): (Кавк.: Эукавк.); S(Phmg); [R.]

2705. *A. tataricum* L. - К. татарский = **III**(Ст,Куб,КР,Х,ЧК,П); **IV**(Н): (Субпонт*.); S(Phm); [Sp.] <Pmel>

2706. *A. hyrcanum* Fisch. et С.А.Мей. - К. гирканский = **III**(ТЗ); **V**(Касп): (Кавк.: Общекавк.); S(Phms); [R.]

2707. *A. ibericum* Bieb. - К. грузинский = **V**(Касп): (Субкавк*.); S(Phm); [R.]

Genus 644. Negundo Boehm. - Негундо

2708. **N. aceroides* Moench (*Acer negundo* L.) - Н. клёновидный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Адвент. [Сев.Америка]; S,ST(Phms); <Po>

Ordo 73. Balsaminales - Бальзаминоцветные

Familia 124. Balsaminaceae A.Rich. - Бальзаминовые

Genus 645. Impatiens L. - Недотрога

2709. *I. noli-tangere* L. - Н. обыкновенная = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Евро-Сиб.); S(T); [Pl.]

2710. **I. glandulifera* Royle - Н. желёзконосная = **III**(Ст,П,ВЛ,ТЗ,Кисл): (Адвент. [Гималаи]); Rb(T); [Sp.]

Ordo 74. Rhamnales - Крушиноцветные

Familia 125. Rhamnaceae Juss. - Крушиновые

Genus 646. Paliurus Hill - Держи-дерево

2711. *P. spina-christi* Mill. - Д.-д. христова колючка = **II**(Кизл); **III**([П: Гроссгейм, 1962],ЧО,ОС,ВС); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); ST(Phn); [Pl.] <Rx - в П; Pmel; Pm>

Genus 647. Frangula Hill - Крушина

2712. *F. alnus* Mill. - К. ломкая = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); S(Phn); [Sp.] <Pm>

Genus 648. Rhamnus L. - Жостер

2713. *Rh. cathartica* L. - Ж. слабительный = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); S(Phm); [Pl.] <Pm>

2714. *Rh. pallasii* Fisch. et С.А.Мей. - Ж. Палласа = **I**(Прик,ТБ,НК,М); **II**(ВП); **III**(Ст,ЧК,ТЗ,СКТ,Э,Б,ОС,ВС); **V**(Даг): (Ирано-Туран.); Da(Phn); [Pl.]

2715. *Rh. tortuosa* Somm. et Levier (*Rh. awarica Sachok.*) - Ж. извилистый = **III**(ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn); [Sp.] <Ee> l.c. аул Уч-кулан

2716. *Rh. spathulifolia* Fisch. et С.А.Мей. - Ж. лопатчатолистный = **I**(МД,АИ,НК); **III**(СК,П); **V**(Касп): (Субкавк*.); ST(Phn); [Sp.]

2717. *Rh. imeretina* Booth - Ж. имеретинский = **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(Phm); [R.]

2718. *Rh. cordata* Medw. - Ж. сердцевидный = **III**(ВЛ: Галушко, 1980); **IV**(ТА: Гроссгейм, 1962): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Esub>

2719. *Rh. microcarpa* Boiss. - Ж. мелкоплодный = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Общекавк.); Do(Phn); [R.]
2720. *Rh. depressa* Grub. - Ж. прижатый = III(ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Do(Phn); [Pl.]

Ordo 75. Vitales - Виноградоцветные

Familia 126. Vitaceae Juss. - Виноградовые

Genus 649. Vitis L. - Виноград

2721. *V. sylvestris* C.C.Gmel. - В. лесной = I(НК,М); II(КН); III(Ст,Куб,КР,П,Л,УН); V(Касп): (Субсредиз*.); S(Phn:ll); [Sp.] <Pa>

Ordo 76. Malvales - Мальвоцветные

Familia 127. Tiliaceae Juss. - Липовые

Genus 650. Tilia L. - Липа

2722. *T. cordata* Mill. (*T. parviflora* Ehrh. ex Hoffm.) - Л. сердцевидная = III(ВЛ,Б,ОС,ВС,Ч); V(Касп,ЦД,АС): (Палеаркт.); S(Phms); [Sp.]
2723. *T. platyphyllos* Scop. (*T. cordifolia* Bess.) - Л. широколистная = III(ВЛ,ТЗ,П,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп): (Европ.); S(Phmg); [R.] <Pm;Pmel>
2724. *T. caucasica* Rupr. - Л. кавказская = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); S(Phmg); [Pl.] <Pm;Pmel>

Familia 128. Malvaceae Juss. - Мальвовые

Genus 651. Hibiscus L. - Гибискус

2725. *H. trionum* L. - Г. тройчатый = I(АЕ); III(Ст,ЛН,СК,П,Каб.); IV(Н); V(БН,Касп): (Плюрирег.); Ra,Rb(Т); [Sp.]

Genus 652. Abutilon Hill - Канатник

2726. *A. theophrasti* Medik. - К. Теофраста = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Плюрирег.); Rb(Т); [Sp.]

Genus 653. Malvella Jaub. et Spach - Мальвочка

2727. *M. scherardiana* (L.) Jaub. et Spach - М. Жерара = V(Касп): (Средиземн.); ST(НК); [R.]

Genus 654. Lavatera L. - Хатьма

2728. *L. thuringiaca* L. - Х. тюрингенская = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Pa,ST(К); [Pl.] <Pm;Po>
2729. *L. punctata* All. - Х. пятнистая = III([Ст,П]: Меницкий, 1997); IV(ТА); V(Касп): (Средиземн.); ST(НК:pb); [Sp.]

Genus 655. Malva L. - Просвирник

2730. *M. sylvestris* L. (*M. mauritiana* L.) - П. лесной = I(АК,КЕ,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Pa,ST,Rb(Т); [Sp.] <Pm;Pmel>
2731. *M. ambigua* Guss. - П. непостоянный = IV(Н): (Средиземн.); Rb(Т); [R.]
2732. *M. neglecta* Wallr. - П. пренебреженный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Rb(Т); [Pl.] <Pa;Pmel>

2733. *M. parviflora* L. - П. мелкоцветковый = V(Касп: Муртазалиев, 2009): (Общ.др.средиз.); Rb(T); [R.]

2734. *M. nicaeensis* All. - П. ницкий = I(M); II(ВП); III(Ст,СК,П,Кисл); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Общ.др.средиз.); Rb(T); [R.] <Pmel>

2735. *M. pusilla* Smith - П. низкий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pa;Pmel>

Genus 656. *Althaea* L. - Алтей

2736. *A. hirsuta* L. - А. жёстковолосистый = I(ЗП,ЦП); II(Кизл); III(Ст,КР,СК,П,ЧО,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Субсредиз*.); ST,Rb(T); [Sp.]

2737. *A. cannabina* L. - А. коноплёвый = I(Тем,Т,КЕ,Прик,М); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Общ.др.средиз.); Pa,ST(K); [Sp.]

2738. *A. officinalis* L. - А. лекарственный = I(ЗП,НК); II(ВП); III(Ст,Куб,Каб); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Aa(K); [Sp.] <Pm>

2739. *A. armeniaca* Ten. - А. армянский = I(ЗП,Прик,ТБ,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Субтуран*.); Pa,Aa(K); [Sp.] <Pm>

2740. *A. taurinensis* DC. - А. крымский = IV(Н); V(Касп): (Понтич.); Db(K); [R.]

Genus 657. *Alcea* L. - Шток-роза

2741. *A. rugosa* Alef. - Ш.-р. морщинистая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понтич.); ST,Pa(K); [Pl.] <Po>

2742. *A. kusariensis* (Iljin) Iljin - Ш.-р. кусарская = V(АС - с. Хлют: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Rb(K); [R.] <Esub>

2743. *A. novorokrovskii* Iljin - Ш.-р. Новопокровского = I(АЕ): (Понтич.); ST(K); [Sp.] <Esub>

2744. *A. abchasica* Iljin - Ш.-р. абхазская = IV(ТА - верх Мзымты: Тимухин, 2012): (Кавк.: Эукавк.); Pb(K); [R.] <Esub>

Genus 658. *Malvalthaea* Iljin - Мальвальтея <GT>

2745. *M. transcaucasica* (Sosn.) Iljin - М. закавказская = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Rb(T); [R.]

Genus 659. *Kitaibelia* Willd. - Китайбелия <GT>

2746. **K. vitifolia* Willd. - К. виноградолистная = III(Ст: Белоус, 1999): (Средиземн.); Rb(K); [R.]

Ordo 77. *Laurales* - Лавроцветные

Familia 129. *Lauraceae* Juss. - Лавровые

Genus 660. *Laurus* L. - Лавр

2747. *L. nobilis* L. - Л. благородный = IV(СЗЗ): (Средиземн.); S,Da(Phn:sv); [Sp.]

Ordo 78. *Theales* - Чаецветные

Familia 130. *Hypericaceae* Juss. - Зверобоевые

Genus 661. *Hypericum* L. - Зверобой

2748. *H. androsaemum* L. - З. красильный = IV(ТА): (Средиземн.); S(Ch:sf); [R.]

2749. *H. xylosteifolium* (Spach) N.Robson (*H. inodorum* Willd.) - 3. кустарниковый = **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(Phn); [R.]
2750. *H. bupleuroides* Griseb. - 3. володушковидный = **IV**(ТА: **Зернов, 2006**): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.]
2751. *H. tetrapterum* Fries (*H. quadrangulum* L.; *H. acutum* Moench, *nom. illegit.*) - 3. четырёхкрылый = **I**(АК,КЕ,Тем,Т); **III**(Ст,**Куб**,СК,П,Кисл,Л,УН, Ч); **IV**(ТА); **V**(Касп): (Европ.); Аа(НК); [Sp.]
2752. *H. perforatum* L. - 3. продырявленный = **I**(**ЗП,ЦП**); **II**(**ВП**); **III**(Ст,**Куб**,**ЗК**,**Э**,**Тер**,**ВК**); **IV**(**СЗЗ**); **V**(Даг): (Палеаркт.); Ра(НК); [Pl.] <Pm>
2753. *H. elegans* Steph. - 3. изящный = **I**(**ЗП**,Прик,ТБ,НК); **II**(Кизл); **III**(Ст,СК,П,Каб,ТС); **V**(БН,ЦД): (Евро-Сиб.); ST(НК); [Sp.]
2754. ★*H. montbretii* Spach (*H. maleevii* A.Zernov et A.Jelen.; *H. strictum* Maleev) - 3. Монбре = **III**(КР,Х); **IV**(Н): (Субкавк*.); Pb(НК); [R.]
2755. *H. bithynicum* Boiss. (*H. caucasicum* (Woronow) Gorschk.) - 3. вифийский = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(НК); [Sp.]
2756. *H. orientale* L. (*H. buschianum* Woronow; *H. ptarmicifolium* Spach) - 3. восточный = **III**(ВЛ - pp. Белая,Лаба,ТЗ - pp.Теберда,Зеленчук); **IV**(ТА); **V**(АС: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(НК); [R.]
2757. *H. elongatum* Ledeb. (*H. hyssopifolium* Chaix) - 3. удлинённый = **III**(КР); **IV**(Н): (Средиземн.); Da(НК); [R.]
2758. *H. lydium* Boiss. (*H. ponticum* Lipsky; *H. chrysothyrsum* Woronow) - 3. лидийский = **IV**(Н); **V**(Касп - Талги: **Муртазалиев, 2009**): (Субкавк*.); ST(НК); [R.]
2759. *H. hirsutum* L. - 3. жёстковолосистый = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ); **III**(Ст,**Куб**,**ЗК**,**Э**,**Тер**,**ВК**); **IV**(**СЗЗ**); **V**(Даг): (Палеаркт.); Ра,ST(НК); [Pl.]
2760. *H. linarioides* Bosse (*H. polygonifolium* Rupr.) - 3. льнянковидный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]
2761. *H. theodorii* Woronow - 3. Фёдора = **V**(АС - Хнов: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.]
2762. *H. nummularioides* Trautv. - 3. монетолистный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ, Б,ОС); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.] l.c. г. Нахар
2763. *H. asperuloides* Czern. ex Turcz. - 3. ясменниковый = **III**(Л,УН,Ч); **V**(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(Ch:sf); [R.] <Ее>
2764. *H. montanum* L. - 3. горный = **III**(ТЗ,ЦЭ); **IV**(ТА): (Европ.); S,Pb(НК); [R.]

Ordo 79. Tamaricales - Гребенщикоцветные

Familia 131. Elatinaceae Dumort. - Повойничковые

Genus 662. Elatine L. - Повойничек

2765. *E. alsinastrum* L. - II. мокричный = **I**(Тем); **III**(**Куб**,СК,П): (Европ.); Ab(T); [R.]
2766. *E. triandra* Schkuhr - II. трёхтычинковый = **I**(Тем: **Косенко, 1970**): (Адвент. [Сев. и Южн. Америка]); Ab(T); [R.]

Familia 132. Frankeniaceae S.F.Gray - Франкениевые

Genus 663. Frankenia L. - Франкения

2767. *F. hirsuta* L. - Ф. жестковолосистая = I(НД,ЗПМ,Т,ЦП); II(ВП); III(П); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Dc(Ch:sf); [R.]

2768. *F. pulverulenta* L. - Ф. порошистая = I(ЗП,МД,АИ,НК); II(ВП); III(Ст,П); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Dc(T); [R.]

Familia 133. Tamaricaceae Link - Гребенщиковые

Genus 664. Reaumuria L. - Реамюрия

2769. *R. alternifolia* (Labill.) Britten. (*R. hypericioides* Willd.) - Р. очереднолистная = III(Кисл - Кисловодск: Бондаренко, 2012); V(Касп,ЦД): (Субкавказ*.); ST,Dc(Ch:sf); [R.] <Rx в Кисл>

Genus 665. Tamarix L. - Гребенщик

2770. *T. octandra* Bunge - Г. восьмитычинковый = ([II(ВП); V(Касп)]: Русанович, 2012): (Субкавказ*.); Dc,Аа(Phn); [R.]

2771. *T. meyeri* Boiss. - Г. Мейера = II(Кизл); V(Касп): (Ирано-Туран.); Db,Аа(Phn); [R.]

2772. *T. tetrandra* Pall. - Г. четырёхтычинковый = ([I(T); IV(H)]: Зернов, 2006,ТА): (Вост.средиз.); Аа(Phn); [R.]

2773. *T. gracilis* Willd. - Г. изящный = I(ЗПМ,АЕ - Азовское море,МД): (Субтуран*.); Аа(Phn); [Rs.]

2774. *T. laxa* Willd. - Г. рыхлый = I(МД); II(Кизл): (Ирано-Туран.); Аа(Phn); [Rs.]

2775. *T. hohenackeri* Bunge - Г. Гогенакера = II(Кизл); IV(Н: Зернов, 2006); V(Касп,ЦД,АС): (Ирано-Туран.); Аа,Db(Phn); [Sp.]

2776. *T. ramosissima* Ledeb. - Г. многоветвистый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СКТ,П,кисл); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Вост.средиз.); Аа,Db(Phn); [Sp.] <Pm>

Genus 666. Myricaria Desv. - Мирикария

2777. *M. germanica* (L.) Desv. (*M. bracteata* Royle; *M. alopecuroides* Schrenk) - М. германская = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Общедр.средиз.); Аа,Do(Phn); [Sp.]

2778. *M. squamosa* Desv. - М. чешуйчатая = III(ЦЭ,Б,ОС.); V(ЦД): (Субтуран*.); Аа,Do(Phn); [R.]

Ordo 80. Cistales - Ладанникоцветные

Familia 134. Cistaceae Juss. - Ладанниковые

Genus 667. Cistus L. - Ладанник

2779. *C. tauricus* C.Presl. (*C. creticus* L.) - Л. крымский = IV(ТА - Мацеста, Орлиные скалы): (Средиземн.); Da(Ch); [Rs.]

2780. *C. salviifolius* L. - Л. шалфеелистный = IV(ТА - пос. Чемитоквадже): (Зап.др.средиз.); Da(Ch); [Rs.]

Genus 668. Helianthemum Hill - Солнцецвет

2781. *H. daghestanicum* Rupr. - С. дагестанский = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавказ.); Da(Ch:sf); [Sp.] <Es> l.c. Гимри, р. Сулак

2782. *H. nummularium* (L.) Mill. - С. монетолистный = III(ЧК,КР,З,Кисл,Э,Б,ОС,ВС); IV(Н); V(Дар): (Субсредиз*.); Pb(Ch:sf); [Pl.]
2783. *H. nitidum* Clementi - С. блестящий = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(БН,Касп,ЦД): (Европ.); Pb(Ch:sf); [Sp.]
2784. *H. ovatum* (Viv.) Dun. - С. яйцевидный = III(ЗК,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); Pb(Ch:sf); [Sp.] <Pmel>
2785. *H. salicifolium* (L.) Mill. - С. иволистный = IV(Н); V(БН,Касп): (Средиземн.); ST(Т); [Sp.]
2786. *H. lasiocarpum* Jacques et Herincq - С. опушенноплодный = III(ЧО); V(БН,Касп): (Субкавказ*.); ST(Т); [Sp.] <Pmel>
2787. *H. buschii* (Palib.) Juz. et Pozd. - С. Буша = III(ЧК,КР,ВЛ - гг. Фишт,Оштен,Кисл,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавказ.); Pb,Рс,Do(Ch:sf); [Pl.] l.c. г. Б.Тхач <Esub>
2788. *H. ciscaucasicum* Juz. et Pozd. - С. предкавказский = III(ЧК,КР,Э,Б,ОС): (Кавк.: Эукавказ.); ST,Da(Ch:sf); [Pl.] <Pmel><Ee>

Genus 669. *Fumana* (Dun.) Spach - Фумана

2789. *F. procumbens* (Dun.) Gren. et Godr. - Ф. лежачая = III(КР,П,ВС); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Средиземн.); Da(Ch:sf); [R.] <в П - Rх>
2790. *F. arabica* (L.) Spach (*F. viscidula* Juz.) - Ф. арабийская = IV(ТА - басс. р. Агура: **Зернов, 2006**): (Средиземн.); Da(Ch:sf); [Rs.] <Rх>

Ordo 81. *Violales* - Фиалкоцветные

Familia 135. *Violaceae* Batsch - Фиалковые

Genus 670. *Viola* L. - Фиалка

2791. *V. rupestris* F.W.Schmidt - Ф. скальная = III(ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb(НК); [Pl.]
2792. *V. reichenbachiana* Jord. ex Boreau (*V. silvestris* Lam.) - Ф. Рейхенбаха = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); S(НК:ephhd); [Sp.]
2793. *V. sieheana* W.Beck. (*V. caspia* (Rupr.) Freyn) - Ф. Зиге = III(ВЛ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавказ*.); S(НК); [Sp.]
2794. *V. elatior* Fries (*V. accrescens* Klok.; *V. montana* L.; *V. nemoralis* Kutz.) - Ф. высокая = I(НД,М - Прохладный); III(Ст,Куб,П,Кисл); V(Касп): (Палеаркт.); S(НК:ephhd); [R.]
2795. *V. pumila* Chaix - Ф. низкая = I(НД); III(Ст,Куб,СК): (Европ.); S(НК:ephhd); [Rs.]
2796. *V. canina* L. (*V. ericetorum* Schrad. ex Hayne) - Ф. собачья = I(АК,КЕ,Прик,НК,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Евро-Сиб.); S(НК:ephhd); [Pl.] <Pm>
2797. *V. x poroviae* Vl.V.Nikitin - Ф. Поповой = ([III(Х,ВЛ,ТЗ,Кисл): **Никитин, 2012**): (Кавк.: Эукавказ.); Pb(НК); [R.] <Ee> l.c. пер. Гумбаши
2798. *V. mirabilis* L. - Ф. удивительная = III(ТЗ,Э,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД,АС): (Палеаркт.); S(НК:ephhd); [Sp.]
2799. *V. ambigua* Waldst. et Kit. - Ф. сомнительная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Понтич.); Pa(НК:ephhd); [Pl.]

2800. *V. hirta* L. (*V. thomasiniana* Songeon et E.P.Perrier) - Ф. коротковолосистая = **I**(Тем,Т,КЕ); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); **IV**(Н); **V**(Касп,ЦД): (Евро-Сиб.); Pa(НК:ephhd); [Pl.]
2801. *V. ignobilis* Rupr. (*V. pyrenaica* Ramond ex DC.) - Ф. неблагородная = **III**(ВЛ); **IV**(ТА): (Субкавказ*.); Pc(НК:ephhd); [R.]
2802. *V. odorata* L. (*V. wiedemannii* Boiss.) - Ф. душистая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Евро-Кавк.); S(НК:ephhd); [Pl.] <Pm>
2803. *V. suavis* Vieb. - Ф. приятная = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Субпонт*.); S(НК:ephhd); [Sp.]
2804. *V. alba* Bess. (*V. dehnhardtii* Ten.) - Ф. белая = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Европ.); S(НК:ephhd); [Sp.]
2805. *V. somchetica* C.Koch - Ф. сомхетская = **III**([Ст: Танфильев, Кононов, 1987],ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); **V**(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pc(НК:ephhd); [Pl.]
2806. *V. selkirkii* Purch ex Goldie - Ф. Селькирка = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **V**(ЦД,АС): (Голаркт.); S(НК:ephhd); [R.]
2807. *V. caucasica* Kolenati - Ф. кавказская = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]
2808. *V. minuta* Vieb. (*V. daghestanica* (Rupr.) Vl.V.Nikitin) - Ф. мелкая = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>
2809. *V. meyeriana* (Rupr.) Klok. - Ф. Мейера = **III**(ЦЭ - Эльбрус): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Es> l.c. г. Эльбрус
2810. *V. oreades* Vieb. - Ф. высокогорная = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавказ*.); Pc(НК); [Pl.]
2811. *V. tricolor* L. - Ф. трёхцветная = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Палеаркт.); S,Pb(T); [R.]
2812. *V. x wilhelmii* Vl.V.Nikitin - Ф. Вильгельма = **III**(ВЛ); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(T); [R.] <Ee> l.c. Кавк. запов., р. Челайс
2813. *V. saxatilis* F.W.Schmidt (*V. vespertina* Klok.) - Ф. каменистая = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(ТА: Зернов, 2006); **V**(Касп,ЦД,АС): (Евро-Кавк.); Pa(T); [Pl.]
2814. *V. matutina* Klok. - Ф. утренняя = **III**([Ст,Каб - Нальчик]: Никитин, 2012): (Понтич.); Pa(T); [R.]
2815. *V. hymettia* Boiss. (*V. nemausensis* Jord.) - Ф. гиметтская = **IV**(Н - Никитин, 2012); **V**(Касп - Тарки-Тау: Муртазалиев, 2009): (Вост.средиз.); ST,Rb(T); [R.]
2816. *V. arvensis* Murr. - Ф. полевая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Евро-Сиб.); Pa,Rb(T); [Sp.] <Pm>
2817. *V. kitaibeliana* Schult. - Ф. Китайбелева = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(Н); **V**(Касп,ЦД): (Понтич.); ST(T); [Pl.]

Ordo 82. Begoniales - Бегониецветные

Familia 136. Datisceae Lindl. - Датисковые

Genus 671. *Datisca* L. - Датиска

2818. *D. cannabina* L. - Д. коноплевая = III(КР,Х,ВЛ,Каб - Нальчик,Л); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Общедр.средиз.); Rb(НК); [R.] <Pm>

Ordo 83. Thymelaeales - Волчикоцветные

Familia 137. Thymelaeaceae Juss. - Волчниковые

Genus 672. *Daphne* L. - Волчник

2819. *D. mezereum* L. - В. обыкновенный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Каб,ВК); IV(ТА); V(АС): (Европ.); S(Phn); [Sp.] <Pt;Pm>

2820. *D. pontica* L. - В. понтийский = III(ВЛ); IV(ТА): (Эвксин.); S(Phn:sv); [R.]

2821. *D. albowiana* Woronow ex Pobed. - В. Альбова = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(Phn); [R.]

2822. *D. glomerata* Lam. - В. сборный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(Даг): (Субкавк*); Pb(Phn:sv); [Pl.]

2823. *D. caucasica* Pall. - В. кавказский = III(ТЗ - верх.Теберды); IV(ТА); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); S(Phn); [R.]

2824. ★*D. baksanica* Pobed. - В. баксанский = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn:sv); [R.] <Es> l.c. пос. Былым

2825. *D. pseudosericea* Pobed. (*D. woronowii* Kolak.) - В. ложношелкови-
стый = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(Phn:sv); [R.]

2826. *D. circassica* Woronow ex Pobed. - В. черкесский = III(ВЛ - р. Белая); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(Phn:sv:fl); [Sp.] <Esub>

Genus 673. *Thymelaea* Mill. - Тимелея

2827. *Th. passerina* (L.) Coss. et Germ. (*Lygia passerina* (L.) Fas.) - Т. воробьиная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,КР,СК,П); IV(Н); V(БН,Касп): (Общедр.средиз.); ST,Da(T); [R.]

Genus 674. *Diartron* Turcz. - Двучленник

2828. *D. vesiculosum* (Fisch. et C.A.Mey. ex Kar. et Kir) C.A.Mey. - Д. пузырчатый = IV(Касп): (Ирано-Туран.); Da(T); [R.]

Genus 675. *Stelleropsis* Pobed. - Стеллеропсис

2829. ★*S. caucasica* Pobed. - С. кавказский = III(Кисл - Гумбаши, Хасаут,ЦЭ,Б): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [Sp.] <Es> l.c. р. Хасаут

Ordo 84. Elaeagnales - Лохоцветные

Familia 138. Elaeagnaceae Juss. - Лоховые

Genus 676. *Nipporhaë* L. - Облепиха

2830. *N. rhamnoides* L. - О. крушиновидная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Aa(Phn); [Pl.] <Pm;Pa;Pmel>

Genus 677. *Elaeagnus* L. - Лох

2831. *E. angustifolia* L. - Л. узколистный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Общедр.средиз.); Db(Phn); [Sp.] <Pa;Pm;Pmel>

2832. *E. caspica* (Sosn.) Grossh. - Л. каспийский = **II(Кизл); V(БН,Касп,ЩД):** (Ирано-Туран.); Db(Phn); [Sp.]

Ordo 85. Myrtales - Миртоцветные

Familia 139. *Lythraceae* J.St.-Nil. - Дербенниковые

Genus 678. *Lythrum* L. - Дербенник

2833. *L. tribracteatum* Salzm. ex Spreng. - Д. трёхприцветниковый = **I(НД,Тем); IV(Н); V(Касп - окр. Махачкалы: Муртазалиев, 2009):** (Общедр.средиз.); Dc(T); [Sp.] <Pmel>

2834. *L. thesioides* Bieb. - Д. ленецевидный = **III(Ст):** (Понтич.); Aa(T); [Rs.] <Rg> l.c. Ставрополь

2835. *L. hyssopifolia* L. - Д. иссополистный = **IV(СЗЗ):** (Субсредиз.*); Pa,Aa(T); [R.]

2836. *L. thymifolia* L. - Д. тимьянолистный = **V(Касп - окр. Махачкалы):** (Голаркт); Pa(T); [R.] <Rg>

2837. *L. virgatum* L. - Д. прутьевидный = **I(Тем,Т,КЕ,Прик,НК,М); II(ВП); III(Ст,Куб,КР,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pmel>

2838. *L. salicaria* L. - Д. иволистный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

Familia 140. *Punicaceae* Horan. - Гранатовые

Genus 679. *Punica* L. - Гранат

2839. ★*P. granatum* L. - Г. обыкновенный = **IV(ТА); V(Касп):** (Вост.средиз.); Dd,Aa(Phn); [Sp.] <Pa;Po>

Familia 141. *Onagraceae* Juss. - Кипреевые (Ослинниковые)

Genus 680. *Epilobium* L. - Кипрей

2840. *E. hirsutum* L. - К. шерстистый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.]

2841. *E. parviflorum* Schreb. - К. мелкоцветковый = **I(Тем,Т); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Евро-Кавк.); Aa(НК); [Sp.]

2842. *E. montanum* L. - К. горный = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.]

2843. *E. lanceolatum* Seb. et Mauri - К. ланцетолистный = **I(Тем); III(Куб,КР,Кисл,ЦЭ); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Зап.др.средиз.); S,Aa(НК); [R.]

2844. *E. tetragonum* L. (*E. adnatum* Griseb.) - К. четырёхугольный = **I(НД,ЗПМ,АЕ); II(Кизл); III(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Палеаркт.); Aa(НК); [R.]

2845. *E. lamyi* F.Schultz - К. Ламы = III(МА); IV(C33): (Европ.); S,Pa,Aa(НК); [Sp.]
2846. *E. nervosum* Boiss. et Buhse - К. жилковатый = III(Ст,Ку6,ВЛ,Т3,Э,БК); IV(C33); V(БН,ЦД,АС): (Вост.средиз.); Aa(НК); [Sp.]
2847. *E. prionophyllum* Hausskn. - К. городчатолитный = III(ВЛ,Т3); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Aa(НК); [R.]
2848. *E. consimile* Hausskn. - К. сходный = III(ВЛ: Зернов, 2006): (Субкавк*.); Aa(НК); [R.]
2849. *E. frigidum* Hausskn. - К. холодостойкий = V(Касп,ЦД): (Ирано-Туран.); Pb,Aa(НК); [Rs.]
2850. *E. palustre* L. - К. болотный = I(НД,ЗПМ); III(ВЛ,Т3,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(АС): (Голаркт.); Aa,Ab(НК); [Sp.]
2851. *E. alpestre* (Jacq.) Krock. - К. предальпийский = III(ВЛ,Т3,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Европ.); Pb,Aa(НК); [R.]
2852. *E. algidum* Vieb. - К. холодный = III(ВЛ,Т3,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(АС): (Субкавк*.); Pb,Рс,Aa(НК); [Pl.]
2853. *E. gemmascens* С.А.Меу. - К. почконосный = III(ВЛ,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Армено-Иран.); Рс,Aa(НК); [R.]
2854. *E. subalgidum* Hausskn. - К. холодолобивый = V(АС): (Ирано-Туран.); Aa(НК); [R.]
2855. *E. alpinum* L. (*E. anagallidifolium* Lam.) - К. альпийский = III(ВЛ,Т3,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(АС): (Палеаркт.); Рс,Aa(НК); [Sp.]
2856. *E. roseum* Schreb. - К. розовый = I(НД); IV(Н: Зернов, 2006); V(ЦД - Аркас: Муртазалиев, 2009): (Европ.); Aa(НК); [R.]

Genus 681. Chamaenerion Hill - Иван-чай

2857. *Ch. angustifolium* (L.) Scop. (*Chamerion angustifolium* (L.) Holub) - И.-ч. узколистый = III(ВЛ,Т3,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Плурирег.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.] <Pa;Pm;Pmel>
2858. *Ch. crassifolium* (Lehm.) Tzvel., comb. nova (*Ch. dodonae* (Vill.) Kost.; *Ch. angustissimum* (Web.) Grossh.) - И.-ч. толстолистный = III(ВЛ,Т3,ЦЭ,Кисл,Б,ОС,ВС,Ч); IV(C33); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.]
2859. *Ch. colchicum* (Albov) Steinb. (*Ch. caucasicum* (Hausskn.) Sosn. ex Grossh.; *Chamerion caucasicum* (Hausskn.) Galushko) - И.-ч. колхидский = III(ВЛ,Т3,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(C33); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]
2860. *Ch. bondarenkoi* Tzvel. - И.-ч. Бондаренко = [III(Х,Т3); IV(ТА)]; Цвелёв, 2014: (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub> l.c. окр. пос. Шабановское, р. Шебш

Genus 682. Oenothera L. - Ослиник

2861. *Oe. biennis* L. (*Onagra biennis* (L.) Scop.) - О. двулетний = I(ЗП); II(Кизл); III(Ст,ЧК,КР,Т3,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(НК:pb); [Pl.] <Ро;Рм>
2862. *Oe. oakesiana* (A.Gray) Robbin ex S.Walt. et Coult. - О. Океса = IV(ТА: Зернов, 2006): (Адвент. [Сев.Америка]); Db(HR:pb); [Sp.]

Genus 683. *Circaea* L. - Двулепестник

2863. *C. lutetiana* L. - Д. парижский = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст, Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.]

2864. *C. intermedia* Ehrh. - Д. средний = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Европ.); S(НК); [R.]

2865. *C. alpina* L. - Д. альпийский = III(ЗК,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Голаркт.); S(НК); [Pl.]

Familia 142. *Trapaceae* Dumort. - Чилимовые

Genus 684. *Trapa* L. - Чилим

2866. ★*T. natans* L. - Ч. плавающий = I(НД): (Европ.); Ac(T); [Rs.]

2867. *T. maenotica* Woronow - Ч. азовский = I(Тем); III(МА): (Понтич.); Ac(T); [Pl.] l.c. Кубань

2868. *T. hircana* Woronow - Ч. гирканский = II(Кизл - Гудермес-Хасавьюрт): (Туранск.); Ac(T); [R.] <Rg>

Ordo 86. *Haloragales* - Урутецветные

Familia 143. *Haloragaceae* R.Br. - Урутевые

Genus 685. *Myriophyllum* L. - Уруть

2869. *M. verticillatum* L. - У. мутовчатая = I(Тем,Т,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П); V(ЦД): (Голаркт.); Ac(K); [Sp.]

2870. *M. spicatum* L. - У. колосовая = I(Тем,Т,ТБ,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П); IV(Н); V(Касп): (Голаркт.); Ac(K); [Sp.]

Ordo 87. *Hippuridales* - Хвостникоцветные

Familia 144. *Hippuridaceae* Link - Хвостниковые

Genus 686. *Hippuris* L. - Хвостник

2871. *H. vulgaris* L. - Х. обыкновенный = II(ВП); V(Касп,ЦД): (Голаркт.); Ac(K); [R.]

Ordo 88. *Araliales* - Аралиецветные

Familia 145. *Araliaceae* Juss. - Аралиевые

Genus 687. *Hedera* L. - Плющ

2872. *H. caucasigena* Pojark. (*H. helix* L.) - П. кавказский = III(Х,ВЛ,ТЗ,П - Бештау,Кисл); IV(СЗЗ): (Эвксин.); S(Ch:ll); [R.] <Rt>

2873. *H. colchica* (C. Koch) C.Koch - П. колхидский = III(Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(Ch:ll); [R.] <Rt>

2874. ★*H. pastuchovii* Woronow - П. Пастухова = V(БН,Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S(Ch:ll); [R.] <Rt>

Familia 146. *Apiaceae* Lindl. - Сельдереевые (*Umbelliferae* - Зонтичные)

Genus 688. *Hydrocotyle* L. - Щитолистник

2875. *H. ramiflora* Maxim - Щ. ветвеветочковый = III(УН - Алагир: Комжа, 2004); IV(ТА): (Адвент. [Юго-Вост. Азия]); Аа,Аб(К); [R.]

Genus 689. Sanicula L. - Подлесник

2876. *S. europaea* L. - П. европейский = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm>

Genus 690. Astrantia L. - Астранция

2877. *A. major* L. - А. большая = III(ТЗ,ЦЭ): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [Sp.]

2878. *A. biebersteinii* Trautv. (*A. trifida* Hoffm.; *A. ossica* Woronow) - А. Биберштейна = III(ЗК,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(НК); [Pl.]

2879. *A. maxima* Pall. - А. наибольшая = III(ЗК,Э,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]

2880. *A. pontica* Albov. - А. понтийская = III(ВЛ,ТЗ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.]

Genus 691. Eryngium L. - Синеголовник

2881. *E. giganteum* Vieb. - С. гигантский = III(ЛН,КР,ЗК,Э,ОС); IV(ТА); V(Дар): (Эвксин.); Pb(НК); [Sp.]

2882. *E. campestre* L. - С. полевой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Субсредиз*.); ST,Rb(НК); [Pl.] <Pm>

2883. *E. planum* L. - С. плосколистный = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,Э,ЧО,ВК); IV(Н); V(Касп): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.] <Pm;Po>

2884. *E. caucasicum* Trautv. (*E. caeruleum* Vieb.; *E. biebersteinianum* Nevsky) - С. кавказский = II(КН); III(ЧК,СК,П,ТС,ЧО,Л); IV(ТА); V(БН,Касп): (Армено-Иран.); ST(НК); [Sp.] l.c. окр. Дербента

2885. ★*E. maritimum* L. - С. приморский = I(НД,АЕ,АК,Тем,Т - побережье Азовского моря); IV(СЗЗ): (Субсредиз*.); Db(НК); [R.] <Po>

Genus 692. Physocaulis (DC.) Tausch - Вздутостебельник <GM>

2886. *Ph. nodosus* (L.) Koch (*Murrhoides nodosa* (L.) Cannon) - В. узловатый = I(Т,Тем,АК,КЕ); III(Ст,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); S,Rb(Т); [R.]

Genus 693. Chaerophyllum L. - Бутень

2887. *Ch. aureum* L. (*Ch. maculatum* Willd. ex DC.) - Б. золотистый = I(КЕ,ТБ); II(ВП: Меницкий, 1991б); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]

2888. *Ch. hirsutum* L. (*Ch. cicutaria* Willd. ex DC.) - Б. жёсковолосистый = III(ВЛ,ТЗ): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [R.]

2889. *Ch. humile* Stev. - Б. низкий = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Рс(К); [Pl.]

2890. *Ch. roseum* Vieb. (*Ch. millefolium* DC.) - Б. тысячелистный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Каб,ЧО,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.]

2891. *Ch. rubellum* Albov - Б. красноватый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(НК); [R.] <Esub>

2892. *Ch. borodini* Albov - Б. Бородина = III(ВЛ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Es> l.c. г. Фишт

2893. *Ch. temulum* L. - Б. опьяняющий = I([АК,КЕ]: Меницкий, 1991); III(Ст,Куб,КР,Х,ЧК,ТЗ,П,Кисл); IV(Н); V(ЦД): (Европ.); S(Т); [Sp.]

2894. *Ch. angelicifolium* Bieb. - Б. дягелелистный = III(ТЗ,Б,ОС); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Субкавказ*.); S(НК); [R.]

2895. *Ch. confusum* Woronow - Б. смущённый = III(ВЛ - Гузерипль): (Кавк.: Общекавказ.); Pс(НК); [Rs.]

2896. *Ch. bulbosum* L. (*Ch. caucasicum* (Hoffm.) Schischk.) - Б. клубненосный = I(НД,КЕ); III(КУБ,Э,ТЕР); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Сиб.); S,Rb(К); [Sp.]

2897. *Ch. prescottii* DC. - Б. Прескотта = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Кисл,ВЛ,ТЗ): (Палеаркт.); S(НК:pb); [R.]

Genus 694. Anthriscus Pers. - Купырь

2898. *A. nemorosa* (Bieb.) Spreng. (*A. sylvestris auct. non L.*) - К. дубравный = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); II(Кизл - Кизляр: Муртазалиев, 2009); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК); [Sp.]

2899. *A. sylvestris* (L.) Hoffm. - К. лесной = I(АК); III(Ст,Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Ra,Rb(НК); [Sp.]

2900. *A. velutina* Somm. et Levier - К. бархатистый = III(ТЗ): (Кавк.: Эукавказ.); Pс,Do(НК); [R.] <Es> l.c. Теберда

2901. *A. ruprechtii* Boiss. - К. Рупрехта = III(ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавказ.); Pb,Pс(НК); [Pl.]

2902. *A. schmalhauseni* (Albov) K.-Pol. (*Chaerophyllum schmalhauseni* Albov) - К. Шмальгаузена = III(ВЛ): (Кавк.: Общекавказ.); S(НК); [R.]

2903. *A. cereifolium* (L.) Hoffm. (*A. longirostris Bertol.*) - К. бутенелистный = I(КЕ); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Европ.); Rb(Т); [R.]

2904. *A. caucalis* Bieb. (*A. scandicina Mansf.*, *A. vulgaris Pers. nom. illegit.*) - К. прицепниковый = I(Т,Тем); III(МА - Краснодар); IV(Н - Геленджик): (Европ.); Rb(Т); [R.]

Genus 695. Scandix L. - Кервель

2905. *S.ecten-veneris* L. - К. гребенчатый = I(АК,КЕ,Тем,Т,[ТБ,НК,М: Меницкий, 1991]); II(КН: Меницкий, 1991)]; III(Ст,Куб,СК,П); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Rb(Т); [Sp.]

2906. *S. iberica* Bieb. - К. грузинский = III(МА - Краснодар); V(Касп): (Армено-Иран.); Rb(Т); [R.]

2907. *S. stellata* Banks et Soland. - К. звёздчатый = V(Касп): (Субтуран*); Rb(Т); [R.]

2908. *S. australis* L. (*S. falcata Londes*, *S. grandiflora auct.*) - К. южный = I(Тем,Т); III(П); IV(Н); V(БН,Касп): (Средиземн.); Ra,Rb(Т); [R.]

Genus 696. Osmorhiza Rafin. - Осмориза

2909. *O. aristata* (Thunb.) Makino et Gabe - О. остистая = III(ВЛ,ТЗ): (Палеаркт.); S(НК); [R.]

Genus 697. Myrrhis Hill - Миррис

2910. **M. odorata* (L.) Scop. - М. душистый = III(П - Машук: Галушко, 1980): (Адвент. [Европа]); Rb(НК); [Rs.]

Genus 698. *Torilis* Adans. - Пупырник

2911. *T. japonica* (Houtt.) DC. (*T. anthriscus* Gmel.) - П. японский = **I(КЕ); II(Кизл); III(Ст, Куб, ЗК, Э); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Палеаркт.); S(T); [Pl.]
2912. *T. arvensis* (Huds.) Link - П. полевой = **I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Общедр.средиз.); S, Rb(T); [Pl.]
2913. *T. heterophylla* Guss. - П. разнолистный = **I(АК, КЕ, Прик, ТБ, НК); III(Ст, Куб, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(БН, Касп):** (Зап.др.средиз.); Rb(T); [R.]
2914. *T. nodosa* (L.) Gaertn - П. узловатый = **V(Касп):** (Ирано-Туран.); Ra, Rb(T); [Sp.]
2915. *T. leptophylla* (L.) Reichenb. fil. - П. тонколистный = **I(АК, КЕ); III(Ст, П, Кисл); IV(Н); V(БН, Касп):** (Общедр.средиз.); ST, Rb(T); [R.]
2916. *T. stocksiana* (Boiss.) Drude - П. Стокса = **V(Касп):** (Туранск.); Rb(T); [R.]

Genus 699. *Astrodaucus* Drude - Морковница

2917. *A. orientalis* (L.) Drude - М. восточная = **I(ЗП); III(ЛН, СК, ТЗ, Э, Тер); IV(Н); V(Даг):** (Зап.др.средиз.); Dd, Rb(НК:pb); [Pl.]
2918. *A. persicus* (Boiss.) Drude - М. персидская = **V(ЦД):** (Субкавказ*.); ST(НК:pb); [R.]
2919. *A. littoralis* (Vieb.) Drude - М. прибрежная = **I(АЕ, АК, Тем, Т - побережье Азовского моря); III(МА - Майкоп); IV(Н); V(Касп):** (Эвксин.); Db, Dc(T); [R.]

Genus 700. *Caucalis* L. - Прицепник

2920. *C. platycarpus* L. (*C. daucoides* L.; *Orlaya daucoides* (L.) Greuter; *O. platycarpus* (L.) W.D.J.Koch) - П. плоскоплодный = **IV(СЗЗ); V(Касп, ЦД):** (Зап.др.средиз.); Rb(T); [Sp.]
2921. *C. lappula* (Web.) Grande - П. липучковый = **I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ТЗ, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); ST, Ra, Rb(T); [Sp.] <Pa>

Genus 701. *Turgenia* Hoffm. - Тургенеция

2922. *T. latifolia* (L.) Hoffm. - Т. широколистная = **I(НД, ЗПМ, АЕ, АК, КЕ, Т, Тем, [ТБ: Меницкий, 1991]); II([КН: Меницкий, 1991], Кизл); III(Ст, ЦЭ, БН); IV(Н); V(Касп):** (Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]

Genus 702. *Daucus* L. - Морковь

2923. *D. carota* L. - М. дикая = **I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ТЗ, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(БН, Касп, ЦД):** (Палеаркт.); Ra, Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

Genus 703. *Coriandrum* L. - Кориандр (Кинза)

2924. **C. sativum* L. - К. посевной = **I(АК); III(Куб, П, СК, ЧО); V(Касп):** (Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]

Genus 704. *Fuernrohrria* C.Koch - Фюрнроррия <GM>

2925. *F. setifolia* C.Koch - Ф. щетинколистная = **III(Кисл - Кисловодск):** (Армено-Иран.); Pb(НК); [R.]

Genus 705. *Vifora* Hoffm. - Бифора

2926. *V. testiculata* (L.) DC. - Б. яйцевидная = **V(Касп):** (Средиземн.); Rb(T); [Sp.]

2927. *B. radians* Vieb. - Б. лучистая = I(T); IV(H); V(Касп): (Средиземн.); Ra,Rb(T); [Sp.]

Genus 706. *Smyrniium* L. - Смирния

2928. *S. perfoliatum* L. - С. пронзённолистная = I(Тем,Т,[Прик,ТБ,НК: Меницкий, 1991]); III(Ст,Куб,ЧК,СК,П,Л,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп): (Средиземн.); S(НК:pb); [Sp.]

Genus 707. *Physospermum* Cuss. ex Juss. - Вздutosемянник

2929. *Ph. cornubiense* (L.) DC. (*Ph. danaa* (Bieb.) Schishk.; *Danaa nudicaulis* (Bieb.) Grossh.) - В. корнуольский = I([ТБ,НК]: Меницкий, 1991); III(Ст,Куб,ЧК,СК,П,Л,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); S(НК); [Sp.]

Genus 708. *Conium* L. - Болиголов

2930. *C. maculatum* L. - Б. пятнистый = I(T); III(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pt;Pm>

Genus 709. *Eleutherospermum* С.Кoch - Свободносемеянник

2931. *E. cicutarium* (Bieb.) Boiss. - С. цикутовый = III(ЗК,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); S,Pb(НК); [Sp.]

Genus 710. *Tamamschjanella* Pimenov et Kljuikov - Тамамшаночка
<GT>

2932. ★*T. rubella* (E.Busch) Pimenov et Kljuikov (*Eleutherospermum rubellum* E.Busch; *E. lazicum* Boiss.) - Т. краснеющая = III(ВЛ,ТЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.]

Genus 711. *Bilacunaria* M.Pimen et V.Tichomirov - Конский фенхель

2933. *B. microcarpa* (Bieb.) M.Pimen. et V. Tichomirov (*Hippomarathrum microcarpum* (Bieb.) V.Petrov; *Cachrys microcarpa* Bieb.) - К.ф. мелкоплодный = I(Прик,ТБ); III(Ст,КР,П,Кисл,СКТ,ВС); IV(H); V(Касп,ЦД): (Субкавк*.); Pa(НК); [Sp.]

2934. *B. caspica* (DC.) M. Pimen. et V. Tichomirov (*H. capsicum* (DC.) Grossh.; *C. caspica* (DC.) Menitsky) - К.ф. каспийский = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.): ST(НК); [Sp.]

2935. *B. longiloba* (DC.) M.Pimen. et V. Tichomirov (*H. longilobum* (DC.) V. Fedtsch. ex Grossh.; *C. longiloba* DC.) - К.ф. длиннодольчатый = V(АС - Ахты: Муртазалиев, 2009): (Субкавк*.); Da(НК); [R.]

Genus 712. *Prangos* Lindl. - Прангос

2936. *P. ferulacea* (L.) Lindl. - П. феруловидный = V([Касп - Талги,ЦД - Ахты]: Муртазалиев, 2009): (Субсредиз*.): ST(НК); [Sp.]

2937. *P. odontalgica* (Pall.) Herrnst. et Heun (*Cachris odontalgica* Pall.) - П. противозубной = I(ЗПМ,АЕ,МД,АИ,НК,М); II(КН); III(Ст,СК,ЧО); V(БН,Касп): (Субтуран*.); Dc(НК); [R.]

Genus 713. *Vupleurum* L. - Володушка

2938. *V. rotundifolium* L. - В. круглолистная = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ, Прик,ТБ,НК); II(Кизл); III(Ст,Куб, СКТ,П,Кисл,Л, УН,Ч); IV(H); V(Даг): (Палеаркт.); Pa,Rb(T); [Sp.]

2939. *V. falcatum* L. - В. серповидная = III(ЧК,Кисл,УН,ОС,ВС): (Европ.); Pb(НК); [Sp.]

2940. *V. polyphyllum* Ledeb. - В. многолистная = **III(ЗК,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]
2941. ★*V. gischawii* Albov - В. Ришави = **III(ВЛ - г. Большой Бамбак); IV(ТА - Кавказский заповедник)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Да(НК); [R.] <Esub>
2942. *V. exaltatum* Vieb. - В. высокая = **II(Кизл); III(Ст,КР,ЧК,Э, ЗК,Тер); IV(Н); V(Касп,ЦД,АС)**: (Вост.средиз.); Da(НК); [Pl.]
2943. *V. woronowii* Manden. - В. Воронова = **IV(СЗЗ)**: (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Ее> l.c. ст. Натухаевская
2944. *V. nordmannianum* Ledeb. - В. Нордмана = **III(ВЛ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС)**: (Субкавк*.); Pb,Рс(НК); [Pl.]
2945. *V. subnivale* (Galushko) Galushko - В. околоснежная = **III(ЦЭ - верх. р. Малки)**: (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Rs.] <Es> l.c. верх. р. Малки
2946. *V. gerardii* All. (*V. commutatum* Boiss. et Bal.) - В. Жерара = **I(АК,КЕ,ЦП); II(КН); III(Ст,КР,СК); IV(Н); V(Касп)**: (Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.]
2947. *V. affine* Sadl. - В. родственная = **I(ЗП: Меницкий, 1991); III(КР,СК,П); IV(Н); V(Касп)**: (Евро-Кавк.); ST(T); [R.]
2948. *V. boissieri* Post - В. Буасье = **IV(Н); V(Касп)**: (Вост.средиз.); ST(T); [R.]
2949. *V. brachiatum* C.Koch - В. ветвистая = **I(АК,КЕ,Тем,Т); II(Кизл); III(Ст,Куб,СК,П,ТС); IV(СЗЗ)**: (Эвксин.); ST(T); [R.]
2950. *V. asperuloides* Heldr. ex Boiss. - В. ясменниковая = **III(П - Железноводск); IV(Н)**: (Кр.-Новоросс.); Dc(T); [Rs.] <Rx>
2951. *V. tenuissimum* L. - В. тончайшая = **I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,СК)**: (Суб-средиз*.); ST(T); [Sp.]
2952. *V. marschallianum* С.А.Мей. - В. Маршалла = **I(Тем,Т,Прик,ТБ, НК,М); II(ВК); III(СК,ТС); IV(Н); V(БН,Касп)**: (Евро-Кавк.); Dc(T); [R.] l.c. Кизляр
- Genus 714. *Trinia* Hoffm. - Триния**
2953. *T. multicaulis* (Poir.) Schischk. - Т. многостебельная = **I(НД,ЗПМ, АЕ,АК,КЕ); IV(Н); V(Касп - г. Тарки-тау: Муртазалиев, 2009)**: (Понтич.); ST(НК); [R.]
2954. *T. kitaibelii* Vieb. - Т. Китайбея = **I(ЗП,М); II(КН); III(Ст,П,ТС); IV(Н)**: (Понтич.); ST(НК:pb); [R.]
2955. *T. leiogona* (С.А.Мей.) В. Fedtsch. - Т. гладкоплодная = **I(АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ,НК,М); II(КН); III(Ст,Куб,СК,П,ТС); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД)**: (Субкавк*.); ST(НК); [Sp.]
2956. *T. hispida* Hoffm. - Т. щетинистоволосистая = **I(ЗП,Прик,ТБ,НК, М); II(Кизл); III(Ст,П,СК); IV(Н); V(Касп)**: (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
- Genus 715. *Froriepia* С. Koch - Фрорепия**
2957. *F. subpinnata* (Ledeb.) Baill - Ф. почти-перистая = **IV(ТА); V(Касп,ЦД)**: (Субкавк*.); Rb(T); [R.]

Genus 716. Apium L. - Сельдерей

2958. **A. graveolens* L. - С. пахучий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(НК:pb); [R.] <Pa>

Genus 717. Cyclospermum Lag. - Круглосемянник

2959. *C. leptophyllum* (Pers.) Spague ex Britt. (*Apium leptophyllum* (Pers.) F. Muell. ex Benth.) - К. тонколистный = IV(ТА): (Адвент. [Центр. Америка]; Rb(Т); [R.]

Genus 718. Sison L. - Петрушечник

2960. *S. amomum* L. - П. ароматный = IV(СЗЗ): (Европ.); Rb(НК:pb); [R.]

Genus 719. Visnaga Mill. - Виснага

2961. **V. daucoides* Gaertn. (*Ammi visnaga* (L.) Lam.) - В. морковевидная = III(П - Пятигорск); V(Касп): (Средиземн.); ST(НК:pb); [R.] <Pm>

Genus 720. Falcaria Fabr. - Резак

2962. *F. vulgaris* Bernh. (*F. sioides* (Wib.) Aschers.) - Р. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЧК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm>

Genus 721. Carum L. - Тмин

2963. *C. carvi* L. - Т. обыкновенный = I(НД,ЗПМ); III(Куб,ЗК,Э, Тер,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Палеаркт.); Pb,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

2964. *C. porphyrocoleon* (Freyn et Sint.) Woronow - Т. пурпурововлагищный = III(ТЗ): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

2965. *C. caucasicum* (Bieb.) Boiss. - Т. кавказский = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ, Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]

2966. *C. meifolium* (Bieb.) Boiss. - Т. рассечённолиственный = III(ВЛ,ТЗ, ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК:pb); [Pl.]

2967. *C. alpinum* (Bieb.) Benth. et Hook. fil. - Т. альпийский = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Pl.] <Esub>

Genus 722. Bunium L. - Буниум

2968. *B. bourgaei* (Boiss.) Freyn et Sint. ex Freyn (*B. microcarpum* (Boiss.) Freyn et Sint. ex Freyn) - Б. Буржо = III(КР,ЧК,УН); IV(Н): (Армено-Иран.); ST(НК); [R.]

Genus 723. Elaeosticta Fenzl - Элеостикта

2969. *E. lutea* (Hoffm.) Kljuikov, M.Pimen. et V.Tichomirov (*Muretia lutea* (Hoffm.) Boiss., *Bunium luteum* Bieb.) - Э. жёлтая = I(НД,ЗПМ,МД,КЕ): (Понт.- Южносиб.); Dc,Rb(НК); [R.] <Rx>

Genus 724. Chamaescadium С.А.Меу. - Низкозонтичник

2970. *Ch. acaule* (Bieb.) Boiss. - Н. бесстебельный = III(ЗК,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Бештау

Genus 725. Pimpinella L. - Бедренец

2971. *P. saxifraga* L. - Б. камнеломка = III(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД,АС): (Евро-Сиб.); Pb(НК); [Pl.] <Pm>

2972. *P. major* (L.) Huds. (*P. magna* L.) - Б. большой = III(КР,ЧК,Кисл,Л,Б,ОС): (Палеаркт.); Pb(НК); [Pl.]

2973. *P. rhodantha* Boiss. - Б. розовоцветный = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС) IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавказ*.); Pb(НК); [Pl.]

2974. *P. tragium* Vill. (*P. pseudotragium* DC.; *P. confusa* Woronow; *P. titanophila* Woronow; *P. idae* Takht.; *P. daghestanica* Schischk.) - Б. козельцовый = I(Прик); III(Ст); IV(Н); V(Касп): (Понтич.); Da(НК); [R.]

2975. *P. aromatica* Vieb. - Б. ароматный = V(Касп,ЦД): (Общекавк*.); ST(НК:pb); [R.]

2976. *P. affinis* Ledeb. (*P. peregrina* L.) - Б. близкий = III(УН,Ч); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Средиземн.); ST(Т:pb); [R.]

Genus 726. *Albovia* Schischk. - Альбовия

2977. *A. tripartita* (Kalen.) Schischk. (*Pimpinella tripartita* Kalen; *Scaligeria tripartita* (Kalen) Tamamsch.) - А. трёхраздельная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавказ*.); S(НК); [Sp.]

Genus 727. *Aegopodium* L. - Сныть

2978. *Ae. podagraria* L. - С. обыкновенная = III(Ст,ЗК,Э,Тер); IV(СЗЗ): (Палеаркт.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pm>

Genus 728. *Sium* L. - Поручейник

2979. *S. sisarum* L. (*S. sisaroides* DC.) - П. сизаровидный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,ЗК,Э,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Субтуран*.); Aa(НК); [Pl.]

2980. *S. latifolium* L. - П. широколистный = I(НД,ЗПМ,АЕ,[ТБ,НК: Меницкий, 1991]); II([ВП: Меницкий, 1991]); III(МА - Кубань): (Палеаркт.); Ab(НК); [Sp.] <Pt>

Genus 729. *Verula* Koch - Берула

2981. *V. erecta* (Huds.) Cov. (*V. angustifolia* (L.) Mert. et Koch; *Sium erectum* Huds.) - Б. прямая = I(Тем,МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(Ст,Куб,ЧК,СК,П,Кисл,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Евро-Кавк.); Ab(К); [Sp.]

Genus 730. *Crithmum* L. - Серпник

2982. ★*C. maritimum* L. - С. морской = IV(СЗЗ): (Средиз.); Do(НК); [Sp.]

Genus 731. *Seseli* L. - Жабрица

2983. *S. alexeenkoi* Lipsky - Ж. Алексеенко = V(ЦД): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Sp.] <Es>

2984. *S. dichotomum* Pall. ex Vieb. - Ж. вильчатая = III(П - Бештау): (Понтич.); Db(НК); [R.] <Rx>

2985. *S. rupicola* Woronow - Ж. скальная = IV(ТА): (Кавк.: Эукавказ.); Da,Do(НК); [R.] <Esub>

2986. *S. cuneifolium* Vieb. - Ж. клинолистная = V(Касп - южн. часть: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавказ.); Dd(НК); [R.] <Esub>

2987. *S. ponticum* Lipsky - Ж. понтийская = III(ВЛ - Даховская); IV(Н): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Новороссийск

2988. *S. petraeum* Vieb. (*S. floribundum* Somm. et Levier) - Ж. каменистая = III(ЗК,Э,ВК); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da,Do(НК); [Sp.]

2989. *S. peucedanoides* (Vieb.) K.-Pol. - Ж. горичниковидная = III(Ст,ЛН,СК,П,Кисл,Б,ОС,ЧО); IV(ТА); V(Дар): (Субкавказ*.); Pa(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск

2990. *S. varium* Trev. - Ж. варьирующая = **III(СК,Э,Тер)**; (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [Sp.]

2991. *S. grandivittatum* (Somm. et Levier) Schischk. - Ж. крупноканальцевая = **III(ОС)**: (Кавк.: Общекавк.); Do(НК); [R.]

2992. *S. tortuosum* L. (*S. arenarium* Bieb.; *S. campestre* Bess.) - Ж. извилистая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ); IV(Н); V(Касп)**: (Средиземн.); Pa,ST(НК); [Sp.]

Genus 732. Libanotis Haller ex Zinn - Порезник

2993. *L. transcaucasica* Schischk. (*Seseli libanotis* (L.) Koch; *Seseli transcausicum* (Schischk.) Pimenov et Sdobnina) - П. закавказский = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Субкавк*.); Pa,Pb(НК:pb); [Sp.] <Pm>

Genus 733. Oenanthe L. - Омежник

2994. *Oe. aquatica* (L.) Poir. - О. водяной = **I(НД,АК,КЕ,Тем,Т,ЦП); II(Кизл); III(СК,П); V(Касп)**: (Палеаркт.); Ab(К); [Sp.]

2995. *Oe. abchasica* Schischk. - О. абхазский = **IV(ТА)**: (Кавк.: Эукавк.); Aa,Ab(К); [R.] <Esub>

2996. *Oe. silaifolia* Bieb. - О. морковниколистный = **I(Тем); III(МА - Краснодар,ВЛ); IV(СЗЗ)**: (Евро-Кавк.); Ab(К); [R.]

2997. *Oe. pimpinelloides* L. - О. бедренцевидный = **I(Тем); IV(СЗЗ)**: (Средиземн.); Aa,Ab(К); [R.]

Genus 734. Aethusa L. - Кокорыш

2998. *Ae. synarion* L. - К. обыкновенный (Собачья петрушка) = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(СТ,Куб,ТЗ,П,Кисл,Каб); IV(СЗЗ); V(Касп)**: (Евро-Кавк.); S,Rb(Т); [Pl.]

Genus 735. Foeniculum Hill - Фенхель

2999. *F. vulgare* Mill. - Ф. обыкновенный = **V(Касп)**: (Средиземн.); Rb(НК); [R.]

Genus 736. Silaum Mill. - Морковник

3000. *S. alpestre* (L.) Thell. (*S. besseri* (DC.) Grossh.) - М. предальпийский = **I(ЗПМ); III(П,ТЗ)**: (Понтич.); Pa(НК); [R.]

Genus 737. Cnidium Cuss. ex Juss. - Жгун-корень

3001. *C. pauciradiatum* Somm. et Levier (*Seseli saxicolum* (Albov) Pimenov) - Ж.-к. малолучевой = **III(ВЛ,ТЗ)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>

Genus 738. Arafoë M.Pimen. et Lavrova - Арафэ <GMC>

3002. ★*A. aromatica* M.Pimen. et Lavrova (*Ligusticum arafoe* Albov) - А. ароматный = **III(ВЛ); IV(ТА)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>

Genus 739. Macroscadium V.Tichomirov et Lavrova - Макросциadium

<GD>

3003. *M. alatum* (Bieb.) V.Tichomirov et Lavrova (*Ligusticum alatum* (Bieb.) Spreng.) - М. крылатый = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(АС,ЦД)**: (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск

3004. *M. physospermifolium* (Albov) V.Tichomirov et Lavrova (*L. physospermifolium* Albov; *Cnidiacarpa physospermifolia* (Albov) M. Pimenov) - М. вдутосемянниколистный = III(Х,ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

Genus 740. *Ligusticum* L. - Лигустикум

3005. *L. caucasicum* Somm. et Levier - Л. кавказский = III(ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub> l.c. Клухорский перевал

Genus 741. *Angelica* L. - Дудник

3006. *A. sylvestris* L. (*Angelica pachyptera* Ave-Lall.) - Д. лесной = I(НД); III(ЧК,ВЛ,Кисл): (Палеаркт.); S,Аа(НК); [Sp.]

Genus 742. *Xanthogalum* Ave-Lall. - Ксантогалум

3007. *X. purpurascens* Ave-Lall. - (*Angelica purpurascens* (Ave-Lall.) Gilli) - К. пурпуровый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Субкавк*.); Pb,Аа(НК); [R.]

3008. *X. tatianaе* (Bordz.) Schischk. (*A. tatianaе* Bordz.) - К. Татьяны = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [R.] l.c. г. Большой Бамбак

3009. *X. sachokianum* Karjag. - К. Сахокия = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Esub>

Genus 743. *Archangelica* N.M.Wolf - Дягиль

3010. *A. officinalis* Hoffm. (*Angelica archangelica* L.) - Д. лекарственный = III(МА - Майкоп,ЧК): (Палеаркт.); S,Аа(НК:pb); [R.] <Pm>

Genus 744. *Ostericum* Hoffm. - Маточник

3011. *O. palustre* (Bess.) Bess. (*Angelica palustris* (Boiss.) Hoffm.) - М. болотный = III(МА,ВЛ,ЦЭ,Б,ОС): (Евро-Сиб.); Аа(НК:pb); [R.]

Genus 745. *Agasyllis* Spreng. - Агазилис

3012. *A. latifolia* (Vieb.) Boiss. - А. широколистный = III(ВЛ,ТЗ,Э,ЧО,ВК); IV(ТА); V(АС,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск

Genus 746. *Chymsydia* Albov - Химсидия

3013. *Ch. agasylloides* (Albov) Albov - Х. агазиллеvidная = III(ВЛ - г. Оштен): (Кавк.: Эукавк.); Da,Pb,Pc(НК); [R.] <Esub>

Genus 747. *Eriosynarhe* DC. - Пушистоспайник

3014. ★*E. longifolia* (Fisch. ex Spreng.) DC. - П. длиннолистный = I(НД,АЕ,АК,КЕ,М,П,СК): (Субтуран*.); ST(НК); [R.] <Rx>

Genus 748. *Ferula* L. - Ферула

3015. *F. tatarica* Fisch. ex Spreng. - Ф. татарская = I(ЗП,М); II(Кизл); III(Ст,ЛН,СК,ТС); V(БН,Касп): (Субтуран*.); ST(НК); [Sp.] l.c. Ставрополь

3016. *F. caspica* Vieb. (*F. caucasica* Korov.) - Ф. каспийская = I(М); II(ВП); III(Ст,СК,П); V(БН,Касп): (Субтуран*.); ST,DC(НК); [Sp.]

3017. *F. calcarea* M.Pimen. - Ф. известняковая = V(Касп: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub> l.c. окр. Махачкалы, с. Талги

3018. *F. euxina* M. Pimen. - Ф. черноморская = I(АК - окр. Ейска: Меницкий, 2008a): (Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx>

Genus 749. *Ferulago* Koch - Ферульник

3019. *F. campestris* (Bess.) Grec. - Ф. полевой = I(ЗП,ЦП); II(Кизл); III(Ст,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп): (Субпонт*.); Pa,ST(НК); [R.]

Genus 750. *Palimbia* Bess. - Палимбия

3020. *P. salsa* (L.f.) Bess. (*P. rediviva* (Pall.) Thell.) - П. солончаковая = I(ЗП): (Понтич.); Dc(НК); [R.]

Genus 751. *Peucedanum* L. - Горичник

3021. *P. ruthenicum* Bieb. - Г. русский = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); V(Дар): (Понт.-Южносиб.); ST,Да(НК); [Pl.] <Pm>

3022. *P. calcareum* Albov - Г. известняковый = III(ВЛ,ТЗ); IV(Н): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [R.]

3023. *P. tauricum* Bieb. - Г. крымский = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); ST(НК); [Sp.]

3024. *P. adae* Woronow - Г. Ады = III(КР,Куб,ЧК,П): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>

3025. *P. carvifolia* Vill. (*P. podolicum* (Bess.) Todor) - Г. оленелистный = III(Ст,ЧК,Кисл): (Европ.); S(НК); [R.]

3026. *P. pschawicum* Boiss. - Г. пшавский = III(Ст,ЛН,ЧК,Э,Б,ОС,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Esub>

3027. *P. cervaria* (L.) Lapeyr. (*Cervaria rivinii* Gaertn.) - Г. олений = III(П - Машук,Бештау); (Европ.); Pa(НК); [R.] <Rg>

3028. *P. oreoselinum* (L.) Moench - Г. горный = III(П,Кисл): (Европ.); S(НК); [R.]

3029. *P. caucasicum* (Bieb.) C.Koch (*Cervaria caucasica* (Bieb.) M. Pimenov) - Г. кавказский = III(КР,ЧК,Каб, Кисл,Л); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [R.]

Genus 752. *Macroselinum* Schur - Макроселинум

3030. ★*M. latifolium* (Bieb.) Schur (*Peucedanum latifolium* (Bieb.) DC.; *Cervaria aegopodioides* (Boiss.) Pimenov) - М. широколистный = III(Ст,Куб,КР,ЧК); IV(Н - Новомихайловский,ТА): (Эвксин.); S(НК); [R.]

Genus 753. *Xanthoselinum* Schur - Золотогоричник

3031. *X. alsaticum* (L.) Schur (*Peucedanum alsaticum* L.; *P. lubimenkoanum* Kotov) - З. эльзасский = I(НД,АЕ,АК,КЕ); III(Ст,Куб,ЧК, СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Sp.]

Genus 754. *Laser* Borkh. - Лазурник

3032. *L. trilobum* (L.) Borkh. - Л. трёхлопастный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); Pa,S(НК); [Sp.]

Genus 755. *Johreniopsis* M.Pimen. - Джорениопсис

3033. *J. seselioides* (С.А.Мей.) М.Римен. (*Peucedanum paucifolium* Ledeb., *P. meyeri* (Boiss.) Boiss.) - Д. жабрицевый = V(ЦД - Гергебиль, Гуниб: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [R.]

Genus 756. *Pastinaca* L. - Пастернак

3034. *P. armena* Fisch. et С.А.Мей. - П. армянский = III(ЗК,Кисл,ЦЭ, ВК); IV(ТА); V(АС,ЦД): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]

3035. *P. aurantiaca* (Albov) Kolak. - П. оранжевый = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc(НК); [R.] <Esub>

3036. *P. pimpinellifolia* Vieb. - П. бедреницелистный = I(АЕ,АК,КЕ, Прик,ТБ,НК); II(ВК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Pl.]

3037. *P. sylvestris* Mill. - П. лесной = I(НД,АЕ); III(Ст,ЧК,СК,П, Кисл,ВК); V(БН: Муртазалиев, 2009): (Европ.); Pa(НК:pb); [Sp.]

3038. *P. umbrosa* Stev. ex DC. - П. теневой = III(Кисл,Л,УН,Ч); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); S,Rb(НК); [Sp.]

3039. *P. clausii* (Ledeb.) M.Pimen. (*P. biebersteinii* Galushko; *Malabaila graveolens* (Spreng.) Hoffm.) - П. Клауса = I(ЗП,М); II(КН); III(Ст,Куб,СКТ): (Понтич.); Pa(НК); [Sp.]

Genus 757. *Symphyoloma* С.А.Мей. - Сростноплодник <GMC>

3040. *S. graveolens* С.А.Мей. - С. пахучий = III(Б,ОС,ВС); IV(АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Sp.] <Esub>

Genus 758. *Heracleum* L. - Борщевик

3041. *H. sibiricum* L. - Б. сибирский = III(Ст,Куб,П,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН): (Палеаркт.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pt;Pm>

3042. *H. asperum* (Hoffm.) Vieb. - Б. жёсткий = III(ТЗ,П,Кисл,ЦЭ, ОС,ВС); V(АС,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pt> <Esub> l.c. Бештау

3043. *H. ponticum* (Lipsky) Schischk. ex Grossh. - Б. понтийский = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub>

3044. *H. aconitifolium* Woronow - Б. аконитолистный = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Pt> <Esub>

3045. *H. freynianum* Somm. et Levier (*H. colchicum* Lipsky; *H. calcareum* Albov) - Б. Фрейна = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА); (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [R.] <Esub>

3046. *H. osseticum* Manden. - Б. осетинский = III(ОС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Esub>

3047. *H. mantegazzianum* Somm. et Levier - Б. Мантегацци = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); (Эвксин.); S,Pb(НК:pb); [Pl.] <Pt>

3048. *H. sosnowskyi* Manden. - Б. Сосновского = III(Ст - заносное); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Pb(НК:pb); [Sp.] <Pt>

3049. *H. sommieri* Manden. - Б. Соммье = III(Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub>

3050. *H. wilhelmsii* Fisch. et Ave-Lall. - Б. Вильгельмса = V(АС: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

3051. *H. scabrum* Albov - Б. шероховатый = III(Х,ВЛ,ТЗ); IV(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Esub> l.c. г. Оштен

3052. *H. leskovii* Grossh. (*H. nanum* Satzyr.) - Б. Лескова = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Sp.] <Esub>

3053. *H. stevenii* Manden. - Б. Стевена = IV(Н): (Евро-Кавк.); Da(НК); [R.]

3054. *H. grandiflorum* Stev. - Б. крупноцветковый = III(ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Sp.] <Esub>

3055. *H. chorodanum* (Hoffm.) DC. - Б. айрный = III(ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск

3056. *H. roseum* Stev. - Б. розовый = III(ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [R.] <Esub>

3057. *H. apiifolium* Boiss. - Б. сельдереелистный = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pб,Pс(НК); [Sp.]

Genus 759. Malabaila Hoffm. - Малабайла

3058. *M. sulcata* С. Koch - М. бороздчатая = IV(Н - Анапа-Новороссийск: Галушко, 1980), V(Касп - южн. часть: Муртазалиев, 2009): (Субкавк*.); ST(НК); [R.]

3059. *M. aucheri* Boiss. - М. Оше = V(Касп - Дербент: Муртазалиев, 2009): (Ирано-Туран.); ST(НК); [R.]

Genus 760. Zosima Hoffm. - Зосима

3060. *Z. orientalis* Hoffm. (*Z. absinthifolia* (Vent.) Link) - З. восточная (полыннолистная) = III(Ст,Э,Тер); V(Даг): (Общедр.средиз.); Da(НК); [Sp.]

Genus 761. Tordylium L. - Тордилиум

3061. *T. maximum* L. - Т. крупный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Pa,Rb(Т); [Sp.]

Genus 762. Mandenovia Alava - Манденовия <GMC>

3062. ★*M. komarovii* (Manden.) Alava (*Tordylium komarovii* Manden.; *Trigonosciadium komarovii* (Manden.) Tamamsch.) - М. Комарова = III(ОС - Арми, ВС - Аргун); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК:pb); [Sp.] <Ee>

Genus 763. Laserpitium L. - Гладыш

3063. *L. hispidum* Vieb. - Г. щетинистоволосистый = III(Куб,КР,ЧК,ТЗ,СК,П,Кисл,Л,УН); IV(СЗЗ); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Sp.]

3064. ★*L. stevenii* Fisch. et Trautv. - Г. Стевена = III([ВЛ,ТЗ - рр. Аманауз, Гоначхир]: Пименов, Онипченко, 1999), IV(ТА - оз. Кардывач: Солодько, Кирый, 2002): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb(НК); [R.]

Ordo 89. Cornales - Кизиловцветные

Familia 147. Cornaceae Dumort. - Кизиловые

Genus 764. Cornus L. - Кизил

3065. *C. mas* L. - К. обыкновенный = I(Т,АК,КЕ,Прик); III(Ст,Куб,П,Кисл,Тер); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); S(Phm); [Pl.] <Pa;Pm>

Genus 765. Swida Opiz - Свидина

3066. *S. australis* (С.А.Мей.) Pojark. ex Grossh. (*Thelycrania australis* auct.) - С. южная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Общедр.средиз.); S(Phm); [Pl.]

3067. *S. koenigii* (Schred.) Pojark. ex Grossh. (*Th. koenigii* (Schneid) Sanadze) - С. Кёнига = IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(Phm); [R.]

Ordo 90. Ericales - Верескоцветные

Familia 148. Pyrolaceae Dumort. - Грушанковые

Genus 766. Pyrola L. - Грушанка

3068. *P. rotundifolia* L. - Г. круглолистная = III(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Голаркт.); S(НК); [Rs.] <Rg;Pm>

3069. *P. media* Sw. - Г. средняя = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Европ.); S,Pb(НК); [Sp.]

3070. *P. chlorantha* Sw. - Г. зеленоцветковая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); S(НК); [Sp.]

3071. *P. minor* L. - Г. малая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); S,Pb,Рс(НК); [Sp.]

Genus 767. Moneses Salisb. - Одноцветка

3072. *M. uniflora* (L.) A.Gray - О. крупноцветковая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Голаркт.); S(НК); [Sp.]

Genus 768. Orthilia Rafin. - Ортилия

3073. *O. secunda* (L.) House - О. маленькая = III(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Панбор.); S(НК); [Rs.] <Rg>

Familia 149. Monotropaceae Nutt. - Подъельниковые (Верляницевые)

Genus 769. Nuyopitys Hill - Подъельник

3074. *N. monotropa* Crantz - П. обыкновенный = III(Ст,Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВС); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); S(К:sap); [Rs.] <Rg>

Familia 150. Ericaceae Juss. - Вересковые

Genus 770. Arctostaphylos Adans. - Толокнянка

3075. *A. caucasica* Lipsch. (*A. uva-ursi* (L.) Spreng.) - Т. кавказская = III(ЦЭ - Бермамыт,Л - Сукан-Су, Хызны-Су,УН,Ч); V(АС - Андийский хр.): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sv); [R.] <Esub>

Genus 771. Azalea L. - Азалия

3076. *A. pontica* L. (*Rhododendron luteum* Sweet) - А. понтийская = III([Ст: Гроссгейм, 1967],ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,Э,Каб,ЧО,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); S,Pb(Phn); [Sp.] <Po;Pt>

Genus 772. Rhododendron L. - Рододендрон

3077. *Rh. ponticum* L. - Р. понтийский = III(Х,ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Зап.др.средиз.); S(Phm:sv); [Sp.] <Rt;Po>

3078. *Rh. caucasicum* Pall. - Р. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(Phn:sv); [Pl.] <Pm;Po>

3079. *Rh. x sochadze* Charadze et Davlianidze - Р. Сохадзе = IV(ТА - хр. Аишха, Аибга: КК Краснодарского края, 2017): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phn:sv); [R.] <Esub>

Familia 151. Vacciniaceae S.F.Gray - Брусниковые

Genus 773. Rhodococcum (Rupr.) Avror. - Брусника

3080. *Rh. vitis-idaea* (L.) Avror. (*Vaccinium vitis-idaea* L.) - Б. обыкновенная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); S,Pb,Рс(Ch:fl:sv); [Pl.] <Pa>

Genus 774. Vaccinium L. - Черника

3081. *V. myrtillus* L. - Ч. обыкновенная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); S,Pb,Рс(Ch:fl); [Pl.] <Pa>

3082. *V. arctostaphylos* L. - Ч. кавказская = III(Х,ВЛ,ТЗ,Л,УН,ОС,Ч); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(Phn); [R.] <Pa>

Ordo 91. Ebenales - Эбеноцветные

Familia 152. Ebenaceae Vent. - Эбеновые

Genus 775. Diospyros L. - Хурма

3083. ★*D. lotus* L. - Х. кавказская = IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Армено-Иран.); Da(Phm); [R.] <Pa>

Ordo 92. Primulales - Первоцветные

Familia 153. Primulaceae Vent. - Примуловые

Genus 776. Primula L. - Первоцвет

3084. ★*P. juliae* Kusun. - П. Юлии = V(АС): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb,Do(НК:ephhd); [R.] <Esub>

3085. *P. acaulis* Mill. (*P. vulgaris* Huds.) - П. бесстебельный = III(КР,Х); IV(СЗЗ): (Европ.); S(НК:ephhd); [Pl.] <Po>

3086. *P. sibthorpii* Hoffm. - П. Сибторпа = IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Вост.средиз.); Pa,S(НК:ephhd); [Sp.] <Po>

3087. *P. woronowii* Losinsk. - П. Воронова = III(ТС,ЧО,Л, УН,Ч); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S(НК:ephhd); [Sp.] <Po>

3088. *P. leskeniensis* G.Koss et Smoljjan. - П. лескенский = III(Б): (Кавк.: Эукавк.); S(НК:ephhd); [R.] <Es> <Po> l.c. Малая Кабарда, отроги Сунженского хребта

3089. *P. komarovii* Losinsk. - П. Комарова = III(КР,Х); IV(СЗЗ): (Кр.-Новоросс.); S(НК:ephhd); [Pl.] <Po>

3090. *P. amoena* Bieb. - П. приятный = III(ВЛ,ТЗ,П - Бештау,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Pb,Do(НК:ephhd); [Rs.] <Po> l.c. Бештау

3091. *P. kuznetzovii* Fed. - П. Кузнецова = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК:ephhd); [Sp.] <Po>

3092. ★*P. renifolia* Volgun. - П. почколистный = III(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК:ephhd); [R.] <Es> <Po> l.c. Теберда

3093. *P. meyeri* Rupr. - П. Мейера = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК:ephhd); [Pl.] <Po>

3094. *P. macrocalyx* Bunge - П. крупночашечковый = I(АК,КЕ,Тем,Прик,ТБ,НК,М); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Сиб.); S,Pa(НК:ephhd); [Pl.] <Pm;Po>

3095. *P. ruprechtii* Kusun. - П. Рупрехта = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.] <Po>

3096. *P. pseudoelatior* Kusun. - П. ложновысокий = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК:ephhd); [R.] <Po>

3097. *P. cordifolia* Rupr. - П. сердцелистный = III(ВК); V(ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb,Do(НК:ephhd); [Pl.] <Po>

3098. *P. algida* Adams (*P. ossetica* Kusun.) - П. холодный = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb,Pc(НК:ephhd); [Pl.] <Po>

3099. *P. farinifolia* Rupr. (*P. zeylamica* Charadze et Kapell.) - П. мучнистый = III(BC); V(ЦД, AC): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Do(НК:ephd); [Sp.] <Ee> <Po>

3100. ★*P. darialica* Rupr. - П. дарьяльский = III(OC, BC): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Do(НК:ephd); [Sp.] <Esub> I.c. Дарьяльское ущелье <Po>

3101. *P. auriculata* Lam. - П. ушковатый = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС, Ч); IV(TA); V(ЦД, AC): (Армено-Иран.); Pb, Pc(НК:ephd); [Sp.] <Po>

3102. *P. luteola* Rupr. - П. жёлтенький = III(BC); V(ЦД, AC): (Кавк.: Эукавк.); Pc, Aa(НК:ephd); [Sp.] <Es> <Po>

3103. *P. bayernii* Rupr. - П. Байерна = III(ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС): (Кавк.: Эукавк.); Pc, Do(НК:ephd); [Sp.] <Ee> <Po>

Genus 777. Sredinskya (Stein) Fed. - Срединския

3104. ★*S. grandis* (Trautv.) Fed. (*Primula grandis* Trautv.) - С. большая = III(ВЛ, ЦЭ, Б); IV(TA; Зернов, 2006): (Кавк.: Эукавк.); Pc, Aa(НК:ephd); [R.] <Po>

Genus 778. Androsace L. - Проломник

3105. *A. barbulate* Ovcz. (*A. villosa auct.*) - П. бородчатый = III(ВЛ, ТЗ, Кисл, ЦЭ, Каб, ЧО, ВК); IV(TA); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК:ephd); [Pl.] <Po>

3106. *A. lehmanniana* Spreng. (*A. chamaejasme* Wulfen ex Host) - П. Лемана = III(ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС): V(ЦД, AC): (Кавк.: Общекавк.); Pc, Do(НК:ephd); [Sp.]

3107. *A. maxima* L. (*A. turczaninonii* Freyn.) - П. большой = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST, Rb(T:eph); [Pl.]

3108. *A. albana* Stev. - П. азербайджанский = III(ВЛ, ТЗ, Б, ОС, ВС); IV(TA); V(ЦД, AC): (Кавк.: Общекавк.); Pc, Do(НК:pb); [Sp.]

3109. *A. raddeana* Somm. et Levier - П. Радде = III(ЦЭ, ОС, ВС); V(AC): (Кавк.: Общекавк.); Pc, Do(НК:pb); [Sp.]

3110. *A. septentrionalis* L. - П. северный = III(ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); V(AC): (Голаркт.); Pb, Pc, Do(T:eph); [Pl.]

3111. *A. elongata* L. - П. удлинённый = I(AE, AK); III(Ст, КР); IV(H); V(Касп): (Палеаркт.); Pa(T:eph); [Pl.]

Genus 779. Samolus L. - Северница

3112. *S. valerandi* L. - С. Валеранда = I(AK, Тем, НК); II(ВП); III(Ст, СК, П); IV(H); V(Касп): (Плурирег.); Aa(НК); [R.]

Genus 780. Lysimachia L. - Вербейник

3113. *L. nummularia* L. - В. монетный = I(Тем, КЕ); III(Ст - Ставрополь, КР, Х, ВЛ, Л, Ч); IV(H): (Европ.); S(НК); [R.] <Rg; Pm; Po>

3114. *L. verticillaris* Spreng. - В. мутовчатый = I(Тем, СК); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субкавк*.); Pa(НК); [Pl.] <Po>

3115. *L. vulgaris* L. - В. обыкновенный = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S, Aa(НК); [Sp.]

3116. *L. dubia* Soland. - В. сомнительный = I(AK - Кубань, М); II(Кизл); III(Куб, КР, ЧО, Ч); IV(СЗЗ); V(БН, Касп): (Субкавк*.); Aa(НК:pb); [Sp.]

Genus 781. Naumburgia Moench - Наумбургия <GD>

3117. *N. thyrsoflora* (L.) Reichenb. (*Lysimachia thyrsoflora* L.) - Н. кистецветная = III(Л - Черек Балкарский: **Меницкий, Конечная, 2012**): (Голаркт.); Ab(K); [Rs.] <Rg>

Genus 782. Glaux L. - Млечник

3118. *G. maritima* L. - М. приморский = I(НД,АЕ); III(Ч); V(Касп): (Голаркт.); Аа,Дс(НК); [R.]

Genus 783. Anagallis L. - Очный цвет

3119. *A. arvensis* L. - О.ц. полевой = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,М); III(Ст,Куб,ЧК,КР,СКТ,Э,Л); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [R.] <Pm>

3120. *A. foemina* Vill. (*A. caerulea* Schreb.) - О.ц. женский = I(ЗП); III(Ст,СК,П,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [R.]

Genus 784. Cyclamen L. - Дряква

3121. ★*C. coum* Mill. - Д. косская = III(МА - Майкоп,ЧК,КР,Х); IV(СЗЗ): (Эвксин.); S(K:ephd); [Sp.] <Pm;Po>

Ordo 93. Plumbaginales - Свинчаткоцветные

Familia 154. Limoniaceae Ser. - Кермековые

Genus 785. Acantholimon Boiss. - Акантолимон

3122. *A. glumaceum* (Jaub. et Spach) Boiss. - А. плёнчатый = III(Б): (Армено-Иран.); Da,Do(Ch:ppul); [R.] <Rx>

3123. *A. schemachense* Grossh. - А. шемахинский = V(Касп - Самур): (Субкавказ*.); Dd(Ch:ppul); [R.]

Genus 786. Goniolimon Boiss. - Углостебельник

3124. *G. rubellum* (S.G.Gmel.) Klok. - У. красноватый = I(ЗПМ); III([ТБ - Томузловка, СК - Моздок]: **Цвелёв, 2012**): (Субтуран*.); Dc(НК); [R.]

3125. *G. besserianum* (Schult.) Kusn. - У. Бессера = I(ЗПМ,АЕ,МД,АИ,НК,М); II(КН): (Понтич.); Dc(НК); [Rs.] <Rx>

3126. *G. tataricum* (L.) Boiss. - У. татарский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(Дар): (Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.] <Po>

3127. *G. tauricum* Klok. - У. крымский = ([III(Кисл - окр. Кисловодска); IV(Н)]: **Цвелёв, 2012**): (Понтич.); Dc(НК); [R.] <Rx>

3128. *G. caucasicum* Klok. - У. кавказский = ([II(ВП); V(Касп)]: **Цвелёв, 2012**): (Кавк.: Эукавк.); Dc(НК); [R.] <Ee> l.c. а. Башлы

Genus 787. Limonium Mill. - Кермек

3129. *L. gmelinii* (Willd.) O.Kuntze - К. Гмелина = I(ЗПМ,АЕ,[Тем - Кубань]: **Цвелёв, 2012**); II(КН - Ачикулак: **Цвелёв, 2012**) (Субтуран*.); Dc(НК); [Sp.] <Po;Pm;Pmel>

3130. *L. tomentellum* (Boiss.) O.Kuntze - К. опушённый = I(НД,МД,АЕ); II([ВП: **Гроссгейм, 1967**]): (Понтич.); Dc,Аа(НК); [Sp.] <Pmel>

3131. *L. scorarium* (Pall. ex Willd.) Stankov (*L. meyeri* (Boiss.) O.Kuntze) - К. венечный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Субтуран*.); Dc(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Po>

3132. *L. platyphyllum* Lincz. (*L. latifolium* (Smith) O.Kuntze) - К. плосколистный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Понтич.); ST(НК); [Pl.] l.c. Азов <Pmel;Po>

3133. *L. sareptanum* (A.Beck.) Gams - К. сарептский = I(ЗПМ,АЕ,[Т: Цвелёв, 2012],[МД: Танфильев, Кононов, 1987]): (Субтуран*.); ST,Дс(НК); [Pl.] <Pmel;Po>

3134. *L. caspium* (Willd.) Gams - К. каспийский = I(ЗПМ,АК,КЕ,Тем,Т,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК); IV(Н); V(Касп): (Субтуран*.); Дс(НК); [Sp.] <Pmel;Po>

3135. *L. kimmericum* (Lipsky) Klok. (*L. danubiale* Klok.) - К. киммерийский = (I(Т); IV(Н)): Цвелёв, 2012): (Кр.-Новоросс.); Дс(НК); [R.] l.c. Анапа

3136. *L. suffruticosum* (L.) O.Kuntze - К. полукустарниковый = I(АЕ,МД): (Субтуран*.); Дс(Ch:sf); [R.] <Pmel>

Genus 788. Limoniopsis Lincz. - Кермековидка <GD>

3137. ★*L. owerinii* (Boiss.) Lincz. - К. Оверина = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da,Dd(НК); [Sp.] <Es> l.c. окр. с. Чирката

Genus 789. Psilliosachys (Jaub. et Spach) Nevsky - Подорожничкоцветник

3138. *P. spicata* (Willd.) Nevski (*Limonium spicatum* auct.) - П. колосистый = I(НК); II(ВП); V(Касп): (Ирано-Туран.); Дс(Т); [R.]

Ordo 94. Oleales - Маслиноцветные

Familia 155. Oleaceae Hoffmgg. et Link - Маслиновые

Genus 790. Fraxinus L. - Ясень

3139. *F. parvifolia* Lam. - Я. коротколистный = IV(Н: Гроссгейм, 1967): (Средиземн.); S(Phm); [R.]

3140. *F. oxycarpa* Willd. - Я. остроплодный = III(КР,ВЛ); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Вост.средиз.); S(Phm); [R.]

3141. *F. excelsior* L. - Я. обыкновенный = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Европ.); S(Phmg); [Pl.] <Pm>

3142. *F. coriariifolia* Scheele - Я. сумахолистный = V(БН,Касп): (Вост.средиз.); S(Phms); [R.]

Genus 791. Ligustrum L. - Бирючина

3143. *L. vulgare* L. - Б. обыкновенная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Европ.); S(Phn); [Pl.] <Po;Pm;Pmel>

Genus 792. Jasminum L. - Жасмин

3144. *J. fruticans* L. - Ж. кустарниковый = IV(Н); V(Касп,ЦД): (Средиземн.); Da(Phn); [R.]

Ordo 95. Gentianales - Горечавкоцветные

Familia 156. Gentianaceae Juss. - Горечавковые

Genus 793. Centaurium Hill - Золототысячник

3145. *C. pulchellum* (Sw.) Druce - З. красивый = III([Ст: Танфильев, Кононов, 1987],Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Аа(Т); [Sp.] <Pm>

3146. *C. meyeri* (Bunge) Druce - З. Мейера = I(АК,М); II(КН); III(ЛН,СК,П,Каб,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); Аа(Т); [Sp.]

3147. *C. tenuiflorum* (Hoffmngg. et Link) Fritsch - З. тонкоцветковый = IV(Н - Новороссийск,ТА - Сочи); V(Касп - Махачкала): (Средиземн.); Ра,Аа(Т); [R.]

3148. *C. minus* Moench (*C. erythraea Rafn*, *C. umbellatum Gilib.*) - З. малый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э, Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Европ.); Ра(НК:pb); [Pl.] <Pm>

3149. *C. littorale* (D.Turner) Gilmour (*C. vulgare Rafn*) - З. береговой = III(ЛН): (Европ.); Ра(Т); [Rs.] <Rg>

3150. *C. spicatum* (L.) Fritsch - З. колосовидный = I(МД - Калаус); II(КН); III(КР); IV(Н); V(БН,Касп): (Общедр.средиз.); Дс(Т); [R.]

Genus 794. Blackstonia Huds. - Блэкстония

3151. *B. perfoliata* (L.) Huds. - Б. пронзённая = III(Х: [Портениер, 1998](#)); IV(Н - Туапсе): (Средиземн.); Да,Аа(Т); [R.]

Genus 795. Gentiana L. - Горечавка

3152. *G. schistocalyx* (С.Коч) С.Коч - Г. раздельночашечковая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Pl.]

3153. *G. pneumonanthe* L. - Г. лёгочная = III(МА,Х): (Палеаркт.); S(НК); [Rs.]

3154. ★*G. paradoxa* Albov - Г. странная = III(ВЛ); IV(ТА - Красная поляна): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub>

3155. *G. kolakovskiyi* Doluch. - Г. Колаковского = III(ЦЭ,Б): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Rs.]

3156. ★*G. lagodechiana* (Kusn.) Grossh. - Г. лагодехская = V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub>

3157. *G. grossheimii* Doluch. - Г. Гроссгейма = III(Ч,ВС); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Да(НК): [Sp.] <Ee> l.c. окр. с. Гуниб

3158. *G. septemfida* Pall. - Г. семираздельная = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]

3159. *G. overinii* (Kusn.) Grossh. - Г. Оверина = V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. с. Данух

3160. *G. cruciata* L. - Г. крестообразная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Ра(НК); [Sp.] <Pm>

3161. *G. djimilensis* С.Коч - Г. джимильская = III(Х,ВЛ,ТЗ, Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(Касп,ЦД,АС): (Субкавк*.); Рс,Do(НК); [Pl.]

3162. *G. aquatica* L. - Г. водная = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pb,Рс(Т); [Sp.]

3163. *G. angulosa* Vieb. - Г. угловатая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(НК); [Pl.]

3164. *G. oschtenica* (Kusn.) Woronow - Г. оштенская = III(ВЛ,ТЗ,Кисл - Кисловодск,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Dach(НК); [Rs.] <Esub> l.c. г. Оштен

3165. *G. nivalis* L. - Г. снежная = III(ЦЭ,Б,ОС): (Голаркт.); Рс(НК); [Sp.]

Genus 796. Gentianopsis Ma - Горечавочник

3166. *G. blepharophora* (Bordz.) Galushko (*Gentiana blepharophora Bordz.*) - Г. ресниченосный = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); ST(НК:pb); [R.]

3167. *G. barbata* (Froel.) Ma (*G. barbata* Froel.) - Г. бородатый = III(ЦЭ,Б,ОС): (Палеаркт.); Pb,Рс(НК:pb); [R.]

Genus 797. *Gentianella* Moench - Горечавочка

3168. *G. poretzkyi* Tzvel. - Г. Порецкого = [III(ОС,ВС); V(АС)]: Цвелёв, 1993): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(НК:pb); [R.] <Ее>

3169. *G. biebersteinii* (Bunge) Holub (*Gentiana biebersteinii* Bunge) - Г. Биберштейна = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(НК:pb); [Sp.] <Esub> l.c. Минеральные Воды (г. Змейка)

3170. *G. lingulata* (Agardh) Pritchard (*G. lingulata* Pritchard) - Г. язычковая = V(ЦД,Касп): (Палеаркт.); Pa(НК:pb); [R.]

3171. *G. amarella* (L.) Boern. (*Gentianella axillaries* (F.W.Schmidt) A. et D.Love; *Gentiana axillaries* (F.W.Schmidt) Reichenb) - Г. пазушная = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС): (Евро-Сиб.); Pb(НК:pb); [R.]

3172. *G. caucasea* (Lodd. ex Sims.) Holub (*G. caucasica* Lodd., *G. marcowiczii* Kusn.) - Г. кавказская = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(НК:pb); [Sp.]

3173. *G. lipskyi* (Kusn.) Holub (*G. lipskyi* Kusn.) - Г. Липского = III(Б): (Кавк.: Эукавк.); Рс(НК:pb); [R.] <Es> l.c. Хуламовецк

3174. *G. umbellata* (Bieb.) Holub (*G. umbellata* Bieb.) - Г. зонтичная = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА: Портениер, Солодько, 2002); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb,Рс(НК:pb); [R.]

3175. *G. promethea* (Juz.) Holub (*Gentiana promethea* Juz.) - Г. Прометея = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb,Рс(НК); [Sp.]

Genus 798. *Comastoma* (Wettst.) Toyokuni - Комастома

3176. *C. dechy anum* (Somm. et Levier) Holub (*Gentiana dechyana* Somm. et Levier) - К. Деши = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(Т); [Sp.] <Esub> l.c. Эльбрус

Genus 799. *Lomatogonium* A.Br. - Ломатогониум

3177. *L. carinthiacum* (Wulf.) Reichenb. - Л. каринтийский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb,Аа(Т); [Pl.]

Genus 800. *Swertia* L. - Сверция

3178. *S. iberica* Fisch. et С.А.Меу. - С. грузинская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.]

Familia 157. *Menyanthaceae* Dumort. - Вахтовые

Genus 801. *Menyanthes* L. - Вахта

3179. *M. trifoliata* L. - В. трёхлистная = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Голаркт.); Pb,Аб(НК); [R.]

Genus 802. *Nymphoides* Hill - Болотноцветник

3180. *N. peltata* (S.G.Gmel.) O.Kuntze (*Menyanthes nymphoides* L.) - Б. щитовидный = I(НД,АК - Кубань,Тем); II(Кизл); III(Куб): (Палеаркт.); Ас(К); [Sp.]

Familia 158. Aprocynaceae Juss. - Кутровые

Genus 803. Vinca L. - Барвинок

3181. *V. minor* L. - Б. малый = III(КР,Х - пер. Шаумянский); IV(СЗЗ): (Европ.); S,Pa(Ch:lv); [Sp.]

3182. *V. major* L. (*V. pubescens* D'Urv.) - Б. большой = IV(СЗЗ): (Европ.); S,Pa(Ch:lv); [R.]

3183. *V. herbacea* Waldst. et Kit. - Б. травянистый = I(ЗП,Прик,ТБ,НК,М); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субпонт*.); Pa(НК); [Pl.] <Pt;Po>

Genus 804. Trachomitum Woodson - Кендырь

3184. *T. sarmatiense* Woodson - К. сарматский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,П,Кисл,СКТ); IV(Н); V(БН,Касп): (Понт.-Южносиб.); Aa(НК); [Sp.]

Familia 159. Asclepiadaceae R.Br. - Ластовневые

Genus 805. Asclepias L. - Ваточник

3185. *A. siriaca* L. - В. сирийский = III(Ст - Ставрополь): (Адвент. [Передняя Азия]); Ra,Rb(НК); [R.]

Genus 806. Periploca L. - Обвойник

3186. *P. graeca* L. - О. греческий = I(АК,КЕ - Кубань); II(ВП); III(Куб,ЧО); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Зап.др.средиз.); S(Ch:ll); [R.] <Pm;Po>

Genus 807. Vincetoxicum N.M.Wolf - Ластовень

3187. *V. albobianum* (Kusn.) Pobed. (*Alexitoxicum albobianum* (Kusn.) Pobed.) - Л. Альбова = III([Ст: Танфильев, Кононов, 1987],ВЛ,П): (Эвксин.); Da(НК); [R.] <Rx>

3188. *V. stauropolitanum* Pobed. (*A. stauropolitanum* (Pobed.) Pobed.) - Л. ставропольский = I(Прик - г.Брык); III(Ст - г. Стрижамент): (Кавк.: Предкавк.); ST(НК); [Rs.] <Es> l.c. г.Брык

3189. *V. scandens* Somm. et Levier (*A. csandens* (Somm. et Levier) Pobed.) - Л. лазящий = I(АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЧК,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавк*.); S(НК:lh); [Pl.] <Pmel>

3190. *V. rehmannii* Boiss. (*A. rehmannii* (Boiss.) Pobed.) - Л. Реманна = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); S(НК:lh); [Sp.] l.c. Владикавказ <Pmel>

3191. *V. hircynica* Medik. (*V. laxum* (Bartl.) Gren. et Gord.; *V. officinale* Moench, *V. cretaceum* (Pobed.) Vassjul., *A. laxum* (Bartl.) Pobed.) - Л. ласточкин = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Европ.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel>

3192. *V. funebre* Boiss. et Kotschy (*A. funebre* (Boiss. et Kotschy) Pobed.) - Л. погребальный = III(Ст,ЧК,ТЗ,Э,ОС,ВС); V(Дар): (Субкавк*.); Dd(НК); [R.] <Pmel>

3193. *V. schmalhauseni* (Kusn.) Stank. (*A. schmalhauseni* (Kusn.) Pobed.) - Л. Шмальгаузена = III(Ст,Э,Тер); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel> <Ee> l.c. Предкавказье

Genus 808. Cynanchum L. - Цинанхум

3194. *C. acutum* L. - Ц. острый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субсредиз*.); Db,Rb(НК:lh); [Sp.]

Ordo 96. Convolvulales - Вьюнковоцветные

Familia 160. Convolvulaceae Juss. - Вьюнковые

Genus 809. Convolvulus L. - Вьюнок

3195. *C. erinaceus* Ledeb. - В. жёстковолосистый = II(Кизл - о. Чечень: Теймуров и др., 2013): (Туранск.); Db(Ch); [R.] l.n. <Rx>
3196. *C. cantabrica* L. - В. кантабрийский = I(АК,КЕ); II(Кизл); III(ЛН,ЧК,КР,Э,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦЭ): (Зап.др.средиз.); Da(НК); [R.]
3197. *C. ruprechtii* Boiss. - В. Рупрехта = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee>
3198. *C. lineatus* L. - В. узколиственный = II(КН); III(Ст,ЛН,ЧК,СКТ, Э,Б,ОС); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); ST, Da(НК); [Sp.] <Pm>
3199. *C. tauricus* (Bornm.) Juz. - В. крымский = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); ST, Da(НК); [R.] <Rx>
3200. *C. tshegemensis* Galushko - В. чегемский = III(ЦЭ - Чегем, аридные котловины): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es>
3201. *C. persicus* L. - В. персидский = II(Кизл); V(Касп): (Ирано-Туран.); Db(НК); [Pl.] <Pm>
3202. *C. betonicifolius* Mill. (*C. hirsutus* Bieb.) - В. буквицелиственный = I(Т); II(Кизл); III(МА): (Средиземн.); Rb(НК:lh); [R.]
3203. *C. arvensis* L. (*C. fischeranus* V.Petr.) - В. полевой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плюрирег.); ST, Ra, Rb(НК:lh); [Pl.] <Pm>

Genus 810. Calystegia R.Br. - Повой

3204. *C. sepium* (L.) R.Br. - П. заборный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плюрирег.); S, Aa(НК:lh); [Sp.] <Pm>
3205. *C. silvatica* (Kit.) Griseb. (*Convolvulus silvaticus* Kit.; *Calystegia sylvestris* (Willd.) Roem. et Schult.) - П. лесной = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Зап.др.средиз.); S, Aa(НК:lh); [Sp.]
3206. ★*C. soldanella* (L.) R.Br. - П. сольданелловый = IV(СЗЗ); (Плюрирег.); Db(НК); [Sp.]

Familia 161. Cuscutaceae Dumort. - Повиликовые

Genus 811. Cuscuta L. - Повилика

3207. *C. epithymum* (L.) L. (*C. trifolii* Bab.) - П. тимьяновая = I(НД,ЗПМ,АЕ); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); ST(Т:par); [Pl.]
3208. *C. approximata* Bab. (*C. cupulata* Engelm.) - П. сближенная = I(АЕ,КЕ,Т); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); ST(Т:par); [Pl.]
3209. *C. europaea* L. - П. европейская = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); II(ВП); III(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Ra(Т:par); [Sp.] <Pm>
3210. *C. epilinum* Weihe - П. льняная = III(Куб,Ст,П): (Плюрирег.); Ra(Т:par); [R.]

3211. *C. tinei* Insenga (*C. australis* R.Br.; *C. brevifolia* Vis.) - П. Тина = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); II(Кизл); III(Куб,КР); IV(Н): (Общедр.средиз.); Ra(T:par); [R.]

3212. *C. campestris* Yunck. - П. полевая = I(АК); IV(СЗЗ); V(Кизл): (Адвент. [Сев. Америка]); Ra(T:par); [R.]

3213. *C. monogyna* Vahl. - П. одностолбиковая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Кисл,Л,ТС,ЧО); IV(Н); V(БН,Касп): (Общедр.средиз.); Ra(T:par); [Sp.]

3214. *C. lupuliformis* Krock. - П. хмелевидная = III(П): (Вост.средиз.); Ra(T:par); [R.]

Ordo 97. Polemoniales - Синюхоцветные

Familia 162. Polemoniaceae Juss. - Синюховые

Genus 812. Polemonium L. - Синюха

3215. *P. caucasicum* N.Busch (*P. coeruleum* non L.) - С. кавказская = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [Sp.] <Pm>

Familia 163. Hydrophyllaceae R.Br. - Гидрофилиевые

Genus 813. Phacelia Juss. - Фацелия

3216. *Ph. tanacetifolia* Benth. - Ф. пижмолистная = III([МА - Майкоп: Гроссгейм, 1967],ЧК,КР,П,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Адвент. [Сев. Америка]); Ra,Rb(T); [R.]

Ordo 98. Boraginales - Бурачничкоцветные

Familia 164. Heliotropaceae R.Br. - Гелиотроповые

Genus 814. Argusia Boehm. - Аргусия

3217. *A. sibirica* (L.) Dandy (*Tournefortia sibirica* L.) - А. сибирская = I(ЗП,МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(СК,ОС,Ч); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Db(НК); [Sp.]

Genus 815. Beruniella Zak. et Nabiev - Беруниелла

3218. *B. micrantha* (Pall.) Zak. et Nabiev (*Heliotropium micranthos* (Pall.) Bunge) - Б. мелкоцветковая = II(КН): (Понтич.); ST(T); [R.]

Genus 816. Heliotropium L. - Гелиотроп

3219. *H. lasiocarpum* Fisch. et C.A. Mey. - Г. опушённоплодный = II(Кизл): (Ирано-Туран.); Rb(T); [R.] <Rx>

3220. *H. ellipticum* Ledeb. - Г. эллиптический = I(АЕ,Тем,Т,М); II(ВП); III(КР,СК,ОС); IV(Н); V(БН,Касп): (Вост.средиз.); ST,Rb(T); [R.]

3221. *H. europaeum* L. - Г. европейский = I(ЗП,Прик,ТБ,НК,М); II(Кизл); III(Ст,СК,П,Каб,ТС); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Субпонт*.); Rb(T); [Sp.]

3222. *H. styligerum* Trautv. - Г. столбиковый = III(ОС,ВС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); ST,Do(T); [Sp.] <Ее> l.c. с. Ахты

3223. *H. suaveolens* Vieb. - Г. душистый = I(ЗПМ,Т,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,ТС); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Субпонт*.); ST,Dc(T); [Sp.]

Familia 165. Boraginaceae Juss. - Бурачниковые

Genus 817. Omphalodes Hill - Пупочник

3224. *O. scorpioides* (Haenke) Schrank - П. ползучий = III(Ст): (Европ.); S(НК:pb); [Rs.] <Rg>

3225. *O. cappadocica* (Willd.) DC. (*O. caucasica* Brand.) - П. каппадокийский = IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S, Аа(НК); [R.]

3226. *O. kusnetzovii* Kolak. - П. Кузнецова = IV(ТА - ущ. Мзымты: Тимухин, 2012): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>

3227. *O. lojkae* Somm. et Levier - П. Лойки = III(ЧК, ВЛ, ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pс, Do(НК); [R.] <Esub> l.c. верх. р. Кубань

3228. *O. rupestris* Rupr. ex Boiss. - П. скальный = III(ЦЭ, УН, Ч); V(АС - Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Балта

Genus 818. Cynoglossum L. - Чернокорень

3229. *C. officinale* L. - Ч. лекарственный = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

3230. *C. holosericeum* Stev. - Ч. шелковистый = V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb, Pс, Do(НК); [R.]

3231. *C. germanicum* Jacq. (*C. montanum* L.) - Ч. германский = III(Ст, Куб, X, ВЛ); IV(ТА); V(Касп): (Европ.); S(НК:pb); [Sp.]

3232. *C. creticum* Mill. (*C. pictum* Soland.) - Ч. критский = I(Тем, Т); III(Куб); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр. средиз.); Rb(НК); [R.]

Genus 819. Solenanthus Ledeb. - Трубкацвет

3233. *S. biebersteinii* DC. - Т. Биберштейна = I(Т, Прик); III([Ст - Стрижамент <Rg>], КР, X); IV(СЗЗ): (Эвксин.); S(НК); [Rs.]

3234. *S. petiolaris* DC. (*S. circinnatus* Ledeb.) - Т. черешковый = V(Касп): (Ирано-Туран.); S(НК); [R.]

Genus 820. Paracarium (DC.) Boiss. - Паракариум

3235. *P. laxiflorum* Trautv. (*Mattiastrum laxiflorum* (Trautv.) Czer.) - П. рыхлоцветковый = V(АС - Самур, с. Лучек: Теймуров, 1998): (Ирано-Туран.); Da(НК); [Rs.]

Genus 821. Rindera Pall. - Риндера

3236. *R. tetraspis* Pall. - Р. четырёхщитковая = I(ЗПМ, АЕ); III(СК, П, ТС, ЧО); IV(Н); V(Касп - хр. Куруртбаш: Теймуров и др., 2013): (Субтуран*.); ST(НК:eph); [Rs.]

Genus 822. Lappula Moench - Липучка

3237. *L. spinocarpos* (Forssk.) Aschers. - Л. колючеплодная = V(БН, [ЦД - Ахты: Муртазалиев, 2009]): (Субсредиз*.); ST, Rb(Т); [R.]

3238. *L. consanguinea* (Fisch. et C.A. Mey.) Guerke - Л. кровавая = II(Кизл); III(ЧО, Ч); V(Даг): (Средиземн.); Rb(Т); [Sp.]

3239. *L. squarrosa* (Retz.) Dumort. (*L. myosotis* Moench; *L. echinata* Gilib. *nom. invalid.*) - Л. растопыренная = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ): (Палеаркт.); ST, Rb(Т); [Pl.]

3240. *L. heteracantha* (Ledeb.) Vorb. - Л. разношипая = I(НД, АЕ, АК); II(ВП); III(Ст, СК, П, Кисл, ЦЭ, ТС, Б, ОС.); V(Касп, ЦД): (Понт.-Южносиб.); ST(Т); [R.]

3241. *L. barbata* (Bieb.) Guerke - Л. бородчатая = I(Тем,Т,КЕ); III(ВЛ,ТЗ,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Ирано-Туран.); ST,Rb(T); [Pl.]

3242. *L. filiformis* (Godet) Kusn. - Л. нитевидная = III(Кисл); V(Касп): (Кавк.: Эукавк.); ST(T); [R.] <Ee> l.c. окр. Махачкалы

3243. *L. sinaica* (DC.) Aschers. et Schweinf. - Л. синаяская = V(Касп - Махачкала: Муртазалиев, 2009): (Ирано-Туран.); Da(T); [R.]

3244. *L. patula* (Lehm.) Menyharth - Л. пониклая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Касп): (Общедр.средиз.); Rb(T); [Sp.]

3245. *L. marginata* (Lehm.) Guerke - Л. окаймлённая = I(М); II(ВП); V(БН,Касп): (Туранск.); ST(T); [R.]

Genus 823. *Eritrichium* Schrad. ex Gaudin - Незабудочник

3246. *E. caucasicum* (Albov) Grossh. - Н. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. г. Казбек

Genus 824. *Asperugo* L. - Асперуга

3247. *A. procumbens* L. - А. простёртая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]

Genus 825. *Symphytum* L. - Окопник

3248. *S. officinale* L. - О. лекарственный = I(НД,ЗПМ,АЕ,Прик,ТБ,НК,М); III(Куб,СК - Кума,П); IV(Н): (Европ.); Аа(НК); [R.] <Pm;Pmel>

3249. *S. caucasicum* Vieb. - О. кавказский = I(М); II(ВП); III(Ст,П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Sp.] <Pmel>

3250. *S. asperum* Lerech. - О. шершавый = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pmel;Pp>

3251. *S. podcumicum* Frolov - О. подкумский = III([П,Кисл]: Фролов, 1985): (Кавк.: Предкавк.); Аа(НК); [R.] <Es;Pmel> l.c. ст. Подкумок

3252. *S. tauricum* Willd. - О. крымский = I(Тем,Т); III(Ст,Куб,ЧК,КР,П,Кисл); IV(СЗЗ): (Понтич.); S,Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>

3253. *S. grandiflorum* DC. - О. крупноцветковый = III(Куб,ЧК,ВЛ); IV(СЗЗ): (Эвксин.); S(НК); [R.] <Pmel> <Rg>

3254. *S. tanaicense* Stev. - О. донской = I(НД): (Европ.); Аа(НК); [Sp.] <Pmel>

Genus 826. *Borago* L. - Огуречная трава

3255. *B. officinalis* L. - О.т. лекарственная = I(НД); III(Ст,МА,СК); IV(СЗЗ): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(НК:pb); [R.] <Pa;Pmel;Pm>

Genus 827. *Trachystemon* D.Don. - Опушённотычиночник <GD>

3256. *T. orientalis* (L.) G.Don fil. - О. восточный = III(МА,КР,Х,ЧК,ВЛ); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Sp.]

Genus 828. *Anchusa* L. - Воловик

3257. *A. officinalis* L. - В. лекарственный = I(АК); III(Ст,СК): (Европ.); Ra,Rb(НК:pb); [Sp.]

3258. *A. procera* Bess. - В. рослый = I(НД,АЕ,АК): (Понтич.); Db(НК:pb); [R.]

3259. *A. gmelinii* Ledeb. - В. Гмелина = I(Тем,КЕ): (Понтич.); Db(НК:pb); [R.]

3260. *A. ochroleuca* Bieb. - В. бледно-жёлтый = I(АК,КЕ,Тем,Т, МД,АИ,НК); II(КН); IV(Н): (Понтич.); Db(НК:pb); [Sp.]

3261. *A. azurea* Mill. (*A. italica* Retz.) - В. лазоревый = I(ЗП); II(Кизл); III(Ст,КР,СК,ЧО); IV(Н); V(БН,Касп): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(НК); [Sp.] <Pm>

3262. *A. thessala* Boiss. et Sprun. - В. фессальский = I(Т); IV(Н): (Средиземн.); Da,Db(Т); [R.]

3263. *A. porovii* (Gusul.) Dobrocz. - В. Попова = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Понтич.); Db(НК); [Pl.]

Genus 829. *Brunnera* Stev. - Бруннера

3264. *B. macrophylla* (Bieb.) Johnst. - Б. крупнолистная = III(ВЛ,ТЗ, ОС,Ч); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Sp.]

Genus 830. *Lycopsis* L. - Кривоцвет

3265. *L. orientalis* L. (*L. arvensis* (non L.) Ledeb., *Anchusa arvensis* (L.) Bieb.) - К. восточный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Общедр.средиз.); Pa,Ra,Rb(Т); [Pl.]

Genus 831. *Trigonocaryum* Trautv. - Трёхгранноплодник <GD>

3266. *T. involucratum* (Stev.) Kusn. - Т. окутанный = III(ЦЭ,ОС); V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(Т); [Sp.] <Esub>

Genus 832. *Nonea* Medik. - Ноня

3267. *N. lutea* (Desv.) DC. - Н. жёлтая = I(ЦП); II(ВП); III(Ст,ЛН,СКТ,Э); IV(Н); V(Дар): (Общедр.средиз.); Db,Rb(Т); [Pl.]

3268. *N. setosa* (Lehm.) Roem. et Schult. - Н. щетинистая = I(Прик,ТБ,НК); II(КН); III(Ст,П,Кисл,Каб,ЧО); V(БН,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); ST,Dd(Т); [Sp.]

3269. *N. flavescens* (C.A.Mey.) Fisch. et C.A.Mey. - Н. желтеющая = V(Касп): (Ирано-Туран.); Db,Rb(Т); [R.]

3270. *N. alpestris* (Stev.) G.Don fil. - Н. предальпийская = V(Касп, ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК:pb); [Sp.] <Esub>

3271. *N. rosea* (Bieb.) Link - Н. розовая = I(АК,КЕ); II(ВП); III(Ст,СК,ТС,ЧО); V(БН,Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); ST,Rb(Т); [Sp.] l.c. Кизляра

3272. *N. versicolor* (Stev.) Sweet - Н. разноцветная = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Do(Т); [Pl.]

3273. *N. caspica* (Willd.) G.Don fil. - Н. каспийская = II(ВП); V(Касп): (Ирано-Туран.); ST(Т); [R.]

3274. *N. rossica* Stev. (*N. pulla* auct.) - Н. русская = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,Т, МД,АИ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,СК): (Понт.-Южносиб.); ST,Rb(НК); [Sp.]

3275. *N. taurica* Ledeb. - Н. крымская = I(Т); III(КР); IV(Н): (Понтич.); ST(НК); [R.]

3276. *N. daghestanica* Kusn. - Н. дагестанская = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. окр. с. Ахты

3277. *N. intermedia* Ledeb. - Н. промежуточная = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]

3278. *N. decurrens* (C.A.Mey.) G. Don fil. - Н. низбегающая = V(Касп): (Армено-Иран.); Pa(НК); [R.] <Rg>

Genus 833. *Pulmonaria* L. - Медуница

3279. *P. mollis* Wulf. ex Hornem. (*P. mollissima* A.Kerner) - М. мягкая = III(Ст,Куб,ЧК,КР,Х,ТЗ,П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ): (Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

Genus 834. *Myosotis* L. - Незабудка

3280. *M. amoena* (Rupr.) Boiss. - Н. приятная = III(П,ЗК,ЦЭ,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Эвксин.); S(НК); [Sp.]

3281. *M. sparsiflora* Pohl - Н. редкоцветковая = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S,Аа(Т); [Sp.]

3282. *M. propingua* (Turcz.) A.DC. - Н. близкая = I(КЕ); III(МА); IV(Н): (Армено-Иран.); Ра,Аа(Т); [R.]

3283. *M. palustris* (L.) L. (*M. scorpioides* L.) - Н. болотная = I(Т); III(Куб,СКТ,Э); IV(Н): (Голаркт.); Аа(НК); [R.]

3284. *M. cespitosa* K.F.Schultz - Н. дернистая = I(НД,Тем,Т,М); III(Ст,Куб,КР,ТЗ,Э,Л,УН,ЧО); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Голаркт.); Аа(НК); [Sp.]

3285. *M. micrantha* Pall. ex Lehm. - Н. мелкоцветковая = I(ЗП); II(КН); III(Ст,КР,ТЗ,СК,П,ТС); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Db(Т); [R.]

3286. *M. ramosissima* Rochel ex Schult. (*M. collina auct.*, *M. hispida Schlecht.*) - Н. ветвистая = III(УН,ОС,ВС); V(Касп,ЦД,АС): (Палеаркт.); ST,Rb(Т); [R.]

3287. *M. heteropoda* Trautv. - Н. разноножковая = V(Касп): (Армено-Иран.); Ра(Т); [Pl.]

3288. *M. arvensis* (L.) Hill - Н. полевая = I(Тем,Т,КЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Ра(Т); [Pl.] <Pm>

3289. *M. sylvatica* Ehrh. ex Hoffm. - Н. лесная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Европ.); S(Т); [Pl.]

3290. *M. alpestris* F.W.Schmidt - Н. альпийская = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]

3291. *M. lithospermifolia* (Willd.) Hornem. (*M. suaveolens auct.*) - Н. воробейниколистная = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Ра,Pb(НК); [Sp.]

3292. *M. schistosa* Khokhr. - Н. щербнистая = V(АС - г. Несиндаг, Шалбуздаг): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Es> l.c. г. Несиндаг.

Genus 835. *Trigonotis* Stev. - Тригонопис

3293. *T. peduncularis* (Trev.) Benth. et S.Moore - Т. булавовидный = V([АС - г. Тфандаг: Муртазалиев, 2009], г. Шалбуздаг): (Палеаркт.); ST,Rb(Т); [R.]

Genus 836. *Aegonychon* S.F.Gray - Эгонихон

3294. *Ae. purpureocaeruleum* (L.) Holub (*Lithospermum purpureocaeruleum* L.; *Buglossoides purpureocaerulea* (L.) Johnst.) - Э. фиолетово-синий = I(АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Европ.); S(НК); [Pl.] <Pm>

Genus 837. *Lithospermum* L. - Воробейник

3295. *L. officinale* L. - В. лекарственный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST,Rb(НК); [Sp.] <Pm>

Genus 838. Buglossoides Moench - Буглоссоид

3296. *B. arvensis* (L.) Johnston. (*Lithospermum arvense* L.) - Б. полевой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Pa(T); [Pl.] <Pm>

3297. *B. tenuiflora* (L.fil.) Johnston. (*L. tenuiflorum* L.fil.) - Б. тонкоцветковый = I(МД,АИ,Прик,ТБ); II(КН); III(Ст): (Общедр.средиз.); Dc(T); [R.]

Genus 839. Huynhia Greuter - Гуйния <GMC>

3298. *H. pulchra* (Roem. et Schult.) Greuter et Burdet (*Airyanthus echioides* (L.) Stev.; *Macrotomia echioides* (L.) Boiss.; *Arnebia pulchra* (Roem. et Schult.) J.R.Edmondson.) - Г. красивая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б, ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

Genus 840. Onosma L. - Оносма

3299. *O. caspium* Gruner - О. каспийская = V(Касп): (Субкавк*.); Da,Dd(НК); [R.]

3300. *O. setosa* Ledeb. - О. щетинистая = II(Кизл); V(Касп): (Туранск.); ST(НК:pb); [R.]

3301. *O. armeniaca* Klok. ex M.Pop. (*O. hispida* Stev.) - О. армянская = III(ОС,ВС); V(Касп,ЦД): (Армено-Иран.); Da(НК); [Sp.]

3302. *O. visianii* Clementi - О. Визиана = I(T): (Вост.средиз.); ST(НК:pb); [R.]

3303. *O. microcarpa* Stev. ex DC. - О. мелкоплодная = V(Касп): (Армено-Иран.); Da,Do(НК:pb); [R.]

3304. *O. tinctoria* Vieb. (*O. polychroma* Klok. ex M.Pop.) - О. красильная = I(Тем,Т,КЕ,Прик,НК); II(КН); III(Ст,СКТ,П,Кисл); IV(Н): (Субтуран*.); ST(T); [Sp.]

3305. *O. subtinctoria* Klok. - О. полукрасильная = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Понтич.); ST,Da(НК); [Sp.]

3306. *O. sericea* Willd. - О. шелковистая = V(ЦД): (Армено-Иран.); Da(НК); [R.]

3307. ★*O. polyphylla* Ledeb. - О. многолистная = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Sp.]

3308. *O. taurica* Pall. ex Willd.- О. крымская = I(T); IV(Н): (Вост.средиз.); Da(НК); [Sp.]

3309. *O. caucasica* Levin ex M.Pop. - О. кавказская = III(ЧК,КР,ТЗ,Э,ВК); IV(Н); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.]

3310. *O. levinii* T.N.Pop. - О. Левина = V(Касп): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Esub>

3311. *O. aucheriana* DC. (*O. rigida* auct. non Ledeb.) - О. Оше = IV(Н): (Эвксин.); Da(НК); [Sp.]

Genus 841. Cerinthe L. - Восковник

3312. *C. minor* L. - В. малый = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Субсредиз*.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.]

3313. *C. caucasica* (Hc) Galushko (*C. alpina* Kit.) - В. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [R.]

Genus 842. *Echium* L. - Синяк

3314. *E. russicum* J.F.Gmel. (*E. rubrum* Jacq.) - С. русский = I(АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субпонт*.); Pa(НК:pb); [Pl.]

3315. *E. biebersteinii* (Lacaita) Dobrocz. (*E. italicum* L.) - С. Биберштейна = I(АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб,КР,СКТ); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); Rb(НК:pb); [Sp.]

3316. *E. vulgare* L. - С. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm,Pmel>

Genus 843. *Rochelia* Reichenb. - Рохелия

3317. *R. retorta* (Pall.) Lipsky - Р. согнутая = I(АЕ,АК,КЕ,Тем, Т,Прик,ТБ); III(Ст,СК,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Субтуран*.); Pa(Т); [R.]

Ordo 99. Lamiales - Ясноткоцветные

Familia 166. Verbenaceae J.St.-Hil. - Вербеновые

Genus 844. *Verbena* L. - Вербена

3318. *V. officinalis* L. - В. лекарственная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Плюрирег.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>

3319. *V. brasiliensis* Vell. - В. бразильская = IV(ТА: Мельников, 2014): Адвент. [Южная Америка]; Rb(Т); [R.]

3320. *V. supina* L. - В. лежачая = I(Т,МД,АИ): (Общедр.средиз.); Db,Dd(Т); [R.]

Genus 845. *Lippia* L. - Липпия

3321. *L. nodiflora* (L.) Michx. - Л. узлоцветковая = II(Кизл): (Общедр.средиз.); Aa(НК); [R.]

Genus 846. *Vitex* L. - Прутняк

3322. *V. agnus-castus* L. - П. обыкновенный (Авраамово дерево) = IV(СЗЗ): (Средиземн.); Db,Aa(Phn); [R.]

Familia 167. Lamiaceae Lindl. - Яснотковые (Labiatae - Губоцветные)

Genus 847. *Ajuga* L. - Живучка

3323. *A. reptans* L. - Ж. ползучая = III(Ст,Куб,ЧК,КР,СКТ,Э); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pa(НК); [R.] <Pm>

3324. *A. genevensis* L. - Ж. женевская = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>

3325. *A. orientalis* L. - Ж. восточная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Зап.др.средиз.); ST(НК:ephd); [Pl.]

3326. *A. laxmannii* (L.) Benth. - Ж. Лаксмана = I(ЗП); III(Ст,Куб,ЧК,СКТ,П,Кисл,Л): (Понтич.); Pa(НК); [Sp.] <Pm>

3327. *A. chia* Schreb. (*A. glabra* C.Presl.; *A. pseudochia* Shost.) - Ж. хиосская = I(АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб,ЧК,ТЗ,СК,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Даг): (Зап.др.средиз.); ST,Rb(Т); [Pl.]

Genus 848. *Teucrium* L. - Дубровник

3328. *T. orientale* L. - Д. восточный = III(ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(Касп,ЦД,АС - южная часть): (Субкавказ*.); ST,Da(Ch:sf); [Pl.]

3329. *T. hircanicum* L. - Д. гирканский = III(Ч); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Sp.]

3330. *T. scordioides* Schreb. - Д. скордиевидный = I(АК,Прик,ТБ,НК); II(Кизл); III(ЛН,КР,СК,П,Каб,ЧО,ОС,Ч); IV(СЗЗ): (Общедр.средиз.); Aa(НК); [Sp.]

3331. *T. scordium* L. - Д. чесночный = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Евро-Сиб.); Aa(НК); [Sp.] <Pm>

3332. *T. nuchense* C.Koch - Д. нухинский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавк*.); Pa, Da(Ch:sf); [Pl.]

3333. *T. chamaedrys* L. - Д. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Субпонт*.); Pa(Ch:sf); [Sp.] <Pm>

3334. *T. fischeri* Juz. - Д. Фишера = V(Н): (Кр.Новоросс.); S, Da(Ch:sf); [R.]

3335. *T. canum* Fisch. et C.A.Mey. - Д. седой = V(Касп): (Субкавк*.); Da(Ch:sf); [R.]

3336. *T. polium* L. - Д. белый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Общедр.средиз.); Pa, ST(Ch:sf); [Pl.] <Pm>

Genus 849. *Scutellaria* L. - Шлемник

3337. *S. galericulata* L. - Ш. обыкновенный = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,Каб,ЧО); IV(Н): (Голаркт.); Pa, Aa(К); [Sp.] <Pm>

3338. *S. hastifolia* L. - Ш. копьелистный = I(НД,АЕ,Прик,ТБ,НК,М); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,Каб); IV(Н): (Европ.); Aa(К); [Sp.]

3339. *S. dubia* Taliev et Sirj. - Ш. сомнительный = I(НД,АЕ): (Понтич.); Pa, Aa(К); [Sp.]

3340. *S. altissima* L. - Ш. высочайший = I(НД); III(Ст,Куб,КР,П,Л,Каб,Ч); IV(СЗЗ): (Субсредиз*.); S(К); [Sp.]

3341. *S. helenae* Albov - Ш. Елены = IV(ТА - истоки р. Псоу: Тимухин, Туниев, 2015): (Кавк.: Эукавк.); Do(Ch:sf); [Rs.] <Esub>

3342. *S. taurica* Juz. - Ш. крымский = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(Ch:sf); [R.]

3343. *S. stevenii* Juz. - Ш. Стевена = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(Ch:sf); [R.]

3344. *S. tatianaе* Juz. (*S. hypopolia* Juz.) - Ш. Татьяны = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(Ch:sf); [R.]

3345. *S. karatschaica* Charadze - Ш. карачаевский = III(ЦЭ - Кубань,Чегем): (Кавк.: Эукавк.); Do(Ch:sf); [R.] <Esub> l.c. Учкулан

3346. *S. paradoxa* Galushko - Ш. странный = III(ЦЭ - Баксан,Гижгит): (Кавк.: Эукавк.); Do(Ch:sf); [Sp.] <Es>

3347. *S. leptostegia* Juz. - Ш. мелкочешуйчатый = III(ОС,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Do(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. ущелье Терека между Чми и Ларсом

3348. *S. raddeana* Juz. - Ш. Радде = III(ЦЭ,Б,ОС,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Ch:sf); [Sp.] <Ee>

3349. *S. andina* Charadze - Ш. андийский = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Do(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. верх. Андийского Койсу, с. Тинди

3350. *S. novorossica* Juz. (*S. hirtella* Juz.) - Ш. новороссийский = IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [Sp.] <Es> l.c. хр. Маркотх

3351. *S. polyodon* Juz. - Ш. многозубый = III([Ст: Танфильев, Кононов, 1987], СК, Э, Л, УН, Б, ОС): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Ee> l.c. Кисловодск
3352. *S. oschtenica* Juz. - Ш. оштенский = III(ВЛ - г.Оштен): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc, Do(НК); [R.] <Es> l.c. г. Оштен
3353. *S. granulosa* Juz. - Ш. мелкозернистый = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Do(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. Гимри и Гуниб
3354. *S. daghestanica* Grossh. - Ш. дагестанский = V(Даг): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Esub>
3355. *S. oreophila* Grossh. - Ш. горолюбивый = III(ЧК, ТЗ, Э, Б, ОС, ВС); V(ЦД, АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Ch:sf); [Pl.] <Esub>
3356. *S. ossetica* Charadze - Ш. осетинский = III(ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Ch:sf); [Sp.] <Esub> l.c. Ардон, с. Лисри
3357. *S. orientalis* L. - Ш. восточный = V(ЦД: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Da(Ch:sf); [R.]

Genus 850. *Marrubium* L. - Шандра

3358. *M. praecox* Janka - Ш. ранняя = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П); IV(Н); V(БН, Касп): (Понтич.); ST, Rb(К); [Pl.] <Pmel>
3359. *M. vulgare* L. - Ш. обыкновенная = I(ЗП, Прик, ТБ, НК, М); III(Ст, Куб, КР, ТЗ, СК, Э, ТС, ЧО, ВС); IV(СЗЗ); V(Касп, ЦД): (Общедр.средиз.); Pa, Ra, Rb(К); [Pl.] <Pm; Pmel>
3360. *M. plumosum* C.A.Mey. - Ш. перистая = III(ВС - Аргун); V(Касп, ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc, Do(К); [R.] <Esub>
3361. *M. catarifolium* Desr. - Ш. котовниколистная = III(Ст, СК, Э, ТС, ОС, ВС); V(БН, Касп, ЦД): (Субкавк*.); ST(К); [Sp.]
3362. *M. leonuroides* Desr. - Ш. пустырниковая = III(Куб, ЧК, ТЗ, СКТ, Э, Б, ОС); V(БН, Касп, ЦД): (Кавк.: Эукавк.); ST, Rb(К); [Pl.] <Esub>
3363. *M. propinquum* Fisch. et C.A.Mey. - Ш. близкая = V(Касп): (Армено-Иран.); ST, Rb(К); [R.]
3364. *M. peregrinum* L. - Ш. чужеземная = I(АК, КЕ, Тем, Т); II(ВП); III(Ст, Куб, СК, П); IV(Н); V(БН, Касп): (Понтич.); ST(К); [Sp.]

Genus 851. *Sideritis* L. - Железница

3365. *S. euxina* Juz. (*S. taurica* Steph. ex Willd.) - Ж. черноморская = IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Es> l.c. окр. Новороссийска
3366. *S. montana* L. - Ж. горная = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Общедр.средиз.); ST(Т); [Pl.]
3367. *S. comosa* (Rochel ex Benth.) Stank. - Ж. хохлатая = III(Ст, ЧК, СК, Э, Б, ОС, ВС); IV(Н): (Средиземн.); ST(Т); [Sp.]

Genus 852. *Nepeta* L. - Котовник

3368. *N. supina* Stev. - К. лежачий = III(ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc, Do(К); [Pl.]
3369. *N. lamifolia* Willd. (*N. brevifolia* C.A.Mey.) - К. яснотколистный = V(АС - верховья Самура): (Кавк.: Общекавк.); Pc, Do(К); [R.]
3370. *N. cataria* L. - К. кошачий = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pa, Rb(К); [Sp.] <Pm>

3371. *N. somkhetica* Kapell. - К. сомхетский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [Sp.]

3372. *N. grandiflora* Bieb. - К. крупноцветковый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Pb(К); [Sp.]

3373. *N. transcaucasica* Grossh. - К. закавказский = V(ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(К); [R.]

3374. *N. cyanea* Stev. - К. синий = III(ЦЭ,Б,УН,ОС,Ч,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(К); [Pl.] <Esub> I.c. с. Хиналуг

3375. *N. kubanica* Pojark. - К. кубанский = III(ЧК,ЦЭ,Кисл): (Кавк.: Эукавк.); ST(К); [R.] <Ee>

3376. *N. czegemensis* Pojark. - К. чегемский = III(ЦЭ,Б): (Кавк.: Эукавк.); ST,Do(К); [Sp.] <Ee> I.c. р. Чегем, с. Булунгу

3377. *N. biebersteiniana* (Trautv.) Pojark. - К. Биберштейна = III(ВС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Do(К); [Sp.] <Esub> I.c. с. Ахты

3378. *N. daghestanica* Pojark. - К. дагестанский = V(Касп,ЦД,[АС - Агвали, Шаури, г. Шалбуздаг]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Da(К); [Sp.] <Esub> I.c. с. Ахты

3379. *N. rannonica* L. (*N. nuda* L.) - К. венгерский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST(К); [Pl.]

3380. *N. komarovii* E.Busch - К. Комарова = III(ОС: Меницкий, 1992): (Кавк.: Эукавк.); Do,Pc(НК); [R.]

3381. *N. parviflora* Bieb. - К. мелкоцветковый = I(ЗП,МД,АИ,Прик,ТБ,НК); III(Ст); IV(Н): (Понтич.); ST(К); [R.]

Genus 853. Glechoma L. - Будра

3382. *G. hederacea* L. - Б. плющевидная = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

Genus 854. Dracoscephalum L. - Змееголовник

3383. *D. botryoides* Stev. - З. кистевой = V([ЦД,АС] - южная часть): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [R.]

3384. *D. thymiflorum* L. - З. чебреццветковый = I(НД,АК); III(Ст,ЛН,СК): (Евро-Сиб.); Rb(Т); [R.] <Pmel>

3385. *D. moldavica* L. - З. молдавский = I(НД,АК); III(СК,Кисл): (Евро-Сиб.); Rb(Т); [R.] <Pm;Pmel;Po>

3386. *D. multicaule* Montbr. et Auch. ex Benth. - З. многостебельный = V(Касп): (Армено-Иран.); Pb,Pc,Do(НК); [R.]

3387. *D. ruyschiana* L. - З. Руйша = III(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb(НК); [Sp.] <Pmel;Po>

3388. *D. austriacum* L. - З. австрийский = III(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [Pl.] <Pmel;Po>

Genus 855. Lallemania Fisch. et С.А.Меу. - Ляллеманция

3389. *L. peltata* (L.) Fisch. - Л. щитовидная = III(МА: Зернов, 2006,ОС); V(ЦД,АС): (Армено-Иран.); Rb(Т); [Sp.]

3390. *L. iberica* (Bieb.) Fisch. et С.А.Меу. - Л. грузинская = III(Ст,ЛН): (Средиземн.); ST,Rb(Т); [R.] <Pmel>

Genus 856. *Prunella* L. - Черноголовка

3391. *P. vulgaris* L. - Ч. обыкновенная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>

3392. *P. laciniata* (L.) L. - Ч. разрезная = **I(М); III(Ст,Куб,ЧК,КР,СКТ,П); IV(Н); V(БН,Касп):** (Евро-Кавк.); Pa,Аа(НК); [R.]

3393. *P. grandiflora* (L.) Scholl. - Ч. крупноцветковая = **III(ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Касп):** (Европ.); Pa(НК); [Sp.]

Genus 857. *Eremostachys* Bunge - Пустыноколосник

3394. *E. iberica* Vis. - П. грузинский = **III(ЧО,Ч); V(БН,Касп):** (Субкавк*.); ST,Da(К); [R.]

Genus 858. *Phlomis* L. - Зопник

3395. *Ph. pungens* Willd. - З. колючий = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЧК,СКТ,П,Кисл); V(БН,Касп,ЦД):** (Субпонт*.); ST(К); [Pl.] <Pm>

3396. *Ph. taurica* Hartwiss ex Bunge - З. крымский = **III(МА,ВЛ); IV(Н):** (Кр.-Новоросс.); Da(К); [Sp.]

3397. *Ph. majkopensis* (Novopokr.) Grossh. - З. майкопский = **I(АК); III(Ст,ЧК,Куб):** (Кавк.: Предкавк.); ST(К); [R.] l.c. ст. Даховская <Ее>

Genus 859. *Phlomoides* Moench - Фломоидес

3398. *Ph. tuberosa* (L.) Moench (*Phlomis tuberosa* L.) - Ф. клубненосный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Pa(К); [Pl.] <Pa;Pm>

Genus 860. *Galeopsis* L. - Пикульник

3399. *G. ladanum* L. - П. ладанниковый = **III(Ст,СК,П); IV(ТА); V(БН,[Касп: Муртазалиев, 2009]):** Евро-Кавк.); Ra,Rb(Т); [R.] <Pmel>

3400. *G. bifida* Voenn. - П. двунадрезанный = **I(АК,КЕ,Тем,Т); II(Кизл); III(Ст,ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); S(Т); [Sp.] <Pmel>

3401. *G. speciosa* Mill. - П. видный = **I(Тем,Т):** (Евро-Сиб.); Rb(Т); [R.]

Genus 861. *Lamium* L. - Яснотка

3402. *L. amplexicaule* L. - Я. стеблеобъемлющая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД):** (Палеаркт.); Pa,Ra,Rb(Т); [Pl.] <Pm>

3403. *L. raczoskianum* Worosch. - Я. Пачоского = **I(МД); III(Ст - Сенгилевское оз.):** (Субтуран*.); ST,Rb(Т); [Sp.]

3404. *L. maculatum* (L.) L. - Я. пятнистая = **I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем); III(Ст,Куб,КР,П,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Европ.); S,Pa(К); [Sp.] <Pmel>

3405. *L. gundelsheimeri* С. Koch - Я. Гундельшеймера = **III(Б: Портениер, 2012):** (Кавк.: Общекавк.); S(К); [R.]

3406. *L. album* L. - Я. белая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Rb(К); [Pl.] <Pm;Pmel>

3407. *L. gundelsheimeri* С. Koch - Я. Гундельшеймера = **III(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); V(Даг):** (Ирано-Туран.); S(К); [Sp.]

3408. *L. tomentosum* Willd. - Я. войлочная = **III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС):** (Субкавк*.); Pс(К); [Pl.]

3409. *L. purpureum* L. - Я. пурпурная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Pa,Rb(Т); [Pl.] <Pmel>

Genus 862. Galeobdolon Adans. - Зеленчук

3410. *G. luteum* Huds. - З. жёлтый = III(Куб,Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Европ.); S(НК); [R.]

Genus 863. Chaiturus Willd. - Гривоховост <GT>

3411. *Ch. marrubiastrum* (L.) Reichenb. (*Leonurus marrubiastrum* L.) - Г. шандровый = I(НД,АК,Тем,Т,МД,АИ); II(ВП); III(Ст,Куб,КР,СК,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Sp.]

Genus 864. Leonurus L. - Пустырник

3412. *L. quinquelobatus* Gilib (*L. cardiaca* L.) - П. пятилопастный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Сиб.); Rb(К); [Sp.] <Pm;Pmel>

3413. *L. glaucescens* Bunge - П. сизый = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,МД); II(Кизл); V(ЦД - Кубачи: Муртазалиев, 2009): (Субтуран*.); Rb(К); [R.] <Pmel>

Genus 865. Molucella L. - Молюцелла

3414. *M. laevis* L. - М. гладкая = I(АЕ,АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб,СК,П); IV(СЗЗ): (Зап.др.средиз.); Rb(Т); [R.]

Genus 866. Ballota L. - Белокудренник

3415. *B. nigra* L. - Б. чёрный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Европ.); S,Rb(К); [Pl.] <Pm>

3416. *B. grisea* Pojark. - Б. серый = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Rb(К); [Sp.]

Genus 867. Betonica L. - Буквица

3417. *B. macrantha* C.Koch (*B. grandiflora* Willd.) - Б. крупноцветковая = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb,Pc(НК); [Pl.]

3418. *B. abchasica* (Bornm.) Chinth. - Б. абхазская = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА); (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>

3419. *B. nivea* Stev. - Б. белоснежная = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb,PcDo(НК); [Sp.] <Esub>

3420. *B. ossetica* (Bornm.) Chinth. - Б. осетинская = III(ОС,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Da,Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. Осетия, р. Архондон

3421. *B. perauca* Klok. (*B. officinalis auct.*) - Б. сильно-расширенная = I(АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Палеаркт.); Pa,Pb(НК); [Pl.]

Genus 868. Stachys L. - Чистец

3422. *S. fruticulosa* Bieb. - Ч. кустарничковый = V(Касп - р. Самур): (Ирано-Туран.); Dd(Ch); [Rs.]

3423. *S. pauli* Grossh. - Ч. Пауля = V(АС); (Кавк.: Эукавк.); Do(Ch); [Rs.] <Esub>

3424. *S. lavandulifolia* Vahl - Ч. лавандолистный = III(ОС - Коби: Гроссгейм, 1967): (Субкавк*.); Do(НК); [Rs.]

3425. *S. byzantina* C.Koch (*S. lanata* Jacq.) - Ч. византийский = V(Касп,ЦД): (Вост.средиз.); ST(НК); [Sp.]

3426. *S. velata* Klok. (*S. cretica auct.*) - Ч. обёрнутый = III(КР); IV(Н): (Вост.средиз.); ST(НК); [R.]

3427. *S. germanica* L. - Ч. германский = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Европ.); S,Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pmel>
3428. *S. balansae* Boiss. et Kotschy - Ч. Балансы = **III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС):** (Субкавказ*.); Pa,Pb(НК); [Pl.]
3429. *S. intermedia* Ait. - Ч. промежуточный = **III(Ст,Э,ВК); V(ЦД,АС):** (Субкавказ*.); Pa,Pb(НК); [Sp.] <Pmel>
3430. *S. macrophylla* Albov - Ч. крупнолистный = **III(МА - Майкоп,ЧК):** (Эвксин.); S(НК); [R.] <Pmel> <Rg>
3431. *S. sylvatica* L. - Ч. лесной = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД):** (Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
3432. *S. palustris* L. - Ч. болотный = **I(ЗП,Прик,ТБ,НК,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЧК,КР,СК,ТС); IV(СЗЗ):** (Палеаркт.); Aa(НК); [R.] <Pmel>
3433. *S. recta* L. - Ч. прямой = **III(Ст,СК,ЛН,П,Кисл):** (Средиземн.); ST(НК); [R.]
3434. *S. atherocalyx* C.Koch - Ч. острочашечковый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Субкавказ*.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
3435. *S. iberica* Bieb. - Ч. грузинский = **III(ОС):** (Субкавказ*.); ST(НК); [R.]
3436. *S. maritima* L. - Ч. морской = **IV(СЗЗ):** (Средиземн.); Db(НК); [Sp.]
3437. *S. pubescens* Ten. - Ч. пушистый = **I(Т); III(П,Б); V(Касп):** (Субкавказ*.); Pa,ST(НК); [R.] <Pmel>
3438. *S. annua* (L.) L. - Ч. однолетний = **I(ЗП,Прик,ТБ,НК); II(КН); III(Ст,ЛН,КР,СКТ,П,Кисл,Л,ОС,ВС); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Евро-Кавк.); Rb(Т); [Sp.]

Genus 869. *Salvia* L. - Шалфей

3439. *S. tomentosa* Mill. (*S. grandiflora* Etl.) - Ш. войлочный = **IV(Н):** (Вост.средиз.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
3440. *S. ringens* Sibth. et Smith - Ш. раскрытый = **III(КР); IV(СЗЗ):** (Вост.средиз.); Da(НК); [R.]
3441. *S. glutinosa* L. - Ш. железистый = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.] <Pm>
3442. *S. viridis* L. - Ш. зелёный = **III(П,СК,ТС,ЧО); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД):** (Средиземн.); ST,Rb(Т); [R.]
3443. *S. canescens* С.А.Меу. - Ш. седеющий = **III(ЧК,ТЗ,Кисл,ЦЭ):** (Кавк.: Эукавказ.); Da,Dd(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Кисловодск
3444. *S. daghestanica* Sosn. - Ш. дагестанский = **III(ОС,ВС); V(Касп,ЦД):** (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Sp.] <Ee>
3445. *S. sclarea* L. - Ш. мускатный = **IV(СЗЗ: Галушко,1980); V(Касп - Дербент):** (Вост.средиз.); Pa(НК); [Sp.]
3446. *S. beckeri* Trautv. - Ш. Беккера = **V(Касп,ЦД,АС):** (Кавк.: Эукавказ.); ST,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. с. Ахты
3447. *S. aethiops* L. - Ш. эфиопский = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(БН,Касп):** (Общедр.средиз.); ST,Da(НК); [Pl.] <Pm>
3448. *S. verbascifolia* Bieb. - Ш. коровяколистный = **V(Касп):** (Армено-Иран.); Da(НК); [R.]

3449. *S. nutans* L. - Ш. поникающий = I(АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,ЛН,СК): (Понтич.); ST(НК); [R.] <Po>
3450. *S. verbenaca* L. - Ш. вербеновый = V(Касп - Дербент): (Средиземн.); ST,Rb(НК); [R.]
3451. *S. kuznetzovii* Sosn. - Ш. Кузнецова = III(ЧК,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Усть-Джегута
3452. *S. tesquicola* Klok. et Pobed. - Ш. сухостепной = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субтуран*.); ST(НК); [Pl.] <Pmel>
3453. *S. deserta* Schang. (*S. nemorosa* L.) - Ш. пустынный = I(АК,КЕ,ЦП); II(ВП); V(Касп: Муртазалиев, 2009): (Туранск.); ST(НК); [R.]
3454. *S. fugax* Pobed. - Ш. опадающий = I(М: Танфильев, Кононов, 1987); III(СК: Галушко, 1980); V(БН,Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.] <Ee> l.c. Сев. Дагестан (?) <Rx - в М и СК>
3455. *S. virgata* Jacq. - Ш. лозный = III(Кисл,ЦЭ); V(Касп,ЦД): (Вост.средиз.); Pa(НК); [R.]
3456. *S. reflexa* Hornem. - Ш. отогнутый = I(АК,КЕ,ЦП); III(Ст,Куб,СК,Каб): (Адвент. [Сев.Америка]); Ra,Rb(T); [R.]
3457. *S. verticillata* L. - Ш. мутовчатый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
3458. *S. austriaca* Jacq. - Ш. австрийский = I(НД,АЕ): (Понтич.); ST(НК); [R.] <Po>

Genus 870. *Ziziphora* L. - Зизифора

3459. *Z. serpillacea* Vieb. - З. тимьянниковая = V(Касп,ЦД): (Субкавк*.); Do(Ch:sf); [Sp.]
3460. *Z. puschkinii* Adams - З. Пушкина = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(Ch:sf); [Pl.] <Esub> l.c. Осетия (?)
3461. *Z. subnivalis* Ter-Chatsch. - З. подснежная = III([ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС]; Меницкий, 1992): (Кавк.: Общекавк.);
3462. *Z. woronowii* Maleev - З. Воронова = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(Ch:sf); [R.] <Esub> l.c. верховья р. Белой
3463. *Z. denticulata* Juz. (*Z. clinopodioides* Lam.) - З. мелкозубчатая = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pb(Ch:sf); [R.]
3464. *Z. capitata* L. - З. головчатая = I(АК); III(КР,П); IV(Н); V(Касп): (Средиземн.); ST(T); [R.]

Genus 871. *Melissa* L. - Мелисса

3465. *M. officinalis* L. - М. лекарственная = III(Куб,ЧК,КР,П,Кисл,ВС); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Rb(K); [Sp.] <Pm>

Genus 872. *Satureja* L. - Чабер

3466. *S. hortensis* L. (*S. laxiflora* C.Koch) - Ч. садовый = III(Ст,ЧК,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД,АС): (Субкавк*.); Da,Rb(T); [Sp.] <Pmel>
3467. *S. pachyphylla* C.Koch - Ч. толстолистный = II(КН): (Понтич.); ST(T); [R.] <Rx>
3468. *S. spicigera* (C.Koch) Boiss. - Ч. колосоносный = III(Х,ВЛ,ТЗ - Теберда); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(Ch:sf); [R.]

3469. *S. subdentata* Boiss. - Ч. мелкозубчатый = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Do(Ch:sf); [Sp.] <Ee>

Genus 873. Antonina Vved. - Антонина <GM>

3470. *A. debilis* (Bunge) Vved. (*Calamintha debilis* (Bunge) Benth., *C. caucasica* Somm. et Levier) - А. слабая = III(ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Do(T); [R.]

Genus 874. Calamintha Hill - Душечник

3471. *C. grandiflora* (L.) Moench - Д. крупноцветковый = III(Ст,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(C33): (Евро-Кавк.); S(K); [R.]

3472. *C. mentifolia* Host (*C. officinalis auct.*) - Д. мятолистный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Л); IV(C33); V(Дар): (Средиземн.); S(K); [Sp.]

Genus 875. Clinopodium L. - Пахучка

3473. *C. vulgare* L. - П. обыкновенная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C33); V(Дар): (Евро-Сиб.); S(K); [Pl.] <Pm>

3474. *C. umbrosum* (Bieb.) S.Koch - П. теневая = IV(ТА); V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S(K); [R.]

Genus 876. Acinos Mill. - Душевка

3475. *A. arvensis* (Lam.) Dandy (*A. thymoides* Moench) - Д. полевая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C33); V(Дар): (Евро-Кавк.); S,Pa(T); [Pl.]

3476. *A. rotundifolius* Pers. (*A. graveolens* (Bieb.) Link) - Д. круглолистная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(Касп): (Субпонт*.); ST(T); [Sp.]

Genus 877. Hyssopus L. - Иссоп

3477. *H. angustifolius* Bieb. - И. узколиственный = III(П,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Субкавк*.); ST(Ch:sf); [R.]

Genus 878. Origanum L. - Душица

3478. *O. vulgare* L. - Д. обыкновенная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C33); V(Дар): (Палеаркт.); Pa,ST(K); [Pl.] <Pm;Pmel>

Genus 879. Thymus L. - Чебрец

3479. *Th. fedtschenkoii* Ronn. - Ч. Федченко = V(АС - Куруш: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Do(Ch:sf); [Rs.]

3480. *Th. collinus* Bieb. (*Th. transcausicus* Ronn.) - Ч. холмовой = III(ЧК,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Esub>

3481. *Th. marschallianus* Willd. (*Th. dimorphus* Klok. et Shost.) - Ч. Маршаллов = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C33); V(Дар): (Понт.-Южносиб.); Pa,ST(Ch:sf); [Pl.] <Pm;Pmel>

3482. *Th. elenevskyi* Vasjukov - Ч. Еленевского = IV(Н - Новороссийск: Васюков, Попович, 2017): (Кавк.: Эукавк.); ST(Ch:sf); [Rs.] <Es> l.c. Новороссийск

3483. *Th. pastoralis* Pjin ex Klok. - Ч. пастуший = III(П,Кисл): (Кавк.: Эукавк.); ST(Ch:sf); [R.] <Ee> l.c. Кисловодск

3484. *Th. karamarjanicus* Klok. et Shost. - Ч. карамарьянский = V(Касп - Дербент: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); ST,Da(Ch:sf); [R.]

3485. *Th. markhotensis* Maleev - Ч. маркотхский = III(П,Кисл); IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [Rs.] <Pmel> <Ee>

3486. *Th. elisabethae* Klok. et Shost. - Ч. Елизаветы = III([П - Машук (LE!), сборы С.С. Иконникова и Н.П. Литвинова],ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); ST, Da, Do(Ch:sf); [Rs.] <Ee> l.c. p. Худес

3487. *Th. daghestanicus* Klok. et Shost. (*Th. mashukensis* Klok.; *Th. lipskyi* Klok. et Shost.) - Ч. дагестанский = I(Прик - Донская балка, Бешпагир: Меницкий, 1986); III(Ст,СК,ТЗ,П,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(Даг): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Pmel> <Esub> l.c. г. Готчала (р. Каракойсу)

3488. *Th. majkopensis* Klok. et Shost. - Ч. майкопский = III(ЧК,ВЛ,ЦЭ,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Ee>

3489. *Th. helendzhicus* Klok. et Shost. - Ч. геленджикский = IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. пос. Солнцедар

3490. *Th. pallasianus* H.Br. - Ч. Палласа = I(Прик - Донская Балка); II(ВП): (Европ.); Db(Ch:sf); [Rs.] <Pmel> <Rx>

3491. ★*Th. pulchellus* С.А.Мей. - Ч. красивенький = III(ЧК,ЦЭ - Скалистый хребет): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. ст. Красногорская

3492. *Th. pseudopulegioides* Klok. et Shost. - Ч. ложноблониный = III(ВЛ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,Ч): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(Ch:sf); [R.]

3493. *Th. buschianus* Klok. et Shost. - Ч. Буша = IV(ТА); III(Л,УН,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Ps,Do(Ch:sf); [R.] <Esub> l.c. пер. Кодорский (Дагестан)

3494. *Th. caucasicus* Willd. (*Th. grossheimii* Ronn.) - Ч. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч.); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Ps,Do(Ch:sf); [Sp.] <Esub>

3495. *Th. nummularius* Vieb. - Ч. монетный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Ps,Do(Ch:sf); [Pl.] <Esub>

3496. *Th. pseudonummularius* Klok. et Shost. - Ч. ложномонетный = III(ЧК,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Ps(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. окр. Майкопа

Genus 880. *Lycopus* L. - Зюзник

3497. *L. europaeus* L. - З. европейский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Aa(K); [Sp.] <Pm>

3498. *L. exaltatus* L.fil. - З. высокий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Aa(K); [R.]

Genus 881. *Mentha* L. - Мята

3499. *M. arvensis* L. - М. полевая = I(АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб,ЧК,СК,П,Кисл,Каб,ЧО); IV(СЗЗ): (Голаркт.); Aa(K); [Sp.] <Pm;Pmel>

3500. *M. aquatica* L. - М. водная = I(АК,КЕ,Тем,Т,МД); II(Кизл); III(Куб,П,Кисл,Каб,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Aa(K); [Sp.] <Pmel>

3501. *M. caucasica* Gand. (*M. longifolia* (L.) Huds.) - М. кавказская = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Aa(K); [Pl.] <Pm;Pmel>

3502. *M. spicata* L. - М. колосовая = III(Ст,Куб,ЧК,СК,Каб): (Субсредиз*.); Aa,Rb(K); [R.]

3503. *M. pulegium* L. - М. блошиная = I(Тем,Т); III(Куб,ЧК,КР); IV(СЗЗ); (АС - Кособ, Анцух: Муртазалиев, 2009): (Субсредиз*.); Аа(К); [Sp.]

3504. *M. daghestanica* Boriss. - М. дагестанская = V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Аа(К); [R.] <Es> l.c. верх. Аварского Койсу

3505. *M. micrantha* (Fisch.ex Benth.) Litv. - М. мелкоцветковая = I(ЗПМ,Тем - Краснодар); III(Куб); V(БН: Муртазалиев, 2009): (Понтич.); Аа(Т); [R.] <Rg>

3506. *M. piperita* L. - М. перечная = I(Т); IV(Н); III(Ст,Куб,П,Кисл,Каб): (Адвент. [Европа]); Rb(К); [Sp.] <Pm>

Genus 882. Elsholtzia Willd. - Эльсгольция

3507. *E. ciliata* (Thunb.) Nyl. (*E. patrinii* (Lepech.) Garcke) - Э. реснитчатая = III([ВЛ - Пантелеймоновская: Гроссгейм, 1967],ОС - Алагир); IV(ТА: Зернов, 2006): (Адвент. [Вост. Азия]); Rb(Т); [R.]

Ordo 100. Solanales - Паслёноцветные

Familia 168. Solanaceae Juss. - Паслёновые

Genus 883. Nicandra Adans. - Никандра

3508. *N. physalodes* (L.) Gaertn. - Н. физалисовидная = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,П,Кисл,ЧО,ОС); IV(Н); V(ЦД): (Адвент. [Южн.Америка]); Rb(Т); [R.]

Genus 884. Lycium L. - Дереза

3509. *L. barbarum* L. - Д. варварская = I(НД,ЗПМ,АЕ,МД,АИ,Прик,ТБ,НК); III(Ст): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(Ch); [Sp.]

3510. *L. ruthenicum* Murr. (*L. foliosum* Stocks) - Д. русская = I(Тем - Темрюк): (Туранск.); Dc(Ch); [R.]

Genus 885. Atropa L. - Красавка

3511. ★*A. caucasica* Kreyer (*A. bella-donna* L.) - К. кавказская = III(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Субкавк*.); S(К); [R.] <Pm;Pt>

Genus 886. Scopolia Jacq. - Скополия

3512. *S. caucasica* Kolesn. ex Kreyer - С. кавказская = III(Куб,КР,Х); IV(СЗЗ): (Эвксин.); S(К); [R.] <Pt;Pm>

Genus 887. Physochlaina G.Don fil. - Пузырница

3513. *Ph. orientalis* (Bieb.) G.Don fil. - П. восточная = III(ТЗ,П,Кисл,Л,УН,Ч); V(ЦД): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.] <Pt> l.c. Кисловодск

Genus 888. Hyoscyamus L. - Белена

3514. *H. niger* L. (*H. bohemicus* F.W. Schmidt) - Б. чёрная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pt>

Genus 889. Physalis L. - Физалис

3515. *Ph. alkekengi* L. - Ф. обыкновенный = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЧК,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); S,Rb(К); [Pl.] <Pa;Pm;Po>

Genus 890. Solanum L. - Паслён

3516. *S. nigrum* L. - П. чёрный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Rb(Т); [Pl.] <Pa;Pt;Pm>

3517. *S. schultesii* Opiz (*S. decipiens* Opiz) - П. Шультеза = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т); II(Кизл); III(СК,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); Rb(Т); [R.] <Pt>

3518. *S. villosum* Mill. (*S. luteum* Mill.) - П. мохнатый = I(АК,КЕ); II(Кизл); III(Ст,Куб); IV(СЗЗ): (Субсредиз*.); Rb(Т); [R.] <Pt>

3519. *S. dulcamara* L. - П. сладко-горький = I(НД,МД,АЕ,Т); IV(Н): (Палеаркт.); Aa(Ch:sf); [Pl.] <Pt>

3520. *S. pseudopersicum* Pojark. - П. ложноперсидский = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(Касп): (Субкавк*.); S,Rb(Ch:sf:lh); [Pl.] l.c. Машук <Pt;Pm>

3521. *S. persicum* Willd. ex Roem. - П. персидский = II(КН); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Армено-Иран.); Aa(Ch); [Sp.]

3522. *S. sisymbriifolium* Lam. - П. гулявниколистный = I(АК: Косенко, 1970): (Адвент. [Южн.Америка]); Rb(Т); [R.]

3523. *S. cornutum* Lam. (*S. rostratum* Dun.) - П. рогатый = I(НД,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М); II(КН); III(Ст,Куб): (Адвент. [Сев.Америка]); Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pt>

Genus 891. *Datura* L. - Дурман

3524. *D. stramonium* L. - Д. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(Т); [Sp.] <Pm;Pt>

Ordo 101. Scrophulariales - Норичникоцветные

Familia 169. Scrophulariaceae Juss. - Норичниковые

Genus 892. *Verbascum* L. - Коровяк

3525. *V. phlomoides* L. - К. лекарственный = I(АК,КЕ,Тем,Т); II(Кизл); III(Ст,ЧО,Ч); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Европ.); ST,Rb(НК:pb); [Sp.] <Pm>

3526. *V. densiflorum* Bertol. (*V. thapsiforme* Schrad.) - К. густоцветковый = I(АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб): (Европ.); ST(НК:pb); [R.] <Pm>

3527. *V. thapsus* L. - К. обыкновенный = III(Ст,Куб,ЧК,КР,ТЗ,СКТ,Э,Б,ОС); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

3528. *V. pinnatifidum* Vahl - К. перистораздельный = I(АК,Тем,Т); IV(Н): (Эвксин.); Db(Т); [R.]

3529. *V. gnaphalodes* Vieb. - К. сушеницевый = III(ТЗ - р. Гоначхир: Воробьева, Онипченко, 2001); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); Db(НК:pb); [Sp.]

3530. *V. lychnitis* L. - К. мучнистый = I(ЗП,Прик,ТБ,НК,М); III(Ст,Куб,ЧК,ВЛ,ТЗ,СК,П,Кисл,ЧО,ВК); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Европ.); Pa(НК:pb); [Sp.]

3531. *V. sinuatum* L. - К. выемчатый = IV(ТА): (Средиземн.); Db,Rb(НК:pb); [Sp.]

3532. *V. gossipinum* Vieb. - К. хлопковый = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК:pb); [Sp.]

3533. *V. orientale* Bieb. (*V. marschallianum* Ivanina et Tzvel.; *V. austriacum* Schott; *Celsia orientalis* L.) - К. восточный = III(Ст,Куб,ЧК,КР); IV(Н): (Субтуран*.); Pa(НК:pb); [R.] <Rx>

3534. *V. laxum* Filar. et Jav. - К. раскидистый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Pl.]
3535. *V. nigrum* L. - К. чёрный = **III(Ст - Ставрополь: Гроссгейм, 1967)**: (Палеаркт.); Pa(НК); [Rs.] <Rg>
3536. *V. wilhelmsianum* C.Koch - К. Вильгельмса = **III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Esub>
3537. *V. ovalifolium* Donn ex Sims - К. овальнолистный = **I(ЗП,ЦП); II(КН); III(Ст); IV(Н)**: (Понтич.); ST,Db(Т); [R.]
3538. *V. formosum* Fisch. ex Schrank - К. красивый = **IV(Н - Геленджик); V(Касп - Дербент)**: (Кавк.: Общекавк.); ST(НК:pb); [R.]
3539. *V. spectabile* Vieb. - К. представительный = **IV(СЗЗ)**: (Кр.-Новоросс.); ST(НК:pb); [Sp.]
3540. *V. pyramidatum* Vieb. - К. пирамидальный = **I(АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб,КР,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Субкавк*.); Pa(НК); [Pl.]
3541. *V. blattaria* L. - К. тараканий = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СК); IV(СЗЗ); V(Касп)**: (Палеаркт.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pm>
3542. *V. phoeniceum* L. - К. фиолетовый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Понт.-Южносиб.); Pa(К); [Pl.]
3543. *V. atrovioleaceum* (Somm. et Levier) Murb. - К. тёмнофиолетовый = **III(ОС - р.Ардон)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [R.] <Es> l.c. р. Ардон
- Genus 893. Symbalaria Medik. - Цимбалария**
3544. *S. muralis* Gaertn., В. Mey. et Schreb. - Ц. настенная = **III(ЧО - Владикавказ: Комжа, 2004); IV(Н)**: (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(НК); [R.]
- Genus 894. Kickxia Dumort. - Киксия**
3545. *K. caucasica* (Muss.-Puschk.) Kuprian. (*Kickxia elatine* (L.) Dumort.) - К. кавказская = **I(АЕ,АК,КЕ,Тем,Т); III(Куб,ЧК,КР); IV(СЗЗ); V(Касп.)**: (Кавк.: Общекавк.); Rb(Т); [Sp.]
- Genus 895. Linaria Hill - Льянка**
3546. *L. vulgaris* Mill. - Л. обыкновенная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Европ.); Pa,Rb(К); [Sp.] <Pm>
3547. *L. biebersteinii* Bess. - Л. Биберштейна = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М); II(Кизл); III(Ст,СК,ЧО,ТС); IV(СЗЗ); V(БН)**: (Понтич.); Pa(К); [Sp.]
3548. *L. ruthenica* Blonski - Л. русская = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,МД,АИ,Прик,ТБ,НК)**: (Понт.-Южносиб.); ST(К); [R.]
3549. *L. macroga* (Vieb.) Vieb. - Л. крупнохвостая = **I(АЕ,АК,КЕ,Тем,Т,МД,АИ)**: (Понтич.); ST,Db(К); [R.]
3550. *L. incompleta* Kuprian. - Л. неполноцветковая = **I(КЕ,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,П,ЧО,ТС); V(БН,Касп)**: (Понтич.); ST,Db(НК); [Sp.]
3551. *L. meyeri* Kuprian. - Л. Мейера = **III(ОС - Терек, Ардон)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(К); [R.] <Es> l.c. Дарьяльское ущелье
3552. *L. bahanensis* Galushko - Л. баксанская = **III(ЦЭ - Баксан, Гижгит)**: (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Sp.] <Es> l.c. а. Былым
3553. *L. odora* (Vieb.) Fisch. - Л. душистая = **I(НК); II(ВП); III(ТС); V(БН,Касп)**: (Понтич.); Db(К); [R.]

3554. *L. simplex* (Willd.) DC. - Л. простая = II(Кизл); III(Каб,ТС); V(Касп,АС): (Субсредиз*.); Rb(Т:eph); [R.]

3555. *L. dalmatica* (L.) Mill. - Л. далматская = IV(Н): (Зап.др.средиз); Da(К); [R.]

3556. *L. genistifolia* (L.) Mill. (*L. pontica* Kuprian.) - Л. дроколистная = I(АК,КЕ,Тем,Т,ЦП); II(Кизл); III(Ст,Куб,КР,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Европ.); Pa(К); [Pl.]

3557. *L. caucasigena* Kem.-Nath. - Л. кавказская = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,Ч); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [Sp.]

3558. *L. sabulosa* Czer. ex Klok. - Л. песчаная = I(Т); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Db(К); [R.] <Rx>

Genus 896. Chaenorhinum (DC.) Reichenb. - Хеноринум

3559. *Ch. minus* (L.) Lamge (*Ch. viscidum* (Moench) Simonk) - Х. малый = III(Э,Б,УН,ОС,Ч): (Евро-Кавк.); Da(Т); [R.]

Genus 897. Scrophularia L. - Норичник

3560. *S. hircana* Grossh. - Н. гирканский = V([Касп - Нарат-Тюбинский хр., Маджалис, Уллучайкент]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.]

3561. *S. chrysantha* Jaub. et Spach - Н. золотистый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК); [R.]

3562. *S. lateriflora* Trautv. - Н. бокоцветный = III(Ст,ВС); IV(ТА); V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>

3563. *S. orientalis* L. - Н. восточный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); V(ЦД): (Армено-Иран.); Pb(НК); [Sp.]

3564. *S. minima* Vieb. - Н. малый = III(Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [Sp.] <Esub>

3565. *S. ilwensis* C.Koch - Н. ильвенсисбский = V(АС - Куруш: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Аа(Т); [R.]

3566. *S. peregrina* L. - Н. чужестранный = IV(ТА): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(Т); [Sp.]

3567. *S. scopolii* Hoppe ex Pers. - Н. Скополи = III(Ст,Куб,Х,ВЛ,ТЗ,Э,Л,УН,Б,Ч); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Общедр.средиз.); S(НК:pb); [R.]

3568. *S. divaricata* Ledeb. - Н. растопыренный = III(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,УН,Б,ОС,Ч); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S(К); [Sp.]

3569. *S. sprengeriana* Somm. et Levier - Н. Шпренгера = IV(ТА: Зернов, 2006): (Кавк.: Эукавк.); S(Т); [R.] <Esub>

3570. *S. mollis* Somm. et Levier - Н. мягкий = III(Ст,П,Кисл,Л,УН): (Кавк.: Эукавк.); S(НК:pb); [R.] <Ee> l.c. Ларс

3571. *S. nodosa* L. - Н. узловатый = I(Тем,Т,НК); III(Ст,Куб,КР,Х,СКТ,Ч); IV(СЗЗ): (Панбор.); S,Аа(К); [R.] <Pm;Pmel>

3572. *S. macrobotris* Ledeb. - Н. крупнокистевой = III(ВЛ): (Кавк.: Общекавк.); S(К); [R.]

3573. *S. rutifolia* Bess. - Н. рутолистный = V(ЦД: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Do(К); [R.]

3574. *S. umbrosa* Dumort. (*S. aquatica* L.; *S. alata* Gilib. nom. invalid.) - Н. теневой = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,ЧК,КР,ТЗ,СКТ,Э,Б,ОС,ЧО); IV(Н); V(АС): (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]

3575. *S. olympica* Boiss. - Н. олимпийский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(АС): (Субкавказ*.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]

3576. *S. grossheimii* Schischk. - Н. Гроссгейма = V([ЦД - Акуша,АС - Хлют]: Муртазалиев, 2009): (Армено-Иран.); Do(НК); [Sp.]

3577. *S. ruprechtii* Boiss. - Н. Рупрехта = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Эукавказ.); Рс,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Цейский ледник

3578. *S. charadzeae* Kem.-Nath. - Н. Харадзе = III(УН,Ч,ОС,ВС): (Кавк.: Эукавказ.); Do(НК); [R.] <Ee>

3579. *S. variegata* Vieb. - Н. пёстрый = III(ТЗ,Э,Б,ОС); V(Касп,ЦД,АС): (Субкавказ*.); Do(НК); [Pl.]

3580. *S. rupestris* Vieb. ex Willd. - Н. скальный = III(ЧК,Х,СКТ,Э,ВК); IV(Н); V(Даг): (Субкавказ*.); Da(НК); [Pl.]

Genus 898. *Dodartia* L. - Додарция

3581. *D. orientalis* L. - Д. восточная = I(НД,ЦП); II(ВП); III(СК); V(Касп): (Ирано-Туран.); Db,Dd(НК); [Sp.]

Genus 899. *Gratiola* L. - Авран

3582. *G. officinalis* L. - А. лекарственный = I(НД,АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб); IV(Н): (Голаркт.); Aa(К); [Rs.] <Pm>

Genus 900. *Limosella* L. - Лужница

3583. *L. aquatica* L. - Л. водяная = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Кисл,ВС): (Плюрирег.); Aa(Т); [Sp.]

Genus 901. *Lindernia* All. - Линдерния

3584. *L. procumbens* (Krock.) Borb. (*L. puxidaria* All.) - Л. распростёртая = I([НД,АЕ: Флора Нижнего Дона, 1985],[Тем: Галушко, 1980]): (Палеаркт.); Aa(Т); [R.]

Genus 902. *Paederotella* (E.Wulf) Kem.-Nath. - Педеротелля <GTC>

3585. *P. pontica* (Rupr. ex Boiss.) Kem.-Nath. - П. понтийская = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(НК); [R.]

3586. *P. teberdensis* Kem.-Nath. - П. тебердинская = III(ТЗ): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Do(НК); [R.] <Es> l.c. окр. Теберды

3587. *P. daghestanica* (Trautv.) Kem.-Nath. - П. дагестанская = V(ЦД): (Кавк.: Эукавказ.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. Дагестан (?)

Genus 903. *Veronica* L. - Вероника

3588. *V. spicata* L. - В. колосистая = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп): (Палеаркт.); ST(К); [Sp.]

3589. *V. orchidea* Crantz - В. орхидная = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); II(Кизл); III(Ст,Куб,СКТ,Э,ВК); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Европ.); Pa(НК); [Sp.]

3590. *V. spuria* L. (*V. paniculata* L.) - В. ненастоящая = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Куб,ЧК,СК,Э): (Евро-Сиб.); Aa(К); [R.]

3591. *V. longifolia* L. - В. длиннолистная = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,П,Каб,УН,Ч): (Палеаркт.); Aa(НК); [R.]

3592. *V. incana* L. - В. седая = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Евро-Сиб.); **ST**(К); [Sp.] <Po>
3593. *V. gentianoides* Vahl - В. горечавковая = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Субкавказ*.); Pa(НК); [Pl.]
3594. *V. charadzeae* Kem.-Nath. - В. Харадзе = **III**(ОС,ВС): (Кавк.: Эукавказ.); Pb(НК); [R.] <Esub>
3595. *V. schistosa* E.Busch - В. щербнистая = **III**(Б - верх. Уруха,ОС - верх. Ардона и Терека): (Кавк.: Эукавказ.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub>
3596. *V. serpyllifolia* L. - В. тимьянолистная = **I**(НК); **III**(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П); **IV**(СЗЗ): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]
3597. *V. monticola* Trautv. - В. горная = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,П,Кисл); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [R.]
3598. *V. minuta* С.А.Мей. - В. мелкая = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [Pl.]
3599. ★*V. bogosensis* Tumadzhyanov - В. богосская = **III**(ВС); **V**(АС): (Кавк.: Эукавказ.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Es> l.c. Дагестан, Богосский хр.
3600. *V. anagallis-aquatica* L. - В. ключевая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); Aa,Ab(К); [Pl.] <Pm>
3601. *V. anagalloides* Guss. - В. ложноключевая = **I**(ЗП); **III**(Куб,П,Каб); **IV**(Н): (Общедр.средиз.); Aa(НК); [R.]
3602. *V. beccabunga* L. - В. поточная = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pm>
3603. *V. petraea* (Bieb.) Stev. - В. каменная = **III**(ЦЭ,Б,УН,ОС); **V**(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Pc,Do(НК); [R.] <Esub>
3604. *V. propinqua* Boriss. - В. близкая = **III**(ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub>
3605. *V. glabrifolia* Boriss. (*V. borissovae* Holub) - В. гололистная = **III**(Л,УН): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Do(НК); [R.] <Es> l.c. Балкария (?)
3606. *V. officinalis* L. - В. лекарственная = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Палеаркт.); S(НК); [R.]
3607. *V. magna* M.Fisch. (*V. melissifolia* Desf. ex Poir.) - В. крупная = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп - Гильяр: Муртазалиев, 2009): (Субкавказ*.); S(К); [Sp.]
3608. *V. peduncularis* Bieb. - В. цветоножковая = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Субкавказ*.); S(НК); [Pl.]
3609. *V. umbrosa* Bieb. - В. теневая = **I**(Тем,Т); **III**(Куб,КР,ВЛ,ТЗ,П,Кисл,Каб,Л,УН,Ч): (Субкавказ*.); S(НК); [Sp.]
3610. *V. chamaedrys* L. - В. дубравная = **I**(АК,КЕ); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); S,Pa(К); [Pl.] <Pm>
3611. *V. caucasica* Bieb. - В. кавказская = **III**(ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Pb(НК); [Pl.] <Esub>
3612. ★*V. filifolia* Lipsky - В. нителестная = **IV**(Н): (Кавк.: Эукавказ.); Da(К); [R.] <Es> l.c. окр. г. Новороссийска
3613. *V. scutellata* L. - В. щитковая = **III**(Ст,Куб): (Голаркт.); Aa,Ab(НК); [R.]

3614. *V. teucrium* L. - В. широколистная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н): (Палеаркт.); S,Pa(К); [Pl.] <Pm>
3615. *V. prostrata* L. - В. простёртая = I(АК - Кубань); III(Куб,ЧК,КР,ТЗ,Э,Б,ОС,Ч): (Палеаркт.); Pa,ST(НК); [R.]
3616. *V. jacquinii* Baumg (*V. austriaca* L.) - В. Жаквина = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЧК,КР,СКТ,Э); IV(СЗЗ): (Субкавказ*.); ST(К); [Sp.]
3617. *V. multifida* L. - В. многораздельная = I(Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЧК,КР,ТЗ,СКТ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Субтуран*.); ST,Da(НК); [Sp.]
3618. *V. orientalis* Mill. - В. восточная = III(Ст,ЧК,КР,Э,ОС); IV(Н); V(АС: Муртазалиев, 2009): (Субкавказ*.); ST,Da(НК); [R.] <Pr>
3619. *V. crista-galli* Stev. - В. петуший гребень = III(ЧО); V(БН,Касп): (Субкавказ*.); Rb(Т:eph); [R.]
3620. *V. biloba* L. - В. двулопастная = III(Б); V(ЦД,АС): (Ирано-Туран.); Rb(Т:eph); [R.]
3621. *V. acinifolia* L. - В. душевколистная = I(Т); III(КР); IV(Н): (Общедр.средиз.); Pa,Rb(Т:eph); [R.]
3622. *V. ceratocarpa* С.А.Меу. - В. рогоплодная = III(СК - Кума); V(Дар): (Субкавказ*.); Pa(Т:eph); [R.]
3623. *V. arvensis* L. - В. полевая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); ST,Ra(Т:eph); [Sp.]
3624. *V. verna* L. - В. весенняя = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,ТЗ,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Палеаркт.); ST,Db(Т:eph); [Sp.]
3625. *V. dillenii* Crantz - В. Дилленя = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Куб,СК,П,ЦЭ): (Палеаркт.); ST,Da(Т:eph); [Sp.]
3626. *V. hederifolia* L. - В. плющелистная = III(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН): (Палеаркт.); Ra,Rb(Т:eph); [Pl.]
3627. *V. triphyllus* L. - В. трёхлистная = I(ЗПМ,АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ,НК,М); III(Ст,Куб,СК); IV(Н): (Зап.др.средиз.); ST(Т:eph); [Sp.]
3628. *V. praesox* All. - В. ранняя = I(Прик,ТБ,НК,М); II(КН); III(Ст,Куб,КР,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Средиземн.); ST(Т:eph); [Sp.]
3629. *V. agrestis* L. - В. пашенная = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Европ.); Rb(Т:eph); [R.]
3630. *V. polita* Fries (*V. didyma* Ten.) - В. изящная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Ra,Rb(Т:eph); [Pl.]
3631. *V. persica* Poir. (*V. tournefortii* Gmel.) - В. персидская = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(Т:eph); [Pl.]
3632. *V. filiformis* Smith - В. нитевидная = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); S,Pa(Т:eph); [Sp.]

Genus 904. *Digitalis* L. - Наперстянка

3633. *D. schischkinii* Ivanina - Н. Шишкина = III(ЧК,ВЛ); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавказ.); S(НК); [Pl.] <Pt>
3634. *D. grandiflora* Mill. - Н. крупноцветковая = III(ЧК,ВЛ,ТЗ, Кисл,ЦЭ); IV(ТА): (Европ.); S,Pa(НК); [Sp.] <Pt>

3635. *D. ciliata* Trautv. - Н. реснитчатая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb(НК); [Sp.] <Esub> <Pm;Pt>

Genus 905. *Melampyrum* L. - Марьянник

3636. *M. chlorostachium* Beauverd - М. желтоколосый = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Т:hpar); [R.] <Esub>

3637. *M. elatius* (Boiss.) Soo - М. высокий = III(П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ): (Эвксин.); Pa(Т:hpar); [Sp.]

3638. *M. arvense* L. - М. полевой = I(ЗП,Прик,НК); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); Pa(Т:hpar); [Pl.] <Pmel>

3639. *M. argyrosomum* (Fisch. ex Ledeb.) K.-Pol. - М. серебристоохотлатый = III([Ст,П]: Попова, 1980,Кисл): (Европ.); ST(Т:hpar); [R.]

3640. *M. caucasicum* Bunge - М. кавказский = III(Ст,ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(БН: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Pb(Т:hpar); [R.]

3641. *M. mulkijanianii* T.N.Por. - М. Мулкиджаняна = (III(Б,ОС,ВС); V(АС)): Попова, 1980): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc(Т:hpar); [R.] <Esub>

3642. *M. cristatum* L. - М. гребенчатый = I(М - ст.Наурская: Галушко, 1980): (Европ.); Pa,Rb(Т:hpar); [R.] <Rg>

Genus 906. *Euphrasia* L. - Очанка

3643. *E. pectinata* Ten. (*E. tatarica* Fisch. ex Spreng.) - О. гребенчатая = I(АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(Дар): (Палеаркт.); Pa(Т:hpar); [Pl.]

3644. *E. caucasica* Juz. - О. кавказская = III(ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(Т:hpar); [Sp.]

3645. *E. hirtella* Jord.ex Reut. - О. волосистенькая = III([Ст: Галушко, 1980],Х,ЧК,ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb(Т:hpar); [Sp.]

3646. *E. petiolaris* Wettst. - О. черешковая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,УН,Ч,ВС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(Т:hpar); [Sp.]

3647. *E. macrodonta* Juz. - О. крупнозубая = III(ВЛ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Т:hpar); [R.] <Es> l.c. ст. Псебайская

3648. *E. alboffii* Chabert - О. Альбова = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(Т:hpar); [R.] <Ee> l.c. хр. Санчаро, г. Чебых.

3649. *E. amblyodonta* Juz. - О. тупозубая = III(Кисл,ЦЭ,Л,Б.); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(Т:hpar); [Sp.]

3650. *E. adenocaulon* Juz. - О. железистостебельная = III(Б - Черек Безенгийский: Портениер, 2012): (Кавк.: Эукавк.); DoPb(Т:hpar); [R.] <Esub>

3651. *E. ossica* Juz. - О. осетинская = (III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); V(АС)): Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc(Т:hpar); [R.] <Esub>

3652. *E. daghestanica* Juz. - О. дагестанская = V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc(Т:hpar); [Sp.] <Es> l.c. а. Куруш

Genus 907. *Parentucella* Viv. - Парентучелла

3653. *P. latifolia* (L.) Caruel - П. широколистная = IV(ТА); V(Касп): (Вост.средиз.); ST(Т:hpar); [Sp.]

Genus 908. Ornanthella Rauschert - Орнантелла <GD>

3654. *O. lutea* (L.) Rauschert (*Orphantha lutea* (L.) A.Kerner ex Wettst.) - О. жёлтая = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); III(Ст,П,Каб,ЧО); V(Касп): (Понтич.); Pa(T:hpar); [R.]

Genus 909. Macrosyringion Rothm. - Макросирингион <GD>

3655. *M. glutinosum* (Bieb.) Rothm. (*Odontites glutinosa* (Bieb.) Benth.) - М. клейкий = III(ЦЭ - Эльбрус): (Вост.средиз.); ST(T:hpar); [R.]

Genus 910. Odontites Lutw. - Зубчатка

3656. *O. vulgaris* Moench (*O. rubra* (Baumg.) Opiz; *O. serotina* (Lam.) Dumort.) - З. обыкновенная = I(ЗП,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЧК,ТЗ,СК,П,Кисл,Каб,ЧО,Л); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Pa,Rb(T:hpar); [Sp.]

Genus 911. Bellardia All. - Беллардия

3657. *B. trixago* (L.) All. - Б. обыкновенная = V(Касп - Дербент, Рубас): (Вост.средиз.); Pa(T:hpar); [R.]

Genus 912. Rhinanthus L. - Погремок

3658. *Rh. minor* L. (*R. nigricans* Meinsh.) - П. малый = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); Pa,Pb(T:hpar); [Pl.]

3659. *Rh. vernalis* (N.Zing.) Schischk. et Serg. (*Rh. aestivalis* (N.Zing.) Schischk. et Serg.; *Rh. angustifolius* C.C.Gmel.) - П. весенний = I(НД,ЗПМ,АЕ,М); III(Ст,ВЛ,ТЗ,СК,Э,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Евро-Сиб.); Pa(T:hpar); [Pl.]

3660. *Rh. colchicus* Vass. - П. колхидский = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(T:hpar); [R.]

3661. *Rh. schischkinii* Vass. - П. Шишкина = III(ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(T:hpar); [Sp.] <Es>

3662. *Rh. subulatus* (Chabert) Soo - П. шиловидный = III(П,Каб,ТС,ЧО,Л,УН,Ч): (Кавк.: Общекавк.); Pa,ST(T:hpar); [Sp.] I.с. п. Псебай

Genus 913. Pedicularis L. - Мытник

3663. *P. caucasica* Bieb. - М. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Субкавк*); Pc,Do(НК:hpar); [Sp.]

3664. *P. armena* Boiss. et Huet - М. армянский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(ЦД,АС): (Субкавк*); Pb,Pc(НК:hpar); [R.]

3665. *P. pontica* Boiss. - М. понтийский = III(ВЛ): (Кавк.: Эукавк.); Pc(НК:hpar); [Rs.] <Esub>

3666. *P. condensata* Bieb. - М. сжатый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(АС): (Субкавк*); Pb,Pc(НК:hpar); [Pl.]

3667. *P. tatianae* Bordz. - М. Татьяна = III(ВЛ,ТЗ,Б); V(АС - пер. Харамы): (Кавк.: Эукавк.); Pc(НК:hpar); [R.]

3668. *P. atropurpurea* Nordm. - М. чёрно-пурпуровый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК:hpar); [R.]

3669. *P. ranjutinii* E.Busch - М. Панютин = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc(НК:hpar); [R.] <Esub> I.с. верх. Теберды

3670. *P. balkharica* E.Busch - М. балкарский = III(Кисл,Л,УН): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc(НК:hpar); [Sp.] <Es>

3671. *P. willhelmsiana* Fisch. ex Bieb. - М. Вильгельмса = III(ВЛ,ТЗ,Э,Л,Б,ОС); IV(ТА): (Субкавк*); Pb(НК:hpar); [Sp.] I.с. Бештау

3672. *P. subrostrata* C.A.Mey. - М. почти-носатый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); (Кавк.: Эукавк.); Pс(НК:hpar); [Sp.] <Esub>
3673. *P. crassirostris* Bunge - М. толстоносый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС); (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК:hpar); [Pl.]
3674. *P. nordmanniana* Bunge - М. Нордмана = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС); (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК:hpar); [Pl.]
3675. *P. dasystachys* Schrenk - М. мохнатоколосый = I(АЕ - пос. Конезавод: **КК Ростовской области, 2014**); (Евро-Сиб.); Dс(НК); [R.]
3676. *P. daghestanica* Bonati - М. дагестанский = III(Каб,ЧО,Ч); V(БН,ЦД); (Кавк.: Эукавк.); Pa(НК:hpar); [Sp.] <Ee> I.c. окр. с. Бетли
3677. *P. chroorrhyncha* Vved. (*P. sibthorpii* auct. fl. cauc.) - М. окрашенноклювый = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Дар); (Вост.средиз.); Pb,Pс,Do(НК:hpar); [Pl.]
3678. *P. palustris* L. - М. болотный = III(ЧК - Кубань,Кисл - Кисловодск); (Евро-Сиб.); Aa(T:hpar); <Rg>
3679. *P. kaufmannii* Pinzg. - М. Кауфмана = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,СКТ,П); (Понт.-Южносиб.); Pa(НК:hpar); [Pl.]

Genus 914. *Symbocasma* (Endl.) Klok. et Zoz - Цимбохазма <GM>

3680. ★*S. borysthenica* (Pall. ex Schlecht.) Klok. et Zoz - Ц. днепровская = I(ЗПМ - х. Казачий Веселовского р-на); (Понтич); ST(НК); [Rs.]

Genus. 915. *Rhynchocorys* Griseb. - Хоботник

3681. *Rh. elephas* (L.) Griseb. - Х. слоновый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС); (Вост.средиз.); Pb,Pс(К); [Sp.]
3682. *Rh. orientalis* (L.) Benth. - Х. восточный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Дар); (Кавк.: Общекавк.); Pb(Т); [Sp.]
3683. *Rh. stricta* (C.Koch) Griseb. - Х. торчащий = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС,ВС); IV(ТА); (Кавк.: Общекавк.); Pb,Aa(Т); [Sp.]

Genus 916. *Lathraea* L. - Петров крест

3684. *L. squamaria* L. - П.к. чешуйчатый = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Дар); (Палеаркт.); S(НК:par); [Pl.]

Genus 917. *Paulownia* Ziebold et Zucc. - Павловния (Адамово дерево)

3685. *P. tomentosa* (Thunb.) Steud. (*Bignonia tomentosa* Thunb., *Incarvillea tomentosa* Spring.) - П. войлочная, Адамово дерево = IV(ТА); (Адвент. [Центр. Китай]); S(Phms); [R.]

Familia 170. *Martyniaceae* Stapf - Мартиниевые

Genus 918. *Proboscidea* Schmidel - Пробосцидея

3686. *P. louisiana* (Mill.) Thell. - П. луизианская = I(АК,КЕ,Тем,Т); II(Кизл); III(Ст,ЧО); V(Касп); (Адвент. [Сев.Америка]); Ra,Rb(Т); [R.]

Familia 171. *Orobanchaceae* Vent. - Заразиховые

Genus 919. *Diphelipaea* Nicolson - Дифелипея

3687. *D. coccinea* (Bieb.) Nicolson (*Phelypaea coccinea* (Bieb.) Poir.) - Д. красная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЧК,КР,Х,ТЗ,СКТ,П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Дар); (Субкавк*.); Pa(К:par); [Sp.]

Genus 920. *Phelipanche Pomel* - Фелипанхе

3688. *Ph. purpurea* (Jacq.) Sojak (*Orobancha purpurea* Jacq.) - Ф. пурпурная = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб,ЧК,КР,ТЗ,СКТ,П, Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп,ЦД): (Палеаркт.); ST(К:par); [Sp.]

3689. *Ph. pulchella* (С.А.Мей.) Holub (*O. pulchella* (С.А.Мей.) Novopokr.) - Ф. красивенькая = **V**(АС - с. Хлут: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pa(К:par); [R.]

3690. *Ph. mutelii* (F.Schultz) Czer. (*O. mutelii* F.Schultz) - Ф. Мутеля = **I**(НД); **III**(Куб,ЧК,П,ЧО); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Зап.др.средиз.); ST(Т:par); [Sp.]

3691. *Ph. dalmatica* (G.Beck) Sojak (*O. dalmatica* (G.Beck) Tzvel.) - Ф. далматская = **I**(Т); **III**(КР,П,ЧО); **IV**(СЗЗ): (Эвксин.); ST(НК:pb:par); [R.]

3692. *Ph. oxyloba* (Reut.) Sojak (*O. nana* (Reut.) Noe ex G.Beck) - Ф. остролопастная = **I**(АК,КЕ,Тем,Т); **III**(Куб,КР,ЧО); **IV**(СЗЗ); **V** (Касп - Тарки-Тау: Муртазалиев, 2009): (Зап.др.средиз.); ST(Т:par); [R.]

3693. *Ph. ramosa* (L.) Pomel (*O. ramosa* L.) - Ф. ветвистая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СКТ,П); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Субсредиз*.); Ra,Rb(Т:par); [Sp.] <Pm>

3694. *Ph. laevis* (L.) Holub (*O. arenaria* Borkh) - Ф. гладкая = **I**(НД,Тем,Т); **II**(Кизл); **III**(Ст,СК,П,ЧО); **V**(БН,Касп): (Понт.-Южносиб.); ST(К:par); [R.]

3695. *Ph. lanuginosa* (С.А.Мей.) Holub (*O. lanuginosa* (С.А.Мей.) Greuter et Burdet; *O. caesia* Reichenb.) - Ф. голубая = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,СК,П,Кисл,Каб,ЧО); **V**(Дар): (Палеаркт.); ST(К:par); [Sp.]

Genus 921. *Orobancha L.* - Заразиха

3696. *O. coerulescens* Steph. - З. синеватая = **I**(Тем,Т); **III**(Ст,Куб,П, Кисл,СКТ); **V**(Касп): (Палеаркт.); ST(К:par); [Sp.]

3697. *O. cernua* Loefl. - З. поникшая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СКТ,П); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Зап.др.средиз.); Pa,Ra(К:par); [Sp.]

3698. *O. cumanica* Wallr. - З. подсолнечниковая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СКТ,П); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Палеаркт.); Pa,Rb(Т:par); [Sp.]

3699. *O. gamosepala* Reut. - З. сростночашелистиковая = **III**(ВЛ,ТЗ, Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К:par); [Sp.] l.c. Машук

3700. *O. lutea* Baumg. - З. люцерновая = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб, ЧК,КР,ТЗ,СКТ,Э,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Палеаркт.); Pa(К:par); [Sp.]

3701. *O. caryophyllacea* Smith (*O. vulgaris* Poir.) - З. гвоздичная = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Зап.др.средиз.); Pa,ST(К:par); [Sp.]

3702. *O. alba* Steph. - З. белая = **III**(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(ЦД,АС): (Зап.др.средиз.); Pa(К:par); [Pl.]

3703. *O. reticulata* Wallr. - З. сетчатая = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субсредиз*.); Pa,Pb(К:par); [R.]

3704. *O. raddeana* G.Beck - З. Радде = **III**(ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb,Pc(К:par); [Sp.]

3705. *O. crenata* Forrsk. (*O. owerinii* (G.Beck) G.Beck) - З. городчатая = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Субкавк*.); S,Pa(К:par); [Sp.]

3706. *O. picridis* F.Schultz - З. горчачковая = I(НД); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(БН,ЦД,АС): (Евро-Кавк.); ST(К:par); [R.]
3707. *O. minor* Smith - З. малая = (III(ВЛ); IV(ТА)): [Зернов, 2006](#)): (Евро-Кавк.); Pb,Рс(К:par); [R.]
3708. *O. hederæ* Loefl. - З. плющевая = IV(СЗЗ); V(Касп - Самур: [Муртазалиев, 2009](#)): (Субсредиз*.); S(К:par); [R.]
3709. *O. grossheimii* Novopokr. - З. Гроссгейма = III(ВЛ,ТЗ,Б,ОС,ВС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К:par); [Sp.]
3710. *O. elatior* Sutt. (*O. major* L. p.p. nom. abig.) - З. высокая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Палеаркт.); ST(К:par); [R.]
3711. *O. flava* C.Mart. ex F.Schultz - З. жёлтая = III(ВЛ,УН); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); S(К:par); [R.]
3712. *O. inulae* Novopokr. et Abramov - З. девясилловая = III(ЧК,ТЗ,Э,Б,Л,УН,Ч); V(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К:par); [Sp.]
3713. *O. alsatica* Kirschl. - З. эльзасская = III(ТЗ,Э,Л,УН,Б,Ч); V([Касп - Чиркей, Джавгат]: [Муртазалиев, 2009](#)): (Палеаркт.); Pa(К:par); [Pl.]
3714. *O. ingens* (Beck.) Tzvel. - З. значительная = IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К:par); [R.] l.c. Кумух
3715. *O. gracilis* Smith - З. тонкая = V([ЦД,АС - Эрпели, Тинди, Хуштада]: [Муртазалиев, 2009](#)): (Субсредиз*.); Pb(К:par); [R.]
3716. *O. colorata* C.Koch - З. покрашенная = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,ЧК,П,Л,Ч); IV(ТА); V(БН,Касп,ЦД): (Субкавк*.); S(К:par); [R.]

Familia 172. Lentibulariaceae Rich. - Пузырчатковые

Genus 922. Pinguicula L. - Жирянка

3717. *P. vulgaris* L. - Ж. обыкновенная = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Голаркт.); Pb,Рс,Аа(НК:pi); [R.]

Genus 923. Utricularia L. - Пузырчатка

3718. *U. vulgaris* L. - П. обыкновенная = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,МД,НК,М); II(ВП); III(Ст,Куб,ЧК,ВЛ,ТЗ,ВС); IV(ТА); V(Касп): (Голаркт.); Ac(T:pi); [R.]
3719. *U. australis* R.Br. (*U. major auct.*) - П. южная = I(Тем); III(МА - Краснодар): (Европ.); Ac(T); [Rs.] <Rg>

Familia 173. Globulariaceae DC. - Шаровницевые

Genus 924. Globularia L. - Шаровница

3720. ★*G. punctata* Lapeyr. (*G. elongata Hegetschw.*) - Ш. пятнистая = I(Прик); III(Ст): (Зап.др.средиз.); Db(НК); [Rs.] <Rx>
3721. ★*G. trichosantha* Fisch. et C.A.Mey. - Ш. волосоцветковая = III(ВЛ - Оштен): (Зап.др.средиз.); Рс(НК); [Rs.] <Rx>

Familia 174. Plantaginaceae Juss. - Подорожниковые

Genus 925. Plantago L. - Подорожник

3722. *P. major* L. - П. большой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плюрирег.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

3723. *P. tenuiflora* Waldst. et Kit. - П. тонкоколосый = **I(ЗП,ЦП); II(Кизл); V(Касп):** (Палеаркт.); Db,Dc(НК); [Sp.]
3724. *P. cornuti* Gouan - П. Корнута = **I(НД,ЗПМ,АЕ,ЦП); II(КН):** (Палеаркт.); Dc(НК); [R.]
3725. *P. coronopus* L. - П. перистый = **I(АК); V(Касп):** (Общедр.средиз.); Db,Dc(T); [R.]
3726. *P. media* L. - П. средний = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
3727. *P. urvillei* Opiz (*P. stepposa* Kuprian.) - П. Урвиля = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Понт.-Южносиб.); ST,Rb(НК); [Sp.]
3728. *P. maxima* Juss.ex Jacq. - П. крупный = **I(ЗП,ЦП); III(СК):** (Евро-Сиб.); Dc(НК); [R.]
3729. *P. lanceolata* L. - П. ланцетолистный = **I(АК,КЕ,Тем,Т, Прик,ТБ,НК); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Плюрирег.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
3730. *P. lagopus* L. - П. заячий = **IV([Н - Утриш, ТА - р. Псоу]:** **КК Краснодарского края, 2017):** (Европ.); Db(НК); [R.]
3731. *P. salsa* Pall. - П. солончаковый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); IV(Н); V(Касп):** (Плюрирег.); Dc(НК); [Sp.]
3732. *P. caucasica* Parava - П. кавказский = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [Sp.]
3733. *P. saxatilis* Vieb. - П. скальный = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [Pl.]
3734. *P. intermedia* DC. - П. промежуточный = **I(НД,ЗПМ,АЕ):** (Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>

Genus 926. Psyllium Hill - Псиллиум

3735. *P. scabrum* (Moench) Holub (*Plantago arenaria* Waldst. et Kit.; *P. indica* L.) - П. шершавый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст); IV(Н); V(Касп):** (Общедр.средиз.); Db(T:eph); [Pl.]

Ordo 102. Rubiales - Мареноцветные

Familia 175. Rubiaceae Juss. - Мареновые

Genus 927. Sherardia L. - Жерардия

3736. *Sh. arvensis* L. - Ж. полевая = **I(Тем); III(Куб,КР); IV(СЗЗ); V(БН,Касп):** (Палеаркт.); S,Pa(T); [Sp.]

Genus 928. Crucianella L.- Крестовница

3737. *C. angustifolia* L. - К. узколистная = **I(T); III(КР,СК,П); IV(Н):** (Средиземн.); Da(T:eph); [R.]

Genus 929. Asperula L. - Ясменник

3738. *A. molluginoides* (Bieb.) Reichenb. (*Crucianella molluginoides* Bieb.) - Я. моллюгообразный = **III(Куб,Э,Тер); IV(ТА); V(Касп,ЦД):** (Субкавк*.); Pa,Do(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск
3739. *A. prostrata* (Adams) C.Koch - Я. простёртый = **III(ВЛ); IV(ТА); V(АС: Муртазалиев, 2009):** (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [R.]

3740. *A. albovii* Manden. - Я. Альбова = **III(Ч)**; **IV(ТА)**; **V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Андийский хр.
3741. *A. glomerata* (Bieb.) Griseb. - Я. скученный = **V(ЦД,АС)**: (Субкавк*.); Pб,Pс,Do(НК); [Sp.]
3742. *A. caucasica* Pobed. - Я. кавказский = **III(Ст,КР,Х,ВЛ)**; **IV(СЗЗ)**: (Субкавк*.); S(НК); [R.]
3743. *A. odorata* L. (*Galium odoratum* (L.) Scop.) - Я. душистый = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК)**; **IV(СЗЗ)**; **V(Даг)**: (Палеаркт.); S(К); [Pl.] <Pm>
3744. *A. stevenii* V.Krecz. - Я. Стевена = **I(АК,КЕ,Тем,Т,[ТБ,НК: Михеев, 1992])**; **II(ВП)**; **III(Ст,Куб,ЧК)**; **IV(Н)**: (Понтич.); Da,Db(Ch:sf); [R.]
3745. *A. lipskyana* V.Krecz. (*A. markothensis* Klok.) - Я. Липского = **III(КР,ВЛ - Уруп)**; **IV(Н)**: (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Ee> l.c. Новороссийск
3746. *A. biebersteinii* V.Krecz. - Я. Биберштейна = **III(Ст,П,Кисл,ЧК,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС)**; **V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [Sp.] l.c. Пятигорск <Esub>
3747. *A. dasyantha* Klok. - Я. опушённоцветковый = **III(ВС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Do(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. окр. Владикавказа
3748. *A. accrescens* Klok. - Я. возросший = **III(ТЗ - верх. Урупа)**: (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Do(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. г. Ацгара
3749. *A. pedicellata* Klok. - Я. цветоножковый = **III(П - Бештау)**; **V(Даг?)**: (Кавк.: Предкавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. Бештау
3750. *A. vestita* V.Krecz. - Я. шерстеносный = **IV(Н)**: (Кр.-Новоросс.); Da(Ch:sf); [R.]
3751. *A. cristata* (Somm. et Levier) V.Krecz. - Я. гребенчатый = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч)**; **IV(ТА)**; **V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Ch:sf); [Pl.] <Esub> l.c. г. Эльбрус
3752. *A. alpina* Bieb. - Я. альпийский = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС)**; **V(Даг)**: (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Do(Ch:sf); [Pl.] <Esub>
3753. *A. abchasica* V.Krecz. - Я. абхазский = (**III(ВЛ,ТЗ)**; **IV(ТА - г. Ачишхо)**): **Литвинская, Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Esub>
3754. *A. intersita* Klok. - Я. межуточный = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ)**; **IV(ТА)**: (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Do(Ch:sf); [Sp.] <Ee>
3755. *A. graveolens* Bieb. ex Schult. et Schult. fil. - Я. пахучий = **I(НД,НК)**; **II(КН: Михеев, 1992)**; **V(Касп - р. Шура-озень: Муртазалиев, 2009)**: (Понтич.); Db(Ch:sf); [R.]
3756. *A. diminuta* Klok. - Я. уменьшенный = **I(МД,АИ,НК,М)**; **II(ВП)**; **V(Касп)**: (Кавк.: Предкавк.); Db(Ch:sf); [Sp.] l.c. Кумторкале
3757. *A. rivalis* Sibth. et Smith (*G. rivale* (Smith) Griseb.) - Я. ручейный = **I(НД,ЗПМ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК)**; **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК)**; **IV(СЗЗ)**; **V(Даг)**: (Европ.); Pa(НК); [Sp.]
3758. *A. octonaria* Klok. (*G. octonarium* (Klok.) Soo) - Я. восьмилистный = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,ЦП)**; **II(ВП: Муртазалиев, 2009)**; **III(Ст,СК)**: (Субпонт*.); ST(К); [Sp.]

3759. *A. galioides* Bieb. (*G. biebersteinii* Ehrend.) - Я. подмаренниковый = I(АК,КЕ,Тем,Т); II(ВП: Михеев, 1992); III(Ст,Куб,КР,СК,Э,ОС,ВС): (Понтич.); ST(НК); [Pl.]
3760. *A. humifusa* (Bieb.) Bess. (*G. humifusum* Bieb.) - Я. распростёртый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Вост.средиз.); ST,Rb(К); [Pl.]
3761. *A. arvensis* L. - Я. полевой = I(АК,КЕ,Тем,Т,М); II(КН); III(СК,ТС); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,[ЦД - Кумух: Муртазалиев, 2009]): (Средиземн.); Pa(Т); [Sp.]
3762. *A. setosa* Jaub. et Spach - Я. щетинистый = I(Т); II(Кизл); V(Касп): (Ирано-Туран.); Rb(Т); [Sp.]
3763. *A. orientalis* Boiss. et Hohen. (*A. azurea* Jaub. et Spach.) - Я. восточный = V(Касп,ЦД - Ахты: Муртазалиев, 2009): (Армено-Иран.); Da(Т); [R.]
3764. *A. taurica* Paczoski - Я. крымский = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [R.] <Rx>
3765. *A. gracilis* С.А.Мей. - Я. изящный = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Es> l.c. верх. Малки
3766. *A. cynanchica* L. - Я. розоватый = I(НД): (Понтич.); ST,Da(НК); [Sp.]
- Genus 930. Galium L. - Подмаренник**
3767. *G. tricornutum* Dandy (*G. rticorne* Stokes) - П. трёхрогий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Ra,Rb(Т); [Sp.]
3768. *G. aparine* L. (*G. spurium* L.; *G. ibicinum* Boiss. et Hausskn) - П. цепкий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); Pa,Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pm>
3769. *G. tenuissimum* Bieb. - П. тончайший = I([ЗП,ЦП]; II(ВП: Михеев, 1992); III(Ст,Куб,КР,Х,ВЛ,ТЗ,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Субтуран*.); Pa,ST,Da(Т); [Sp.]
3770. *G. transcausicum* Stapf - П. закавказский = V(Касп): (Туранск.); ST(Т); [R.]
3771. *G. verticillatum* Danth. - П. мутовчатый = III(ЧК,КР,Х,ВЛ,П,Кисл,Л,УН,ОС); IV(Н); V(БН,Касп): (Субсредиз*.); Da(Т); [R.]
3772. *G. verum* L. - П. весенний = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST(К); [Pl.] <Pm>
3773. *G. palustre* L. - П. болотный = I(М); II(Кизл - Кизилюрт: Муртазалиев, 2009); III(Каб); V([ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009): (Голаркт.); Pa,Pb,Aa(К); [Sp.]
3774. *G. saturejifolium* Trev. - П. чаберолистный = II(ВП: Михеев, 1992): (Туранск.); Pa(К); [R.]
3775. *G. elongatum* С.Presl. - П. вытянутый = I([Тем,Т]: Зернов, 2006): (Средиземн.); Aa(К); [R.]
3776. *G. uliginosum* L. - П. топяной = III(Ст,ЦЭ); V(АС: Муртазалиев, 2009): (Евро-Сиб.); Aa(К); [R.] <Rg>
3777. *G. rubioides* L. (*G. articulatum* Lam.) - П. мареновидный = I(АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Европ.); S,Pa,Aa(К); [Sp.]

3778. *G. boreale* L. - П. бореальный = V([ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009): (Палеаркт.); Pb(К); [R.]
3779. *G. valantioides* Bieb. - П. валантиевидный = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Da(К); [Pl.] I.c. Кисловодск
3780. *G. flaviflorum* (Trautv.) A.D.Mikheev (*G. aureum* Vis.) - П. желтоцветковый = III(ЗК,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pa, Da(К); [Sp.]
3781. *G. ruthenicum* Willd. - П. русский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); Pa, ST(К); [Pl.]
3782. *G. mollugo* L. - П. мягкий = III(Ст,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВК); IV(СЗЗ): (Голаркт.); Pa, Aa(К); [R.]
3783. *G. album* Mill. (*G. erectum* Huds.) - П. белый = I([ЗП,ЦП]; II(ВП): Михеев, 1992], MA); III(Куб, КР, X); IV(СЗЗ); V(Касп, ЦД): (Субсредиз*.); Pa(К); [R.]
3784. *G. calcareum* (Albov) Pobed. - П. известняковый = III(ВЛ,Б,Л): (Евро-Кавк.); Da(К); [R.] I.c. г. Оштен
3785. *G. grusinum* Trautv. - П. грузинский = V([ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Do(К); [R.]
3786. *G. brachyphyllum* Roem. et Schult. - П. коротколистный = III(Кисл, ЦЭ, Б, ОС, ВС, Ч); V(Касп, ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pb, Pc, Do(К); [Pl.]
3787. *G. pseudorivale* Tzvel. (*Asperula aparine* Bieb.) - П. ложноприручейный = I(НД, ЗПМ); ([III(ВЛ)]; IV(ТА: Зернов, 2006); V(БН): (Субпонт*.); Pa(К); [Sp.]
3788. *G. rotundifolium* L. (*G. scabrum* auct.) - П. круглолистный = III(Х, ВЛ, ТЗ); IV(СЗЗ): (Зап.др.средиз.); S(К); [R.]
3789. *G. fistulosum* Somm. et Levier - П. дудчатый = III(ТЗ, ЦЭ, Б): (Кавк.: Общекавк.); Pc, Do(К); [Sp.]
3790. *G. anfractum* Somm. et Levier - П. извилистый = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ); IV(ТА); V(АС: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pc, Do(НК); [R.]
3791. *G. buschiorum* A.D. Mikheev - П. Бушей = III(Б): (Кавк.: Эукавк.); S(К); [R.] <Es> I.c. Караугомское ущелье
3792. *G. majmechense* Bordz. - П. маймекенский = V(АС: Муртазалиев, 2009): (Субкавк.); Pb(К); [R.]
3793. *G. oshtenicum* Ehrend. et Schanzer ex A.D. Mikheev - П. оштенский = III(ВЛ - гг. Фишт, Оштен: Солодько, Кирий, 2002); (Кавк.: Эукавк.); Da(К); [R.] <Es> I.c. г. Оштен
3794. *G. vartanii* Grossh. - П. Вартана = III(ВЛ - р. Белая: Шанцер, 1989); V([ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009); (Кавк.: Эукавк.); Pc, Do(К); [R.] <Esub>
- Genus 931. Callipeltis Stev. - Каллипельтис**
3795. *C. cucullaria* (L.) Stev. (*C. cucullaris* (L.) Rothm.) - К. капюшончатая = V(Касп - Дербент: Муртазалиев, 2009): (Общ.др.средиз.); Da(Т); [R] <Rx>
- Genus 932. Cruciata Hill - Круциата**
3796. *C. glabra* (L.) Ehrend. (*Galium verum* Scop.) - К. голая = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pa, Pb(НК); [Pl.]

3797. *C. laevipes* Opiz (*G. cruciata* (L.) Scop.) - К. гладенькая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Зап.др.средиз.); Ра(НК); [Pl.] <Pm>

3798. *C. elbrussica* (Pobed.) Pobed (*G. elbrussicum* Pobed.) - К. эльбрусская = **III(ЦЭ - Эльбрус)**: (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Es> л.с. г. Эльбрус

3799. *C. taurica* (Willd.) Soo (*C. chersonensis* (Willd.) Ehrend., *G. tauricum* (Pall. ex Willd.) Roem. et Schult.) - К. крымская = **III(КР,Х,ВЛ,ТЗ,Кисл); IV(НК)**: (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Sp.]

3800. *C. coronata* (Sibth. et Smith) Ehrend. (*C. humifusa* (Willd.) A.D.Mikheev; *G. coronatum* Sibth. et Smith) - К. венечная = **III(ЧК,КР,Ч); IV(Н); V(Касп,ЦД,АС)**: (Субкавк*.); Da(НК); [Sp.]

3801. *C. valentinae* (Galushko) Galushko (*G. valentinae* Galushko) - К. Валентины = **III([ТЗ - Кышкаджер: Воробьёва, Онипченко, 2001],ЦЭ - Хызыны-Су)**: (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Es> л.с. истоки Хызыны-Су

3802. *C. pedemontana* (Bell.) Ehrend. (*G. pedemontanum* (Bell.) All.) - К. пьемонтская = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ,Т); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп,ЦД)**: (Общедр.средиз.); ST(Т); [R.]

3803. *C. pseudopolycarpa* (Somm. et Levier) Pobed. (*G. pseudopolycarpon* Somm. et Levier) - К. ложномногоплодная = **III(ЦЭ - Эльбрус)**: (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Es>

3804. *C. rugosa* (Galushko) Galushko (*G. rugosum* Galushko) - К. морщинистая = **III(ЦЭ)**: (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [Pl.] <Es> л.с. г. Эльбрус, ледник Азау

Genus 933. Rubia L. - Марена

3805. *R. tinctorum* L. (*R. iberica* (Fisch. ex DC.) C.Koch) - М. красильная = **I(НК,М); II(ВП); III(Ст,СК,П); V(БН,Касп)**: (Общедр.средиз.); Rb,Аа(К); [R.]

3806. *R. tatarica* (Trev.) Fr.Schmidt (*Galium tataricum* Trev.) - М. татарская = **I(НД,[ТБ,НК]; II(ВП: Михеев, 1992); III(П)**: (Понт.-Южносиб.); Ра,Аа(НК); [R.]

Ordo 103. Dipsacales - Ворсянкоцветные

Familia 176. Sambucaceae Batsch ex Borkh - Бузиновые

Genus 934. Sambucus L. - Бузина

3807. *S. ebulus* L. - Б. травянистая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Зап.др.средиз.); S,Rb(НК); [Sp.] <Pt;Pm>

3808. *S. nigra* L. - Б. чёрная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Европ.); S,Rb(Phn); [Pl.] <Pm;Pa>

3809. *S. racemosa* L. - Б. кистевидная = **III(СКТ: Шванова, 2008)**: (Европ.); S(Phn); [R.] <Pm>

Familia 177. Viburnaceae Rafin. - Калиновые

Genus 935. Viburnum L. - Калина

3810. *V. lantana* L. - К. гордовина = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Субсредиз*.); S(Phn); [Pl.]

3811. *V. opulus* L. - К. обыкновенная = I(Тем - дельта Кубани); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S(Phn); [Pl.] <Pm;Pa;Pmel>

Familia 178. Caprifoliaceae Juss. - Жимолостевые

Genus 936. Linnaea L. - Линнея

3812. *L. borealis* L. - Л. северная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); S(Ch:sf); [Pl.]

Genus 937. Lonicera L. - Жимолость

3813. *L. buschiorum* Pojark. (*L. coeruleum* auct. fl. cauc.) - Ж. Бушей = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb,Do(Phn): [Pl.]

3814. *L. iberica* Vieb. - Ж. грузинская = II(Кизл); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); ST(Phn); [Sp.]

3815. *L. caucasica* Pall. (*L. orientalis* Lam.) - Ж. кавказская = III(Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S,Do(Phn); [Pl.] <Pmel>

3816. *L. tatarica* L. - Ж. татарская = III(Куб,ЗК,Э,ВК,Тер); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); S(Phn); [Sp.]

3817. *L. steveniana* Fisch. ex Pojark. (*L. xylosteum* auct. fl. cauc.) - Ж. Стевена = III(Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S(Phn); [Pl.] <Pmel>

3818. *L. caprifolium* L. - Ж. каприфоль = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субкавк*.); S(Ch:ll); [Pl.] <Po;Pm;Pmel>

3819. ★*L. etrusca* Santi - Ж. этруская = IV(Н): (Средиземн.); Da(Ch:ll); [R.]

Familia 179. Adoxaceae Trautv. - Адоксовые

Genus 938. Adoxa L. - Адокса

3820. *A. moschatellina* L. - А. мускусная = III(ОС,ВС); IV(ЦД): (Палеаркт.); S,Pb(НК); [R.]

Familia 180. Valerianaceae Batsch - Валериановые

Genus 939. Valeriana L. - Валериана

3821. *V. tuberosa* L. - В. клубненоносная = I(ЗП); III(Ст,СК,П,ТС); IV(Н): (Субтуран*.); Pa(К:ephd); [Sp.]

3822. *V. alliariifolia* Adams - В. чесночницелистная = III(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Эвксин.); Pb(НК); [Sp.]

3823. *V. tiliifolia* Troitzk. - В. липолистная = III(Х,ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [Pl.]

3824. *V. alpestris* Stev. - В. предальпийская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Da,Do(НК); [Pl.]

3825. *V. saxicola* С.А.Меу. - В. скальная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.] l.c. верх. р. Малки

3826. *V. jelenevskyi* P.Smirn. - В. Еленевского = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Л,УН,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.] l.c. пос. Гузерипись

3827. *V. eriophylla* (Ledeb.) Utkin - В. шерстистолистная = III(ВЛ: **Зернов, 2006**), ОС: **Комжа, 2000**): (Кавк.: Общекавк.); Da,Pb(НК); [R.]

3828. *V. cardamines* Bieb. - В. сердечниковая = III(ВЛ,ТЗ,П,Л,УН,Ч); IV(ТА); V(Касп): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Db(НК); [Sp.] <Esub>

3829. *V. kassarica* Charadze et Kapell. - В. кассарская = III(ОС - Ардон, Терек): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. р. Ардон, с. Зарамаг

3830. *V. daghestanica* Rupr. ex Boiss. - В. дагестанская = III(ВС); V(Касп,ЦД); (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); <Esub>

3831. *V. officinalis* L. (*V. grossheimii* Worosch.; *V. wolgensis* Kazak.) - В. лекарственная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Сиб.); S,Pa(К); [Pl.] <Pm>

3832. *V. colchica* Utkin - В. колхидская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК): [Sp.] l.c. г. Аибга

Genus 940. Valerianella Hill - Валерианица

3833. *V. uncinata* (Bieb.) Dufur. - В. крючковатая = III(ВС,Ч); V(БН,Касп): (Субтуран.); ST,Rb(Т:eph); [R.]

3834. *V. sclerocarpa* Fisch. et C.A.Mey. - В. твёрдоплодная = V(Касп - Дербент): (Субтуран.); ST(Т:eph); [R.]

3835. *V. symbocarpa* C.A.Mey. - В. ладьеплодная = V(Касп - [Буйнакск, Дербент]: **Муртазалиев, 2009**): (Субтуран.); ST(Т:eph); [R.]

3836. *V. locusta* (L.) Laterrade (*V. olitoria* (L.) Pollich) - В. колосковая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); V(Н); V(Касп); (Евро-Кавк.); ST,Rb(Т:eph); [Sp.]

3837. *V. costata* (Stev.) Betcke - В. ребристая = I(Т): (Средиземн.); ST(Т:eph); [R.]

3838. *V. dentata* (L.) Poll. - В. зубчатая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп): (Евро-Кавк.); Pa,Rb(Т:eph); [Pl.]

3839. *V. muricata* (Stev. ex Bieb.) J.W.Loud. - В. мягкоигольчатая = I(НК); V(Касп): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(Т:eph); [R.]

3840. *V. carinata* Loisel. - В. килеватая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Субсредиз*.); Ra,Rb(Т:eph); [Pl.]

3841. *V. turgida* (Stev.) Betcke - В. вздутая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понтич.); Db,Rb(Т:eph); [R.]

3842. *V. rimosa* Bast. - В. щелистая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); Pa,Ra,Rb(Т:eph); [R.]

3843. *V. pumila* (L.) DC. - В. маленькая = I(АК,КЕ); II(ВП); III(Ст,СК,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Зап.др.средиз.); ST,Db,Rb(Т:eph); [Sp.]

3844. *V. pontica* Lipsky - В. понтийская = III(КР); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); ST,Rb(Т:eph); [Sp.]

3845. *V. coronata* (L.) DC. - В. увенчанная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Зап.др.средиз.); ST,Rb(Т:eph); [Sp.]

3846. *V. lasiocarpa* (Stev.) Betcke - В. пушистоплодная = **I(ЗП,ЦП); II(Кизл); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Субпонт*.); Da(Т:eph); [R.]**

Genus 941. Pseudobetckea (Hoeck) Lincz. - Псевдобеткея <GMC>

3847. *P. caucasica* (Boiss.) Lincz. - П. кавказская = **III(BC - Шаро-Аргун); V(ЦД,AC): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(Т:eph); [Sp.] <Esub> l.c. верх. р. Тиндинская, а. Акнада**

Familia 181. Dipsacaceae Juss. - Ворсянковые

Genus 942. Knautia L. - Короставник

3848. *K. arvensis* (L.) Coult. - К. полевой = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(ТА); V(Касп): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>**

3849. *K. montana* (Bieb.) DC. - К. горный = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(ЦД,AC): (Кавк.: Общекавк.); S,Pa(НК:pb); [Sp.] l.c. Кисловодск**

3850. *K. involucrata* Somm. et Levier - К. крупнообёртковый = **III(ВЛ,ТЗ,П,Кисл,ВК); IV(ТА); V(ЦД,AC): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК:pb); [Sp.]**

Genus 943. Dipsacus L. - Ворсянка

3851. *D. laciniatus* L. - В. разрезная = **I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Зап.др.средиз.); S,Pa,Аа(НК) [Sp.] <Ро>**

3852. *D. fullonum* L. (*D. sylvestris* Huds.) - В. сукновалов = **I(АК): (Зап.др.средиз.); Pa,Rb(НК:pb); [R.]**

3853. *D. gmelinii* Bieb. - В. Гмелина = **I(НД,АК,КЕ,НК); II(КН): (Субтуран*.); Аа(НК:pb); [R.] l.c. р. Кума, пос. Маджар**

3854. *D. pilosus* L. - В. волосистая = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); S,Pa(НК); [Sp.]**

3855. *D. strigosus* Willd. ex Roem. et Schult. - В. щетинистая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Субпонт*.); S,Аа(НК); [Sp.]**

Genus 944. Cephalaria Schrad. ex Roem. et Schult. - Головчатка

3856. *C. gigantea* (Ledeb.) Bobr. - Г. гигантская = **III(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,AC): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.]**

3857. *C. litvinovii* Bobr. - Г. Литвинова = **III(Ст: Меницкий, 1992): (Понтич.); Pa(НК); [R.] <Rx>**

3858. *C. balkharica* E.Busch - Г. балкарская = **III(Л,Б): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.] <Es> l.c. р. Сукан-Су**

3859. *C. brevipalea* (Somm. et Levier) Litv. (*C. svanetica* Kolak.) - Г. короткочешуйчатая = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>**

3860. *C. calcarea* Albov - Г. меловая = **III(ЦЭ - Хурзук: Меницкий, 2008б): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub>**

3861. *C. coriacea* (Willd.) Steud. - Г. кожистая = **I(АК: Меницкий, 1992); III(ЧК,КР,П,Кисл,УН): (Кр.-Новоросс); Da(НК); [Sp.]**

3862. *C. uralensis* (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. - Г. уральская = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); III(Ст); IV(Н); V(БН,Касп): (Понт.-Южносиб.); Da(НК); [R.]**

3863. *C. media* Litv. - Г. средняя = III(BC); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da,Db(НК); [Sp.]

3864. *C. velutina* Bobr. - Г. бархатистая = III(BC); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); ST, Da(НК); [R.] <Esub>

3865. *C. daghestanica* Bobr. (*C. charadzeae* Schchian) - Г. дагестанская = III(ЦЭ - Баксан, Гижгит, Кисл - Хасаут, Б); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.] <Ee>

3866. *C. microdonta* Bobr. - Г. мелкозубцовая = I(АК: Меницкий, 1992); III(Ст, СК, ТС, ЧО); V(БН, Касп): (Кавк.: Общекавк.); ST(Т); [R.]

3867. *C. transsylvanica* (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. - Г. трансильванская = I(НД, ЗПМ, АЕ, [АК: Меницкий, 1992]); II(ВП); III(Ст, Куб, КР, СК, П, ТС); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субпонт*.); Pa(Т); [Sp.]

3868. *C. syriaca* (L.) Schrad. ex Roem. (*C. transcaucasica* (Bobr.) Galushko) - Г. сирийская = V(Касп): (Средиземн.); Ra, Rb(Т); [Sp.]

Genus 945. Pterocerphalus Adans. - Птероцефалюс

3869. *P. plumosus* (L.) Coult. (*Scabiosa plumosa* (L.) Sm.) - П. перистый = V(Касп, ЦД): (Средиземн.); ST(НК: pb); [R.]

Genus 946. Succisa Hall. - Сивец

3870. *S. pratensis* Moench - С. луговой = III(Куб, ЧК); IV(ТА): (Евро-Сиб.); Aa(НК); [R.] <Pm; Pmel>

Genus 947. Succisella G.Beck - Сукцизелла

3871. *S. inflexa* (Kluk) G.Beck - С. согнутая = III(Куб, ЧК); IV(ТА): (Европ.); Aa(НК); [R.] <Rg>

Genus 948. Scabiosa L. - Скабиоза

3872. *S. isetensis* L. (*S. rupestris* Bieb.) - С. исетская = I(КЕ, Прик); III(Ст): (Субтуран*.); Da, Db(НК); [R.] <Pmel> <Rx> l.c. село Донская Балка

3873. *S. caucasica* Bieb. - С. кавказская = III(ЗК, Э, ВК); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск <Ро; Pmel>

3874. ★ *S. olgae* Albov - С. Ольги = III(ВЛ - гг. Фишт, Оштен); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>

3875. *S. gumbetica* Boiss. - С. гумбетская = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК): [Pl.] <Es> l.c. окр. с. Данух

3876. *S. argentea* L. - С. серебристая = V(Касп - г. Уллутик: Муртазалиев, 2009): (Субкавк*.); Da(НК); [R.]

3877. *S. ucranica* L. - С. украинская = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П); IV(Н); V(Касп, ЦД): (Понтич.); Db(НК: pb); [Pl.] <Pmel>

3878. *S. micrantha* Desf. - С. мелкоцветковая = I([АК, КЕ]: Меницкий, 1992); III(Ст, КР); IV(СЗЗ); V(БН, Касп): (Армено-Иран.); ST(Т); [R.] <Pmel> <Rx>

3879. *S. rotata* Bieb. - С. колесовидная = III(Ст - Ставрополь, Каб, ТС, ЧО, Ч); V(Дар): (Армено-Иран.); ST, SD(Т); [R.] <Rx - Ставрополь>

3880. *S. bipinnata* C.Koch - С. дваждыперистая = III(Куб, Э, Тер); IV(СЗЗ); V(ЦД, АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb, Do(НК); [Pl.] <Pmel>

3881. *S. ochroleuca* L. (*S. georgica* Sulak.) - С. бледно-жёлтая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп,ЦД):** (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.] <Pmel>
3882. *S. imeretica* (Somm. et Levier) Sulak - С. имеретинская = **IV(ТА - Косенко, 1970):** (Кавк.: Эукавк.); Da,Рс(НК); [R.] <Esub>
3883. *S. correvoniana* Somm. et Levier - С. Корревона = **III(ТЗ):** (Кавк.: Эукавк.); Рс(НК); [R.] <Esub>
3884. *S. sosnowskyi* Sulak. - С. Сосновского = **IV(СЗЗ):** (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Sp.]
3885. *S. columbaria* L. - С. голубиная = **V([Касп - Кумторкала, Касумкент]: Муртазалиев, 2009):** (Общ.др.средиз); ST(НК); [R.]
3886. *S. owerenii* Boiss. (*S. alexeenkoana* Sulak.) - С. Оверина = **V(Касп):** (Кавк.: Эукавк.); Рb(НК); [R.] <Esub>

Ordo 104. Cucurbitales - Тыквенноцветные

Familia 182. Cucurbitaceae Juss. - Тыквенные

Genus 949. Thladiantha Bunge - Тладианта

3887. **Th. dubia* Bunge - Т. сомнительная = **III(Ст):** (Адвент. [Юго-Восточная Азия]); Rb(К); [R.]

Genus 950. Bryonia L. - Переступень

3888. *B. alba* L. - П. белый = **I(ЗП,Прик,ТБ,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп):** (Палеаркт.); Rb(К:lh) [Sp.]; <Pm;Pt>
3889. *B. dioica* Jacq. - П. двудомный = **I(АК,КЕ,Тем,Т,МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(Ст); V(Касп):** (Палеаркт.); Rb(К:lh); [R.] <Pm;Pt>

Genus 951. Ecballium A.Rich. - Бешеный огурец

3890. *E. elaterium* (L.) A.Rich. - Б.о. обыкновенный = **I(АК,КЕ,Т,М); II(Кизл); III(Куб); IV(Н); V(Касп):** (Зап.др.средиз.); Rb(НК); [R.] <Pm>

Genus 952. Echinocystis Torrey et Gray - Колючеплодик

3891. *E. lobata* (Michx.) Torr. et Gray - К. лопастный = **III(Ст,Х,ВЛ,Каб,ЧО); IV(Н):** (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(Т); [R.]

Ordo 105. Campanulales - Колокольчиковые

Familia 183. Campanulaceae Juss. - Колокольчиковые

Genus 953. Campanula L. - Колокольчик

3892. *C. maleevii* Fed. - К. Малеева = **I(КЕ - Армавир); II(ВП); III(Ст,СК,П,МА); IV(СЗЗ):** (Кавк.: Эукавк.); Ра(НК); [R.] <Ее> l.c. окр. г. Туапсе
3893. *C. oblongifolioides* Galushko - К. продолговатолистный = **III(ЧК,Кисл,ЦЭ,Л,Б,ОС); V(ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); ST(К); [Sp.]
3894. *C. symphytifolia* (Albov) Kolak. - К. окопниколистный = **IV(ТА):** (Кавк.: Эукавк.); Рb,Рс(К); [R.] <Esub>
3895. *C. trautvetteri* Grossh. ex Fed. - К. Траутфеттера = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Касп,ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); Ра(К); [Pl.]

3896. *C. latifolia* L. - К. широколистный = **III**(ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(ТА): (Европ.); S,Pb(К); [Sp.] <Po>
3897. *C. megrelica* Manden. et Kuth. - К. мегрельский = **IV**(ТА - гора Два Брата): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [Sp.] <Esub>
3898. *C. rapunculoides* L. - К. рапунцелевидный = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп,ЦД,АС): (Евро-Кавк.); S,Pa(К); [Pl.]
3899. *C. cordifolia* C.Koch - К. сердцелистный = **III**(ВЛ,ТЗ,Э); **IV**(ТА): (Субкавк*.); S,Pb(К); [Sp.]
3900. *C. foliosa* Galushko - К. листовой = **III**(Л - Сукан-Су, Хызны-Су): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [R.] <Es> l.c. Хызны-Су
3901. *C. grossheimii* Charadze - К. Гроссгейма = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВК); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [R.] <Esub> l.c. верх. Терек
3902. *C. bononiensis* L. - К. болонский = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Евро-Сиб.); ST,Pa(К); [Sp.]
3903. ★*C. komarovii* Maleev - К. Комарова = **IV**(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК): [R.] <Es> l.c. между Новороссийском и Геленджиком
3904. *C. longistyla* Fomin (*C. schischkinii* Kolak. et Sachok.) - К. длинно-столбиковый = **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК): [Sp.] <Esub> l.c. окрестности г. Туапсе
3905. *C. elatior* (Fomin) Grossh. (*C. praealta* Galushko) - К. высокий = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Понтич.); Pa(НК:pb); [Pl.]
3906. *C. ciscaucasica* Charadze - К. предкавказский = **III**(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. Карачаевска
3907. *C. litvinskajae* Ogan. - К. Литвинской = **III**(ВЛ - хребты Герпегем, Шахан: [Оганесян, 2015](#)): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Es> l.c. хр. Герпегем
3908. *C. taurica* Juz. - К. крымский = **I**(ЗП,ЦП); **III**(Ст,Куб,СКТ,П): (Понтич.); Db(НК:pb); [Sp.]
3909. *C. hohenackeri* Fisch. et C.A.Mey. - К. Гогенакера = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(НК:pb); [Pl.] l.c. окр. с. Коби.
3910. *C. fedorovii* Charadze - К. Фёдорова = **III**(Ч); **V**(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.] <Es> l.c. с. Данух
3911. *C. charadzeae* Grossh. - К. Харадзе = **III**(ВС); **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub>
3912. *C. darialica* Charadze - К. дарьяльский = **III**(ОС,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Es> l.c. Дарьяльское ущелье
3913. *C. daghestanica* Fomin - К. дагестанский = **III**(Ч); **V**(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Дагестан (?)
3914. *C. caucasica* Vieb. - К. кавказский = **V**(АС - гт. Ярыдаг, Базардюзи, Несиндаг): (Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>
3915. *C. czerapanovii* Fed. - К. Черепанова = **V**(ЦД - окрестности сёл Маджалис, Акуша, Цудахар): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Es> l.c. окр. с. Акуша

3916. *C. rubasensis* Teimurov et Taisumov - К. рубасский = V(ЦД - Хучни: Тайсумов, Теймуров, 2010): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Рубас между сс. Ягдыг и Хучни
3917. *C. alliariifolia* Willd. (*C. ochroleuca* Kem.-Nath.) - К. чесночницелистный = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД,АС): (Субкавк*.); Da(НК); [Sp.]
3918. ★*C. dolomitica* E.Busch (*C. kirpicznikovii* Fed.) - К. доломитовый = III(Л,УН): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.] <Es>
3919. *C. leskovii* Fed. - К. Лескова = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. водораздел рек Мзымта и Шахе
3920. *C. sarmatica* Ker-Gawl. - К. сарматский = III(Кисл,ЧК,ВЛ,ТЗ, Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>
3921. *C. siegismundii* Fed. - К. Сигизмунда = III(Кисл,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Бабугент
3922. *C. sommieri* Charadze - К. Соммье = III(ТЗ,ЦЭ - верх. Кубани); (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. р. Индыш
3923. *C. woronowii* Charadze - К. Воронова = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.] <Es> l.c. г. Фишт
3924. *C. dzyschrica* Kolak. - К. дзышринский = IV(ТА - г. Дзыхра, водораздел рек Мзымта-Псоу: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); S, Da(НК); [R.] <Esub>
3925. *C. collina* Vieb. (*C. sphaerocarpa* Kolak.) - К. холмовой = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.] l.c. окр. г. Кисловодска
3926. *C. annae* Kolak. - К. Анны = III(ОС,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub>
3927. *C. nefedovii* Galushko - К. Нефёдова = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Es> l.c. уроч. Джылы-Су
3928. *C. albovii* Kolak. - К. Альбова = III(ВЛ - верховья р. Белой); IV(ТА): (Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
3929. *C. klukhorica* Kolak. - К. клухорский = III(ВЛ - Загедан,ТЗ,ЦЭ - зап. часть): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(НК); [Sp.] <Esub> l.c. р-н Клухорского перевала
3930. *C. valentinae* Galushko - К. Валентины = III(ЦЭ - сев.-зап. подножие Эльбруса): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК): [R.] <Es>
3931. *C. hypopolia* Trautv. - К. снизу-седой = III(ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [R.] <Esub>
3932. *C. petrophila* Rupr. - К. скальный = III(ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [Sp.] <Esub>
3933. *C. saxifraga* Vieb. - К. камнеломка = III(ВЛ,ТЗ,[П - Бештау,<Rg>], Кисл,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
3934. *C. meyeriana* Rupr. - К. Мейера = ([АС - гг. Шахдаг, Ярыдаг, Шалбуздаг]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [Pl.] <Esub>
3935. *C. fominii* Grossh. - К. Фомина = V(ЦД - Самур): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(Ch:ppul); [R.] <Esub>
3936. *C. argunensis* Rupr. - К. аргунский = III(ВС,Ч); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub> l.c. р. Аргун, окр. с. Евдокимовское

3937. ★*C. besenginica* Fomin - К. безенгийский = III(Б): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc, Do(НК); [Rs.] <Es> l.c. окр. ледника Безенги
3938. ★*C. kryophila* Rupr. (*C. zeyensis Amirkh. et Tavasiev*) - К. холодолюбивый = III(ОС - бассейн Ардона): (Кавк.: Эукавк.); Pc, Do(НК); [R.] <Es> l.c. Цейское ущелье
3939. *C. kadargavanica* Amirkh. et Komzha - К. кадаргаванский = III(ОС - Скалистый хребет, ущелье р. Фиэгдон, l.c.): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Es>
3940. ★*C. ardonensis* Fomin - К. ардонский = III(ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Do(НК); [R.] <Es> l.c. р. Ардон, окр. с. Мизур
3941. *C. bellidifolia* Adams (*C. sosnowskyi Charadze*) - К. маргаритколиственный = III(Л, УН, ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. р. Терек, окр. с. В.Ларс
3942. *C. circassica* Fomin (*C. anomala Fomin; C. aucheri auct. non A.DC.*) - К. черкесский = III(ВЛ, ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc, Do(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Псеашха
3943. *C. songutica* Amirkh. - К. сонгутский = III(ОС - ледник Малый Сонгут): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Rs.] <Es>
3944. *C. biebersteiniana* Schult. (*C. tridentata Schreb.; C. akuschensis Gusselinov*) - К. Биберштейна = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Кисл, Б, ОС, ВС, Ч); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc(НК): [Pl.]
3945. *C. ciliata* Stev. - К. реснитчатый = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.] <Esub>
3946. *C. garunculus* L. (*C. lambertiana A.DC.*) - К. рапунцель = I(АК, КЕ, Прик, ТБ); III(Ст, Куб, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп, ЦД): (Европ.); S, Rb(НК:pb); [R.]
3947. *C. persicifolia* L. - К. персиколистный = III(Ст - Ставрополь): (Европ.); S, Pa(НК); [R.] <Rg; Po>
3948. *C. stevenii* Vieb. - К. Стевена = III(ВЛ, ТЗ, Э, ВК); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Субкавк*.); Pb, Do(НК); [R.]
3949. ★*C. ossetica* Vieb. - К. осетинский = III(УН - вост. часть, ОС, Ч - зап. часть): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee>
3950. *C. kolenatiana* С.А.Меу. ex Rupr. - К. Коленати = V(ЦД, АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК): [R.] <Esub>
3951. *C. andina* Rupr. - К. андийский = III(ВС, Ч); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. окр. с. Данух
3952. *C. calcarata* Somm. et Levier - К. шпорцеватый = III(ЦЭ - верх. Кубани): (Кавк.: Эукавк.); S, Do(НК); [R.] <Es> l.c. окр. а. Уччулан
3953. ★*C. autraniana* Albov - К. Отрана = III(ВЛ - г. Фишт, Оштен); IV(ТА - г. Два Брата): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Da(НК); [Sp.] <Es> l.c. г. Фишт

Genus 954. *Mzymtella* Kolak. - Мзымтелла <GMC>

3954. *M. sclerophylla* Kolak. (*Campanula sclerophylla (Kolak.) Czer.*) - М. твёрдолистная = IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. ущ. Ахцу, каньон р. Мзымты

Genus 955. *Symphiandra* A.DC. - Зимфиандра

3955. *S. pendula* (Bieb.) A.DC. (*S. transcaucasica* (Somm. et Levier) Grossh.; *Campanula pendula* Bieb.) - З. повислая = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Db(НК); [Pl.] <Esub> l.c. Железноводск

3956. *S. lezgina* Alexeenko ex Lipsky (*C. lezgina* (Alexeenko) Kolak. et Serdjuk) - З. лезгинская = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Esub>

3957. *S. galushkoi* Taisumov et Teimurov (*C. galushkoi* (Taisumov et Teimurov) Murtazaliev) - З. Галушко = III(ЧО - ущелье р. Ассы: Тайсумов, Теймуров, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Es> l.c. ущ. р. Ассы

Genus 956. *Gadellia* Schulkina - Гаделия <GD>

3958. *G. lactiflora* (Bieb.) Schulkina (*Campanula lactiflora* Bieb.) - Г. молочнокветковая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Л,Б,УН,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [Pl.]

Genus 957. *Legousia* Durande - Легузия

3959. *L. hybrida* (L.) Delarb. - Л. гибридная = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Rb(Т); [R.]

Genus 958. *Asyneuma* Griseb. et Schenk - Азинеума

3960. *A. campanuloides* (Bieb. ex Sims) Bornm. - А. колокольчиковая = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Бештау и Кисловодск

3961. *A. rigidum* (Willd.) Grossh. - А. жёсткая = V(ЦД,АС - Самур): (Субкавк*.); ST(НК); [R.]

Genus 959. *Pseudocampanula* Kolak. - Ложноколокольчик

3962. *P. dzaaku* (Albov) Kolak. (*C. dzaaku* Albov) - К. Дзаку = IV(ТА - г. Фишт: КК Краснодарского края, 2017): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Esub>

Genus 960. *Muehlbergella* Feer - Мюльбергелла <GMC>

3963. ★*M. oweriniana* (Rupr.) Feer (*Edraianthus owerinianus* Rupr.) - М. Оверина = V(ЦД - Гимри, Эрпели, В.Ботлих): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:ppul); [R.] <Es>

Ordo 106. Asterales - Астроцветные

Familia 184. Asteraceae Dumort. - Астровые (Compositae - Сложноцветные)

Genus 961. *Eupatorium* L.- Посконник

3964. *E. cannabinum* L. - П. коноплевидный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pm.>

Genus 962. *Grindelia* Willd. - Гринделия

3965. *G. squarrosa* (Pursh) Dunal. - Г. растопыренная = IV(Н - Новоросийск, Сукко): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(НК:pb); [Sp.]

Genus 963. *Solidago* L. - Золотая розга

3966. *S. virgaurea* L. - З.р. обыкновенная = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Куб, ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

3967. *S. caucasica* Kem.-Nath. - З.р. кавказская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [R.]

3968. *S. canadensis* L. - З.р. канадская = **I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ЧК,П, Кисл,СКТ); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Адвент. [Сев. Америка]; Rb(НК); [Sp.]

Genus 964. *Tripolium* Nees - Триполиум

3969. *T. vulgare* Nees (*Aster tripolium* L.) - Т. обыкновенный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Голаркт.); Aa(НК:pb); [Sp.] <Pm;Pmel>

Genus 965. *Aster* L. - Астра

3970. *A. bessarabicus* Bernh. ex Reichenb. (*A. amelloides* Bess.) - А. бесарабская = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Понтич.); Pa,ST(НК); [Pl.]

3971. *A. alpinus* L. - А. альпийская = **III(ВЛ,ТЗ,[П: Галушко, 1980], Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС):** (Панбор.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Po>

3972. *A. ibericus* Stev. - А. грузинская = **III(ВК); V(Касп,ЦД):** (Субкавказ*.); Pa(НК); [Pl.]

3973. *A. laevis* L. - А. гладкая = **III(ТА - Сочи):** (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(Т); [R.]

Genus 966. *Kemulariella* Tamamsch. - Кемуляриелла

3974. *K. caucasica* (Willd.) Tamamsch. (*Aster caucasicus* Willd.) - К. кавказская = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА):** (Кавк.: Общекавказ.); Pb,Pc(НК); [Sp.]

3975. *K. colchica* (Albov) Tamamsch. - К. колхидская = **IV(ТА - Мзымта):** (Кавк.: Общекавказ.); Pb,Pc,Da(НК); [R.]

3976. *K. abchasica* (Kem.-Nath.) Tamamsch. (*A. abchasicus* Kem.-Nath.) - К. абхазская = **IV(ТА - Мзымта):** (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Da(НК); [R.] <Esub>

3977. *K. rosea* (Stev. ex Bieb.) Tamamsch. (*A. roseus* Bieb. et Stev.) - К. розовая = **V(ЦД,АС):** (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Pc,Da(НК); [Sp.] <Esub>

Genus 967. *Heteropappus* Less. - Гетеропаппус

3978. *H. canescens* (Nees) Novopokr. - Г. седеющий = **V(Касп):** (Туранск.); ST(НК); [R.]

Genus 968. *Galatella* Cass. - Солонечник

3979. *G. rossica* Novopokr. (*G. punctata* Walst. et Kit.) - С. российский = **I(Т):** (Понтич.); ST(НК); [R.]

3980. *G. pastuchovii* (Kem.-Nath.) Tzvel. - С. Пастухова = **I(МД,АИ,НК); II(ВП); V(Даг):** (Понтич.); Db,Dc(НК); [Sp.]

3981. *G. dracunculoides* (Lam.) Nees - С. эстрагоновидный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]

3982. *G. biflora* (L.) Nees (*G. novopokrovskii* Zefir.) - С. двуцветковый = **I(НД,ЗПМ,АЕ,Прик):** (Субтуран*.); ST,Da,Dd(НК); [Sp.]

3983. *G. angustissima* (Tausch) Novopokr. - С. узколиственный = **I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Кисл: Меницкий, 20086):** (Субтуран*.); ST,Da(НК); [Sp.]

3984. *G. villosa* (L.) Reichenb (*Crinitaria villosa* (L.) Grossh.) - С. мохнатый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>

3985. *G. linosyris* (L.) Reichenb. (*C. linosyris* (L.) Less.) - С. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]

3986. *G. fominii* (Kem.-Nath.) Czer. - С. Фомина = IV(ТА: Солодько, 2002): (Кавк.: Эукавк.); ST, Da(НК); [R.] <Esub>

3987. *G. pontica* (Lipsky) Novopokr. et Bogdan - С. понтийский = I(Т); III(КР); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); Da, ST(НК); [R.]

Genus 969. Erigeron L. - Мелколепестник

3988. *E. orientalis* Boiss. - М. восточный = III(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb, Pc(НК); [Pl.]

3989. *E. pseudoelongatus* Botsch. - М. ложноудлинённый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb, Pc(НК); [Sp.]

3990. *E. podolicus* Bess. - М. подольский = I(АК); II(ВП: Муртазалиев, 2009); III(Ст,СКТ,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(Касп,ЦД): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]

3991. *E. acris* L. (*E. acer auct.*) - М. едкий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pm>

3992. *E. uralensis* Less. - М. уральский = III(ТЗ,ЦЭ,Б); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); S, Pb(НК); [R.]

3993. *E. alpinus* L. - М. альпийский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); Pc, Do(НК); [Pl.]

3994. *E. venustus* Botsch. - М. приятный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb, Pc(НК); [Pl.]

3995. *E. caucasicus* Stev. - М. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

3996. *E. schalbusi* Viehr. - М. шалбусский = V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc, Do(НК); [Sp.] <Ee> l.c. г. Шалбуз-даг

3997. *E. uniflorus* L. - М. однокорзинковый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pc, Do(НК); [Sp.]

Genus 970. Phalacrolooma Cass. - Тонколучник

3998. *Ph. annuum* (L.) Dumort. (*Ph. septentrionale* (Fern. et Wiegand) Tzvel.; *Erigeron annuus* (L.) Pers., *Stenactis annua* (L.) Cass.) - Т. однолетний = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Адвент. [Сев. Америка]); S, Pa, Rb(Т); [Pl.]

Genus 971. Conyza Less. - Мелколепестничек

3999. *C. canadensis* (L.) Cronq. (*Erigeron canadensis* L.) - М. канадский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Адвент. [Сев. Америка]); Ra, Rb(Т); [Pl.] <Pm>

4000. *C. bonariensis* (L.) Cronq. (*E. bonariensis* L.) - М. буэносайресский = IV(ТА): (Адвент. [Южн. Америка]); ST(Т); [R.]

Genus 972. Dichrocephala L'Her. - Дихроцефала

4001. *D. integrifolia* (L. fil.) O.Kuntze (*D. bicolor* (Roth) Schlecht.) - Д. цельнолистная = IV(ТА): (Общедр.средиз.); S, Rb(Т); [Sp.]

Genus 973. *Bellis* L. - Маргаритка

4002. *B. perennis* L. - М. многолетняя = III(ВЛ,УН,ВС - Ведено); IV(СЗЗ): (Европ.); Pb(НК); [Sp.]

Genus 974. *Micropus* L. - Микропус

4003. *M. supinus* L. - М. лежачий = II([Кизл - Бавтугай, Дешлагар]: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); ST(T); [R.]

Genus 975. *Bombucilaena* (DC.) Smoljan. - Бомбицилена

4004. *B. erecta* (L.) Smoljan. - Б. прямостоячая = I(T,М); III(КР,ТС); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); ST(T); [R.]

Genus 976. *Filago* L. - Жабник

4005. *F. vulgaris* Lam. (*F. germanica* L.) - Ж. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Дар): (Зап.др.средиз.); Da,Db(T); [R.]

4006. *F. pyramidata* L. (*F. spathulata* C. Presl.) - Ж. пирамидальный = III(Кисл); IV(Дар): (Зап.др.средиз.); Db(T); [R.]

4007. *F. arvensis* L. - Ж. полевой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); ST(T); [Pl.] <Pm>

Genus 977. *Helychrysum* Mill. - Бессмертник

4008. *H. arenarium* (L.) Moench - Б. песчаный = I(ЗП,ЦП); II(КН); III(Ст,ЧК,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Db(НК); [Sp.] <Pm>

4009. *H. tanaiticum* Tzvel. - Б. донской = III(Кисл,ЦЭ): (Понтич.); Da(НК); [R.]

4010. *H. nogaicum* Tzvel. - Б. ногойский = II([КН - Терекли, Червлёные Буруны,Кизл. - Кизляр]: Муртазалиев, 2009): (Понтич.); Db(НК); [R.]

4011. *H. plinthocalyx* (C.Koch) Sosn. - Б. нижнечашечковый = V(Касп): (Туранск.); Da(НК); [R.]

Genus 978. *Laphangium* (Hilliard et B.L.Burtt) Tzvel. - Лафангиум <GT>

4012. *L. luteo-album* (L.) Tzvel. (*Gnaphalium luteo-album* L.) - Л. жёлто-белый = III(ВЛ,ТЗ,СК - Кума,Каб); IV(ТА); V(Касп): (Плюрирег.); Da(T); [R.]

Genus 979. *Gnaphalium* L. - Сушеница

4013. *G. rossicum* Kirp. (*Filaginella rossica* (Kirp.) Tzvel.) - С. русская = I(ЗП); III(Ст,Куб,П,Кисл); V([Касп - Махачкала, Избербаш]: Муртазалиев, 2009): (Палеаркт.); Aa,Rb(T); [R.] <Rg>

Genus 980. *Omalotheca* Cass. - Омалотека

4014. *O. sylvatica* (L.) Sch.Bip. et F.Schultz (*Gnaphalium sylvaticum* L.) - О. лесная = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); S(НК); [R.]

4015. *O. alpigena* (C.Koch) Holub (*O. caucasica* (Somm. et Levier) Czer.; *G. caucasicum* Somm. et Levier) - О. альпийская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [R.]

4016. *O. supina* (L.) DC. (*O. stewartii* (C.B.Clarke) Holub; *G. supinum* L.) - О. приземистая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pc,Do(НК); [Pl.]

Genus 981. *Antennaria* Gaertn. - Кошачья лапка

4017. *A. caucasica* Boriss. (*A. dioica auct. fl. cauc.*) - К.л. кавказская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]

Genus 982. *Cladochaeta* DC. - Кладохета <GM>

4018. ★*C. candidissima* (Bieb.) DC. (*C. caspica Sosn. ex Grossh.*) - К. белейшая = III(ЦЭ,ЧО,ОС,ВС,Ч); V(Касп,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da,Do(НК); [Sp.] <Esub>

Genus 983. *Inula* L. - Девясил

4019. *I. magnifica* Lipsky - Д. великолепный = III(Х,ВЛ,ТЗ,Б,Л); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.] l.c. верховья р. Мзымты, оз Кардывач

4020. *I. helenium* L. - Д. высокий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pa,Аа(НК); [Pl.] <Pm>

4021. *I. orientalis* Lam. - Д. восточный = III(ВЛ,ТЗ,[П: Танфильев, Кононов, 1987],Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

4022. *I. hirta* L. - Д. жёстковолосистый = I(АК,КЕ,ЦП); III(Ст,СК,П,Кисл): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]

4023. *I. ensifolia* L. - Д. мечелистный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); ST(НК); [Pl.]

4024. *I. germanica* L. - Д. германский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЧК,КР,СКТ,Э); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); ST(НК); [Sp.]

4025. *I. salicina* L. - Д. ивовый = II(Кизл); III(Ст,Кисл,ТЗ,ЧО); IV(Н); V(БН,Касп): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]

4026. *I. aspera* Poir. - Д. шероховатый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Pl.]

4027. *I. caspica* Blum ex Ledeb. - Д. каспийский = I(АК,Тем,Т,МД); II(КН,Кизл - Терек,Сулак); IV(Н): (Туранск.); Dc(НК:pb); [Sp.]

4028. *I. oculus-christi* L. - Д. Христово око = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Зап.др.средиз.); ST(НК); [Sp.]

4029. *I. britannica* L. - Д. британский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.] <Pm>

4030. *I. conyza* DC. (*I. vulgaris Trevis.*) - Д. растопыренный = I(АЕ,КЕ); III(ВЛ,ТЗ,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); ST(НК:pb); [Sp.]

4031. *I. thapsoides* (Bieb.) Spreng. - Д. коровяковый = III(Ст,ЧК,КР,Х,П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ); (Армено-Иран.); Pa(НК); [Sp.]

4032. *I. grandiflora* Willd. - Д. крупноцветковый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(НК); [R.]

Genus 984. *Pulicaria* Gaertn. - Блошница

4033. *P. vulgaris* Gaertn. (*P. prostrata Aschers.*) - Б. обыкновенная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(Касп): (Евро-Кавк.); Аа(Т); [Sp.] <Pm>

4034. *P. dysenterica* (L.) Bernh. (*P. uliginosa Stev. ex DC.*) - Б. дизентерийная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); Аа(НК); [Sp.]

Genus 985. *Carpesium* L. - Карпезиум

4035. *C. abrotanoides* L. - К. полынный = IV(ТА); V(Касп): (Общ.др.средиз.); S(НК); [R.]

4036. *C. cernuum* L. - К. поникающий = III(СК - Георгиевск, Каб - Нальчик); IV(Н); V(Касп): (Общедр.средиз.); Аа(НК); [Rs.] <Rg>

Genus 986. *Telekia* Baumg. - Телекия

4037. *T. speciosa* (Schreb.) Baumg. - Т. видная = III([Ст: Танфильев, Кононов, 1979], ЗК, Э, Каб, ЧО, ВК); IV(ТА); V(Даг): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.] <Ро>

Genus 987. *Cyclachaena* Fresen. - Циклахена

4038. *C. xanthiifolia* (Nutt.) Fresen. - Ц. дурнишниковидная = I(НД, ЗПМ, АЕ, АК, КЕ, Прик, ТБ, НК); III(Ст, СК, Э); IV(Н): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(Т); [Sp.]

Genus 988. *Ambrosia* L. - Амброзия

4039. *A. artemisifolia* L. - А. полыннолистная = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ТЗ, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Адвент. [Сев.Америка]); Ra, Rb(Т); [Pl.]

4040. *A. psilostachya* DC. - А. голометельчатая = I(ЗП, Прик, ТБ); III(Ст, КР): (Адвент. [Сев.Америка]); Ra, Rb(НК); [Sp.]

4041. *A. trifida* L. - А. трёхраздельная = IV(ТА): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(НК); [R.]

Genus 989. *Xanthium* L. - Дурнишник

4042. *X. spinosum* L. - Д. колючий = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ТЗ, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(Т); [Pl.] <Pm>

4043. *X. strumarium* L. - Д. зобовидный = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(Т); [Pl.] <Pm>

4044. *X. albinum* (Willd.) H. Scholz (*X. occidentale* Bertol.) - Д. беловатый = I(Т); IV(СЗЗ): (Адвент. [Центр. Америка]); Rb(Т); [R.]

4045. *X. californicum* Greene - Д. калифорнийский = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(Т); [Pl.]

Genus 990. *Sigesbeckia* L. - Сигезбекия

4046. *S. orientalis* L. - С. восточная = III(ВЛ, ТЗ, П, Кисл, Л, УН); IV(СЗЗ): (Адвент. [Юго-Вост.Азия]); Rb(Т); [Sp.]

Genus 991. *Helianthus* L. - Подсолнечник

4047. **H. tuberosus* L. - П. клубненосный (Топинамбур) = III(Ст, Куб); IV(СЗЗ): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(К); [Sp.] <Pm>

Genus 992. *Bidens* L. - Череда

4048. *B. tripartita* L. - Ч. трёхраздельная = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ТЗ, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Плюрирег.); Аа, Rb(Т); [Pl.] <Pm>

4049. *B. frondosa* L. - Ч. широколистная = III(МА, ЧО - Владикавказ, Беслан: Комжа, 2004); IV(СЗЗ): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(Т); [Sp.]

4050. *B. cernua* L. - Ч. поникающая = I(НД, ЗПМ, АЕ); III(Ст, Куб, ЧК, П, Кисл, Каб): (Голаркт.); Аа(Т); [Sp.]

4051. *V. bipinnata* L. - Ч. дваждыперистая = **IV**(ТА): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(T); [R.]

4052. *V. radiata* Thuill. - Ч. лучистая = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Палеаркт.); Aa(T); [Pl.]

Genus 993. Galinsoga Ruiz et Pav. - Галинсога

4053. *G. parviflora* Cav. - Г. мелкоцветковая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЧК,Х,ВЛ,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп,ЦД): (Адвент. [Южн. Америка]); Rb(T); [Pl.]

4054. *G. ciliata* (Rafin.) Blake (*G. quadriradiata auct.*) - Г. реснитчатая = **III**(П,Каб,ЧО,ТЗ); **IV**(ТА): (Адвент. [Южн. Америка]); Rb(T); [R.]

Genus 994. Anthemis L. - Пупавка

4055. *A. iberica* Vieb. - П. грузинская = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК); [Pl.]

4056. *A. saportana* Albov - П. Сапорты = **III**(ВЛ,ТЗ); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК); [R.]

4057. *A. fruticulosa* Vieb. - П. кустарничковая = **III**(ОС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(Ch:fl); [Sp.] <Esub>

4058. *A. marschalliana* Willd. - П. Маршалла = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pс,Do(НК); [Pl.]

4059. *A. sosnovskyana* Fed. (*A. caucasica Chandjian*) - П. Сосновского = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Sp.]

4060. *A. ruthenica* Vieb. - П. русская = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,ЦП); **II**(ВП); **III**(СК,ТС); **IV**(Н); **V**(БН,Касп): (Понтич.); ST,Db,Dd(НК); [Pl.]

4061. *A. candidissima* Willd. ex Spreng. - П. белейшая = **I**([НК - Будёновск: Танфильев, Кононов, 1987](Туранск.); Rb(T); [R.]

4062. *A. cotula* L. - П. собачья = **I**(ЗП,ЦП); **III**(Ст,Куб,ЧК,КР,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Евро-Кавк.); Rb(T); [Pl.]

4063. *A. tinctoria* L. (*A. subtinctoria Dobroc.*; *A. maris-nigri Fed.*; *A. markothenis Fed.*) - П. красильная = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); **III**(Ст,ЧК,КР,СК,П,ТС); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Евро-Кавк.); ST(НК); [Sp.]

4064. *A. triumfettii* (L.) All. (*A. dumetorum Sosn.*; *A. rigescens Willd.*) - П. Триумфетта = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Sp.]

4065. *A. melanoloma* Trautv. (*A. macroglossa Somm. et Levier*; *A. zyghia Woronow*) - П. крупноязычковая = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pс(НК); [Sp.]

4066. *A. euxina* Boiss. - П. эуксинская = **IV**(ТА): (Эвксин.); Db(НК); [Sp.]

4067. *A. altissima* L. - П. высочайшая = **III**([Ст: Галушко, 1980],ЧО); **IV**(Н); **V**(БН,Касп): (Вост.средиз.); Rb(T); [R.]

4068. *A. austriaca* Jacq. - П. австрийская = **I**(АК,Тем,Т); **IV**(Н): (Евро-Кавк.); Rb(T); [R.]

4069. *A. arvensis* L. - П. полевая = **I**(ЗПМ,АК,КЕ); **III**(КР): (Евро-Кавк.); Rb(НК); [Sp.]

Genus 995. *Ptarmica* Hill - Чихотник

4070. *P. biserrata* (Bieb.) DC. (*P. griseo-virens* (Albov) Galushko; *Achillea biserrata* Bieb.; *A. griseo-virens* Albov) - Ч. дважды-пильчатый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [Sp.]

4071. *P. ptarmicifolia* (Willd.) Galushko (*A. ptarmicifolia* (Willd.) Rupr. ex Heimerl) - Ч. чихотниколистный = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(Даг): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub>

4072. *P. salicifolia* (Bess.) Serg. (*A. salicifolia* Bess.) - Ч. иволистный = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Евро-Сиб.); Pa,Аа(НК); [Pl.]

4073. *P. cartilaginea* (Ledeb. ex Reichenb.) Ledeb. (*A. cartilaginea* Ledeb. ex Reichenb.) - Ч. хрящеватый = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Евро-Сиб.); Аа(НК); [Sp.]

Genus 996. *Achillea* L. - Тысячелистник

4074. *A. millefolium* L. (*A. setacea* Waldst. et Kit.) - Т. обыкновенный (Деревей тысячелистник) = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Сиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>

4075. *A. nobilis* L. (*A. neilreichii* A.Kern.) - Т. благородный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>

4076. *A. micrantha* Willd. (*A. gerberi* Willd.) - Т. мелкоцветковый = I(ЗП,Прик,ТБ); II(ВП); III(Ст,СК,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Понт.-Южносиб.); Db(НК); [Sp.] <Pm>

4077. *A. biebersteinii* Afan. - Т. Биберштейна = I(АК,КЕ,Т,ЦП); II(КН); III(ТС,ЧО); V(БН,Касп,ЦД): (Вост.средиз.); ST,Da,Dd(НК); [Pl.]

4078. *A. leptophylla* Bieb. - Т. тонколистный = I(ЗП,ЦП); II(ВП): (Понтич.); ST(НК); [R.]

4079. *A. filipendulina* Lam. - Т. таволговый = II(Кизл); V(БН,Касп,ЦД): (Средиземн.); Dd(НК); [Sp.]

Genus 997. *Leucanthemum* Hill - Нивяник

4080. *L. vulgare* Lam. - Н. обыкновенный = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Евро-Сиб.); Pa,S(НК); [Pl.] <Pm;Po>

Genus 998. *Matricaria* L. - Ромашка

4081. *M. recutita* L. (*M. chamomilla* L; *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert) - Р. лекарственная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); Rb(Т); [Pl.] <Pm>

Genus 999. *Lepidotheca* Nutt. - Лепидотека

4082. *L. aurea* (L.) Kovalevsk. (*Matricaria aurea* (Loefl.) Sch.Bip.) = Л. золотистая = V(Касп): (Субтуран.); Rb(Т); [R.]

4083. *L. suaveolens* (Purch) Nutt. (*M. suaveolens* (Pursh) Buschenau; *M. discoidea* DC.; *Chamomilla discoidea* (DC.) J.Gay ex A.Br.) - Л. пахучая = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,Э); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Панбор.); Rb(Т); [Pl.] <Pm>

Genus 1000. *Tripleurospermum* Sch.Bip. - Ромашник

4084. *T. perforatum* (Merat) M.Lainz (*T. inodorum* (L.) Sch.Bip. nom. illegit.; *Matricaria perforata* Merat) - Р. пронзённый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]

4085. *T. tenuifolium* (Kit.) Freyn. (*T. tzvelevii* Pobed.) - Р. тонколистный = **II(Кизл); V(Касп)**: (Субпонт.); Rb(T); [R.]

4086. *T. caucasicum* (Willd.) Hayek (*T. subnivale* Pobed., *M. subnivalis* (Pobed.) Rauschert) - Р. кавказский = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]

4087. *T. szowitzii* (DC.) Pobed. - Р. Шовица = **III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС)**: (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

4088. *T. elongatum* (Fisch. et C.A.Mey. ex DC.) Wornm. - Р. удлинённый = **III(ТЗ,ЦЭ); V(БН - Эндирей: Львов, 1971)**: (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [R.]

4089. *T. nathaliae* A.Zernov - Р. Натальи = **III(ВЛ); IV(ТА)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Ее>

4090. *T. parviflorum* (Willd.) Pobed. (*M. parviflora* (Willd.) Poir.) - Р. мелкоцветковый = **I(МД,АИ,НК); II(ВП); V(Касп)**: (Армено-Иран.); ST(T); [R.]

Genus 1001. *Tanacetum* L. - Пижма

4091. *T. vulgare* L. - П. обыкновенная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Голаркт.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pm>

4092. *T. millefolium* (L.) Tzvel. (*Pyrethrum millefolium* (L.) Willd.) - П. тысячелистная = **I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т); III(Ст,КР,СК,ТС); IV(Н); V(БН,Касп)**: (Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.]

4093. *T. achilleifolium* (Bieb.) Sch.Bip. (*P. achilleifolium* Bieb.) - П. деревеелистная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(СК,ТС); V(БН,Касп)**: (Понт.-Южносиб.); ST,Дс(НК); [Pl.]

4094. *T. chiliophyllum* (Fisch. et C.A.Mey.) Sch.Bip. (*P. transcaucasicum* Sosn.) - П. закавказская = **V(Касп,ЦД)**: (Субкавк*.); ST(НК); [Sp.]

4095. ★*T. akinfiievii* (Alexeenko) Tzvel. (*P. akinfiievii* Alexeenko) - П. Акинфиева = **V(ЦД)**: (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. окр. с. Цудахар

Genus 1002. *Pyrethrum* Zinn - Поповник

4096. *P. macrophyllum* (Waldst. et Kit.) Willd. (*Tanacetum macrophyllum* (Waldst. et Kin.) Sch. Bip.) - П. крупнолистный = **IV(ТА - верх. р. Псоу: КК Краснодарского края, 2017)**: (Субкавк.); S,Pb(НК); [R.]

4097. *P. corymbosum* (L.) Scop. - П. щитковый = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Европ.); Pa(НК); [Sp.]

4098. *P. poteriifolium* Ledeb. - П. черноголовниковый = **III(КР,Х,ВЛ); IV(СЗЗ)**: (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [Sp.]

4099. *P. parthenifolium* Willd. (*P. demetrii* Manden.; *P. kubense* Grossh.) - П. девичьелистный = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Общедр.средиз.); S,Da(НК); [Pl.] <Pm>

4100. *P. peucedanifolium* (Sosn.) K.Bremer et Humphries (*P. glanduliferum* (Somn. et Levier) K.Bremer) - П. горичниколистный = **III(ЦЭ,Б,ОС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.] <Esub>

4101. *P. leptophyllum* Stev. ex Bieb. - П. тонколиственный = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub>
4102. *P. punctatum* (Desr.) Bordz. ex Sosn. - П. точечный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС): (Субкавк.); Pb(НК); [R.]
4103. *P. coccineum* (Willd.) Worosch. (*P. roseum* (Adams) Bieb.) - П. красный = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.] <Pm;Pt;Po>
4104. *P. silaifolium* Stev. - П. морковниколиственный = III(ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub>
4105. *P. daghestanicum* (Rupr. ex Boiss.) Fler. (*P. galushkoi* Prima; *P. aromaticum* Tzvel.) - П. дагестанский = III(ВС,ОС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК): [Pl.] <Ee>
4106. *P. tricholobum* Sosn. ex Manden. (*P. dolomiticum* Galushko) - П. волосистолопастный = III(ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. Кассарское ущелье
4107. *P. kotschyi* Boiss. - П. Кочи = V(ЦД): (Субкавк*.); Pc,Da(Ch:sf); [R.]
4108. *P. fruticosum* Biehl. (*P. niveum* Lag.) - П. кустарничковый = III(ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(НК); [Sp.]

Genus 1003. *Artemisia* L. - Полынь

4109. *A. vulgaris* L. - П. обыкновенная (Чернобыльник) = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
4110. *A. abrotanum* L. (*A. procera* Willd.; *A. elatior* Klok.) - П. лечебная = I(АК,Тем,Т); II(ВП); III(П); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); Db(Ch:sf); [R.] <Pm>
4111. *A. chamaemelifolia* Vill. - П. ромашколистная = III(ТЗ,СК,Э,ВС,Ч); V(Даг): (Субкавк*.); Da(Ch:sf); [Sp.]
4112. *A. pontica* L. - П. понтийская = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,ЧК,КР,Х,П); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.] <Pm>
4113. *A. armeniaca* Lam. - П. армянская = I(НД,АЕ): (Понт.-Южносиб.); ST,Da(Ch:sf); [R.]
4114. *A. annua* L. - П. однолетняя = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(Т); [R.] <Pm>
4115. *A. caucasica* Willd. (*A. grossheimii* Krasn. ex Pojark.) - П. кавказская = I([Прик - с. Тугулулук, г. Брык: Галушко, Мигненко, 1989]); III(Ст - окр. с. Московское,ЧК,КР,Э,Б,ОС); V(Даг): (Субкавк*.); Da(Ch:sf); [R.] <Po;Rx>
4116. *A. splendens* Willd. - П. блестящая = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]
4117. *A. austriaca* Jacq. - П. австрийская = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); SD,Db,Dd,Dc(НК); [Pl.]
4118. *A. campestris* L. - П. полевая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П); V(БН,Касп): (Голаркт.); ST(НК); [Sp.]
4119. *A. absinthium* L. - П. горькая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>

4120. *A. incana* (L.) Druce (*A. fasciculata* Bieb.) - П. серая = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); ST, Da(НК); [R.]

4121. *A. daghestanica* Krasch. et A. Poretzky - П. дагестанская = III(Ч - Таргимская котловина); V(ЦД, Касп): (Кавк.: Эукавк.); ST, Da(НК); [Sp.] <Ее> I. с. р. Самур, с. Филя

4122. ★ *A. salsoloides* Willd. (*A. tanaitica* Klok.) - П. солянковая = I([Т: Галушко, 1980]); III(Кисл - г. Медведка, Ч); IV(Н); V(Касп): (Понт.-Южносиб.); Da(Ch:sf); [Rs.] <Rx>

4123. *A. tschernieviana* Bess. (*A. arenaria* DC.) - П. Черняева = I(ЗП, МД, АИ, НК, М); II(ВП); III(СК, П, ТС); V(Касп): (Понтич.); Db(Ch:sf); [Pl.]

4124. *A. marschalliana* Spreng. (*A. sosnovskyi* Krasch. ex Novopokr.) - П. Маршалла = III(СК, ТС, Э, ОС); V(БН, Касп, ЦД): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]

4125. *A. scoraria* Waldst. et Kit. - П. метельчатая (веничная) = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, ЛН, ТЗ, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(БН, Касп, ЦД): (Палеаркт.); ST(Т); [Pl.]

4126. *A. szowitziana* (Bess.) Grossh. - П. Шовица = I(АК); II(Кизл); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Db, Rb(НК); [R.]

4127. *A. taurica* Willd. - П. крымская = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, СК, П); IV(Н); V(Касп): (Понтич.); Dc, Dd(НК); [Pl.] <Pm; Pp>

4128. *A. lerceana* Web. ex Stechn. (*A. fragrans* Willd.) - П. Лерхе = I(НД, ЗПМ, АЕ); II(ВП): (Понт.-Южносиб.); ST, Dd(Ch:sf); [Pl.]

4129. *A. verlotiorum* Lamotte - П. Верлотов = III([П - г. Машук: Дубовик, Мосякин, 1991]): (Адвент. [Юго-Вост. Азия]); Rb(НК); [R.]

4130. *A. dracunculus* L. - П. эстрагон = I(НД, ЗПМ, АЕ, НК); II(КН - Кума): (Голаркт.); ST, Dc(НК); [R.]

4131. *A. santonica* L. - П. сантонинная = I(НД, ЗПМ, АЕ, АК, МД, АИ, Прик, ТБ, НК); II(ВП); III(Ст): (Туранск.); Dc(НК); [R.] <Pm>

Genus 1004. Tussilago L. - Мать-и-мачеха

4132. *T. farfara* L. - М.-и-м. обыкновенная = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Dd(К); [Pl.] <Pm>

Genus 1005. Petasites Hill - Белокопытник

4133. *P. spurius* (Retz.) Reichenb. - Б. ложный = I(НД, ЗПМ, АЕ): (Европ.); Aa(К); [Pl.]

4134. *P. hybridus* (L.) Gaertn., Mey. et Schreb. - Б. гибридный = I(АК, КЕ, Прик, ТБ); III(Ст, Куб, ТЗ, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(БН, Касп): (Евро-Кавк.); S, Aa(К); [Pl.] <Pm>

4135. *P. albus* (L.) Gaertn. - Б. белый = I(АК, КЕ, Прик, ТБ); III(Ст, Куб, ТЗ, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(БН, Касп): (Евро-Кавк.); S, Aa(К); [Pl.]

Genus 1006. Nardosmia Cass. - Нардосмия

4136. *N. fominii* (Bordz.) Kuprian. (*Petasites fominii* Bordz.) - Н. Фомина = III(ОС: КК СО-А, 1999); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pс(НК); [R.]

Genus 1007. Doronicum L. - Дороникум

4137. *D. orientale* Hoffm. - Д. восточный = III([Ст<Rg>], КР, Х, ВЛ, ТЗ); IV(СЗЗ): (Евро-Кавк.); S(НК); [R.] <Po>

4138. *D. macrophyllum* Fisch. ex Hornem. - Д. крупнолистный = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Субкавказ*.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Бештау
 4139. *D. oblongifolium* DC. - Д. продолговатолистный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb(НК); [Pl.]

Genus 1008. Senecio L. - Крестовник

4140. *S. grandidentatus* Ledeb. - К. крупнозубчатый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,ЧК,СКТ,Э,Л,ОС); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Понт.-Южносиб.); Pa,ST(НК); [Pl.]
4141. *S. erucifolius* L. - К. эруколистный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СКТ,П): (Палеаркт.); Pa,Аа(НК); [Sp.]
4142. *S. schischkinianus* Sof. - К. Шишкина = **II**(КН); **V**(Касп): (Кавк.: Предкавказ.); Dc(НК); [Sp.] l.c. ст. Кумторкала <Ее>
4143. *S. jacobaea* L. - К. Якова = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Палеаркт.); ST,Rb(Т); [Sp.]
4144. *S. erraticus* Bertol. - К. блуждающий = **III**(П - Железноводск); **IV**(СЗЗ): (Европ.); Rb,Аа(НК); [R.]
4145. *S. kubensis* Grossh. - К. кубинский = **III**(ОС); **V**(АС - Куруш): (Кавк.: Общекавказ.); Pb,Do(НК); [R.]
4146. *S. pandurifolius* C.Koch - К. бандуролистный = **III**(ВЛ,ТЗ); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавказ.); Da(НК); [Pl.]
4147. *S. taraxacifolius* (Vieb.) DC. - К. одуванчиколистный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]
4148. *S. kolenatianus* С.А.Мей. - К. Коленати = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавказ.); Pb,Рс(НК); [R.] l.c. г. Казбек
4149. *S. buschianus* Sosn. - К. Буша = **III**(Кисл,Л,УН): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Рс(НК); [R.] <Ее> l.c. г. Мехтыген
4150. *S. macrophyllus* Vieb. - К. крупнолистный = **I**(М - Терек); **III**(Ст,Куб,П,Каб,ЧО,Л): (Предкавказ.); S,Pa(НК); [Sp.] l.c. Терек и Кума
4151. *S. racemosus* (Vieb.) DC. - К. кистевой = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Субкавказ*.); Pb,Рс(НК); [Sp.]
4152. *S. paucifolius* S.G.Gmel. - К. малолистный = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Понт.-Южносиб.); Pa,ST(НК); [Sp.]
4153. *S. schvetzovii* Korsh. - К. Швецова = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.]
4154. *S. tataricus* Less. - К. татарский = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Евро-Сиб.); Аа(НК); [Sp.]
4155. *S. rhombifolius* (Adams ex Willd.) Sch.Bip. (*Adenostyles rhombifolia* (Adams) M.Pimen.) - К. ромболистный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавказ.); Pb(НК); [Sp.] <Pm>
4156. *S. platyphylloides* Somm. et Levier (*A. platyphylloides* (Somm. et Levier) Czer.) - К. ложношироколистный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); **IV**(ТА): (Субкавказ*.); Pb(НК); [R.] <Pm>
4157. *S. rojarkovae* Schischk. - К. Поярковой = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); **IV**(ТА); **V**(ЦД): (Кавк.: Общекавказ.); S,Pb(НК); [R.]

4158. *S. othonnae* Bieb. - К. Отонны = **III**(ВЛ,ТЗ,Б); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

4159. *S. lapsanoides* DC. - К. бородавниковидный = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Л,Б,ОС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb(НК); [Sp.] <Esub> I.c. г. Казбек

4160. *S. propinquus* Schischk. (*S. jacquinianus* Rehb.) - К. близкий = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S,Pa(НК); [Sp.]

4161. *S. fluviatilis* Wallr. - К. приречный = **I**(НД,АЕ): (Евро-Сиб.); Aa(НК); [Sp.]

4162. *S. viscosus* L. (*S. calvertii* Boiss.) - К. липкий = **III**(ТЗ,Э,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(Касп): (Евро-Кавк.); Rb(Т); [R.]

4163. *S. vulgaris* L. - К. обыкновенный = **I**(ЗП,ЦП); **III**(Ст,Куб,ЧК,Х,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ): (Палеаркт.); Rb(Т); [Sp.] <Pm>

4164. *S. vernalis* Waldst. et Kit. - К. весенний = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Палеаркт.); Rb,Do(Т); [Pl.]

4165. *S. sosnovskyi* Sof. - К. Сосновского = **III**(ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [Pl.]

4166. *S. noeanus* Rupr. - К. Ноя = **I**(АК,КЕ,ЦП); **II**(ВП); **III**(СК); **V**(Касп: Муртазалиев, 2009): (Ирано-Туран.); Dc(Т); [Sp.]

4167. *S. subdentatus* Ledeb. - К. почтизубчатый = **II**(ВП): (Туранск.); ST(Т); [R.]

Genus 1009. Tephroseris (Reichenb.) Reichenb. - Пепельник

4168. *T. cladobotrys* (Ledeb.) Griseb. et Schenk (*Senecio cladobotrys* Ledeb.) - П. ветвистый = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,Л,УН,Ч); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb(НК); [Sp.] <Esub>

4169. *T. subfloccosa* (Schischk.) Czer. (*S. subfloccosus* Schischk.) - П. почтичлочковатый = **III**(Ст,ЧК,ТЗ,П,Кисл,ВК); **IV**(ТА); **V**(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

4170. *T. caucasigena* (Schischk.) Czer. (*S. caucasigenus* Schischk.) - П. кавказский = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]

4171. *T. karjagini* (Sof.) Golub (*S. karjagini* Sof.) - П. Карягина = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub> I.c. г. Эльбрус

Genus 1010. Dolichorrhiza Galushko - Долихориза <GTC>

4172. *D. caucasica* (Bieb.) Galushko (*Ligularia caucasica* (Bieb.) G.Don fil.; *Senecio caucasica* Bieb.) - Д. кавказская = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Sp.]

4173. *D. renifolia* (С.А.Мей.) Galushko (*L. renifolia* (С.А.Мей.) DC.; *S. renifolia* С.А.Мей.) - Д. почколистная = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [Pl.] <Esub> I.c. окр. с. Коби

4174. *D. correvoniana* (Albov) Galushko (*L. correvoniana* (Albov) Pojark.; *S. correvoniana* Albov) - Д. Корревона = **III**(ВЛ); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb,Da(НК); [R.] <Esub>

Genus 1011. Ligularia Cass. - Бузульник

4175. *L. subsagittata* Pojark. - Б. полустреловидный = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Аа(НК); [Pl.]

Genus 1012. Erechtites Rafin. - Эрехтитес

4176. **E. valerianifolia* С.А.Меу. - Э. валерианолистный = IV(ТА: Конечная, 2008): (Адвент. [Центр. и Южн. Америка]); Rb(Т); [R.]

Genus 1013. Calendula L. - Календула

4177. **C. officinalis* L. - К. лекарственная = I(Т); IV(СЗЗ): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(Т); [R.]

Genus 1014. Echinops L. - Мордовник

4178. *E. orientalis* Trautv. - М. восточный = V(Касп - Дербент): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [R.] l.c. Дербент

4179. *E. viridifolius* Pjin - М. зеленолистный = III(П - Машук): (Кавк.: Предкавк.); Pa(НК); [Rs.] <Es> l.c. Машук

4180. *E. ritro* L. (*E. ruthenicus* Vieb.) - М. обыкновенный = I(ЗП); III(Ст,КР); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.] <Pm>

4181. *E. sphaerocephalus* L. - М. шароголовый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Sp.] <Pm;Pmel>

4182. *E. dagestanicus* Pjin - М. дагестанский = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pa(НК); [Sp.]

4183. *E. galaticus* Freyn (*E. colchicus* Sosn.) - М. галатский = II(Кизл); III(Х - Ходыженск); IV(СЗЗ): (Эвксин.); S,Pa(НК); [Sp.]

Genus 1015. Xeranthemum L. - Сухоцвет

4184. *X. annuum* L. - С. однолетний = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Субпонт*.); ST(Т); [Pl.] <Po;Pm>

4185. *X. squarrosum* Boiss. - С. растопыренный = I(ТС - Грозный); II(Кизл); III(П); V(БН,Касп): (Субтуран*.); ST,Da(Т); [Sp.]

4186. *X. inapertum* (L.) Mill. - С. закрытый = I(Т); III(КР); IV(Н); V(БН,Касп): (Зап.др.средиз.); ST,Da(Т); [R.] <Po>

4187. *X. cylindraceum* Sibth. et Smith. - С. цилиндрический = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); ST(Т); [Sp.] <Po>

Genus 1016. Amphoricarpos Vis. - Амфорикарпус <GD>

4188. ★*A. elegans* Albov - А. изящный = IV(ТА - южная часть): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Da(НК); [R.] <Esub>

Genus 1017. Carlina L. - Колючник

4189. *C. vulgaris* L. (*C. biebersteiniana* Bernh. ex Hornem.) - К. обыкновенный = I(НД,АЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); ST(НК:pb); [Pl.]

Genus 1018. Arctium L. - Лопух

4190. *A. platylepis* (Boiss. et Bal) Sosn. ex Grossh. - Л. широкочешуйчатый = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК:pb); [R.]

4191. *A. lappa* L. - Л. репейник = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [R.] <Pm;Pmel>

4192. *A. nemorosum* Lej. - Л. дубравный = III(П,Л,УН,Ч): (Европ.); S,Rb(НК:pb); [Sp.] <Rg;Pmel>

4193. *A. minus* (Hill) Bernh. - Л. малый = I(НД,ЗПМ,АЕ,[СК,НК - Кума: Танфильев, Кононов, 1987]); IV(СЗЗ - Зернов, 2006); V([ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009): (Понтич.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>

4194. *A. palladini* (Marc.) Grossh. - Л. Палладина = I(М); III(Ст,Куб,ЧК,П,Кисл,Каб,ЧО,Л,Ч); IV(Н); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); S,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pmel>

4195. *A. tomentosum* Mill. - Л. войлочный = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); III(Ст,Куб,П); IV(Н); V(Дар): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>

Genus 1019. Cousinia Cass. - Кузиния

4196. *C. orientalis* (Adams) C.Koch - К. восточная = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [Sp.]

Genus 1020. Saussurea DC. - Горькуша

4197. *S. amara* (L.) DC. - Г. горькая = I([НК: Танфильев, Кононов, 1987]): (Субтуран*.); Dc(НК); [R.]

4198. *S. salsa* (Pall. ex Vieb.) Spreng. - Г. солончаковая = I(ЗПМ,[НК: Танфильев, Кононов, 1987]); II(ВП: Муртазалиев, 2009): (Вост.средиз.); Dc(НК); [R.]

Genus 1021. Jurinea Cass. - Наголоватка

4199. *J. cyanoides* (L.) Reichenb. - Н. васильковая = I(АК,КН); III([Ст: Танфильев, Кононов, 1987]): (Понт.-Южносиб.); Dd(НК); [R.]

4200. *J. ewersmannii* Bunge - Н. Эверсмана = I(КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М); II(КН); III(Ст): (Понтич.); Db(НК); [R.]

4201. *J. ciscaucasica* (Sosn.) Iljin - Н. предкавказская = I(АК,М); III(СК,Каб,ЧО); V(Касп): (Кавк.: Предкавк.); Db(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Нальчик

4202. *J. wogonowii* Iljin - Н. Воронова = III(ТЗ - р. Б.Зеленчук, р. Алибек): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Da(НК); [R.] <Es>

4203. *J. iljinii* Grossh. - Н. Ильина = III(ТЗ - верх. Урупа и Марухи): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Do(НК); [R.] <Es> l.c. г. Ацгара

4204. *J. pseudoiljinii* Galushko et Nemirova - Н. ложно-Ильина = III(ВЛ - р. Кислинка): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [R.] <Es> l.c. верх. Б.Лабы, р. Кислинка

4205. *J. sosnovskyi* Grossh. - Н. Сосновского = III(ЧК - гг. Джиса и Ахмет): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Скалистый хр., ущ. р. Б.Лаба

4206. *J. venusta* Iljin - Н. красивая = III(ВЛ - верх. М.Лабы): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Do(НК); [R.] <Es>

4207. *J. pumila* Albov - Н. низкая = III(ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Da,Do(НК); [R.] <Esub>

4208. *J. bellidioides* Boiss. - Н. маргаритковидная = III(УН - р. Ардон): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Es>

4209. *J. annae* Sosn. - Н. Анны = III(УН - сс. Балта-Чми, Ч - г. Хахалги): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Скалистый хр., ущ. р. Диднеуа-Ком

4210. *J. dolomitica* Galushko - Н. доломитовая = III(ЦЭ - с. Верх. Чегем, Л - р. Чегем в обл. Скалистого хр.): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es>

4211. *J. levieri* Albov (*J. albovii* Galushko et Nemirova) - Н. Левье = III(ВЛ): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Da(НК); [Sp.] <Es> l.c. г. Фишт

4212. *J. prokhanovii* Nemirova - Н. Проханова = III(УН - pp. Генальдон и Гизельдон): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Генальдон
4213. *J. galushkoi* Nemirova - Н. Галушко = III(Л - pp. Черек Балкарский и Урух): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Es> l.c. Скалистый хр., ущ. р. Урух
4214. *J. brachyrapra* Nemirova - Н. короткохолокковая = III(УН - р. Фиагдон): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Es> l.c. Скалистый хр., р. Фиагдон
4215. *J. filicifolia* Boiss. - Н. папоротниколистная = III(ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Ee> l.c. ущ. р. Ардон
4216. *J. akinfieyii* Nemirova - Н. Акинфиева = III(ОС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. нижн. течение р. Садон (приток Ардона)
4217. *J. coronopifolia* Somm. et Levier - Н. вороньелапая = III([ТЗ - Кель-Баши и Б.Хутый: **Воробьёва, Онипченко, 2001**; верх. Б.Зеленчука],ЦЭ - верх Кубани и Малки): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.] <Ee> l.c. хребет между pp. Даут и Учкулан
4218. *J. multiflora* (L.) Vieb. - Н. многоцветковая = I(НД,ЗПМ,АЕ,МД, АИ,Прик,ТБ,НК); II(ВП); III(Ст,СК,П,ТС): (Понт.-Южносиб.); Db,Dc,Dd (НК); [Pl.]
4219. *J. stoechadifolia* (Vieb.) DC. - Н. лавандолистная = I(Т); III(КР); IV(Н): (Понтич.); Da(НК); [R.]
4220. *J. alata* (Desf.) Cass. - Н. крылатая = III(ЧК,Х,ВЛ,Кисл,ЦЭ,Л): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК): [Sp.] <Esub>
4221. *J. ruprechtii* Boiss. - Н. Рупрехта = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(НК); [R.] <Es> l.c. Дагестан (?)
4222. *J. arachnoidea* Bunge - Н. паутинистая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЧК,Кисл,Тер); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
4223. *J. blanda* (Vieb.) C.A.Mey. - Н. привлекательная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЗ, Б,ОС); IV(Н); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Do(НК); [Sp.]

Genus 1022. *Jurinella* Jaub. et Spach - Наголоваточка

4224. *J. moschus* (Nabl.) Vobr. - Н. мускусная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б, УН,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [Sp.]
4225. *J. subcaulis* (Fisch. et C.A.Mey.) Iljin - Н. бесстебельная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pc,Do(НК); [Pl.]

Genus 1023. *Carduus* L. - Чертополох

4226. *C. nutans* L. - Ч. поникающий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК, Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
4227. *C. acanthocephalus* C.A.Mey. - Ч. колючеголовый = III(ОС,ВС); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc(НК); [R.] <Esub>
4228. *C. poliochrus* Trautv. - Ч. серо-жёлтый = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub> l.c. с. Ахты (р. Самур)
4229. *C. uncinatus* Vieb. (*C. stenoccephalus* Tamamsch.) - Ч. крючковатый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп): (Субпонт*.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
4230. *C. hamulosus* Ehrh. - Ч. крючочковый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Субпонт*.); ST(НК:pb); [Sp.] <Pmel>

4231. *C. pseudocollinus* (Schmalh.) Klok. - Ч. ложнохолмовой = **II(ВП); III(Ст,СК,П,Каб,ЧО); V(БН,Касп):** (Понтич.); ST(НК:pb); [R.] <Pmel>
4232. *C. adpressus* С.А.Меу. - Ч. прижатый = **III(ОС,ВС); V(АС):** (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Sp.]
4233. *C. laciniatus* Ledeb. (*C. multijugus* С.Коч) - Ч. рассечённый = **III(Ст,Куб,ЧК,ТЗ,П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(ТА); V(Касп):** (Кавк.: Общекавк.); S,Pa(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
4234. *C. novorossicus* Porten. - Ч. новороссийский = **IV(Н,ТА - окр. Туапсе):** (Кавк.: Эукавк.); ST,Da(НК); [R.] <Es> l.c. окр. пос. Пшада (Геленджикский район)
4235. *C. seminudus* Vieb. - Ч. почтиголый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Субкавк*.); ST(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
4236. *C. acanthoides* L. - Ч. колючий = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Евро-Кавк.); SD,Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
4237. *C. crispus* L. - Ч. курчавый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
4238. *C. albidus* Vieb. (*C. arabicus* Jacq. ex Murray) - Ч. беловатый = **II(Кизл); V(БН,Касп):** (Ирано-Туран.); Rb(T); [R.] <Pmel>
4239. *C. cinereus* Vieb. - Ч. сероватый = **I(АК,Т,М); II(Кизл); III([Ст: Портениер, 1997]); IV(Н); V(БН,Касп):** (Ирано-Туран.); Rb(T); [R.] <Pmel>
4240. *C. onopordioides* Fisch. ex Vieb. - Ч. татарниковый = **V(ЦД - Гапцах: Муртазалиев, 2009):** (Ирано-Туран.); ST(НК:pb); [R.]

Genus 1024. *Cirsium* Hill - Бодяк

4241. *C. aggregatum* Ledeb. - Б. скученноголовчатый = **III(ВЛ: Зернов, 2006); IV(ТА - басс. р. Мзымты):** (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
4242. *C. gagnidzei* Charadze (*C. longiflorum* Charadze) - Б. Гагнидзе = **IV(ТА):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
4243. *C. chlorocomos* Somm. et Levier - Б. зеленоверхий = **III(ТЗ,ЦЭ); IV(ТА):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub>
4244. *C. caucasicum* (Adams) Petr. - Б. кавказский = **III([ТЗ,ЦЭ,ОС]: Литвинская, Муртазалиев, 2009):** (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
4245. *C. abkhasicum* (Petr.) Grossh. - Б. абхазский = **III(ВЛ,ТЗ):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
4246. *C. erythrolepis* С.Коч - Б. красночешуйный = **III(ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Осетия (?)
4247. *C. buschianum* Charadze (*C. tricholoma* auct.) - Б. Буша = **III(ТЗ,ЦЭ,Б):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub>
4248. *C. osseticum* (Adams) Petrak - Б. осетинский = **III(ОС,ВС); V(АС):** (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.] l.c. р. Терек, окр. с. В.Ларс
4249. *C. fominii* Petr. - Б. Фомина = **IV(ТА - верх. Мзымты: Тимухин, 2012):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
4250. *C. caput-medusae* Somm. et Levier - Б. голова Медузы = **III(ТЗ); IV(ТА):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
4251. *C. czerkessicum* Charadze - Б. черкесский = **III(ВЛ); IV(ТА):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> l.c. Гузерипль, г. Абаго

4252. *C. vulgare* (Savi) Ten. - Б. обыкновенный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
4253. *C. strigosum* (Bieb.) Bieb. - Б. жесткощетинистый = **V(АС - Ахты: Литвинская, Муртазалиев, 2009):** (Кавк.: Эукавк.); ST,Rb(НК); [R.] <Esub>
4254. *C. arachnoideum* (Bieb.) Bess. - Б. паутинистый = **III(Ст,П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(Н); V(ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); Da,Pa(НК); [Sp.] <Pmel> <Esub> l.c. Бештау
4255. *C. euxinum* Charadze - Б. черноморский = **I(Т); IV(СЗЗ):** (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Ee> l.c. Новороссийск
4256. *C. kosmelii* (Adams) Fisch. ex Hohen. - Б. Космели = **III(ЦЭ); V(АС):** (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
4257. *C. macrobotrys* (C.Koch) Boiss. - Б. крупнокистевой = **V(АС - Самур (Куруш): (Субкавк*.); Pb(НК); [R.]**
4258. *C. macrocephalum* С.А.Меу. - Б. крупноголовый = **V(АС):** (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Sp.] <Esub>
4259. *C. cephalotes* Boiss. - Б. головчатый = **III(ЦЭ - верх. Баксана,ОС):** (Субкавк*.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Rg>
4260. *C. pugnaх* Somm. et Levier - Б. воинственный = **III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Л,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.] l.c. Зап. Кавказ, Кубань (?)
4261. *C. balkharicum* Charadze - Б. балкарский = **III(ЦЭ,Б,ОС,ВС):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Ee>
4262. *C. argillosum* V.Petrov ex Charadze - Б. глинистый = **V(ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>
4263. *C. polonicum* (Petraк) Iljin - Б. польский = **I(НД,ЗПМ,АЕ):** (Европ.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
4264. *C. tomentosum* С.А.Меу. - Б. войлочный = **III(ОС,ВС); V(АС):** (Субкавк*.); Pc,Do(НК); [Sp.]
4265. *C. daghestanicum* Charadze (*C. ketzkhovellii* Charadze; *C. tindiacum* Charadze) - Б. дагестанский = **V(АС):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. окр. с. Лучек
4266. *C. ciliatum* (Murr.) Moench - Б. реснитчатый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Кавк.: Общекавк.); S,Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
4267. *C. szovitsii* (C.Koch) Boiss. - Б. Шовица = **V(ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); Rb(НК); [R.]
4268. *C. serrulatum* (Bieb.) Fisch. - Б. мелкопильчатый = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК); III(МА):** (Понт.-Южносиб.); Pa,ST,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pmel>
4269. *C. sinuatum* (Trautv.) Boiss. (*C. charadzeae* (Kimer.) Czer.) - Б. выемчатый = **III(Б,ОС,ВС); V(АС):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Курах
4270. *C. echinus* (Bieb.) Hand.-Mazz. - Б. игольчатый = **III(ВЛ,ЧК,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); V(ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); Pb,Rb(НК); [Sp.]

4271. *C. kusnetzowianum* Somm. et Levier - Б. Кузнецова = **III**(ВЛ,ТЗ); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [R.]
4272. *C. oblongifolium* С.Koch - Б. продолговатолистный = **IV**(ТА - оз. Кардывач: **Семагина, 1999**): (Кавк.: Эукавк.); Aa,Pb(НК); [R.]
4273. *C. sychnosanthum* Petrak - Б. многоцветковый = **III**(ВЛ); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Aa(НК); [R.]
4274. *C. dealbatum* Vieb. - Б. беловатый = **III**(ЧК,ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb,Rb(НК); [Pl.] l.c. Кисловодск
4275. *C. biebersteinii* Charadze - Б. Биберштейна = **III**(Ст,Куб,Э,ВК); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.] <Pmel>
4276. *C. canum* (L.) All. - Б. серый = **I**(НД,ЗПМ,КЕ); **II**(Кизл): (Европ.); Pa,Dc(НК); [Sp.] <Pmel>
4277. *C. depilatum* Boiss. et Bal. (*C. hygrophiloides* Charadze) - Б. безволосый = **III**(ЦЭ): (Субкавк.); Pb(НК); [R.]
4278. *C. alatum* (S.G.Gmel.) Vorb. - Б. крылатый = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Субтуран*.); Dc(НК); [Sp.] <Pmel>
4279. *C. svaneticum* Somm. et Levier - Б. сванетский = **III**(ТЗ,Кисл, ЦЭ,Б); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb,Aa(НК); [Sp.] <Esub>
4280. *C. uliginosum* (Vieb.) Fisch. - Б. болотный = **III**(Э,Л,Каб): (Кавк.: Эукавк.); Aa(НК); [Sp.] <Ee;Pmel> l.c. Кисловодск
4281. *C. elbrusense* Somm. et Levier - Б. эльбрусский = **III**([ТЗ - pp. Уллу-Муруджу, Муху, Чучхура: **Воробьёва, Онипченко, 2001**],ЦЭ - верх. Кубани и Баксана,[ОС,ВС]: **Литвинская, Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Aa(НК): [R.] <Es>
4282. *C. subinermis* Fisch. et С.А.Меу. - Б. слабо-вооружённый = **III**(ОС,ВС); **V**(АС): (Субкавк.); S(НК); [R.]
4283. *C. elodes* Vieb. - Б. болотолюбивый = **I**(М); **II**(ВП); **III**(ЧО): (Субкавк*.); Rb(НК); [R.] <Pmel>
4284. *C. hygrophylum* Boiss. - Б. влаголюбивый = **I**(П?: **Меницкий, 2008в**): (Субкавк*.); Aa(НК); [Rs.]
4285. *C. obvallatum* (Vieb.) Fisch. - Б. окутанный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС, ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК): [Pl.]
4286. *C. simplex* С.А.Меу. - Б. простой = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Aa(НК); [Pl.] l.c. г. Эльбрус
4287. *C. rhizocepalum* С.А.Меу. - Б. корнеголовый = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б, ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]
4288. *C. esculentum* (Siev.) С.А.Меу. - Б. съедобный = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Палеаркт.); Aa,Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
4289. *C. arvense* (L.) Scop. - Б. полевой = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб, ТЗ,СКТ,П); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Евро-Сиб.); Rb(НК); [Sp.] <Pm;Pmel>
4290. *C. incanum* (S.G.Gmel.) Fisch. - Б. седой = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СКТ,П); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Понт.-Южносиб.); Rb(НК); [Sp.] <Pmel>
4291. *C. setosum* (Willd.) Vieb. - Б. щетинистый = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,Т); **III**(Куб,Кисл): (Палеаркт.); Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pmel>

Genus 1025. Picnomon Adans. - Пикномон

4292. *P. acarna* (L.) Cass. - П. колючий = III(Куб, ЧК, КР, ТС, ЧО); IV(Н); V(БН, Касп): (Общедр. средиз.); Rb(НК:pb); [Sp.]

Genus 1026. Lamyra (Cass.) Cass. - Ламира

4293. *L. echinocephala* (Willd.) Tamamsch. (*Ptilostemon echinocephalus* (Willd.) Greuter) - Л. ежеголовая = III(ЧК, [П - Машук, Кисл - окр. Кисловодска); IV(СЗЗ); V([ЦД - Гергебиль, Усучай, Мискинджа]: Муртазалиев, 2009): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Sp.] <в П, Кисл и ЦД - Rx>

Genus 1027. Silybum Adans. - Расторопша

4294. *S. marianum* (L.) Gaertn. - Р. пятнистая = I(АК, Тем, Т); II(Касп); IV(Н); V(БН, Касп): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [R.] <Pm>

Genus 1028. Onopordum L. - Татарник

4295. *O. acanthium* L. - Т. колючий = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, ТЗ, Э); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm; Pmel>

4296. *O. tauricum* Willd. - Т. крымский = II(КН - Червлёные Буруны: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); Rb(НК:pb); [R.] <Rx>

Genus 1029. Ancathia DC. - Анкафия <GM>

4297. *A. igniaria* (Spreng.) DC. - А. огненная = V(Касп, ЦД): (Субтуран.*); Da(НК); [R.]

Genus 1030. Serratula L. - Серпуха

4298. *S. coronata* L. - С. венценосная = III(Ст, Куб, КР, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп, ЦД): (Палеаркт.); Ra(НК); [Sp.] <Pm>

4299. *S. erucifolia* (L.) Boriss. - С. эруколистная = I(НД, ЗПМ, АЕ, М); II(ВП); III(Ст, ЧК, КР); IV(Н); V(Касп): (Субтуран*.); Dc(НК); [R.]

4300. *S. radiata* (Waldst. et Kit.) Vieb. (*S. bracteifolia* (Iljin ex Grossh.) Stank.) - С. лучистая = I(АЕ); III(Ст, Куб, ЧК, КР, СКТ, П, Кисл); IV(Н); V(Касп, ЦД): (Евро-Кавк.); Ra(НК); [Sp.]

4301. *S. biebersteiniana* (Iljin ex Grossh.) Takht. - С. Биберштейна = V(Касп, ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Ra, Pb(НК); [Sp.]

4302. *S. haussknechtii* Boiss. (*S. transcaucasica* (Bornm.) Sosn. ex Grossh.) - С. Хаускнехта = V(Касп, ЦД): (Субкавк.*); ST, Da(НК); [R.]

4303. *S. quinquefolia* Vieb. ex Willd. - С. пятилистная = III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субкавк*.); S(НК); [Pl.]

4304. *S. caucasica* Boiss. - С. кавказская = V(ЦД, АС): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.]

Genus 1031. Stemmakantha Cass. - Стеммаканта

4305. *S. pulchra* (Fisch. et C.A.Mey.) M.Dittrich (*Rhaponticum pulchrum* Fisch. et C.A.Mey.) - С. красивая = III(ОС: Габриелян, 2008); V(ЦД, АС): (Субкавк*.); Da, Do(НК); [R.]

4306. *S. serratuloides* (Georgi) M.Dittrich (*Rh. serratuloides* (Georgi) Bobr.; *Leuzea salina* Spreng.) - С. серпуховидная = I(НД, ЗПМ, АЕ, [АК, Тем: Гроссгейм, 1949], Прик - г. Брык); III(СК): (Понт.-Южносиб.); Dc(НК); [Sp.]

Genus 1032. Acroptilon Cass. - Горчак

4307. *A. repens* (L.) DC. - Г. ползучий = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П); IV(СЗЗ); V(БН, Касп): (Палеаркт.); ST, Ra, Rb(НК); [Sp.] <Pm>

Genus 1033. Callicephalus C.A.Mey. - Каллисефалюс <GM>

4308. *C. nitens* (Bieb.) C.A.Mey. - К. блестящий = V(Касп,ЦД): (Субкавказ*.); Da(T); [R.]

Genus 1034. Amberboa (Pers.) Less. - Амбербоа

4309. *A. glauca* (Willd.) Grossh. - А. сизая = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); SD(НК:pb); [Sp.]

Genus 1035. Grossheimia Sosn. et Takht. - Гроссгеймия

4310. *G. polyphylla* (Ledeb.) Holub (*G. ossica* (C.Koch) Sosn. et Takht.; *Centaurea polyphylla* Ledeb.) - Г. многолистная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавказ.); S,Pb(НК); [Sp.]

Genus 1036. Chartolepis Boiss. - Хартолепис

4311. *Ch. intermedia* Boiss. - Х. средний = I(НД,ЗПМ,АЕ,МД,АИ,НК); II(КН): (Субтуран*.); Dc(НК); [R.]

Genus 1037. Psephellus Cass. - Псефеллюс

4312. *P. marschallianus* (Spreng.) A.D.Mikheev (*Centaurea marschalliana* Spreng.) - П. Маршалла = III(Ст - Сенгилеевская котловина): (Понтич); Da(НК); [R.] <Rx>

4313. *P. annae* Galushko - П. Анны = I(Прик); III(Ст,П - Машук): (Кавк.: Предкавказ.); Da(НК); [Sp.] <Ee> л.с. Прикалаусские высоты

4314. *P. hymenolepis* (Trautv.) Boiss. (*C. hymenolepis* Trautv.) - П. плёнчаточешуйчатый = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub> л.с. окр. с. Курах

4315. *P. boissieri* (Sosn.) Sosn. (*C. boissieri* Sosn.) - П. Буасье = V(ЦД): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Sp.] <Es> л.с. окр. с. Гимри

4316. *P. schistosus* (Sosn.) Alieva (*C. schistosa* Sosn.) - П. осыпной = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Pl.] <Esub>

4317. *P. galushkoi* Alieva (*C. galushkoi* (Alieva) Czer.) - П. Галушко = V(Касп - Леваша,ЦД): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Sp.] <Es> л.с. Даргинский р-н, г. Шамхал-даг

4318. *P. gamidii* Alieva - П. Гамида = V([ЦД,Касп - Муги, Леваша, Кубачи, Урари]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [R.] <Ee> л.с. Акушинский р-н, с. Муги

4319. *P. alexeenkoi* Alieva - П. Алексеенко = V(АС - Цекоб: Алиева, 1983): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Do(НК); [R.] <Es> л.с. Советский р-н, с. Цекоб

4320. *P. prokhanovii* Galushko (*P. kemulariae* Charadze; *C. prokhanovii* (Galushko) Czer.) - П. Проханова = III(Л,УН,Ч): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Sp.] <Ee> л.с. р. Хызны-Су, Скалистый хребет

4321. *P. andinus* Galushko et Alieva (*C. andina* (Galushko et Alieva) Czer.) - П. андийский = III(Ч - оз. Кезеной-ам); V(ЦД - с.Анди): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Da(НК); [Sp.] <Es> л.с. Андийский хр., оз. Кезеной-ам

4322. *P. pseudoandinus* Galushko et Alieva - П. ложноандийский = III(ВС - Таргим): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Rs] <Es> л.с. р. Асса, с. Таргим

4323. *P. buschiorum* Sosn. (*C. buschiorum* (Sosn.) Czer.; *C. ossetica* Sosn. p.p.) - П. Бушей = III(ВЛ - Малая и Большая Лаба,[ТЗ - Б.Зеленчук, Нижний

- Архыз]: Литвинская, Муртазалиев, 2009); IV(ТА - Аибга): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. верх. р. Малая Лаба
4324. *P. barbeyi* Albov (*C. barbeyi* (Albov) Sosn.) - П. Барбея = III(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>
4325. *P. holophyllus* Socz. et Lipat. (*C. holophylla* (Socz. et Lipat) Socz. et Lipat.) - П. цельнолистный = III(ВЛ,ТЗ,Кисл); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,S(НК); [R.] <Esub>
4326. *P. circassicus* (Albov) Galushko - П. черкесский = III(ВЛ,[ТЗ - Клухорский перевал: Колаковский, 1982]); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Оштен
4327. *P. maleevii* Sosn. (*C. maleevii* (Sosn.) Sosn.) - П. Малеева = III(Х,ВЛ): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Гуамский хр., ст. Темнолесская
4328. *P. troitzkyi* Sosn. (*C. troitzkyi* (Sosn.) Sosn.) - П. Троицкого = III(ЧК,ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. Теберды
4329. *P. salviifolius* Boiss. (*C. salviifolia* (Boiss.) Sosn.) - П. шалфеелистный = III(ЦЭ,ВК); V(Даг): (Кавк.: Эукавк.); Da,Do(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Цейское ущелье
4330. *P. czererpanovii* Alieva - П. Черепанова = V(ЦД - Каракойсу): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Es> l.c. окр. с. Гуниб
4331. *P. paucilobus* (Trautv.) Boiss. (*C. pauciloba* Trautv.) - П. немноголопастный = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. с. Курах
4332. *P. abchasicus* Albov (*P. heterophyllus* Boiss. et Huet.; *Centaurea abchastica* (Albov.) Sosn.) - П. абхазский = III(ВЛ: Михеев, 2008): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>
4333. *P. declinatus* (Bieb.) C.Koch (*C. declinata* Bieb.) - П. наклоненный = III(КР); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Sp.] <Rx>
4334. *P. ciscaucasicus* (Sosn.) Galushko (*C. ciscaucasica* Sosn.) - П. предкавказский = III(ЧК,Кисл,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Кисловодск
4335. *P. leucophyllus* (Bieb.) С.А.Мей. (*C. leucophylla* Bieb.) - П. белолистный = III(ЧК,СК,П): (Кавк.: Предкавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Пятигорск
4336. *P. anatolii* A.L.Ivanov - П. Анатолия = III([П,Кисл]: Иванов, 1997): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Es> l.c. Кисловодск, Боргустанский хр.
4337. *P. dealbatus* (Willd.) Boiss. (*C. dealbata* Willd.) - П. беловатый = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel;Po>
4338. *P. gnilovskoyi* Galushko - П. Гниловского = III(ТЗ - верх. Б.Зеленчук): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Es> l.c. верх. р. Б. Зеленчук
4339. *P. daghestanicus* Sosn. - П. дагестанский = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК): [Pl.] <Esub> l.c. окр. с. Гуниб
4340. *P. absinthifolius* Galushko - П. полыннолистный = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. оз. Кезеной-ам

Genus 1038. Aetheorappus Cass. - Этеопапрус

4341. *Ae. pulcherrimus* (Willd.) Cass. - Э. красивейший = V(ЦД): (Субкавк*.); Pb,Pc(НК); [Sp.]

4342. *Ae. caucasicus* Sosn. - Э. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК); [Sp.]

4343. *Ae. vvedenskyi* (Sosn.) Sosn. - Э. Введенского = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pс,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. г. Большой Бамбак

Genus 1039. *Sosnovskya Takht.* - Сосновскія

4344. *S. daghestanica* (Lipsky) Czer. (*Centaurea daghestanica* (Lipsky) Wagenitz) - С. дагестанская = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Чир-Юрт

4345. *S. ruprechtii* (Boiss.) Takht. (*C. ruprechtii* (Boiss.) Wagenitz) - С. Рупрехта = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Es> l.c. окр. с. Голотль

Genus 1040. *Rharonticoides L.* - Рапонтиковидка

4346. *Rh. ruthenica* (Lam.) M.V.Agab. et Greuter. (*Centaurea ruthenica* Lam.) - Р. русская = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,ЦП); III(Ст,СК,П,ТС): (Субтуран*.); ST(НК); [R.] <Pmel>

4347. *Rh. razdorskyi* (Karjagin) M.V.Agab. et Greuter (*C. razdorskyi* Karjagin) - Р. Раздорского = V(Касп - Талги: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Da,Dd(НК); [R.] <Esub>

Genus 1041. *Centaurea L.* - Василёк

4348. *C. taliewii* Kleop. - В. Талиева = I(ЗПМ,АЕ - Мечетинская): (Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx>

4349. *C. nigrofimbria* (C.Koch) Sosn. - В. чёрнобахромчатый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

4350. *C. tanaitica* Klok. - В. донской = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Понтич.); Pa,ST(НК); [R.]

4351. *C. pseudotanaitica* Galushko nomen nudum - В. ложнодонской = III(Ст,СК,ТС): (Кавк.: Предкавк.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Ee>

4352. *C. czerkessica* Dobroc. et Kotov - В. черкесский = I(Т); III(КР); IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.] <Ee>

4353. *C. fuscomarginata* (C.Koch) Juz. - В. буроотороченный = I(Т); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Pa(НК); [Rs.]

4354. *C. cheiranthifolia* Willd. - В. бледно-жёлтый = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]

4355. *C. willdenowii* Czer. - В. Вильденова = III(Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pс(НК); [R.] <Esub> l.c. Балкария, Хызны-су

4356. *C. depressa* Vieb. - В. прижатый = III(П,Кисл,Каб,ЧО,Л,УН,Ч); V(БН,Касп): (Вост.средиз.); Ra,Rb(Т); [R.] <Pmel>

4357. *C. cyanus* L. - В. синий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Голаркт.); Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pm;Pmel>

4358. *C. substituta* Czer. - В. замещающий = I(НД); III(Ст,Куб,КР); IV(Н): (Понтич.); S,Pa(НК); [Sp.]

4359. *C. abbreviata* (C.Koch) Hand.-Mazz. - В. укороченный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк*.); S,Pa,Pb(НК); [Sp.]

4360. *C. salicifolia* Vieb. - В. иволистный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавк*.); S,Pa(НК); [Sp.] l.c. Владикавказ

4361. *C. pseudophrygia* C.A.Mey. - В. ложнофригийский = **I**(НД,АЕ): (Понтич.); Pa(НК); [Pl.]
4362. *C. alutacea* Dobrocz. - В. серовато-жёлтый = **III**(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,П,Кисл); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pa,Pb(НК); [Sp.] <Esub>
4363. *C. abnormis* Czer. - В. уклоняющийся = **III**(Ст,Куб,ЧК,Х,СК,П): (Кавк.: Предкавк.); S,Pa(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Майкоп
4364. *C. trichosephala* Vieb. - В. волосистоголовый = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); **III**(П): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.]
4365. *C. daghestanica* (Lipsky) Czer. - В. дагестанский = (**V**(Касп - Чиркей, Ишкарты, Чирюрт, дол. Кар-Кар, Халимбек-аул, Н. Казанище, ЦД(Ахты, Усучай)): **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.]; <Ee> l.c. Чирюрт
4366. *C. ruprechtii* (Boiss.) Czer. - В. Рупрехта = **V**([ЦД - Анди, Ботлих, Голотль, Гергебиль, Цудахар, Хаджалмахи]: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.] <Es> l.c. Голотль
4367. *C. trinervia* Steph. - В. трёхжилковый = **I**(АК,КЕ); **III**(Ст,Куб,ЧК,КР,П,ТС); **IV**(Н): (Понтич.); ST(НК); [Sp.]
4368. *C. avarica* Tzvel. - В. аварский = **V**(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. окр. с. Ботлих
4369. *C. sarandinakiae* N.B.Illar. (*C. novorossica* Klok.; *C. sterilis* auct.) - В. Сарандинаки (новороссийский) = **I**(Т); **IV**(Н - Анапа, Новороссийск): (Кр.-Новоросс.); Da(НК:pb); [Sp.]
4370. *C. transcaucasica* Sosn. ex Grossh. - В. закавказский = **V**([Касп - Гильяр, АС - Рутул]: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК:pb); [R.]
4371. *C. salonitiana* Vis. - В. салонский = **I**(НД,Т); **III**(КР); **IV**(Н): (Понтич.); ST, Da(НК); [Sp.]
4372. *C. reflexa* Lam. - В. отогнутый = **V**(Касп - Дербент): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [R.]
4373. *C. orientalis* L. - В. восточный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Понтич.); ST(НК); [Pl.]
4374. *C. apiculata* Ledeb. - В. шипиконосный = **I**(АК,КЕ,Тем,Т); **III**(Ст,Куб,ЧК,СКТ,П); **IV**(Н); **V**(Касп,ЦД): (Субсредиз*.); Pa,ST(НК); [R.]
4375. *C. adpressa* Ledeb. - В. прижаточешуйчатый = **I**(ЗП); **III**(Ст,Куб,ЧК,СКТ,П); **IV**(Н); **V**(Касп,ЦД): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.]
4376. *C. pseudoscabiosa* Boiss. et Buhse (*C. ossetica* Sosn.) - В. ложноскобиоза = **V**(ЦД,АС): (Субкавк*.); Pb(НК); [R.]
4377. *C. micrantha* S.G.Gmel. (*C. ketulariae* Dumb.; *C. kubanica* Klok.) - В. мелкоцветковый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(Кизл); **III**(Куб,ЧО); **IV**(Н); **V**(БН,Касп): (Палеаркт.); ST(НК:pb); [Sp.]
4378. *C. scripczinskyi* A.D.Mikheev - В. Скрипчинского = [**I**(Прик); **III**(Ст,П,Кисл)]: **Михеев, 1997**): (Кавк.: Предкавк.); Db(НК); [Sp.] <Ee> l.c. окр. г. Кисловодска
4379. *C. arenaria* Vieb. - В. песчаный = **I**(НК); **II**(ВП); **V**(Касп): (Туранск.); Db(НК:pb); [R.] l.c. р.Кума

4380. *C. odessana* Prodan - В. одесский = I[АК - косы Долгая, Сазальницкая, Ейский остров, Тем - дельта Кубани, Т]: **КК Краснодарского края, 2017**): (Понтич.); Db(НК:pb); [R.]
4381. *C. majorovii* Dumb. - В. Майорова = V(Касп - бархан Сарыкум): (Понтич.); Db(НК); [Rs.] l.c. Кумторкала
4382. *C. vicina* Lipsky - В. соседний = IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК:pb); [R.] <Es> l.c. Новороссийск
4383. *C. ovina* Pall. ex Willd. - В. овечий = V(БН, Касп, ЦД): (Субкавк*.); Db(НК); [Rs.]
4384. *C. caprina* Stev. - В. овечий = III(Ст); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Db, Dd, Rb(НК); [R.] <Rx>
4385. *C. squarrosa* Willd. - В. оттопыренный = II(Кизл = южная часть); III(ТС); V(БН, Касп, ЦД): (Субтуран*.); ST, Rb(НК:pb); [Sp.]
4386. *C. caspia* Grossh. - В. каспийский = II(Кизл); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Db(НК:pb); [Sp.]
4387. *C. diffusa* Lam. - В. раскидистый = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(БН, Касп, ЦД): (Понтич.); ST, Rb(НК:pb); [Pl.]
4388. *C. solstitialis* L. - В. солнечный = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П, Кисл); IV(Н); V(БН, Касп): (Ирано-Туран.); SD(НК:pb); [Sp.]
4389. *C. iberica* Trev. ex Spreng. - В. грузинский = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ТЗ, СКТ, П); IV(СЗЗ); V(БН, Касп): (Ирано-Туран.); Rb(НК:pb); [Pl.]
- Genus 1042. Phalacrachena Pjin - Лысосемянник <GD>**
4390. *Ph. inuloides* (Fisch. ex Janka) Pjin (*Centaurea inuloides* Fisch. ex Janka) - Л. девясиловидный = I(НД, ЗПМ, АЕ, АК): (Понтич.); Аа, Dc(НК); [Sp.]
- Genus 1043. Cnicus L. - Кникус**
4391. *C. benedictus* L. - К. благословенный = V(Касп - Самур: Муртазалиев, 2009): (Общедр.сред.); Rb(Т); [R.]
- Genus 1044. Carthamus L. - Сафлор**
4392. *C. lanatus* L. - С. шерстистый = I(АЕ, АК, КЕ, Прик, ТБ); II(Кизл); III(Ст, Куб, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(БН, Касп): (Общедр.средиз.); Rb(Т); [Pl.]
4393. *C. glaucus* Vieb. - С. сизый = I(Т); III(КР); IV(Н): (Субкавк*.); Rb(Т); [R.]
- Genus 1045. Scrupina (Pers.) DC. - Крупина**
4394. *C. vulgaris* Cass. - К. обыкновенная = I(НД, Тем, Т); III(КР, СК, П, ТС); IV(Н); V(БН, Касп): (Субтуран*.); ST, Da(Т); [R.]
4395. *C. scrupinastrum* (G.Moris) Vis. - К. крупиновидная = V(Касп - Дербент): (Субкавк*.); Da, Do(НК); [R.] <Rx>
- Genus 1046. Scolymus L. - Блошник**
4396. *S. hispanicus* L. - Б. испанский = I(Т); IV(СЗЗ): (Средиземн.); Db(Т); [Sp.]
- Genus 1047. Cichorium L. - Цикорий**
4397. *C. inthybus* L. - Ц. обыкновенный = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ТЗ, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(БН, Касп, ЦД): (Палеаркт.); Pa, Rb(НК); [Pl.] <Pa; Pm; Pmel>

Genus 1048. *Scorzonera* L. - Козелец

4398. *S. filifolia* Boiss. - К. нителестный = III(ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); ST, Da(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. с. Гимри
4399. *S. charadzeae* Parava - К. Харадзе = III(ОС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] l.c. с. Чми
4400. *S. parviflora* Jacq. - К. мелкоцветковый = I(НД,ЗПМ,АК,КЕ); II(Кизл); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Dc(НК:pb); [Sp.]
4401. *S. stricta* Hornem. - К. торчащий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
4402. *S. taurica* Vieb. - К. крымский = II(Кизл); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Касп): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
4403. *S. biebersteinii* Lipsch. - К. Биберштейна = II(ВП); III(П,Кисл,ТС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da,Db(НК); [Sp.] l.c. Пятигорск
4404. *S. pusilla* Pall. (*Takhtajaniantha pusilla* (Pall.) Nazarova) - К. крошечный = (II(Кизл); V(Касп)): Муртазалиев, 2009): (Туранск.); Dc(НК); [R.]
4405. *S. czerapanovii* R.Kam. (*S. lanata* (L.) Hoffm.) - К. Черепанова = V(Касп - Дербент): (Субкавк*.); ST(НК); [R.]
4406. *S. mollis* Vieb. - К. мягкий = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,ЦП); III(Ст,КР,СК,П,Кисл,ТС); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Субпонт*.); ST(НК); [Sp.]
4407. *S. turkeviczii* Krasch. et Lipsch. - К. Туркевича = IV(Н): (Эвксин.); Da(НК); [R.]

Genus 1049. *Podospermum* DC. - Ножкосемянник

4408. *P. meyeri* C.Koch (*Scorzonera meyeri* (C.Koch) Lipsch.) - Н. Мейера = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Субкавк.); Pc,Do(НК) [Pl.]
4409. *P. grigoraschvilii* Sosn (*S. grigoraschvilii* (Sosn.) Lipsch.) - Н. Григорашвили = III(ВС): (Кавк.: Эукавк.); Pc(НК); [R.] <Es>
4410. *P. schischkinii* (Lipsch. et Vass.) Kuth. (*S. schischkinii* Lipsch. et Vass.) - Н. Шишкина = I(Т); IV(Н): (Кавк.: Предкавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Анапа
4411. *P. canum* С.А.Мей. (*S. cana* (С.А. Мей.) О. Hoffm.) - Н. седой = III(ТС); V(БН,Касп): (Понт.-Южносиб.); Da(НК); [R.]
4412. *P. laciniatum* (L.) DC. (*S. laciniata* L.) - Н. разрезной = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); ST, Da(НК:pb); [Sp.]
4413. *P. lachnostegium* Woronow (*S. lachnostegia* (Woronow) Lipsch.) - Н. косматообёртковый = I(Т,АК,КЕ); IV(Н): (Кавк.: Предкавк.); ST(НК:pb); [R.] <Ee>

Genus 1050. *Tragopogon* L. - Козлобородник

4414. *T. graminifolius* DC. - К. злаколистный = III(Э,ВС); V(Касп,ЦД): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]
4415. *T. brevirostris* DC. - К. коротконосый = III(Куб,ЧК,КР,ТЗ,СК,П,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pa,ST, Da(НК); [Sp.] <Esub>
4416. *T. leonidae* Kuth. - К. Леонида = III(ВС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Rs] <Es> l.c. р. Асса, с. Архигали

4417. *T. reticulatus* Boiss. et Huet - К. сетчатый = **III**(ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Субкавказ*.); Pb(НК); [Sp.]

4418. *T. colchicus* Albov. - К. колхидский = (**III**(ВЛ); **IV**(ТА)): **Зернов, 2006**): (Кавк.: Эукавказ.); Pb(НК); [R.] <Esub>

4419. *T. filifolius* Rehm. ex Boiss. (*T. charadzeae* Kuth.) - К. нителистный = **III**(Кисл,ЦЭ,ВК); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Pb(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Дарьяльское ущелье

4420. *T. otschiaurii* Kuth. - К. Очиаури = **III**(ВС): (Кавк.: Эукавказ.); Pb(НК); [R.]

4421. *T. dasyrhynchus* Artemcz. - К. опушенноносый = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т); **III**(Ст,Куб,ЧК,Х,СК,П); **IV**(Н); **V**([Касп - Агач-аул, ЦД - Ботлих, Цовкра]: **Мургазалиев, 2009**): (Понтич.); ST, Da(НК:pb); [Sp.]

4422. *T. tanaiticus* Artemcz. - К. донской = **I**(НД): (Понтич.); Db(НК:pb); [R.]

4423. *T. daghestanicus* (Artemcz.) Kuth. - К. дагестанский = **I**(АК - ст. Шкуринская); **II**(ВП); **V**(БН,Касп): (Евро-Кавк.); Db(НК:pb); [Sp.] l.c. Махачкала

4424. *T. ruthenicus* Bess. ex Krasch. et S.Nikit. - К. русский = **II**(Кизл); **V**(Касп): (Субтуран*.); Db(НК:pb); [R.]

4425. *T. tuberosus* C.Koch - К. клубненоносный = **V**(БН,Касп): (Кавк.: Обшекавказ.); ST(НК); [R.]

4426. *T. pusillus* Vieb. - К. крошечный = **V**(Касп - Тарки,ЦД,АС): (Субкавказ*.); ST(НК); [R.]

4427. *T. dubius* Scop. - К. сомнительный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп,ЦД): (Субсредиз*.); Pa(НК:pb); [Sp.]

4428. *T. ketzkhovellii* Kuth. - К. Кецховели = **IV**(ТА: **Литвинская, Мургазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавказ.); Pb, Pc(НК); [R.] <Esub>

Genus 1051. Hypochoeris L. - Пазник

4429. *H. radicata* L. (*Porcellites radicata* (L.) Cass.) - П. стержнекорневой = **III**(Ст,Куб,Х,ВЛ,Ч); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Субсредиз*.); Pa(НК); [R.]

Genus 1052. Trommsdorffia Bernh. - Прозанник (Троммсдорфия)

4430. *T. maculata* (L.) Bernh. (*Hypochoeris maculata* L.; *Achyrophorus maculatus* (L.) Scop.) - П.(Троммсдорфия) крапчатый = **III**(Ст,Куб,ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,П,Кисл,ВК); **IV**(Н): (Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm>

Genus 1053. Leontodon L. - Кульбаба

4431. *L. autumnalis* L. - К. осенняя = **III**(Ст,Куб,ВЛ,Каб): (Евро-Сиб.); Pa, Rb(НК); [R.] <Pmel>

4432. *L. caucasicus* (Vieb.) Fisch. - К. кавказская = **III**(Ст,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавказ*.); Pb, Pc(НК); [Sp.]

4433. *L. danubialis* Jacq. - К. дунайская = **III**(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>

4434. *L. hispidus* L. - К. щетинисто-волосистая = **III**(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel; Pp>

4435. *L. biscutellifolius* DC. (*L. crispus* Vill., *L. asperus* (Waldst. et Kit.) Boiss.) - К. плещатколистная = III(ЧК,КР,ЦЭ,Л,УН); V(АС: Муртазалиев, 2009): (Зап.др.средиз.); ST(НК); [R.]

4436. *L. asperrimus* (Willd.) Endl. - К. шероховатейшая = III(КР,Э,ВС); IV(СЗЗ); V([Касп,ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009): (Армено-Иран.); Da(НК); [R.] <Pmel>

4437. *L. tlostanovii* Schag. - К. Тлостанова = III(Б - Верхний Чегем: Шагапсоев, 2003): (Кавк.: Эукавк); Da(НК); [R.] <Es>

Genus 1054. *Picris* L. - Горлюха

4438. *P. hieracioides* L. - Г. ястребинковая = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); ST(НК:pb); [Pl.]

4439. *P. rigida* Ledeb. - Г. твёрдая = I(Т); III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(Н); V(ЦД): (Понт.-Южносиб.); Db(НК:pb); [R.]

4440. *P. pauciflora* Willd. - Г. малоцветковая = I(АК); III(Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); Rb(Т); [R.]

4441. *P. strigosa* Vieb. - Г. щетинистая = III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); ST(НК:pb); [Sp.]

4442. *P. canescens* (Stev.) V.Vassil. - Г. седоватая = II(Кизл); III(Куб,Кисл,ЦЭ,СК,Каб,ЧО,Ч); IV(Н); V(БН,Касп): (Кавк.: Общекавк.); Rb(НК:pb); [Sp.]

Genus 1055. *Helminthotheca* Zinn - Гельминтотека

4443. *H. echioides* (L.) Holub (*Helmintia echioides* (L.) Juss.; *Picris echioides* L.) - Г. румянквидная = III(Ст,ЛН,СК,П); IV(ТА); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Ra,Rb(Т); [Sp.]

Genus 1056. *Hedynois* Hill - Гедипноис

4444. *H. cretica* (L.) Dum. (*H. rhagadioloides* (L.) F.W.Smidt; *H. persica* Vieb.) - Г. критская = V(Касп): (Общедр.средиз.); ST(Т); [Sp.]

Genus 1057. *Garhadiolus* Jaub. et Spach - Гарадиолус

4445. *G. angulosus* Jaub. et Spach - Г. угловатый = V(Касп - Самур: Муртазалиев, 2009): (Туранск.); Rb(Т); [R.]

4446. *G. ramosus* Boiss. et Buhse - Г. летучконосный = II(ВП); III(ТС); V(БН,Касп): (Армено-Иран.); ST,Rb(Т); [R.]

Genus 1058. *Rhagadiolus* Juss. - Рагадиолус

4447. *Rh. hebelaeus* (DC.) Vass. - Р. опушённый = V(Касп): (Средиземн.); Rb(Т); [Sp.]

4448. *Rh. edulis* Gaertn. - Р. съедобный = IV(СЗЗ): (Средиземн.); Rb(Т); [Sp.]

Genus 1059. *Sonchus* L. - Осот

4449. *S. arvensis* L. - О. полевой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Плюрирег.); Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pmel>

4450. *S. palustris* L. - О. болотный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pmel>

4451. *S. asper* (L.) Hill - О. колючий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Голаркт.); Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pmel>

4452. *S. oleraceus* L. - О. овощной = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Плюрирег.); Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pm;Pmel>**

Genus 1060. Reichardia Roth. - Рейхардия

4453. *R. glauca* Matthews (*R. dichotoma* (Vahl) Freyn) - Р. сизая = **III(ЧК,Кисл,ЦЭ,Л,УН); V(БН,Касп,ЦД): (Армено-Иран.); ST,Da(НК); [Sp.]**

Genus 1061. Prenanthes L. - Косогорник

4454. *P. abietina* (Boiss. et Bal.) Kirp. - К. пихтовый = **III(ВЛ,ТЗ,Б): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [Sp.]**

4455. *P. petiolata* (C.Koch) Sennikov (*P. cacaliifolia* (Bieb.) Beauverd; *P. pontica* (Boiss.) Leskov; *Cicerbita petiolata* (C.Koch) Gagnidze) - К. черешковый = **III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]**

4456. *P. purpurea* L. - К. пурпуровый = **III(ЗК,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субсредиз*.); S(НК); [Sp.]**

Genus 1062. Lactuca L. - Латук (Молокан)

4457. *L. tatarica* (L.) C.A.Mey. - Л.(М.) татарский = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Ra,Rb(НК); [Pl.]**

4458. *L. chaixii* Vill. (*L. quercina* L.) - Л.(М.) Ше = **III(Ст,ЧК,Х,ТЗ,П,Кисл,Л); IV(Н); V(ЦД): (Субсредиз*.); S,Pa(НК:pb); [Sp.]**

4459. *L. serriola* L. - Л.(М.) компасный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Ra,Rb(Т); [Pl.] <Pm>**

4460. *L. saligna* L. (*L. altaica* Fisch. et C.A.Mey.) - Л.(М.) солончаковый = **I(ЗП,МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П); IV(СЗЗ); V(Касп): (Субсредиз*.); Dc(НК:pb); [R.]**

4461. *L. georgica* Grossh. - Л.(М.) грузинский = **V(Касп): (Армено-Иран.); Da,Do(НК:pb); [R.]**

Genus 1063. Scariola F.W.Schmidt - Скариола

4462. *S. viminea* (L.) F.W.Schmidt (*Lactuca viminea* (L.) Presl) - С. прутьевидная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Зап.др.средиз.); ST,Rb(НК:pb); [Sp.]**

Genus 1064. Steptorhamphus Bunge - Степторамфус

4463. *S. tuberosus* (Jacq.) Grossh. - С. клубневой = **IV(Н: Зернов, 2006): (Зап.др.средиз.); S(НК); [R.]**

Genus 1065. Mycelis Cass. - Мицелис

4464. *M. muralis* (L.) Dumort. (*Cicerbita muralis* (L.) Wallr.) - М. стенной = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); S,Аа(НК); [Sp.]**

4465. *M. deltoidea* (Bieb.) Sennikov (*C. deltoidea* (Bieb.) Beauverd) - М. дельтовидный = **III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Sp.]**

Genus 1066. Cephalorrhynchus Boiss. - Цефалоринхус

4466. *C. tuberosus* (Stev.) Schchian - Ц. клубневой = **IV(Н): (Зап.др.средиз.); S(НК); [Sp.]**

Genus 1067. Cicerbita Wallr. - Цицербита

4467. *C. prenanthoides* (Bieb.) Beauverd - Ц. косогорниковая = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [Pl.]**

4468. *C. macrophylla* (Willd.) Wallr. - Ц. крупнолистная = **III**(Ст,ЗК,Э,БК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [Sp.]

4469. *C. racemosa* (Willd.) Beauverd - Ц. кистистая = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,БК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавк*.); S,Pb(НК); [Sp.]

Genus 1068. Lapsana L. - Бородавник

4470. *L. communis* L. - Б. обыкновенный = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,БК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); S,Rb(Т); [Sp.] <Pm>

4471. *L. intermedia* Bieb. - Б. промежуточный = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,БК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Субкавк*.); S,Rb(НК); [Sp.]

4472. *L. grandiflora* Bieb. - Б. крупноцветковый = **III**(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,Э,Тер,БК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавк*.); S(НК); [Pl.]

Genus 1069. Taraxacum L. - Одуванчик

4473. *T. serotinum* (Waldst. et Kit) Poir. - О. поздний = **I**(ЗП,ЦП); **II**(Кизл); **III**(СК,П); **V**(БН,Касп,ЦД): (Субпонт*.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pmel>

4474. *T. bessarabicum* (Hornem.) Hand.-Mazz. - О. бессарабский = **I**(ЗП); **IV**(Н): (Палеаркт.); Dc(НК); [R.] <Pmel>

4475. *T. podkumokense* Galushko - О. подкумский = **III**(Кисл - верх. Подкумка): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Es>

4476. *T. tenuisectum* Somm. et Levier - О. тонкорассеченный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>

4477. *T. erythrospermum* Andr. (*T. praticola* Schischk.; *T. prilipkoi* Czer.; *T. ghalganum* Galushko) - О. красносемянный = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); **III**(ЧК,П,Кисл,ВС,ЧО,Ч); **IV**(СЗЗ): (Европ.); Pa,Dc,Db(НК); [Sp.] <Pmel>

4478. *T. grossheimii* Schischk. - О. Гроссгейма = **IV**(ТА: **Меницкий, Попова, 1996**): (Кавк.: Общекавк.); Rb(НК); [R.]

4479. *T. divulsiforme* R. Doll - О. дивульсиформный = **III**(П): (Кавк.: Эукавк.); Pa(НК); [Sp.] <Es> l.c. Пятигорск

4480. *T. ciscaucasicum* Schischk. - О. предкавказский = **I**(КЕ,АИ,Прик): (Кавк.: Предкавк.); Dc(НК); [R.] <Ee> l.c. Благодатное

4481. *T. porphyranthum* Boiss. - О. пурпурноцветковый = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.]

4482. *T. stenolepium* Hand.-Mazz. - О. узкочешуйный = **V**([ЦД,АС]: **Муртазалиев, 2009**): (Субкавк.); Pb(НК); [R.]

4483. *T. stevenii* (Spreng.) DC. (*T. crepidiforme* DC.) - О. Стевена = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(АС): (Субкавк*.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]

4484. *T. confusum* Schischk. - О. смешиваемый = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(НК); [Sp.]

4485. *T. officinale* Wigg. - О. лекарственный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,БК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>

4486. *T. pseudomurbeckianum* Tzvel. - О. ложно-Мурбеков = **IV**(Н - Сукко, Новороссийск: **КК Краснодарского края, 2017**): (Кр.-Новоросс.); Aa(НК); [R.]

Genus 1070. Chondrilla L. - Хондрилла

4487. *Ch. juncea* L. - Х. ситниковидная = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Субсредиз*.); Da,Db(НК:pb); [Sp.] <Pm>

4488. *Ch. graminea* Bieb. - X. злаколистная = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Понтич.); Db,Rb(НК:pb); [Pl.]

4489. *Ch. acantholepis* Boiss. - X. колючечешуйчатая = I(T); IV(H); V(Касп: Муртазалиев, 2009): (Ирано-Туран.); Da,Db(НК); [R.]

4490. *Ch. latifolia* Bieb. - X. широколистная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Субпонт*.); Da,Db(НК:pb); [Sp.]

Genus 1071. *Calycocorus* F.M.Schmidt - Каликокорус <GT>

4491. *C. tuberosus* (Fisch. et C.A.Mey.) Rauschert (*Willemetia tuberosa* Fisch. et C.A.Mey.) - К. клубненосный = V(Касп): (Армено-Иран.); S,Pa(НК); [R.]

Genus 1072. *Crepis* L. - Скерда

4492. *C. sibirica* L. - С. сибирская = III(ЧК,ВЛ,ТЗ,Кисл,Л,Б,УН); IV(TA); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); S,Pb(НК); [Sp.]

4493. *C. caucasica* C.A.Mey. (*C. glabra* Boiss.; *C. paludosa* (L.) Moench.) - С. кавказская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [R.]

4494. *C. sonchifolia* (Bieb.) C.A.Mey. - С. осотolistная = III(ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

4495. *C. rannonica* (Jacq.) C.Koch - С. венгерская = I(НД,ЗПМ,АЕ, АК,КЕ); III(Ст,ЧК,П); IV(H); V(БН,Касп,ЦД): (Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.]

4496. *C. caucasigena* Czer. - С. кавказорodная = III(Э,Б,УН,ОС); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Ее>

4497. *C. tectorum* L. - С. кровельная = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); III(Ст,П): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

4498. *C. ramosissima* D'Urv. - С. ветвистая = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Понтич.); ST,Db(T); [Sp.]

4499. *C. astrachanica* Stev. ex Czer. - С. астраханская = V(Касп): (Туранск.); Da,Аа(T); [R.]

4500. *C. pulchra* L. - С. красивая = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); II(Кизл - Сулевкент: Муртазалиев, 2009); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); Da,Rb(T); [Pl.]

4501. *C. capillaris* (L.) Wallr. - С. волосовидная = IV(TA): (Адвент. [Европа]); Pa,Pa,Rb(T); [R.]

4502. *C. micrantha* Czer. - С. мелкоцветковая = V(Касп): (Средиземн.); Pb,Rb(T); [Sp.]

Genus 1073. *Barkhausia* Moench - Баркгаузия

4503. *B. alpina* (L.) DC. (*Crepis alpina* L.) - Б. альпийская = V(Касп): (Армено-Иран.); ST(T); [R.]

4504. *B. foetida* (L.) P.W.Schmidt (*C. foetida* L.) - Б. вонючая = III(МА,Каб); V(Касп): (Евро-Кавк.); Db(T); [R.]

4505. *B. rhoeadifolia* (Bieb.) Reichenb. (*C. rhoeadifolia* Bieb.) - Б. маколистная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субпонт*.); ST,Rb(НК:pb); [Pl.]

4506. *B. marschallii* C.A.Mey. (*C. marschallii* (C.A.Mey.) F.Schultz) - Б. Маршалла = I(АК,КЕ,Тем,Т,ЦП); II(ВП); III(КР); IV(H); V(Касп): (Субкавк*.); ST,Rb(НК:pb); [R.]

4507. *V. setosa* (Hall. fil.) DC. (*C. setosa* Hall. fil.) - Б. щетинистая = **IV(C33)**: (Зап.др.средиз.); ST,Rb(T); [Pl.]

Genus 1074. Pterotheca Cass. - Птеротека

4508. *P. sancta* (L.) C.Koch (*Lagoseris sancta* (L.) K.Maly; *Crepis sancta* (L.) Babcs.) - П. священная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C33); V(Дар)**: (Вост.средиз.); ST,Rb(T); [Pl.]

4509. *P. glaucescens* (C.Koch) Grossh. (*L. glaucescens* (C.Koch) Sosn.) - П. сизоватая = **II(ВП); V(АС - Хушдада, Ахты: Муртазалиев, 2009)**: (Армено-Иран.); ST,Da(T); [R.]

Genus 1075. Hieracium L. - Ястребинка

4510. *H. gentile* Jord. ex Boreau - Я. породнённая = **III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС)**: (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]

4511. *H. exotericum* Jodr. ex Boreau (*H. kreczetoviczii* Juxip; *H. cardiophyllum* Jord. ex Sudre) - Я. экзотерическая = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б); V(ЦД,АС)**: (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]

4512. *H. erythrocarpum* Peter (*H. erythrocarpoides* (Litv. et Zahn) Kem.-Nath.; *H. ratluense* Zahn) - Я. красноплодная = **III(ВЛ,ТЗ,Э,ВС); V(Касп,ЦД,АС)**: (Субкавк*.); S(НК); [Sp.]

4513. *H. glomerellum* (Zahn) Juxip (*H. macrolepioides* (Zahn) Juxip; *H. samurense* (Zahn) Juxip) - Я. клубочковая = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС)**: (Субкавк*.); S,Pb(НК); [R.]

4514. *H. acuminatifolium* (Litv. et Zahn) Juxip (*H. membranulatum* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. epichlorum* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. заострённолистная = **III(П)**: (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [R.] l.c. Железноводск

4515. *H. medianiforme* (Litv. et Zahn) Juxip - Я. средняя = **III(П)**: (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.] <Es> l.c. Бештау

4516. *H. endaurovae* Juxip (*H. hypopytyforme* Juxip; *H. quinquemonticola* Juxip; *H. argillacioides* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. hypopytis* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. Эндауровой = **III(ЧК,П,Кисл,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б)**: (Субкавк*.); S,Pb(НК); [Sp.] l.c. Теберда

4517. *H. leucothyrsum* (Litv. et Zahn) Juxip (*H. tephrophilum* (Kozl. et Zahn) Juxip) - Я. белокистевая = **III(ВЛ,ТЗ)**: (Кавк.: Эукавк.); S,Pb(НК); [R.] l.c. Теберда

4518. *H. leptogrammoides* Juxip - Я. мелкописаноподобная = **III(ВЛ,ЦЭ); V(ЦД,АС)**: (Субкавк*.); Pb(НК); [R.]

4519. *H. rigidellum* Litv. et Zahn - Я. жестковатая = **III(Ст,П)**: (Кавк.: Предкавк.); Pa(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Бештау

4520. *H. beschtaviciforme* Juxip - Я. бештаусскообразная = **III(П)**: (Кавк.: Предкавк.); Pa(НК); [R.] <Es> l.c. Бештау

4521. *H. gudergomiense* Juxip - Я. гудергомисская = **III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Esub>

4522. *H. macrolepis* Boiss. (*H. subsvaneticum* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. крупночешуйчатая = **III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [Sp.]

4523. *H. simplicicaule* (Somm. et Levier) Peter (*H. hypopogon* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. простостебельная = **III**(ВЛ,ТЗ,Э); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb(НК); [Sp.] <Esub>
4524. *H. svaneticiforme* (Litv. et Zahn) Kem.-Nath. - Я. сванетскоподобная = **III**(ТЗ,ЦЭ); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.] l.c. верх. Теберды
4525. *H. pseudosvaneticum* Peter - Я. ложносванетская = **III**(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
4526. *H. mictorum* Boiss. - Я. мелкоушастая = **V**(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Sp.]
4527. *H. prenanthoides* Vill. (*H. hypoglaucum* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. косогорниковая = **III**(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субсредиз*.); S,Pb(НК); [Sp.]
4528. *H. bupleurifolium* Tausch (*H. bupleurifolioides* (Zahn) Juxip) - Я. володушколистная = **III**(ЗК,ЦК,ВК); **V**(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); S(НК); [R.]
4529. *H. chaetothyrsoides* (Litv. et Zahn) Juxip - Я. волосистосоцветновидная = **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Sp.]
4530. *H. strictissimum* Froel. - Я. прямейшая = **III**(ТЗ,П,Кисл,ОС): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [R.]
4531. *H. juranum* Fries (*H. pseudojuranum* Arv.-Touv.) - Я. юрская = **III**(ВЛ); **V**(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
4532. *H. adenobrachion* Litv. et Zahn - Я. железистоветочковая = **III**(ВЛ,ТЗ,П,Кисл): (Кавк.: Предкавк.); Pa(НК); [R.] <Ee> l.c. Пятигорск
4533. *H. gigantellum* Litv. et Zahn - Я. крупноватая = **III**(П,Кисл): (Кавк.: Эукавк.); Pa(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Бештау
4534. *H. chaetothyrsus* (Litv. et Zahn) Juxip - Я. волосистосоцветная = **III**(Ст,П,Кисл): (Кавк.: Эукавк.); Pa(НК); [R.] <Ee> l.c. г. Бештау
4535. *H. chloroprenanthes* Litv. et Zahn (*H. obscuricaule* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. зелёноскриповидная = **III**(ВЛ,ТЗ): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]
4536. *H. leptoprenanthes* Litv. et Zahn - Я. тонкоскриповидная = **III**(ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Теберда
4537. *H. pseudoconstrictum* Zahn - Я. ложносжатая = **III**(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
4538. *H. raddeanum* Zahn - Я. Радде = **III**(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
4539. *H. conicum* Arv.-Touv. - Я. коническая = **III**(ВЛ,ТЗ); **IV**(ТА): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [R.]
4540. *H. teberdense* (Litv. et Zahn) Juxip ex P.D.Sell et C.West - Я. тебердинская = **III**(ТЗ): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.] l.c. р. Теберда
4541. *H. litwinowianum* Zahn (*H. gothicifrons* (Zahn) Juxip) - Я. Литвинова = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.] l.c. верховья р. Теберды
4542. *H. atrocephalum* Schmalh. (*H. schmalhausenianum* Litv. et Zahn) - Я. тёмноголовая = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. Кисловодска, р. Ольховка
4543. *H. podkumokense* Juxip. - Я. подкумская = **III**(Кисл): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es>

4544. *H. virosum* Pall. - Я. ядовитая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп):** (Палеаркт.); S,Pa,ST(НК); [Sp.]
4545. *H. robustum* Fries - Я. могучая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп):** (Палеаркт.); S,Pa,ST(НК); [Sp.]
4546. *H. vagum* Jord. - Я. блуждающая = **III(ВЛ,ОС); IV(ТА); V(ЦД):** (Евро-Кавк.); Pb(НК); [R.]
4547. *H. virgultorum* Jord. - Я. ветвистая = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(СЗЗ):** (Евро-Кавк.); Pb(НК); [R.]
4548. *H. terekianum* (Litv. Et Zahn.) Juxip ex V.J.Nikolajev - Я. терекская = **III(ТЗ,П,Кисл):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] l.c. г. Бештау <Esub>
4549. *H. umbellatum* L. - Я. зонтичная = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Голаркт.); Da,Db(НК); [Pl.]
4550. *H. laevigatum* Willd. (*H. kiderense* (Zahn) Juxip) - Я. сглаженная = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС):** (Палеаркт.); S,Db(НК); [R.]
4551. *H. tridentatum* (Fries) Fries - Я. трёхзубчатая = **III(ЦЭ):** (Евро-Кавк.); Pb(НК); [R.]
4552. *H. kubanicum* (Litv. et Zahn) Juxip - Я. кубанская = **III(ТЗ):** (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [Sp.] <Es>
4553. *H. caucasiense* Arv.-Touv. - Я. предкавказская = **III(П,Кисл):** (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Бештау
4554. *H. beschtavicum* (Litv. et Zahn) Juxip - Я. бештауская = **III(Ст,П,Кисл):** (Кавк.: Предкавк.); S(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Бештау
4555. *H. callichlorum* Litv. et Zahn (*H. biebersteinii* Litv. et Zahn; *H. sobrinatum* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. красивозелёная = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Теберда
4556. *H. horreanum* Schult. - Я. Гоппе = **III(ЦЭ):** (Субсредиз*.); Pb(НК); [R.]
4557. *H. hypereum* Peter - Я. широковатая = **III(ЦЭ,Б,ОС):** (Субсредиз*.); Pb(НК); [R.]
4558. *H. ruprechtii* Boiss. - Я. Рупрехта = **V(ЦД,АС):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub>
4559. *H. pilosella* L. - Я. волосистая = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС):** (Евро-Кавк.); Da,Db(НК); [Pl.] <Pm>
4560. *H. bifurcum* Bieb. (*H. longipes* (C.Koch ex Naeg et Peter) Juxip; *H. alticaule* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. вильчатая = **III(Ст,П,Л,УН,Ч,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС):** (Субкавк*.); S,Pa(НК); [Sp.]
4561. *H. stauropolitanum* Juxip - Я. ставропольская = **III(Ст):** (Кавк.: Предкавк.); S,Pa(НК); [R.] <Es> l.c. Ставрополь
4562. *H. piloselloides* Vill. (*H. glaucescens* Bess.; *H. rubrobauhinii* (Schelk. et Zahn) Juxip) - Я. волосистовидная = **III(Х,ВЛ,ТЗ,Э); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС):** (Европ.); S(НК); [R.]
4563. *H. arvorum* (Naeg. et Peter) Pugls. - Я. пахотная = **III(Ст,ЛН,П,Каб):** (Евро-Кавк.); Pa(НК); [Sp.]

4564. *H. mollicaule* Vuk (*H. nalczikense* Juxip; *H. mirobauhinii* (Zahn) Juxip; *H. purpureibracteum* (Zahn) Juxip) - Я. мягкостебельная = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
4565. *H. auriculoides* Lang. (*H. arvense* (Naeg. et Peter) Juxip, *H. mirum* (Naeg. et Peter) Juxip, *H. tanythrix* (Naeg. et Peter) Juxip, *H. sarmentosum* Froel.; *H. amaurobasis* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. lasiophorum* (Naeg. et Peter) Juxip; *H. subumbelliforme* (Zahn) Juxip; *H. rubropannonicum* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. teberdaefontis* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. basileucum* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. sublasiophorum* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. submirum* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. sabiniceps* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. thracicum* (Naeg. et Peter) Juxip) - Я. ушковидная = III(Ст,Х,ВЛ,ТЗ,Э,БК); IV(СЗЗ: V(ЦД,АС): (Европ.); Pa(НК); [Sp.]
4566. *H. procerigenum* (Litv. et Zahn) Juxip - Я. рослородственная = III(Ст,ЧК,ТЗ,СК,П,Л): (Субкавк*.); Pa(НК); [Sp.] l.c. Бештау
4567. *H. incaniforme* Litv. et Zahn - Я. сероватая = III(ТЗ): (Субкавк*.); S(НК); [R.] l.c. р. Теберда
4568. *H. cymosum* L. - Я. цимозная = III(Ст,ВЛ,ТЗ,Э): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
4569. *H. zizianum* Tausch - Я. Цица = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС): (Евро-Кавк.); Pa,Db(НК); [R.]
4570. *H. fallax* Willd. - Я. обманчивая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); Da(НК); [Sp.]
4571. *H. longiscapum* Boiss. et Kotschy ex Naeg. et Peter - Я. длиннострелковая = III(ТЗ,Э,БК); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(НК); [Sp.]
4572. *H. echioides* Lumn. - Я. румяноквая = I(НД,ЗПМ,АЕ,Прик,ТБ); III(Ст,ЛН,ЗК,БК,Э,Каб,ТС); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
4573. *H. procerum* Fries - Я. рослая = III(Х,ВЛ,ТЗ,[П: Николаев, 1990б], ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Вост.средиз.); Pa(НК); [Sp.]
4574. *H. macrotrichum* Boiss. (*H. balansae* Boiss.) - Я. крупнощетиная = III(ТЗ); IV(ТА): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [R.]
4575. *H. caucasicum* Naeg. et Peter (*H. hohenackeri* (Naeg. et Peter) Juxip) - Я. кавказская = III(Ст,ВЛ,ТЗ,СК,П,Кисл); V(Касп): (Субкавк*.); Pa,ST(НК); [Sp.]
4576. *H. maschukense* Litv. et Zahn - Я. машукская = III(П,Кисл): (Субкавк*.); ST(НК); [Sp.] l.c. Машук
4577. *H. verruculatum* Link. (*H. scabrum* (Willd.) Froel.; *H. incanum* Bieb.) - Я. мелкобородавчатая = III(Ст,ТЗ,П,Кисл); V(ЦДАС): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]
4578. *H. leptophytomorphum* (Litv. et Zahn) Juxip - Я. тонковатая = III(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [R.] <Es> l.c. долина р. Теберды
4579. *H. pannoniciforme* Litv. et Zahn - Я. паннонскообразная = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.] l.c. р. Теберда

ЛИТЕРАТУРА

1. Аверьянов Л.В. Обзор видов семейства *Orchidaceae* флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1994, Т. 79, № 10. –С. 108-127.
2. Аверьянов Л.В. Род Башмачок – *Cypripedium (Orchidaceae)* на территории России // *Turczaninovia* 1999, 2 (2). –С. 5-40.
3. Аверьянова Е.А. *Epipactis pontica* Taubenheim (*Orchidaceae*) – новый вид для флоры России // *Turczaninovia* 2013, 16 (3). –С. 38-43.
4. Алиева А.А. Новые виды рода *Psephellus* Cass. (*Asteraceae*) с Северного Кавказа // Ботанический журнал, Т. 83, № 1, 1983. –С. 116-120.
5. Алтухов М.Д. Новые находки *Tulipa lipskyi* Grossh. на Кавказе // Ботанический журнал, 1964, Т. 49, № 2. –С. 262-263.
6. Алтухов М.Д. Очерк высокогорной растительности известнякового массива Трю-Ятыргварта // Труды Кавказского государственного заповедника, вып. 9. – М., 1967. –С. 3-59.
7. Алтухов М.Д. Эндемы высокогорной флоры Северо-Западного Кавказа // Доклады Сочинского отдела географического общества. – Сочи, 1971, вып. 2. – С. 349-363.
8. Асадулаев З.М., Залибеков М.Д. *Crataegus songarica* С.Кoch (*Rosaceae*) в дендрофлоре Дагестана // Труды Дагестанского отделения Русского ботанического общества, вып. 2. Махачкала, 2013. –С. 39-42.
9. Амирханов А.М., Глазунова К.П., Комжа А.Л. Новые данные о распространении и экологии видов *Alchemilla (Rosaceae)* на Центральном Кавказе // Ботанический журнал, 1998, Т. 83, № 12. –С. 92-96.
10. Бакташева Н.М. Конспект флоры Калмыкии. – Элиста: Изд-во КГУ, 1994. –81 с.
11. Белоус В.Н. Новые виды рода *Astragalus* L. во флоре Ставрополя // Охрана, обогащение, воспроизводство и использование растительных ресурсов. – Ставрополь, 1990а. –С. 308-310.
12. Белоус В.Н. Эколого-ценотические особенности и распространение видов рода *Astragalus* L. (*Fabaceae*) флоры Ставрополя // Активное воспроизводство генофонда флоры и растительности. – Ставрополь, 1990б. –С. 75-86.
13. Белоус В.Н. *Kitaibelia vitifolia* Willd. (*Malvaceae*) - новый вид для флоры Ставрополя // Вестник СГУ, вып. 19, 1999. –С. 50-51.
14. Белоус В.Н. Географический анализ реликтовых видов ценофлоры Восточного Приманьчья // Роль ботанических садов в сохранении и мониторинге биоразнообразия Кавказа: Материалы Международной научной конференции. – Сухум, 2016. –С. 84-88.
15. Бондаренко С.В. *Reaumuria* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. –С. 349-350.
16. Васильева И.М. *Aquilegia* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. –С. 62-63.

17. Васюков М.В., Попович А.В. Новый вид рода *Thymus* (*Lamiaceae*) с Северо-Западного Кавказа / Новости систематики высших растений, Т. 48, 2017. – С. 123-125.
18. Воробьёва Ф.М., Онипченко В.Г. Сосудистые растения Тебердинского заповедника. Флора и фауна заповедников, вып. 99. – М., 2001. –100 с.
19. Габриелян Э.Ц. *Stemmacantha* Cass. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(1). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. –С. 201-202.
20. Галушко А.И. Флора Северного Кавказа. – Ростов: Изд-во РГУ, 1978-1980: Т. 1, 1978. –317 с. Т. 2, 1980. –350 с. Т. 3, 1980. –327 с.
21. Галушко А. И., Мигненко Т. И. Экологические реликты долины реки Калаус (Центральное Предкавказье) // Экологические проблемы Ставропольского края и сопредельных территорий. – Ставрополь, 1989. –С. 88-89.
22. Гельтман Д.В. Заметки о кавказских видах рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) // Новости систематики высших растений, Т. 28, 1991. –С. 110-116.
23. Гельтман Д.В. Американский вид *Euphorbia davidii* Subils (*Euphorbiaceae*) во флоре Восточной Европы и Северного Кавказа // *Turczninowia*, 2012a, 15(1). –С. 37-39
24. Гельтман Д.В. *Euphorbiaceae* Juss. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012б. –С. 494-513.
25. Голгофская К.Ю. Конспект дендрофлоры Кавказского заповедника // Труды Кавказского гос. заповедника. – Краснодар, 1977, вып. 14. –С. 67-90.
26. Гроссгейм А.А. Флора Кавказа, 2-е изд., 1939-1967. Т. 1, – Баку: Изд. Азерб. ФАН СССР, 1939. –404 с. Т. 2, – Баку: Изд. Азерб. ФАН СССР, 1940. – 284 с. Т. 3, – Баку: Изд. Азерб. ФАН СССР, 1944. –322 с. Т. 4, – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1950. –314 с. Т. 5, –М.-Л.: Изд. АН СССР, 1952. –456 с. Т. 6, – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1962. –424 с. Т. 7, – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1967. –894 с.
27. Гроссгейм А.А. Определитель растений Кавказа. – М.: Изд-во Советская наука, 1949. –747 с.
28. Гусейнов Ш.А. Новые и редкие виды семейства *Caryophyllaceae* во флоре Дагестана // Ботанический журнал, 1990, Т. 75, № 12. –С. 234-237.
29. Дакиева М.К. Флора Республики Ингушетии и её анализ. Диссертация на соискание учёной степени кандидата биологических наук. – Ставрополь, 2003. –368 с.
30. Данилевич В. Г. О состоянии популяции *Gagea artemczukii* A.Krasnova в Приманычье // Вопросы экологии и охраны природы Ставропольского края и сопредельных территорий. – Ставрополь, 1995. –С. 81.
31. Данилевич В.Г. Обзор видов рода *Gagea* Salisb. Ставропольского края // Вестник СГУ, вып. 6, 1996. –С. 91-100.
32. Девятов А.Г., Тайсумов М.А., Теймуров А.А. Новый вид рода *Dianthus* L. (*Caryophyllaceae*) из Дагестана // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отделение биологии, 1999, Т. 104, Вып. 2. –С. 37-38.
33. Дорофеев В.И. Новые данные о крестоцветных Кавказа // Ботанический журнал, 1994, Т. 79, № 5. –С. 102-104.

34. Дорофеев В.И. Крестоцветные (*Cruciferae* Juss.) Российского Кавказа // *Turczaninowia*, 2003, 6(3). –С. 5-137.
35. Дорофеев В.И. *Brassicaceae* Burnett / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. –С. 371-469.
36. Дорофеев В.И., Муртазалиев Р.А. *Papaver × tuberculatum* (*Papaveraceae*) - новый нотовид из Дагестана // *Turczaninowia*, 2014, 17 (4). – С. 5-11.
37. Дубовик О.Н., Дзыбов Д.С. Географический анализ видов рода *Astragalus* (*Fabaceae*) Крымско-Новороссийской провинции и их флористические связи // *Ботанический журнал*, 1990. Т. 75, № 2. –С. 170-180.
38. Дубовик О.Н., Мосякин С.Л. *Artemisia verlotiorum* (*Asteraceae*) - новый адвентивный вид флоры Северного Кавказа // *Ботанический журнал*, 1991, Т. 76, № 10. –С. 1408-1411.
39. Егорова Т.В. Обзор подсемейств *Cyperoideae* и *Rhynchosporoideae* (*Cyperaceae*) флоры Кавказа // *Новости систематики высших растений* 1991. Т.28. –С. 5-21.
40. Егорова Т.В. Род *Eleocharis* R.Br. / Конспект флоры Кавказа, Т. 2, 2006. – СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006. –С. 191-198.
41. Еленевский А.Г. *Ranunculus* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2) – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. –С. 94-105
42. Залибеков М.Д. Конспект видов рода *Crataegus* L. (*Rosaceae*) флоры Дагестана // *Труды Дагестанского отделения Русского ботанического общества*, вып. 3. – Махачкала, 2015. –С. 33-36.
43. Зернов А.С. Флора Северо-Западного Кавказа. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. –664 с.
44. Зернов А.С., Онипченко В.Г. Сосудистые растения Карачаево-Черкесской республики. – М.: МАКС Пресс, 2011. –240 с.
45. Иванов А.Л. К вопросу о нахождении *Adiantum capillus-veneris* L. на Ставропольской возвышенности // *Современные вопросы экологии и природопользования на Ставрополье*. – Ставрополь, 1993. –С. 36-37.
46. Иванов А.Л. О новом местонахождении *Ophris oestifera* Vieb. на Северном Кавказе // *Современные вопросы экологии и природопользования на Ставрополье*. – Ставрополь, 1993. –С. 39-40.
47. Иванов А.Л. *Diagnosis speciei novae (Psephellus anatolii A.L. Ivanov)* / Конспект флоры Ставрополья. – Ставрополь, 1997. –С. 132-134.
48. Иванов А.Л. Конспект флоры Ставрополья. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001. –200 с.
49. Иванов А.Л. *Botrychium multifidum* (*Polypodiophyta*) – новый вид для флоры Северного Кавказа // *Ботанический журнал*, Т. 99, № 1, 2014. –С. 96-98.
50. Имханицкая Н.Н. Критические заметки о кавказских видах секции *Juniperus* рода *Juniperus* L. (*Cupressaceae*) // *Новости систематики высших растений*, Т. 27, 1990. –С. 5-16.
51. Кечайкин А.А. Три новых таксона *Potentilla* (*Rosaceae*) с Кавказа и из Монголии / *Новости систематики высших растений*, Т. 48, 2017. –С. 84-88.
52. Колаковский А.А. Флора Абхазии, Т. II. – Тбилиси: Мецниереба, 1982. – 282 с.

53. Колмаков С.Г. Новые данные по флоре Ставропольской губернии (1917-1925) // Известия Главного ботанического сада, Т. XXVII, вып. 2, 1928. –С. 116-160.
54. Комжа А.Л. Сосудистые растения // Природные ресурсы республики Северная Осетия-Алания. Растительный мир. – Владикавказ, 2000. –С. 109-187.
55. Комжа А.Л. Новые адвентивные виды Центрального и Восточного Кавказа // Ботанический журнал, Т. 89, № 1, 2004. –С. 121-125.
56. Конечная Г.Ю. *Erechtites* Raf. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(1) – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. –С. 228.
57. Косенко И.С. Определитель высших растений Северо-Западного Кавказа и Предкавказья. – М.: Колос, 1970. –614 с.
58. Кравцун Н.В. О нахождении *Pteridium tauricum* (С.Presl) V.Krecz. в верховьях р. Кумы (Северное Предэльбрусье) // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 4. – Ставрополь, 1983. –С. 103-104.
59. Кравцун Н.В. Нахождение на Северном Кавказе *Galanthus woronowii* и его охрана // Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране. – Грозный, 1989. –С.49-51.
60. Красная книга Карачаево-Черкесской республики. – Черкесск: Нартиздат, 2013. –360 с.
61. Красная книга Краснодарского края. 2-е издание (растения и грибы). – Краснодар, 2007. –640 с.
62. Красная книга Краснодарского края. 3-е издание (растения и грибы) / под ред. С.А. Литвинской. – Краснодар, 2017. –850 с.
63. Красная книга Республики Дагестан / Под. ред. Г.М. Абдурахманова. – Махачкала, 2009. –552 с.
64. Красная книга Республики Калмыкия. В 2-х томах. Том 2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения и грибы. – Элиста: ЗАО «НПП «Джангар», 2014. –199 с.
65. Красная книга Республики Северная Осетия-Алания. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. – Владикавказ: Проект-Пресс. 1999. –248 с.
66. Красная книга Ростовской области. Издание 2-е. – Ростов-на-Дону: Минприроды Ростовской области, 2014. Т. 2. Растения и грибы. –344 с.
67. Красная книга Российской Федерации. – М.: Изд-во КМК, 2008. –855 с.
68. Красная книга Ставропольского края. Издание 2-е. Т. 1. Растения / под ред. А.Л. Иванова. – Ставрополь: Астериск, 2013. –400 с.
69. Лавренко Е.М. Основные черты ботанико-географического разделения СССР и сопредельных стран // Проблемы ботаники, вып. 1, М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. –С. 530-548.
70. Лавренко Е.М. Провинциальное разделение Причерноморско-Казахстанской подобласти Степной области Евразии // Ботанический журнал, 1970, Т. 55, № 5. –С. 609-625.
71. Лазьков Г.А. Обзор рода *Silene* (*Caryophyllaceae*) флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1996, Т. 81, № 8. –С. 99-111.

72. Лазьков Г.А. Обзор рода *Herniaria* (*Caryophyllaceae*) флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1996б, Т. 81, №. 9. –С. 90-92.
73. Лазьков Г.А. *Minuartia* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012а. –С. 164-170.
74. Лазьков Г.А. *Gypsophila* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012б. –С. 174-180.
75. Лазьков Г.А. *Silene* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012в. –С. 198-209.
76. Литвинская С.А. Растительный покров Черноморского побережья России (Средиземноморский анклав). – Краснодар, 2004. –118 с.
77. Литвинская С.А. Атлас растений природной флоры Кавказа. – М.: ЗАО «ЛАКОЛ», 2011. –364 с.
78. Литвинская С.А., Муртазалиев Р.А. Кавказский элемент во флоре Российского Кавказа: география, созология, экология. – Краснодар: Изд-во КубГУ, 2009. –439 с.
79. Львов П.Л. К флоре Дагестана // Новости систематики высших растений, вып. 8, 1971б. –С. 248-289.
80. Макарова, Е. Л., Шулаков А. А. *Comperia comperiana* (Stev.) Asch. et Graebn. (*Orchidaceae*) - новый вид для природной флоры России и Кавказа // Материалы 9-й Международной научной конференции «Охрана и культивирование орхидей». – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. –С. 286–289.
81. Мельников Д.Г. О *Verbena brasiliensis* Vell. с Черноморского побережья Кавказа // Turczaninowia, 2014, 17(1). –С. 72-76.
82. Меницкий Ю.Л. Дубы Азии. – Л.: Наука, 1984. –316 с.
83. Меницкий Ю.Л. Обзор видов рода *Thymus* L. (*Lamiaceae*) флоры Кавказа // Новости систематики высших растений, Т. 23, 1986. –С. 117-142.
84. Меницкий Ю.Л. Конспект видов семейства *Apiaceae* (*Umbelliferae*) флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1991, Т. 76, № 12. –С. 1749-1764.
85. Меницкий Ю.Л. Конспект видов семейства *Dipsacaceae* флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1992, Т. 77, № 11. –С. 136-139.
86. Меницкий Ю.Л. Конспект видов семейства *Chenopodiaceae* флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1994, Т. 79, № 5. –С. 105-114.
87. Меницкий Ю.Л. *Ferula* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(1). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008а. –С. 98-99
88. Меницкий Ю.Л. *Cephalaria* Schrad. ex Roem. et Schult. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(1). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008а. –С. 130-134.
89. Меницкий Ю.Л. *Galatella* Cass. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(1). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008б. –С. 170-172.
90. Меницкий Ю.Л. *Cirsium* Mill. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(1). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008в. –С. 261-276.
91. Меницкий Ю.Л., Конечная Г.Ю. *Naumburgia* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. –С. 336.

92. Меницкий Ю.Л., Попова Т.Н. Конспект видов рода *Taraxacum* (*Asteraceae*) Кавказа // Ботанический журнал, 1996, Т. 81, № 8. –С. 83-94.
93. Мизирева О.М. О нахождении *Sedum reflexum* L. на территории Ставропольского края // Современные проблемы экологии и природопользования на Ставрополье. – Ставрополь, 1993. –С. 61-62.
94. Михеев А.Д. Два новых вида *Papaver* L. из Центрального Предкавказья // Бюллетень МОИП, отд. биол., 1981, Т. 86, вып. 3. –С. 81-90.
95. Михеев А.Д. Конспект видов семейства *Rubiaceae* флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1992, Т. 77, № 10. –С. 68-74.
96. Михеев А.Д. Новый вид рода *Centaurea* (*Asteraceae*) с Северного Кавказа // Ботанический журнал, 1997, Т. 82, № 11. –С. 85-88.
97. Михеев А.Д. Обзор видов семейства *Papaveraceae* флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1993, Т. 78, № 5. –С. 115-124.
98. Михеев А.Д. Новые виды родов *Allium* L. (*Alliaceae*) и *Gladiolus* L. (*Iridaceae*) с Кавказа / Новости систематики высших растений, 2004, Т. 36. –С. 96-100.
99. Михеев А.Д. *Psephellus* Cass. / Конспект флоры Кавказа. – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(1), 2008. –С. 287-296.
100. Михеев А.Д. Конспект флоры сосудистых растений района Кавказских Минеральных Вод и прилегающих территорий. – Пятигорск: Вестник Кавказа, 2009. –64 с.
101. Михеев А.Д. *Papaver* L. / Конспект флоры Кавказа. – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(2), 2012. –С. 111-118.
102. Мордак Е.В. О *Fritillaria meleagroides* Partin ex Schult.et Schult.f. (*Liliaceae*) на Кавказе // Новости систематики высших растений, Т. 20, 1983. –С. 86-91.
103. Муртазалиев Р.А. Конспект флоры Дагестана. – Махачкала: Изд-во ИД «Эпоха», Т. I-IV, 2009: Т. I, 2009. –320 с.; Т. II, 2009. –248 с.; Т. III, 2009. –304 с.; Т. IV, 2009. –232 с.
104. Немирова Е.С., Данилевич В.Г. К флоре окрестностей озера Солёного // Актуальные вопросы экологии и охраны природы Ставропольского края и сопредельных территорий. Ставрополь, 1991. –С. 134-135.
105. Немирова Е.С., Данилевич В.Г. К флоре северо-восточных и восточных районов Ставропольского края // Вестник СГПУ, вып. 2. Ставрополь, 1995. –С. 23-26.
106. Немирова Е.С., Троцкая И.В. О некоторых редких видах рода *Allium* L. флоры Предкавказья // Вторая Всероссийская телеконференция «Современная биогеография» 2003. (Internet-публикация: <http://www.stavsu.ru>).
107. Никитин В.В. *Viola* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. –С. 338-349.
108. Николаев В.Я. Обзор кавказских видов рода *Hieracium* подрода *Hieracium* - секции *Hieracium*, *Pannosa*, *Sparsiflora*, *Glauciformis* (*Asteraceae*) // Ботанический журнал, 1990а, Т. 75, № 3. –С. 419-429;

109. Николаев В.Я. Обзор кавказских видов *Hieracium* подрода *Hieracium* - секции *Prenanthoidea*, *Schmalhauseniiana*, *Foliosa*, *Sabauda*, *Umbellata*, *Tridentata* (*Asteraceae*) // Ботанический журнал, 1990б, Т. 75, № 4. –С. 556-563.
110. Новосад В.В. Флора Керченско-Таманского региона. – Киев: Наукова думка, 1992. –278 с.
111. Оганесян М.Э. *Campanula litvinskajae* Ogan. (*Campanulaceae*) – новый вид с Западного Кавказа / Новости систематики высших растений, Т. 46, 2015. – С. 216-221.
112. Онипченко В.Г. *Narthecium balansae* Briq. (*Liliaceae*) – новый вид для Северного Кавказа и России в целом // Бюллетень МОИП, Отд. биологии, 1995, Т. 100, № 1. –С. 86-87
113. Пименов М.Г., Онипченко В.Г. *Laserpitium stevenii* Fisch. et Trautv. (*Umbelliferae*) – новый вид для Северного Кавказа и России в целом // Бюллетень МОИП, Отд. биологии, 1999, Т. 104, № 2. –С. 59-60.
114. Попова Т.И. Критические заметки о кавказских марьяниках (*Melampyrum* L.) // Новости систематики высших растений, Т. 17, 1980. –С. 218-228.
115. Портениер Н.Н. Флористические находки на Западном Кавказе // Ботанический журнал, 1998, Т. 83, № 5. –С. 113-114.
116. Портениер Н.Н. Методические вопросы выделения географических элементов флоры Кавказа. // Ботанический журнал, 2000? Т. 85, № 6. –С. 76-84.
117. Портениер Н.Н. Дополнение к флоре Западного Закавказья // Ботанический журнал, 2003, Т. 88, № 7. –С. 127-132.
118. Портениер Н.Н. Флора и ботаническая география Северного Кавказа. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. –294 с.
119. Портениер Н.Н., Солодько А.С. Дополнения к флоре Российского Северо-Западного Закавказья // Ботанический журнал, 2002, Т. 87, № 6. –С. 123-130.
120. Проханов Я.И. Обзор растительности и флоры Будённовского района Ставропольского края // Материалы по изучению Ставропольского края, вып. 2-3. – Ставрополь: Крайиздат, 1950. –С. 103-162.
121. Пунина Е.О., Мордак Е.В. Конспект кавказских видов рода *Raeonia* (*Raeoniaceae*) // Ботанический журнал, 2009, Т. 94, № 11. –С. 1681-1696.
122. Пунина Е.О., Мордак Е.В, Тимухин И.Н., Литвинская С.А. Конспект нотовидов рода *Raeonia* L. (*Raeoniaceae*) Кавказа и Крыма // Новости систематики высших растений, 2011, Т. 42. – М.: Товарищество научных изданий КМК. –С. 120-131.
123. Раджи А.Д. Венерин башмачок настоящий - *Cypripedium calceolus* L. // Красная книга республики Дагестан. – Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1998. –338 с.
124. Русанович И.И. *Tamarix* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012б. –С. 350-353
125. Семагина Р.Н. Флора Кавказского государственного природного биосферного заповедника. – Сочи, 1999. –230 с.

126. Серегин Ф. П. Новые и редкие виды рода *Allium* (*Alliaceae*) флоры Крыма и вопросы систематики некоторых видов в роде // Бюлл. МОИП, 2004, № 109(3). –С. 47.
127. Соколова И.В. *Cerastium* L. / Конспект флоры Кавказа. – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(2), 2012. –С. 153-161.
128. Солодько А.С. Флора Сочинского Причерноморья: материалы к конспекту флоры дикорастущих сосудистых растений. – Сочи, 2002. –62 с.
129. Солодько А.С., Кирий П.В. Красная книга Сочи. Том. 1. Растения и грибы. – Сочи: Издание Бесковых, 2002. –148 с.
130. Сытин А.К. Ревизия кавказских астрагалов (*Astragalus* L., *Fabaceae*) секции *Hololeuce* Bunge // Новости систематики высших растений, 1986., Т. 23. –С. 79-86.
131. Тайсумов М.А., Теймуров А.А. Новые виды петрофитов из Южного Дагестана // Бюллетень МОИП. Отделение биологии, 2010, Т. 115, Вып. 1. –С. 70-73.
132. Танфильев В.Г., Кононов В.Н. Дополнение к флоре Ставропольского края // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 3. – Ставрополь, 1979. –С. 85-89.
133. Танфильев В.Г., Кононов В.Н. Каталог дикорастущих растений Ставропольского края. – Ставрополь, 1987. –116 с.
134. Татанов И.В. *Molluginaceae* Bartl. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. –С. 141.
135. Теймуров А.А. Эколого-географическая и биологическая характеристика петрофитов Самурского хребта и Джуфудага в связи с историей формирования флоры Южного Дагестана. Атореферат дисс....канд. биол. наук. – Махачкала, 1998. –26 с.
136. Теймуров А.А., Сатуева Л.Л., Миразаев Д.М., Солтанмурадова З.И. Новые флористические находки для Дагестана // Юг России: экология, развитие, № 4, 2013. –С. 105-108.
137. Тимухин И.Н. Новые находки редких видов растений в Краснодарском крае // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных территорий. – Краснодар, 2000. –С. 4-5.
138. Тимухин И.Н. Естественные межвидовые гибриды рода *Orchis* (*Orchidaceae*) в Туапсе-Адлерском флористическом районе Западного Закавказья // Ботанический журнал, 2010, Т. 95, № 2. –С. 187-190.
139. Тимухин И.Н. Горные флористические эндемы Абхазии в приграничных районах Краснодарского края // Материалы IV Международной конференции, посвящённой 80-летию основателя ИЭГТ КБНЦ РАН, чл.-корр. РАН А.К. Темботова и 80-летию Абхазского государственного университета. – Нальчик, 2012. –С. 233.
140. Тимухин И.Н., Туниев Б.С. Новые места находок сосудистых растений в Северо-Западном Закавказье // Ботанический вестник Северного Кавказа, № 1, 2015. –С. 68-80.
141. Толмачёв А.И. Введение в географию растений. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1974. –224 с.

142. Умаров М.У., Тайсумов М.А. Конспект флоры Чеченской Республики. – Грозный: Изд-во АН ЧР, 2011. –151 с.
143. Флора Нижнего Дона, часть 1 / Под ред. Г.М.Зозулина и В.В.Федяевой. – Ростов: Изд-во РГУ, 1984. –279 с.
144. Флора Нижнего Дона, часть 2 / Под ред. Г.М.Зозулина и В.В.Федяевой. – Ростов: Изд-во РГУ, 1985. –239 с.
145. Флора СССР, 1934-1964, Т. I-XXX: Т. I. – Л., 1933. –302 с. Т. II. – Л., 1934. –778 с. Т. III. – Л., 1935. 636 с. Т. IV. – Л., 1935. –760 с. Т. V. – М.-Л., 1936. –762 с. Т. VI. – М.-Л., 1936. –956 с. Т. VII. – М.-Л., 1937. –790 с. Т. VIII. – М.-Л., 1939. –692 с. Т. IX. – М.-Л., 1939. –546 с. Т. X. – М.-Л., 1941. –673 с. Т. XI. – М.-Л., 1945. –432 с. Т. XII. – М.-Л., 1946. –919 с. Т. XIII. – М.-Л., 1948. –588с. Т. XIV. – М.-Л., 1949. –790 с. Т. XV. –М.-Л., 1949. –743 с. Т. XVI. – М.-Л., 1950. –648 с. Т. XVII. – М.-Л., 1951. –390 с. Т. XVIII. – М.-Л., 1952. –803 с. Т. XIX. – М.-Л., 1953. –753 с. Т. XX. – М.-Л., 1954. –556 с. Т. XXI. – М.-Л., 1954. –704 с. Т. XXII. – М.-Л., 1955. –862 с. Т. XXIII. – М.-Л., 1958. –776 с. Т. XXIV. – М.-Л., 1957. –502 с. Т. XXV. – М.-Л., 1959. –630 с. Т. XXVI. – М.-Л., 1961. –939 с. Т. XXVII. – М.-Л., 1962. –758 с. Т. XXVIII. – М.-Л., 1963. –654 с. Т. XXIX. – М.-Л., 1964. –798 с. Т. XXX. – М.-Л., 1964. –732 с.
146. Фролов Ю.М. Новый вид рода *Symphytum* (*Boraginaceae*) с Кавказа // Ботанический журнал, 1985, Т. 70, № 4. –С. 533-534.
147. Цвелёв Н.Н. Злаки СССР. – Л.: Наука, 1976. –788 с.
148. Цвелёв Н.Н. Род *Polygonum sensu lato* (*Polygonaceae*) на Кавказе / Новости систематики высших растений, 1989, т. 26. –С. 63-73.
149. Цвелёв Н.Н. Обзор видов семейства *Gentianaceae* флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1993, Т. 78, № 6. – С. 131-138.
150. Цвелёв Н.Н. *Turphaceae* Juss / Конспект флоры Кавказа, Т. 1. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006. –С. 246-248.
151. Цвелёв Н.Н. О роде Тонконог (*Koeleria* Pers., *Poaceae*) в России / Новости систематики высших растений, 2010, Т. 42. –С. 63-90.
152. Цвелёв Н.Н. *Plumbaginaceae* Juss. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(2), 2012. –С. 272-284.
153. Цвелёв Н.Н. *Droseraceae* Salisb. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(2), 2012б. –С. 315-316.
154. Цвелёв Н.Н. *Polygonum* L. / Конспект флоры Кавказа. – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(2), 2012в. –С. 262-268.
155. Цвелёв Н.Н. *Plumbaginaceae* Juss. / Конспект флоры Кавказа. – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(2), 2012г. –С. 272-284.
156. Цвелёв Н.Н. О роде *Chamaenerion* Seg. (*Onagraceae*) на Кавказе / Новости систематики высших растений, 2014, Т. 45. –С. 42-50.
157. Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. – С.-Пб.: Мир и семья-95, 1995. –990 с.
158. Шанцер И.А. Заметки о кавказских подмаренниках (*Galium* L., *Rubiaceae*) секции *Orientigalium* Ehrend. // Новости систематики высших растений, 1989, Т. 26. –С. 151-157.

159. Шванова В.В. *Sambucus L.* // Конспект флоры Кавказа. – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(1), 2008. –С. 113-114.
160. Шванова В.В. *Ordo Nymphaeales* / Конспект флоры Кавказа. – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(2), 2012. –С. 56-57.
161. Шильников Д.С. Конспект флоры Карачаево-Черкесии. – Ставрополь: Изд-во Аргус, 2010. –384 с.
162. Шильников Д.С. Редкие и исчезающие растения Карачаево-Черкесии. – Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых (ООО «Полиграфсервис и Т»), 2011. –492 с.
163. Шагапсоев С.Х. Анализ петрофитного флористического комплекса западной части Центрального Кавказа. – Нальчик: Издательский центр Эль-Фа, 2003. –220 с.
164. Юзепчук С.В. Манжетка - *Alchemilla L.* / Флора СССР, Т. 10, 1941. – С. 289-410.
165. Efimov P. Notes on *Epipactis condensata*, *E. rechingeri* and *E. purpurata* (*Orchidaceae*) in the Caucasus and Crimea // *Willdenowia*, 2008, 38. –P. 71-80.
166. Raunkiaer C. The life forms of plants and statistical plant geography. – Oxford: Clarendon Press, 1934. –632 p.

Index familiarum

A	№		
Aceraceae.....	123	Commelinaceae.....	42
Acoraceae.....	39	Convallariaceae.....	56
Adiantaceae.....	7	Convolvulaceae.....	160
Adoxaceae.....	179	Cornaceae.....	147
Alismataceae.....	34	Corylaceae.....	64
Alliaceae.....	52	Crassulaceae.....	97
Amaranthaceae.....	76	Cryptogrammaceae.....	9
Amaryllidaceae.....	53	Cucurbitaceae.....	182
Anacardiaceae.....	114	Cupressaceae.....	24
Anthericaceae.....	48	Cuscutaceae.....	161
Apiaceae.....	146	Cyperaceae.....	38
Apocynaceae.....	158	D	
Aquifoliaceae.....	120	Datisceae.....	136
Araceae.....	40	Dioscoreaceae.....	59
Araliaceae.....	145	Dipsacaceae.....	181
Aristolochiaceae.....	73	Droseraceae.....	96
Asclepiadaceae.....	159	Dryopteridaceae.....	16
Asparagaceae.....	54	E	
Asphodelaceae.....	47	Ebenaceae.....	152
Aspleniaceae.....	13	Elaeagnaceae.....	138
Asteraceae.....	184	Elatinaceae.....	131
Athyriaceae.....	15	Empetraceae.....	119
B		Ephedraceae.....	25
Balsaminaceae.....	124	Equisetaceae.....	4
Berberidaceae.....	89	Ericaceae.....	150
Betulaceae.....	65	Euphorbiaceae.....	116
Blechnaceae.....	18	F	
Boraginaceae.....	165	Fabaceae.....	104
Brassicaceae.....	93	Fagaceae.....	66
Butomaceae.....	35	Frankeniaceae.....	132
Buxaceae.....	118	Fumariaceae.....	92
C		G	
Cactaceae.....	77	Gentianaceae.....	156
Caesalpiniaceae.....	103	Geraniaceae.....	105
Callitrichaceae.....	117	Globulariaceae.....	173
Campanulaceae.....	183	Grossulariaceae.....	101
Cannabaceae.....	69	H	
Capparaceae.....	94	Haloragaceae.....	143
Caprifoliaceae.....	178	Heliotropaceae.....	164
Caryophyllaceae.....	82	Hemerocallidaceae.....	49
Celastraceae.....	121	Hippuridaceae.....	144
Ceratophyllaceae.....	85	Huperziaceae.....	1
Chenopodiaceae.....	75	Hyacinthaceae.....	51
Cistaceae.....	134	Hydrangeaceae.....	99
Colchicaceae.....	46	Hydrocharitaceae.....	36
		Hydrophyllaceae.....	163
		Hypecoaceae.....	90
		Hypericaceae.....	130
		Hypolepidaceae.....	8
		I	

Iridaceae.....	60	Polygalaceae.....	115
J		Polygonaceae.....	74
Juglandaceae.....	63	Polypodiaceae.....	11
Juncaceae.....	44	Pontederiaceae.....	43
Juncaginaceae.....	33	Portulacaceae.....	81
L		Potamogetonaceae.....	29
Lamiaceae.....	167	Primulaceae.....	153
Lauraceae.....	129	Pteridaceae.....	6
Lemnaceae.....	41	Punicaceae.....	140
Lentibulariaceae.....	172	Pyrolaceae.....	148
Liliaceae.....	50	R	
Limoniaceae.....	154	Ranunculaceae.....	88
Linaceae.....	107	Resedaceae.....	95
Lycopodiaceae.....	2	Rhamnaceae.....	125
Lythraceae.....	139	Rosaceae.....	102
M		Rubiaceae.....	175
Malvaceae.....	128	Ruppiaceae.....	30
Marsileaceae.....	19	Ruscaceae.....	55
Martyniaceae.....	170	Rutaceae.....	112
Melanthiaceae.....	45	S	
Menyanthaceae.....	157	Salicaceae.....	62
Molluginaceae.....	80	Salviniaceae.....	20
Monotropaceae.....	149	Sambucaceae.....	176
Moraceae.....	68	Santalaceae.....	72
N		Saxifragaceae.....	98
Najadaceae.....	32	Scrophulariaceae.....	169
Nelumbonaceae.....	86	Selaginellaceae.....	3
Nitrariaceae.....	111	Simaroubaceae.....	113
Nupharaceae.....	84	Sinopteridaceae.....	10
Nyctaginaceae.....	79	Smilacaceae.....	58
Nymphaeaceae.....	83	Solanaceae.....	168
O		Sparganiaceae.....	27
Oleaceae.....	155	Staphyleaceae.....	122
Onagraceae.....	141	T	
Onocleaceae.....	14	Tamaricaceae.....	133
Ophioglossaceae.....	21	Taxaceae.....	22
Orchidaceae.....	61	Tetradicliaceae.....	109
Orobanchaceae.....	171	Thelypteridaceae.....	12
Osmundaceae.....	5	Thymelaeaceae.....	137
Oxalidaceae.....	106	Tiliaceae.....	127
P		Trapaceae.....	142
Paeoniaceae.....	87	Trilliaceae.....	57
Papaveraceae.....	91	Typhaceae.....	26
Parnassiaceae.....	100	U	
Peganaceae.....	108	Ulmaceae.....	67
Phytolaccaceae.....	78	Urticaceae.....	70
Pinaceae.....	23	V	
Plantaginaceae.....	174	Vacciniaceae.....	151
Poaceae.....	37	Valerianaceae.....	180
Polemoniaceae.....	162	Verbenaceae.....	166

Viburnaceae.....	177
Violaceae.....	135
Viscaceae.....	71
Vitaceae.....	126
W	
Woodsiaceae.....	17
Z	
Zannichelliaceae.....	31
Zosteraceae.....	28
Zygophyllaceae.....	110

Алфавитный указатель семейств

А	№.
Адиантовые.....	7
Адоксовые.....	179
Аировые.....	39
Амариллисовые.....	53
Аралиевые.....	145
Аронниковые.....	40
Астровые.....	184
Асфodelовые.....	47
Б	
Бальзаминовые.....	124
Баранцовые.....	1
Барбарисовые.....	89
Безвременниковые.....	46
Белозоровые.....	100
Берёзовые.....	65
Бересклетовые.....	121
Бобовые.....	104
Болотниковые.....	117
Брусниковые.....	151
Бузиновые.....	176
Буковые.....	66
Бурачниковые.....	165
В	
Валериановые.....	180
Вахтовые.....	157
Венечниковые.....	48
Вербеновые.....	166
Вересковые.....	150
Верглиянцевые.....	149
Взморниковые.....	28
Виноградовые.....	126
Водокрасовые.....	36
Водяниковые.....	119
Волчниковые.....	137
Ворсянковые.....	181
Вудсиевые.....	17

Вьюнковые.....	160
Г	
Гармаловые.....	108
Гвоздиковые.....	82
Гелиотроповые.....	164
Гераниевые.....	105
Гиацинтовые.....	51
Гидрофилиевые.....	163
Гипекоумовые.....	90
Гипопелисовые.....	8
Горечавковые.....	156
Гранатовые.....	140
Гребенщиковые.....	133
Гречишковые.....	74
Грушанковые.....	148
Д	
Датисковые.....	136
Дербенниковые.....	139
Дербянковые.....	18
Диоскореиные.....	59
Дымянковые.....	92
Е	
Ежеголовниковые.....	27
Ж	
Жимолостевые.....	178
З	
Занникелиевые.....	31
Заразиховые.....	171
Зверобоевые.....	130
Злаковые.....	37
Зонтичные.....	146
И	
Ивовые.....	62
Иглициевые.....	55
Ильмовые.....	67
Ирисовые.....	60
Истодовые.....	115
К	
Кактусовые.....	77
Калиновые.....	177
Камнеломковые.....	98
Каперсовые.....	94
Капустовые.....	93
Кермековые.....	154
Кизиловые.....	147
Кипарисовые.....	24
Кипреевые.....	141
Кирказоновые.....	73
Кислицевые.....	106
Клекачковые.....	122

Клёновые.....	123	Ослинниковые.....	141
Колокольчиковые.....	183	Осмундовые.....	5
Коммелиновые.....	42	Осоковые.....	38
Коноплёвые.....	69	П	
Костенцовые.....	13	Падубовые.....	120
Кочедыжниковые.....	15	Парнолистниковые.....	110
Крапивовые.....	70	Паслёновые.....	168
Красодневовые.....	49	Пионовые.....	87
Криптограммовые.....	9	Плаунковые.....	3
Крушиновые.....	125	Плауновые.....	2
Крыжовниковые.....	101	Повиликовые.....	161
Кубышковые.....	84	Повойничковые.....	131
Кутровые.....	158	Подорожниковые.....	174
Л		Подъельниковые.....	149
Лавровые.....	129	Понтедериевые.....	43
Ладанниковые.....	134	Портулаковые.....	81
Лаконосовые.....	78	Примуловые.....	153
Ландышевые.....	56	Птерисовые.....	6
Ластовневые.....	159	Пузырчатковые.....	172
Лещиновые.....	64	Р	
Лилиевые.....	50	Рдестовые.....	29
Липовые.....	127	Резедовые.....	95
Лотосовые.....	86	Рогозовые.....	26
Лоховые.....	138	Роголистниковые.....	85
Луковые.....	52	Розовые.....	102
Льновые.....	107	Росянковые.....	96
Лютиковые.....	88	Руппиевые.....	30
М		Рутовые.....	112
Маковые.....	91	Рясковые.....	41
Мальвовые.....	128	С	
Маревые.....	75	Сальвиниевые.....	20
Мареновые.....	175	Самшитовые.....	118
Марсилиевые.....	19	Сандаловые.....	72
Мартиниевые.....	170	Сассапарилиевые.....	58
Маслиновые.....	155	Селитрянковые.....	111
Мелантиевые.....	45	Сельдереевые.....	146
Многоножковые.....	11	Симарубовые.....	113
Моллюговые.....	80	Синоптерисовые.....	10
Молочаевые.....	116	Синюховые.....	162
Мятликовые.....	37	Ситниковые.....	44
Н		Ситничковые.....	33
Наядовые.....	32	Сосновые.....	23
Никтагиновые.....	79	Спаржевые.....	54
Нимфеевые.....	83	Сумаховые.....	114
Норичниковые.....	169	Сусаковые.....	35
О		Т	
Омёловые.....	71	Телиптерисовые.....	12
Оноклеевые.....	14	Тетрадиклидиевые.....	109
Ореховые.....	63	Тисовые.....	22
Орхидные.....	61	Толстянковые.....	97

Триллиевые.....	57	Частуховые.....	34
Тутовые.....	68	Чилимовые.....	142
Тыквенные.....	182	Чубушниковые.....	99
У		Ш	
Ужовниковые.....	21	Шаровницевые.....	173
Урутевые.....	143	Щ	
Ф		Щирицевые.....	76
Фиалковые.....	135	Щитовниковые.....	16
Франкениевые.....	132	Э	
Х		Эбеновые.....	152
Хвостниковые.....	144	Эфедровые.....	25
Хвощёвые.....	4	Я	
Ц		Яснотковые.....	167
Цезальпиниевые.....	103	Ятрышниковые.....	61
Ч			

Index generum

A

Abies 34
Abutilon 652
Acachmena 461
Acalypha 632
Acantholimon 785
Acanthophaea 589
Acer 643
Achillea 996
Achnatherum 140
Acinos 876
Aconitum 400
Aconogonon 306
Acorus 200
Acroptilon 1032
Actaea 397
Adiantum 8
Adonis 419
Adoxa 938
Aegilops 67
Aegonychon 836
Aegopodium 727
Aeluropus 152
Aetheopappus 1038
Aethusa 734
Agaloma 633
Agasyllis 745
Agrimonia 547
Agriophyllum 328
Agropyron 65
Agrostemma 389
Agrostis 100
Ailanthus 623
Aira 94
Ajuga 847
Albovia 726
Alcea 657
Alchagi 601
Alchemilla 545
Aldrovanda 510
Alisma 51
Alliaria 483
Allium 232
Alnus 284
Alopecurus 137
Althaea 656
Althenia 47

Alyssoides 464
Alyssum 468
Amaranthus 346
Amberboa 1034
Ambrosia 988
Amelanchier 530
Amaria 574
Amorpha 581
Amphoricarpos 1016
Amygdalus 552
Anabasis 341
Anacamptis 268
Anagallis 783
Ancathia 1029
Anchusa 828
Andrachne 629
Andropogon 179
Androsace 778
Andrzeiowskia 491
Anemonastrum 408
Anemone 407
Anemonoides 409
Anetilla 410
Aneurolepidium 72
Angelica 741
Anisantha 80
Antennaria 981
Anthemis 994
Anthericum 216
Anthoxanthum 87
Anthriscus 694
Anthyllis 577
Antonina 873
Apera 98
Aphanes 546
Apium 716
Apterigia 497
Aquilegia 395
Arabidopsis 471
Arabis 469
Arafoë 738
Arceuthobium 297
Archangelica 743
Arctium 1018
Arctostaphylos 770
Arenaria 357
Argusia Boehm 814
Argyrolobium 562
Aristolochia 301

Armeniaca 557
Armoracia 477
Arrhenatherum 83
Artemisia 1003
Arthraxon 180
Arum 201
Aruncus 524
Arundo 150
Asarum 300
Asclepias 805
Asparagus 238
Asperugo 824
Asperula 929
Asphodeline 215
Asplenium 17
Aster 965
Astracantha 590
Astragalus 591
Astrantia 690
Astrodaucus 699
Asyneuma 958
Athyrium 21
Atraphaxis 310
Atriplex 319
Atropa 885
Avena 81
Avenella 93
Axyris 318
Azalea 771

B

Ballota 866
Barbarea 474
Barkhausia 1073
Bassia 326
Batrachium 414
Beckmannia 135
Bellardia 911
Bellevalia 228
Bellis 973
Berberis 420
Berteroa 465
Berula 729
Beruniella 815
Beta 315
Betonica 867
Betula 283
Bidens 992
Bienertia 335
Bifora 705

Bilacunaria 711
 Bistorta 305
 Blackstonia 794
 Blechnum 28
 Blitum 317
 Blysmus 189
 Bolboschoenus 185
 Bombycilaena 975
 Bongardia 422
 Borago 826
 Boriskellera 154
 Botriochloa 178
 Botrychium 32
 Brachiaria 165
 Brachypodium 61
 Brassica 430
 Briza 126
 Brizochloa 127
 Bromopsis 79
 Bromus 78
 Brunnera 829
 Bryonia 950
 Bufonia 361
 Buglossoides 838
 Bunias 448
 Bunium 722
 Bupleurum 713
 Buschia 416
 Butomus 53
 Buxus 638
C
 Cakile 447
 Calamagrostis 97
 Calamintha 874
 Calendula 1013
 Calepina 449
 Callicephalus 1033
 Calligonum 311
 Callipeltis 931
 Callitriche 637
 Calophaca 588
 Caltha 398
 Calycocorus 1071
 Calystegia 810
 Camelina 488
 Campanula 953
 Camphorosma 324
 Campyloptera 501
 Cannabis 294
 Capparis 506
 Capsella 489
 Caragana 587
 Cardamine 478
 Cardaria 503
 Carduus 1023
 Carex 199
 Carlina 1017
 Carpesium 985
 Carpinus 280
 Carthamus 1044
 Carum 721
 Caspia 339
 Castanea 286
 Catabrosa 118
 Catabrosella 116
 Caucalis 700
 Caulinia 49
 Celtis 289
 Cenchrus 171
 Centaurea 1041
 Centaurium 793
 Cephalanthera 255
 Cephalaria 944
 Cephalorrhynchus 1066
 Cerastium 362
 Cerasus 553
 Ceratocarpus 322
 Ceratocephala 417
 Ceratochloa 77
 Ceratophyllum 392
 Cercis 558
 Cerinthe 841
 Ceterach 18
 Chaenorhinum 896
 Chaerophyllum 693
 Chaiturus 863
 Chamaecytisus 567
 Chamaenerion 681
 Chamaesciadium 724
 Chamaesyce 636
 Charesia 385
 Chartolepis 1036
 Cheilanthes 11
 Chelidonium 424
 Chenopodium 316
 Chiasmophyllum 511
 Chloris 157
 Chondrilla 1070
 Chorisporea 482
 Chrozophora 630
 Chrysaspis 575
 Chrysopogon 177
 Chrysosplenium 518
 Chymysydia 746
 Cicer 602
 Cicerbita 1067
 Cichorium 1047
 Cinna 128
 Circaea 683
 Cirsium 1024
 Cistus 667
 Cladium 195
 Cladochaeta 982
 Clausia 459
 Cleistogenes 153
 Clematis 412
 Cleome 507
 Climacoptera 340
 Clinopodium 875
 Clypeola 444
 Cnicus 1043
 Cnidium 737
 Coccyanthe 383
 Coeloglossum 262
 Coix 181
 Colchicum 213
 Colpodium 120
 Colutea 586
 Coluteocarpus 452
 Comarum 536
 Comastoma 798
 Commelina 206
 Comperia 265
 Conium 708
 Conringia 436
 Consolida 403
 Convallaria 242
 Convolvulus 809
 Conyza 971
 Corallorhiza 275
 Coriandrum 703
 Corispermum 327
 Cornus 764
 Coronilla 595
 Coronopus 505
 Cortaderia 151
 Corydalis 428
 Corylus 282
 Cotoneaster 525
 Cotynus 625

Cousinia 1019
 Crambe 446
 Crataegus 533
 Crepis 1072
 Crithmum 730
 Crocus 247
 Crucianella 928
 Cruciata 932
 Crupina 1045
 Crypsis 160
 Cryptogramma 10
 Cucubalus 388
 Cuscuta 811
 Cutandia 111
 Cyclachaena 987
 Cyclamen 784
 Cyclosporum 717
 Cydonia 526
 Cymbalaria 893
 Cymbochasma 914
 Cynanchum 808
 Cynodon 158
 Cynoglossum 818
 Cynosurus 125
 Cyperus 191
 Cypripedium 252
 Cystopteris 22
 Cytisus 566
D
 Dactylis 124
 Dactylorhiza 266
 Dantonina 147
 Daphne 672
 Dasypyrum 69
 Datisca 671
 Datura 891
 Daucus 702
 Delphinium 401
 Dendrobrychis 598
 Dentaria 480
 Deschampsia 92
 Descurainia 486
 Dianthus 374
 Diarrhon 674
 Dichodon 359
 Dichostylis 192
 Dichrocephala 972
 Dictamnus 621
 Didymophysa 504
 Diedropetala 402
 Digitalis 904
 Digitaria 168
 Dioscorea 245
 Diospyros 775
 Diphasiastrum 3
 Diphelipaea 919
 Diplotaxis 437
 Dipsacus 943
 Dodartia 898
 Dolichorrhiza 1010
 Doronicum 1007
 Dorycnium 578
 Draba 472
 Dracocephalum 854
 Drosera 509
 Dryas 543
 Drymochloa 105
 Dryopteris 26
E
 Ecballium 951
 Echinaria 132
 Echinochloa 164
 Echinocystis 952
 Echinops 1014
 Echium 842
 Elaeagnus 677
 Elaeosticta 723
 Elatine 662
 Eleocharis 190
 Eleusine 156
 Eleutherospermum 709
 Elisanthe 384
 Elodea 56
 Elsholtzia 882
 Elymus 63
 Elytrigia 64
 Empetrum 639
 Ephedra 39
 Epilobium 680
 Epimedium 421
 Epipactis 254
 Epipogium 274
 Equisetum 5
 Eragrostis 155
 Erechites 1012
 Eremogone 358
 Eremopoa 115
 Eremopyrum 66
 Eremosparton 584
 Eremostachys 857
 Eremurus 214
 Erianthus 172
 Erigeron 969
 Eriochloa 166
 Eriophorum 183
 Eriosynaphe 747
 Eritrichium 823
 Erodium 611
 Erophila 473
 Eruca 433
 Erucastrium 432
 Ervilia 604
 Eryngium 691
 Erysimum 460
 Erythronium 223
 Euclidium 438
 Eunomia 498
 Euonymus 641
 Eupatorium 961
 Euphrasia 906
F
 Fagopyrum 307
 Fagus 285
 Falcaria 720
 Fallopia 309
 Ferula 748
 Ferulago 749
 Festuca 107
 Fibigia 463
 Ficaria 415
 Ficus 292
 Filago 976
 Filipendula 544
 Foeniculum 735
 Fragaria 535
 Frangula 647
 Frankenia 663
 Fraxinus 790
 Fritillaria 220
 Froiepia 715
 Fuernrohria 704
 Fumana 669
 Fumaria 429
G
 Gadellia 956
 Gagea 218
 Galanthus 237
 Galatella 968
 Galega 582
 Galeobdolon 862

Galeopsis 860
 Galinsoga 993
 Galium 930
 Gamanthus 344
 Garhadiolus 1057
 Garidella 405
 Gastridium 102
 Gaudinopsis 85
 Genista 565
 Gentiana 795
 Gentianella 797
 Gentianopsis 796
 Geranium 610
 Geum 541
 Gladiolus 251
 Glaucium 425
 Glaux 782
 Glechoma 853
 Gleditsia 559
 Globularia 924
 Glyceria 138
 Glycirrhiza 593
 Gnaphalium 979
 Goldbachia 439
 Goniolimon 786
 Goodyera 259
 Gratiola 899
 Grindelia 962
 Groenlandia 44
 Grossheimia 1035
 Grossularia 522
 Gymnadenia 264
 Gymnocarpium 24
 Gypsophila 370
H
 Hablitzia 314
 Halanthium 342
 Halimione 320
 Halocnemum 331
 Halopeplis 329
 Halostachys 332
 Halothamnus 338
 Haplophyllum 620
 Hedera 687
 Hedyppnois 1056
 Hedysarum 597
 Helianthemum 668
 Helianthus 991
 Helictotrichon 82
 Heliotropium 816
 Helleborus 406
 Helminthotheca 1055
 Helychrysum 977
 Hemerocallis 217
 Heracleum 758
 Herminium 261
 Herniaria 356
 Hesperis 458
 Heteropappus 967
 Hibiscus 651
 Hieracium 1075
 Hierochloë 86
 Himantoglossum 271
 Hippocrepis 594
 Hippophaë 676
 Hippuris 686
 Hirschfeldia 434
 Holcus 95
 Holosteum 364
 Hordelymus 75
 Hordeum 74
 Hornungia 499
 Humulus 293
 Huperzia 1
 Huynhia 839
 Hyalopoa 117
 Hydrocharis 54
 Hydrocotyle 688
 Hylotelephium 513
 Hymenolobus 490
 Hyoscyamus 888
 Hypecoum 423
 Hypericum 661
 Hypochoeris 1051
 Hypopitys 769
 Hyssopus 877
I
 Iberis 500
 Ilex 640
 Impatiens 645
 Imperata 173
 Inula 983
 Iridodictyum 249
 Iris 250
 Isatis 442
 Isolepis 188
J
 Jasminum 792
 Johreniopsis 755
 Juglans 279
 Juncellus 193
 Juncus 208
 Juniperus 38
 Juno 248
 Jurinea 1021
 Jurinella 1022
K
 Kalidium 330
 Kemulariella 966
 Kickxia 894
 Kitaibelia 659
 Knautia 942
 Kobresia 198
 Kochia 325
 Koeleria 91
 Kohlrauschia 375
 Krascheninnikovia 321
L
 Lactuca 1062
 Lallelantia 855
 Lamium 861
 Lamyra 1026
 Laphangium 978
 Lappula 822
 Lapsana 1068
 Laser 754
 Laserpitium 763
 Lathraea 916
 Lathyrus 606
 Laurocerasus 556
 Laurus 660
 Lavatera 654
 Leersia 144
 Legousia 957
 Lemna 203
 Lens 605
 Leontodon 1053
 Leonurus 864
 Leopoldia 229
 Lepidium 502
 Lepidotheca 999
 Leptopus 628
 Leucanthemum 997
 Leucojum 236
 Leucopoa 106
 Leymus 71
 Libanotis 732
 Ligularia 1011
 Ligusticum 740
 Ligustrum 791

Lilium 219
 Limodorum 256
 Limoniopsis 788
 Limonium 787
 Limosella 900
 Linaria 895
 Lindernia 901
 Linnaea 936
 Linum 614
 Liparis 253
 Lippia 845
 Listera 257
 Lithospermum 837
 Litwinowia 451
 Lloydia 222
 Lobularia 467
 Lolium 104
 Lomatogonium 799
 Lonicera 937
 Lotus 579
 Lunaria 453
 Lupinaster 573
 Luzula 209
 Lycium 884
 Lycopodium 2
 Lycopsis 830
 Lycopus 880
 Lysimachia 780
 Lythrum 678
M
 Maclura 291
 Macrosciadium 739
 Macroselinum 752
 Macrosyringium 909
 Majanthemum 241
 Malabaila 759
 Malus 528
 Malva 655
 Malvalthaea 658
 Malvella 653
 Mandenovia 762
 Marrubium 850
 Marsilea 29
 Matricaria 998
 Matteuccia 20
 Matthiola 454
 Medicago 571
 Melampyrum 905
 Melandrium 387
 Melica 139
 Melilotoides 569
 Melilotus 572
 Melissa 871
 Meniocus 466
 Mentha 881
 Menyanthes 801
 Mercurialis 631
 Merendera 212
 Mespilus 532
 Micropus 974
 Microstegium 175
 Microthlaspi 494
 Miliun 96
 Minuartia 366
 Mirabilis 350
 Miscanthus 174
 Moehringia 360
 Molinia 146
 Mollugo 351
 Molucella 865
 Moneses 767
 Monochoria 207
 Morus 290
 Muehlbergella 960
 Muhlenbergia 159
 Murbeckiella 479
 Muscari 230
 Myagrum 441
 Mycelis 1065
 Myosotis 834
 Myosoton 365
 Myosurus 418
 Myricaria 666
 Myriophyllum 685
 Myrrhis 697
 Mzymtella 954
N
 Najas 48
 Nardosmia 1006
 Nardurus 109
 Nardus 143
 Narthecium 211
 Nasturtium 476
 Naumburgia 781
 Nectaroscordum 233
 Negundo 644
 Nelumbo 393
 Neotorularia 487
 Neottia 258
 Nepeta 852
 Neslia 450
 Neurotropis 493
 Nicandra 883
 Nigella 404
 Nitraria 619
 Noaea 336
 Noccaea 495
 Nonea 832
 Notholaena 12
 Nuphar 391
 Nymphaea 390
 Nymphoides 802
O
 Oberna 378
 Odontites 910
 Oenanthe 733
 Oenothera 682
 Ofaiston 343
 Omalotheca 980
 Omphalodes 817
 Onobrychis 600
 Ononis 568
 Onopordum 1028
 Onosma 840
 Ophioglossum 31
 Ophrys 273
 Oplismenus 162
 Opuntia 347
 Orchis 267
 Oreopteris 15
 Origanum 878
 Ornanthella 908
 Ornithogalum 224
 Orobanche 921
 Orobus 607
 Orthilia 768
 Osmorhiza 696
 Osmunda 6
 Ostericum 744
 Ostrya 281
 Otites 380
 Oxalis 612
 Oxybaphus 349
 Oxyria 303
 Oxytropis 592
P
 Pachyphragma 496
 Padellus 554
 Padus 555
 Paederotella 902

Paeonia 394
Palimbia 750
Paliurus 646
Pancreatum 234
Pandera 323
Panicum 163
Papaver 426
Paracarium 820
Paracolpodium 119
Parapholis 130
Parentucella 907
Parietaria 296
Paris 243
Parnassia 520
Paronichia 355
Paspalum 167
Pastinaca 756
Paulovnia 917
Pedicularis 913
Peganum 615
Pennisetum 170
Pentaphylloides 538
Pentatherum 99
Periploca 806
Persicaria 304
Petasites 1005
Petrocoma 386
Petrorhagia 376
Petrosimonia 345
Peucedanum 751
Phacelia 813
Phalacrachena 1042
Phalacroloma 970
Phalaris 134
Phalaroides 133
Phegopteris 16
Phelipanche 920
Philadelphus 519
Phleum 136
Phlomis 858
Phlomoides 859
Pholiurus 129
Phragmites 149
Phyllitis 19
Phyllostachys 60
Physalis 889
Physocaulis 692
Physochlaina 887
Physospermum 707
Phytolacca 348

Picea 35
Picnomon 1025
Picris 1054
Pimpinella 725
Pinguicula 922
Pinus 36
Piptatherum 142
Pistacia 624
Pisum 608
Plantago 925
Platanthera 263
Platycladus 37
Pleconax 381
Pleiolblastus 59
Poa 114
Podospermum 1049
Poinsettia 634
Polemonium 812
Polycnemonum 313
Polygala 627
Polygonatum 240
Polygonum 308
Polypodium 13
Polypogon 101
Polystichum 25
Poncirus 622
Populus 276
Portulaca 352
Potamogeton 43
Potentilla 539
Poterium 549
Prangos 712
Prenanthes 1061
Primula 776
Proboscidea 918
Prometheum 514
Prospero 226
Prunella 856
Prunus 551
Psammophilliella 371
Psathyrostachys 73
Psephellus 1037
Pseudobetckea 941
Pseudocampanula 959
Pseudomuscari 231
Pseudosasa 58
Pseudosophora 560
Pseudovesicaria 481
Psillioistachys 789
Psilurus 113

Psoralea 580
Psyllium 926
Ptarmica 995
Pteridium 9
Pteris 7
Pterocarya 278
Pterocephalus 945
Pterotheca 1074
Puccinellia 122
Pulicaria 984
Pulmonaria 833
Pulsatilla 411
Punica 679
Puschkinia 227
Pycneus 194
Pyracantha 531
Pyrethrum 1002
Pyrola 766
Pyrus 527
Q
Quercus 287
Queria 367
R
Ranunculus 413
Raphanus 445
Rapistrum 435
Reaumuria 664
Reichardia 1060
Reseda 508
Reynoutria 312
Rhagadiolus 1058
Rhamnus 648
Rhaponticoides 1040
Rhinanthus 912
Rhizomatopteris 23
Rhodococcum 773
Rhododendron 772
Rhus 626
Rhynchocorys 915
Rhynchospora 197
Ribes 521
Rindera 821
Robinia 583
Rochelia 843
Roemeria 427
Rorippa 475
Rosa 550
Rostraria 90
Rosularia 516
Rubia 933

Rubus 534
 Rumex 302
 Ruppia 45
 Ruscus 239
S
 Sagina 368
 Sagittaria 52
 Salicornia 333
 Salix 277
 Salsola 337
 Salvia 869
 Salvinia 30
 Sambucus 934
 Sameraria 443
 Samolus 779
 Sanguisorba 548
 Sanicula 689
 Saponaria 373
 Satureja 872
 Saussurea 1020
 Saxifraga 517
 Scabiosa 948
 Scandix 695
 Scariola 1063
 Schedonorus 103
 Schoenoplectus 186
 Schoenus 196
 Scilla 225
 Scirpoides 187
 Scirpus 182
 Scleranthus 369
 Sclerochloa 123
 Scleropoa 110
 Scolymus 1046
 Scopolia 886
 Scorzonera 1048
 Scrophularia 897
 Scutellaria 849
 Secale 70
 Securigera 596
 Sedum 515
 Selaginella 4
 Sempervivum 512
 Senecio 1008
 Serapias 272
 Serratula 1030
 Seseli 731
 Sesleria 131
 Setaria 169
 Sherardia 927
 Sibbaldia 540
 Sideritis 851
 Sieglingia 148
 Sigesbeckia 990
 Silaum 736
 Silene 379
 Silybum 1027
 Sinapis 431
 Sison 718
 Sisymbrium 484
 Sium 728
 Smilax 244
 Smyrnium 706
 Sobolewsia 440
 Solanum 890
 Solenanthus 819
 Solidago 963
 Sonchus 1059
 Sophora 561
 Sorbus 529
 Sorghum 176
 Sosnovskya 1039
 Sparganium 41
 Spartium 563
 Spergula 353
 Spergularia 354
 Sperihedium 455
 Sphaerophysa 585
 Sphenopus 112
 Spiraea 523
 Spiranthes 260
 Spirodela 202
 Sredinskya 777
 Stachys 868
 Staphylea 642
 Stellaria 363
 Stelleropsis 675
 Stemmacantha 1031
 Steptorhamphus 1064
 Sterigmostemum 456
 Steris 382
 Sternbergia 235
 Steveniella 270
 Stipa 141
 Stratiotes 55
 Strigosella 457
 Suaeda 334
 Succisa 946
 Succisella 947
 Swertia 800
 Swida 765
 Symphiandra 955
 Symphyoloma 757
 Symphytum 825
 Syrenia 462
T
 Taeniatherum 76
 Tamamschjanella 710
 Tamarix 665
 Tamus 246
 Tanacetum 1001
 Taraxacum 1069
 Taxus 33
 Telekia 986
 Teline 564
 Telmatophace 204
 Tephrosieris 1009
 Tetradielis 616
 Teucrium 848
 Thalictrum 396
 Thelypteris 14
 Thesium 299
 Thladiantha 949
 Thlaspi 492
 Thymelaea 673
 Thymus 879
 Tilia 650
 Tithymalus 635
 Tordylium 761
 Torilis 698
 Trachomitum 804
 Trachynia 62
 Trachystemon 827
 Tragopogon 1050
 Tragus 161
 Trapa 684
 Traunsteinera 269
 Tribulus 618
 Trichophorum 184
 Trifolium 576
 Triglochin 50
 Trigonella 570
 Trigonocaryum 831
 Trigonotis 835
 Trinia 714
 Tripleurospermum 1000
 Tripolium 964
 Trisetaria 89
 Trisetum 88
 Triticum 68

Trollius 399
Trommsdorffia 1052
Tulipa 221
Turgenia 701
Turritis 470
Tussilago 1004
Typha 40
U
Ulmus 288
Urtica 295
Utricularia 923
V
Vaccaria 372
Vaccinium 774
Valeriana 939
Valerianella 940
Vallisneria 57
Vavilovia 609
Velarum 485
Velezia 377
Ventenata 84
Verathrum 210
Verbascum 892
Verbena 844
Veronica 903
Viburnum 935
Vicia 603
Vinca 803
Vincetoxicum 807
Viola 670
Viscum 298
Visnaga 719
Vitex 846
Vitis 649
Vulpia 108
W
Wolffia 205
Woodsia 27
Woronowia 542
X
Xanthium 989
Xanthobrychis 599
Xanthogalum 742
Xanthoselinum 753
Xanthoxalis 613
Xeranthemum 1015
Z
Zannichellia 46
Zingeria 121
Zizania 145

Ziziphora 870
Zosima 760
Zostera 42
Zygophyllum 617

**Алфавитный
указатель родов**

А
Абрикос 557
Авенелла 93
Авран 899
Агазилис 745
Агалома 633
Адамово дерево 917
Адиантум 8
Адокса 938
Азалия 771
Азинеума 958
Аир 200
Аира 94
Айва 526
Айлант 623
Акалифа 632
Акантолимон 785
Акантофака 589
Акачмена 461
Аконогонон 306
Аксирис 318
Алиссоидес 464
Алтей 656
Альбовия 726
Альдрованда 510
Альтения 47
Амбербоа 1034
Амброзия 988
Амория 574
Аморфа 581
Амфорикарпус 1016
Анабазис 341
Анакамптис 268
Андррахна 629
Андржеевския 491
Анемонаструм 408
Анетилла 410
Анкафия 1029
Антонина 873
Аптеригия 497
Арафэ 738
Аргиролобиум 562
Аргузия 814

Аронник 201
Артраксон 180
Арундо 150
Арцеутобиум 297
Асперуга 824
Астра 965
Астрагал 591
Астраканта 590
Астранция 690
Асфodelина 215
Б
Багряник 558
Баранец 1
Барбарис 420
Барвинок 803
Баркгаузия 1073
Бассия 326
Башмачок 252
Бедренец 725
Безвременник 213
Бекманния 135
Белена 888
Беллардия 911
Беллевалия 228
Белозор 520
Белокопытник 1005
Белокудренник 866
Беломятлик 106
Белоус 143
Белоусник 109
Белоцветник 236
Берёза 283
Бересклет 641
Берула 729
Беруниелла 815
Бескильница 122
Бессмертник 977
Бешеный огурец 951
Бинерция 335
Бирючина 791
Бисторта 305
Бифора 705
Блисмус 189
Блитум 317
Блошник 1046
Блошница 984
Блэкстония 794
Бодяк 1024
Болиголов 708
Болотник 637

Болотница 190
 Болотноцветник 802
 Бомбицилена 975
 Бонгардия 422
 Бор 96
 Борец 400
 Борискеллера 154
 Бородавник 1068
 Бородач 178
 Бородачевник 179
 Борщевик 758
 Боярышник 533
 Брахиария 165
 Бровник 261
 Бруннера 829
 Брусника 773
 Буглоссoid 838
 Будра 853
 Бузина 934
 Бузульник 1011
 Бук 285
 Буквица 867
 Булавоножка 112
 Буниум 722
 Бурачок 468
 Бусенник 181
 Бутень 693
 Бухарник 95
 Бушия 416
 Бюфония 361
В
 Вавиловия 609
 Вайда 442
 Валериана 939
 Валерианица 940
 Валлиснерия 57
 Василёк 1041
 Василистник 396
 Ваточник 805
 Вахта 801
 Вейник 97
 Велеция 377
 Велярум 485
 Венечник 216
 Вентената 84
 Вербейник 780
 Вербена 844
 Верблюдка 327
 Верблюжья колючка 601
 Вероника 903
 Веснянка 473
 Ветреница 407
 Ветреничка 409
 Вздутосемянник 707
 Вздутостебельник 692
 Взморник 42
 Виноград 649
 Виснага 719
 Вишня 553
 Водокрас 54
 Водосбор 395
 Водяника 639
 Водяной лютик 414
 Волдырник 388
 Волжанка 524
 Воловик 828
 Володушка 713
 Волчник 672
 Вольфия 205
 Воробейник 837
 Воронеж 397
 Вороний глаз 243
 Вороновия 542
 Ворсянка 943
 Восковник 841
 Вострец 72
 Вудсия 27
 Вульпия 108
 Вьюнок 809
 Вяжечка 470
 Вязель 595
Г
 Габлиция 314
 Гаделия 956
 Галимионе 320
 Галинсога 993
 Галотамнус 338
 Гардиолус 1057
 Гариделла 405
 Гармала 615
 Гаудинопсис 85
 Гвоздика 374
 Гедипноис 1056
 Гелиотроп 816
 Гельминтотека 1055
 Герань 610
 Гетеропапус 967
 Гибискус 651
 Гимнокарпиум 24
 Гипекоум 423
 Гипсолюбка 370
 Гиршфельдия 434
 Гладыш 763
 Гледичия 559
 Гнездовка 258
 Головчатка 944
 Голохвостник 113
 Гольдбахия 439
 Горделимус 75
 Горечавка 795
 Горечавочка 797
 Горечавочник 796
 Горлицевик 419
 Горичник 751
 Горлюха 1054
 Горох 608
 Горошек 603
 Горчак 1032
 Горчица 431
 Горькуша 1020
 Горянка 421
 Граб 280
 Гравилат 541
 Гранат 679
 Гребенщик 665
 Гребневик 125
 Гренландия 44
 Гречиха 307
 Гречишка 305
 Гречишка 308
 Гречка 167
 Гривохвост 863
 Гринделия 962
 Гроздовник 32
 Гроссгеймия 1035
 Груша 527
 Грушанка 766
 Грыжник 356
 Гудайера 259
 Гуйния 839
 Гулявник 484
 Гусиный лук 218
Д
 Дазипирум 69
 Дантония 147
 Датиска 671
 Двойчатка 504
 Двуклесточник 133
 Дулепестник 683
 Двурядка 437

Двусемянка 499
Двучешуйник 130
Двучленник 674
Девясил 983
Дельфиниум 401
Дендробрихис 598
Дербенник 678
Дербянка 28
Дереза 884
Держи-дерево 646
Дескурайния 486
Джорениопсис 755
Джужгун 311
Дивала 369
Диоскорея 245
Дифазиаструм 3
Дифелипея 919
Диходон 359
Дихостилис 192
Дихроцефала 972
Диэдропеталя 402
Додарция 898
Долихориза 1010
Донник 572
Дорикниум 578
Дороникум 1007
Дрёма 387
Дремлик 254
Дриада 543
Дримохлоя 105
Дрок 565
Дряква 784
Дуб 287
Дубровник 848
Дудник 741
Дурман 891
Дурнишник 989
Душевка 876
Душевник 874
Душистый колосок 87
Душица 878
Дымянка 429
Дягиль 743
Е
Ежа 124
Ежевика 534
Ежеголовник 41
Ежовница 132
Ель 35
Ж

Жабник 976
Жабрица 731
Жасмин 792
Жгун-корень 737
Железница 851
Желтушник 460
Жерардия 927
Жеруха 476
Жерушник 475
Жескоколосница 123
Жесткомятлик 110
Живокость 403
Живучка 847
Жимолость 937
Жириянка 922
Житняк 65
Жостер 648
Журавельник 611
З
Занникелия 46
Заразиха 921
Звёздчатка 363
Зверобой 661
Зеленчук 862
Земляника 535
Зиббальдия 540
Зиглингя 148
Зизифора 870
Зимфиандра 955
Змеёвка 153
Змееголовник 854
Золотая розга 963
Золотобородник 177
Золотогоричник 753
Золототысячник 793
Зопник 858
Зосима 760
Зубровка 86
Зубчатка 910
Зубянка 480
Зюзник 880
И
Иберийка 500
Ива 277
Иван-чай 681
Иглица 239
Игловик 132
Изолепис 188
Икотник 465
Ильм 288

Императа 173
Индау 433
Инжир 292
Ирга 530
Иридодиктиум 249
Ирис 250
Испанский дрок 563
Иссоп 877
Истод 627
Иудино дерево 558
К
Календула 1013
Калепина 449
Каликокорус 1071
Калина 935
Каллипельтис 931
Каллисефалнос 1033
Калужница 398
Камнеломка 517
Камфоросма 324
Камыш 182
Камышовник 187
Канаречник 134
Канатник 652
Кандык 223
Каперсы 506
Капуста 430
Карагана 587
Кардария 503
Каркас 289
Карпезиум 985
Касатик 250
Каспия 339
Катаброзочка 116
Катран 446
Каулиния 49
Каштан 286
Кверия 367
Кемуляриелла 966
Кендырь 804
Кервель 695
Кермек 787
Кермековидка 788
Кизил 764
Кизильник 525
Киксия 894
Кинза 703
Кипрей 680
Кирказон 301
Кислица 612

Кисличник 303
 Китайбелія 659
 Кладохета 982
 Клаузія 459
 Клевер 576
 Клекачка 642
 Клён 643
 Клеома 507
 Климакоптера 340
 Клоповник 502
 Клубнекамыш 185
 Ключочешуйница 90
 Кникус 1043
 Кобрезія 198
 Ковыль 141
 Козелец 1048
 Козлец 161
 Козлобородник 1050
 Козлятник 582
 Кокорыш 734
 Кокушник 264
 Колокольчик 953
 Колосняк 71
 Кольподиум 120
 Кольраушія 375
 Колючеяплодник 952
 Колючещетинник 171
 Колючник 1017
 Комастома 798
 Коммелина 206
 Комперія 265
 Конопля 294
 Конрингія 436
 Конский фенхель 711
 Копеечник 597
 Копытень 300
 Кориандр 703
 Коровяк 892
 Коронопус 505
 Короставник 942
 Коротконожка 61
 Косогорник 1061
 Костенец 17
 Костенец 364
 Костёр 78
 Кострец 79
 Костяника 534
 Котовник 852
 Кочедыжник 21
 Кошачья лапка 981
 Краекучник 11
 Крапива 295
 Красавка 885
 Красоднев 217
 Крашенинниковія 321
 Крепкоплодник 438
 Кресс 502
 Крестовник 1008
 Крестовница 928
 Кривоцвет 830
 Криптограмма 10
 Кровохлёбка 548
 Круглосемянник 717
 Крупина 1045
 Крупка 472
 Круциата 932
 Крушина 647
 Крыжовник 522
 Крылотычиночник 501
 Ксаноксалис 613
 Ксантобрихис 599
 Ксантогалум 742
 Кубышка 391
 Кувшинка 390
 Кузинія 1019
 Куколь 389
 Кукушник 383
 Кульбаба 1053
 Кумарчик 328
 Купальница 399
 Купена 240
 Купырь 694
 Курильский чай 538
 Куриное просо 164
 Куропаточья трава 543
 Курчавка 310
 Кутандія 111
Л
 Лабазник 544
 Лавр 660
 Лавровишня 556
 Ладанник 667
 Ладьян 275
 Лазурник 754
 Лаконос 348
 Ламира 1026
 Ландыш 242
 Лапина 278
 Лапчатка 539
 Ластовень 807
 Латук 1062
 Лафангиум 978
 Лебеда 319
 Левкой 454
 Легузія 957
 Леерсія 144
 Лён 614
 Ленец 299
 Лентоостник 76
 Леопольдія 229
 Лепидотека 999
 Лептопус 628
 Лещина 282
 Лжепузырник 481
 Лигустикум 740
 Лилия 219
 Лимодорум 256
 Линдернія 901
 Линнея 936
 Липа 650
 Липпія 845
 Липучка 822
 Лисохвост 137
 Листовник 19
 Листоколосник 60
 Литвиновія 451
 Ллойдія 222
 Лобулярія 467
 Ложноколокольчик 959
 Ломатогониум 799
 Ломкоколосник 73
 Ломкоостник 142
 Ломонос 412
 Лопух 1018
 Лосняк 253
 Лотос 393
 Лох 677
 Луговик 92
 Лужница 900
 Лук 232
 Лунник 453
 Лысосемянник 1042
 Льянка 895
 Любка 263
 Люпинастер 573
 Лютик 413
 Люцерна 571
 Лядвенец 579
 Ляллеманція 855
М

Майкараган 588
 Майник 241
 Мак 426
 Маклюра 291
 Макроселинум 752
 Макросирингион 909
 Макросциadium 739
 Малабайла 759
 Малина 534
 Мальвальтея 658
 Мальвочка 653
 Манденовия 762
 Манжетка 545
 Манник 138
 Маргаритка 973
 Марена 933
 Марсилия 29
 Марь 316
 Марьянник 905
 Маточник 744
 Мать-и-мачеха 1004
 Махалебка 554
 Мачок 425
 Медуница 833
 Мелилотоидес 569
 Мелисса 871
 Мелколепестник 969
 Мелколепестничек 971
 Мелкочешуйник 175
 Мерендера 212
 Мерингия 360
 Метельник 563
 Метлица 98
 Меч-трава 195
 Мзымтелла 954
 Микропус 974
 Миндаль 552
 Минуарция 366
 Мирабилис 350
 Мирикария 666
 Миррис 697
 Мискантус 174
 Мицелис 1065
 Млечник 782
 Многобородник 101
 Многокоренник 202
 Многоножка 13
 Многорядник 25
 Многосемянник 490
 Можжевельник 38
 Молиния 146
 Молодило 512
 Молокан 1062
 Молочай 635
 Моллюцелла 865
 Монохория 207
 Мордовник 1014
 Морковник 736
 Морковница 699
 Морковь 702
 Морозник 406
 Морская горчица 447
 Мортук 66
 Мурбекиелла 479
 Мутовчатка 351
 Мушмула 532
 Мшанка 368
 Мыльнянка 373
 Мытник 913
 Мышехвостник 418
 Мышиный гиацинт 230
 Мюленбергия 159
 Мюльбергелла 960
 Мягковолосник 365
 Мята 881
 Мятлик 114
Н
 Наголоватка 1021
 Наголоваточка 1022
 Надбородник 274
 Наперстянка 904
 Нардосмия 1006
 Нартециум 211
 Наумбургия 781
 Наяда 48
 Невзрачница 546
 Невротропис 493
 Негундо 644
 Недотрога 645
 Незабудка 834
 Незабудочник 823
 Нектароскордум 233
 Неравноцветник 80
 Неслия 450
 Нивяник 997
 Низкозонтичник 724
 Никандра 883
 Новочётчик 487
 Ножкосемянник 1049
 Ноккея 495
 Ноня 832
 Норичник 897
 Нотолена 12
 Ночная фиалка 458
 Ноэя 336
 Нут 602
О
 Обвойник 806
 Оберна 378
 Облепиха 676
 Овёс 81
 Овсец 82
 Овсяница 107
 Огуречная трава 826
 Одноцветка 767
 Одуванчик 1069
 Ожика 209
 Окопник 825
 Оксифафус 349
 Ольха 284
 Омалотека 980
 Омежник 733
 Омёла 298
 Оносма 840
 Опунция 347
 Опушённотычиночник 827
 Ореоптерис 15
 Орех 279
 Орляк 9
 Орнантелла 908
 Ортилия 768
 Ослинник 682
 Осмориза 696
 Осмунда 6
 Осока 199
 Осот 1059
 Остролодочник 592
 Остянка 162
 Отитес 380
 Офайстон 343
 Офрис 273
 Очанка 906
 Очеретник 197
 Очиток 515
 Очиточник 513
 Очный цвет 783
П
 Павлония 917
 Падуб 640

Пажитник 570
 Пазник 1051
 Палимбия 750
 Пальчатокоренник 266
 Пампасная трава 151
 Пандерия 323
 Панкраций 234
 Паракариум 820
 Паракольподиум 119
 Парентучелла 907
 Парнолистник 617
 Паслён 890
 Пастернак 756
 Пастушья сумка 489
 Пахучеколосник 87
 Пахучка 875
 Педеротелля 902
 Пепельник 1009
 Первоцвет 776
 Переступень 950
 Перистошестинник 170
 Перловник 139
 Персикария 304
 Песчанка 357
 Петров крест 916
 Петрокома 386
 Петрорагия 376
 Петросимония 345
 Петрушечник 718
 Пижма 1001
 Пикномон 1025
 Пикульник 860
 Пион 394
 Пираканта 531
 Пихта 34
 Плаун 2
 Плаунок 4
 Плевел 104
 Плейобластус 59
 Плеконакс 381
 Плёнчатомятлик 117
 Плоскоцветочник 37
 Плоскоплодник 466
 Плющ 687
 Повилика 811
 Повой 810
 Повойничек 662
 Погремок 912
 Подковник 594
 Подлесник 689
 Подмаренник 930
 Подорожник 925
 Подорожничкоцветник 789
 Подснежник 237
 Подсолнечник 991
 Подъельник 769
 Полевица 100
 Полевичка 155
 Полёвка 441
 Пололепестник 262
 Полынь 1003
 Понцирус 622
 Поповник 1002
 Порезник 732
 Портулак 352
 Поручейник 728
 Поручейница 118
 Посконник 961
 Постенница 296
 Поташник 330
 Прангос 712
 Прибрежница 152
 Приноготовник 355
 Прицепник 700
 Пробосцидея 918
 Прозанник 1052
 Пролеска 225
 Пролесник 631
 Проломник 778
 Прометеум 514
 Просвирник 655
 Просо 163
 Просперо 226
 Прутняк 325
 Прутняк 846
 Псаммофилиелла 371
 Псевдобеткея 941
 Псевдомускари 231
 Псевдосаза 58
 Псевдософора 560
 Псефеллюс 1037
 Псиллиум 926
 Псоралея 580
 Птерис 7
 Птеротека 1074
 Птероцефалус 945
 Птицемлечник 224
 Пуансетия 634
 Пузатик 102
 Пузыреплодник 452
 Пузырник 22
 Пузырник 586
 Пузырница 887
 Пузырчатка 923
 Пупавка 994
 Пупочник 817
 Пупырник 698
 Пустынница 358
 Пустынномятлик 115
 Пустыноколосник 857
 Пустырник 864
 Пухонос 184
 Пушистоспайник 747
 Пушица 183
 Пушкиния 227
 Пшеница 68
 Пыльцеголовник 255
 Пырей 64
 Пырейник 63
 Пятистенник 99
Р
 Рагадиолус 1058
 Райграс 83
 Ракитник 566
 Ракитничек 567
 Рапонтиковидка 1040
 Расторопша 1027
 Рдест 43
 Реамюрия 664
 Редька 445
 Резак 720
 Резеда 508
 Резуха 469
 Резушка 471
 Рейнутрия 312
 Рейхардия 1060
 Ремерия 427
 Ремнелепестник 271
 Репейничек 547
 Репник 435
 Ризоматоптерис 23
 Риндера 821
 Робиния 583
 Рогачка 432
 Роговник 77
 Рогоглавник 417
 Рогоз 40
 Роголистник 392
 Рогоплодник 322

- Рододендрон 772
 Рожь 70
 Розеточница 516
 Ромашка 998
 Ромашник 1000
 Росичка 168
 Росянка 509
 Рохелия 843
 Рупшия 45
 Рыжик 488
 Рябина 529
 Рябчик 220
 Ряска 203
С
 Сабельник 536
 Сальвиния 30
 Самерария 443
 Самшит 638
 Сарсазан 331
 Сассапариль 244
 Сафлор 1044
 Сведа 334
 Свекла 315
 Свербига 448
 Сверция 800
 Свицина 765
 Свиной 158
 Свободносемянник 709
 Северница 779
 Секироплодник 596
 Селезёночник 518
 Селитрянка 619
 Сельдерей 716
 Серапиас 272
 Сердечник 478
 Серпник 730
 Серпуха 1030
 Сеслерия 131
 Сивец 946
 Сигезбекия 990
 Синеголовник 691
 Синюха 812
 Синяк 842
 Сирения 462
 Ситник 208
 Ситничек 193
 Ситовник 194
 Скабиоза 948
 Скариола 1063
 Скерда 1072
 Скополия 886
 Скребница 18
 Скрученник 260
 Скрытница 160
 Скумпия 625
 Слива 551
 Смирния 706
 Смолёвка 379
 Смолка 382
 Смородина 521
 Сныть 727
 Соболевская 440
 Солерос 333
 Солнцецвет 668
 Солодка 593
 Солонечник 968
 Солянка 337
 Солянококосник 332
 Соляноцветник 342
 Сон 411
 Сорго 176
 Соровник 329
 Сосна 36
 Сосновский 1039
 Софора 561
 Сочевичник 607
 Спайноцветник 344
 Спаржа 238
 Сперихедиум 455
 Спирея 523
 Срединский 777
 Сростноплодник 757
 Стальник 568
 Стевениелла 270
 Стеллеропсис 675
 Стеммаканта 1031
 Степторамфус 1064
 Стеригма 456
 Страусник 20
 Стрелолист 52
 Стригозелла 457
 Сукцизелла 947
 Сумах 626
 Сурепка 474
 Сусак 53
 Сухоцвет 1015
 Сушеница 979
 Сферофиза 585
 Схенус 196
 Сыть 191
Т
 Таволга 523
 Тайник 257
 Тамамшаночка 710
 Тамус 246
 Татарник 1028
 Телекия 986
 Телина 564
 Телиптерис 14
 Телорез 55
 Тельматофака 204
 Терескен 321
 Тетрадиклис 616
 Тимелея 673
 Тимофеевка 136
 Тис 33
 Титималюс 635
 Гладианта 949
 Тмин 721
 Толокнянка 770
 Толстостенка 496
 Тонколучник 970
 Тонконог 91
 Тополь 276
 Тордилиум 761
 Торица 353
 Торичник 354
 Трагус 161
 Траунштейнера 269
 Трахиния 62
 Трёхгранноплодник 831
 Трёхзубка 148
 Триголотис 835
 Триния 714
 Триостенник 50
 Триполиум 964
 Трищетиный 88
 Трищетиница 89
 Троммдорфия 1052
 Тростник 149
 Трубноцвет 819
 Трясунка 126
 Трясунковидка 127
 Тургеневия 701
 Тысячеголов 372
 Тысячелистник 996
 Тюльпан 221
У
 Углостебельник 786
 Ужовник 31

Уруть 685

Ф

Фаллопия 309
Фацелия 813
Фегоптерис 16
Фелипанхе 920
Фенхель 735
Ферула 748
Ферульник 749
Фиалка 670
Фибигия 463
Физалис 889
Фисташка 624
Фломоидес 859
Франкения 663
Фрорепия 715
Фумана 669
Фюрнрория 704

Х

Хамезице 636
Харезия 385
Хартолерис 1036
Хатьма 654
Хвостник 686
Хвощ 5
Хеноринум 896
Хиастофиллум 511
Химсидия 746
Хлорис 157
Хмелеграб 281
Хмель 293
Хоботник 915
Хондрилла 1070
Хориспора 482
Хохлатка 428
Хрен 477
Хризаспис 575
Хрозофора 630
Хруплявник 313
Хурма 775

Ц

Цельнолистник 620
Цефалоринхус 1066
Циклахена 987
Цикорий 1047
Цимбалярия 893
Цимбохазма 914
Цинанхум 808

Цингерия 121

Цинна 128

Цицания 145

Цицербита 1067

Ч

Чабер 872
Частуха 51
Чебрец 879
Чемерица 210
Череда 992
Черёмуха 555
Череш 214
Черника 774
Черноголовка 856
Черноголовник 549
Чернокорень 818
Чернушка 404
Чертополох 1023
Чесночница 483
Чечевица 605
Чешуехвостник 129
Чий 140
Чилим 684
Чина 606
Чистец 868
Чистотел 424
Чистяк 415
Чихотник 995
Чубушник 519

Ш

Шалфей 869
Шандра 850
Шаровница 924
Шафран 247
Шедонорус 103
Шелковица 290
Шеноплектус 186
Шерстяк 166
Шиповник 550
Шлемник 849
Шпажник 251
Штернбергия 235
Шток-роза 657

Щ

Щавель 302
Щетинник 169
Щирица 346
Щитница 444
Щитовник 26

Щитолистник 688

Э

Эвномия 498
Эгилопс 67
Эгонихон 836
Элеостикта 723
Элеузина 156
Элизанта 384
Элодея 56
Эльсгольция 882
Эрвилия 604
Эремоспартон 584
Эрехтитес 1012
Эриантус 172
Эспарцет 600
Этеопалпус 1038
Эфедра 39

Ю

Юнона 248

Я

Яблоня 528
Язвенник 577
Якорцы 618
Ярутка 492
Яруточка 494
Ясенец 621
Ясень 790
Ясколка 362
Ясменник 929
Яснотка 861
Ястребинка 1075
Ятрышник 267
Ячменеволоснец 75
Ячмень 74

Содержание

Предисловие.....	3
Условные обозначения.....	4
Conspectus florum Caucasi Rossicae.....	11
Литература.....	276
Index familiarum.....	286
Алфавитный указатель семейств.....	288
Index generum.....	291
Алфавитный указатель родов.....	298

Научное издание

Александр Львович
ИВАНОВ

**Conspectus florae Caucasi Rossicae
(Plantae Vasculares)**

**Конспект флоры Российского Кавказа
(сосудистые растения)**



Издаётся в авторской редакции

Подписано в печать
16.09.2019.

Формат 60x84 1/16
Бумага офсетная

Усл. печ. л. 19,82

Уч.-изд. л. 19,02
Тираж 300 экз.

Отпечатано с предоставленных заказчиком форм
в Издательско-полиграфическом комплексе
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
355029, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 2