



КОММИСІИ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЙ

ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЪ СВ. ВЛАДИМІРА

ДЛЯ ОПИСАНІЯ

ГУБЕРНІЙ

КІЕВСКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА

КІЕВСКОЙ, ВОЛЫНСКОЙ, ПОДОЛЬСКОЙ, ПОЛТАВСКОЙ И ЧЕРНІГОВСКОЙ.



КІЕВЪ.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ.

1851.

С Т А Т Ъ И.

О т д ъ л е н и е п е р в о е . С Т А Т И С Т И К А .

Планъ Статистического описанія губерній Кіевскаго Учебнаго Округа: Кіевской, Волынской, Подольской, Полтавской и Черниговской, составленный Д. Ч. Д. Журавскимъ.

О т д ъ л е н и е в т о р о е . Е С Т Е С Т В Е Н Н А Я И С Т О Р И Я .

О растительно – географическихъ Округахъ Европейской Россіи, статья Д. Ч. Р. Траутфеттера.

О юрскихъ и мѣловыхъ осадкахъ Кіевской губерніи, статья Д. Ч. К. Феофилактова.

О кристаллическихъ породахъ губерній: Кіевской, Волынской и Подольской, статья Д. Ч. К. Феофилактова.

Животныя млекопитающія губерній Кіевскаго Учебнаго Округа, статья Д. Ч. К. Кесслера.

Птицы воробынныя губерній Кіевскаго Учебнаго Округа, статья Д. Ч. К. Кесслера.

Птицы хищныя и куриныя губерній Кіевскаго Учебнаго Округа, статья Д. Ч. К. Кесслера.

ПТИЦЫ ХИЩНЫЕ И КУРИНЫЕ.

ГУБЕРНИЙ

КІЕВСЬКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА.

Статья

Д. Ч. К. Кесслера.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы, по отпечатаніи, представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Кіевъ, 3 Іюля 1851 года.

Цензоръ Д. Мацкевич.

РАЗРЯДЪ ПТИЦЪ ХИЩНЫХЪ.

А. ДНЕВНЫЯ ХИЩНЫЯ ПТИЦЫ.

РОДЪ I. СИПЪ. *VULTUR* L.

Видъ 1. *Cipz спрыт.* *Vultur cinereus* L.

Vultur cinereus. Кесслеръ, Руководство. 142.—Симашко, Русская Фауна. 6. Таб. 1. фиг. 3.—Naumann, Vögel Deutschlands. I. 155. Taf. 1—Temminck, Manuel. I. 4. III. 2.—Nordmann, Faune pontique. 79.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 37.

Vultur arrianus. Tysenhauz, Ornithologia. I. 9.

Vultur persicus? Pallas, Zoographia. I. 377.

Сипъ сѣрый, грифъ сѣрый.

Sep kasztanowaty Tys., Sep popielaty Zaw.

Сѣрый Сипъ обитаетъ въ гористыхъ стравахъ Европы, Азіи и Африки. По словамъ Эверсмана онъ водится во множествѣ на Южномъ Уралѣ, по свидѣтельству Нордманна и Завадзкаго встречается въ Бессарабіи и Галиціи. Изъ этихъ послѣднихъ мѣстъ, онъ залетаетъ иногда случайно въ Подольскую губернію.

Видъ 2. *Cipz бѣлоголовый.* *Vultur fulvus* L.

Vultur fulvus Двигубскій, Опытъ. 5.—Кесслеръ, Руководство. 143.—Симашко, Русская Фауна. 5. Таб. 1. фиг. 1.—Naumann, Vögel Deutschlands. I, 162. XIII. 3. Taf. 2. und 338.—Temminck, Manuel. I. 5. III. 3.—Tysenhauz, Ornithologia. I. 9.—Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 14.—Czernay,

ibidem. 1850. I. 604. Fauna Харьк. губерпіи. 35. — Nordmann, Faune romptique. 75. — Zawadzki. Galiz. Fauna. 37.

Vultur perenopterus. Pallas, Zoographia. I. 375.—

Сипъ белоголовый, грифъ бурый или белоголовый, орелъ белоголовый.

Sep plowy Tys., Sep okrutny Zaw.

Белоголовый Сипъ обитаетъ во всѣхъ странахъ, опоясывающихъ средиземное и черное моря, и кромѣ того водится въ южной Африкѣ, въ Персіи и на южномъ Уралѣ. Профессоръ Нордманъ, который встрѣчалъ его часто цѣлыми стадами въ степяхъ Бессарабіи, полагаетъ, что онъ прилетаетъ туда съ Карпатскихъ горъ, но это вѣроятно не совсѣмъ справедливо. Я имѣлъ случай убѣдиться въ томъ, что онъ лѣтаетъ гнѣзда на обоихъ берегахъ Днѣстра, съ одной стороны въ Бессарабіи, а съ другой стороны въ Подольской губерніи. Высокіе, утесистые берега Днѣстра доставляютъ ему пристанища, почти совершенно неприступныя, гдѣ онъ выводить молодыхъ и откуда вылетаетъ на добычу въ степные мѣста Бессарабіи и Подолія. — Очень вѣроятно, что белоголовый Сипъ посѣщаетъ случайно и другія ваши губерніи, но такъ какъ его смѣшиваютъ обыкновенно съ оранами и большими орлами, то трудно получить на этотъ счетъ точныя свѣдѣнія. Достовѣрно известно только то, что онъ иногда попадается въ Волынской губерніи.

Въ селѣ Попенкахъ, Балтскаго уѣзда Подольской губерніи, мнѣ было подробнѣ разсказано, какъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ одномъ глубокомъ ущельи, находящемся не подалеку оттуда на правомъ берегу Днѣстра, въ одинъ день было убито 18 штукъ белоголовыхъ Сиповъ, по большей части молодыхъ, не бывшихъ еще въ состояніи подняться на воздухъ. Изъ этого надоѣло заключить, что птицы эти живутъ, въ мѣстахъ для нихъ благопріятныхъ, цѣлыми колоніями, какъ это впрочемъ уже замѣчено и въ Венгріи, при берегахъ Дуная. Кромѣ того меня у说服али въ Попенкахъ, что Сипы не ограничиваются для пищи одною падалью, а похищаютъ также живыхъ ягнятъ, зайцевъ и различныхъ другихъ животныхъ.

РОДЪ II. ОРЛАНЪ. HALIAËTUS SAV.

Видъ 3. Орланъ-бллохвостъ. *Haliaëtus albicilla* Briss.

Haliaëtus albicilla. Кесслеръ, Руководство. 145. — Самашко, Русская Fauna. 18. Таб. 3 — Czernay, Bull. de Moscou. 1850. I. 604. Fauna Харьк. губерніи. 27.

Aquila albicilla. Pallas, Zoographia. I. 345. Двигубскій, Опытъ. 20. — Eichwald,
Naturh. Skizze. 236. Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 14.
Aquila ossifraga. Pallas, Zoographia. I. 348. — Двигубскій, Опытъ 20. — Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 14.
Falco albicilla. Naumann, Vögel Deutschlands. I. 224. Taf. 12. — 14. XIII. 67. — Temminck, Manuel. I. 49. III, 26. — Tysenhauz Ornithologia. I. 50. — Nordmann, Faune pontique. 98. — Zawadzki, Galiz. Fauna. 41.
Бѣлохвостъ или бѣлохвостикъ, сѣроватень, черный орелъ (молодой).
Orzel Bielik Tys., Orzeł Biały Zaw.

Орланъ — бѣлохвостъ водится во всѣхъ сѣверныхъ и умѣренныхъ странахъ стараго свѣта и встрѣчается также во всѣхъ нашихъ губерніяхъ, какъ лѣтомъ, такъ и зимою. Наи чаще онъ попадается у насъ въ мѣстахъ степныхъ, куда его привлекаютъ вѣроятно многочисленные маленькие грызуны. Въ Іюль мѣсяцѣ 1849 года мнѣ случилось видѣть, въ Балтскомъ уѣздѣ Подольской губерніи, сразу трехъ бѣлохвостовъ, которые парили надъ Днѣстромъ въ близкомъ разстояніи одинъ отъ другаго.

Бѣлохвостъ очень силенъ и кровожаденъ, но менѣе смѣлъ и проворенъ, нежели настоящіе орлы. Онъ имѣетъ полетъ медленный, тяжелый, и держится обыкновенно низко надъ землею; но случается также, что онъ, подобно другимъ хищнымъ птицамъ, взвивается на огромную высоту и крутится тамъ по цѣльямъ часами. Онъ питается не только маленькими животными млекопитающими (зайцами, сусликами, хомяками, ягнятами) и птицами (дрохвами, куропатками, гусями, утками), но также рыбой, доставая ее изъ воды на подобіе Скопы. Кроме того охотно ёстъ и падаль.

Бѣлохвостъ вьетъ гнѣздо, то на вершинѣ высокихъ, старыхъ деревьевъ (какъ напримѣръ въ окрестностяхъ Кіева), то на мало приступныхъ скалахъ. Оно состоитъ изъ сухихъ хворостинокъ, бываетъ очень плоско и имѣетъ въ поперечникѣ болѣе 5 футовъ. Молодыхъ находится въ гнѣздахъ обыкновенно два или три. 31 Мая нынѣшняго года мнѣ былъ доставленъ молодой бѣлохвостъ, убитый въ самомъ гнѣздахъ, которому, судя по его величинѣ, могло быть около шести недѣль. Изъ этого на добно заключить, что бѣлохвостъ несетъ яица уже въ Мартѣ мѣсяцѣ.

Примѣчаніе. Нынѣшнею весною мнѣ случилось имѣть въ рукахъ убитаго въ окрестностяхъ Кіева бѣлохвоста, который былъ замѣченъ по необыкновенно малой своей величинѣ. Онъ имѣлъ именно въ ширину, при расправленныхъ крыльяхъ,

не болѣе 7 футовъ, а въ длину, отъ основанія клюва до конца хвоста, 2 фута и 9 дюймовъ. То былъ самецъ и, судя по одеждѣ, уже очень старый. (*)

РОДЪ III. ОРЕЛЪ. *Aquila* BRISS.

Видъ 4. *Орелъ-холзанъ.* *Aquila chrysaëtus* L.

Aquila chrysaëtus. Pallas. Zoographia. I. 341. — Двигубскій, Опытъ. 18. — Двигубскій, Опытъ. 18. — Кесслеръ, Руководство. 146.

Falco chrysaëtus. Naumann. Vögel Deutschlands. XIII. 8. Taf. 339.

Не знаю, находится ли холзанъ гдѣ либо въ нашихъ губерніяхъ на постоянномъ пребываніи, или залетаетъ къ намъ только случайно, во время зимнихъ своихъ странствованій. Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1850 года миѣ была прислана очень хорошо сохранившаяся шкура холзана, убитаго въ Полтавской губерніи, Константино-градскимъ уѣзднымъ врачемъ И. Е. Карповичемъ. Холзанъ этотъ находится теперь въ Зоологическомъ Кабинетѣ Университета Св. Владимира, составляя одно изъ лучшихъ его украшеній. Къ нему совершенно приходится описание птицы средняго возраста, составленное Науманомъ (Vol. XIII. р. 14 — 16).

Видъ 5. *Орелъ-беркутъ.* *Aquila nobilis* Pall.

Aquila nobilis. Pallas, Zoographia. I. 338. — Двигубскій, Опытъ. 18. — Кесслеръ, Руководство. 147. —

(*) Почти всѣ большиe орлы имѣютъ обширное географическое распространеніе, но по большей части бываютъ вездѣ рѣдки и встречаются лишь по однажды. Кроме того они вьютъ гнѣзда обыкновенно въ мѣстахъ мало доступныхъ, далеко удаленныхъ отъ городовъ и сель, и бываютъ очень дики и осторожны, такъ что рѣдко достаются въ добычу охотникамъ. По всѣмъ этимъ причинамъ естественная исторія ихъ оставалась долго мало известна и до сихъ поръ еще представляетъ множество пробѣловъ. До сихъ поръ еще не знаютъ даже различить точнымъ образомъ между собою тѣ виды большихъ орловъ, которые водятся въ Европѣ, и принимаютъ то два, то три таковыхъ. Я рѣшился слѣдовать въ этомъ случаѣ Науману, какъ наблюдателю едва ли не самому точному, тѣмъ болѣе, что мои собственныя наблюденія хотя и очень не многочисленныя, совершенно соглашаются съ его выводами. Я полагаю именно, что находится три вида большихъ Европейскихъ орловъ, которые всѣ три водятся также въ Россіи и тутъ давно уже, болѣе или менѣе точнымъ образомъ, были различаемы подъ мѣстными названіями холзана, беркута и могильника.

Aquila fulva L.—Eichwald, Naturh. Skizze. 236.—Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 14.

Aquila chrysaëtus. Симашко, Русская Фауна. 49. Таб. 6. фиг. 1.

Falco fulvus. Naumann, Vögel Deutschlands. I. 208. XIII. 28. Taf. 8. 6.—Temminck. Manuel. I. 38. III. 19.—Tysenhausz, Ornithologia (ex parte). 46.—Nordmann, Faune pontique. 100.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 41.

Орелъ беркутъ.

Orzeł przedni Rzacz., Orzeł zwyczajny Zaw.

Беркутъ встречается изредка во всѣхъ нашихъ губерніяхъ, но не известно, вѣтъ ли онъ гдѣ либо въ нихъ гнѣздо. Очень красивый беркутъ средняго возраста, доставленный изъ Черниговской губерніи, сохраняется въ Зоологическомъ кабинетѣ Университета Св. Владимира.

Видъ 6. Орелъ-могильникъ. *Aquila imperialis Bechst.*

Aquila imperialis. Кесслеръ, Руководство. 147.—Czernay, Bull. de Moscou. 1850. I. 604. Fauna Харьк. губерніи. 35.

Falco imperialis. Naumann, Vögel Deutschlands. I. 201. XIII. 21. Taf. 6, 7, 340.—Temminck, Manuel. I. 36. III. 18 (ex parte).—Tysenhausz, Ornithologia. I. 45.—Nordmann, Faune pontique. 101.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 41.—Orzeł Cesarski Tys., Orzeł Król Zaw.

Могильникъ встречается у насъ гораздо чаще, нежели холланъ и беркутъ, особенно въ южной полосѣ губерній Киевской и Подольской. Палласъ не упоминаетъ о немъ въ своей Зоографіи; но очень вѣроятно, что онъ смѣшивалъ его съ холланомъ. Это тѣмъ правдоподобнѣе, что Палласъ, разсказывая о холланѣ, говоритъ именно, что онъ бываетъ часто меньше беркута, а могильникъ дѣйствительно замѣтно уступаетъ въ величинѣ этому послѣднему.

Могильникъ живетъ лѣтомъ предпочтительно въ лѣсахъ, гдѣ онъ вѣтъ гнѣзда на самыхъ высокихъ деревьяхъ, особенно на старыхъ дубахъ. Часто однако онъ вылетаетъ также въ степи и къ концу лѣта, по видимому, даже совсѣмъ туда выселается, привлекаемый вѣроятно многочисленными маленькими грызунами, составляющими главную его пищу. По степямъ онъ летаетъ обыкновенно не высоко и часто садится для отдыха на землю. Гдѣ находятся курганы или старыя могилы,

тамъ кершины ихъ служатъ любимымъ его пристанищемъ и отъ того безъ сомнія произошло самое его название. (*)

Въ Маѣ мѣсяцѣ 1844 года миѣ былъ подаренъ годовалый живой могильникъ, который находился у меня до осени 1845 года. Когда я его получилъ, на немъ была еще первая одежда, которую онъ въ теченіи лѣта перемѣнилъ на вторую, а эту послѣднюю въ слѣдующій годъ на третью. При этомъ я имѣлъ случай убѣдиться въ томъ, что всѣ эти одежды описаны Науманомъ съ большою точностью. — Кормилъ я своего могильника обыкновенно сырьимъ мясомъ, по кромѣ того давалъ ему иногда птицъ, живыхъ или мертвыхъ, крысъ и другихъ маленькихъ животныхъ, которыхъ онъ схватывалъ всегда съ большою жадностью. Однажды я пустилъ къ нему въ клѣтку живаго ежа; онъ тотчасъ напалъ на него съ горячностью и долго съ нимъ возился, но не могъ однако ничего ему сдѣлать.

Видъ 7. Орелъ-крикунъ. *Aquila naevia Briss.*

Aquila naevia. Кесслеръ, Руководство 148.—Симашко, Русская Фауна (темно-бурое отличие). 55. Таб. 7 А. Фиг. 3.—Eichwald, Naturh. Skizze. 236.—Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 14.—Czernay, ibidem. 1850. I. 604.

Falco naevius. Naumann. Vögel Deutschlands. I. 217. XIII. 50. Taf. 10, 11.—Temminck, Manuel. I. 42. III. 23.—Tysenhaus, Ornithologia. I. 48.—Nordmann, Faune pontique. 101.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 42.

Орелъ малый, крикунъ, могильникъ.

Orzeł krzykliwy, Orzeł plamisty Tys.

Орелъ-крикунъ водится, по видимому, во всѣхъ почти странахъ Европы, а кромѣ того въ прилежащихъ къ ней частяхъ Азіи и въ сѣверной Африкѣ. Онъ встречается во всѣхъ нашихъ губерніяхъ и притомъ какъ въ мѣстахъ лѣсистыхъ, такъ и степныхъ, но вообще однако довольно рѣдокъ. Не знаю также, остается ли онъ у насъ зимовать, или нетъ.

Крикунъ по образу жизни занимаетъ какъ бы средину между большими орлами и сарычами. Онъ летаетъ довольно легко и плавно и подымается нерѣдко на очень

(*) По словамъ Профессора Нордмана по той же причинѣ въ некоторыхъ мѣстахъ называютъ могильникомъ также и орла-крикунца.

значительную высоту. Для отдыха онъ садится то на какой нибуль обнаженный ствъ, то на возвышенный земляной бугоръ и просиживаетъ иногда въ одномъ мѣстѣ по цѣлымъ часамъ, при чмъ однако озирается внимательно во всѣ стороны, чтобы высмотрѣть какую нибуль добычу. Для отысканія добычи онъ часто посѣщаетъ также берега рѣкъ и озеръ. Главную пищу его составляютъ маленькия млекопитающія, какъ то кроты, мыши, полевки, суслики, но въ случаѣ нужды онъ довольствуется также лягушками и крупными насѣкомыми.

Въ окрестностяхъ Кіева крикунъ вьетъ гнѣздо всегда въ большихъ лѣсахъ и именно на самыхъ высокихъ деревьяхъ; но, по свидѣтельству Профессора Нордманна, въ мѣстахъ степныхъ онъ гнѣздится также и непосредственно на землѣ.

Примѣчаніе. Науманъ убѣжденъ въ томъ, что карачутъ или черный орелъ Палласа (*Aquila clanga*), составляетъ видъ самостоятельный, различающійся отъ орла-крикуна какъ болѣе темнымъ цвѣтомъ, такъ и замѣтно большими размѣрами. На этомъ основаніи карачутъ помѣщенъ также какъ отдѣльный видъ въ моемъ Руководствѣ. Не многие сюда относящіеся орлы, которыхъ мнѣ въ Кіевѣ случалось имѣть въ рукахъ, принадлежали несомнѣнно къ виду *Aquila naevia*, и по этому не могу сказать, водится ли въ нашихъ губерніяхъ карачутъ, или нѣтъ.

Видъ 8. Орелъ-карликъ. *Aquila pennata L.*

Aquila pennata. Симашко, Русская Фауна. 58. Таб. 7. Фиг. 3. — Двигубскій, Опытъ. 19. — Czernay, Bull. de Moscou. 1850. I. 604. Фауна Харьк. губерніи. 33. —

Falco pennatus. Naumann, Vögel Deutschlands. XIII. 58. Taf. 343. — Temminck, Manuel. I. 44. III. 23. — Tysenhauz, Ornithologia. I. 49. — Nordmann, Faune pontique. 102. — Zawadzki, Galiz. Fauna 42.

Орель мохногий. Двиг.

Orzeł włochaty Tys., Orzeł mały Zaw.

Орель-карликъ водится предпочтительно въ Африкѣ, но на лѣто залетаетъ также въ юговосточныя страны Европы, какъ то: въ Венгрію, въ Грецію и въ южную Россію. Мнѣ случалось однажды лѣтомъ, а именно во второй половинѣ Іюля 1849 года, встрѣтить семью орловъ-карликовъ въ дубовомъ лѣсу, находящемся въ немногихъ верстахъ отъ города Балты. Изъ нихъ мнѣ удалось варочемъ добыть только одного, который и сохраняется въ Зоологическомъ кабинетѣ Университета

Св. Владимира. Онъ совершенно походитъ па молодаго самца, изображенаго Науманомъ на таблици 343, съ тѣмъ различиемъ, что исподъ у него замѣтно темнѣе, нежели на рисункѣ Наумана. Описаніе Наумана (Vol. XIII. p. 61) также вполнѣ къ нему приходится, только хвостъ у него относительно длиннѣе, нежели какимъ его показываетъ Науманъ, и выставляется немногого изъ подъ сложенныхъ крыльевъ.

Сколько я могъ замѣтить, орель - карликъ по образу жизни очень походитъ на осоѣда (*Pernis apivorus*), за котораго я его первоначально было и принялъ.

Приимчаніе. Такъ какъ орель этотъ пропущенъ въ моемъ Руководствѣ, то помѣщаю здѣсь краткую его характеристику:

Челюстная щель простирается до средины глаза; плюсна имѣетъ въ вышину темнаго болѣе $2\frac{1}{2}''$; на оконечномъ суставѣ каждого пальца находится 3 поперечныхъ щитака. Крылья почти достаютъ до конца усѣченаго хвоста; этотъ посыпѣнъ сверху темнобураго цвѣту, а снизу блѣдносѣраго съ темными поперечными полосками и пятнами, и снабженъ па концѣ довольно широкою, бѣловатою каймою. На каждомъ плечѣ находится рѣзко обграниченнное, бѣлое пятно.

Господствующій цвѣтъ на верхнихъ частяхъ бурый, въ различныхъ оттенкахъ; исподъ у молодыхъ краснобурый, у старыхъ бѣловатый, съ темными наствольными полосками.

Клювъ черный, восковица и пальцы желтые, радужина желтоватобурая.

Имѣеть въ длину около 20". —

РОДЪ IV. САРЫЧЪ. BUTEO BECHST.

Видъ 9. Сарычъ - конюхъ. *Buteo lagopus* Brün.

Buteo lagopus. Кесслеръ, Руководство. 149. — Симашко, Русская, Фауна. 68.

Таб. 8. Фиг. 1. 2. — Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 15. — Сегнай, ibidem. 1850. I. 604. Харьк. губернія. 34.

Falco lagopus. Двигубскій, Опытъ 14. Naumann, Vögel Deutschlands. I. 359. XIII. 141. Taf. 34. — Temminck, Manuel. I. 65. III. 37. — Tysenhaus,

Ornitologia. I. 58. — Nordmann, Faune pontique. 103. — Eichwald, Naturh. Skizze. 58. — Zawadzki, Galiz. Fauna. 42. —

Accipiter lagopus. Pallas, Zoographia. I. 360.

Сарычъ, конюхъ Двигубскій, коюхъ, въ Арханхельскѣ ястребъ.

Kobuz wlochaty Jarocki.

Сарычъ-конюхъ водится какъ въ старомъ, такъ и въ новомъ свѣтѣ. Въ ~~дѣт-~~ нее время онъ держится предпочтительно въ самыхъ холодныхъ странахъ Европы, Азіи и Америки, а на зиму подвигается далѣе къ югу и встрѣчается тогда не только въ южной полосѣ Европы, но также во всей почти Африкѣ. Въ нашихъ губерніяхъ онъ бываетъ обыкновенно только на пролетѣ, а именно въ Мартѣ и въ Ноябрѣ мѣсяцахъ.

Рѣдко онъ показывается у насъ совершенно по одиночкѣ, а по большей части маленькими обществами или стадами. Полетъ его плавный, но медленный. Онъ садится всегда на самую верхушку дерева и имѣеть свойство такъ приводнѣвать перья, что является гораздо большимъ, нежели каковъ онъ въ самой сущности. Главную пищу его составляютъ маленькие грызуны, какъ то мыши и полевки.

Видъ 10. Сарычъ-Сарнь. *Buteo vulgaris Bechst.*

Buteo vulgaris. Кесслеръ, Руковѣдство. 150. — Симашко, Русская Фауна. 60.

Таб. 8. фиг. 3. 5. — Czernay, Bull. de Moscou. 1850. I. 604. —

Buteo communis. Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 15.

Falco buteo L. Naumann, Vögel Deutschlands. I. 346. XIII. 137. Taf. 32, 33. —

Temminck, Manuel. I. 63. III. 35. — Двигубскій, Опытъ. 14. — Tysenhaus,

Ornitologia. I. 58. — Nordman, Faune pontique. 105. — Eichwald, Naturh.

Skizze. 236. — Zawadzki, Galiz. Fauna. 42. —

Accipiter buteo. Pallas, Zoographia. I. 362.

Сарычъ или Сарнь.

Kobuz wyszowow Jandzill.

Сарнь водится во всей почти Европѣ, въ западной Сибири, Грузіи, Малой Азіи и сѣверной Африкѣ. Онъ находится также во всѣхъ нашихъ губерніяхъ, но ~~иногда~~ не бываетъ въ большомъ числѣ и кромѣ того не остается по видимому у насъ зиждовать, а подвигается на зиму далѣе къ югу. По крайней мѣрѣ мы никогда не

случалось встречать его зимою въ окрестностяхъ Кіева, а онъ показывается тутъ не раньше, какъ въ Мартѣ мѣсяцѣ.

Сарнь живетъ въ лѣсахъ и рощахъ, смежныхъ съ полями и лугами. Онъ летаетъ обыкновенно низко и медленно и вообще какъ то вяль и неловокъ во всѣхъ своихъ движеніяхъ, при чемъ садится часто для отдыха на земляной бугоръ или на верхушку небольшаго дерева. По широкимъ крыльямъ и по толстому, включому тѣлу довольно легко бываетъ уже издали отличить его отъ другихъ хищныхъ птицъ. Главную пищу его составляютъ мыши, полевки, кроты, лягушки, яшерицы, змѣи и различныя крупныя насѣкомыя. Птицъ, за исключеніемъ развѣ очень молодыхъ, онъ при медленности своей не въ состояніи бываетъ поймать.

Сарнь вьетъ гнѣздо на высокихъ соснахъ или дубахъ, но не каждый годъ дѣлаетъ новое гнѣздо, а часто возвращается къ старому и только нѣсколько подправляетъ его. Оно состоитъ изъ сухихъ прутиковъ и выстилается внутри различными мягкими веществами. Самка несетъ обыкновенно 3 или 4 яйца блѣдно-зеленоватаго цвету, съ бурыми пятнышками, и высиживаетъ ихъ въ три недѣли. Молодыя остаются въ гнѣздѣ очень долго. Такъ напримѣръ въ первыхъ числахъ Іюля 1849 года мнѣ случилось найти гнѣздо сарня съ тремя молодыми, которые могли уже породочно порхать, по тѣмъ не менѣе упорно оставались въ гнѣздѣ и позволили себѣ взять въ немъ руками.

РОДЪ V. ОСОВЪДЪ. PERNIS CUV.

Видъ 2. Осово́дъ Европейскій. *Pernis apivorus* L.

Pernis apivorus. Кесслеръ, Руководство. 151. — Симашко, Русская Фауна. 70. Таб. 9. Фиг. 1. 2. — Czernay, Bull. de Moscou. 1850. I. 604. Fauna Харьк. губерніи. 33. —

Falco apivorus. Naumann, Vögel Deutschlands. I. 367. XIII. 144. Taf. 35. 36. — Temminck, Manuel. I. 67. III. 38. — Двигубскій Опытъ. 15. — Tysenhaus, Ornithologia. I. 57. — Nordmann, Faune pontique. 105. — Eichwald, Naturh. Skizze. 236. — Zawadzki, Galiz. Fauna. 43.

Accipiter lacertarius. Pallas Zoographia. I. 359.

Мышеловъ или мышеловка, пчеловѣдъ, осоѣдъ.

Kobuz Trzmielojad Gorski.

Осоѣдъ водится во всей Европѣ, за исключениемъ самой сѣверной ея полосы, въ югозападной Сибири и въ иѣкоторыхъ другихъ частяхъ Азіи. Въ Европейской Россіи онъ доходитъ до 60° сѣверной широты именно еще и попадается въ окрестностяхъ С. Петербурга. Въ нашихъ губерніяхъ онъ не составляетъ лѣтомъ большой рѣдкости, но нигдѣ однако не бываетъ многочисленъ, а разсѣянъ тамъ и сямъ по одиначкѣ. Наичаще мнѣ случалось его встрѣчать въ южной части Кіевской губерніи. На счетъ времени его прилета и отлета не имѣю никакихъ положительныхъ данныхъ.

Осоѣдъ избираетъ своимъ пристанищемъ по преимуществу пебольшіе лѣса и рощи, окруженные полями. Онъ летаетъ тяжело и медленно и держится обыкновенно низко надъ землею; только въ ясные дни взвивается иногда высоко на воздухъ. Кромѣ того онъ трусливѣе всѣхъ другихъ хищныхъ птицъ и очень лѣнивъ, такъ что просиживаетъ иногда неподвижно по цѣлымъ часамъ на одномъ мѣстѣ. По землѣ онъ ходитъ впрочемъ лучше другихъ хищныхъ птицъ. Пишу его составляютъ различные насѣкомыя и гусеницы, а также мыши, полевки, кроты, лягушки, ящерицы, лица маленькихъ птицъ и такъ далѣе. Очень искусно онъ умѣеть отыскивать гнѣзда осъ и пчелей и поѣдаетъ какъ самыхъ насѣкомыхъ такъ особенно ихъ личинокъ и куколокъ.

Осоѣдъ вьетъ гнѣздо всегда на высокихъ деревьяхъ. Самка несетъ обыкновенно два или три яйца, которые на желтоватомъ грунтѣ усыпаны краснобурыми пятнышками и точками.

РОДЪ VI. КРАЧУНЪ. CIRCAËTUS VIEILL.

Видъ 12. Крачунъ голубоногій. *Circaëtus gallicus* Gm.

Circaëtus gallicus. Кесслеръ, Руководство. 152. — Симашко, Русская Фауна, 75.

Таб. 9. фиг. 3.

Aquila brachydactyla Meyer. Двигубскій Опытъ 21.

Falco brachydactylus. Naumann, Vögel Deutschlands. I. 236. XIII. 84. Taf. 15. — Temminck, Manuel. I. 46. III. 24. — Tysenhaus, Ornithologia. 53. — Eichwald, Naturh. Skizze. 236. —

Falco leucopsis Bechst. Nordmann, Faune pontique. 95. Zawadzki, Galiz. Fauna. 40. Крачунъ, орелъ злой Двиг.

Крачунъ, сколько до сихъ поръ известно, водится въ немногихъ только странахъ Европы, а именно въ Германии, Франціи, Италіи, Галиціи и въ южныхъ и западныхъ частяхъ Россіи. По свидѣтельству Прѣфессора Нордмана онъ встрѣчается очень часто въ Бессарабіи, а по показаніямъ Прѣфессора Эйхвальда и Графа Тизенгауза также въ Литвѣ. Въ нашихъ губерніяхъ онъ, по видимому, очень рѣдокъ и мнѣ попадался именно только въ Подольской губерніи при берегахъ Днѣстра.

Принимаютъ обыкновенно, что крачунъ питается исключительно земноводными и преимущественно змѣями, по Графъ Тизенгаузъ утверждаетъ, что онъ ловить также тетеревей и куропатокъ.

РОДЪ VII. СКОПА. PANDION SAV.

Видъ 13 Скопа степная. *Pandion haliaetus* L.

Pandion haliaetus. Кесслеръ, Руководство. 153. — Симашко, Русская Fauna. 80.

Табл. 9. Фиг. 4. и Таб. 8. А. Фиг. 4. — Czernay, Bull. de Moscou. 1850. I. 604. —

Aquila haliaetus. Двигубскій, Опытъ. 21. — Eichwald, Naturh. Skizze. 236.

Falco haliaetus. Naumann, Vögel Deutschlands. I. 241. XIII. 88. Taf. 16. — Temminck, Manuel. I. 47. III. 25. — Tysenhauz, Ornithologia. I. 52. — Nordmann, Faune pontique. 97. — Zawadzki. Galiz. Fauna. 40.

Accipiter haliaetus. Pallas, Zoographia. I. 355. —

Скопа, скоба.

Orzeł Rybitw Tys., Oszeł Ryboż ar Zaw.

Скопа водится во всѣхъ почти странахъ, какъ старого, такъ и нового свѣта. Въ нашихъ губерніяхъ она встрѣчается повсюду, но никогда не находится въ большомъ числѣ и никогда не остается тутъ зимовать. Въ окрестностяхъ Кіева она показывается обыкновенно подъ конецъ Марта или въ началѣ Апрѣля и исчезаетъ въ Сентябрѣ.

Скопа поселяется то въ большихъ лѣсахъ, то на мало приступныхъ склонахъ, но всегда въ недальномъ разстояніи отъ воды. Полетъ ея плавный и легкій, но вирочемъ довольно медленный. Она держится обыкновенно на значительной высотѣ и крутится часто очень долго на одномъ мѣстѣ, то надъ рѣкою, то надъ озеромъ или прудомъ, чтобы высмотрѣть въ водѣ себѣ добычу. Вмѣстѣ съ тѣмъ однако она чрезвычайно осторожна, такъ что рѣдко удается убить ее изъ ружья.

Скопа питается исключительно рыбой, для схватывания которой ноги ея приспособлены превосходнымъ образомъ. Когда она видитъ въ водѣ рыбу, то останавливается на полетѣ, быстро размахивая крыльями, и потомъ бросается стремглавъ внизъ, чтобы окунуться въ воду за своею добычею. Не каждый разъ впрочемъ удается ей схватить рыбу, а часто та успѣваетъ спастись, несмотря на всю быстроту ея удара. Иногда даже скопа сама дѣлается жертвою своей завзятости, а именно въ томъ случаѣ, когда она вѣпится въ такую большую рыбу, которой не можетъ поднять (она поднимаетъ рыбъ до 6 фунтовъ вѣсомъ) и вмѣстѣ съ тѣмъ не сумѣеть опять скоро высвободить изъ нея своихъ когтей. Не разъ уже бывали ловлены рыбаками старые карпы, въ которыхъ торчали еще полусгнившія лапы скопы.

Скопа вѣтъ гнѣздо или на высокихъ деревьяхъ, или на обрывистыхъ скалахъ. Самка несетъ 3 или 4 яйца бѣлаго цвѣту съ краснобурыми пятнышками, и высиживаетъ ихъ въ три недѣли.

РОДЪ VIII. СОКОЛЪ. *FALCO* L.

Видъ 14. *Соколъ-балабанъ.* *Falco lanarius* Pall.

Falco lanarius S. laniarius. Pallas, Zoographia. I. 330. — Двигубскій, Опытъ. 9. — Симашко, Русская Fauna. Таб. 11. Фиг. 5. — Naumann, Vögel Deutschlands. I. 279. XIII. 98. Taf. 23. — Temminck, Manuel. I. 20. III. 10. — Tysenhauz, Ornithologia. 32. — Wobazzil. Rhea. I. 39. (съ двумя прекрасными рисунками). — Nordmann, Faune pontique. 89 — Czernay, Bull. de Moscou. 1850. I. 605. — Zawadzki, Galiz. Fauna. 39.

Falco chanopus, Thienemann, Rhea. I. 62.

Falco sacer Gm. Кесслеръ, Руководство. 155.

Accipiter cyanopus. Rzaczynski, Hist. nat. 352. Auctuarium. 268. —

Sokoł Rarog Rzacz.

Соколъ благородный, балабанъ.

Балабанъ водится, сколько известно, въ юго-восточной Европѣ и въ юго-западной Сибири. Въ нашихъ губерніяхъ онъ встречается чаще сапсанъ, особенно въ мѣстахъ степныхъ. Такъ напримѣръ въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1849 года мы слушались очень часто его видѣть въ степяхъ южной Подоліи.

Балабанъ лежаетъ обыкновенношибко и низко и часто садится для отдыха на выдающуюся земляную глыбу или на хлѣбную копчу; но иногда онъ поднимается также высоко на воздухъ и паритъ тамъ плавно, не производя почти вовсе замѣтныхъ размаховъ крыльями и широко распустивъ закругленный свой хвостъ. Птицется онъ, по видимому, столько же маленькими степными грызунами, сколько птицами. Не всегда онъ бываетъ такъ остороженъ, какъ обыкновенно рассказываютъ, а валегаетъ иногда очень близко на охотника или подпускаетъ его къ себѣ на короткое разстояніе, когда занятъ раздираніемъ съваченпой имъ добычи.

Въ Зоологическомъ Кабинетѣ Университета Св. Владимира находятся два очень красивыхъ балабана, изъ которыхъ одинъ убитъ 23 Іюля 1849 года въ окрестностяхъ Балты, а другой 11 Сентября того же года по близости Кіева. У первого изъ нихъ, старого самца, сильно линяющаго, восковица и ноги свѣтлоголубыя, а у втораго, самки, вѣроятно еще старшѣй, восковица и ноги сѣроватожелтые.

Видъ 15. Соколъ - сапсанъ. *Falco peregrinus* Briss.

Falco peregrinus. Pallas, Zoographia I. 387. — Двигубскій, Опытъ. 9. — Кесслеръ, Руководство. 155 — Симашко, Русская Fauna. Таб. 10. Фиг. 3, 4. — Naumann, Vögel Deutschlands. I. 285. XII 106. Taf. 24. 25. — Temminck. Manuel. I. 22. III. 11. — Tysenhauz, Ornithologia. I. 33. — Nordmann, Faune pontique. 89. — Eichwald, Naturl. Skizze. 236. — Czernay, Bull. de Moscou 1850. I. 605. — Zawadzki, Galiz. Fauna. 39.

Falco communis. Andrzejowski. Bull de Moscou. 1839 I. 14.

Соколъ, сапсанъ, рябикъ, челигъ соколій (самка).

Sokoł węgrowski Jarocki. Sokol szlachetny Zaw.

Сапсанъ водится, по видимому, во всѣхъ странахъ и старого и нового свѣта, за исключеніемъ развѣ тропическихъ. Въ нашихъ губерніяхъ онъ встрѣчается, сколько миѣ известно, довольно рѣдко. Миѣ самому даже никогда не случалось его убивать.

Примѣчаніе. 1. Соколъ - кречетъ, *Falco candicans* Gm. миѣ никогда еще не попадался въ нашихъ губерніяхъ, хотя очень вѣроятно, что онъ иногда къ намъ застаетъ.

Примѣчаніе. 2. Для охоты за птицами пріучались въ прежнее время и нынѣ еще въ некоторыхъ мѣстахъ пріучаются всѣ болѣшіе соколы, и кречетъ, и бала-

банъ, и саисанъ. У насъ впрочемъ называются иногда ошибочно соколами ястребовъ-тетеревятниковъ (*Astur pomumbarius*), которыхъ также употребляютъ для этой цѣли.

Видъ 16. Соколъ-чеглокъ. *Falco subbuteo L.*

Falco subbuteo. Pallas. Zoographia. I. 332.—Двигубскій, Опытъ. 10.—Кесслеръ, Руководство. 156.—Симашко, Русская фауна. Таб. 11. фиг. 1. 2.—Naumann, Vögel Deutschlands. I. 296. XIII. 108. Taf. 26.—Temminck, Manuel. I. 25. III. 12.—Tysenhaus, Ornithologia. I. 38.—Nordmann, Faune pontique. 87.—Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 14.—Czernay, ibidem. 1850. I. 605.—Eichwald, Naturh. Skizze. 236.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 39.

Чеглокъ, въ Оренбургской губерніи бѣлогорликъ.

Sokoł kobuz Rrzaaz., Sokoł lesny Zaw.

Чеглокъ водится во всѣхъ почти умѣренныхъ и холодныхъ странахъ старого свѣта, но не доходитъ однако такъ далеко на сѣверъ, какъ дербникъ. Въ нашихъ губерніяхъ онъ находится, на лѣтнемъ пребываніи, въ довольно значительномъ числѣ, и во множествѣ бываетъ на пролетѣ, весеннемъ и осеннемъ. Въ окрестностяхъ Киева онъ показывается обыкновенно въ первой половинѣ Апрѣля и остается до исхода Сентября.

Какъ по тѣлосложенію, такъ и по обычаямъ чеглокъ очень походитъ на сапсана, хотя вдвое менѣе этого послѣдняго. Онъ летаетъ необыкновенношибко и схватываетъ добычу только на лету, а никогда не береть ея съ земли. По этому онъ самый страшный врагъ всѣхъ маленькихъ птичекъ и особенно жаворонковъ, которые неизбѣжно дѣлаются его жертвою, если ему удается падетъ на нихъ въ расплохъ, и которыхъ печалившое появление его приводитъ въ совершенный ужасъ. Даже быстролетныя ласточки часто не успѣваютъ избѣжать его когтей. Чеглокъ можетъ схватить птичку впрочемъ не иначе, какъ только ударя на нее сверху, а потому жаворонки и ласточки, зайдѣвъ его заблаговременно, спасаются отъ него тѣмъ, что взлетаютъ очень высоко на воздухъ и не даютъ ему подняться выше себя. Вообще чеглокъ летаетъ обыкновенно очень низко и взвивается исколькь выше на воздухъ только тогда, когда пускается въ погоню за высокотѣнною имъ птичкою. Кроме птичекъ онъ ловить иногда также крупныхъ летучихъ насѣкомыхъ, какъ

напримѣръ хрущѣй и подобныхъ имъ жуковъ. — Для отдыха онъ садится на выдающіяся земляные глыбы и кочки, на курганы и холмы, рѣже на верхушки сухихъ деревьевъ. Онъ держится по болѣшей части на мѣстахъ открытыхъ, на степяхъ и поляхъ, лугахъ и болотахъ; только для ночлега удаляется въ рощи и маленькие лѣса, тамъ же вьетъ и гнѣзда.

Гнѣзда чеглока находятся всегда на высокихъ деревьяхъ и состоятъ изъ сухихъ прутиковъ, обложенныхъ снутри волосами и другими мягкими веществами; часто основою ему служитъ старое гнѣзда воронье или сорочье. Самка несетъ 3 или 4 яйца, нечистаго бѣлаго цвѣту, съ бурыми и сѣрыми пятнышками и крапинками, и высиживаетъ ихъ въ три недѣли.

Чеглокъ, особепо если онъ былъ пойманъ молодымъ, довольно скоро ручается и можетъ быть пріучаемъ для охоты за птичками.

Видъ 17. Соколъ-дербникъ. *Falco aësalon Gm.*

Falco aësalon. Pallas, Zoographia. I. 336. — Двигубскій, Опытъ. 10. — Кесслеръ, Руководство. 157. — Симашко, Русская Fauna. Таб. 11. фиг. 3, 4. — Naumann, Vögel Deutschlands. I. 303. XIII. 109. Taf. 27. — Temminck, Manuel. I. 27. III. 13. — Tysenhausz, Ornithologia, I. 38. — Nordmann, Faune pontique. 87. — Czernay, Bull. de Moscou. 1850. I. 605. — Zawadzki, Galiz. Fauna. 38. —

Дербникъ, дербничокъ.

Sokoł Drzemlik Rzacz.

Дербникъ водится во всѣхъ умѣренныхъ и холодныхъ странахъ старого свѣта и также въ сѣверной Америкѣ. Онъ подвигается къ сѣверу гораздо далѣе, нежели чеглокъ, и вообще избираетъ для лѣтняго своего пребыванія по преимуществу страны холодныя, такъ что встрѣчается въ южной полосѣ Европы почти исключи-тельно только зимою, а въ умѣренной преимущественно на весеннемъ и осеннемъ пролетѣ. Въ нашихъ губерніяхъ, сколько мнѣ известно, онъ бываетъ только осенью и весною. Въ окрестностяхъ Киева онъ начинаетъ замѣтно показываться подъ конецъ Августа, и пролетъ его продолжается до половины Октября.

Дербникъ по наружности очень походитъ на чеглока, съ которыемъ его часто смѣшиваютъ; но опытный глазъ уже издали можетъ узнатъ его по стройности тѣло-

сложенія и по относительной короткости крыльевъ. Подобно чеглоку, онъ летаетъ обыкновенно низко и очень шибко и, подобно ему же, составляетъ бичъ для маленькихъ птицъ. Онъ хватаетъ ихъ всегда на лету и ударяетъ на нихъ съ такою быстротою, что на открытомъ мѣстѣ рѣдкая успѣваетъ спастись отъ него. Такъ какъ при появлѣніи его въ нашихъ мѣстахъ ласточекъ бываетъ уже мало, то главную добычу его составляютъ жаворонки, щеврицы, зяблики, воробы, овсянки. Въ случаѣ нужды онъ довольствуется впрочемъ также крупными насѣкомыми. — Но чуетъ всегда на деревьяхъ, въ садахъ, рощахъ и небольшихъ лѣсахъ.

Дербникъ, подобно чеглоку, бываетъ иногда пріучаемъ для охоты за маленькими птицами.

Видъ 18. Соколъ-кобецъ. *Falco vespertinus L.*

Falco vespertinus. Pallas, Zoographia. I. 334. — Двигубскій, Опытъ. 11. — Кесслеръ, Руководство. 157. — Czernay, Bull. de Moscou. 1850. I. 605.

Falco rufipes Beseke. Naumann, Vögel Deutschlands. I. 311. XIII. 112. Taf. 28 — Temminck, Manuel. I. 33. III. 17. — Tysenhauz, Ornithologia. I. 40. — Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 14. — Eichwald, Naturh. Skizze. 236. — Nordmann, Faune pontique. 82. — Zawadzki, Galiz. Fauna. 38. — Симашко, Русская Фауна. Таб. 12. Фиг. 1, 2. —

Кобецъ, кобчикъ.

Sokoł Kobuzek Tys, Sokoł czerwononog Zaw.

Кобецъ или кобчикъ водится въ южной Сибири и въ восточныхъ странахъ Европы, въ Россіи, Венгріи, Галиціи; только изрѣдка онъ залетаетъ далѣе на западъ. Въ несмѣтномъ множествѣ онъ обитаетъ лѣтомъ въ южной полосѣ Россіи и въ нашихъ губерніяхъ также встрѣчается чаще всѣхъ другихъ соколовъ и вообще, можно сказать, чаще всѣхъ другихъ хищныхъ птицъ. Въ окрестностяхъ Киева онъ появляется обыкновенно около половины Апрѣля и исчезаетъ около половины Сентября.

Кобецъ болѣе любитъ сообщество себѣ подобныхъ, нежели другіе соколы. Это проявляется особенно во время periodическихъ его путешествій, весеннихъ и осеннихъ. Часто тогда можно бывать видѣть стада кобцовъ, заключающія въ себѣ отъ 12 до 20 штукъ. Замѣчательно притомъ, что весною подобные стада состоять иногда почти исключительно изъ недѣлимыхъ мужскихъ, такъ, что когда

оны сидятъ скучившись па какомъ нибудь высокомъ деревѣ, то издали по цвету можно бываетъ принять ихъ за дикихъ голубей.

По образу жизни и особенно по полету кобецъ очень походитъ на пустельгу. Подобно этой послѣдней, онъ то съ легкостью подвигается впередъ и какъ бы плаваетъ по воздуху, то трепещется долго на одномъ мѣстѣ, чтобы высмотрѣть па землѣ какую нибудь добычу. Но онъ скорѣе, по видимому, утомляется, нежели пустельга, и потому чаще отдыхаетъ, садясь для этой цѣли то на кочку или земляной бугорокъ, то на хлѣбную копну, на стогъ сѣна или на сухое дерево. Въ продолженіи Августа и въ началѣ Сентября обширные поля и луга бываютъ иногда совершенно усѣяны этими красивыми соколиками, которые своими разпородными движениями доставляютъ наблюдателю самое занимательное зрѣлище. Особенно дѣятельными они являются вечеромъ, при наступленіи сумерекъ.

Кобецъ питается почти исключительно различными крупными насѣкомыми, какъ то жуками, кузнецами, стрекозами. Часто также я находилъ у него осенью въ желудкѣ гусеницъ ночныхъ бабочекъ. Изрѣдка только онъ ловитъ мышей, полевокъ, ящерицъ.

Кобецъ вьетъ гнѣздо почти всегда па деревьяхъ, то въ садахъ или маленькихъ рощахъ, то въ опушкахъ лѣсовъ, и наичаше именно близко отъ воды. Случается иногда, что нѣсколько гнѣздъ находятся въ одной и той же небольшой рощѣ, въ недальнемъ разстояніи одно отъ другаго. Случается также, что кобецъ не дѣлаетъ самъ гнѣзда, а отбиваетъ готовое уже гнѣздо у сороки. Самка весеть отъ 4 до 6 яицъ, которыя на желтоватомъ грунѣ густо обсѣяны краснобурыми пятнышками и крапинками. Въ окрестностяхъ Киева молодыя вылетаютъ въ гнѣзда обыкновенно подъ конецъ Іюня мясаца.

Видъ 91. Соколъ красный. *Falco cenchris* Naum.

Falco cenchris. Кесслеръ, Руководство. 158. — Симашко, Русская Фауна Таб. 12. фиг. 3. — Naumann, Vögel Deutschlands. I. 318. XIII. 116. Taf. 29. — Nordmann, Faune pontique. 80.

Falco tinnunculoides. Temminck, Manuel. I. 31. III. 15. — Tysenbauz, Ornithologia. I. 39.

Соколъ Пустынечка Туз.

Красный соколъ по цвету очень походитъ на пустельгу, по стройнѣю сложенію и привѣтио менѣе этой послѣдней. Онъ водится въ сѣверной Африкѣ, въ Малой Азіи и въ самыхъ южныхъ странахъ Европы, особенно въ Италии и Греціи, но встрѣчается также въ южной полосѣ Россіи, начиная отъ Бессарабіи до Оренбургскихъ степей. Цѣлую семью этихъ соколиковъ, въ Іюль мѣсяцѣ 1849 года, мне случилось найти на берегу Днѣстра, около села Выхватенцы (въ Балтскомъ уѣздѣ Подольской губерніи); но никакихъ другихъ данныхъ объ распространеніи ихъ по нашимъ губерніямъ не имѣю.

По образу жизни и по движеніямъ красный соколикъ представляетъ много сходства съ кобчикомъ и съ пустельгою. Онъ летаетъ очень быстро и бойко, но часто останавливается въ полетѣ и начинаетъ трепетаться на одномъ мѣстѣ, чтобы высмотреть на землю какаго нибудь жука или кузнецика, за которымъ бросается потомъ внизъ съ большою стремительностью. Для отдыха онъ садится на земляную глыбу или на край скалы. Вообще онъ предпочитаетъ, по видимому, места гористыя и скалистые плоскимъ равнинамъ. На счетъ его гнѣзда я не могъ получить никакихъ точныхъ свѣдѣній.

Видъ 20. Соколъ-пустельга. *Falco tinnunculus L.*

Falco tinnunculus. Pallas, Zoographia. I. 333. — Двигубскій, Опытъ. 11. — Кесслеръ, Руководство. 159. — Симашко, Русская Fauna. Таб. 12, фиг. 4, 5. — Naumann, Vögel Deutschlands. I. 325. XIII. 120. Taf. 30. Temminck, Manuel. I. 29. III, 19. — Tysenhaus, Ornithologia. I. 39. — Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 14. — Czernay. ibidem. 1850. I. 605. — Eichwald, Naturh. Skizze. 236. — Nordmann, Faune pontique. 81. — Zwadzki, Galiz. Fauna. 38.

Пустельга (*) кобчикъ.

Sokoł Pustułka Rzacz., Sokoł wiezzowy Zaw.

Пустельга водится не только во всей Европѣ, но также въ сѣверной Африкѣ и во многихъ частяхъ Азіи. Въ нашихъ губерніяхъ она, въ продолженіи лѣта, на-

(*) По свидѣтельству Профессора Эверсмана названіе пустельги въ Оренбургской губерніи даютъ тремъ видамъ: *F. tinnunculus*, *F. cenchris* и *F. vespertinus*, по той причинѣ, что все они не могутъ быть употребляемы для охоты.

ходится повсюду въ значительномъ числѣ, по сколько мѣй известно, не остается никогда зимовать, а подвигается на зимнее время далѣе на югъ. Въ окрестностяхъ Кієва она появляется обыкновенно въ концѣ Марта или въ началѣ Апрѣля и остается до первыхъ чиселъ Октября. Въ самомъ Кіевѣ первыя пустельги были замѣчены мною именно въ слѣдующіе дни:

1844 — 1845 — 1847 — 1848 — 1849 — 1850 — 1851.
19 Апрѣля, 30 Марта, 30 Марта, 27 Марта, 10 Апрѣля, 9 Апрѣля 28 Марта.

Пустельга держится предпочтительно въ мѣстахъ открытыхъ, на поляхъ, лугахъ и степяхъ; для ночлега она охотно избираетъ рощи и лѣсныя опушки, но днемъ по возможности избѣгаетъ лѣсовъ, особенно глубины ихъ. Часто напротивъ того она придерживается мѣсть жилыхъ и поселяется даже внутри сель и городовъ — Она летаетъ не такъ шибко, какъ благородные соколы, и потому не въ состояніи бываетъ схватить птички на лету, но тѣмъ не менѣе однако всѣ движенія ея легки и быстры. Замѣчательное свойство, общее ей съ кобчикомъ, заключается въ томъ, что она на лету останавливается часто на одномъ мѣстѣ и производить очень частые размахи крыльями, какъ бы трепещась на воздухѣ. Она дѣлаетъ это съ тою цѣлью, чтобы лучше высмотрѣть находящихся на землѣ маленькихъ животныхъ и насѣкомыхъ и вѣриѣ ихъ схватить. Пустельга вообще неутомима на полетѣ и гораздо рѣже садится отдыхать, па землю или на сухое дерево, нежели кобчикъ. Главную пищу ея составляютъ мыши, полевки, молодые суслики, различныя маленькия птички, особенно молодыя, далѣе ящерицы, лягушки, кузнечики, жуки и многія другія насѣкомыя.

Гнѣздо пустельги помѣщается часто на высокихъ и крутыхъ берегахъ рѣкъ, на обрывистыхъ стѣнахъ овраговъ, на мало доступныхъ скалахъ, а часто также на башняхъ, колокольняхъ и другихъ каменныхъ строеніяхъ; гораздо рѣже оно находится на деревьяхъ и въ этомъ случаѣ старое гнѣздо служить ему обыкновенно основою. Въ Кіевѣ между прочимъ одна или двѣ четы поселяются ежегодно на самомъ зданіи Университета, въ ближайшемъ сосѣдствѣ отъ колоніи галокъ. Гнѣздо очень беззискусственно и часто состоитъ изъ немногихъ только соломинокъ и волосковъ, служащихъ подстилкою для лицъ. Число лицъ простирается отъ 4 до 6; они блѣдоватаго или желтоватаго цвѣту и испещрены многочисленными бурыми пятнышками и точками. Насиживаніемъ ихъ, которое продолжается около трехъ недѣль, занимается одна только самка. Въ Кіевѣ молодыя оставляютъ гнѣздо обыкновенно въ исходѣ Іюня мѣсяца.

РОДЪ IX. ЯСТРЕБЪ. ASTUR CUV.

Видъ 21. Ястребъ-Тетеревятникъ. *Astur palumbarius* L.

Astur palumbarius. Кесслеръ, Руководство 160.—Симашко, Русская Fauna 100.
Tab. 13, фиг. 1, 2,—Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 15.—
Czernay, ibidem. 1850. I. 604.

Falco palumbarius. Двигубскій, опытъ. 12.—Naumann. Vögel Deutschlands. I. 249. XIII. 90. Taf. 17, 18.—Temminck, Manuel. I. 55. III. 27.—Tysen-hauz, Ornithologia. I. 69.—Eichwabl. Naturh. Skizze. 236.—Nordmann, Faune pontique. 90.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 39.

Accipiter astur. Pallas, Zoographia. I. 367.

Ястребъ, тетеревятникъ или тетерникъ, голубятникъ, рябакъ (молодой).
Sokoł Jastrzęb Rzacz. Jastrząb gołębiołow Zaw.

Ястребъ-тетеревятникъ водится во всей почти Европѣ и въ сѣверной половинѣ Азіи. Въ нашихъ губерніяхъ онъ встрѣчается почти по всюду, но нигдѣ не находится въ большомъ числѣ, а разсѣянъ болѣе по одиночкѣ. Онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ хищныхъ птицъ, которые не покидаютъ нашихъ мѣстъ и зимою, и можно сказать, что онъ у насъ зимою попадается даже чаще, нежели лѣтомъ.

Тетеревятникъ поселяется предпочтительнее въ такихъ мѣстахъ, гдѣ лѣса и рощи перемежаются съ полями и лугами; какъ обширныхъ голыхъ степей, такъ глубины дремучихъ лѣсовъ онъ по возможности избѣгаетъ. Не смотря на то, что крылья у него относительно короче, нежели у большей части другихъ хищныхъ птицъ, онъ лѣтаетъ очень шибко, но рѣдко поднимается высоко на воздухъ, а держится обыкновенно низко надъ землею. Онъ чрезвычайно смѣлъ и силенъ и главную добычу его составляютъ различные крупные птицы, какъ то: дикие и домашніе голуби, тетерева, куропатки, домашнія куры, стрепета, утки, вороны, галки. Въ случаѣ нужды онъ довольствуется также маленькими птичками или мелкими грызунами. Птицы онъ беретъ какъ съ земли, такъ и на воздухѣ, но въ послѣднемъ случаѣ улавляетъ ихъ не сверху, какъ то дѣлаютъ соколы, а снизу или съ боку. Всѣ птицы очень хорошо знаютъ этого лютѣшаго своего врага и появленіе его извѣдливъ на нихъ паническій страхъ. — Въ прежнія времена тетеревятникъ почти везде былъ употребляемъ для охоты, да иныше еще въ некоторыхъ мѣстахъ его пріу-

чаютъ къ ней; такъ напримѣръ ястребиная охота содержится въ Полтавскомъ имѣніи Князя Кочубея.

Тетеревятникъ вьетъ гнѣздо на самыхъ высокихъ деревьяхъ, наичаше имѣнно на старыхъ дубахъ или соснахъ. Оно бываетъ очень большое, плоское, лѣгается изъ сухихъ хворостинокъ а выстилается внутри мохомъ и другими подобными веществами. Лица пѣсолько больше куриныхъ и на зеленоватомъ грунтѣ испещрены желто-бурыми пятнышками. Ихъ бываетъ въ гнѣздахъ 3 или 4 и высиживаніемъ ихъ, которое продолжается около трехъ недѣль, занимается одна самка.

Видъ 22. Ястребъ перепелятникъ. *Astur nisus L.*

Astur nisus. Кесслеръ, Руководство. 160.—Самашко, Русская Фауна. 104. Таб. 13 Фиг. 3, 4, — Czernay, Bull. de Moscou. 1850. I. 605. Фауна Харьк. губернія. 27.

Falco nisus. Двигубскій, Опытъ. 12. Naumann, Vögel Deutschlands. I. 258. XIII. 92. Taf. 19, 20 — Temminck, Manuel. I. 56. III, 28. — Tysenhaus Ornithologia. I. 76. Nordmann, Faune pontique. 91. — Eichwald, Naturh. Skizze. 236. — Zawadzki, Galiz. Fauna. 40.

Accipiter nisas. Pallas, Zoographia. I. 370.

Nisus communis. Andrzejowski, Bull. de Moscou 1839. I. 15.

Ястребъ малый, перепелятникъ.

Jastrzab kroguec Rzacz.

Перепелятникъ водится во всѣхъ частяхъ старого свѣта и именно также въ цѣлой Европѣ, за исключеніемъ только самой сѣверной ея полосы. По нашимъ губерніямъ онъ встрѣчается повсюду, по преимущественно однако въ мѣстахъ лѣсистыхъ. Вообще же онъ попадается рѣже лѣтомъ, нежели въ другія времена года и это зависитъ безъ сомнѣнія отъ того, что лѣтомъ онъ ведетъ жизнь болѣе осѣдлую и не отлетаетъ далеко отъ лѣса или отъ рощи, гдѣ свилъ гнѣздо, между тѣмъ какъ позднѣе онъ начинаетъ скитаться также по мѣстамъ открытымъ и часто появляется около городовъ и селъ.

По образу жизни перепелятникъ представляетъ много сходства со сродныемъ съ нимъ тетеревятникомъ. Не смотря на то, что крылья у него еще короче, нежели у этого послѣдняго, онъ летаетъ чрезвычайно шибко и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ искусно управляетъ своими движениями, что ловко проносится сквозь чащу деревъ и чрезъ

узкія отверстія въ плетняхъ. По большей части онъ держится въ полетѣ низко надъ землею, рѣдко взвивается высоко на воздухѣ. — Онъ питается предпочтительно различными маленькими птичками, рѣже прибѣгаетъ къ мелкимъ грызунамъ и къ насѣкомымъ. Птичекъ беретъ какъ съ земли, такъ и на лету. Притомъ же онъ такъ смѣлъ и силенъ, что нападаетъ иногда на птицъ, которыя гораздо больше его, особенно если онъ замѣтить, что онъ не совсѣмъ здоровы. Такъ напримѣръ мнѣ случилось однажды видѣть, какъ перепелятникъ схватилъ на воздухѣ подстрѣленнаго чиренка и унесъ его, хотя и съ большимъ усилиемъ, въ ближайшій лѣсъ. Другой разъ мнѣ пришлось быть свидѣтелемъ того, какъ съ одного выстрѣла были убиты заяцъ и перепелятникъ; этотъ послѣдній, по видимому, преслѣдовалъ перваго, который уже прежде былъ подстрѣленъ. — Перепелятникъ легко можетъ быть пріучаемъ для охоты и употребляется у насъ особенно для ловли перепеловъ, отъ чего произошло и самое его название.

Перепелятникъ гнѣздится въ лѣсахъ и предпочтительно въ хвойныхъ. Большое гнѣзда его состоитъ изъ сухихъ прутиковъ и выстилается внутри мохомъ и перьями. Самка (которая постоянно бываетъ замѣтно больше самца) несетъ отъ 4 до 7 яицъ, которые на бѣловатомъ грунтѣ испещрены сѣроватобурыми пятнышками, наиболѣе скученными то на тупомъ, то на остромъ ихъ концѣ, и высиживаетъ ихъ въ три недѣли. Въ окрестностяхъ Кіева мнѣ случалось находить гнѣзда съ полнымъ числомъ яицъ обыкновенно во второй половинѣ Мая.

РОДЪ Х. КОРШУНЪ. *MILVUS BRISS.*

Видъ 23. *Коршунъ черный. Milvus niger Briss.*

Milvus niger. Кесслеръ, Руководство. 161. — Симашко, Русская Фауна. 116.

Таб. 14. Фиг. 1. — Czernay, Bull. de Moscou. 1850. I. 605.

Falco ater Gm. Двигубскій, Опытъ. 13.—Naumann, Vögel Deutschlands. I. 340.

XIII. 125. Taf. 31. Temminck. Manuel. I. 60. III. 30.—Tysenhaus, Ornithologia I. 62.—Nordmann, Faune pontique. 106.—Eichwald, Naturh. Skizze.

236.—Zawadzki. Galiz. Fauna. 43.

Milvus fuscoater. Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 15.

Accipiter Milvus. Pallas, Zoographia. I. 356.

Шулекъ, шулика или шульпика, коршунъ.

Kania czarna Tys.

Черный коршунъ водится во всей почти Африкѣ, въ западныхъ частяхъ Азіи и въ южныхъ и умѣренныхъ странахъ Европы. Въ Россіи онъ принадлежитъ къ

числу птицъ перелетныхъ, по залетаетъ лѣтомъ на сѣверъ далѣе, нежели въ западной Европѣ. Во всѣхъ нашихъ губерніяхъ онъ бываетъ въ большомъ числѣ, начиная отъ начала Апрѣля до половины Сентября. Въ городѣ Кіевѣ первые черные коршуны, въ продолженіи 9 лѣтъ, были замѣчены мною въ слѣдующіе дни:

1843 — 1844 — 1845 — 1846 — 1847 — 1848 — 1849 — 1850 — 1851.
31 Марта, 20 Апр., 30 Марта, 15, — 30, — 27, — 7 Апр., 30 Марта, 28, —

Черный коршунъ летаетъ легко и плавно, хотя впрочемъ довольно медленно. По большей части онъ держится на значительной высотѣ, а иногда даже взвивается на воздухъ такъ высоко, что его едва бываетъ видно. Часто притомъ онъ кружится долго на одномъ мѣстѣ, не производя распостертыми своими крыльями никакихъ замѣтныхъ размаховъ. Пронзительный, хохотливый крикъ его, особенно часто издаваемый имъ весною, бываетъ слышимъ на большое разстояніе — Онъ избираетъ своимъ гристианищемъ, въ лѣсахъ и рощахъ, самыя высокія деревья; на нихъ онъ устроиваетъ свое гнѣздо и на нихъ ночуетъ. Для отысканія пищи онъ удаляется часто очень далеко отъ своего обиталища и скитаются по полямъ и степямъ, гдѣ достаются ему въ добычу полевки, мыши, суслики и другія подобныя животныя, или носится надъ водою и достаетъ изъ нея лягушекъ и рыбокъ, подплывающихъ къ ея поверхности. Очень часто онъ залетаетъ также въ села и города и похищаетъ тутъ молодыхъ домашнихъ птицъ или выбираетъ кости и другія животныя остатки изъ сорныхъ кучъ. Въ самомъ Кіевѣ напримѣръ, въ продолженіи всего лѣта, ежедневно можно бывать видѣть болѣе или менѣе значительное число коршуновъ, медленно плавающихъ по воздуху и внимательно обозрѣвающихъ всѣ улицы и дворы. — Кромѣ того наконецъ эти коршуны охотно ёдятъ также падаль и при ней собираются иногда въ большомъ числѣ, вмѣстѣ съ воронами и воронами, особенно въ мѣстахъ степныхъ.

Большое гнѣздо коршуна дѣлается изъ сухихъ хворостинокъ и выстилается внутри мягкими травинками, мохомъ и другими подобными веществами. Яйца, которыхъ бываетъ въ гнѣздѣ 3 или 4, на зеленоватобѣломъ грунтѣ усыпаны краснобурymi крапинками и черточками. Молодыя сидятъ въ гнѣздѣ очень долго.

Видъ 24. Коршунъ красный. *Milvus regalis* Briss.

Milvus regalis. Кесслеръ, Руководство. 161. — Симашко, Русская Фауна 113. Таб. 14 А. Фиг. 1.

Milvus communis. Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 15.

Accipiter regalis. Pallas, Zoographia. I. 358.

Falco Milvus. Двугубский, Опытъ. 13. Naumann, Vögel Deutschlands. I. 333.

XIII. 123. Taf. 31 — Temminck, Manuel. I. 59. III. 30.—Tysenhausz, Ornithologia. I. 62 — Nordmann, Faune pontique. 106.—Andrzejowski, Rys Botaniczny. 80.—Eichwald, Naturh. Skizze. 236.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 43.

Коршунъ царскій, коршунъ красный, каня, шулика.

Kania Rzacz., Kania czerwona Zaw.

Красный коршунъ водится въ южныхъ и умѣренныхъ странахъ Европы, въ сѣверной Африкѣ и въ малой Азіи. Въ западной Европѣ онъ встрѣчается чаще, нежели черный коршунъ, и далѣе этого послѣдняго подается на сѣверъ. Въ Россіи же напротивъ того онъ распространенъ гораздо менѣе, нежели черный коршунъ. Уже въ нашихъ губерніяхъ онъ бываетъ несравненно рѣже, нежели этотъ послѣдній, и въ окрестностяхъ Кіева напримѣръ почти никогда не встрѣчается. Наичаще случалось мнѣ видѣть его въ Подольской губерніи, особенно около Днѣстра. По образу жизни красный коршунъ очень сходенъ съ чернымъ.

Примѣчаніе. Коршуновъ уже издалека можно бывать на лету отличить отъ всѣхъ другихъ хищныхъ птицъ, если только обратить вниманіе на хвостъ, который у нихъ болѣе или менѣе глубоко вырѣзанъ. У чернаго коршуна хвостъ не такъ глубоко вырѣзанъ, какъ у краснаго, у котораго онъ имѣетъ форму почти вилообразную, и по этому признаку ихъ можно также удобно различить и между собою, даже на значительной высотѣ.

РОДЪ XI. ЛУНЬ CIRCUS BRISS.

Видъ 25. Лунь полевой. *Circus cyaneus* L.

Circus cyaneus. Кесслеръ, Руководство. 162.—Симашко, Русская Фауна. Таб. 14. фиг. 2.—Czernay, Bull. de Moscou. 1850. I. 605.

Circus pygargus. Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 15.

Falco cyaneus. Двугубский, Опытъ. 16.—Temminck, Manuel. I. 72. III. 41.—Tysenhausz, Ornithologia. I. 81.—Nordmann, Faune pontique. 107.—Eichwald, Naturh. Skizze. 236.

Falco pygargus Gm. Naumann, Vögel Deutschlands. I. 391. XIII. 151. Taf. 38. 39.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 44.

Accipiter variabilis. Pallas, Zoographia. I. 364.

Лунь полевой, лунь бѣлый.
Błotniak zbożowy Tys.

Полевой лунь водится во всей Европѣ, за исключениемъ самой сѣверной ея полосы, и кромѣ того въ южной Сибири, Малой Азіи и сѣверной Африкѣ. Во всѣхъ нашихъ губерніяхъ онъ принадлежитъ къ числу самыхъ обыкновенныхъ и наиболѣе распространенныхъ хищныхъ птицъ. Никогда впрочемъ онъ не остается у насъ зимовать, а подвигается на зиму далѣе къ югу. Въ окрестностяхъ Кіева онъ показывается обыкновенно въ концѣ Марта или въ первыхъ числахъ Апрѣля и бываетъ видимъ по одинакѣ до исхода Октября.

Полевой лунь держится всегда на мѣстахъ открытыхъ, на поляхъ, степяхъ и лугахъ, особенно такихъ, которые находятся близко отъ воды; лѣсовъ же онъ рѣшительно избѣгаетъ. Онъ имѣетъ полетъ легкій, но неровный, и летаетъ обыкновенно низко надъ землею, при чмъ часто какъ бы плаваетъ или качается на воздухѣ съ распущенными крыльями, не производя ими никакихъ примѣтныхъ размаховъ. Онъ скитаются такимъ образомъ съ мѣста на мѣсто почти круглый день и только изрѣдка садится для отдыха на земляную глыбу, на вершину кургана, или на хлѣбную копну.—Главную пищу его составляютъ мыши, полевки, кроты, лягушки, ящерицы, крупныя настѣкомыя. Птичекъ онъ не можетъ поймать на лету, но часто хватаетъ сидячихъ, особенно молодыхъ.

Полевой лунь всегда помѣщаетъ свое гнѣздо на землѣ, то между хлѣбомъ, то въ густой травѣ или осокѣ. Онъ дѣлаетъ его безъ большаго искусства изъ соломинокъ и сухихъ травинокъ и выстилаетъ внутри перышками и волосами. Въ высиживаніи яицъ, которыхъ бываетъ числомъ отъ 4 до 6, зеленовато-бѣлаго цвѣту, самецъ не принимаетъ никакаго участія.

Видъ 26. Лунь луговой. *Circus cineraceus* Mont.

Circus cineraceus. Кесслеръ, Руководство. 163. — Симашко, Русская Фауна. Табл. 14. Фиг. 5 — Чернай, Fauna Харьк. губерніи. 23. Bull. de Moscou. 1850. I. 605.

Falco cineraceus. Naumann, Vögel Deutschlands. I. 402. XIII. 165. Taf. 40. — Temminck, Manuel. I. 76. III. 46. — Tysenhausz, Ornithologia. I. 82. — Nordmann, Faune pontique. 108.

Falco cinerascens. Zawadzki. Galiz. Fauna. 44.

Лунь луговой, лунь рыжий.

Błotniak popielaty Jarocki.

Луговой лунь водится, сколько известно, въ южныхъ и умеренныхъ странахъ Европы и въ южной Сибири. Онъ встречается также во всѣхъ нашихъ губерніяхъ, но рѣже, нежели лунь полевой. Притомъ же онъ, по видимому, прилетаетъ къ намъ весною немного позднѣе этого послѣдняго, а осеню раньше опять удаляется.

Луговой лунь держится всегда на мѣстахъ открытыхъ и предпочтительно на низменныхъ, влажныхъ лугахъ, которые разстилаются по ложбинамъ рѣкъ; нерѣдко также онъ посѣщаетъ поля и степи, близкія отъ воды. Вообще по образу жизни луговой лунь очень сходенъ съ полевымъ лунемъ. Подобно этому послѣднему онъ летаетъ неутомимо (крылья у лугового луна относительно длиннѣе и острѣе, нежели у полеваго) почти цѣлый день и лишь изрѣдка садится для отдыха на землю. Онъ питается преимущественно мышами, полевками, лягушками, молодыми птичками, птичьими яицами, крупными насѣкомыми. Птичекъ и насѣкомыхъ онъ никогда не ловить на лету, а беретъ ихъ съ земли.

Гнѣзда лугового луна всегда находятся на землѣ и дѣлаются безъ всякаго особеннаго искусства изъ соломинокъ и сухихъ травинокъ. Въ немъ бываетъ обыкновенно 4 яйца, совершенно бѣлыхъ. Въ окрестностяхъ Кіева молодыя показываются наи чаще въ гнѣзда около половины Іюля. Въ 1847 году мнѣ случилось найти гнѣзда съ яицами еще 17 Іюня.

Видъ 27. Лунь степной. *Circus pallidus* Sykes.

Circus pallidus. Nordmann, Bull. physico—mathem. 1845. IV. 102.

Circus cineraceus pallidus. Schlegel, Kritische Uebersicht. p. VI et 22.

Falco pallidus. Naumann, Vögel Deutschlands. XIII. 154. Taf. 348.—Temminck, Manuel. IV. 594.

Лунь степной или бѣлый, ластrebъ бѣлый.

Степной лунь водится, сколько до сихъ поръ известно, въ южныхъ странахъ Европы и въ сѣверной Африкѣ. Его недавно только положительнымъ образомъ отличили отъ луней полеваго и степнаго, съ которыми онъ очень сходенъ и между

которыми занимаетъ именно какъ бы средину. Онъ немнога меньше полеваго луя, но не сколько больше луговаго; крылья у него замѣтно длиннѣе, нежели у полеваго луя, но короче, нежели у луговаго; самка и молодыя по цвету чрезвычайно походятъ на самку и молодыхъ луговаго луя, а старый самецъ напротивъ того очень сходенъ со старымъ полевымъ лунемъ, только еще свѣтлѣе этого послѣдняго и имѣетъ грудь почти совершенно бѣлую. Между луями, сохраняемыми въ Зоологическомъ Кабинетѣ Университета Св. Владимира, находится одна самка, убитая въ окрестностяхъ Кіева, которая несомнѣнно принадлежитъ къ этому виду. Старыхъ самцовъ мнѣ случалось иногда встрѣтить въ степныхъ мѣстахъ нашихъ губерній, гдѣ ихъ называютъ бѣлыми луями или бѣлыми ястребами, но вообще однако степной лунь бываетъ у насъ гораздо рѣже, нежели лунь полевой.

Видъ 28. Лунь камышевый. *Circus rufus L.*

Circus rufus. Кесслеръ, Руководство. 164.—Симашко, Русская, Фауна. Таб. 14.

Фиг. 4.—Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 15.—Czernay, ibidem. 1850. I. 605.

Falco rufus. Двигубскій, Опытъ. 15.—Naumann, Vögel Deutschlands. I. 378. XIII. 150. Taf. 37. 38.—Temminck, Manuel. I. 69. III. 39.—Tysenhaus, Ornithologia. I. 80.—Nordmann, Faune pontique. 107.—Eichwald, Naturh. Skizze. 236.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 44.

Accipiter Circus. Pallas, Zoographia. I. 362.

Лунь камышевый или болотный, набережникъ.

Blotniak bлотny Jundzill.

Камышевый лунь водится какъ во всей почти Европѣ, такъ въ Сибири, Грузіи Малой Азіи и сѣверной Африкѣ. Въ нашихъ губерніяхъ онъ находится въ значительномъ числѣ, отъ конца Марта до начала Октября.

Камышевый лунь обитаетъ почти исключительно на болотахъ и низменныхъ, влажныхъ лугахъ; особенно онъ любить такія мѣста, гдѣ находится рѣчка, небольшія озера и пруды, которыхъ берега покрыты густымъ тростникомъ или комышомъ. Онъ имѣетъ полетъ легкій, но неровный, держится обыкновенно довольно низко надъ землею и летаетъ неутомимо почти цѣлый день, изрѣдка только садясь для отдыха на стогъ сѣна или на земляной бугорокъ. Питается онъ по преимуществу различными водяными и болотными птицами и ихъ яицами, рѣже прибѣгаешь къ

маленькихъ млекопитающимъ или къ насѣкомымъ. Особенно жаденъ этотъ лунь до яицъ и съ большимъ искусствомъ отыскиваетъ, для добытія таковыхъ, гнѣзда водяныхъ и болотныхъ птицъ, причиняя имъ тѣмъ очень значительный ущербъ. Самыхъ птицъ онъ никогда не беретъ на лету, а только на землѣ или на водѣ, но за то онъ очень зорокъ и смѣлъ, такъ что при малѣйшей оплошности съ ихъ стороны, онъ непремѣнно достаються ему въ добычу. Мне случилось однажды быть очевидцемъ, какъ камышевый лунь схватилъ подстрѣленнаго дуппеля, не болѣе какъ въ 100 шагахъ отъ охотника.

Камышевый лунь вьетъ безъискусственное свое гнѣздо всегда на землѣ, наимѣюще на бугоркѣ, закрытомъ осокой, или на кучкѣ старого, повалившагося камыша. Самка несетъ 4 яица, зеленовато-блѣдаго цвѣту, и высиживаетъ ихъ, безъ помощи самца, въ три недѣли. Въ окрестностяхъ Кіева молодыя, которыя первоначально бывають покрыты блѣдымъ пухомъ, вылупливаются изъ яицъ часто уже въ первыхъ числахъ Іюня мѣсяца.

Приимѣчаніе. Между набитыми камышевыми лунями, которые сохраняются въ Зоологическомъ Кабинетѣ Университета Св. Владимира, находятся два, одинъ старый, другой молодой, у которыхъ четвертое маховое перо длине третьяго. Послѣдній, который убитъ по близости Кіева въ Іюль мѣсяцѣ 1846 года, замѣченъ по необыкновенно темному, почти на всемъ тѣлѣ однообразному цвѣту перьевъ. Только на затылкѣ находится у него большое свѣтлокрасное пятно, но вовсе нѣтъ свѣтлыхъ перьевъ на горлѣ.

В. НОЧНЫЯ ХИЩНЫЯ ПТИЦЫ ИЛИ СОВЫ.

РОДЪ XII. СОВА. AEGOLIUS KEYS. BL.

Видъ 29. Сова болотная. *Aegolius brachyotus* Forst.

Aegolius brachyotus. Кесслеръ, Руководство 165.—Симашко, Русская Фауна Таб. 15, фиг. 1, 3,—Czernay, Bull. de Mascou. 1850. I. 606.

Strix brachyotus. Двигубскій, Опытъ. 26.—Naumann. Vögel Deutschlands. I. 459. Taf. 45, fig. 2.—Temminck, Manuel. I. 99. III. 51.—Tysenhaus, Ornithologia. I. 104.—Nordmann, Faune pontique. 112.—Eichwald. Naturh. Skizze. 236.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 48.

Strix Aegolius. Pallas, Zoographia. I. 309.

Strix Ulula. Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 15

Сова болотная или короткоухая.

Puhacz błotny Tys.

Болотная сова водится въ Европѣ, въ сѣверной Африкѣ, во многихъ странахъ Азіи и въ сѣверной Америкѣ. Во всѣхъ нашихъ губерніяхъ она встрѣчается въ довольно значительномъ числѣ, но, сколько мыѣ известно, не зимуетъ въ нихъ, а въ концѣ осени удаляется далѣе на югъ. Въ окрестностяхъ Кіева мыѣ случалось ее находить не позднѣе половины Октября мѣсяца.

Сова эта въ проложеніи лѣта держится предпочтительно на низменныхъ, болотистыхъ лугахъ, а осенью встрѣчается также на поляхъ, въ кустахъ и рощахъ. Днемъ она сидитъ обыкновенно на землѣ, прячется въ высокой осокѣ и травѣ, или между кочками и земляными глыбами, и, въ надеждѣ оставаться пезамѣченою, позволяетъ тогда человѣку подойти на самое близкое разстояніе; но если ее однажды согнать съ места и если она замѣтитъ, что ее преслѣдуютъ, то она дѣлается болѣе осторожнаю, старается укрыться въ кустарникахъ, когда таковые находятся по близости, или улетаетъ очень далеко. Она имѣетъ полетъ медленный, перовный, но тѣмъ не менѣе, во время вечернихъ и утреннихъ сумерекъ, когда занимается отыскиваніемъ пищи, вѣтсѧ по воздуху съ большою живостью. Главную добычу ея составляютъ кроты, куторы, мыши, полевки, перепелки и другія маленькия млекопитающія и птицы, а также различные крупныя насѣкомыя.

Сова эта не вьетъ, можно сказать, вовсе гнѣзда, а кладетъ свои яйца или непосредственно на сухие земляные бугорки и кочки, находящіеся въ болотѣ, или только подстилаетъ подъ нихъ немного сухой травы. Число яицъ простирается отъ 3 до 4. Они бѣлаго цвѣту и имѣютъ форму почти шарообразную. Насиживаніе продолжается около трехъ недѣль. Молодыя, при выходѣ изъ яицъ, покрыты бѣловатымъ пухомъ.

Видъ 50. Сова ушастая. *Aegolius otus L.*

Aegolius otus. Кесслеръ, Руководство. 166. — Симашко, Русская Фауна. Таб. 15. фиг. 4, 5 — Czernay, Bull. de Moscou. 1850. I. 606.

Strix Otus. Pallas, Zoographia. I. 367. — Двигубскій, Опытъ. 27. — Naumann, Vögel Deutschlands. I. 451. XIII. 176. Taf. 45. fig 1.—Temminck, Manuel I.

102. III. 54. — Tysenhauz, Ornithologia, I. 109.—Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 15.—Rys Botaniczny. 80.—Eichwald, Naturh. Skizze. 236.—Nordmann, Faune pontique. 109.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 48.

Сова ушастая или чернорогая, сычъ.

Puhacz uszaty Jundziłł.

Ушастая сова водится во всей почти Европѣ, въ съверной Африкѣ, на Кавказѣ и въ Сибири. У насъ она встречается во всѣхъ лѣсистыхъ мѣстахъ, но вообще находится въ меньшемъ числѣ, нежели болотная сова. За то ушастая сова остается у насъ зимовать, чего не дѣлаетъ болотная.

Ушастая сова обитаетъ въ лѣсахъ, рощахъ и садахъ. Днемъ она сидѣтъ обыкновенно неподвижно на какомъ нибудь густомъ деревѣ и старается избѣгнуть всяаго вниманія тѣмъ, что прижимается плотно къ толстому суку или къ самому стволу. Съ наступленіемъ же сумерекъ оставляетъ потаенное свое убѣжище и вылетаетъ на поимку добычи, при чемъ показывается также на мѣстахъ открытыхъ и скитаются даже по полямъ и лугамъ. Пищу ея составляютъ преимущественно мелкія млекопитающія, какъ то: мыши, полевки, куторы; но кроме того она ловитъ также и птичекъ, особенно молодыхъ, лягушекъ, крупныхъ жуковъ и другихъ насѣкомыхъ.

Ушастая сова не вѣтъ сама гнѣзда, а пользуется старыми гнѣздами воронъ, сорокъ, сарычей и другихъ большихъ птицъ. Самка несетъ отъ 3-хъ до 4 шаровидныхъ бѣлыхъ яицъ и сидѣтъ на нихъ три недѣли. У молодыхъ развиваются надъ ушами пучки удлиненныхъ перышковъ еще тогда, когда они находятся въ пуху.

РОДЪ XIII. НЕЯСТЬ. ULULA CUV.

Видъ 51. Неясть спрая. *Ulula aluco L.*

Ulula aluco. Кесслеръ, Руководство. 167.—Симашко, Русская Фауна. Таб. 16, Фиг. 2, 3.—Чернай, Фауна Харьк. губерніи. 27. Bull. de Moscou. 1850. I. 606.

Strix aluco. Pallas, Zoographia. I. 321.—Двигубскій, Опытъ. 24.—Naumann, Vögel Deutschlands. I. 473. XIII. 178. Taf. 46 и. Taf. 47, fig 1.—Temminck, Manuel. I. 89. III, 48.—Tysenhauz Ornithologia. I. 95.—Nordmann, Faune pontique. 110.—Eichwald, Naturh. Skizze. 236.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 47.

Syrnium aluco. Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 15.

Сова свѣтлосѣрая Двиг., неясыть, сипуха.

Sowa Puszczuk Jundziłł.

Неясыть водится во всей почти Европѣ и кромѣ того въ Грузіи, Сиріи, Малой Азіи. Въ лѣсистой полосѣ нашихъ губерній она встречается довольно часто, рѣже въ мѣстахъ степныхъ. Остается у насъ зимовать.

Неясыть обитаетъ предпочтительно въ лѣсахъ или густыхъ рощахъ, особенно въ продолженіи лѣта; только осенью и зимою переселяется иногда въ мѣста болѣе открытыя и показывается даже на голыхъ степяхъ. — По чрезвычайно толстой ея головѣ уже издали можно бывать отличить ее отъ всѣхъ другихъ совъ; притомъ же перья у ней бываютъ обыкновенно особеннымъ образомъ растопырены, такъ, что она является крайне неуклюжею. Въ самомъ дѣлѣ она очень сонлива и неповоротлива; днемъ сидитъ почти всегда въ какомъ нибудь скрытномъ мѣстѣ, наичаше именно на суку густаго дерева, и дремлетъ. Если ее оттуда согнать, то она отлетаетъ не далеко, размахивая крыльями какъ-то тяжело и медленно, и скоро опять погружается въ прежнюю дремоту. Только въ сумерки нѣсколько оживляется и пускается летать, тихими и неслышными ударами крыльевъ, для поимки добычи. Главную пищу ея составляютъ мыши, полевки, кроты, лягушки, а изрѣдка ей удается также схватить молодаго зайчика, или сидячу птичку. Кромѣ того она не отказывается и отъ ночныхъ насѣкомыхъ.

Для кладки яицъ неясыть избираетъ по преимуществу дупла старыхъ деревъ. Тутъ она иногда приготовляетъ для нихъ подстилку изъ моха и перышковъ, а иногда кладетъ ихъ непосредственно на древесныя щепки. Число яицъ, бѣлыхъ, почти шаровидныхъ, простирается отъ 3 до 5. Насиживание продолжается немного болѣе трехъ недѣль. Молодыя, при выходѣ изъ яйца, покрыты бѣловатымъ пухомъ, очень неуклюжи и нѣсколько дней бываютъ слѣпыми. Въ нашихъ мѣстахъ они вылупливаются изъ яицъ обыкновенно въ первыхъ числахъ Мая, но ростуть такъ медленно, что достигаютъ полнаго развитія не раньше половины Августа.

Попадается въ нашихъ мѣстахъ также рыжеватая разность неясыти (которая, по мнѣнію Наумана, составляется молодыми женскими недѣлимymi). Въ Зоологическомъ Кабинетѣ Университета Св. Владимира сохраняется очень красивая рыжая неясыть, убитая, въ Генварѣ 1849 года, въ южной части Кіевской губерніи.

РОДЪ XIV. СИПУХА. *STRIX L.*Видъ 32. *Сипуха желтая. Strix flammea. L.*

Strix flammea. Двигубскій, Опытъ. 24.—Кесслеръ, Руководство. 168.—Симашко, Русская фауна. Таб. 16. фиг. 4.—Naumann, Vögel Deutschlands. I. 483. XIII. 188. Taf. 47. fig. 2.—Temminck, Manuel. I. 91. III. 48.—Tysenhausz, Ornithologia. I. 102.—Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 15.—Czernay, ibidem. 1850. I. 606.—Eichwald, Naturh. Skizze. 236.—Nordmann, Faune pontique. 110.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 47.

Сипуха, сова рыжая Двиг.

Sova płomykowata Tys.

Сипуха водится въ южной и умѣренной полосахъ Европы, въ Азіи и въ Африкѣ. По свидѣтельству Андржіевскаго она встрѣчается также въ нашихъ губерніяхъ, но мнѣ самому никогда не случалось еще ее находить. Сколько известно, она обитаетъ предпочтительно на старыхъ башняхъ, колокольняхъ и вообще въ опустѣлыхъ ветхихъ строеніяхъ.

РОДЪ XV. СЫЧЪ. *NYCTALE BREHM.*Видъ 33. *Сычъ ручной. Nyctale Tengmalmi Gm.*

Nyctale Tengmalmi. Кесслеръ, Руководство. 169.—Симашко, Русская Фауна. Таб. 17. фиг. 1, 2.—Чернай, Fauna Харьк. губ. 27. Bull. de Moscou. 1850. I. 606.

Strix Tengmalmi. Двигубскій Опытъ. 25.—Naumann, Vögel Deutschlands. I. 500. XIII. 190. Taf. 48. fig. 2, 3.—Temminck, Manuel. I. 94. III. 49.—Tysenhausz, Ornithologia. I. 99.

Strix passerina. Pallas Zoographia. I. 323.

Strix dasypus Bechst. Eichwald, Naturh. Skizze. 236.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 47. Сычъ, сова мохноногая Двиг.

Sowa Pojdźka Tys.

Сычъ водится въ умѣренныхъ и холодныхъ странахъ Европы и въ западной Сибири. Онъ встрѣчается въ лѣсистой, сѣверной полосѣ нашихъ губерній, но

вообще довольно рѣдко. Одинъ только разъ, въ началѣ Сентября 1846 года, мы случилось его найти въ окрестностяхъ Кіева, въ небольшомъ, но очень густомъ хвойномъ лѣсу.

Графъ Тизенгаузъ разсказываетъ, что въ Литвѣ народъ питаетъ суевѣрный предразсудокъ, будто полуночный крикъ сыча предвѣщаетъ смерть какого нибудь большаго. Очень вѣроютно однако, что предразсудокъ этотъ касается не сыча, а домоваго сиринга, относительно котораго подобное же суевѣріе существуетъ также въ нѣкоторыхъ частяхъ Германіи. Это тѣмъ правдоподобнѣе потому, что сычъ обитаетъ обыкновенно вдали отъ всѣхъ жилыхъ мѣстъ, между тѣмъ, какъ домовый сирингъ предпочтительнѣе ихъ придерживается.

Сычъ, пойманный живымъ, очень скоро дѣлается совершенно ручнымъ.

РОДЪ XVI. СИРИНЪ. *SURNIA DUM.*

Видъ 34. *Сирингъ домовый.* *Surnia noctua Retz.*

Surnia noctua. Кесслеръ, Руководство. 169. — Симашко, Русская Фауна, Таb. 17. Фиг. 3. — Von der Muhle, Ornithologie Griechenlands. 24.

Surnia passerina L. Czernay, Bull. de Moscou. 1850. I. 606.

Strix noctua. Naumann, Vögel Deutschlands. I. 493. XIII. 189. Taf. 18. fig 1.— Schlegel, Kritische Uebersicht. XV u. 39.—Nordmann, Faune pontique. 109. Zawadzki, Galiz. Fauna. 46.

Strix passerina. Двигубскій Опытъ 25 — Temminck, Manuel. I. 92. III. 49.— Tysenhauz, Ornithologia. I. 98.—Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 15.

Сиринъ малый, сычъ.

Sowa Sówka Rzacz.

Домовый сирингъ водится въ южной и умѣренной Европѣ, въ Грузии и Малой Азии. У насъ онъ находится осѣдлымъ повсюду и встрѣчается вообще чаще всѣхъ другихъ совъ.

Маленькая эта совка придерживается обыкновенно мѣстъ жилыхъ, часто обитаетъ внутри городовъ и сель. Она избираетъ тутъ своимъ пристанищемъ до

преимуществу чердаки домовъ, дымовыя трубы, дырья въ каменныхъ стѣнахъ и другія подобныя мѣста. Такъ напримѣръ нѣсколько такихъ совокъ постоянно живутъ на зданії Кіевскаго Университета и недавно даже случилось, что одна изъ нихъ, чрезъ дымовую трубу, забралась въ самую Зоологическую лабораторію, не смотря на то, что эта послѣдняя помѣщается въ нижнемъ этажѣ. Иногда впрочемъ она поселяется также въ глубокихъ, обрывистыхъ оврагахъ, или въ садахъ и рощахъ.

Совка эта птица довольно живая, проворная, весною очень крикливая. Она вылетаетъ за добычею не только въ сумерки и ночь, но часто также днемъ, особенно лѣтомъ, когда заботится о прокормленіи молодыхъ. Главную пищу ея составляютъ мыши, полевки и крупные жуки (навозные и майскіе); но очень вѣроятно, что она ловитъ иногда и птичекъ, потому что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ воробыи, какъ я замѣтилъ, очень ея боятся.—Въ комнатѣ она очень скоро дѣлается ручною.

Домовый сиринъ не вьетъ обыкновенно вовсе гнѣзда, а кладетъ яйца въ удобное для этой цѣли углубленіе, безъ всякой даже подъ ними подстилки. Яйца бѣлые, почти шаровидныя и ихъ бываетъ по большей части 4 или 5. Въ конца Іюня молодыя, въ нашихъ мѣстахъ, бываютъ почти совершенно взрослые.

Примѣчаніе. Шлегель принимаетъ двѣ разности вида *Surnia noctua*, южную и сѣверную, говоря, что первая отличается отъ послѣдней блѣднѣйшимъ цѣвѣтомъ перьевъ и нѣкоторыми другими маловажными признаками. Графъ Фонъ-деръ-Мюле и Науманъ даже полагаютъ, что подъ названіемъ *Surnia noctua* смѣшиваются два совершенно отдѣльныхъ, самостоятельныхъ вида, но вмѣстѣ съ тѣмъ сознаются, что они основываютъ свое предположеніе преимущественно на разнородномъ образѣ жизни относимыхъ сюда совокъ, а не могли найти между ними точныхъ и рѣзкихъ видовыхъ различій. При сличеніи между собою тѣхъ экземпляровъ, которые сохраняются въ Зоологическомъ Кабинетѣ Университета Св. Владимира и происходять изъ окрестностей Кіева, я нашелъ, что они представляютъ два слѣдующія видоизмененія:

А. Верхняя челюсть немногого сжата съ боковъ и вытянута въ длинный, довольно острый крючекъ; пальцы покрыты очень рѣдкими волосовидными перышками и потому, на нѣкоторомъ разстояніи, являются какъ бы совершенно обнаженными; ногти очень большіе и острые; свѣтлые поперечные полосы на хвостѣ узкія, мало язвственные.

В. Верхняя челюсть съ боковъ выпукла и вытянута въ крючёкъ не очень большой, тупой; пальцы покрыты сверху довольно густыми, волосовидными перышками; ногти относительно небольшие; свѣтлые поперечные полосы на хвостѣ довольно широкія, очень явственныя; ошейникъ густой, очень замѣтный.

У обоихъ видоизмѣнений клювъ никогда не бываетъ совершенно желтымъ, а къ основанию дѣлается темнобурымъ. Цвѣтъ перьевъ въ одномъ и томъ же видоизмѣненіи бываетъ то свѣтлѣе, то темнѣе.

Не берусь впрочемъ решить вопроса, составляютъ ли эти два видоизмѣненія только разности одного и того же вида, или же два различныхъ, самобытныхъ вида, тѣмъ болѣе, что наблюденія мои, касательно образа жизни нашихъ маленькихъ сириковъ, пока еще очень не полны.

Видъ 55. Сиринъ белый. *Surnia nystea* L.

Surnia nystea. Кесслеръ, Руководство. 170 — Симашко, Русская Фауна. Таб. 18. Фиг. 2.—Andrzejowski. Bull. de Moscou. 1839. I. 15.

Strix nystea. Pallas, Zoographia I. 312 — Двигубскій, Опытъ. 22. — Naumann, Vögel Deutschlands. I. 417. Taf. 41.—Temminck. Manuel. I. 82. Ill. 45.—Tysenhaus, Ornithologia. I. 91.—Eichwald, Naturh. Skizze. 236.

Strix nivea. Zawadzki, Galiz. Fauna. 45.

Сиринъ белый, сова белая, въ Сибири улунъ или лунъ.

Sowa biala Jundzill.

Бѣлый сирикъ водится въ холодной и полярной полосахъ Европы, Азіи и Америки; очень рѣдко показывается въ странахъ умѣренныхъ, и то по преимуществу только зимою. У насъ онъ попадается иногда въ губерніи Волынской, но мнѣ самому никогда не случалось еще его находить.

Примѣчаніе. Очень вѣроятно, что въ сѣверной полосѣ нашихъ губерній встрѣчается также сирикъ ястребиный (*Surnia funerea* s. *nistoria*) и сирикъ крошечный (*Surnia passerina* L. s. *acadica* Temm.), которые, по свидѣтельству Профессора Эйхвальда и Графа Тизенгауза, водятся въ значительномъ числѣ во всей Литвѣ; но до сихъ поръ недостаетъ обѣ этомъ всякихъ положительныхъ свѣдѣній.

РОДЪ XVII. ФИЛИНЪ. *BUBO CUV.*Видъ 56. **Филинъ-пугачъ.** *Bubo maximus Retz.*

Bubo maximus. Кесслеръ. Руководство. 171. — Симашко, Русская Fauna. Tab. 18. фиг. 3. — Czernay, Bull. de Moscou. 1850. I. 606.

Bubo dux Cuv. Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 15.

Strix bubo L. Pallas, Zoographia. I. 305. — Двигубскій, Опытъ. 27.—Naumann, Vögel Deutschlands. I. 440 XIII. 174. Taf. 44.—Temminck. Manuel. I. 100. III. 53.—Tysenhauz, Ornithologia. I. 105.—Nordmann, Faune pontique. 112.—Eichwald, Naturh. Skizze. 236. — Zawadzki. Galiz. Fauna. 48.

Филинъ, бугалень, въ Малороссіи пугачъ.

Puhacz właściwy Rzacz.

Филинъ водится во всей почти Европѣ и Азіи. Въ нашихъ губерніяхъ онъ встрѣчается повсюду, гдѣ только находятся лѣса или большія густыя рощи, но преимущественно въ сѣверной полосѣ.

Филинъ поселяется обыкновенно въ самой чащѣ лѣсовъ или въ мало доступныхъ оврагахъ, поросшихъ густыми кустами, а иногда избираетъ также своимъ обиталищемъ старыя развалины каменныхъ строеній. Онъ очень остороженъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ необыкновенно смѣлъ и золъ. Когда онъ сердится, то большие красные глаза его горятъ огнемъ и онъ громко щелкаетъ челюстями. Издаваемый имъ по почамъ страшный крикъ, какое то глухое пу-гу-гу, пу-гу-гу, бываетъ слышимъ на большомъ разстояніи и приводить въ трепетъ всѣхъ птицъ и мелкихъ млекопитающихъ. Онъ вылетаетъ за добычею съ наступленіемъ вечернихъ сумерекъ и бодрствуетъ всю ночь, но и днемъ дремлетъ очень чутко и, когда его содержать въ клѣткѣ, принимаетъ даже днемъ пищу. Главную добычу его составляютъ мыши, полевки, кроты и другія мелкія млекопитающія, а также лягушки, ящерицы и крупные жуки. Кроме того онъ похищаетъ иногда зайцевъ и даже молодыхъ сарнъ и ловитъ всякихъ птицъ, особенно же тетеревей, куропатокъ, воронъ, соекъ. Всѣ лѣсныя птицы очень боятся его и крайне испанидятъ; если онъ случайно покажется днемъ на какомъ нибудь открытомъ мѣстѣ, то поднимается между ними всеобщій крикъ, и, такъ какъ онъ днемъ ничего не можетъ имъ сдѣлать, то всѣ начинаютъ его преслѣдоватъ и дразнить. Самымъ упорнымъ образомъ къ нему пристаютъ въ этомъ случаѣ именно вороны.

Филинъ устроиваетъ безъискусственное свое гнѣздо то въ разѣминахъ непрѣступныхъ обрывовъ, то на толстыхъ пняхъ въ самой чащѣ лѣсовъ. Бѣлыя яйца, которыхъ бываетъ числомъ 2 или 3, иемного больше куриныхъ и имѣютъ форму почти шарообразную. Молодыя покрыты первоначально пестрымъ пухомъ и растутъ довольно медленно. Въ окрестностяхъ Кіева они начинаютъ летать въ началѣ Іюля мѣсяца.

РОДЪ XVIII. КАНЮКЪ. EPHIALTES KEYS. BLAS.

Видъ 37. Канюкъ лѣсной. *Ephialtes scops L.*

Ephialtes scops. Кесслеръ, Руководство. 172.—Симашко, Русская Фауна. Таб. 18. фиг. 4.—Czernay, Bull. de Moscou. 1850. I. 606.

Strix scops. Pallas. Zoographia. I. 310. — Двигубскій, Опытъ. 27. — Naumann, Vögel Deutschlands. I. 406. Taf. 43, fig. 3. — Temminck, Manuel. I. 103. III. 54.—Tysenhauz, Ornithologia. I. III.—Nordmann, Faune pontique. 110.—Eichwald, Naturh. Skizze. 236.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 47.

Scops communis. Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 15.

Puhacz Sycez Tys.

Канюкъ водится во всѣхъ почти южныхъ и умѣренныхъ странахъ Европы. Въ нашихъ губерніяхъ мнѣ самому никогда еще не случалось его находить, но Г. Авдrijевскій свидѣтельствуетъ въ томъ, что онъ встрѣчается тутъ. По показаніямъ Профессора Эйхвальда и Графа Тизенгауза въ Литвѣ попадается особенная меньшая разность его.

РАЗРЯДЪ ПТИЦЪ КУРИНЫХЪ.

А. ГОЛУБИНЫЯ ПТИЦЫ.

РОДЪ I. ГОЛУБЬ. *COLUMBA L.*

Видъ 1. Голубь-вяхирь. *Columba palumbus L.*

Columba palumbus. Двигубскій, Опытъ. 101. — Кесслеръ, Руководство. 266.— Симашко, Русская Fauna. Таб. 81. Фиг. 1—6. — Naumann, Vögel Deutschlands. VI. 168. Taf. 149, fig. 1, 2. — Temminck, Manuel. II. 444. IV. 307. — Tysenhaus, Ornithologia. II. 549. — Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 18. — Czernay, ibidem. 1850. I. 617. — Nordmann, Faune romptique. 213.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 92.

Columba palumbes. Pallas, Zoographia. I. 568.

Вяхирь, вятуень, въ Малороссіи припутень и трепетень.

Gołąb Grzywacz Rzacz.

Вяхирь водится во всѣхъ почти странахъ Европы, лежащихъ къ югу отъ полярного круга, и кромѣ того встрѣчается въ западной Сибири, Грузіи, Малой Азіи и сѣверной Африкѣ. Въ нашихъ губерніяхъ находится лѣтомъ повсюду, но вездѣ однако въ меньшемъ числѣ, нежели клиндухъ и горлица. Никогда не осается у насъ зимовать, но показывается очень рано весною, иногда уже въ первыхъ числахъ марта мѣсяца.

Вяхирь избираетъ лѣтнимъ своимъ пристанищемъ предпочтительно большиє лѣса, какъ хвойные, такъ и лиственіные, и бываетъ разсѣянъ по нимъ отдельными четами.

Во время осенняго пролета онъ посѣщаетъ также мѣста открытыя и даже голыя поля, но и въ этомъ случаѣ показывается у насъ лишь маленькими обществами, а не такими огромными стадами, какія, по словамъ Профессора Нордмана, появляются у береговъ Чернаго моря.

Вяхирь летаетъ шибко и разсѣкаетъ воздухъ съ болышио силою, такъ что полетъ его очень шуменъ, особенно когда онъ поднимается съ земли или срывается съ дерева. По землѣ ходить и бѣгаеть довольно проворно, кивая на каждомъ шагу головою. Какъ въ лѣсѣ, такъ и на полѣ чрезвычайно остороженъ, рѣдко подпускаетъ къ себѣ охотника на разстояніе выстрѣла. Голосъ у него глухой, но далеко слышимый.—Питается вяхирь различными сѣменами и ягодами; самый любимый кормъ его составляютъ именно сосновое сѣмя и жолуди.

Гнѣзда вяхира всегда находятся на деревьяхъ, иногда не выше 10 футовъ отъ земли, а иногда чрезвычайно высоко. Оно дѣлается очень безъискусственно изъ сухихъ прутиковъ и бываетъ почти совершенно плоско, съ небольшимъ только углубленіемъ по срединѣ. Голубка кладетъ въ него два яйца, которые совершенно бѣлы и имѣютъ правильную овальную форму. При насиживаніи ихъ, которое продолжается отъ 17 до 19 дней, голубка ежедневно на нѣсколько часовъ смѣняется голубемъ. Молодыя около 9 дней остаются слѣпыми и покрыты первоначально ключковатымъ желтымъ пухомъ; кормленіе ихъ производится такимъ же образомъ, какъ у домашнихъ голубей. Замѣчательно то, что вяхирь, бывшій хоть однажды обезпокоенъ на гнѣздѣ, непремѣнно его покидаетъ, еслибъ даже въ немъ находились яйца почти досиженнія.

Видъ 2. Голубь-клиндухъ. *Columba oenas* Gm.

Columba oenas. Pallas, Zoographia. I. 559.—Двигубскій, Опытъ. 101.—Кесслеръ, Руководство. 267.—Симашко, Русская Фауна. Табл. 82. Фиг. 1, 2 — Naumann, Vögel Deutschlands. VI. 215. Taf. 151. fig 1, 2.—Temminck, Manuel. II. 445. IV. 308.—Tysenhaus, Ornithologia. II. 550.—Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 19.—Czernay, ibidem. 1850. I. 617.—Eichwald, Naturh. Skizze. 236.—Nordmann, Faune pontique. 215.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 92.

Голубь дикій, клиндухъ, климицъ.

Gołąb Siniak Jundziłł, Gołąb hurkot Zaw.

Клинухъ имѣетъ почти такое же географическое распространение, какъ вяхирь. Въ нашихъ губерніяхъ онъ встрѣчается гораздо чаще вяхира и дольше его у насъ гоститъ. Въ окрестностяхъ Кіева клиндухъ показывается обыкновенно въ началѣ Марта или даже подъ конецъ Февраля и бываетъ видимъ до конца Октября или до первыхъ дней Ноября.

Клинухъ обитаетъ всегда въ мѣстахъ лѣсистыхъ, но не любить глубины лѣсовъ, а держится болѣе по опушкамъ ихъ или въ маленькихъ рощахъ, смежныхъ съ лугами и полями. Вообще клиндухъ добываетъ себѣ кормъ предпочтительно на поляхъ, а потому и лѣтнія его пристанища находятся всегда по сосѣству отъ таковыхъ. Какъ скоро успѣютъ подросты молодыя, то клиндухи соединяются въ болѣе или менѣе многочисленныя стада и тогда уже цѣлый день скитаются по полямъ, лугамъ и степямъ. Въ окрестностяхъ Кіева подобныя стада начинаютъ появляться уже во второй половинѣ Іюля и часто бываютъ смѣшаны съ чибесами, особенно на низменныхъ лугахъ, которые растилаются вдоль береговъ Днѣпра. Самыя огромныя стада клиндуховъ, содержащія иногда иѣсколько сотъ штукъ, встрѣчаются однако во время главнаго осеннаго ихъ пролета, то есть отъ конца Августа до начала Октября.

Въ быстротѣ и легкости полета клиндухъ едва ли уступаетъ какой нибудь другой птицѣ, но тѣмъ не менѣе при самомъ взлѣтѣ, подобно вяхирю, частыми ударами крыльевъ производить довольно сильный шумъ. По землѣ бѣгаеть также очень проворно. Голосъ его замѣтно тонче и тише, нежели голосъ вяхира.

Клинухъ питается преимущественно сѣменами хлѣбныхъ растеній, особенно пшеницею, ячменемъ, овсомъ, грѣчишкою и горошкомъ, но есть также сосновое сѣмя, жолуди, различныя ягоды и другія подобныя вещества.

Гнѣздо клиндуха находится всегда въ дуплахъ старыхъ деревьевъ и состоитъ изъ кучки сухихъ прутиковъ и листьевъ, сложенныхъ безъ всякаго порядка и искусства. Яйца, которыхъ въ каждомъ гнѣздѣ бываетъ два, то коротко-ovalны, то болѣе продолговаты, но всегда совершенно бѣлы. При насиживаніи ихъ, которое продолжается 17 или 18 дней, голубка чередуется съ голубемъ. Молодыя первоначально чрезвычайно безобразны и покрыты длиннымъ, рѣдкимъ, клочковатымъ пухомъ. Они около девяти дней бываютъ слѣпыми и вообще до четырехъ недѣль остаются въ гнѣздѣ. Старая обнаруживаетъ большую привязанность и къ яицамъ и къ молодымъ, и кормятъ послѣднихъ такимъ же точно способомъ, какъ домашніе фазули.

Видъ 3. Голубь-горлица. *Columba turtur L.*

Columba turtur. Pallas, Zoographia. I. 564.—Двигубскій, Опытъ. 108.—Кесслеръ, Руководство 268.—Симашко, Русская Fauna. Таб. 82, фиг. 3—5.—Naumann, Vögel Deutschlands. VI. 233. Taf. 152. fig. 1, 2.—Temminck, Manuel. II. 448. IV. 312.—Tysenhausz, Ornithologia II. 551.—Andrzejowski, Rys Botaniczny. 81. Bull. de Moscou. 1839. I. 19.—Czernay, ibidem. 1850. I. 617.—Eichwald, Naturh. Skizze. 236.—Nordmann, Faune pontique. 216.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 92.

Горлица, горинка, горленокъ, туркавка.

Gołąb Turkawka Kluk.

Горлица водится во всѣхъ почти странахъ Европы, Азіи и Африки. Въ Европѣ она подвигается впрочемъ на сѣверъ не такъ далеко, какъ другіе голуби, и въ Россіи напримѣръ составляетъ уже рѣдкость въ южной полосѣ Лифляндіи. Въ нашихъ губерніяхъ она лѣтомъ встрѣчается вездѣ во множествѣ, но прилетаетъ весною гораздо поздже и улетаетъ осенью замѣтно раньше, нежели другіе голуби. Въ окрестностяхъ Кіева появляется обыкновенно во второй половинѣ Апрѣля и исчезаетъ опять въ началѣ Сентября.

Горлица обитаетъ у насъ во всѣхъ лѣсахъ, большихъ и малыхъ, хвойныхъ и лиственныхъ, а часто поселяется также въ маленькихъ рощахъ и въ садахъ, въ ближайшемъ сосѣдствѣ отъ сель и городовъ. Необходимое жизненное условіе для нея составляетъ чистая, текучая вода и потому она вѣтъ гнѣздо всегда въ возможно близкомъ разстояніи отъ рѣки или хоть отъ маленькаго ручейка. Обыкновенно она прилетаетъ къ водѣ около полудня или подъ вечеръ, избираетъ при ней мѣстечко, болѣе или менѣе скрытое и вмѣстѣ съ тѣмъ удобное для купанія, въ остается тутъ иногда довольно долго. Часто также посѣщаетъ, для отысканія корма, близкія отъ обиталища ея поля и степи, или бѣжалыя дороги. Притомъ же она гораздо довѣрчивѣе другихъ голубей и нерѣдко позволяетъ человѣку подойти или подѣхать къ ней на самое близкое разстояніе. Она любить сообщество себѣ подобныхъ и потому рѣдко попадается по одиночкѣ, а почти всегда семьями и маленькими стадами, но съ другой стороны никогда не встрѣчается такими огромными ватагами, какъ клиндухъ.

Полетъ горлицы необыкновенно легкій и быстрый; она производитъ значительный шумъ ударами крыльевъ только тогда, когда поднимается съ земли или срывается съ дерева. Походка ея очень живая, красивая, и вообще всѣ ея

движения отличаются большою ловкостью и стройностью. Голубь и голубка питаются другъ къ другу большую привязанность и часто занимаются изъявленіями взаимной вѣжности. Довольно приятное турруканье, которымъ голубь призываетъ и потѣшаетъ голубку, замѣтно отличается отъ воркованія другихъ голубей.

Горлица питается сѣменами очень разнородныхъ растеній, по самый любимый ея кормъ, по видимому, составляютъ сѣмена хвойныхъ деревъ, сѣмя коноплянное, льняное и рѣповое, горошекъ и пшеница.

Горлица помѣщаетъ свое гнѣздо то на маленькихъ деревьяхъ, то на кустарникахъ, но всегда въ мѣстѣ весьма густомъ и не очень высоко отъ земли (мнѣ случалось находить гнѣзда, которые находились отъ земли не выше 4 или 5 футовъ). Гнѣздо состоитъ изъ сухихъ прутиковъ и травинокъ, очень безъискусственно между собою связанныхъ, и содержитъ по срединѣ небольшое углубленіе для помѣщенія яицъ. Этихъ послѣднихъ въ немъ бываетъ всегда два; они имѣютъ правильно-ovalную форму и совершенно бѣлы. Въ насиживаніи ихъ, которое продолжается 16 или 17 дней, участвуютъ и голубка и голубь. Молодыя, подобно какъ у другихъ голубей, первоначально бываютъ слѣпы, покрыты желтымъ пухомъ и очень неуклюжи. — Въ нашихъ мѣстахъ горлица выводитъ молодыхъ два раза въ лѣто. Молодыя первой выводки оставляютъ гнѣздо около половины Іюля, а молодыя второй выводки въ началѣ Августа.

Примѣчаніе. Не знаю, встрѣчается ли гдѣ либо въ нашихъ губерніяхъ голубь полевой (*Columba livia Briss.*), отъ котораго, какъ полагаютъ, ведетъ свое происхожденіе голубь домашній и который, по свидѣтельству Графа Тизенгауза, водится изрѣдка въ Литвѣ (около мѣстечка Троки, Виленской губерніи). Скалистые берега Днѣстра должны представлять, по видимому, удобныя для него пристанища.

В. НАСТОЯЩІЯ КУРИНЫЯ ПТИЦЫ.

РОДЪ II. ТЕТЕРЕВЪ. *TETRAO L.*

Видъ 4. Тетеревъ глухой. *Tetrao urogallus L.*

Tetrao urogallus. Pallas, Zoographia. II. 56. — Двигубскій, Опытъ. 105. — *Tetrao urogallus.* Кесслеръ, Руководство. 270.—Симашко, Русская Фауна. Таб. 85, фиг. 1—3.—

Naumann, Vögel Deutschlands. VI. 277. Taf. 154, 155.—*Temminck*, Manuel. II. 457. IV. 317.—*Tysenhaus*, Ornithologia. III. 66—*Güldenstaedt*, Reise II. 409.—*Andrzejowski*, Bull. de Moscou. 1839. I. 18.—*Czernay*, ibidem. 1850. I. 617.—*Eichwald*, Naturh. Skizze. 236.—*Nordmann*, Faune pontique. 219.—*Zawadzki*, Galiz. Fauna. 93.

Тетеревъ глухой, глухарь, мошникъ; въ Лапландії самецъ — мошенъ, самка — копало; въ Архангельскѣ чукарь и тятгёра.

Głuszec właściwy Rzacz., Kniejotok *Głuszec Zaw.*

Глухой тетеревъ или глухарь водится почти исключительно въ холодныхъ и умѣренныхъ странахъ Европы (Графъ Фонъ — деръ — Мюле находилъ его впрочемъ также въ Греціи) и въ Сибири. У насъ онъ встрѣчается, въ довольно значительномъ числѣ, въ сѣверной полосѣ губерній Кіевской и Волынской и во всей почти губерніи Черниговской.

Глухарь постоянно обитаетъ въ большихъ хвойныхъ лѣсахъ и избираетъ въ нихъ своимъ пристанищемъ мѣста самыя уединенные, особенно болотистыя. Притомъ же онъ никогда не удаляется далеко отъ мѣста, въ которомъ однажды поселился, и потому принадлежитъ къ птицамъ совершенно осѣдлымъ. Въ продолженіи лѣта глухарь держится предпочтительно на землѣ и только изрѣдка взлетаетъ на деревья; отъ осени до весны напротивъ того онъ живетъ болѣе на деревьяхъ, именно на самыхъ высокихъ, и рѣдко спускается на землю. — Всѣ движенія глухаря тяжелы и полетъ его очень шуменъ; особенно сильный трескъ онъ производить, когда поднимается съ земли. Обыкновенно онъ летитъ въ совершенно прямомъ направлѣніи и отлетаетъ сразу очень не далеко, но вмѣстѣ съ тѣмъ весьма остороженъ и не легко подпускаетъ къ себѣ человѣка на близкое разстояніе.

Питается глухарь очень разнородными веществами, сосновыми и еловыми иглами, почками различныхъ лиственныхъ деревъ, ягодами, насѣкомыми. Кроме того онъ имѣеть обычай глотать маленькие камешки и раковинки, служащіе для скорѣйшаго растиранія пищи въ желудкѣ.

Половыя и семейныя отношенія глухаря представляютъ много любопытныхъ явлений. Глухарь — самецъ не соединяется постояннымъ бракомъ съ глухарицей, а ведетъ почти круглый годъ жизнь совершенно уединенную. Только весною онъ отыскиваетъ и сзываетъ къ себѣ самокъ и остается съ ними до тѣхъ поръ, пока онъ сядутъ на яйца. Въ продолженіи этого времени онъ взлетаетъ каждую ночь

на какое нибудь высокое дерево и тамъ, при наступлениі утренней зари, начинаетъ издавать различные странные звуки, сопровождая ихъ самыми забавными ужимками и тѣлодвиженіями; по восходженіи же солнца слетасть опять на землю къ ожидающимъ его самкамъ. Все это явленіе называется токомъ глухарей. Во время тока глухарь совершенно измѣняется въ характерѣ, бываетъ очень смѣль, неостороженъ и ничего какъ бы не видить, такъ что тогда очень легко бываетъ убить его изъ ружья. Если два самца встрѣтятся въ присутствіи самокъ, то начинается между ними ожесточенный бой и продолжается до тѣхъ поръ, пока одинъ изъ нихъ не будетъ принужденъ обратиться въ бѣгство. Въ окрестностяхъ Кіева токъ глухарей, продолжающійся около трехъ недѣль, бываетъ въ Мартѣ мѣсяцѣ. По окончаніи тока самецъ опять покидаетъ самокъ, такъ, что всѣ заботы о гнѣздахъ и о молодыхъ лежать совершенно на этихъ послѣднихъ. Гнѣздо впрочемъ бываетъ очень безискусственное и состоитъ только изъ вырытаго въ землѣ небольшаго углубленія, выстланаго сухими листьями и травинками. Глушица несетъ отъ 6 до 12 яицъ и сидитъ на нихъ около четырехъ недѣль. Яица, величиною равныя куриннымъ, на блѣдно-желтомъ грунтѣ усыяны темными точками и крапинками. Молодыя тотчасъ по выходѣ изъ яицъ бываютъ уже въ состояніи бѣжать за маткою, которая уводитъ ихъ въ мѣста, представляющія имъ обильный кормъ, вообще заботится о нихъ съ болѣшою нѣжностью и защищаетъ ихъ съ опасностью собственной жизни.

Видъ 5. Тетеревъ черный. *Tetrao tetrix L.*

Tetrao tetrix. Pallas, Zoographia. II. 59.—Двигубскій, Опытъ. 106.—Кесслеръ, Руководство. 270. — Симашко, Русская Фауна. Таб. 86. Фиг. 1, 2.—Naumann, Vögel Deutschlands. VI. 324. Taf. 157.—Temminck, Manuel. II. 460. IV. 320. — Tysenhauz, Ornithologia. III. 70. — Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 18. — Czernay, ibidem. 1850. I. 617.—Güldenstaedt, Reise. II. 363, 395. — Eichwald, Naturh. Skizze. 236.—Nordmann, Faune pontique. 218. — Zawadzki, Galiz. Fauna. 93.

Тетеревъ, тетервакъ, косецъ, косачъ; самка: тетёрка, полуха, кополиха, косатка, мара́куша, польникъ, тетеревъ полевой.

Głusczec Cietrzew Rzacz., Kniejotok Cietrzew Zaw.

Черный тетеревъ водится въ тѣхъ же странахъ, въ которыхъ обитаетъ глухарь, но подается къ югу далѣе этого послѣдняго. Въ нашихъ губерніяхъ онъ находится

въ гораздо большемъ числѣ и болѣе распространенъ, нежели глухарь, встрѣчаясь не только во всей сѣверной ихъ полосѣ, но также и въ самыхъ южныхъ частяхъ губерній Полтавской, Киевской и Подольской.

Черный тетеревъ не очень разборчивъ относительно мѣста жительства: онъ обитаетъ то въ дремучихъ лѣсахъ, то въ маленькихъ рощахъ и кустахъ, а иногда водится даже на голыхъ поляхъ и степяхъ. Предпочтительно однако онъ держится въ лѣсахъ хвойныхъ и березовыхъ, избирая въ нихъ своимъ пристанищемъ такие участки, гдѣ между старыми деревьями пробивается густая молодая поросль, гдѣ находится много валежнику и гдѣ растутъ вересъ, брусника и черника. Кромѣ того онъ очень любить и такія мѣста, гдѣ лѣсные участки перемежаются съ пахатными полями, сѣнокосами, и съ болотами, поросшими клюквою. --- По полету и по походкѣ тетеревъ очень сходенъ съ глухаремъ, только что во всѣхъ движеніяхъ его обнаруживается болѣе легкости и проворства. Въ продолженіи лѣта тетеревъ держится почти постоянно на землѣ, а отъ осени до весны много бываетъ на деревьяхъ.

Тетеревъ питается очень разнородными веществами, соображаясь въ этомъ отношеніи съ мѣстностью и съ временемъ года. Зимою главную пищу его составляютъ почки березовыхъ, ольховыхъ и осиновыхъ, сосновыя иглы и другія подобныя части; весною онъ кормится преимущественно нѣжными молодыми листочками травъ, а лѣтомъ и осенью есть какъ ягоды и сѣмена, такъ насѣкомыхъ, червяковъ, слизняковъ.

Между тетеревами, подобно какъ между глухарями, не бываетъ постоянныхъ брачныхъ соединеній, а самцы находятся при самкахъ только весною, когда токуютъ. Токъ тетеревей начинается у пасъ обыкновенно около половины Марта и продолжается до конца Апрѣля. Тетерева не токуютъ впрочемъ по одинакѣ, подобно глухарямъ, а по большей части собирается ихъ нѣсколько въ одномъ мѣстѣ и тутъ происходятъ между ними жестокія драки. Вообще тетеревъ и въ остальное время года не ведеть такой уединенной жизни, какъ глухарь, а очень часто нѣсколько старыхъ самцовъ соединяются вмѣстѣ и составляютъ какъ бы одно общество. Это особенно замѣтно бываетъ въ позднюю осень и зимою, когда они держатся преимущественно на деревьяхъ и часто цѣльными стадами скитаются съ мѣста на мѣсто.

Тетерка одна занимается насиживаніемъ яицъ и одна печется о молодыхъ. Она не вьетъ настоящаго гнѣзда, а вырываетъ небольшую ямочку въ землѣ и вы-

стиластъ ее сухими листьями и травинками. Несетъ отъ 5 до 12 яицъ, которые по величинѣ и по формѣ походятъ на яйца домашней курицы, но бываютъ желтоватобураго цвѣту, съ темнобурыми пятнышками и точками. Насиживание продолжается около четырехъ недѣль. Молодыя по выходѣ изъ яйца тотчасъ слѣдуютъ за маткою, которая показываетъ большую привязанность къ нимъ и часто, для охраненія ихъ, подвергаетъ опасности собственную жизнь. Они начинаютъ летать, когда бываютъ еще очень малы; въ окрестностяхъ Кіева уже въ первой половинѣ Іюня.

Видъ 6. Тетеревъ-рябчикъ. *Tetrao bonasia L.*

Tetrao bonasia. Pallas, Zoographia. II. 70.—Двигубскій, Опытъ. 106.—Кесслеръ, Руководство. 271.—Симашко, Русская Fauna. Таб. 86. Фиг. 3, 4.—Naumann, Vögel Deutschlands. VI. 358. Taf. 158.—Temminck, Manuel. II. 463. IV. 321.—Tysenhausz, Ornithologia. III. 75.—Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 18.—Eichwald, Naturh. Skizze. 236. Güldenstaedt, Reise. II. 409.—Nordmann, Faune pontique. 219.—Zawadzki, Galiz. Fauna. 94.

Рябчикъ, рябокъ.

Głuszec Jarząbek Rzacz.

Рябчикъ водится въ холодныхъ и умѣренныхъ странахъ Европы и во всей почти Сибири. У насъ встрѣчается только въ губерніи Черниговской и въ сѣверной полосѣ губерній Кіевской и Волынской, и то довольно рѣдко.

Рябчикъ принадлежитъ къ числу птицъ осѣдлыхъ, никогда даже и временно не покидающихъ своей родины. Онъ обитаетъ въ большихъ лѣсахъ, хвойныхъ или смѣшанныхъ, и избираетъ въ нихъ своимъ пристанищемъ самые уединенные и густые участки. Онъ бываетъ болѣе на землѣ, нежели на деревьяхъ, а когда взлетаетъ на деревья, то держится обыкновенно на нижнихъ сучьяхъ. Сидя на деревѣ рябчикъ чрезвычайно искусно умѣетъ укрываться отъ выглядывающаго его охотника; онъ въ этомъ случаѣ такъ сильно вытягивается и такъ плотно прижимается къ сучку, на которомъ сидитъ, что только опытный глазъ въ состояніи бываетъ его различить. Когда рябчикъ срывается съ земли, то производить крыльями довольно сильный трескъ, но впрочемъ летаетъ очень быстро. По землѣ бѣгаetъ также весьма шибко, а на деревьяхъ, въ случаѣ надобности, съ большимъ проворствомъ перепрыгиваетъ съ одного сучка на другой. Выводка

рябчиковъ, согнавшиа съ земли, улетаетъ обыкновенно не далеко, но рѣдко садится опять тотчасъ на землю, а разсыпается по ближайшимъ деревьямъ.

Лѣтомъ рябчикъ питается предпочтительно насѣкомыми и ихъ личинками, которыхъ вырываетъ ногами изъ земли, но очень охотно есть также различные ягоды, какъ-то: бруснику, землянику, малину, бузину, рябину. Осеню и зимою, при недостаткѣ въ ягодахъ, довольствуется серёжками березовыми и ольховыми, или даже сосновыми иглами.

Обыкновенно самецъ довольствуется одною самкою, но отлучается отъ нея, когда она сидитъ на яицахъ, и присоединяется къ выводку уже тогда, когда молодыя немного подростутъ. Самка не вьетъ настоящаго гнѣзда, а приготовляетъ для яицъ лишь тонкую подстилку изъ сухихъ травинокъ и листьевъ. Число яицъ простирается отъ 6 до 12; они едва больше голубиныхъ и на буроватожелтомъ грунтѣ усыпаны краснобурыми пятнышками и точками. Насиживание продолжается немного болѣе трехъ недѣль, при чёмъ матка рѣдко сходитъ съ яицъ и когда это случится, то, для безопасности, всегда закрываетъ ихъ листьями. Молодыя, только что вылупившіяся изъ яицъ, уже способны бывать слѣдовательно за маткою, которая заботится о нихъ съ большою щѣжностью и очень старательно пріучаетъ ихъ къ отыскиванію приличнаго корма.

Примѣчаніе. Бѣлый тетеревъ или такъ называемая бѣлая куропатка (*Tetrao albus* Gm.), сколько мнѣ известно, не встрѣчается вовсе въ нашихъ губерніяхъ. Графъ Тизенгаузъ считаетъ рѣку Нѣманъ юго-западною границею ея распространения.

РОДЪ III. КУРОПАТКА. *PERDIX BRISS.*

Видъ 7. *Куропатка спрая.* *Perdix cinerea Briss.*

Perdix cinerea. Двигубскій, Опытъ. 110 — Кесслеръ, Руководство. 274.— Симашко, Русская Фауна. Таб. 92, фиг. 1—4.—Naumann, Vögel Deutschlands. VI. 477. Taf. 163.—Temminck, Manuel. II. 488. IV. 334.—Tysen-hauz, Ornithologia. III. 106.—Andrzejowski, Bull. de Moscou. 1839. I. 18.—Czernay, ibidem. 1850. I. 617.—Güldenstaedt, Reise II. 363.—Eichwald,

Naturh. Skizze. 236. Nordmann, Faune pontique. 220. — Zawadzki, Galiz. Fauna. 95.

Tetrao perdix. Pallas. Zoographia. II. 77.—Andrzejowski, Rys Botaniczay. 81.

Куропатка, куропатка сѣрая, въ Сибири рябикъ полевой или степной, въ Дауріи рябчикъ каменный.

Kuropatwa właściwa Jarocki, Kuropatwa pospolita Zaw.

Сѣрая куропатка водится во всей почте Европѣ, въ югозападной Сибири, Грузіи, Малой Азіи и сѣверной Африкѣ. Въ самомъ большомъ числѣ встречается въ умеренной полосѣ Европы, къ которой принадлежать и наши губерніи. Нагдѣ однако у насъ не бываетъ въ такомъ множествѣ, какъ въ нѣкоторыхъ частяхъ Германіи и Франціи.

Куропатка птица осѣдлая и никогда почти не удаляется далеко отъ того мѣста, въ которомъ выведена. Для нея составляютъ любимое пристанище такие поля и луга, которые перемежаются съ кустарниками; но часто она обитаетъ также на обширныхъ голыхъ степяхъ, или же встречается въ садахъ и рощахъ; только въ большихъ лѣсахъ никогда не бываетъ. Притомъ же она постоянно держится на землѣ и никогда не взлетаетъ на деревья. Бѣгаеть очень скоро и летаетъшибко, но на лету частитъ ударами крыльевъ и производить такимъ образомъ сильный шумъ. Вообще во всѣхъ движеніяхъ ея обнаруживаются сила и проворство.

Въ продолженіи лѣта главную пищу куропатки составляютъ различные насѣкомые (особенно маленькие жуки, кузнецики, муравьи) и ихъ личинки, для добытія которыхъ она много роется въ землѣ. Осеню она кормится преимущественно сѣменами травъ и зернами хлѣбныхъ растеній, особенно пшеницею, ячменемъ и овсомъ, зимою же и въ началѣ весны прибѣгааетъ къ молодымъ росткамъ и листочкамъ. Когда выпадетъ зимою глубокій снѣгъ и особенно если, послѣ легкой оттепели, снѣгъ покроется твердою ледяною корою, какъ это въ нашихъ мѣстахъ часто случается, то куропаткамъ приходится очень плохо. Они не въ состояніи бываютъ вкопаться въ снѣгъ и не могутъ достать себѣ корма, такъ что умираютъ иногда съ голода. Хлѣбные скирды и огороды составляютъ въ этомъ случаѣ главное ихъ убежище. — Къ человѣку куропатки не привыкаютъ и не дѣлаются ручными.

Куропатки живутъ обыкновенно отдѣльными семьями или выводками; въ рѣдкихъ только случаихъ несколько полныхъ выводковъ соединяются въ одно стадо.

Чаще случается, что молодые такой выводки, отъ которой убиты старые, пристаютъ къ другой, полной выводкѣ. Всюю однако каждая выводка разбивается на отдельные пары, и, такъ какъ число самцовъ бываетъ часто болѣе числа самокъ, то между ними происходятъ тогда жестокія драки. Самецъ, вступившій однажды въ брачное соединеніе съ самкою, остается ей павсегда вѣрнымъ. Онъ не принимаетъ конечно никакого участія въ насиживаніи яицъ, но и въ это время не отлучается далеко отъ самки, старается ее предостеречь отъ всякой угрожающей ей опасности и потомъ раздѣляетъ съ нею всѣ заботы о воспитаніи молодыхъ. — Самка несетъ отъ 10 до 20 яицъ, для помѣщенія которыхъ вырываетъ въ земль ямочку и выстилаетъ ее сухими травинками. Яица блѣдно-зеленоватаго цвѣту и на одномъ концѣ сильно заострены; насиживаніе ихъ продолжается около трехъ недѣль. Молодые уже при самомъ выходѣ изъ яицъ имѣютъ на себѣ пеструю пуховую одежду и тотчасъ оставляютъ гнѣздо, чтобы слѣдоватъ за маткою. Въ нашихъ мѣстахъ они достигаютъ такой величины, чтобы ихъ можно было стрѣлять, обыкновенно не раньше Августа.

Примѣчаніе. Г. Андржіевскій, въ сочиненіи своемъ *Rys Botaniczny*, р. 81, говоритъ, что онъ находилъ, въ степяхъ между Днѣстромъ и Бугомъ, также красную куропатку (? *Perdix saxatilis* Meyer), но не означаетъ ближе мѣстности, въ Подольской ли губерніи, или въ Херсонской. Странно притомъ, что это обстоятельство могло ускользнуть отъ вниманія Профессора Нордманна.

РОДЪ IV. ПЕРЕПЕЛКА. *COTURNIX MEYER.*

Видъ 8. *Перепелка Европейская.* *Coturnix dactylisognans* *Meyer.*

Coturnix dactylisognans Кесслеръ, Руководство. 275. — Eichwald, Naturh. Skizze.

236. — Czernay, Bull. de Moscou. 1850. I. 617.

Perdix coturnix L. Днигубскій, Опытъ. 111. — Naumann, Vögel Deutschlands. VI. 575. Taf. 166. — Temminck, Manuel. II. 491. IV. 334. — Tysenhaus, Ornithologia. III. 111. — Güldenstaedt, Reise. II. 363. — Nordmann, Faune pontique. 221. — Zawadzki, Galiz. Fauna. 95.

Tetrao coturnix. Pallas, Zoographia. II. 80. — Andrzejowski, Rys Botaniczny. 81.
Перепелка, перепелица, перепель, подполуха.
Przepiółka właściwa Tys.

Перепелка водится во всей почти Европѣ, во многихъ странахъ Азіи и въ сѣверной Африкѣ. Въ Европѣ она принадлежитъ къ числу птицъ перелетныхъ, находящихся тутъ только на лѣтнемъ пребываніи, и подвигается притомъ на сѣверъ почти не далѣе 60° сѣверной широты. Въ нашихъ губерніяхъ перепелка встрѣчается повсюду, водится именно во множествѣ въ южной, степной ихъ полосѣ, какъ напримѣръ въ Константиноградскомъ уѣздѣ Полтавской губерніи. Въ окрестностяхъ Кіева показывается весною въ первой половинѣ Апрѣля, осенью же попадается по одиночкѣ до исхода Октября. Бывали даже случаи, что запоздалыя выводки перепелокъ оставались здѣсь зимовать.

Перепелка живеть почти исключительно въ мѣстахъ открытыхъ, на степяхъ и поляхъ, на лугахъ и болотахъ. Науманъ утверждаетъ, будто перепелка избѣгаетъ влажныхъ луговъ и болотъ, но это несправедливо; по крайней мѣрѣ въ окрестностяхъ Кіева она очень часто встречается въ подобныхъ мѣстахъ, особенно осенью. Для лѣтняго пребыванія перепелка, между прочимъ, весьма охотно избираетъ поля, засѣянныя пшеницею, а осенью часто во множествѣ находится въ гречихѣ. Перепелка бѣгаетъ чрезвычайно скоро и не охотно поднимается съ земли, такъ что, даже съ помощью легавой собаки, трудно бываетъ ее взогнать. Летаетъ она впрочемъ довольношибко, но низко надъ землею и въ совершенно прямомъ направлении; рѣдко притомъ пролетаетъ сразу далеко, а почти всегда садится опять скоро на землю. На самомъ взлетѣ производить частыми ударами крыльевъ довольно сильный шумъ. — Перепелка ведетъ жизнь почти совершенно ночную; днемъ сидѣть обыкновенно спокойно въ какомъ нибудь потаенномъ мѣстечкѣ и только съ наступленiemъ сумерекъ выбѣгаєтъ на пищедобываніе. Гдѣ много перепелокъ, тамъ по ночамъ со всѣхъ сторонъ раздается тонкій ихъ голосокъ. Перепель — самецъ имѣетъ весною особенный, ловально странный, но вмѣстѣ съ тѣмъ звучный и приятный напѣвъ, для которого его иногда парочно ловятъ и содержать въ комнатѣ. Въ неволи перепелка вообще, противуположно куропаткѣ, очень скоро ручибетъ.

Перепелка питается какъ маленькими насѣкомыми, такъ сѣменами и зернами хлѣбныхъ растеній и различныхъ травъ. Подобно всѣмъ другимъ куринымъ птицамъ, она глотаетъ также маленькие камешки, служащіе для скорѣйшаго размельченія пищи въ желудкѣ.

Неизвестно достовѣрно довольствуется ли самецъ—перепель одною самкою, или живетъ въ многоженствѣ; по всѣмъ имѣющимся даннымъ послѣднее вѣроятнѣе. Во всякомъ случаѣ онъ очень влюбчивъ и непостояненъ, оставляетъ самку, какъ скоро она сядетъ на яица, и не принимаетъ никакого участія въ воспитаніи моло-дыхъ. Самка несетъ отъ 8 до 15 яицъ, для помѣщенія которыхъ дѣлаетъ въ земль ямочку и выстилаетъ ее слегка сухими травинками. Яица имѣютъ форму почти грушевидную и бываютъ буроватожелтаго цвѣту, съ темнобурыми пятнышками и точками; насиживаніе продолжается отъ 15 до 20 дней. Молодыя, тотчасъ по вылупленіи изъ яицъ, оставляютъ гнѣздо и слѣдуютъ за маткою. Они развиваются чрезвычайно быстро, такъ что уже чрезъ двѣ недѣли начинаютъ летать, и тогда обыкновенно не остаются уже долго вмѣстѣ, а болѣе или менѣе разсѣиваются. — Замѣчательно то обстоятельство, что перепелки обыкновенно весьма поздно при-ступаютъ къ кладкѣ яицъ и къ высиживанію молодыхъ. Въ окрестностяхъ Кіева мнѣ никогда не случалось находить летающихъ молодыхъ перепелокъ раньше первыхъ чиселъ Іюля, а напротивъ того довольно часто приходилось встрѣчать моло-дыхъ въ пуху еще подъ конецъ Августа и даже въ началѣ Сентября.

