

А. Ю. ЛАШКАРЕВЪ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КЛАССИФИКАЦІЯ ЛУГОВЫХЪ ТРАВЪ

ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КЛАССИФИКАЦІЯ

ГЛАВНѢЙШИХЪ СОРТОВЪ

ЛУГОВЫХЪ ТРАВЪ

СЪ КРАТКИМЪ ОПИСАНИЕМЪ

КАЖДОЙ ТРАВЫ ВЪ ОТДѢЛЬНОСТИ.

— * —

Печатается съ разрѣшенія Главнаго Интенданта и санкціи Военнаго Совѣта.

— * —

Составилъ Штабсъ-Ротмистръ Главнаго Интендантскаго Управленія

А. Ю. Лашкаревъ.

— * —

ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ.

— * —

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЗАГОТОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БУМАГЪ.

1898.

ПРЕДИСЛОВIE.

Въ своемъ руководствѣ я старался дать каждому лицу, имѣющему дѣло съ сѣномъ, такой матеріалъ, благодаря которому, онъ сразу, по наружному виду, могъ бы легко опредѣлить сортъ, название травы, зналъ бы какая годная, негодная, какая безусловно вредная или ядовитая, могъ бы слѣдить за правильностью укоса травъ вообще, хорошей сортировкой и во всякомъ случаѣ могъ бы обойтись безъ выписки всевозможныхъ руководствъ, которыхъ или слишкомъ кратки и ненаглядны, или заключаютъ въ себѣ такія ботаническія подробности, на изученіе коихъ требуются или специальная ботаническія познанія, или же много лѣтъ на ихъ изученіе.

Всякому лицу, занимающемуся травосѣяніемъ, или продажей и покупкой сѣна вообще, или выращиваніемъ скота, или откормкой такового, необходимо стоять на высотѣ своего назначенія при опредѣленіи годности его и тѣмъ самыемъ избѣжать критики при продажѣ и обмана при покупкѣ его, а любителямъ коневодства—сохранить здоровье коня.

Надѣюсь, что въ практическомъ примѣненіи мой трудъ принесетъ ту пользу въ сѣнномъ дѣлѣ, которую я единствено при его изданіи преслѣдовалъ, и оправдаетъ собою оцѣнку его профессорами ботаники, отзывы коихъ при семъ прилагаются, и одобреніе Ученаго Комитета, состоящаго при Министерствѣ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Штабсъ-Ротмистръ А. Ю. Лашкаревъ.

1898 г., Февраль.

I. Разсмотрѣвъ составленный Штабсъ-Ротмистромъ Главнаго Интендантскаго управления Лашкаревымъ атласъ луговыхъ травъ, съ пояснительнымъ къ нему текстомъ, я нахожу рисунки составленными въ ботаническомъ отношеніи вполнѣ правильно и текстъ не содержащимъ научныхъ ошибокъ. Рисунки отличаются къ тому же большою наглядностью. Изданіе такого атласа можетъ принести, по моему убѣжденію, большую пользу. Профессоръ Императорской Военно-Медицинской Академіи и Лѣсного Института, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ И. Бородинъ. 9 Октября 1897 г.

II. Представленные Штабсъ-Ротмистромъ Главнаго Интендантскаго управлениі А. Ю. Лашкаревымъ рисунки луговыхъ растеній выполнены столь отчетливо и близко къ природѣ, что всякий, даже не посвященный въ систематику растеній, въ состояніи узнатъ то или другое растеніе при первомъ взглядѣ на соответствующій рисунокъ. Что же касается до относящагося къ этимъ рисункамъ текста, то онъ находится въ видимомъ согласіи съ содержаніемъ поименованныхъ авторомъ литературныхъ источниковъ. Ординарный профессоръ Императорскаго С.-Петербургскаго университета *Хр. Гоби.* 10 Октября 1897 г.

III. Представленные Штабсъ-Ротмистромъ Главнаго Интендантскаго управлениі Лашкаревымъ рисунки луговыхъ травъ сдѣланы правильно и точностю своею отвѣчаютъ вполнѣ своему назначению: служить образцами для предполагаемаго имъ къ изданию руководства «Классификація луговыхъ травъ, встречающихся на русскихъ лугахъ». Самое руководство составлено практически и можетъ послужить къ болѣе легкому и правильному распознанію травъ, входящихъ въ составъ сѣна. Какъ то, такъ и другое, будучи изданымъ, принесетъ большую пользу. Директоръ Императорскаго С.-Петербургскаго ботаническаго сада *Фишеръ фонъ-Вальдегеймъ.* 11 Октября 1897 г.

Свѣдѣнія для этого изданія почерпнуты изъ разныхъ новѣйшихъ руководствъ
спеціалистовъ по ознакомленію съ травами:

Маевскаго — «Флора Средней Россіи»	изд. 1895 г.
Ланеталь — т. 1-й и 2-й	изд. 1876 и 1877 ,
Остафьевса — «Луга и Пастбища»	изд. 1882 ,
Костычева — «Воздѣлываніе кормовыхъ травъ»	, 1895 ,
Котельникова — «Травосѣяніе»	, 1897 ,
Семиловскаго — (Gospodarstvo Lakowe) «Культура луговъ»	, 1890 ,
Дремцова — «О посѣвѣ травъ»	, 1894 ,
Вильморена — «Атласъ»	—
Шмальгаузена — «Флора Юго-Западной Россіи»	, 1886 ,
Стеблера, Шредера, Вельтера — «Les meilleures plantes fourragères»	, 1896 ,
Корневенъ — «Ядовитыя растенія», переводъ профессора Гоби	, 1895 ,
Изъ статей: Демоора, Мертваго, Герцика, Бернштейна, Калантара, Айзенберга, Волкова, Рева — о разныхъ кормовыхъ травахъ, встречающихся на русскихъ лугахъ	, 1894 ,

ГЛАВНІЙШІЯ ТРАВЫ

раздѣляются на слѣдующія групсы:

- I. ЗЛАКИ — листья линейные, простые; цилиндрическій узловой стебель, выметывающій во время цветенія или колось, или метелку.
- II. БОБОВЫЯ — листья сложные, лапчатые или чаще перистые; плоды въ видѣ боба.
- III. ПРЯНЫЯ и ЗОНТИЧНЫЯ — укрѣпляющаго и возбуждающаго свойства, способствуютъ пищеваренію; цветки расположены зонтикомъ.
- IV. ОСОКОВЫЯ, СОРНЫЯ и КИСЛЫЯ — въ отличіе отъ хорошихъ злачныхъ — стебель трехгранный безъ узловъ у осоковыхъ, а у другихъ различный.
- V. ВРЕДНЫЯ — препятствуютъ росту хорошихъ травъ, различнаго вида, по большей части съ непріятнымъ запахомъ, неѣдомы.
- VI. ЯДОВИТЫЯ — различные по внѣшнему виду, содержащія въ себѣ сильно одуряющія вещества и яды, быстро вызывающіе признаки отравленія.

Эти же травы дѣлятся на:

- A. НИЗОВЫЯ — даютъ кусты и нѣсколько стеблей и называются также подсѣдомъ.
- B. ВЕРХОВЫЯ — даютъ мало кустовъ, но много стеблей, покрытыхъ листьями.

Луга, на которыхъ эти травы растутъ, раздѣляются на:

- 1) ПОЕМНЫЕ — заливаемые водой весною.
- 2) ГЛИНИСТЫЕ — тяжелая почва.
- 3) ПЕСЧАНЫЕ — рыхлая или легкая почва.
- 4) ИЗВЕСТКОВЫЕ или МЕРГЕЛЕВЫЕ — соединеніе песку и глины.
- 5) БОЛОТИСТЫЕ — требующіе осушенія.
- 6) ТОРФЯНЫЕ — требующіе осушенія и удобренія.
- 7) СОЛОНЧАКОВЫЕ — требующіе удобренія и сильной перепашки, а въ случаѣ мокроты — осушенія.

Классификація произрастанія травъ по качеству луговъ.

- 1) НА ПОЕМНЫХЪ — пырей, мятыникъ, бѣлая полевица, лисій хвостъ, пахучій колосъ, дикий овесъ, костеръ, лядвенецъ, клеверъ, горошки, тимофеевка и др.
- 2) НА ГЛИНИСТЫХЪ — лисій хвостъ, тимофеева трава, ежа, овсяница, костеръ мягкий, цикорій, одуванчикъ и др.

- 3) НА ПЕСЧАНЫХЪ — полевица ползучая, медовая трава, а также встречается овсяница луговая (овечья), люцерна, бедренецъ, осока и др.
- 4) НА ИЗВЕСТКОВЫХЪ и МЕРГЕЛЕВЫХЪ — гребникъ, медунка, шалфей, эспарцетъ, клеверъ, мать-мачиха и др.
- 5) НА БОЛОТИСТЫХЪ — хвощъ, осока, ситники, лютикъ, калужница, плюшникъ, мятыникъ, камышъ, рогоза и др.
- 6) НА ТОРФЯНИСТЫХЪ — мохъ и большою частью вредныхъ и ядовитыхъ травы, а въ западномъ краѣ — верескъ.
- 7) НА СОЛОНЧАКОВЫХЪ — манникъ, ячмень морской, ситники, попутникъ, камышъ, полынь и др.

Самые лучшие луга черноземные съ суглинкомъ и, конечно, заливные. Свойства этой почвы: пропускать воду, поглощая ее въ значительномъ количествѣ и быстро испаряя лишнюю; долго сохранять какъ теплоту, такъ и скважность, способствующую доступу воздуха; быстро разлагать удобрения.

Глинистая почва связная, тяжелая и холодная. Вода испаряется медленно, застаивается; нѣжная сладкая травы тую растутъ.

Песочная почва легкая, рыхлая, быстро воспринимаетъ тепло, и трава на ней скоро поспѣваетъ; подвержена влиянию засухи, нуждается въ удобреніи, иначе растительность скудная.

Известковая почва сходна съ песчаной, но еще менѣе пригодна для луговъ; сильно поглощаетъ влагу, но не задерживаетъ ее; быстро разлагаетъ органическія вещества.

Известь въ соединеніи съ пескомъ и глиной даетъ прекрасную почву, называемую мергелевой.

Торфянистая и болотистая почвы содержатъ въ себѣ массу кислого перегноя, не дающего ходу хорошимъ травамъ; требуютъ осушенія и, въ случаѣ недостатка наноснаго ила при весеннихъ разливахъ, — удобренія.

Солончаковые почвы препятствуютъ появлению мало-мальски сносной растительности и обозначаются тамъ, где онѣ есть, грязновато-блѣдыми плѣшинами. Требуютъ сильной перепашки и удобренія, а главное, на нихъ не должна застаиваться вода.

Для урегулированія свойства почвъ вообще на лугахъ, необходима періодическая распашка застарѣлыхъ и затвердѣлыхъ мѣстъ, бороньба болѣе рыхлыхъ почвъ и распределеніе орошенія путемъ прорытія канавъ въ низкихъ мѣстахъ луга, где вода застаивается, и устройства оросительныхъ дамбъ, для орошенія высокихъ мѣстъ, которыя безъ этого не въ состояніи производить хорошей растительности.

Лучшими и дешевыми удобреніями въ лѣсистыхъ мѣстахъ — зола, а где таковой нѣтъ, — всѣ виды навоза, за исключеніемъ свиного, который, по своему свойству, засоряетъ луга вообще.

НАЗВАНИЕ ТРАВЪ

по группамъ, сортамъ, съ различными народными прозвищами и латинскимъ переводомъ. *)

I. ЗЛАЧНЫЯ или ЗЛАКИ.

Таблица 1. РАЙГРАССЪ	англійскій (Lolium perenne),	пшонецъ,	головоломъ.
„ 2. „	италіанскій (Lolium italicum)	„ „	„ „
„ 3. ЕЖА	сборная или обыкновенная (Dactylis glomerata),	лицальчикъ,	южа, плющица, ежовникъ, вивсюкъ, рѣсничникъ.
„ 4. ОВСЯНИЦА	луговая (Festuca pratensis),	заноска	луговая.
„ 5. „	тонконожка овечья (Festuca ovina).		
„ 6. „	разнолистная (Festuca heterophylla).		
„ 7. „	красная (Festuca rubra).		
„ 8. „	ячменка (Festuca Arundinacea Schreb.),	овсяница	тростниковая.
„ 9. ОВЕСЪ	луговой или французскій райграссъ (Avena elatior).		
„ 10. „	золотистый (Avena flavesens).		
„ 11. ТИМОФЕЕВКА	(Phleum pratense),	палочникъ,	коло́сь, съянецъ, аржанецъ, сивуха, степъ луговой, хобръ, брзанка.
„ 12. БАТЛАЧИКЪ	или ЛИСОХВОСТЬ луговой (Alopecurus pratensis),	дивый боръ,	коло́сокъ.
„ 13. ПАХУЧІЙ КОЛОСОКЪ	(Anthoxanthum odoratum),	кумарникъ.	
„ 14. ПОЛЕВИЦА	(Agrostis alba),	рѣзакъ,	тонконожка.
„ 15. МЕТЛА	луговая (Poa pratensis).		
„ 16. „	обыкновенная (Poa trivialis).		
„ 17. „	узколистая (Poa angustifolia).		
„ 18. „	льсная (Poa nemoralis).		
„ 19. „	песчаная (Poa collina).		
„ 20. КОСТЕРЪ	стоячій (Bromus erectus).		
„ 21. „	безостый (Bromus inermis).		
„ 22. „	мягкій (Bromus mollis).		

*) Латинскія названія здѣсь приведены на случай необходимости разбора травъ по специальнымъ сочиненіямъ. Разборы эти иногда неизбѣжны при возникновеніи пререканій между поставщикомъ и приемщикомъ о пригодности травъ или сѣна вообще.

Таблица 23. ГРЕБНИКЪ (*Cynosurus cristatus*), пѣтушиный гребешокъ, приплевчатка.

- ,, 24. МАННИКЪ обыкновенный (*Glyceria fluitans*), мышиный хвостъ.
- ,, 25. ПЫРЕЙ обыкновенный (*Triticum repens*), бороно, волокъ, житецъ.
- ,, 26. ТРЯСУНКА средняя (*Briza media*), трясучка.
- ,, 27. КАНАРЕЙНИКЪ (*Phalaris arundinacea*), шелковая трава.
- ,, 28. БУХАРНИКЪ (*Holcus lanatus*), лепехъ.

Такимъ образомъ чаще всего встречающихся злаковыхъ травъ 28 сортовъ, которые, въ свою очередь, заключаютъ въ себѣ нѣсколько видовъ: къ райграссу принадлежатъ три; къ овсяницѣ—пять; къ дикому овсу—два; къ мятыциѣ—пять, и къ костру—три и 10 разнородныхъ. Конечно, есть еще много родовъ и видовъ злаковыхъ, но я перечислилъ лишь тѣ, которые главнымъ образомъ должны быть известны, такъ какъ на практикѣ болѣе всего приходится съ ними сталкиваться. Появленіе ихъ на лугахъ не всегда бываетъ въ количественномъ отношеніи равномѣрно, такъ, напр., въ одинъ годъ бываетъ больше мятыковъ, въ другой больше костра или овсяницы. Это все зависитъ отъ весеннаго разлива, климатическихъ условій весны и суровости зимы.

Кромѣ разливовъ, дожди и тепло имѣютъ громадное влияніе на появленіе предпочтительно однѣхъ травъ передъ другими, точно также, какъ засухи и поздніе весенниe заморозки, которые не всѣми злаковыми переносятся одинаково.

II. ПРЯНЫЯ (зонтичные).

Таблица 29. ТМИНЬ (*Carum carvi*).

- „ 30. БЕДРЕНЕЦЪ (*Pimpinella saxifraga*).
- „ 31. ДЕРЕВЕЙ (*Achillea millefolium*), тысячелистникъ.
- „ 32. ОДУВАНЧИКЪ (*Taraxacum officinale*).
- „ 33. КОЗЛОБОРОДНИКЪ (*Tragopogon pratensis*), козелецъ.
- „ 34. ЦИКОРИЙ (*Cichorium intybus*).
- „ 35. ВАСИЛЕКЪ (*Centaurea scabiosa*).
- „ 36. ПОПУТНИКЪ (*Plantago lanceolata*), казакъ, козликъ, подорожникъ, прѣзникъ, узникъ.
- „ 37. ЧЕРНОГОЛОВНИКЪ (*Poterium sanguisorba*).
- „ 38. КРОВОХЛЕБКА (*Sanguisorba officinalis*).
- „ 39. ДИКАЯ ГОРЧИЦА (*Eruca* и *Sinapis alba*).
- „ 40. ЗОЛОТОТЫСЯЧНИКЪ (*Erytraea centaurium*).
- „ 41. МАУНЬ (*Valeriana officinalis*), земляной ладонь.
- „ 42. АИРЪ (*Acorus calamus*).
- „ 43. ВЯЗЕЛЬ (*Coronilla*).
- „ 44. ДИКАЯ РЯБИНА (*Tanacetum vulgare*), пижма.
- „ 45. ДУШИЦА (*Origanum vulgare*).
- „ 46. ВАХТА или ВАКХА (*Menyanthes trifoliata*), водяной трилистникъ.

Всѣ перечисленныя растенія называются прямыми и самостоятельно на лугахъ существовать не должны, въ виду отличительного свойства быть возбуждающими и иногда съ чрезвычайно острымъ вкусомъ. Они желательны, какъ примѣсь къ злакамъ, для сдабриванія прѣсноты послѣднихъ. Тогда они приносятъ большую пользу, облегчая пищевареніе и вводя въ желудокъ животнаго много укрѣпляющихъ и возбуждающихъ соковъ или, короче говоря, составляютъ приправу къ злачной травѣ и на лошадей оказываютъ прекрасное дѣйствіе. Видовъ пряныхъ растеній, конечно, гораздо больше, но здѣсь приведены нѣкоторыя болѣе популярныя между ними, изъ коихъ извлекаютъ очень полезныя лѣкарственные вещества.

Всѣ пряные растенія принадлежатъ къ низовымъ травамъ и въ отдельности не растутъ, а въ смѣси со злаками. Поэтому и укосы ихъ производятся одновременно съ послѣдними.

III. БОБОВЫЯ или МОТЫЛЬКОВЫЯ. *)

Таблица 47.	КЛЕВЕРЪ	красный (Trifolium pratense)
„	48.	„
„	49.	„
„	50.	„

- валашокъ, гоголечка, голо-
вокъ, красноголовка, дятлина
(въ Черниг. губ.); иvasикъ,
кашка, коничина (въ Польшѣ);
медуница (въ Вятской губ.);
трилистникъ, тройца (въ Смо-
ленской губ.); макушка (въ
Вологодск. губ.); сѣрое зелье,
конюшна (въ Полтавск. губ.);
язвенникъ, заячій клеверъ.
- „ 51. ЛЮЦЕРНА или МЕДУНКА обыкновенная (Medicago sativa), бурунчикъ,
степной вязель, мусюй, сиджи (Закав-
казье), имурокъ (Донъ).
- „ 52. „ „ „ хмѣлевая (Medicago lupulina).
- „ 53. ЛЮПИНЪ бѣлый (Lupinus albus).
- „ 54. „ „ „ желтый (Lupinus luteus).
- „ 55. „ „ „ голубой (Lupinus angustifolius).
- „ 56. „ „ „ синій (Lupinus hirsutus).
- „ 57. ЛЯДВЕНЕЦЪ (Lotus corniculatus), рогатая, полевая акація, богатень, заячий
братки, гороховникъ, горицвѣтъ, желтушка.
- „ 58. ДОННИКЪ (Melilotus dentatus), конскій зубъ, сибирскій бѣлый клеверъ.
- „ 59. ВИКА кормовая (Vicia sativa), горошекъ кормовой.
- „ 60. „ „ „ мохнатая или песчаная (Vicia villosa).

*) Бобовые травы здѣсь приводятся лишь для полноты свѣдѣній о травахъ вообще. Въ кормъ лошадямъ и вообще животнымъ, несмотря на ихъ безспорно хорошія качества въ питательномъ отношеніи, давать опасно, такъ какъ онѣ слишкомъ жирны, производятъ колики и вздутие живота. Лошади ими обжираются. Въ прессовку, вслѣдствіе отпаденія листьевъ и цвѣтковъ при оперaciї сѣнопрессованія, не годятся, за исключеніемъ прессовки ручнымъ прессомъ, который годится лишь для маленькихъ хозяйствъ.

Таблица 61. ЧИНА луговая (*Lathyrus pratensis*).

,, 62. ЭСПАРИШТЬ обыкновенный (*Onobrychis sativa*).

,, 63. ,,, (*Onobrychis hedisarum*), стругъ (въ Курской губ.), красный
буркунъ, заячій горохъ, ослянка турецкая, подковникъ,
пѣтушина дятлина.

Бобовые растения чрезвычайно взыскательны на почву, растутъ преимущественно на пахатныхъ поляхъ, а на лугахъ непрочны въ виду того, что не переносятъ сырости, весеннихъ разливовъ и неизбѣжно растущихъ другихъ травъ, которыя ихъ вытѣсняютъ. Требуютъ сильного удобрения; очень плохо переносятъ климатические варианты съверныхъ и даже среднихъ полосъ Россіи. Весьма сложны при уборкѣ и осыпаются очень сильно во время послѣдней, такъ что процентъ питательности, заключающейся именно только въ листьяхъ и цветахъ, отходитъ громадный, и, кромѣ того, не многолѣтни.

IV. ОСОКОВЫЯ, СОРНЫЯ и КИСЛЫЯ ТРАВЫ.

Таблица 64. СИТНИКИ (*Juncus*).

- „ 65. ПУШИЦА (ПУХОНОСЬ) болотистая (*Eriophorum latifolium*).
- „ 66. „ „ „ пахучая (*Eriophorum latifolium vaginatum*).
- „ 67. КАМЫШЬ болотный (*Scirpus palustris*).
- „ 68. „ (*Scirpus lacustris*).
- „ 69. ОСОКА (*Carex*).
- „ 70. РОГОЗА (*Typha*).
- „ 71. ХВОЩЪ (*Equisetum arvense*).
- „ 72. МОХЪ (*Musci*).
- „ 73. БѢЛОУСТЬ (*Nardus*), щетинница.
- „ 74. ЩАВЕЛЬ (*Rumex*).
- „ 75. ИРИСЪ (*Iris germanica*), касатикъ.

Всѣ эти травы непитательны, никуда не годны и потому не терпимы на лугахъ; главнымъ образомъ ихъ надо уничтожать еще и потому, что онъ препятствуютъ росту хорошихъ травъ; растутъ большею частью на болотистыхъ лугахъ и на тѣхъ мѣстахъ луга, гдѣ вода застаивается. Когда лугъ въ порядкѣ, то ихъ нѣть; вслѣдъ за осушеніемъ болотистыхъ и сырыхъ мѣстъ онъ тотчасъ же пропадаютъ.

V. ВРЕДНЫЯ ЛУГОВЫЯ ТРАВЫ.

Таблица 76. ШАЛФЕЙ (*Salvia pratensis*).

- „ 77. СТАЛЬНИКЪ колючій (*Ononis spinosa*).
 - „ 78. „ ползучій (*Ononis repens*).
 - „ 79. ДРОКЪ красильный (*Genista tinctoria*).
 - „ 80. БУДРА плющевидная (*Glechoma hederacea*).
 - „ 81. ГУСИНАЯ ЛАПКА (*Potentilla anserina*).
 - „ 82. ЛОПУШНИКЪ (*Lappa major*).
 - „ 83. НИВНЯКЪ или пупавка (*Chrysanthemum leucanthemum*).
 - „ 84. ПОГРЕМОКЪ (*Rhynanthus major*).
 - „ 85. МАТОЧНИКЪ или татарникъ огородный (*Cirsium oleraceum*).
 - „ 86. ПОВЕЛИКА (*Cuscuta europaea*).
 - „ 87. КАЛУЖНИЦА болотная (*Caltha palustris*).
 - „ 88. ВЕРЕСКЪ (*Calluna vulgaris*).
 - „ 89. БОГУЛЬНИКЪ (*Ledum palustre*).
 - „ 90. МАТЬ-МАЧИХА (*Tussilago farfara*).
-

VI. ЯДОВИТЫЯ ЛУГОВЫЯ РАСТЕНИЯ.

Таблица 91. ОСЕННИКЪ (*Colchicum autumnale*), безыменный цветокъ, песобой осенній.

- | | | | |
|---|------|--|------------|
| „ | 92. | ЛЮТИКЪ болотный (<i>Ranunculus aquatilis</i>) | } жабники. |
| „ | 93. | „ колючій („ <i>flammula</i>) | |
| „ | 94. | „ ядовитый („ <i>sceleratus</i>) | |
| „ | 95. | „ ёдкій („ <i>acris</i>) | |
| „ | 96. | ЧЕМЕРИЦА бѣлая (<i>Veratrum album</i>). | |
| „ | 97. | АВРАНЪ (<i>Gratiola officinalis</i>), лихорадочная трава, коневой трутъ. | |
| „ | 98. | БѢЛЕНА черная (<i>Nyoscyamus niger</i>). | |
| „ | 99. | БУТЕНЬ одуряющій (<i>Chaerophyllum temulus</i>). | |
| „ | 100. | „ дикій („ <i>sylvestris</i>). | |
| „ | 101. | СОБАЧЬЯ ПЕТРУШКА (<i>Aethusa cinapium</i>), кокорышъ. | |
| „ | 102. | БОЛИГОЛОВЪ крапчатый (<i>Conium maculatum</i>). | |
| „ | 103. | ДУРМАНЪ колючій (<i>Datura stramonium</i>). | |
| „ | 104. | ПАСЛЕНЪ черный (<i>Solanum nigrum</i>). | |
| „ | 105. | ПЛЕВЕЛЬ опьяняющій (<i>Lolium temulentum</i>), злакъ. | |
| „ | 106. | ПОРУЧЕЙНИКЪ (<i>Sium latifolium</i>). | |
| „ | 107. | ВЕХЪ ядовитый (<i>Cicuta virosa</i>). | |
| „ | 108. | МОЛОЧАЙ (<i>Euphorbia cyprissias</i>). | |

Эти растенія должны быть въ точности известны, такъ какъ отъ нихъ лошади дохнутъ. При первомъ появлениі, ихъ необходимо немедленно съ корнями выкапывать, выносить съ луга и сжигать.

Классификация злаковых травъ по степени ихъ питательности и качеству.

1. ОЧЕНЬ ХОРОШИЯ.	Овсяница луговая.
	Метла.
	Ежа сборная.
	Райграссъ французскій.
	Манникъ обыкновенный.
	Тимофеевка.
2. ХОРОШИЯ.	Полевица.
	Лисохвостъ или батлачикъ.
	Райграссъ италіанскій.
	„ англійскій.
	Овсяница овечья.
	Трясучка.
3. ПОСРЕДСТВЕННЫЯ.	Манникъ водяной.
	Овесъ золотистый.
	Гребникъ.
	Пырей.
	Костеръ мягкий.
	Пахучій колосокъ.
	Канарейникъ.
	Овесъ луговой.
	Костеръ безостый.

I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Ежа сборная или обыкновенная. *Dactylis glomerata* (липальчикъ, южа, плюшица, ежовникъ, вивсюкъ, рѣсничникъ).

Верховая трава, но послѣ первого укоса превращается въ низовую; многолѣтняя и отлично растетъ до 10 лѣтъ на всякой мало-мальски сносной почвѣ; переносить отлично зиму и жару, не любить болотистыхъ почвъ и песку. Весенниe разливы оказываютъ на ростъ ея прекрасное дѣйствіе и даже въ случаѣ продолжительности таковыхъ не портятъ ея качествъ. Въ тѣни растетъ еще лучше. Указывая своимъ присутствiемъ на превосходныя качества луга, ежа сама относится къ числу лучшихъ злаковъ и даетъ большую массу корма. Если сравнивать ее съ другими злаками, то получится: что французскій райграссъ даетъ хотя болѣе зеленаго корма, но менѣе сѣна, такъ какъ сильно усыхаetъ при сушкѣ; лисохвостъ даетъ сѣна нѣсколько менѣе, а тимофѣевка на $\frac{1}{4}$ менѣе, такъ какъ ежа послѣ первого покоса вырастаетъ быстро и снова быстро же зацвѣтаетъ. Очень питательна. Своимъ ростомъ показываетъ хорошiя качества луга.

Косить надо недѣли за двѣ до цвѣтенiя, иначе она грубѣеть. Даетъ отличное раннее сѣно; цвѣтетъ въ началѣ Іюня, а въ случаѣ ранней весны и въ концѣ Мая. Хорошiе укосы получаются съ третьего года послѣ посѣва. Урожай съ десятины отъ 250—300 пудовъ.



I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Тимофеевка. Phleum pratense (палочница, колось, съянецъ, аржанецъ, сивуха, степъ луговой, хобрь, бразанка).

Изъ злачныхъ травъ это безспорно лучшая трава. Верховая, растетъ на всякихъ почвахъ, многолѣтняя; даетъ укосы до 9 лѣтъ, а иногда и до 10, смотря по качеству почвы; переноситъ всякие климаты; великолѣпно растетъ на осущенныхъ частяхъ луга, гдѣ почва тяжелая, сырватая, холодная. Даетъ укосы со второго года посѣва, а если сѣять осенью, то великколѣпно кустится и съ весны входитъ уже въ силу настолько, что можно лѣтомъ ее косить. Весеннихъ разливовъ не боится, также и дождей. Вырождается въ смѣси съ костромъ и пыреемъ. Послѣднія двѣ травы ее глушатъ: первая — силой своего роста, вторая — силой своихъ расползающихся корней. Не требовательна на почву и въ крайнемъ случаѣ растетъ даже на болотахъ на торфѣ, любить водосоку, т.-е. такія влажныя мѣста на лугу, гдѣ вода хотя и не выступаетъ на поверхность, но при сильномъ нажиманіи ногой показывается. Предпочитаетъ вспаханную, хорошо выско роженную и выкатанную почву, а потому раздѣливать луга подъ нее надо тщательно, если желательно получить хороший урожай. Чѣмъ лучше будетъ сработана земля, тѣмъ продолжительнѣе и лучше будутъ укосы. Роста она на такихъ раздѣленныхъ мѣстахъ даетъ отъ 2-хъ до 4-хъ аршинъ, и въ первые годы ее приходится жать и только съ 3-го или 4-го года возможно ее косить. На высокихъ почвахъ не можетъ расти долго. Весеніе разливы и иногда слѣдующіе за ними дожди переносить прекрасно и не выпрѣваетъ. Вообще присутствіе этой травы вполнѣ обеспечиваетъ возможность получения хорошаго сѣна, такъ какъ она на хорошо раздѣленной почвѣ корневыми клубнями уничтожаетъ всѣ остальные травы и по виду зелени растетъ, какъ озимая пшеница. Цвѣтетъ на 3 недѣли позднѣе лисохвоста; косить надо въ началѣ цвѣтенія, въ противномъ случаѣ — грубѣетъ. Урожай даетъ съ десятины отъ 200—600 пудовъ.



I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Батлачикъ или лисохвостъ луговой. *Alopecurus pratensis* (дивый боръ, колосокъ).

Верховая многолѣтняя трава, похожа очень на тимофеевку по наружному виду и разнится отъ нея тѣмъ, что у цвѣточковъ ея явственно видна ость, тогда какъ у тимофеевки ость нѣтъ; переноситъ лучше всѣхъ злачныхъ холода, весеннеіе заморозки и продолжительность снѣжныхъ покрововъ. Тѣни не боится, но не любить засухи; хорошо растетъ на осушенныхъ болотахъ, на торфянистыхъ лугахъ; требуетъ ранняго укоса, примѣрно въ половинѣ Мая, такъ какъ, во-первыхъ, даетъ нѣсколько укосовъ въ лѣто и, если посѣяна на жирной землѣ, очень густо развивается и въ сырую и въ дождливую весну и лѣто ложится, загнивая у корня (подопрѣваетъ). Зацвѣтаетъ ранѣе другихъ злачныхъ травъ, иногда даже въ половинѣ Мая, и цвѣтетъ до Іюля; иногда цвѣтетъ второй разъ въ концѣ Августа и началѣ Сентября.

При правильныхъ и своевременныхъ укосахъ она заглушаетъ остальныя травы, въ особенности сорняка. Растетъ въ дикомъ видѣ преимущественно возлѣ дубовъ. Урожай съ десятины отъ 200—400 пудовъ.



I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Пахучий колосокъ. *Anthoxanthum odoratum* (кумарникъ).

Низовая трава, многолѣтняя, чрезвычайно душистая и придающая сѣну острый и пріятный запахъ; листья плоскіе, покрыты мягкими волосками, стеблевые листья короткие; любить песчаную и сырую почву и, въ виду того, что растетъ быстро и созрѣваетъ рано, не требуетъ весенней влаги и можетъ быть посѣяна и на сухихъ мѣстахъ, такъ какъ для ея развитія совершенно достаточно подпочвенной влаги, оставшейся въ землѣ отъ зимы или весеннаго разлива.

Вслѣдствіе своей сильной пахучести самостотельно нельзя ее засѣвать, а непремѣнно въ смѣси съ другими травами. Развивается на третьемъ году послѣ посѣва и можетъ давать укосы до 6 лѣтъ. Цвѣтетъ съ половины Мая по Сентябрь, и косить нужно при началѣ цвѣтенія. Урожайность съ десятины отъ 100 — 150 пудовъ.



I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Полевица. *Agrostis alba* (рѣзакъ, тонконожка).

Низовая трава, многолѣтняя, какъ подсѣдъ, при хорошихъ травахъ очень хороша; но бываетъ еще ползучая полевица, которая никуда не годится. Первая полевица любить сырость, не переноситъ сухихъ мѣстъ, къ почвѣ не разборчива; вторая любить сухія мѣста, находится также на известковой почвѣ, хотя въ меньшемъ количествѣ и не въ такомъ обилии, какъ на пескѣ. Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ; косить надо недѣли за двѣ передъ цвѣтенiemъ, въ противномъ случаѣ она дѣлается жесткой. Даетъ укосы до 3-хъ лѣтъ. Урожайность съ десятины отъ 200 — 400 пудовъ.



II. ПРЯНЫЯ (зонтичные).

Маунъ. *Valeriana officinalis* (земляной ладонъ).

Многолѣтнее, лѣкарственное растеніе, горьковато на вкусы, но, благодаря своему пріятному, сходному съ ванилью запаху и безвредности собственно травы, придаетъ хороший ароматъ съну; любить сырья и тѣнистыхъ мѣстъ. Цвѣтетъ свѣтлорозовыми цвѣтами съ Іюня по Августъ; корень ядовитъ.



Маунъ (VALERIANA OFFICINALIS).

II. ПРЯНЫЯ (зонтичныя).

Дикая рябина. *Tanacetum vulgare* (пижма).

Многолѣтняя трава, преимущественно растетъ около оросительныхъ дамбъ и осушительныхъ канавъ. Горька и остра на вкусъ, но горечь пріятная. Цвѣтетъ желтыми цвѣтами съ конца Іюня до Сентября въ головкахъ, полушаровидныхъ и собранныхъ въ щитики. Имѣетъ сильный запахъ.



ДИКАЯ РЯБИНКА (TANACETUM VULGARE).

II. ПРЯНЫЯ (зонтичные).

Вахта (вакха). *Menyanthes trifoliata* (водяной трилистникъ).

Многолѣтняя, горькая на вкусъ и содержитъ много танина. Листья схожи съ листьями клевера. Растетъ на болотахъ и мокрыхъ лугахъ и принадлежитъ скорѣе къ сорнымъ травамъ, во всякомъ случаѣ мало питательна. Цвѣтетъ бѣлыми или розовыми цвѣтами въ концѣ Мая и Іюня.



ВАХТА ИЛИ ВАХА (MENYANTHES TRIFOLIATA).

III. БОБОВЫЯ *) (мотыльковые).

Клеверъ розовый. *Trifolium hybridum*.

Валашокъ, гоголечка, головокъ, красноголовка, дятлина (въ Черниговской губ.); иvasикъ, кашка, коничина (въ Польшѣ); медуница (въ Вятской губ.); трилистникъ, тройца (въ Смоленской губ.); макушка (въ Вологодской губ.); сѣрое зелье, конюшна (въ Полтавской губ.); язвенникъ, заячій клеверъ.

Бобовые растенія чрезвычайно взыскательны на почву, растутъ преимущественно на пахатныхъ поляхъ, а на лугахъ не прочны, въ виду того, что не переносятъ сырости, весеннихъ разливовъ и неизбѣжно растущихъ другихъ травъ, которыя ихъ вытѣсняютъ; требуютъ сильного удобренія, очень плохо переносятъ климатическіе варианты сѣверныхъ и даже среднихъ полосъ Россіи. Весьма сложны при уборкѣ и осыпаются очень сильно во время послѣдней, такъ что процентъ питательности, заключающейся именно только въ листьяхъ и цвѣтахъ, отходитъ громадный, и кромѣ того не многолѣтни.

*) Бобовые травы здѣсь приводятся лишь для полноты свѣдѣній о травахъ вообще. Въ кормъ лошадямъ и вообще животнымъ, несмотря на ихъ безспорно хорошія качества въ питательномъ отношеніи, давать опасно, такъ какъ онѣ слишкомъ жирны, производятъ колики и вздутие живота. Лошади ими обжираются. Въ прессовку, вслѣдствіе отпаденія листьевъ и цвѣтковъ при операциіи сѣнопрессованія, не годятся, за исключеніемъ прессовки ручнымъ прессомъ, который годится лишь для маленькихъ хозяйствъ.



III. БОБОВЫЯ *) (мотыльковые).

Клеверъ красный. *Trifolium pratense*.

Валашокъ, гоголечка, головокъ, красноголовка, дятлина (въ Черниговской губ.); иvasикъ, кашка, коничина (въ Польшѣ); медуница (въ Вятской губ.); трилистникъ, тройца (въ Смоленской губ.); макушка (въ Вологодской губ.); сѣрое зелье, конюшна (въ Полтавской губ.); язвенникъ, заячій клеверъ.

Бобовыя растенія чрезвычайно взыскательны на почву, растутъ преимущественно на пахатныхъ поляхъ, а на лугахъ не прочны, въ виду того, что не переносятъ сырости, весеннихъ разливовъ и неизбѣжно растущихъ другихъ травъ, которыя ихъ вытѣсняютъ; требуютъ сильнаго удобренія, очень плохо переносятъ климатическіе варианты сѣверныхъ и даже среднихъ полосъ Россіи. Весьма сложны при уборкѣ и осыпаются очень сильно во время послѣдней, такъ что процентъ питательности, заключающейся именно только въ листьяхъ и цветахъ, отходитъ громадный, и кромѣ того не многолѣтни.

*) Бобовыя травы здѣсь приводятся лишь для полноты свѣдѣній о травахъ вообще. Въ кормъ лошадямъ и вообще животнымъ, несмотря на ихъ безспорно хорошія качества въ питательномъ отношеніи, давать опасно, такъ какъ онѣ слишкомъ жирны, производятъ колики и вздутие живота. Лошади ими обжираются. Въ прессовку, вслѣдствіе отпаденія листьевъ и цветковъ при операции сѣнапрессованія, не годятся, за исключеніемъ прессовки ручнымъ прессомъ, который годится лишь для маленькихъ хозяйствъ.



КЛЕВЕРЪ РОЗОВЫЙ (TRIFOLIUM HYBRIDUM).

III. БОБОВЫЯ *) (мотыльковые).

Клеверъ желтый. *Trifolium pannonicum*.

Валашокъ, гоголечка, головокъ, красноголовка, дятлина (въ Черниговской губ.); иvasикъ, кашка, коничина (въ Польшѣ); медуница (въ Вятской губ.); трилистникъ, тройца (въ Смоленской губ.); макушка (въ Вологодской губ.); сѣрое зелье, конюшна (въ Полтавской губ.); язвенникъ, заячій клеверъ.

Бобовыя растенія чрезвычайно взыскательны на почву, растуть преимущественно на пахатныхъ поляхъ, а на лугахъ не прочны, въ виду того, что не переносятъ сырости, весеннихъ разливовъ и неизбѣжно растущихъ другихъ травъ, которыя ихъ вытѣсняютъ; требуютъ сильного удобренія, очень плохо переносятъ климатическіе варианты сѣверныхъ и даже среднихъ полосъ Россіи. Весьма сложны при уборкѣ и осыпаются очень сильно во время послѣдней, такъ что процентъ питательности, заключающейся именно только въ листьяхъ и цвѣтахъ, отходитъ громадный, и кромѣ того не многолѣтни.

*) Бобовыя травы здѣсь приводятся лишь для полноты свѣдѣній о травахъ вообще. Въ кормъ лошадямъ и вообще животнымъ, несмотря на ихъ безспорно хорошія качества въ питательномъ отношеніи, давать опасно, такъ какъ онъ слишкомъ жирны, производятъ колики и вадутіе живота. Лошади ими обжираются. Въ прессовку, вслѣдствіе отпаденія листьевъ и цвѣтковъ при операции сѣнопрессованія, не годится за исключеніемъ прессовки ручнымъ прессомъ, который годится лишь для маленькихъ хозяйствъ.



IV. ОСОКОВЫЯ, СОРНЫЯ и КИСЛЫЯ ТРАВЫ.

Пушица (пухоность) болотистая. *Eriophorum latifolium*.

Многолѣтняя. Растетъ на торфянистыхъ и болотныхъ лугахъ и доходитъ до $\frac{1}{2}$ аршина вышины. Листъ широкій, похожъ на листъ старой ячменки, по краю шершавый. Цвѣтетъ въ Маѣ и Іюнѣ. Послѣ цвѣтенія образуетъ бѣлый пухъ, который летитъ по болоту.

Пушица (*ERIOPHORUM LATIFOLIUM*).

IV. ОСОКОВЫЯ, СОРНЫЯ и КИСЛЫЯ ТРАВЫ.

Пушица (пухоносъ) пахучая. *Eriophorum latifolium vaginatum*.

Многолѣтняя. Растетъ на торфянистыхъ и болотныхъ лугахъ и имѣетъ значительно большій подсѣдъ. Листъ широкій, похожъ на листъ старой ячменки, по краямъ шершавый. Цвѣтетъ въ Маѣ и Іюнѣ. Послѣ цвѣтенія образуетъ бѣлый пухъ, который летитъ по болоту. Цвѣтъ, кромѣ того, меньше, чѣмъ у болотной пушицы, и пуховка не конусообразная, а съ сузившимся концомъ.



V. ВРЕДНЫЯ ЛУГОВЫЯ ТРАВЫ.

Шалфей. *Salvia pratensis*.

Многолѣтняя трава съ очень сильнымъ запахомъ и горькимъ непріятнымъ вкусомъ, который лошадьми не переносится, такъ что съна, въ которое попадаетъ эта пахучая трава, лошадь не ъстъ.

Растетъ большею частью на сухихъ мѣстахъ и очень рѣдко на поемныхъ или заливныхъ лугахъ. Цвѣтетъ съ Мая по Іюнь темносиними цвѣтами, расположенными кольцами.

ШАЛФЕЙ (*SALVIA PRATENSIS*).

V. ВРЕДНЫЯ ЛУГОВЫЯ ТРАВЫ.

Дрокъ красильный. *Genista tinctoria*.

Многолѣтняя, высокая трава, полукустарникъ, имѣющій до 70 сортовъ, доходитъ до аршиннаго роста; встрѣчается на песчаныхъ почвахъ и тѣнистыхъ мѣстахъ. Цвѣтетъ въ Іюлѣ яркожелтыми цвѣтами съ раздвинутыми крыльями; стручья съ черными бобами. Трава неѣдомая.

ШАЛФЕЙ (*SALVIA PRATENSIS*).

VI. ЯДОВИТЫЯ ЛУГОВЫЯ РАСТЕНИЯ.

Лютикъ колючій. *Ranunculus flammula* (жабникъ).

Растетъ на сырыхъ и влажныхъ лугахъ, любить тѣнистые мѣста; размножается побѣгами и сѣменами; извѣстенъ своими острыми ядовитыми соками, производящими у лошадей воспаленіе въ желудкѣ, кровавую мочу. Въ высушенному видѣ ядъ значительно слабѣе. Цвѣтетъ съ Мая до Августа желтыми цвѣтами. Растеніе безусловно ядовитое.



ДРОКЪ (GENISTA TINCTORIA).

VI. ЯДОВИТЫЯ ЛУГОВЫЯ РАСТЕНИЯ.

Лютикъ ядовитый. *Ranunculus sceleratus* (жабникъ).

Растеніе однолѣтнєе. Растетъ на сырыхъ, влажныхъ и болотистыхъ лугахъ, любить тѣнистыя мѣста. Своими острыми ядовитыми соками вызываетъ у лошадей воспаленіе въ желудкѣ и кровавую мочу; въ высушенному видѣ ядъ значительно слабѣе. Цвѣтетъ съ Мая до Августа; цвѣты желтаго цвѣта. Растеніе безусловно ядовитое.




VI. ЯДОВИТЫЯ ЛУГОВЫЯ РАСТЕНИЯ.

Лютикъ ъдкій. Ranunculus acris (жабникъ).

Растеніе многолѣтнєе. Растетъ на влажныхъ лугахъ, любитъ тѣнистыя мѣста; называется въ простонародіи также куриною слѣпотой. Сокъ также ядовитъ, но менѣе предыдущаго, тоже производитъ у лошадей воспаленіе въ желудкѣ и кровавую мочу. Въ высушенномъ видѣ ядъ значительно слабѣе. Цвѣтетъ съ Мая до Августа; цвѣты желтаго цвѣта. Растеніе безусловно ядовитое.



Лютикъ ъдкій (RANUNCULUS ACRIS).



Ученымъ Комитетомъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ
допущено въ библиотекахъ среднихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній
вѣдомства Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Одобрено Военно-Ученымъ Комитетомъ (Цирк. Гл. Штаба 1 Іюня 1898 г., № 162).

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КЛАССИФИКАЦІЯ

ГЛАВНѢЙШИХЪ СОРТОВЪ

ЛУГОВЫХЪ ТРАВЪ

СЪ КРАТКИМЪ ОПИСАНИЕМЪ

КАЖДОЙ ТРАВЫ ВЪ ОТДѢЛЬНОСТИ.

Печатается съ разрѣшенія Главнаго Интенданта и санкціи Военнаго Совѣта.

Составилъ Штабсъ-Ротмистръ Главнаго Интендантскаго Управленія

А. Ю. Лашкаревъ.

ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ.

ВТОРОЙ ВЫПУСКЪ

(18 хромолитографическихъ таблицъ).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЗАГОТОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БУМАГЪ.

I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Райграссъ английскій. *Lolium perenne* (пшонецъ, головоломъ).

Многолѣтняя низовая трава, колосье безъ остей, растетъ отъ 2-хъ до 4-хъ лѣтъ, смотря по свойству почвы. Кусты райграсса задерняютъ почву, т.-е. отъ нихъ отдѣляется много побочныхъ бесплодныхъ побѣговъ, которые только на слѣдующій годъ образуютъ колосистые стебли; вслѣдствіе этого отдаленно стоящіе пучки тѣсно соединяются между собой и образуютъ сплошной дернъ. Растетъ на всякихъ почвахъ, если онъ не очень тощія и не очень сухія. Принадлежитъ къ числу немногихъ злаковъ, которые растутъ на твердыхъ почвахъ, если только онъ обладаютъ необходимою влагой, или если устроено хорошее орошеніе; на легкой, сухой и мало питательной скорѣй вырождается. Переноситъ засуху и любитъ снѣжныя зимы. Косить надо при началѣ цвѣтенія, иначе грубѣеть. Цвѣтетъ въ Іюнѣ до конца Августа. Урожай съ десятины отъ 200 — 400 пудовъ.

T. 1.



I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Райграссъ италіанскій. *Lolium italicum* (шпонецъ, головоломъ).

Низовая трава, многолѣтняя, но менѣе долговѣчна, чѣмъ англійскій райграссъ, который, въ силу суровости нашего климата, хуже удается, чѣмъ италіанскій; кроме того, у послѣдняго колосъ остистый, растеть отъ 2-хъ до 3-хъ лѣтъ вертикально и нѣсколько выше англійского райграssa. Любить влажную почву, главнымъ образомъ съ избыткомъ извести и хорошимъ подпочвеннымъ слоемъ; лучше всего растеть на почвахъ песчанистыхъ. Даетъ значительно большее количество листьевъ сравнительно съ англійскимъ райграссомъ, и стебли его мягче; въ особенности полезно его засѣвать на новыхъ лугахъ, такъ какъ онъ быстро всходитъ и скоро отѣняетъ почву. Цвѣтетъ съ Июня по Августъ. Переноситъ разливы весеннихъ водъ безъ всякаго ущерба. На осушенныхъ болотахъ развивается отлично. Даетъ укосы въ первый посѣвной годъ. Косить надо въ началѣ цвѣтенія, иначе онъ также, какъ и англійский райграссъ, грубѣетъ. Урожай одинаковъ съ англійскимъ.

T. 2.



I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Овсяница луговая. *Festuca pratensis* (заноска луговая).

Верховая трава, многолѣтняя. Отличается отъ мяты, съ волотью котораго имѣеть много общаго, ланцетовидными колосками, а по вѣточкамъ метёлки, выходящимъ поодиночкѣ или попарно изъ стержня, легко отличить отъ костра безостаго, у котораго вѣточки выходятъ по 3 и по 5 изъ стержня.

На поемныхъ заливныхъ лугахъ овсяница самая главная трава, вытѣсняющая многія травы, тогда какъ на легкихъ почвахъ вытѣсняется другими злаками, особенно на песчаныхъ почвахъ, гдѣ ей не хватаетъ влаги. На сухихъ почвахъ не растетъ совсѣмъ, или если и показывается, то въ качествѣ очень плохой низовой травы. Любить туманы и росу. Переноситъ прекрасно орошеніе и даже затопленіе, но не любить сильной подпочвенной сырости. Она даетъ много сѣна и два раза въ лѣто можетъ цвѣсти, если почва свѣжая. Какъ кормъ, очень питательна и вкусна и хотя по количеству и менѣе получаемаго отъ лисохвоста и французскаго райграсса, но питательностью стоитъ выше ихъ. При устройствѣ новыхъ луговъ считается однимъ изъ лучшихъ злаковъ. Косить надо на цвѣту, который бываетъ въ Іюнѣ и Іюль. Даётъ укосы на третьемъ году послѣ посѣва. Урожай съ десятины отъ 200 — 400 пудовъ.



I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Овсяница тонконожка овечья. *Festuca ovina*.

Совмѣстно съ другими травами — верховая, а при посѣвѣ въ отдѣльности — низовая и очень любима овцами, поэому называется тоже овсяница овечья. Многолѣтняя, невзыскательна на почву и климатъ, переносить хорошо засуху. Образуетъ сплошную траву только тогда, когда пучки ея растутъ одинъ около другого, иначе образуются плѣшины, и послѣднія застаются другими злаками. Листья у нея шетинистые. Любить легкую, сухую почву, въ которую могли бы глубоко проникать ея волокнистые корни; засѣвается на такихъ мѣстахъ луга, гдѣ хорошія злачные травы по скучности почвы не могутъ расти; не любить сырыхъ и низкихъ лошинъ; попадается одинаково какъ на известковой, такъ и на песчаной почвѣ. Гдѣ бы она ни росла — это служить доказательствомъ бѣдной и мелкой почвы, и хотя ея трава и сладка, но скучна. Нѣкоторые въ виду этого очень мало цѣнятъ этотъ кормъ, но во всякомъ случаѣ онъ незамѣнимъ на песчаныхъ почвахъ въ виду того, что сильно ихъ укрѣпляетъ. Растетъ до 3-хъ лѣтъ и даетъ укосы со второго посѣвнаго года. Косить надо на цвету и на ростѣ, благодаря ея тонкости. Послѣ цветенія сильно грубѣетъ и подъ косой гнется. Урожай даетъ съ десятины отъ 200 — 400 пудовъ.



I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Овсяница разнолистная. *Festuca heterophylla*.

Одновременно верховая и низовая, такъ какъ имѣеть два сорта листьевъ — тонкіе и широкіе; первые растутъ высоко, а вторые низко. Любить тѣнь и легкія почвы и не переноситъ сырыхъ и мокрыхъ мѣстъ. На открытыхъ мѣстахъ плохо кустится и лучше всего растетъ на югѣ, такъ какъ плохо переноситъ зиму. Многолѣтняя и развивается окончательно на третьемъ году послѣ сѣва. Отъ овечьей отличается гладкими стеблевыми листьями, а отъ красной *festuca rubra* — плотными пучками травы и кромѣ того отъ обѣихъ — длинными, согнутыми корневыми листьями. Главный ея недостатокъ, что она очень плохо кустится на открытыхъ и сухихъ лугахъ. Косить надо на цвѣту, который на ней появляется въ половинѣ Іюня и продолжается до половины Іюля. Урожай съ десятины отъ 150 — 200 пудовъ.



I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Овсяница красная. *Festuca rubra*.

Многолѣтняя, прекрасная, низовая трава, замѣняющая вполнѣ *Avena flavesrens*; очень питательна и считается одной изъ лучшихъ луговыхъ травъ; невзыскательна на почву настолько, что любить сухія мѣста; растетъ даже на пескѣ, лишь бы были сильныя росы; встрѣчается даже на солончаковыхъ лугахъ, гдѣ въ особенности отличается нѣжностью своихъ стеблей. Словомъ, растетъ вездѣ, гдѣ находитъ рыхлую почву, въ которой могутъ развиться ея побѣги; не встречается на плотной почвѣ, но гораздо болѣе распространена на песчаныхъ, нежели на известковыхъ, гдѣ растетъ съ большими плѣшинами. Достоинство ея еще то, что она заглушаетъ сорные травы, не поддаваясь ихъ вліянію; одинаково переноситъ какъ сырью, такъ и сухую почву. Растетъ послѣ посѣва туда и развивается окончательно лишь на третьемъ году. Косить на цвѣту въ Іюнѣ. Урожай съ десятины отъ 150 — 200 пудовъ.



II. ПРЯНЫЯ (зонтичные).

Тминъ. *Carum carvi*.

Двухлѣтнее растеніе, лѣкарственное, способствующее пищеваренію, какъ возбуждающее. Не чувствителенъ къ засухамъ и не требуетъ сырости, хотя лучше растетъ на влажныхъ мѣстахъ и не боится наводненій. Имѣетъ особый пріятный ароматъ. Небольшая примѣсь къ сѣну дѣлаетъ послѣднее очень съѣдобнымъ. Цвѣтетъ въ Іюнѣ бѣлыми цвѣтами.



II. ПРЯНЫЯ (зонтичныя).

Бедренецъ. *Pimpinella saxifraga.*

Многолѣтнее растеніе; запахъ напоминаетъ запахъ петрушки. Не взыскателенъ на почву; предпочитаетъ мергелевую, вообще легкую почву; растетъ съ ранней весны до поздней осени и въ климатическомъ отношеніи неприхотливое растеніе. Цвѣтеть съ Июня по Августъ бѣлыми цвѣтами.



БЕДРЕНЕЦЪ (PIMPINELLA SAXIFRAGA).

II. ПРЯНЫЯ (зонтичныя).

Козлобородникъ. *Tragopogon pratensis* (козелецъ).

Двухлѣтнее растеніе съ ярко желтыми цвѣтами. Цвѣтетъ въ концѣ Мая. Стебель наполненъ бѣловатой жидкостью. Не взыскателенъ на почву и переноситъ всякия климатическія явленія. По своей краткости существованія не представляетъ большого интереса, но тѣмъ не менѣе очень питателенъ.



III. БОБОВЫЯ *) (мотыльковые).

Клеверъ бѣлый. *Trifolium repens*.

Валашокъ, гоголечка, головокъ, красноголовка, дятлина (въ Черниговской губ.); иvasикъ, кашка, коничина (въ Польшѣ); медуница (въ Вятской губ.); трилистникъ, тройца (въ Смоленской губ.); макушка (въ Вологодской губ.); сѣрое зелье, конюшна (въ Полтавской губ.); язвенникъ, заячій клеверъ.

Бобовыя растенія чрезвычайно взыскательны на почву, растутъ преимущественно на пахатныхъ поляхъ, а на лугахъ не прочны, въ виду того, что не переносятъ сырости, весеннихъ разливовъ и неизбѣжно растущихъ другихъ травъ, которыя ихъ вытѣсняютъ; требуютъ сильного удобренія, очень плохо переносятъ климатические варианты сѣверныхъ и даже среднихъ полосъ Россіи. Весьма сложны при уборкѣ и осыпаются очень сильно во время послѣдней, такъ что процентъ питательности, заключающейся именно только въ листьяхъ и цвѣтахъ, отходитъ громадный, и кромѣ того не многолѣтни.

*) Бобовыя травы здѣсь приводятся лишь для полноты свѣдѣній о травахъ вообще. Въ кормъ лошадямъ и вообще животнымъ, несмотря на ихъ безспорно хорошія качества въ питательномъ отношеніи, давать опасно, такъ какъ онѣ слишкомъ жирны, производятъ колики и вздутие живота. Лошади ими обжираются. Въ прессовку, вслѣдствіе отпаденія листьевъ и цветковъ при операциії сѣнопрессованія, не годятся, за исключеніемъ прессовки ручнымъ прессомъ, который годится лишь для маленькихъ хозяйствъ.



III. БОБОВЫЯ *) (мотыльковые).

Чина луговая. *Lathyrus pratensis*.

Бобовыя растенія чрезвычайно взыскательны на почву, растуть преимущественно на пахатныхъ поляхъ, а на лугахъ не прочны, въ виду того, что не переносятъ сырости, весеннихъ разливовъ и неизбѣжно растущихъ другихъ травъ, которыя ихъ вытѣсняютъ; требуютъ сильнаго удобренія, очень плохо переносятъ климатические варианты сѣверныхъ и даже среднихъ полосъ Россіи. Весьма сложны при уборкѣ и осыпаются очень сильно во время послѣдней, такъ что процентъ питательности, заключающейся именно только въ листьяхъ и цвѣтахъ, отходитъ громадный, и кромѣ того не многолѣтни.

*) Бобовыя травы здѣсь приводятся лишь для полноты свѣдѣній о травахъ вообще. Въ кормъ лошадямъ и вообще животнымъ, несмотря на ихъ безспорно хорошія качества въ питательномъ отношеніи, давать опасно, такъ какъ онѣ слишкомъ жирны, производятъ колики и вздутие живота. Лошади ими обжираются. Въ прессовку, вслѣдствіе отпаденія листьевъ и цвѣтковъ при операции сѣнапрессованія, не годятся, за исключеніемъ прессовки ручнымъ прессомъ, который годится лишь для маленькихъ хозяйствъ.



III. БОБОВЫЯ *) (мотыльковые).

Эспардеть обыкновенный. *Onobrychis sativa*.

Бобовыя растенія чрезвычайно взыскательны на почву, растуть преимущественно на пахатныхъ поляхъ, а на лугахъ не прочны, въ виду того, что не переносятъ сырости, весеннихъ разливовъ и неизбѣжно растущихъ другихъ травъ, которыя ихъ вытѣсняютъ; требуютъ сильнаго удобренія, очень плохо переносятъ климатические варианты сѣверныхъ и даже среднихъ полосъ Россіи. Весьма сложны при уборкѣ и осыпаются очень сильно во время послѣдней, такъ что процентъ питательности, заключающейся именно только въ листьяхъ и цвѣтахъ, отходитъ громадный, и кромѣ того не многолѣтни.

*) Бобовыя травы здѣсь приводятся лишь для полноты свѣдѣній о травахъ вообще. Въ кормъ лошадямъ и вообще животнымъ, несмотря на ихъ безспорно хорошія качества въ питательномъ отношеніи, давать опасно, такъ какъ онъ слишкомъ жирны, производятъ колики и вздутие живота. Лошади ими обжираются. Въ прессовку, вслѣдствіе отпаденія листьевъ и цветковъ при операции сѣнапрессованія, не годятся, за исключеніемъ прессовки ручнымъ прессомъ, который годится лишь для маленькихъ хозяйствъ.



ЭСПАРЦЕТЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ (ONOBRYCHIS SATIVA).

III. БОБОВЫЯ *) (мотыльковые).

Эспарцетъ. *Onobrychis hedisarum* [стругъ (въ Курской губ.), красный буркунъ, заячий горохъ, осянка турецкая, подковникъ, пѣтушиная дятлина].

Бобовыя растенія чрезвычайно взыскательны на почву, растутъ преимущественно на пахатныхъ поляхъ, а на лугахъ не прочны въ виду того, что не переносятъ сырости, весеннихъ разливовъ и неизбѣжно растущихъ другихъ травъ, которыя ихъ вытѣсняютъ; требуютъ сильнаго удобренія, очень плохо переносятъ климатическіе варианты съверныхъ и даже среднихъ полосъ Россіи. Весьма сложны при уборкѣ и осыпаются очень сильно во время послѣдней, такъ что процентъ питательности, заключающейся именно только въ листьяхъ и цвѣтахъ, отходитъ громадный, и кромѣ того не многолѣтни.

*) Бобовыя травы здѣсь приводятся лишь для полноты свѣдѣній о травахъ вообще. Въ кормъ лошадямъ и вообще животнымъ, несмотря на ихъ безспорно хорошія качества въ питательномъ отношеніи, давать опасно, такъ какъ онъ слишкомъ жирны, производятъ колики и вздутие живота. Лошади ими обжираются. Въ прессовку, вслѣдствіе отпаденія листьевъ и цвѣтковъ при оперaciї сънопрессованія, не годятся, за исключеніемъ прессовки ручнымъ прессомъ, который годится лишь для маленькихъ хозяйствъ.



ЭСПАРЦЕТЬ (ONOBRYCHIS HEDISARUM).

IV. ОСОКОВЫЯ, СОРНЫЯ и КИСЛЫЯ ТРАВЫ.

Осока. *Carex.*

Многолѣтняя, но при осушкѣ почвы пропадаетъ. Кислосладкая трава, растетъ только на мокрыхъ мѣстахъ луга, болотахъ, около ручьевъ, озеръ и очень рѣдко на сухихъ мѣстахъ. Ошибочно думаютъ, что осока въ молодомъ видѣ составляетъ хороший кормъ для лошади. Во-первыхъ, рано косить ее невозможно, такъ какъ мѣста, занятые ею, еще мокры, и пока вода сойдетъ, то осока уже настолько погрубѣетъ, что въ сущеномъ видѣ никуда не годится; жестка и совсѣмъ непитательна.

Своими острыми, саблевидными листьями производитъ порѣзы на языкѣ лошади и въ свѣжемъ видѣ вызываетъ разстройство пищеваренія. Имѣетъ массу разновидностей, изъ которыхъ однѣ цвѣтутъ въ Апрѣль, другія въ Маѣ и третіи въ Іюнѣ.



IV. ОСОКОВЫЯ, СОРНЫЯ и КИСЛЫЯ ТРАВЫ.

Хвоцъ. *Equisetum arvense*.

Многолѣтняя трава, растущая только на мокрыхъ лугахъ и рѣдко попадающаяся вмѣстѣ съ хорошими травами. Въ кормъ лошадямъ не годится. Послѣ осушки луговъ пропадаетъ. Въ Маѣ и Іюнѣ на стебляхъ получаются темныя жилки.



Хвошъ (EQUISETUM ARVENSE).

VI. ЯДОВИТЫЯ ЛУГОВЫЯ РАСТЕНИЯ.

Лютикъ болотный. *Ranunculus aquatilis* (жабникъ).

Растеніе многолѣтнєе. Растетъ на сырыхъ, влажныхъ лугахъ и даже мокрыхъ мѣстахъ, по болотамъ, въ стоячихъ водахъ, также около рѣкъ и озеръ. Листва, погруженные въ воду, мелко разсѣчены, плавающіе на поверхности воды лапчаты. Размножается побѣгами и сѣменами; известно своими острыми ядовитыми соками, производящими у лошадей воспаленіе въ желудкѣ, кровавую мочу. Въ высушенному видѣ ядъ значительно слабѣе. Цвѣтетъ съ Мая до Августа; цвѣты желтаго цвѣта. Растеніе безусловно ядовитое.



ЛЮТИКЪ БОЛОТНЫЙ (*RANUNCULUS AQUATILIS*).

VI. ЯДОВИТЫЯ ЛУГОВЫЯ РАСТЕНИЯ.

Собачья петрушка. *Aethusa cinapium* (кокорышъ).

Маленькое однолѣтнее растеніе, похожее на обыкновенную петрушку, употребляемую въ пищу, но безъ того запаха, который свойственъ стѣдобной петрушкѣ; предпочитаетъ сырья и вообще влажныя мѣста на лугахъ. Стебель цилиндрическій, мучнистый, съ голубенькими цвѣтами. Листья темнозеленаго цвѣта, и оборотная ихъ сторона блестяща. Цвѣты бѣлые, растутъ зонтиками и появляются съ Іюня до Августа. Вызываетъ у лошадей тошноту, боли въ желудкѣ, вздутие живота, головокруженіе, и затѣмъ животное падаетъ.

T. 101.





Собачья петрушка (AETHUSA CINAPIUM).

VI. ЯДОВИТЫЯ ЛУГОВЫЯ РАСТЕНИЯ.

Плевель опьяняющий. *Lolium temulentum* (злакъ).

Бываетъ однолѣтнимъ и двухлѣтнимъ. Единственное ядовитое растеніе изъ семейства злаковыхъ; похоже на райграссъ и часто въ немъ попадается. Различіе заключается въ томъ, что нижнія пленки *) или длиннѣе, или равняются колоску, а внутреннія элипсическія—съ остью на верхушкѣ; у райгрassa же онѣ короче и внутреннія ланцетовидной формы. Цвѣтетъ отъ Июня до Августа. Производить у лошади колики, послѣ которыхъ животное дохнетъ. Сѣмена плевела обладаютъ сильнымъ наркотическимъ и ядовитымъ свойствомъ.

*) Пленкой называется ланцетовидный листочекъ, окружающій колось; она всегда перепончата и зеленаго цвѣта и у злака замѣняетъ чаще листикъ обыкновенныхъ растеній.



Таблицы рисунковъ каждого выпуска составлены изъ шести разныхъ отдѣловъ, обозначенныхъ въ оглавлениіи классификаціи травъ вообще.

Такимъ образомъ, при выходѣ въ свѣтъ всѣхъ шести выпусковъ; для распределенія таблицъ, согласно классификаціи, слѣдуетъ разобрать ихъ по общему распределенію травъ въ оглавлениіи, и при такомъ способѣ получится шесть выпусковъ, заключающихъ въ себѣ:

въ I выпускъ . . .	злаки (28 рисунковъ).
во II	прѣнныя травы (18 рисунковъ).
въ III	бобовыя травы (17 рисунковъ).
, IV	сорные и кислые травы (12 рисунковъ).
, V	вредныя травы (15 рисунковъ).
, VI	ядовитыя травы (18 рисунковъ).

Ученымъ Комитетомъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ
допущено въ библіотекахъ среднихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній
вѣдомства Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Одобрено Военно-Ученымъ Комитетомъ (Цирк. Гл. Штаба 1 Іюня 1898 г., № 162).

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КЛАССИФИКАЦІЯ
ГЛАВНѢЙШИХЪ СОРТОВЪ
ЛУГОВЫХЪ ТРАВЪ
СЪ КРАТКИМЪ ОПИСАНИЕМЪ
КАЖДОЙ ТРАВЫ ВЪ ОТДѢЛЬНОСТИ.

Печатается съ разрѣшенія Главнаго Интенданта и санкціи Военнаго Совѣта.

Составилъ Штабсъ-Ротмистръ Главнаго Интендантскаго Управленія

А. Ю. Лашкаревъ.

ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ.

ТРЕТИЙ ВЫПУСКЪ

(18 хромолитографическихъ таблицъ).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЗАГОТОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БУМАГЪ.

1898.

I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Овсяница ячменка. *Festuca arundinacea schreb* (овсяница тростниковая).

Принадлежитъ къ одному роду съ предъидущею. Во Франціи, гдѣ она очень цѣнится, называется *festuque roseau*, т.-е. тростниковая, такъ какъ въ перезрѣломъ возрастѣ напоминаетъ собой тростникъ. Отличается отъ луговой овсяницы крупнымъ листомъ и метёлкой, которая значительно крупнѣе, раскидистѣе, и передъ цветенiemъ конецъ ея нѣсколько перегибается внизъ подъ тяжестью колосковъ, которые мельче и хотя безъ ости, но на концахъ заострены.

По поводу этой травы бываютъ часто пререканія, такъ какъ, въ случаѣ перероста, ее, какъ я сказалъ выше, принимаютъ или за тростникъ или за осоку, тогда какъ съ послѣдней она положительно ничего не имѣеть общаго. Растетъ она на низкихъ сырыхъ мѣстахъ и, конечно, въ перезрѣломъ возрастѣ по жесткости листа и стебля въ кормъ не годится, но въ молодомъ видѣ очень питательна, вкусна, и лошади ее очень любятъ. Листья похожи на листья ячменя, оттого въ Россіи она и называется ячменкой. Лошади отъ нея быстро жирѣютъ и набираются хорошаго, подбористаго тѣла.

На сырыхъ и очень влажныхъ почвахъ не превращается въ кислую несѣдовную траву; засухъ боится. Принадлежитъ къ верховымъ многолѣтнимъ травамъ; даетъ хорошие укосы со второго года посѣва. Косить надо очень рано, по крайней мѣрѣ, за недѣлю до цветенія, которое бываетъ въ началѣ Іюня и даже иногда въ конца Мая—это зависитъ отъ ранней теплой весны. Урожай даетъ съ десятины отъ 300—400 пудовъ.

T. 8.



Овсяница ячменка (*FESTUCA ARUNDINACEA* SCHREB.).

I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Овесъ луговой или французскій райграссъ. *Avena elatior.*

Верховая трава, дающая отличный подсѣдъ, и многолѣтняя, требуетъ для хорошаго произрастанія глубокой и легкой почвы, которая бы хорошо нагрѣвалась и въ то же время обладала связностью, въ которой, при ея глубинѣ, сохранялась бы влажность. Поэтому чаще всего растетъ на лугахъ, имѣющихъ глубокій слой известковаго или песчанаго мергеля, а также на хорошихъ песчаныхъ суглинкахъ; такъ какъ такія почвы вообще болѣе всего пригодны для хорошаго роста злаковъ, то присутствіе этой травы служитъ всегда признакомъ луговъ высшаго качества, которые даютъ обильный и легкій кормъ. На дѣйствительно сырыхъ лугахъ она не растетъ; на сухихъ, т.-е. не обладающихъ свѣжестью почвахъ растетъ очень скучно и тѣмъ скучнѣе, чѣмъ болѣе почва отличается сухостью. — Принадлежитъ къ лучшимъ нашимъ луговымъ травамъ, потому что отличается обилиемъ укосовъ, питательностью, нѣжностью, пріятнымъ вкусомъ и раннимъ развитіемъ; многочисленные листья, идущіе отъ корня, образуютъ отличный подсѣдъ, а высокіе стебли обильную верховую траву. Случается, что послѣ жаровъ она цвѣтеть вторично. При всѣхъ этихъ преимуществахъ она имѣеть тотъ недостатокъ, что тамъ, гдѣ она не составляетъ главной травы луга, и гдѣ другие верховые злаки бываютъ годны для скашиванія позднѣе, стебли ея слишкомъ рано увядаютъ, и въ сѣнѣ получаются полу завядшіе стебли, между тѣмъ какъ снизу еще растетъ обильная трава. По питательности уступаетъ ежѣ, овсяницѣ и друг., но по количеству получаемаго сѣна превышаетъ ихъ. Косить надо рано, на первомъ цвѣту, иначе грубоется; настоящее ея развитіе бываетъ на второмъ году посѣва. Цвѣтетъ въ началѣ Июня и до Сентября. Растетъ до 5 лѣтъ; на вкусъ горьковата. Урожай даетъ съ десятины отъ 200—400 пудовъ.



ОВЕСЪ ЛУГОВОЙ (AVENA ELATIOR).

I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Метла узколистая. Poa angustifolia.

Низовая травка, многолѣтняя, хорошо растетъ преимущественно на сухихъ песчаныхъ обрывахъ и холмахъ и, въ противоположность обыкновенному мятулику, растетъ кустами; цвѣтетъ въ Іюнѣ. Косить на цвѣту. Урожайность съ десятины отъ 100—200 пудовъ.

Т. 17.



МЕГЛА УЗКОЛИСТАЯ (POA ANGUSTIFOLIA).

II. ПРЯНЫЯ (зонтичныя).

Одуванчикъ. *Taraxacum officinale*.

Многолѣтнее растеніе, горьковатое на вкусъ, сочное, съ желтыми цвѣтами и толстымъ стеблемъ, содержащее въ себѣ горьковатую бѣлую жидкость. Растетъ вездѣ, цвѣтеть цѣлое лѣто и особой питательности въ сухомъ видѣ не представляетъ. По окончаніи цвѣтенія на стеблѣ образуетъ пуховой шаръ, который легко сдувается.



ОДУВАНЧИКЪ (TARAXACUM OFFICINALE).

II. ПРЯНЫЯ (зонтичныя).

Василекъ. *Centaurea scabiosa*.

Многолѣтнее. Растетъ на сухихъ лугахъ; цвѣтетъ цѣлое лѣто лиловыми и бѣлыми цвѣтами; съѣдобенъ въ молодомъ видѣ и затѣмъ грубѣеть. Цвѣтетъ Іюнь и Іюль. Весьма разнообразенъ по величинѣ и формѣ лепестковъ.

T. 35.



ВАСИЛЕКЪ (CENTAUREA SCABIOSA).

II. ПРЯНЫЯ (зонтичныя).

Попутникъ. *Plantago lanceolata* (казацъ, козликъ, подорожникъ, порѣзникъ).

Многолѣтнее, горьковатое на вкусы и вяжущаго свойства растеніе. Отличный кормъ, какъ вспомогательный къ злаковымъ травамъ. Очень рано выходитъ весной изъ земли, не боится ни сухости, ни влажности. Предпочтительно растетъ на посмныхъ и песчанихъ лугахъ; вообще любить влагу. Цвѣтетъ съ Мая по осень; цвѣточки маленькие, собранные въ черномъ колоскѣ. Способствуетъ пищеваренію. Листъ при сильной сушкѣ крошится.



ПОПУТНИКЪ (PLANTAGO LANCEOLATA).

II. ПРЯНЫЯ (зонтичныя).

Черноголовникъ. *Poterium sanguisorba*.

Растеніе многолѣтнее, лѣкарственное, останавливающее кровотеченіе. Растетъ на всякой мѣстности, но предпочитаетъ мергелевые почвы. Листъ перистый и желтый; цветы красноватые, круглые, въ видѣ шапочки. Цвѣтетъ съ Мая до осени. Очень рано развивается. Косить надо рано.



ЧЕРНОГОЛОВНИКЪ (POTERIUM SANGUISORBA).

III. БОБОВЫЯ *) (мотыльковые).

Люцерна или медунка обыкновенная. *Medicago sativa* [бурунчикъ, степной вязель, мусюй, енджи (Закавказье), имурокъ (Донъ)].

Бобовые растенія чрезвычайно взыскательны на почву, растутъ преимущественно на пахатныхъ поляхъ, а на лугахъ не прочны въ виду того, что не переносятъ сырости, весеннихъ разливовъ и неизбѣжно растущихъ другихъ травъ, которыя ихъ вытѣсняютъ; требуютъ сильного удобренія; очень плохо переносятъ климатические варианты сѣверныхъ и даже среднихъ полосъ Россіи. Весьма сложны при уборкѣ и осыпаются очень сильно во время послѣдней, такъ что процентъ питательности, заключающейся именно только въ листьяхъ и цветахъ, отходитъ громадный, и кромѣ того не многолѣтни.

*) Бобовые травы здѣсь приводятся лишь для полноты свѣдѣній о травахъ вообще. Въ кормъ лошадямъ и вообще животнымъ, несмотря на ихъ безспорно хорошія качества въ питательномъ отношеніи, давать опасно, такъ какъ онѣ слишкомъ жирны, производятъ колики и вздутие живота. Лошади ими обжираются. Въ прессовку, вслѣдствіе отпаденія листьевъ и цветковъ при операции сѣнопрессованія, не годятся, за исключеніемъ прессовки ручнымъ прессомъ, который годится лишь для маленькихъ хозяйствъ.

T. 51.




ЛЮЦЕРНА ОБЫКНОВЕННАЯ (MEDICAGO SATIVA).

III. БОБОВЫЯ *) (мотыльковые).

Люпинъ белый. *Lupinus albus.*

Бобовыя растенія чрезвычайно взыскательны на почву, растутъ преимущественно на пахатныхъ поляхъ, а на лугахъ не прочны въ виду того, что не переносятъ сырости, весеннихъ разливовъ и неизбѣжно растущихъ другихъ травъ, которыя ихъ вытѣсняютъ; требуютъ сильнаго удобренія; очень плохо переносятъ климатические варианты сѣверныхъ и даже среднихъ полосъ Россіи. Весьма сложны при уборкѣ и осыпаются очень сильно во время послѣдней, такъ что процентъ питательности, заключающейся именно только въ листьяхъ и цветахъ, отходитъ громадный, и кромѣ того не многолѣтни.

*) Бобовыя травы здѣсь приводятся лишь для полноты свѣдѣній о травахъ вообще. Въ кормъ лошадямъ и вообще животнымъ, несмотря на ихъ безспорно хорошія качества въ питательномъ отношеніи, давать опасно, такъ какъ онѣ слишкомъ жирны, производятъ колики и вздутие живота. Лошади ими обжираются. Въ прессовку, вслѣдствіе отпаденія листьевъ и цветковъ при операции сѣнапрессованія, не годятся, за исключеніемъ прессовки ручнымъ прессомъ, который годится лишь для маленькихъ хозяйствъ.



Люпинъ бѣлый (*LUPINUS ALBUS*).

III. БОБОВЫЯ *) (мотыльковые).

Люпинъ желтый. *Lupinus luteus.*

Бобовыя растенія чрезвычайно взыскательны на почву, растуть преимущественно на пахатныхъ поляхъ, а на лугахъ не прочны въ виду того, что не переносятъ сырости, весеннихъ разливовъ и неизбѣжно растущихъ другихъ травъ, которыя ихъ вытѣсняютъ; требуютъ сильнаго удобренія; очень плохо переносятъ климатическіе варианты сѣверныхъ и даже среднихъ полосъ Россіи. Весьма сложны при уборкѣ и осыпаются очень сильно во время послѣдней, такъ что процентъ питательности, заключающійся именно только въ листьяхъ и цветахъ, отходитъ громадный, и кромѣ того не многолѣтни.

*) Бобовыя травы здѣсь приводятся лишь для полноты свѣдѣній о травахъ вообще. Въ кормъ лошадямъ и вообще животнымъ, несмотря на ихъ безспорно хорошія качества въ питательномъ отношеніи, давать опасно, такъ какъ онѣ слишкомъ жирны, производятъ колики и вздутие живота. Лошади ими обжираются. Въ прессовку, вслѣдствіе отпаденія листьевъ и цветковъ при операции сѣнапрессованія, не годятся, за исключеніемъ прессовки ручнымъ прессомъ, который годится лишь для маленькихъ хозяйствъ.



ЛЮПИНЪ ЖЕЛТЫЙ (*LUPINUS LUTEUS*).

IV. ОСОКОВЫЯ, СОРНЫЯ и КИСЛЫЯ ТРАВЫ.

Ситники. *Juncus.*

Растутъ на сырыхъ мѣстахъ и болотахъ. Многолѣтніе. Цвѣты похожи на колоски и сидятъ въ пазухахъ пленокъ; часто бывають собраны въ ложное цвѣторасположеніе. Въ кормъ лошадямъ не употребляются. Сѣно скверное, твердое. Присутствіе ихъ есть признакъ скверной почвы. Цвѣтутъ въ Апрѣлѣ и Маѣ.




Ситники (JUNCUS).

IV. ОСОКОВЫЯ, СОРНЫЯ и КИСЛЫЯ ТРАВЫ.

Камышъ болотный. *Scirpus palustris*.

Многолѣтнее растеніе, но при осушкѣ почвы пропадаетъ. Единственное достоинство этого, никакуа негоднаго какъ трава, растенія — это способность его своими толстыми стволовидными стеблями задерживать проходъ наноснаго ила во время весеннаго разлива рѣкъ, благодаря чему, осущенныя изъ-подъ него мѣста даютъ прекрасную наносную черноземную жирную почву. Цвѣтетъ съ Іюня по Сентябрь.




Камышъ болотный (SCIRPUS PALUSTRIS).

V. ВРЕДНЫЯ ЛУГОВЫЯ ТРАВЫ.

Стальникъ ползучій. *Ononis repens*.

Многолѣтнее растеніе, цвѣтетъ въ Іюнѣ до начала Августа. Стебель ползучій и покрытъ желѣзистыми волосками. Цвѣтетъ ранѣе колючаго и болѣе липкій; колючки если есть, то только на верхушкахъ вѣтвей. Встрѣчается по большей части на известковыхъ почвахъ, хотя попадается и на песчаныхъ. Въ молодомъ возрастѣ онъ въ кормъ еще возможенъ, но какъ только происходитъ выдѣленіе сока изъ стеблей и даже листьевъ — безусловно вреденъ.




СТАЛЬНИКЪ ПОЛЗУЧИЙ (*ONONIS REPENS*).

V. ВРЕДНЫЯ ЛУГОВЫЯ ТРАВЫ.

Будра плющевидная. *Glechoma hederacea*.

Многолѣтняя, пахучая, вредная трава, растущая въ тѣнистыхъ мѣстахъ, ползучая съ черенковымъ листомъ. Цвѣтеть голубенькими цвѣточками въ Июнѣ и Июль.



БУДРА (*GLECHOMA HEDERACEA*).

VI. ЯДОВИТЫЯ ЛУГОВЫЯ РАСТЕНИЯ.

Осенникъ. *Colchicum autumnale* (безыменный цветокъ, пасобой осенний).

Луковичное растеніе, принадлежитъ къ семейству ядовитыхъ лилій (*Melanthaceae*); листа не имѣсть, а лишь одинъ стебель, покрывающійся осенью лиловыми цветами. Иногда бываетъ нѣсколько стеблей, выходящихъ каждый самостоятельно изъ земли. Корень сидитъ глубоко въ землѣ и заключаетъ въ себѣ сильный ядъ, переходящій въ цветы. Ранней весной появляются листья на подобіе листьевъ тюльпана или ландыша, между которыми въ маѣ и развивается длинная трехгранная сѣменная коробочка, въ которой находятся круглые сѣмечки съ очень сильнымъ ядомъ. Лѣтомъ всѣ части этого растенія, въ особенности луковица, издаются сильный запахъ, причиняющій тошноту. Вкусъ его сладковато-горькій, раздражительный и до того острый, что если положить въ ротъ небольшой кусокъ, то во рту, небѣ и горлѣ чувствуется сильнѣйшее жженіе, послѣ чего всѣ эти части цѣпенѣютъ. Изъ сѣмянъ извлекается вератринъ, употребляемый въ качествѣ мази въ медицинѣ. Самое лучшее время уничтоженія этого растенія, путемъ выкапыванія вмѣстѣ съ лукообразнымъ корнемъ, — весна. Появленіе этого ядовитаго растенія показываетъ истощеніе почвы, такъ какъ при удобрѣніи, затопленіи луга оно пропадаетъ и присутствиемъ хорошихъ травъ заглушается. Отравленіе проявляется болью въ желудкѣ, изліяніемъ крови, сильнымъ воспаленіемъ брюшины и, наконецъ, антоновымъ огнемъ.



ОСЕННИКЪ (COLCHICUM AUTUMNALE).

VI. ЯДОВИТЬЯ ЛУГОВЫЯ РАСТЕНИЯ.

Чемерица бѣлая. *Veratrum album*.

Двухлѣтня; растетъ на болотистыхъ лугахъ; имѣетъ здоровый кривой корень; листъ пушистый; цвѣты бѣлые, образующіе кисть. Самый ядъ въ сильной степени заключается въ корнѣ, поэтому при уничтоженіи этой травы необходимо его выкапывать. Цвѣтетъ съ конца Іюня до конца Августа. Кромѣ того, по мнѣнію Роде и Больс, травы, находящіяся съ ней въ соприкосновеніи, напитываются содержащимся въ ней ядомъ и дѣлаются вредными.

Т. 96.



ЧЕМЕРИЦА ВЪЛАЯ (*VERATRUM ALBUM*).

VI. ЯДОВИТЫЯ ЛУГОВЫЯ РАСТЕНИЯ.

Авранъ. *Gratiola officinalis* (лихорадочная трава, коневой трутъ).

Многолѣтнее, горькое растеніе, съ горизонтальнымъ колѣнчатымъ корнемъ; растетъ въ вышину на болотистыхъ и сырыхъ лугахъ. Листья четырехгранные, обхватывающіе половину круглого стебля, вышиною въ $\frac{1}{2}$ арш. и болѣе. Цвѣты бѣлые или красноватые, сидящіе въ промежуткахъ листьевъ, по одному, на длинныхъ ножкахъ. Для лошади самое вредное изъ всѣхъ ядовитыхъ растеній. Трава этого растенія безъ запаха.



АВРАНЬ (GRATIOLA OFFICINALIS).

VI. ЯДОВИТЫЯ ЛУГОВЫЯ РАСТЕНИЯ.

Бутень одуряющій или пьяный. *Chaerophyllum temulus*.

Двухлѣтнее растеніе, похожее на болиголовъ. Стебель бороздчатый, въ 1—3 фута вышины, весь волосистый, съ фиолетовыми или буровыми пятнами; листья матово-зеленые, волосистые сверху и снизу; цветы белые; цвететъ въ Июнь и Июль. Плоды во 2 линіи длинные, безъ клюва.



БУТЕНЬ ОДУРЯЮЩИЙ (*CHAEROPHYLLUM TEMULUS*).

Таблицы рисунковъ каждого выпуска составлены изъ шести разныхъ отдѣловъ, обозначенныхъ въ оглавлениіи классификаціи травъ вообще.

Такимъ образомъ, при выходѣ въ свѣтъ всѣхъ шести выпусковъ, для распределенія таблицъ, согласно классификаціи, слѣдуетъ разобрать ихъ по общему распределенію травъ въ оглавлениіи, и при такомъ способѣ получится шесть выпусковъ, заключающихъ въ себѣ:

въ I выпускѣ . . .	злаки (28 рисунковъ).
во II	пряная травы (18 рисунковъ).
въ III	бобовые травы (17 рисунковъ).
, IV	сорные и кислые травы (12 рисунковъ).
, V	вредные травы (15 рисунковъ).
, VI	ядовитыя травы (18 рисунковъ).

Рекомендовано Учебнымъ Комитетомъ, состоящимъ при собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярии по учреждениямъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ, для фундаментальныхъ библиотекъ всѣхъ подвѣдомственныхъ имъ учебныхъ заведеній (14 Дек. 1898 г., № 23136).

Одобрено: Военно-Ученымъ Комитетомъ (Цирк. Гл. Штаба 1 Іюня 1898 г., № 162).

— Учебнымъ Комитетомъ Министерства Финансовъ для библиотекъ коммерческихъ учебныхъ заведеній (30 Окт. 1898 г., № 28625).

— Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія для фундаментальныхъ библиотекъ среднихъ учебныхъ заведеній и для учительскихъ библиотекъ городскихъ и уѣздныхъ училищъ и допущено въ бесплатныя народныя библиотеки и читальни (23 Сент. 1898 г., № 23841).

— Ученымъ Комитетомъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ допущено въ библиотеки среднихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній вѣдомствъ этого Министерства (17 Іюня 1898 г., № 14210).

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КЛАССИФИКАЦІЯ

ГЛАВНѢЙШИХЪ СОРТОВЪ

ЛУГОВЫХЪ ТРАВЪ

СЪ КРАТКИМЪ ОПИСАНІЕМЪ

КАЖДОЙ ТРАВЫ ВЪ ОТДѢЛЬНОСТИ.

—
x

Печатается съ разрѣшенія Главнаго Интенданта и санкціи Военнаго Совета.

—
x

Составилъ Штабсъ-Ротмистръ Главнаго Интендантскаго Управленія

А. Ю. Лашкаревъ.

—
—

ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫПУСКЪ

(18 хромолитографическихъ таблицъ).

—
—

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЗАГОТОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БУМАГЪ.

Рекомендовано Учебнымъ Комитетомъ, состоящимъ при собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярии по учреждениямъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ, для фундаментальныхъ библиотекъ всѣхъ подвѣдомственныхъ имъ учебныхъ заведеній (14 Дек. 1898 г., № 23136).

— Одобрено: Военно-Ученымъ Комитетомъ (Цирк. Гл. Штаба 1 Іюня 1898 г., № 162).

— Учебнымъ Комитетомъ Министерства Финансовъ для библиотекъ коммерческихъ учебныхъ заведеній (30 Окт. 1898 г., № 28625).

— Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія для фундаментальныхъ библиотекъ среднихъ учебныхъ заведеній и для учительскихъ библиотекъ городскихъ и уѣзденыхъ училищъ и допущено въ бѣзплатныя народныя библиотеки и читальни (23 Сент. 1898 г., № 23841).

— Ученымъ Комитетомъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ допущено въ библиотеки среднихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній вѣдомствъ этого Министерства (17 Іюня 1898 г., № 14210).

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КЛАССИФИКАЦІЯ

ГЛАВНѢЙШИХЪ СОРТОВЪ

ЛУГОВЫХЪ ТРАВЪ

СЪ КРАТКИМЪ ОПИСАНИЕМЪ

КАЖДОЙ ТРАВЫ ВЪ ОТДѢЛЬНОСТИ.

Печатается съ разрѣшенія Главнаго Интенданта и санкціи Военнаго Совѣта.

Составилъ Штабсъ-Ротмистръ Главнаго Интендантскаго Управления

А. Ю. Лашкаревъ.


ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫПУСКЪ

(18 хромолитографическихъ таблицъ).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЗАГОТОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БУМАГЪ.

1898.



I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Овесъ золотистый. *Avena flavesens.*

Многолѣтній, прекрасный злакъ, принадлежащій къ самыимъ лучшимъ луговымъ злакамъ и лучшій изъ всѣхъ низовыхъ злаковъ; нѣженъ, питателенъ и имѣетъ отличный вкусъ. Растетъ только на хорошихъ лугахъ со свѣжею почвою, которая вслѣдствіе глубины слоя не можетъ слишкомъ высыхать; любитъ преимущественно мерглевыя почвы и песчаныя, если есть хотя немного суглинка; появленіе этого растенія рекомендуется лугъ съ наилучшей стороны. Развивается со второго года посѣва. Цвѣтетъ въ Іюнѣ, а иногда и вторично въ концѣ Августа. Косить надо на цвѣту. Урожай отъ 200 — 250 пудовъ съ десятины.

T. 10.





ОВЕСЬ ЗОЛОТИСТЫЙ (AVENA FLAVESCENS).

I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Метла луговая. *Poa pratensis*.

Бывает низовой и верховой травой, смотря по грунту земли, такъ какъ на жирныхъ почвахъ сильнѣе образовываетъ подсѣдъ, а на худощавыхъ или худосочныхъ растетъ болѣе въ вышину. Многолѣтняя трава, встрѣчающаяся на всякихъ лугахъ; даетъ укосы до 6 лѣтъ; переноситъ легко засуху, невзыскательна къ морозамъ, переноситъ продолжительную зиму; любить легкую почву и развивается чрезвычайно медленно; во всякомъ случаѣ очень питательная трава. Дурное свойство ея заключается лишь въ томъ, что стебли ея рано засыхаютъ, отчего при кошеныи, если оно запоздало, получается только низовая трава. Только на третьемъ году даетъ порядочные укосы. Косить надо при появлѣніи цвѣта, который появляется въ концѣ Мая и Іюня. Урожайность десятины отъ 100—200 пудовъ.



МЕТЛА ЛУГОВАЯ (*POA PRATENSIS*).

I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Метла обыкновенная. *Poa trivialis*.

Низовая, многолѣтняя трава; растеть на влажной суглинистой почвѣ, также и на посемныхъ лугахъ; не кустится и даетъ множество мелкихъ побѣговъ съ отдѣльными корнями. Развивается поздней весной, т.-е. тогда только начинаетъ цвѣсти, когда *Poa pratensis* пошелъ въ сѣмена. Образовываетъ длинные листья, расположенные близко другъ къ другу, и по количеству доставляемаго корма превосходитъ всѣ виды мятыника. Стебли въ сухомъ видѣ также очень питательны и охотно съѣдаются всѣми животными. Косить надо при началѣ цвѣтенія, которое бываетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ. Урожайность десятины отъ 150—200 пудовъ.

T. 16.





МЕТЛА ОБЫКНОВЕННАЯ (*POA TRIVIALIS*)

I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Метла песчаная. *Poa collina*.

Низовая трава, многолѣтняя, любить тѣнистая мѣста и песчаную почву. Растетъ плохо и только въ смѣси съ другими травами даетъ порядочные укосы. Косить надо рано потому, что иначе былинки, на которыхъ расположены метёлки съ цвѣтами, грубѣютъ. Урожайность съ десятины отъ 100—150 пудовъ.

T. 19.





МЕТЛА ПЕСЧАНАЯ (POA COLLINA).

II. ПРЯНЫЯ (зонтичныя).

Деревей. *Achillea millefolium* (тысячелистникъ).

Многолѣтнее растеніе; имѣетъ горьковатый вкусъ. Пахучая, крупная, низовая трава, переносящая сушь, жару, холодъ, какъ немногія травы; не боится продолжительности зимы и не вымерзаетъ; можетъ расти и на болотистыхъ лугахъ, но съ присутствиемъ въ грунтѣ песку. Цвѣтетъ цѣлое лѣто бѣлыми цвѣтами и до глубокой осени.





ДЕРЕВЕЙ (ACHILLEA MILLEFOLIUM).

II. ПРЯНЫЯ (зонтичныя).

Цикорій. *Cichorium intybus*.

Многолѣтнее растеніе; горьковатое на вкусъ; очень рано зеленѣетъ; цвѣтетъ цѣлое лѣто лазуревыми цвѣточками и служить, какъ хорошее возбуждающее средство, способствующее пищеваренію.

T. 34.





ЦИКОРІЙ (*CICHORIUM INTYBUS*)

III. БОБОВЫЯ *) (мотыльковые).

Люпинъ голубой. *Lupinus angustifolius.*

Бобовыя растенія чрезвычайно взыскательны на почву, растуть преимущественно на пахатныхъ поляхъ, а на лугахъ не прочны въ виду того, что не переносятъ сырости, весеннихъ разливовъ и неизбѣжно растущихъ другихъ травъ, которыя ихъ вытѣсняютъ; требуютъ сильнаго удобренія; очень плохо переносятъ климатические варианты съверныхъ и даже среднихъ полосъ Россіи. Весьма сложны при уборкѣ и осыпаются очень сильно во время послѣдней, такъ что процентъ питательности, заключающейся именно только въ листьяхъ и цвѣтахъ, отходитъ громадный, и кромѣ того не многолѣтни.

*) Бобовыя травы здѣсь приводятся лишь для полноты свѣдѣній о травахъ вообще. Въ кормъ лошадямъ и вообще животнымъ, несмотря на ихъ безспорно хорошія качества въ питательномъ отношеніи, давать опасно, такъ какъ онѣ слишкомъ жирны, производятъ колики и вздутие живота. Лошади ими обжираются. Въ прессовку, вслѣдствіе отпаденія листьевъ и цвѣтковъ при операциіи сънопрессованія, не годятся, за исключеніемъ прессовки ручнымъ прессомъ, который годится лишь для маленькихъ хозяйствъ.



Люпинъ голубой (*LUPINUS ANGUSTIFOLIUS*).

III. БОБОВЫЯ *) (мотыльковые).

Люпинъ синій. *Lupinus harsutus.*

Бобовыя растенія чрезвычайно взыскательны на почву, растуть преимущественно на пахатныхъ поляхъ, а на лугахъ не прочны въ виду того, что не переносятъ сырости, весеннихъ разливовъ и неизбѣжно растущихъ другихъ травъ, которыя ихъ вытѣсняютъ; требуютъ сильнаго удобренія; очень плохо переносятъ климатические варианты съверныхъ и даже среднихъ полосъ Россіи. Весьма сложны при уборкѣ и осыпаются очень сильно во время послѣдней, такъ что процентъ питательности, заключающейся именно только въ листьяхъ и цвѣтахъ, отходитъ громадный, и кромѣ того не многолѣтни.

*) Бобовыя травы здѣсь приводятся лишь для полноты свѣдѣній о травахъ вообще. Въ кормъ лошадямъ и вообще животнымъ, несмотря на ихъ безспорно хорошія качества въ питательномъ отношеніи, давать опасно, такъ какъ онъ слишкомъ жирны, производятъ колики и вздутие живота. Лошади ими обжираются. Въ прессовку, вслѣдствіе отпаденія листьевъ и цвѣтковъ при операциіи сънопрессованія, не годятся, за исключеніемъ прессовки ручнымъ прессомъ, который годится лишь для маленькихъ хозяйствъ.



ЛЮПИНЪ СИНИЙ (LUPINUS HIRSUTUS).

IV. ОСОКОВЫЯ, СОРНЫЯ и КИСЛЫЯ ТРАВЫ.

Камышъ. *Scirpus lacustris*.

Многолѣтній, но при осушкѣ почвы пропадаетъ. Единственное достоинство этого, никуда негоднаго какъ трава, растенія—это способность своими толстыми стволо-видными стеблями задерживать проходъ наноснаго ила во время весеннаго разлива рекъ, благодаря чему, осушенные изъ-подъ него мѣста даютъ прекрасную наносную черноземную жирную почву. Цвѣтетъ съ Іюня по Сентябрь.



Камышъ (SCIRPUS LACISTRIS).

IV. ОСОКОВЫЯ, СОРНЫЯ и КИСЛЫЯ ТРАВЫ.

Камышъ. *Scirpus lacustris*.

Многолѣтній, но при осушкѣ почвы пропадаетъ. Единственное достоинство этого, никуда негоднаго какъ трава, растенія—это способность своими толстыми стволо-видными стеблями задерживать проходъ наноснаго ила во время весеннаго разлива рѣкъ, благодаря чѣму, осушенныя изъ-подъ него мѣста даютъ прекрасную наносную черноземную жирную почву. Цвѣтетъ съ Июня по Сентябрь.

IV. ОСОКОВЫЯ, СОРНЫЯ и КИСЛЫЯ ТРАВЫ.

Рогоза. *Typha*.

Среднее между камышемъ и осокой; растетъ только на болотахъ, и цвѣтъ собирается въ цилиндрическую плотную головку чернаго цвѣта и мягкую какъ бархатъ. Цвѣтетъ въ Июнѣ и Июлѣ.



Рогоза (ТУРНА).

V. ВРЕДНЫЯ ЛУГОВЫЯ ТРАВЫ.

Стальникъ колючій. *Ononis spinosa*.

Многолѣтній; цвѣтетъ большею частью въ Іюлѣ и Августѣ. Стебель краснобурый, снизу покрытъ колючками, которые въ нижней части стебля бываютъ двойныя. Волоски расположены двумя рядами на одной сторонѣ стебля; другая его сторона почти голая. Принадлежитъ къ бобовымъ растеніямъ. Растетъ на очень сухой почвѣ. Въ молодомъ возрастѣ еще возможень для корма, но когда образуются цвѣточные почки, то желѣзистые волоски начинаютъ отдѣлять вязкій, непріятный и пахучій сокъ, весьма вредный для животныхъ.



СТАЛЬНИКЪ КОЛЮЧІЙ (*ONONIS SPINOSA*).

V. ВРЕДНЫЯ ЛУГОВЫЯ ТРАВЫ.

Гусиная лапка. *Potentilla anserina*.

Многолѣтняя, вонючая трава. Растетъ на сухихъ мѣстахъ, на песчаныхъ и торфянистыхъ лугахъ, также около болотъ и имѣеть лапчатый листъ, похожій на гусиную лапку; стебель очень коротокъ, и листья сидятъ въ розеткахъ. Цвѣтетъ цѣлое лѣто желтыми цвѣтами.





Гусиная лапка (POTENTILLA AUSERINA).

V. ВРЕДНЫЯ ЛУГОВЫЯ ТРАВЫ.

Лопушникъ. *Lappa major*.

Двухлѣтнее растеніе съ листьями громадныхъ размѣровъ, имѣющими пушистый подбой сѣроватаго цвѣта. Растетъ кустиками на сырватыхъ мѣстахъ; занимаетъ много мѣста, глушитъ окружающую траву; вообще неѣдомая трава. Цвѣтетъ въ Іюль и Августъ краснопурпуровыми цвѣтами.



Лопушникъ (LAPPA MAJOR).

V. ВРЕДНЫЯ ЛУГОВЫЯ ТРАВЫ.

Нивнякъ или пупавка. *Chrysanthemum leucanthemum.*

Двухлѣтнее растеніе, называемое также златоцвѣтомъ и полевой ромашкой; попадается на лугахъ довольно часто и имѣетъ иногда прямой стебель, иногда развѣтленный; нижніе листья съужены и кверху заострены; цвѣтетъ желтыми цвѣтами съ Мая до Августа.





НИВНЯКЪ (CHRYSANTHEUM LEUCANTHEMUM).

V. ВРЕДНЫЯ ЛУГОВЫЯ ТРАВЫ.

Калужница болотная. *Caltha palustris.*

Многолѣтнее, горьковатое растеніе. Растетъ на сырыхъ и болотистыхъ мѣстахъ; имѣеть широкій листъ, вслѣдствіе котораго, какъ притѣняющее, мѣшаетъ ростусосѣднихъ травъ, въ сухую весну въ особенности. Цвѣтетъ ярко желтыми цвѣтами съ Мая по Іюнь.



Калужница (*CALTHA PALUSTRIS*).

VI. ЯДОВИТЫЯ ЛУГОВЫЯ РАСТЕНИЯ.

Бѣлена черная. *Nyoscyamus niger*.

Двухлѣтнее, изъ семейства пасленовыхъ, лѣкарственное растеніе, попадается на всякихъ лугахъ, въ особенности вблизи жилья, сторожекъ, и достигаетъ аршинной высоты. Цвѣтеть въ Маѣ грязно желтыми цвѣтами съ темно фиолетовыми жилами. Стебель и листья покрыты мягкими, бѣловатыми, липкими волосами. Всѣ части этого растенія безусловно ядовиты, такъ какъ вызываютъ судороги, бѣшенство, параличъ и другіе припадки. Изъ сѣмянъ этого растенія приготавляется блекотное масло.



Бѣлена чёрная (*HYOSCYAMUS NIGER*)

VI. ЯДОВИТЫЯ ЛУГОВЫЯ РАСТЕНИЯ.

Бутень дикий. *Chaerophyllum sylvestris* (вупырь).

Двухлѣтнее растеніе, похожее на болиголовъ. Стебель съ плоскими бороздками, отъ 3-хъ до 4-хъ футовъ вышины, внизу волосистый. Листья сверху голые, снизу на главныхъ жилкахъ волосистые. Цвѣтетъ въ Маѣ и Июнѣ; цвѣтки бѣловатые, иногда заслончатые, въ стебельчатыхъ зоникахъ. Плоды въ четыре линіи, съ длиннымъ клювомъ (до $\frac{1}{5}$, всей длины плода), блестящіе, черные.





БУТЕНЬ ДИКІЙ (*CHAEROPHYLLUM SYLVESTRIS*).

VI. ЯДОВИТЫЯ ЛУГОВЫЯ РАСТЕНИЯ.

Болиголовъ крапчатый. *Conium maculatum*.

Растеть на болотистыхъ и сырыхъ мѣстахъ. Двухлѣтнее растеніе изъ семейства зонтичныхъ; покрываются большими перистыми листьями, которые сильно разрастаются, и затѣмъ появляется высокій стебель, внутри пустой, съ красными крапинками. Цвѣтеть съ Июня по Августъ маленькими бѣлыми цвѣточками съ сильно отталкивающимъ запахомъ. Вызываетъ сильное головокруженіе, боли въ животѣ, въ заключеніе наступаетъ бѣшенство, и животное дохнетъ. Ядовитое вещество, заключающееся въ немъ, называется конінъ.



Болиголовъ (*CONIUM MACULATUM*).

*21
105*

Рекомендовано Учебнымъ Комитетомъ, состоящимъ при собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярии по учреждениямъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ, для фундаментальныхъ библиотекъ всѣхъ подвѣдомственныхъ имъ учебныхъ заведеній (14 Дек. 1898 г., № 23136).

Одобрено: Военно-Ученымъ Комитетомъ (Цирк. Гл. Штаба 1 Іюня 1898 г., № 162).

— Учебнымъ Комитетомъ Министерства Финансовъ для библиотекъ коммерческихъ учебныхъ заведеній (30 Окт. 1898 г., № 28625).

— Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія для фундаментальныхъ библиотекъ среднихъ учебныхъ заведеній и для учительскихъ библиотекъ городскихъ и уѣздныхъ училищъ и допущено въ бесплатныя народныя библиотеки и читальни (23 Сент. 1898 г., № 23841).

— Ученымъ Комитетомъ Министерствъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ допущено въ библиотеки среднихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній вѣдомствъ этого Министерства (17 Іюня 1898 г., № 14210).

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КЛАССИФИКАЦІЯ ГЛАВНѢЙШИХЪ СОРТОВЪ ЛУГОВЫХЪ ТРАВЪ СЪ КРАТКИМЪ ОПИСАНІЕМЪ КАЖДОЙ ТРАВЫ ВЪ ОТДѢЛЬНОСТИ.

Печатается съ разрѣшенія Главнаго Интенданта и санкціи Военнаго Совѣта.

Составилъ Штабсъ-Ротмистръ Главнаго Интендантскаго Управления

А. Ю. Лашкаревъ.

пятый выпускъ

(18 хромолитографическихъ таблицъ).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЗАГОТОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БУМАГЪ.

1899.

I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Метла лесная. *Poa nemoralis*.

Низовая трава, многолѣтняя, любить тѣнистые мѣста, лѣсистую почву. Растетъ плохо и только въ смѣси съ другими травами даетъ порядочные укосы. Косить надо рано потому, что иначе былинки, на которыхъ расположены метёлки съ цветками, грубѣютъ. Начинаетъ цветти тогда, когда *Poa pratensis* или метла луговая отцвѣла и пошла на сѣмена. Урожайность съ десятины отъ 100—150 пудовъ.

T. 18.



МЕТЛА ЛѢСНАЯ (POA NEMORALIS).

I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Костеръ стоячій. *Bromus erectus*.

Верховая и многолѣтняя трава; невзыскательна на почву, поэтому если по качеству оставляетъ желать лучшаго, то зато пополняетъ собой тѣ мѣста луга, которыя не годятся для посѣва хорошихъ злачныхъ травъ. Долговѣчность ея роста находится въ зависимости отъ качества почвы, такъ, напримѣръ, на хорошей, жирной почвѣ она растетъ до 20 лѣтъ. Любитъ жару, но не переноситъ сырыхъ мѣстъ. Тѣни не боится и переносить прекрасно холодныя зимы. На хорошихъ, жирныхъ почвахъ вытѣсняется хорошими травами также, какъ и на сильно заливныхъ лугахъ, гдѣ вода долго не сходитъ. Развивается медленно и даетъ хорошие укосы со второго, а иногда и съ третьего года посѣва. Цвѣтетъ въ концѣ Мая или въ началѣ Іюня. Косить нужно по крайней мѣрѣ за недѣлю до цвѣтенія въ предупрежденіе полученія жесткаго корма. Урожайность съ десятины отъ 200—400 пудовъ.

Т. 20.



КОСТЕРЪ СТОЯЧИЙ (BROMUS ERECTUS).

I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Костеръ мягкий. *Bromus mollis*.

Многолѣтній. Листья пушистые, стебель тоже. Метёлка прямая, крупная, раскидистая, съ очень длинными тонкими вѣтвями и многочисленными колосками; кверху метёлка нѣсколько сгибается послѣ отцвѣтанія; колосики зеленоватые большею частью съ фиолетовымъ оттѣнкомъ. Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ, любитъ наносную почву, берега рѣкъ и вообще влажность, даетъ хорошия укосы за исключеніемъ юга, гдѣ онъ скоро вырождается. Для корма хорошъ, хотя не особенно питательенъ. Даетъ укосы до 400 пудовъ на десятинѣ.

T. 22.



КОСТЕРЪ МЯГКІЙ (*BROMUS MOLLIS*).

I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Гребникъ. *Cynosurus cristatus* (пѣтушиный гребешокъ, приплевчатка).

Низовая, многолѣтняя трава, чрезвычайно питательна и считается хорошей луговой травой. Засуху переноситъ свободно. Стебли тверды и плотны. Лучше всего растетъ на посмныхъ лугахъ, гдѣ развивается непродолжительно, также на песчаныхъ почвахъ; на известковыхъ растетъ хуже, такъ какъ большая связность этой почвы препятствуетъ проникновенію корней вглубь. На настоящей глинистой почвѣ онъ не растетъ. Встрѣчаются въ сырыхъ свѣжихъ и сухихъ мѣстахъ. Предпочитаетъ также почву не тошую и легче переноситъ зной, чѣмъ большинство другихъ травъ, получая пищу на глубинѣ луговой почвы. Дасть на лугахъ хороший подсѣдъ, только стебель скоро твердѣетъ. Косить надо на цвѣту, когда стебли его обладаютъ значительною питательностью. Окончательный периодъ развитія наступаетъ на третьяемъ году посѣва. Цвѣтетъ съ половины до конца Июня. Урожайность съ десятины отъ 100—120 пудовъ.

Присутствіе этой травы на лугу доказываетъ доброкачественность послѣдняго. (Демооръ).

T. 23.




ГРЕБНИКЪ (CYNOSURUS CRISTATUS).

I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Пырей обыкновенный. *Triticum repens* (бороня, волокъ, житецъ).

Низовая, многогодичная трава, не столь богатая стеблями и листьями, сколь корнями, которые, расползаясь густо подъ землею, заглушаютъ ростъ другихъ травъ. Нерѣдко сего по наружному виду смѣшиваютъ съ райграссомъ, тогда какъ различие между ними то, что у райгрassa колоски обращены къ стержню ребромъ, а у пырея широкой стороной или спинкой.

На лугахъ растетъ недолго потому, что предпочитаетъ рыхлую почву, а какъ только земля задернилась и затвердѣла, тотчасъ пропадаетъ. Онъ любить главнымъ образомъ легкую почву, плодородную, гдѣ могли бы хорошо развиваться его подземные побѣги. На песчаныхъ почвахъ съ нѣкоторою связностью, на глинистомъ мергелѣ или вообще на наиболѣе рыхлой глине пырей разрастается хорошо, хотя никогда не размножается въ такой степени, какъ на суглинистыхъ почвахъ или на такихъ, которые называютъ обыкновенно песчанистымъ суглинкомъ, суглинистымъ пескомъ или рыхлою известково-мергелью почвой. Способенъ переносить сильные засухи; причина кроется въ могучей силѣ его многочисленныхъ корней, которые по своему количеству превышаютъ въ нѣсколько разъ количество растущихъ на поверхности земли стеблей. Косить надо рано, такъ какъ во время цветенія онъ грубѣетъ. Цвѣтетъ съ Иванова дня, т.-е. съ конца Июня до конца лѣтнихъ жаровъ. Урожайность съ десятины отъ 200 · 400 пудовъ.



ПЫРЕЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ (*TRITICUM REPENS*).

I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Бухарникъ. *Holcus lanatus* (лепехъ).

Многолѣтній и шерстистый. Одинъ изъ самыхъ красивыхъ злачовъ. Стебель и листья покрыты нѣжными бархатистыми волосками; метёлка блѣднозеленая или красноватая; во время цвѣтенія рас простертъ, а потомъ суживается. Считается довольно питательной травой; по виду схожъ съ мятыкомъ, отъ котораго отличается легко опущеніемъ. Растетъ на влажныхъ лугахъ, къ почвѣ невзыскателенъ, цвѣтетъ въ Іюнѣ позже; надо косить какъ можно ранѣе, потому что въ перепущенномъ состояніи стебель толстѣетъ и желтѣетъ.



БУХАРНИКЪ (HOLCUS LANATUS).

II. ПРЯНЫЯ (зонтичныя).

Кровохлебка. *Sanguisorba officinalis.*

Многолѣтнее, мало питательное, но сильно возбуждающее растеніе. Цвѣтетъ темно-красными цвѣтами, въ видѣ шапочки, въ Іюнѣ и Іюлѣ; встрѣчается на влажныхъ лугахъ. Косить рано: впослѣдствіи деревенѣетъ.



КРОВОХЛЕБКА (*SANGUISORBA OFFICINALIS*).

II. ПРЯНЫЯ (зонтичныя).

Золототысячниeъ. *Erytraea centaurium* (краснянка).

Однолѣтняя, очень горькая лѣкарственная трава. Любить глинистую влажную почву. Цвѣтеть ярко розовыми цвѣтами съ конца Іюня до половины Августа.




Золототысячникъ (ERYTHRAEA CENTAURIUM).

II. ПРЯНЫЯ (зонтичныя).

Аиръ. *Acorus calamus.*

Многолѣтнее, сильно пахучее. Растетъ на болотистыхъ почвахъ; густо покрываются зелеными цветами. Листья имѣютъ свойство возстановлять разстроенное пищевареніе. Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ.



АИРЬ (ACORUS CALAMUS).

II. ПРЯНЫЯ (зонтичныя).

Вязель. *Coronilla*.

Многолѣтняя травка. Стебель приподымающійся; листья перистые; цвѣты бѣлые, красные или лиловые, расположены головкой или зонтикомъ на длинныхъ приподнятыхъ ножкахъ. Растетъ по холмамъ, заливнымъ лугамъ и пашнямъ. Сѣмена его обладаютъ рвотными и слабительными свойствами. Къ почвѣ и климатическимъ условіямъ неизыскателенъ. Цвѣтетъ съ Іюня до Сентября. Косить надо до цвѣтенія или въ самомъ началѣ таковаго, когда онъ представляеть изъ себя отличный кормъ, несмотря на то, что въ высушенномъ видѣ получаетъ черногрязный цвѣтъ.



Вязель (CORONILLA).

II. ПРЯНЫЯ (зонтичныя).

Душица. *Origanum vulgare* (щабрецъ).

Многолѣтняя, очень ароматичная травка, пріятная на вкусъ, растетъ всюду, предпочитается при этомъ известковую почву. Розоватые цвѣты. Покрыта волосками, ползучая. Цвѣтетъ цѣлое лѣто.

Т. 45.



Душица (ORIGANUM VULGARE).

III. БОБОВЫЯ *) (мотыльковые).

Вика кормовая. *Vicia sativa* (горошекъ кормовой).

Бобовые растенія чрезвычайно взыскательны на почву, растутъ преимущественно на пахатныхъ поляхъ, а на лугахъ не прочны въ виду того, что не переносятъ сырости, весеннихъ разливовъ и неизбѣжно растущихъ другихъ травъ, которыя ихъ вытѣсняютъ; требуютъ сильнаго удобренія; очень плохо переносятъ климатические варианты сѣверныхъ и даже среднихъ полосъ Россіи. Весьма сложны при уборкѣ и осыпаются очень сильно во время послѣдней, такъ что процентъ питательности, заключающейся именно только въ листьяхъ и цвѣтахъ, отходитъ громадный, и кромѣ того не многолѣтни.

*) Бобовые травы здѣсь приводятся лишь для полноты свѣдѣній о травахъ вообще. Въ кормъ лошадямъ и вообще животнымъ, несмотря на ихъ безспорно хорошія качества въ питательномъ отношеніи, давать опасно, такъ какъ онѣ слишкомъ жирны, производятъ колики и вздутие живота. Лошади ими обжираются. Въ прессовку, вслѣдствіе отпаденія листьевъ и цвѣтковъ при операциіи сѣнапрессованія, не годятся, за исключеніемъ прессовки ручнымъ прессомъ, который годится лишь для маленькихъ хозяйствъ.

T. 59.



ВИКА КОРМОВАЯ (*VICIA SATIVA*)

III. БОБОВЫЯ *) (мотыльковые).

Вика мохнатая или песчаная. *Vicia villosa.*

Бобовыя растенія чрезвычайно взыскательны на почву, растутъ преимущественно на пахатныхъ поляхъ, а на лугахъ непрочны въ виду того, что не переносятъ сырости, весеннихъ разливовъ и неизбѣжно растущихъ другихъ травъ, которыя ихъ вытѣсняютъ; требуютъ сильнаго удобренія, очень плохо переносятъ климатические варианты сѣверныхъ и даже среднихъ полосъ Россіи. Весьма сложны при уборкѣ и осыпаются очень сильно во время послѣдней, такъ что процентъ питательности, заключающейся именно только въ листьяхъ и цветахъ, отходитъ громадный, и кромѣ того не многолѣтни.

*) Бобовыя травы здѣсь приводятся лишь для полноты свѣдѣній о травахъ вообще. Въ кормъ лошадямъ и вообще животнымъ, несмотря на ихъ безспорно хорошія качества въ питательномъ отношеніи, давать опасно, такъ какъ онъ слишкомъ жирны, производятъ колики и вздутие живота. Лошади ими обжираются. Въ прессовку, вслѣдствіе отпаденія листьевъ и цветковъ при операциіи сѣннопрессованія, не годятся, за исключеніемъ прессовки ручнымъ прессомъ, который годится лишь для маленькихъ хозяйствъ.




ВИКА МОХНАТАЯ (*VICIA VILLOSA*).

IV. ОСОКОВЫЯ, СОРНЫЯ и КИСЛЫЯ ТРАВЫ.

Бѣлоусъ. *Nardus* (щетиница).

Многолѣтняя верховая трава, сѣровато-зеленая, образующая густыя, многостебельные дерновины. По виду похожа на овсяницу, отъ которой разнится лишь легко цвѣтующими стеблями, которые остаются долго по высыханію. Какъ злакъ, считается худшимъ злаковымъ растеніемъ, но имѣеть то достоинство, что корни его, глубоко проникая въ почву, связываютъ голый песокъ и образуютъ хорошую дернину. Употребляется въ народной медицинѣ отъ лихорадокъ. Цвѣтетъ Май и Іюнь. Разводится на сухихъ лугахъ, между кустарниками и въ сосновыхъ лѣсахъ.

Т. 73.



Бѣлоусъ (NARDUS).

IV. ОСОКОВЫЯ, СОРНЫЯ и КИСЛЫЯ ТРАВЫ.

Щавель. Rumex.

Многолѣтняя верховая трава, такъ называемый конскій щавель. Имѣеть очень твердый, какъ палка, стебель, на концѣ котораго образуется жесткая метёлка. Разрастается на всякой почвѣ настолько, что прекращаетъ ростъ хорошихъ травъ. Требуетъ выдергиванія съ корнемъ, такъ какъ онъ многолѣтній, и иначе отъ него отдѣляться нельзя; имѣеть 8 разновидностей. Цвѣтетъ цѣлое лѣто красноватыми цвѣтами; вкусъ листа кисловатый.




ШАВЕЛЬ (RUMEX).

IV. ОСОКОВЫЯ, СОРНЫЯ и КИСЛЫЯ ТРАВЫ.

Ирисъ. *Iris germanica* (касатикъ).

Многолѣтнее, до 80 сортовъ, саблевидное растеніе, растущее только на болотахъ мокрыхъ; цвѣтетъ голубыми цвѣтами, на подобіе лиліи, въ Маѣ и Іюнѣ. Требуетъ уничтоженія съ корневищемъ или осенняго выжиганія.




ИРИСЪ (IRIS GERMANICA).

V. ВРЕДНЫЯ ЛУГОВЫЯ ТРАВЫ.

Верескъ. *Calluna vulgaris*.

Многолѣтній полукустарникъ, растетъ на сухихъ лугахъ и на землѣ плохого качества. Возможно истреблять зимой на топливо. Цвѣтетъ фиолетовыми цветами въ Июнѣ.



ВЕРЕСКЪ (CALLUNA VULGARIS).

V. ВРЕДНЫЯ ЛУГОВЫЯ ТРАВЫ.

Мать-Мачиха. *Tussilago Farfara.*

Многолѣтнее; имѣеть очень большой листъ; встрѣчается на хорошихъ лугахъ; чрезвычайно быстро распространяется; такъ какъ это сравнительно большое растеніе, то его очень удобно выкапывать и тутъ же зарывать. Цвѣтетъ желтыми цвѣтами въ Мартѣ и Апрѣлѣ.



МАТЬ-МАЧИХА (TUSSILAGO FARFARA).