



**TÜRKMENISTANYŇ GUŞLARY
ПТИЦЫ ТУРКМЕНИСТАНА**




**TÜRKMENISTANYŇ
GUŞLARY**

suratly meýdan kesgitleýjisi

**ПТИЦЫ
ТУРКМЕНИСТАНА**

полевой иллюстрированный определитель



TÜRKMENISTANYŇ GUŞLARY


suratly meýdan kesgitleýjisi

ПТИЦЫ ТУРКМЕНИСТАНА

полевой иллюстрированный определитель

Prof. E.A. Rustamowuň
redaksiýasy bilen

Под редакцией
проф. Э.А. Рустамова



Aşgabat. Ýlym - 2013 - Ашхабад. Ылым

T 90 **Rustamow E.A. /red./.**

Türkmenistanyň guşlary: suratly meýdan kesgitleýjisi. – Aşgabat: Ylym, 2013. – 688 s.
844 reňkli (422 suratlar, 422 karta-shemalar) we 11 gara-ak suratlar.

Kitap Türkmenistanyň guşlary boýunça gysgaça ylmy-populýar maglumat toplumydyr. Okyjylaryň giň körpüligi, ilkinji nobatda, ornitologlar, şeýle-de zoologlar, ekologlar, geograflar-sýahatçylar, biologiki dürlüligi gorap saklamak ulgamynyň ylmy we amaly işgärleri, goraghanalaryň hünärmenleri, awçylar, mekdep okuwçylary, talyplar, orta we ýokary okuw mekdeplerini mugallymlary hem-de ölkämiziň tebigaty bilen gyzyklanýan adamlar üçin niýetlenýär.

Redaktor: prof. **Rustamow E.A.**Rus dilindäki beýanyň koreksiýasy: b.y.k. **Belousowa A.W.**Türkmen diline terjime eden: dos. **Ataýew K.A.**

Türkmençe terjimäniň

koreksiýasy: dos. **Sopyýew Ö.S., Nursahatow Y.**Kartografiya: **Weýisow A.S.**Dizaýn: **Rustamow E.A., Kogan A.S., Slipçuk A.S., Kösekow M.M., Ahmetyarow R.**

Ähli hukuklar goraglydyr. Şu neşiriň hiç bir bölegi neşirýatçydan deslapdan rugsatsyz köpeldilip, maglumat beriji ulgamlarda saklanylyp ýa-da islendik bir görnüşde – elektron, mehaniki, optiki, fotografiki nusga alyş ýa-da ýazgy ediş serişdeleri arkaly ýa-da beýleki usullar bilen ulanylyp bilinmez.

elldaru@mail.ru

© Rustamow E.A., 2012. golyazma, kartalar.

© UNDP/ПРООН, Türkmenistan, 2013.

PDF-2015.

ТДКП №391, 2013 КБК 28.693.35-92 ýа2.

Çap etmäge rugsat edildi 02.12.13.

Ölçegi 60x90/16 A-73319.

Hasap-neşir listi 44,67.

Çap listi. 43,0.

Neşir №110.

Sany 1500.

Т 90 **Рустамов Э.А. /ред./.**

Птицы Туркменистана: полевой иллюстрированный определитель. Ашхабад: Ылым, 2013. – 688 с.

Цв. ил. 844 (422 рисунков и 422 картосхем), черно-белых - 11.

Книга представляет краткую научно-популярную сводку по птицам Туркменистана. Предназначена для широкого круга читателей, в первую очередь, орнитологов и других зоологов, экологов, географов-путешественников, научных сотрудников и практиков по сохранению биоразнообразия, работников заповедников, охотников, школьников, студентов, преподавателей школ и ВУЗов, и всех кто интересуется природой родного края.

Redaktor: проф. **Рустамов Э.А.**

Коррекция русского

текста: к.б.н. **Белоусова А.В.**

Перевод на туркменский

язык: доц. **Атаев К.А.**

Коррекция туркменского

перевода: доц. **Сопыев О.С., Нурсахатов И.**Картография: **Вейисов А.С.**Дизайн: **Рустамов Э.А., Коган А.С.,****Слипчук А.С., Косекow М.М., Ахметьяров Р.**

Все права защищены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена, сохранена в информационных системах или передана в любой форме или иными средствами электронного, механического, оптического, фотографического копирования или записи, или другими способами без предварительного разрешения издателя.

elldaru@mail.ru

© Рустамов Э.А., 2012, текст, карты.

© UNDP/ПРООН, Туркменистан, 2013.

PDF-2015.

ТГКП №391, 2013 КБК 28.693.35-92 ýа2.

Подписано в печать 02.12.13.

Формат 69x90/16 A-733.19.

Издл. 44,67

Печатл. 43,0.

Издат. № 110.

Тираж 1500.

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Diýarymyzyň özboluşly tebigatyny, onuň biologiki baýlyklaryny, şol sanda guşlaryny rejeli peýdalanmakda, gorap saklamakda her bir raýatyň watançylyk duýgusynda ekologiki sowatlylygyny ýokarlandyrmakda, oňa çuňňur akyl yetirmekde, eňňizdäki kitabyň ähmiýetiniň uly boljakdygy şübhesizdir.

Guşlar ýaly, şeýle özüne çekiji, guwandyrjy, täsin galdyrjy, ruhuňy göreriji, başga bir haýwan toparyny göz öňüne getirmek kyn. Olar oňurgaly haýwanlaryň arasynda has bezemenleri we ýakymly owazlylary. Görnüşleriniň dürlüligi we sany boýunça gury ýerde ýaşayan ýokary derejeli haýwanlaryň olar bilen bäsleşip biljekleri ýok. Guşlar zeminiň ähli ýerlerinde mekan tutýarlar – gury ýerde, köllerde, ummanlarda, buzluklarda, daglarda, tokaýlyklarda, çöllüklerde, daglaryň gowaklarynda we obadyr şäherlerde. Dünýäde guşlar iň işjeň hereketli haýwanlaryň biri bolup, älem giňişliginiň hemme ýerlerine aralaşýarlar we elmydama biz bilen ýanaşyk ýaşýarlar.

Guşlaryň çäksiz gözelligi gadymy döwürlerden bäri adamlaryň ünsüni özüne çekip geldi. Güzine guşlaryň köpüsiniň „ýitip gitmek“ syry adamlary gyzyklandyrdy we olaryň ýazyna uçup gelmek hadysasyna uzak wagtlap düşünmäge çalyşdylar. Dünýäniň köp halklarynyň milli döredijiliginde we ruhy garaýşlarynda guşlar wajyp orny eýelediler. Guşlaryň ajaýyp durmuşyň nuşany, asmanyň we günüň, gök gürlämäniň we ýeliň,

В эпоху могущества и счастья, в осуществлении политики **Уважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова** по рациональному использованию богатств родной природы, охраны ее красот и биоразнообразия, включая птиц, повышения экологической грамотности людей, выход этой книги, несомненно, представляется важным событием.

Трудно представить какую-либо группу животных, которые вызывали такие высокие чувства интереса и восхищения, восторга и вдохновения, как птицы. Из всех позвоночных животных они наиболее красочны и сладкоголосы. По видовому разнообразию и численности им нет равных среди сухопутных высших животных. Живут они везде на нашей земле – на суше, в морях и океанах, во льдах, горах, лесах и пустынях, пещерах и городах. Птицы широко распространились по всему миру, они вездесущи, птицы всегда рядом с нами.

Уже в глубокой древности внимание людей привлекала необычайная красота птиц. Люди сталкивались и с загадочным «исчезновением» многих птиц осенью и появлением их весной и долго не могли понять эти явления. Важную роль играли птицы в фольклоре и мифологических воззрениях многих народов мира. Хорошо известно, что птицы служили символами божественной сущности, духа неба и солнца, грома и ветра, плодородия и изобилия, свободы, вдохновения и пророчества, духа самой жизни. Перья экзотических птиц

hasyllylygyň we bolçulygyň, erkinligiň, ruhybelentligiň we öňdeň görüjiligiň kuwwaty, ýaşayşyň düýp mazmuny bolup durýandygy hemmä mälimdir. Owadan reňkli guşlaryň ýeleklere atly-abraýly adamlaryň egin-eşikleriniň, şeýle-de ýönekeý raýatlaryň kellä geýilýän sobaçlarynyň bezegi boldy.

Mundan 150 mln. ýyl öň ýura döwründe ilkinji guşlar peýda boldular. Guşlaryň nesil başlangyjy ylymda entek belli däl. Çaklamalara salgylansaň, olar gadymky sürenijilerden – ýura döwri başlamazyndan öňürti triýasda ýaşap geçen psewdozuhilerden (şolaryň wekillerinden biri, hemmä mälim - arheopteriks) gelip çykypdyr. Guşlar dinowawrlaryň gös-göni neslimi ýa-da psewdozuhilerden döräpmi diýen meseläni entek anyklamak gerek...

Guşlaryň köpüsi howada uçmaga uýgunlaşandyrlar. Dünýäde 9 müne golaý görnüşi (80% – tropik zolakda) bolup, olar häzirkä sistematika boýunça 28 otrýada jemlenýärler: pingwinler, düýeguşlar, nandular, kazuarlar, kiwiler, tinamular, ýoglaşekilliler, tersaýakşekilliler, gaýbuşlukçylar, gotanşekilliler, leglekşekilliler, gyzyl-gazşekilliler, gazşekilliler, laçynşekilliler, towukşekilliler, durnaşekilliler, çulukşekilliler, kepderişekilliler, totuguşlar, ikatýokşekilliler, baýguşşekilliler, gündizkörşekilliler, atgarlawaşekilliler, guş-syçanlar, trogonlar, gökgarlakşekilliler, doňuzguşşekilliler, serçeşekilliler. Türkmenistanyň faunasy 18 otrýaddan 422 görnüşden durýar.

Guşlaryň oturymly görnüşleriniň ýaşayşy belli bir yerler bilen bagly, olar guşyna uzak bolmadyk göçüp-gonma ýa-da birnäçe kulometrdäki ýerlere günde iýmitlenmäge uçup gidip gelyärler (mysal üçin, gargalar,

украшали одежды и, прежде всего, головные уборы людей, причем как именитых, так и простолюдинов.

Первые птицы появились на земле в юрском периоде более 150 млн. лет назад. Непосредственные предки птиц науке пока не известны. Предполагают, что они произошли от древних пресмыкающихся–псевдозухий (один из их представителей – археоптерикс – известен всем), живших с триасового периода до начала юрского. Являются ли птицы прямыми потомками динозавров или они происходят непосредственно от псевдозухий, предстоит еще выяснить.

Большинство птиц приспособлены к активному полету. В мире насчитывается около 9 тыс. видов (80% – в тропиках), объединенных в 28 современных отрядов: пингвины, страусы, нанду, казуары, киви, тинаму, гагарообразные, поганкообразные, буревестники, пеликанообразные, аистообразные, фламингообразные, гусеобразные, соколообразные, курообразные, журавлеобразные, ржанкообразные, голубеобразные, попугаи, кукушкообразные, совообразные, козодоеобразные, стрижеобразные, птицы-мыши, трогоны, ракшеобразные, дятлообразные, воробьинообразные. В фауне Туркменистана – 422 вида из 18 отрядов.

У оседлых видов птиц жизнь протекает на постоянных участках, зимой они совершают недалекие перекочевки или суточные перелеты на несколько километров к местам кормежки (например, врановые, скворцы, синицы). А перелетные птицы совершают регулярные миграции. Протяженность

sarlar, jikjikiler). Uçup geçýän guşlar zygyderli migrasiýa geçirýärler. Uçup geçýän ýolunyň uzynlygy käte onlarça müň kilometre ýetýär. Taýmyrda höwürgtgeleýän we Antarktidadanyň kenarýakasynda gyşlaýan polýar çeriginiň migrasiýa ýoly iň uzyny – 24 müň km. Göçüp-gonýan guşlar iýmit gözleginde agyp-dönüp, ýüzlerçe kilometr ýoly geçmekleri hem mümkin, emma şonda olar kesgitli uçup geçmek möhleti, uçýan ugru we düşlejek yeriniň tertibi saklanmaýar (mysal üçin, melemtil girrikler, çetçetiler, ala sarlar we başg.). Guşlaryň migrasiýasynyň köplenç halatda möwsümleýin geçmegi, olaryň iýmite baý we ýurtyjylaryň az bolan yerlerinde saklanyp, tomus döwründe höwürgtgeleýändikleri we guşyna - klimatyň we iýmit şertleriniň has amatly bolan zolaklaryna uçup gidýändikleri bilen baglanyşykly. Adatça, ýazyna uly guşlar, geçen tomusda jüýjelän yerlerine gaýdyp gelyärler, güýzüne bolsa, geçen ýyl guşlan yerlerine uçup barýarlar.

Tebigatda we adamyň ýaşayşynda guşlaryň ähmiýeti köpdürli: ösümlikleriň güllerini tozanlandyryýarlar we olaryň tohumlaryny ýaýradýarlar, mör-möjekleriň we gemrijileriň sanyny kadalaşdyryýarlar, görnüşleriň käbirleri, käte miweli baglara, däneli ekinlere «tötänleýin» zyýankeş we ýokanç keselleri geçiriji görnüşe geçýärler. Görnüşleriň birtopary eldekileşdirildi we adam tarapyndan çig mal, iýmit we höwes çeşmesi hökmünde peýdalanylýar. Şolardan köpüsi aw guşlarydyr, laçynlar we beýleki ýurtyjy guşlar bolsa, adama ussatlyk bilen aw awlamakda hyzmat edýärler. Guşlaryň biz üçin çeperçilik we medeni ähmiýeti hem uludyr.

маршрутов иногда составляет десятки тысяч километров. Так, самая длинная миграционная трасса полярной крачки, гнездящейся на Таймыре и зимующей у побережий Антарктиды, составляет почти 24 тыс. км. Кочующие птицы, перемещаясь в поисках кормов, могут преодолеть сотни километров, при этом они не придерживаются постоянных сроков, маршрутов и мест пребывания (например, буланые вьюрки, чечетки, розовые скворцы и др.). В большинстве случаев миграции являются сезонными и связаны с тем, что в летний период птицы размножаются там, где больше корма и меньше хищников, а на зиму улетают в зоны с более благоприятными климатическими и кормовыми условиями. Взрослые птицы весной обычно возвращаются в места, где выводили птенцов прошлым летом, а осенью прилетают туда, где зимовали в прошлом году.

Значение птиц в природе и жизни людей многообразно: опыление растений и распространение их семян, регуляция численности насекомых и грызунов, некоторые виды местами оказываются «неумышленными» вредителями садов и посевов зерновых и переносчиками инфекций. Ряд видов одомашнены и используются человеком как источник сырья, пищи, как хобби. Многие из них являются объектами охоты, а сокола и другие хищные птицы служат человеку в качестве виртуозных охотников на дичь. Велика для нас эстетическая и культурная роль птиц.

Как и другие компоненты био-разнообразия, птицы подвергаются большому антропогенному прессу,

Guşlar biologiki dürlüligiň beýleki agzalary ýaly, uly antropogen basyşa sezewar bolýarlar, olaryň ýaşaýan ýerleriniň üýtgemegi bolup geçýär, baş sany azalýar. Şol ýa-da beýleki meýdan giňişlikleriň özleşdirilişine has çökder çemeleşilmegi, diňe bir guşlaryň sanynyň azalmagyna getirmän, eýsem olaryň populýasiýalarynyň, hat-da görnüşleriň ýok bolup gitmegine hem getirýär. Ýer ýüzünden soňky 400 ýylyň dowamynda guşlaryň 100-den gowrak görnüşi ýitip ýok bolup gitdi, şolardan 30-dan gowrak görnüş soňky asyrdan ölüp-ýitip gitdi. Guşlaryň görnüşleriniň ölüp-ýitip gitmeginiň esasy sebäpleriniň biri adamlaryň işjeň täsirinde, onda-da köplenç tebigy lanşaftlaryň özgermegine täsiri tutuş zemin örtügininiň keşbiniň üýtgemegi bolup geçýär.

Şonuň üçin, häzirkä döwürde dünýäde biologik dürlüligi, şol sanda guşlary, gorap saklamaklyga gönükdirilen tebigaty goramak boýunça edaralaryň dürli maksatnamalary uly ähmiýete eýe bolýar. Örän köp ýurtlarda ýabany guşlary gorap saklamaga ylmy, bilimi we syňahatçylyk ulgamyny birleşdirýän aýgıtly hereketler güýje geldi. Türkmenistanda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň we Dünýä ekologik gaznasynyň (BMG ÖM/DEG) „Hazar deňziniň kenarýakasyndaky Hazar goraghanasynyň dünýä ähmiýetli biologiki dürlüligini aýap saklamak we durnukly peýdalanmak» taslamasy durmuşa geçirilýär (2006-2010 ý.), onuň goldawynda bu kitaby çap etmek mümkin boldy.

происходит трансформация местообитаний птиц, сокращается их численность. Порой агрессивное хозяйственное освоение той или иной территории приводит не только к уменьшению числа птиц, но и к вымиранию их популяций и даже видов. За последние 400 лет на земле исчезло свыше 100 видов птиц, из которых более 30 видов вымерли за последний век. Одной из основных причин вымирания видов является деятельность людей по изменению и зачастую нарушению природных ландшафтов, всего лика земли.

В связи с этим все большее значение в современном мире приобретают программы различных природоохранных организаций, направленные на сохранение биологического разнообразия, в том числе и птиц. В очень многих странах охрана диких птиц оформилась в мощное движение, объединяющее науку, просвещение и индустрию туризма. В Туркменистане осуществлялся (2006-2010 гг.) Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия мирового значения в Хазарском заповеднике на побережье Каспийского моря», благодаря которому появление данного издания стало возможным.

Для чего и для кого предназначена эта книга

Познанию орнитологической фауны Туркменистана в исторический период насчитывается более 200 лет. Если на первых этапах изучения птиц приоритет отдавался сбору орнитологических коллекций, то в последнее время про-

Bu kitap näme üçin we kimler üçin niýetlenýär

Türkmenistanyň ornitofaunasyny öwrenmegiň taryhy döwri 200 ýyldan gowrak wagt hasaplanýar. Eger-de ilkinji tapgyrlarda guşlary öwrenmekde esasy üns guşlaryň kolleksiyalaryny ýygnamaga gönükdirilen bolsa, indi, onuň ugry soňky döwürde tebigatda guşlara gözgeçilik geçirmek we surata düşürmek tarapa gönükdirildi. Meýdan şertinde guşlary kesgitlemek üçin gerekli edebiyat çeşmeleriniň ýurdumyzda ýetmezçilik edýändigini köpden bäri belli. Mundan 75 ýyl ozal Türkmenistanyň guşlary boýunça ýeke-täk kesgitleýji düzüldi (Şestoperow, 1937), ol hem tutulan guşy «eliňde saklap» öwrenmek tertibinde berilýär. Geçen asyrdan gysga we doly möçberli guşlary kesgitleýjiler düzüldi, olar diňe bir «tejribehana» däl-de, eýsem meýdan şertinde hem degişli boldy, onda Türkmenistanyň faunasynyň guşlary öňki SSSR-iň umumy araçäkleri beýan edildi (Dementýew we başg., 1948; Gladkow we başg., 1964; Flint we başg., 1968; Iwanow we Ştegman, 1978; Flint we başg., 1984; we başg.). Bulardan başga Türkmenistanda örän köp ylmy işler çap edildi, şolardan has wajyplary we doly göwrümlileri, ýokarda ady tutulan Ý.L. Şestoperowyň kesgitleýjisinden (1937) başga N.A. Zarudnyň «Hazar aňrasy ülkäniň ornitologik faunasy» (1896), G.P. Dementýewiň «Türkmenistanyň guşlary» 1 tom (1952), A.K. Rustamowyň «Garagum çölüniň guşlary» we «Türkmenistanyň guşlary» 2 tom (1954, 1958), «Orta Aziýanyň guşlary» (2007, 1 tom, A.K. Rustamowyň we A.F. Kowşaryň redaksiýasy bilen), «Türkmenistanyň möhüm ornitologik

изошла переориентация в сторону наблюдений и фотографирования птиц в природе. Источников по определению птиц в полевых условиях у нас в стране явно не хватало. Единственный определитель по птицам Туркменистана был создан более 75 лет назад (Шестоперов, 1937), да и он предназначался для определения в «контактном режиме» с птицей. В прошлом столетии определители птиц, краткие и полные, составлялись, причем не только как «лабораторные», но и как полевые, и в них птицы Туркменистана описывались в общих границах бывшего СССР (Дементьев и др., 1948; Гладков и др., 1964; Флинт и др., 1968; Иванов и Штегман, 1978; Флинт и др., 1984; и др.). Помимо всего, птицам Туркменистана посвящено большое количество научных публикаций, наиболее важными и всеобъемлющими из которых, кроме упомянутого определителя Е.Л. Шестоперова (1937), считаются такие крупные книги, как «Орнитологическая фауна Закаспийского края» Н.А. Зарудного (1896), 1-й том «Птицы Туркменистана» Г.П. Дементьева (1952), «Птицы пустыни Каракум» и 2-й том «Птицы Туркменистана» А.К. Рустамова (1954, 1958), «Птицы Средней Азии» (2007, 1-й том, под редакцией А.К. Рустамова и А.Ф. Ковшаря), «Ключевые орнитологические территории Туркменистана» (Рустамов, Уэлш и Бромбахер, 2009).

В Туркменистане профессиональным изучением и охраной птиц занимаются, в основном, ученые Академии наук Туркменистана, государственных заповедников, а также иностранные орнитологи и любители птиц в рамках различ-

ýerleri» (Rustamow, Ueş we Brombacher, 2009) degişlidir.

Türkmenistanda ýokary hünärmen derejesinde guşlary öwrenmek we gorap saklamak boýunca esasan, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Ýokary mekdepleriň alymlary, döwlet goraghanalarynyň işgärleri, daşary ýurt ornitologlary işlediler we Tebigaty goramak ministriliginiň, BMG ÖM/DEG-niň dürli tebigaty goramak maksatnamalarynyň, şeýle-de Merkezi Aziýanyň Möhüm ornitologik ýerleri – Birdlife International Maksatnamasy çäginde guşlary söýüjiler gatnaşdylar.

Kitabyň esasy maksady – guşlar dünýäsini öwrenmekden, olaryň türkmençe, latynça we rusça atlaryny, şeýle-de görnüş derejesini, häzirkä zaman statusyny hem-de ýaşayşyny anyklamaga islendik adama kömek bermekden ybarat. Bu kömek kän bir öýümüzde bolan wagtymyz däl-de, tebigat bilen aragatnaşykda – gezençde we syýahatda bolanymyzda, dynç almaga meýdana çykanymyzda, aw awlamaga we balyk tutmaga gideneimizde gerek. Dogrusy, suratlar bilen bezelen bu kesgitleýjiniň esasy düzüm böleginde, Türkmenistanyň häzirkä meýdan giňliginde gabat gelyän guşlaryň hemme görnüşleriniň diýen ýaly suratlarynyň bolmagydyr. Örän seýrek we biziň ýurdumyzda bir gezek ýa-da soňky 100-110 ýylyň dowamynda birnäçe gezek hasaba alnan görnüşleriň suratlaryny goýmak meýilleşdirilmedi, emma, *Bellikde* we kesgitleýjiniň degişli bölümlerinde, olaryň aýratynlyklary barada maglumatlar goşuldy.

Awtorlar topary Türkmenistanda DEG/UNDP-niň Hazar taslamasynyň goldawynda we IBA/

ных природоохранных программ Министерства охраны природы, ПРООН/ГЭФ, а также Программы Birdlife International – Ключевые орнитологические территории Центральной Азии.

Основное назначение книги – помощь любому человеку в познании мира птиц и определении их туркменских, латинских и русских названий, иными словами – видовой принадлежности, современного статуса и образа жизни. И помощь эта зачастую нужна, когда мы находимся не столько дома, сколько при общении с природой – на прогулках и экскурсиях, пикниках, на охоте и рыбалке и т. д. Вполне понятно, что основными структурными элементами этого иллюстрированного определителя должны быть цветные рисунки с изображением всех видов птиц, встречающихся на территории нынешнего Туркменистана. Для видов, которые очень редки и были отмечены у нас в стране один или несколько раз за последние 100-110 лет, включены в соответствующих местах определителя как *Примечания* по их внешним и другим особенностям.

Выполняя работы по составлению определителя в рамках Хазарского проекта GEF/UNDP и, параллельно, Программы IBA/Birdlife International в Туркменистане, авторский коллектив следовал стандартам **номенклатуры Birdlife International, используемой во Всемирной базе данных по биоразнообразию (WBDB)**, поэтому латинские названия птиц соответствуют принятым Birdlife International (2012), равно как объем видов и таксонов внутри семейств и этих таксонов. Исключе-

Birdlife International Maksatnamasy çäginde kesgitleýjini düzmek boýunça iş ýerine ýetirilende **Birdlife Internationalyň, biologiki dürülik (WBDB) Bütindünýä maglumat gory boýunça ulanylýan standart nomenklaturasyna eýerdi**, şol sebäpli, guşlaryň latynça atlary Birdlife Internationalyň (2012) kabul eden tertibinde görnüşleriň uzygyderligi, maşgala içindäki taksonlar we taksonlaryň göwrümi gabat gelyär. 3 görnüş - dulanan goýunguş, ala garga we hindi serçesi üçin kadadan çykyp L.S. Stepanyan (1990) boýunça berildi. Görnüşleriň rusça atlary, umuman, L.S. Stepanyanyň (1990) we E.I. Gawrilowuyň (1999) beýany ýazgylaryna, Türkmenistanyň möhüm ornitologik ýerleri (2009) üçin kabul edilen kataloga we Hazar taslamasynyň maliýe goldawynda çap edilen Türkmenistanyň awifaunasynyň sanawuna (Ataýew we başg., 2010) gabat gelyär. Guşlaryň türkmençe atlary „Türkmenistandaky haýwanlaryň atlarynyň üçdilli sözlügi“ boýunça berildi (Gurbanow we başg., 1997). 686-687-nji sahypadaky suratlar Gazagystanyň guşlarynyň meýdan kesgitleýjisinden alyndy (W.K. Rýabisew, we başg., 2014). Guşlaryň reňkli suratlary Beýik Britaniýa Zenan Patyşalygynyň guşlary goramak jemgyýetinden (PGGJ) (sur. 250 sany) Mihael Brombaheriň araçylygynda alyndy we bölekleyin Fýodor Karpow ýerine ýetirdi (sur.158 sany), käbir gara-ak we reňkli suratlar – Guşlaryň meýdan kesgitleýjisinden Flint W.Y. & all. (1984) hem-de 88,175, 203,276,285,404,416,418,419,417,421 alyndy.

Kesgitleýji kitapdan peýdalanmakdan öňürti, guşlaryň ornitologiýa ylmynda kabul edilen beden agzalary we ýelek örtüklü ýerleri

чение было сделано для 3-х видов – маскированная трясогузка, серая ворона и индийский воробей, приводимых по Л.С. Степаняну (1990). Но очередность расположения видов и их русские названия в целом соответствуют таковым в работах Л.С. Степаняна (1990) и Э.И. Гаврилова (1999); приняты, как и для каталога Ключевые орнитологические территории Туркменистана (2009) и списка авифауны Туркменистана, последний был опубликован также при содействии Хазарского проекта (Атаев и др., 2010). Туркменские названия птиц приводятся по Трёхязычному словарю туркменских названий животных (Курбанов и др., 1997) с некоторыми изменениями. Рисунки на стр. 686-687 заимствованы из Полевого определителя птиц Казахстана (В.К. Рябицев, и др., 2014). Цветные иллюстрации птиц, при посредничестве Михаеля Бромбахера, предоставлены Королевским обществом защиты птиц (RSPB) Великобритании (250 рисунков), а также Федором Карповым (158 рисунков). Все черно-белые и цветные рисунки 88, 175,203,276,285,404,416,418,419 и 421 заимствованы из Flint V.E. & all. (1984), рисунки 142, 190, и 422 – у Killian Mullarncy & Dan Zetterstrom (1999), 204 у Salim Ali (1964).

Прежде чем пользоваться книгой-определителем, необходимо ознакомиться с принятыми в орнитологической науке названиями частей тела и участков оперения птицы (см. рис. на стр. 686-687), которые при описании птиц использовались составителями, но не обязательно все и не во всех очерках. Рисунки эти специально вынесены в конец книги, что-

bilen (ser. sah. 686-687) tanyşmak gerek. Bu suratlardan islendik wagt, ýagny meýdan gözegçiliginden öň ýa-da soň, ýa-da gös-göni gözegçilik döwründe peýdalanyp bolar.

Guşlara gözegçilik geçirmegiň iň gowy wagty ýaz pasly, aýratyn-da irertir ýa-da giçlik. Şonuň üçin çaklaňja gurallary ýanyňa almaly – dürbi, guşlary kesgitleýji, ýazuw depderçesi we gara galam. Ekskursiýany topar - 3-4 adam bolup, guşlary kesgitlemäge kömek edip, kitapda ýok maglumatlary goşup aýdyp biljek tejribeli ornitologyň gatnaşmagynda geçirilse gowy. Emma, ýylyň beýleki pasylyrynda gözegçilikleri geçirmek zerur, çünki, biziň guşlarymyzyň arasynda görnüşleriň migrasiýa edýänleri, uçup gidýän-gyşlaýanlary az däl, şonuň üçin pasylyaryň ählisinde täsin görnüşler duşup bilerler. Nätanýş guş bilen gabatlaşanyňda derrew kesgitleýji kitaby döwür başlamakdan saklanyp, başda sabyrlylyk bilen guş bar ünsüňi berip, mümkin boldugyça dowamly synlamaga çalyşmaly.

Kitapdan nähili peýdalanmaly

Tekstdе her bir görnüş we surat üçin oçerk – onda-da meýdan şertinde şol ýa-da beýleki guş bilen „ýakynдан tanyşmaklyga“ we ony kesgitlemeklige mümkinçilik berýän, alamatlaryna has ýakynlaşdyrylan häsiýetnamanyň gysgaça beýany berilýär. Kitapda şeýle oçerkler Türkmenistanyň ornitofaunasynyň düzümindäki görnüşleriň sany 422(bellik görnüşli ýazgylar bilen) we olar guşlaryň otrýad we maşgala sistematik toparyna gabat gelyän bölümlere toplanlydy. Öz gezeginde toparlar barada tutuşlaýyn düşünje almaga, şol toparyň her biri üçin

бы ими было удобнее пользоваться в любое время - до или после, или непосредственно во время экскурсий и наблюдений.

Наиболее интересный период наблюдений за птицами, конечно, весна, лучшее время суток – раннее утро или вечер. Минимальное оборудование – бинокль, данный определитель и блокнот. Лучше проводить экскурсии в компании из 3-4 человек и сначала в сопровождении опытного орнитолога, который поможет с определением и расскажет то, чего нет в этой книге. Неверно думать, что в остальные сезоны года, кроме весны, наблюдения бесполезны, среди наших птиц немало мигрирующих и пролетно-зимующих видов, поэтому не исключены встречи и с интересными пернатыми гостями.

Как пользоваться книгой

Для каждого рисунка каждого вида в тексте помещен очерк – краткое описание, максимально адаптированное к таким характеристикам, которые позволяют определить и «поближе познакомиться» с той или иной птицей именно в полевых условиях. Таких очерков (и заметок в виде примечаний) в книге 422 – по числу видов в составе орнитофауны Туркменистана и сгруппированы они в разделы, соответствующие систематическим группам птиц – отряды и семейства. В свою очередь, для каждой из этих групп в краткой форме даны общие характеристики, чтобы иметь представление о всей группе в целом.

При встрече с незнакомой птицей не следует сразу же рыться в

gysgaça görnüşde häsiýetnama berilýär.

Daşky sypatyny we ululygyny öňki tanýş görnüşleriň bilen deňeşdirmeli (mysal üçin, serçeler, kepderiler, ördekler we ş.m., seret sah. 685); bedeniniň daşky gurluşynyň has wajyp alamatlaryna üns bermeli (boýnuna, çüňküne, aýaklaryna, guýrugynyň sypatyna); yelek örtüginini reňk we nagyş utgaýygyny bellemeli (tegmillerini, „murtuny“, zolaklary, nokat bellikleri); guşuň gylyk-häsiýetini we endigik alamatyny anyklamaly (özünü saklaýyş endigi, uçuş häsiýeti, ýerde hereket ediş usullary), şonda ol gowy kömek edip biler.

Bu işi ýerine ýetirmek belli bir türgenleşikde çylşyrymly däl, ondan daşary, her bir gözegçilk we guşlar bilen „ýüzbe-ýüz“ duşuşyk bilgesijilik duýgusyny artdyrýar. **Soňra, eger-de isleseň, kitabyň soňunda aýratyn ýerleşdirilen suratlaryň arasyndan synlaýan guşuň «portret keşbini» tapmaly. Eger-de gören guşuň sypaty suratdaky bilen gabat gelyän bolsa, onda guşuň suratynyň gapdalynda goýlan san belgidäki görnüşüň ýazgy beýanyny tapmaly. Guşlaryň oçerkleriniň beýany ähli görnüşler üçin bir tertip boýunça berilýär.** Olaryň her biri boýunça guşlaryň üçdildäki atlary berilýär, şol sanda:

Meýdan alamatlary: has oňat tanalýan beýleki guşa meňzeşdigi(ser. kitabyň yzky daşky jiltiniň öňündäki sah.). Gözegçiniň, ilkinji nobatda, meýdan alamatlaryna üns bermeginiň gerekdigini nazara alyp, tekstdе gara harplar bilen has wajyp we diňe şol görnüş üçin häsiýetli bolan alamatlar gara

книге, она поможет, если сначала постараться с максимальным вниманием и подольше, насколько возможно, рассмотреть птицу, запомнить ее облик и размеры по сравнению с хорошо известными всем пернатыми (например, воробьем, голубем, уткой и т.п., см. стр. 685), зафиксировать внимание на наиболее важных чертах внешнего строения (шея, клюв, ноги, форма хвоста), бросающихся в глаза элементах окраски оперения (пятна, «усы», полосы, отметины и др.), еще лучше, если удастся высмотреть особенности поведения и повадки птицы (манера держаться, характер полета, способ передвижения по земле). При определенном навыке это сделать не сложно, мало того с каждым разом будет вызываться все возрастающее чувство «страсти» от общения с птицей с «глазу на глаз». **Затем следует найти эту птицу, если хотите, её «портретный образ» среди рисунков, помещенных отдельным блоком в конце книги. Если рисунок совпадает с тем, что было увидено, следует по номеру с названием птицы, проставленным под рисунком, отыскать в тексте по тому же номеру описание данного вида. Очерк описания птицы построен по единой схеме для всех видов.** По каждому из них приводятся трехязычное название птицы, а также:

Полевые признаки: соразмерность с какой-нибудь наиболее знакомой птицей. Полевые особенности, на которые наблюдателю следует обратить внимание в первую очередь; при этом, наиболее важные и характерные для данного вида признаки выделены в тексте

harplar bilen tapawutlandyrylyp; horazyňyň we mäkiýanyňyň, eger-de olaryň daşky sypatlary (jynsy dimorfizmi) aýratynlykda tapawutlanýan bolsa, onda ýazky keşbiniň, ýagny ýaşy ýeten guşlaryň jübütleşme lybasdaky reňkleriniň; uly guşlaryň güýzki-guşky, şeýle-de ýaş guşlaryň we olaryň ululardan tapawutlandyrylyşy alamatlary görkezilýär. Gerekli ýerlerde, suratlarda bellik alamatlary goýulýar: horazy – ♂, mäkiýany – ♀, ýaş guş – **juv.**, ýaşy ýeten guş – **ad.** Sesiniň (gynansakda gulagyň eşidýän sesiniň harplarda berilmegi, onuň asyl sesini elmydama dürs aňlatmaýar), meýdanda özüni alyp baryş häsiýetiniň, howada uçuşyňyň ýa-da beden hereketiniň aýratynlyklary hem-de şol guşuň edebiyatda bar bolan ölçegleriniň we agramynyň gysgaça beýany berilýär.

Meňzeşlikleri – tapawutlary: guşlaryň, ilkinji nobatda, olaryň ýakyn kowumdaşyndan ýa-da beýleki görnüşlerden (kowumdaş dällerinden) tapawutlandyrylyşy alamatlary we olar bilen bar bolan meňzeşligi görkezilen beýan, görnüşi kesgitlemekde, aýratyn-da täze başlanlaryň, ýalňyşmak mümkinçiligini minimuma çenli azaltmaga kömek berer.

Ýaýran ýerleri: görnüşiň arealında höwürtleýän bölegi, onuň Orta Aziýada we Türkmenistanda, guşlaýan oblastlarynda ýaýran ýerleri. Kitabyň soňunda, şol ýa-da beýleki görnüşiň ýaýran ýerleriniň suratly karta-shemasy berilýär. Şonda karta-shemalarda umumy reňklerde görnüşiň ýaýran oblastlary, inçe çyzyklarda – şertli görnüşiň ýaýran ýerleriniň tutuşlaýyndygy ýa-da üzňelikde ýerleşdigi görkezilýär (ser. 555 sah. surat). **Kartashemanyň san belgisi gös-göni görnüşiň suratdaky san belgisine gabat gelýär.**

жирным шрифтом. Краткое описание окраски самцов и самок, если их внешность отличается (половой диморфизм), в отдельности черты весеннего, т.е. брачного наряда взрослых птиц. Осенне-зимний наряд взрослых, а также молодых птиц, и их отличие от взрослых. Где было необходимо, на рисунках проставлены обозначения: ♂-самец, ♀-самка, **juv.**-молодая птица, **ad.**-взрослая. Голос (к сожалению, буквенная передача голосов не всегда совпадает с тем, что может услышать ухо человека), поведение, особенности полета или телодвижений. Наконец, размеры по тем признакам, по которым были найдены данные в литературе, и вес.

Сходства – отличия: отличительные особенности птицы, в первую очередь от близких, или других (даже не родственных) видов, с которыми есть сходство, поможет снизить до минимума неизбежность ошибок при определении птицы, особенно у начинающих наблюдателей.

Распространение: гнездовая часть ареала вида, распространение его в Средней Азии и Туркменистане, область зимовок. В блоке – там же где и рисунки птиц, на соответствующих карто-схемах иллюстрируется распространение той или иной птицы. Цветной фон на карто-схемах обозначает (см. рис. на стр. 555) области распространения, а штриховкой условно показано сплошное или прерывистое распределение вида. **Номер карто-схемы непременно совпадает с номером рисунка соответствующего вида птицы.**

Образ жизни: в условиях Туркменистана описан в самых общих чертах и раскрывает характер пребывания видов в стране (оседлые,

Ýaşaýşy: Türkmenistanyň şerti üçin umumy häsiýetde beýany edildi we görnüşleriň ýurdumyza geliş häsiýetnamasy (oturmly ýa-da oturmly-göçýän, uçup geçýän-höwürtleýän, uçup geçýän, uçup geçýän-guşlaýan we tötdänden uçup gelyän), görnüşleriň migrasiya geçirýänleriniň uçup geçýän möhleti (ýazyna we güzüne), ýaşaýşy – guşlar üçin iň häsiýetli, görnüşleriň Türkmenistanda höwürtleýän döwrüniň wajyp bolan esasy ýaşaýş elementleri (höwürtleýän, ýumurtga we jüyje) we ýitmitleniş häsiýeti berilýär.

Statusy: görnüşiň Türkmenistandaky ylmy, medeni-durmuş ähmiýeti, onuň öwrenilişi, gorag işleriniň ýagdaýy we sany berilýär. Şol ýagdaýda ekskursiýa döwründe onlarça we yüzlerçe sanda duşanlary «köpsanly», käte müläp duşanlary – «has köpsanly», olaryň sany boýunça bir näçe gezek hasaba alnanlary ýa-da hemme ýerde duşanlary – «adaty», gözegçilikde bir ýa-da aýda birnäçe gezek duşanlary – «seýrek» we ýylda bir-iki ýa-da ondan hem seýrek duş gelenleri «örän seýrek» görnüşler diýip kabul edildi.

Guşlar üçin möhüm ähmiýetli ýerler

Guşlary goramak Halkara birleşiginiň (Birdlife International) we onuň bütin dünýä boýunça hyzmatdaşlarynyň köp ýyllaryň dowamynda alyp barýan IBA boýunça (Important Bird Areas) - rus dilinde Möhüm ornitologik ýerleri halkara maksatnamasy. IBA – bu guşlaryň, aýratyn-da seýrek duşan we ýitip yok bolmak howpy abanyan görnüşleriň ýaşaýşy üçin has wajyp bolan ýerleridir. Bu ýerler diňe bir guşlar üçin däl-de, eýsem tutuş tebi-

или оседло-кочующие, пролетно-гнездящиеся, пролетные, пролетно-зимующие и залетные), сроки пролета для мигрирующих видов (весенние и осенние), места обитания – наиболее типичные для птиц, главные жизненные элементы гнездового периода (гнезда, яйца, птенцы) только для гнездящихся в Туркменистане видов и питание.

Статус: научная и культурно-эстетическая значимость вида в Туркменистане, его изученность, состояние охраны и относительная численность. При этом, под «многочисленными» следует понимать виды, которые за время экскурсии встречались десятки и сотни раз, а порой и тысячи, т.е. «очень многочисленные». «Обычными» видами считаются те, которые встречались несколько раз за экскурсию или повседневно. «Редкие» по численности могут попадаться один или несколько раз за месяц – два, наконец «очень редкие» – один или два раза в несколько лет, а то и реже.

Ключевые орнитологические территории

Ключевые орнитологические территории – русскоязычное название международной программы по IBA (Important Bird Areas), проводимой в течение многих лет Международным союзом охраны птиц (Birdlife International) и его партнерами по всему миру. IBA – это участки наиболее важные для обитания птиц, особенно редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. При этом они играют огромную роль не только для птиц, но и для охраны природы в целом.

В 2005-2010 гг. в Туркмениста-

gaty goramakda uly ähmiýetlidir.

Türkmenistanda 2005-2010-njy ýyllarda Guşlary goramak Halkara birleşiginiň goldawynda Guşlary goramak boýunça Zenan Patyşalygyň jemgyýeti (RSPB, Beýik Britaniýa) we Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministriliginiň arasyndaky ylalaşygyň çäklerinde, Birdlife Internationalyň hyzmatdaşy hökmünde, Merkezi Aziýanyň Möhüm ornitologik ýerleri (Program IBA/CA) Maksatnamasy ýerine ýetirildi. Bu ylalaşygyň esasy düzgünleri şulardan ybarat: 1. Tebigaty goramak we aýratyn goralýan tebigy ýerler (AGTÝ) boýunça milli syýasaty (strategiýany) ösdürmeküçin nazaryýet binýadyny çuňlaşdyrmak. 2. IBA-nyň kriteriýasyna laýyklykda AGTÝ «pasportlaşdyrmak» we guşlaryň ýaşaýşy üçin wajyp, emma antropogen basyş astyndaky ýa-da goraga alynmadyk beýleki ýerleri aýdýnlaşdyrmak. 3. Hünärmen-ornitologlaryň, aýratyn-da guşlary söýüjileriň, ýaşlaryň, guşlary we janly tebigatyň beýleki agzalaryny wagyz etmek bilen meşgullanýanlaryň ornitologik barlag işlerini goldamak. 4. Halkara konwensiýalaryň düzgün-namalaryny, şol sanda Biodürlülük baradaky, Suw-batgalyk ýerleri baradaky (Ramsar), Ýabany haywanlaryň göçýän görnüşlerini goramak baradaky (Bonn), Çölleşmäge garşy göreşmek baradaky Konwensiýalary we başgalary ýerine ýetirmeklige goldaw bermek. 5. Göçýän guşlaryň, olaryň uçup geçýän ýoly we gyşlaýan ýerleri boýunça sebitara ylalaşyklary amala aşyrmakda geçirilýän işlere goldaw bermek.

TTBGHB-niň (rusça MSOP) Gyzyly sanawynyň (2013) derejelerine laýyklykda Turkmenistanyň awifaunasyna degişli görnüşler: düýbünden

не под эгидой Birdlife International выполнялась Программа Ключевые орнитологические территории Центральной Азии (Program IBA/CA) в рамках соглашения между Королевским обществом защиты птиц (RSPB, Великобритания), как партнера Birdlife International, и Министерством охраны природы Туркменистана. Основными положениями этого соглашения являются: 1. Углубление теоретической базы для развития национальной стратегии по охране природы и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 2. «Паспортизация» ООПТ соответственно критериям IBA и выделение других территорий, жизненно важных для птиц, но находящихся под большим антропогенным прессом или не охраняемых. 3. Поддержка орнитологических исследований профессиональных орнитологов и, особенно, любителей птиц, молодежи, занимающихся пропагандой охраны птиц и других объектов живой природы. 4. Поддержка выполнения положений международных конвенций, в том числе, Конвенции о биоразнообразии, Рамсарской – о водно-болотных угодьях, Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (Боннской), Конвенции по борьбе с опустыниванием и др. 5. Поддержка деятельности по выполнению региональных соглашений по мигрирующим птицам и их охране на путях пролета и зимовок.

В составе авифауны Туркменистана, согласно категориям Красного списка МСОП (2013), видами, находящими на грани исчезновения (CR), считаются – стерх, дрофа, кречетка и тонкоклювый кроншнеп; исчезающими (EN) – кудрявый

ýitip barýanlary (CR) – ak durna, toklutaý, gara depeli tekeýlylyk we inçe çüňkli ýylkçy; ýitip barýanlary (EN) – buýraly gotan, gyzyly petekeli gaz, maslykçy, uly garaguşyk, çyparbaş laçyn (şahyn), dag hindi towugy we turaç; ýitmek howpynyň abanmagyna ýakynlary (VU) – gyzgylt gotan, gara leglek, kiçi sakar gaz, ekinçi ördek, gara ördek, gorçy, balykçy bürgüti, uzynguýruk suw bürgüdi, sakgally garaguş, mazar garaguşy, gurgy pisint garaguş, sähra göweneği, ütelgi, gök bähri, togdary, goňur kepderi we çöl serçesi; ýitmek howpyna ýakynlary (NT) – gajar, sähra gulatysy, bezbeltek, garlawaç pisint sähra çulugy we gökgarga.

IBA maksatnamanyň ýerine ýetirilmeginiň netijeleriniň biri, “Türkmenistanyň möhüm ornitologik ýerleri” atly reňkli maglumat kitapçasynyň (2009) türkmen, rus we iňlis dillerinde çap edilmegi boldy. Bu maglumat kitapçasy we hormatly okyýjylar siziň eliňizdäki Türkmenistanyň guşlarynyň kesgitleýjisi bilen bilelikde ýurdumyzyň guşlaryny öwrenmek we gorap saklamak işinde bahasyna ýetip bolmajak goldaw bolar. Türkmenistanda, jemi 50 sany möhüm ornitologik ýerleri saýlanyp alyndy we beýan edildi. Olaryň umumy meýdany 3468124 ga ýa-da ýurdumyzyň 7% düzýär. Bu ýerleriň gorap saklanylmagy we dolandyrylmagy döwletiň uzak möhletleýin ileri tutlýan wezipeleriniň biri bolmalydyr, bu meseläniň çözülmegi guşlaryň köp görnüşleriniň we populýasiýalarynyň milli we halkara möçberinde aýap saklanmagyna, şeýle-de biodürlüligiň beýleki düzüm bölekleriniň ekosistema, takson we genetiki derejelerinde gorap saklan-

пеликан, краснозобая казарка, стервятник, большой подорлик, шахин, каспийский улар и турач; уязвимыми с очень низкой численностью (VU) – розовый пеликан, черный аист, пискулька, мраморный чирок, белоглазая чернеть, савка, скопа, орлан-долгохвост, бородач, могильник, ястребиный орел, степная пустельга, балобан, сапсан, дрофа-красотка, бурый голубь и пустынный воробей; близкими к уязвимым (NT) – черным гриф, степной лунь, стрепет, степная тиркушка и сизоворонка (касается только европейского подвида). Одним из итогов выполнения Программы IBA явилось издание красочного информационного справочника по Ключевым орнитологическим территориям Туркменистана (2009) на туркменском, русском и английском языках. Этот справочник вместе с Определителем птиц, который вы, уважаемый читатель, держите в руках, станет незаменимым подспорьем в деле изучения и охраны птиц Туркменистана. В стране всего выделено и описано 50 Ключевых орнитологических территорий. Их площадь в общей сложности составляет 3468124 га, или 7% Туркменистана. Охрана и управление сетью этих территорий должна являться приоритетной долгосрочной задачей государства, решение которой внесет вклад в сохранение многих видов птиц и их популяций в национальном и международном масштабах, а также сохранение других компонентов биоразнообразия на экосистемном, таксономическом и генетическом уровнях. Например, для Бадхызского заповедника, как территории IBA, уже разработаны План управления этой территорией и План мониторинга, специалистами-орнитологами подготовлено номинационное досье для включе-

magyna goşandy bolar. Mysal üçin, IBA-nyň meýdany hökmünde Bathyz goraghanasy üçin, eýýäm bu ýerini dolandyrmagyň Meýilnamasy we hünärmen-ornitologlaryň, gözegçilik (monitoring) Meýilnamasy işlenip düzüldi, ÝUNESKO-niň Bütindünyä tebigy mirasyna goşmak üçin talaplar boýunça (nominanasy) maglumatlar taýýarlandy we başgalar.

Türkmenistan Garaşsyz we özbaşdak döwlet hökmünde IBA-nyň ýerleriniň we olaryň biodürlüligini gorap saklamak üçin wajyp tebigy gymmatyna oňat düşünyär.

Kitabyň üstinde kim we nähili işledi

BMG ÖM/DEG-niň «Hazar deňziniň kenaryakasyndaky Hazar goraghanasynyň dünýä ähmiýetli biologik dürlüligini aýap saklamak we durnukly peýdalanmak» Taslamasynyň ýolbaşçysy, uly tehniki maslahatçysy – O.T. Güýçgeldiýew (Hazar taslamasy) we Türkmenistandaky «Merkezi Aziýanyň Möhüm ornitologik ýerleri» Maksatnamanyň utgaşdyryjysy – E.A. Rustamow IBA/CA/BPGJ Maksatnamasy kesgitleýjini döretmek pikirini teklipl etdiler. Hazar taslamasynyň görkezilen çäginde, BMG ÖM-niň goldaw bermeginde, 2007-nji ýylda birnäçe duşuşyklar, maslahat okuwlary geçirildi, işçi topary döredildi, şertnama esasynda borçlar bölünişildi, meýilnamasy we olaryň ýerine ýetiriş tertibi kesgitlendi: iş toparynyň işine we mümkinçiliklerine umumy ýolbaşçy uly tehniki maslahatçysy – O.T. Güýçgeldiýew we Möhüm ornitologik ýerler Maksatnamasynyň utgaşdyryjysy E.A. Rustamow; umumy ýolbaşçy Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi – ministriň orunbasary J.S. Saparmyradow.

Türkmenistanyň ähli ornitologlary kesgitleýjini düzmeklige gatnaşdylar:

ния в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, и т.д.

Туркменистан, как независимое и суверенное государство, осознает природную ценность территорий IBA и их важность для сохранения биоразнообразия в целом.

Кто и как работал над книгой

Идея создания данного определителя принадлежит О.Т. Гуйчгельдыеву – руководителю, старшему техническому советнику Проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия мирового значения в Хазарском заповеднике на побережье Каспийского моря» (Хазарский проект) и Э.А. Рустамову – Координатору Программы «Ключевые орнитологические территории Центральной Азии» в Туркменистане (Программа IBA/CA/RSPB). При поддержке ПРООН, в рамках указанного Хазарского проекта ещё в 2007 г. был проведен ряд встреч и тренингов, на которых создана рабочая группа, распределены договорные обязательства и нагрузки, определены планы и порядок их выполнения: потенциал и общее руководство работой – старший технический советник Хазарского проекта О.Т. Гуйчгельдыев; организация тренингов и совещаний – координатор Программы Ключевые орнитологические территории – Э.А. Рустамов; куратор от Министерства охраны природы Туркменистана – заместитель министра Д.С. Сапармуратов.

В составлении определителя принимали участие почти все орнитологи Туркменистана:

1. Кандидат биологических наук, заведующий Лабораторией позвоночных животных Национального института пустынь, растительного и животного мира Туркменистана, доцент – **К.А. Атаев** (семейства жаворонковые, крапивниковые, слав-

1. **К.А. Атаев** – Türkmenistanyň Çölleri, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň Oňurgaly haýwanlar laboratoriasynyň müdiri, biologiya ylmlarynyň kandidaty, dosent (torgaýlar, çitçitiler, çürlentgiler, hurmaýjyklar, gögümtil jikjikiler, uzynguýruk jikjikiler, jikjikiler, daşdeşenler, jüyüldewükler maşgalalary (tekstiň 12.9%).

2. **M.B. Amanowa** – Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň professory, TYA-nyň habarçy agzasy, biologiya ylmlarynyň doktory (toganlar, sarlar, gargalar, serçeler, girrikler, süleçiler maşgalalary (7.5%).

3. **E.C. Annaýewa** – Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň öňki dosenti, biologiya ylmlarynyň kandidaty (gökgarlakşekilliler otrýady, garlawaçlar, goýunguşlar, sarkyldaklar maşgalalary (2.5%).

4. **M.Y. Gauzer** – Türkmenbaşy şäheriniň guşlary söýüjiler Klubynyň öňki ýolbaşçysy, biologiya ylmlarynyň kandidaty (gazşekilliler otrýady, çarlaklar we çerikler maşgalalary (11.5%).

5. **S.I. Zakaryýewa** – Hazar döwlet goraghanasynyň ornitology (guwlar maşgalasy (0.9%).

6. **E.A. Rustamow** – biologiya ylmlarynyň doktory, RAEN-niň akademigi, professor (kesgitleýjiniň düzümi, gurluş tertibi, çeperçilik taslamasy, awtorlar toparyna ýolbaşçylyk, türgenleşik okuwly we maslahaty geçirmek, görnüşleriň oçerkleriniň ýazylyşyny tükellemek we gutarnykly redaktirlemek, görnüşleriň yaýraýşynyň kartasyny düzmek, giriş bölümi we tersaýaklar, atgarlawaçlar, gökgarlakşekilliler, leglekşekilliler we baýguşşekilliler otrýady, garlawaçlar, goýunguşlar, sarkyldaklar, toganlar, sarlar, gargalar, oýapkalar, serçeler, girrikler, süleçiler, maşgalalary (18.4%).

7. **J.S. Saparmyradow** – Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministriň otunbasary, biologiya ylmlarynyň kandidaty (laçynşekilliler, towukşekilliler, durnalar otrýadlary (12.7%).

ковые, корольковые, сutorовые, длиннохвостые синицы, синицевые, поползневые, пищуховые (12.9% текста).

2. Доктор биологических наук, Член-корреспондент АН Туркменистана, профессор Туркменского государственного университета имени Магтымгулы – **М.Б. Аманова** (семейства сорокопутовые, скворцовые, врановые, воробьиные, вьюрковые, овсянковые (7.5%).

3. Кандидат биологических наук, экс-доцент Туркменского государственного педагогического института имени Сеиди – **Э.Ч. Аннаева** (отряды ракшеобразные, семейства ласточковые, трясогузковые, иволговые (2.5%).

4. Кандидат биологических наук, экс-руководитель Клуба любителей птиц г. Туркменбаши – **М.Е. Гаузер** (отряд гусеобразные, семейства чайковые и крачковые (11.5%);

5. Орнитолог Хазарского государственного заповедника **С.И. Закарьева** (семейство лебединые (0.9%).

6. Доктор биологических наук, академик РАЕН, профессор **Э.А. Рустамов** (структура и принципы построения определителя, руководство рабочей группой, проведение тренингов, сбор, предварительная и окончательная редакция видовых очерков, составление карт распространения и списков видов, дизайн, вводная часть, отряды поганкообразные, аистообразные, совообразные, стрижеобразные, ракшеобразные, семейства ласточковые, трясогузковые, сорокопутовые, скворцовые, иволговые, врановые, оляпковые, воробьиные, вьюрковые и овсянковые (18.4%).

7. Кандидат биологических наук, Заместитель министра охраны природы Туркменистана – **Д.С. Сапармуратов** (отряды соколообразные и журавлеобразные (12.7%).

8. **Ö.S. Sopyew** – S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk unwersitetiniň dosenty, biologiýa ylmlarynyň kandidaty (kepderişekilliler, ikatýokşekilliler, doňuzguşekilliler otrýadlary; ardyçlar, owazçylar, siňekçiler, jokjokylar, jikgildewükler maşgalalary (18.3%).

9. **A.A. Şerbina** – Hazar taslamasyň ekspert-ornitology (ýoglaşekilliler, gotanşekilliler, gyzylgazlar otrýadlary we çuluklar maşgalasy, çarlaklardan we çeriklerden galanlary (13.3%).

10. **A.E. Eminow** – biologiýa ylmlarynyň kandidaty (legleşekilliler we baýguşekilliler otrýadlary (2.0%).

Tanymal suratçy W.A.Wataginiň (1884-1969) çeken çürçüriniň suraty kitabyň daşyny bezeýär. Ol guş Garagumuň hem-de Aşgabatda geçen (1969 ý.) halkara ornitologiki maslahatyň “nyşany” çürçürini maslahaty gurnajy we türkmen ornitologlarynyň mekdebini esaslandyryjy hem-de kesgitleýijiniň döremegini arzuwlan **akademik Anwer Keýuşewiç Rustamowyň (1917-2005)** in söýgüli guşudy. **Awtorlar bu kitaby onuň ýagty ýadygärligine bagşlaýarlar.**

Hazar taslamasyň iş dolandyryjysy D.Ş. Hojamyradowa, şol taslamanyň yerli ilat bilen düşünişmek boýunça hünärmeni – S.E. Eýeberenow we BMG ÖM Türkmenistandaky Wekilhanasynyň daşky gurşawy goramak we energetika boýunça taslamalaryň maksatnamalaşdyryjy ýolbaşçysy – R.A. Nurmuhammedow we M.R. Hudaýgulyýew.

Agzalan administratorlaryň we olaryň kömekçileriniň hemmesine, şeýle-de işiň üstünlikli tamamlanmagyna işjeň goşandyňy goşanlaryň ählisine biz öz minnetdalygymyzy bildirýäris.

8. Кандидат биологических наук, доцент Туркменского сельскохозяйственного университета им. С.А. Ниязова – **О.С. Сопьев** (отряды курообразные, голубеобразные, кукушкообразные, козодоеобразные и дятлообразные, семейства свиристелевые, завирушковые, мухоловковые, дроздовые и тимелиевые (18.3%).

9. Эксперт-орнитолог Хазарского проекта – **А.А. Щербина** (отряды гагарообразные, пеликанообразные, фламингообразные и ржанкообразные, кроме чайковых и крачковых (13.3%), а также данные по залетам ряда видов.

10. Кандидат биологических наук – **А.Э. Эминов** (отряды аистообразные и совообразные (2.0%).

Обложку определителя украшает рисунок известного художника-анималиста В.А. Ватагина (1884-1969) с изображением саксаульных соек. Эта сойка – орнитологический «символ» Каракумов и Ашхабадской орнитологической конференции (1969 г.). Птицу эту считал своей самой любимой организатор той конференции и основатель школы туркменских орнитологов – **акademik Anwer Keýuşewiç Rustamowyň (1917-2005)**. **Его светлой памяти посвящают эту книгу авторы.**

Издание определителя не было бы возможным без поддержки и желания завершить работу со стороны администратора Хазарского проекта – Д.Ш. Ходжамуратовой и специалиста по связям с общественностью того же Проекта – С.Д. Эйберенова, а также представителей ПРООН в Туркменистане – Р.А. Нурмухамедова и М.Р. Худайкулыева.

Всем авторам, администраторам, помощникам и всем неупомянутым, но своими действиями способствующим успешному завершению работы, выражается искренняя признательность.

Guşlaryň sistematiki toparlarynyň we görnüşleriniň beýany Описания систематических групп и видов птиц

ÝOGLAŞEKILLILER – GAVIIFORMES – ГАГАРООБРАЗНЫЕ

Uly ölçeqli, yöne gazdan maýda üzüýän guşlar otrýady. Bedeni süýnmek, suwda ýüzmäge we çümmäge oňat uýgunlaşan. Ganatlary göwresine berk gysylan. Çünki orta uzynlykda, bizşekilli görnüşde. Boýny uzyn, guýrugy gysga, aýaklary yza tarap süýşen. Barmaklarynyň öňki üçüsi umumy ýüzgüç perdesine birleşen, birinji barmagy ýok diýen ýaly. Ýelek örtügi gaty, dykyz, kellesindäki ýeleklere mahmal ýaly ýylmanak. Gury ýerde kynlyk bilen ädimleýär we diňe höwürtegeýän döwri ýerde gezýär. Agyrlyk bilen howa, köplenç ýeliň garşysyna göterilýär. Göwresini aşak egip we aýaklaryny sallap äwman uçýar. Horazy we makiýany meňzeş reňkli, emma pasyllaýyn we ýaş tapawutlary bolýar. Dünýäde – 5, Türkmenistanda – ýoglar maşgalasyndan (*Gaviidae*) 2 görnüş.

1. Gyzył petekeli ýogla – *Gavia stellata* – Краснозобая гагара

Meýdan alamatlary: kiçiräk öý gazynyň ölçeğinde. **Çünki ýokarlygyna sähelçe gaýşak.** Ýazyna kellesi we boýnunyň gapdal-lary çal, boýnunyň yz tarapy ýagty zolakly. Bokurdagy goňras tegmilli. Arkasy maýdaja ak menekli çalymtyl-goňur reňkli, garny ak. Kellesinde we boýnunda bezeg beriji ýeleklere ýok. Aýaklary garamtyl. **Uly guşlaryň jübütleşmeýän wagty** we ýaş guşlaryň ýelek örtügiň reňki tu-

Отряд водоплавающих птиц крупного размера, но мельче гуся. Тело обтекаемой формы, хорошо приспособлены к плаванию и нырянию. Крылья плотно прижаты к туловищу. Клюв средней длины, шиловидной формы. Шея длинная, хвост короткий, ноги сильно отставлены назад. Три передних пальца соединены общей плавательной перепонкой, первый палец почти редуцирован. Оперение жесткое, плотное, на голове слегка бархатистое. С трудом передвигаются по суше и связаны с ней только в гнездовой период. Взлетают тяжело, преимущественно против ветра. Полет тяжелый с наклонным положением туловища и свисающими ногами. Самцы и самки окрашены сходно, но имеются сезонные и возрастные отличия. В мире 5 видов, в Туркменистане – 2 из семейства гагаровые (*Gaviidae*).

Полевые признаки: размером с небольшого домашнего гуся. **Клюв слегка вздернут кверху.** Весной голова и бока шеи серые, на задней стороне шеи светлые полосы. На горле – пятно каштанового цвета. Окраска спины серовато-бурая с мелкими белыми крапинами, брюхо белое. Украшающих перьев в области головы и шеи нет. Ноги темные. **У взрослых вне брачного периода** и у молодых птиц опере-

tuk, anyk belliksiz we goňras tegmilsiz. Sesi ýiti, iňňildili gykylyk; uçanda we howa göterilende gagyldyly sesli – “ga-ga-gagara”. Uzynlygy – 68, ganaty – 31, ganatlarynyň gerimi – 124, çüňki – 6, guýrugy – 8.3 sm, agramy – 2,6 kg.

Meňzeşlikleri–tapawutlary: **çüňküniň ýokarlygyna gaýsakdygy**, ýazyna bolsa, bokurdagynyň goňras tegmillidigi bilen gara petekeli ýogladan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän oblastlary – Ýewraziýanyň we Demirgazyk Amerikanyň taýga we tundra zolaklaryndaky köller. Günorta Ýewropanyň we Gündogar Aziýanyň, Demirgazyk Amerikanyň günorta böleginiň, şeýle-de Ortaýer, Gara we Hazar deňizleriniň kenaryakasynda gyslaýar. Türkmenistanda gysga wagtlaýyn Hazar deňzinde, örän seýrek içki suw ýataklarynda, aýratyn-da adatdan daşary sowuk gyş bolanda gabat gelýär.

Ýaşayşy: gyslaýan guş. Oktýabryň aýagyndan maý aýy-nyň ortasyna çenli duş gelýär. Aglaba balyk, käte maýda leňneççekilliler, balyk-gulaklar, gurçuklar bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek görnüş, aw guşy hökmünde ähmiýeti ýok.

2. Gara petekeli ýogla – *Gavia arctica* – Чернозобая гагара

Meýdan alamatlary: öý gazynyň ortaça ölçeginde. **Çüňki göni.** Ýazyna kellesiniň üsti we boýny çal, petekesi we boýnunyň gapdallary dik ak zolakly. Arkasy açyk ak kese zolakly gara, garny ak. Bokurdagyndaky gara tegmil anyk bildirýär. Sesi pert – “knarrknorr”, haly pes umydygäriň sesine çalymdaş – “aaah-oh”. Horazlarynyň ganaty – 28.5-33.8, mäkiýanlarynyňky

ние менее яркое, без тонких деталей и **каштанового пятна.** Голос – пронзительные, стонущие крики; в полете и на взлете – громкое гоготание «га-га-гагара». Длина – 68, крыло – 31, размах крыльев – 124, клюв – 6, хвост – 8.3 см, вес – 2,6 кг.

Сходства – отличия: от чернозобой гагары хорошо отличается **вздёрнутым кверху клювом**, а весной – каштановым пятном на горле.

Распространение: гнездовая область – озера таежной и тундровой зон Евразии и Северной Америки. Зимует у побережий Западной Европы, Восточной Азии и южной половины Северной Америки, а также Средиземного, Черного и Каспийского морей. В Туркменистане эпизодически встречается на Каспии, очень редко на внутренних водоемах, особенно в необычно холодные зимы.

Образ жизни: зимующая птица. Встречается с конца октября до середины мая. Питается преимущественно рыбой, изредка мелкими ракообразными, моллюсками, червями.

Статус: редкий вид, охотничьего значения не имеет.

Полевые признаки: размером с домашнего гуся среднего размера. **Клюв прямой.** Весной верх головы и шеи серые, продольные белые полосы на зобе и боках шеи. Спина черная с яркими белыми поперечными полосами, брюхо белое. На горле четко выраженное черное пятно. Голос – резкое «knarrknorr» и похожее на чаячье – «aaah-

– 27.1-30.0 sm, horazynyň agramy – 3.3, mäkiýanynyňky – 2.03 kg.

Meňzeşlikleri–tapawutlary: çüňküniň gönüdigigi, bokurdagyndaky gara tegmiliň (ýazyna), boýnunyň we arkasynyň aladygy bilen ýaşy ýeten gyzyl petekeli ýogladan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän oblastlary – Demirgazyk Ýewraziýanyň arktika tundrasyndan tokaýlysähra we sähra zolagyna çenli we Demirgazyk - Günbatar Amerika. Günbatar Ýewropanyň, Gündogar Aziýanyň, Demirgazyk Amerikanyň Ýuwaş umman ýakasy, Gara deňziň, bölekleyin Hazar we Aral deňizleriniň kenaryakalarynda gyslaýar. Türkmenistanda Hazar deňzinde, aýratyn-da güýçli sowuk gyşda gabat gelýär.

Ýaşayşy: uçup geçýän-gyslaýan, bölekleyin uçup gezyän guş (iýulda). Güzüne noýabryň aýagynda, gyslaýanlary – dekabrdafewralyň başynda uçup geçýär, yzyna gitmegi we ýazyna uçup geçmegi fewralyň soňundan maýyň ortasyna çenli dowam edýär. Esasan, balyk, käte maýda leňneççekilliler, balykgulaklar, gurçuklar bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly görnüş, awçylykda ähmiýeti ýok.

TERSAÝAKŞEKILLILER – *PODICIPEDIFORMES* – ПОГАНКООБРАЗНЫЕ

Orta ýa-da maýda ördekleriň ölçegindäki suwda ýüzýän guşlar otrýady. Suwda pes oturýar, guýrugy görünmeýär, insiz ganatlary berk gysylan, boýny özglere garanyňda uzyn, çüňki gysga, ýiti uçly, ýasy däl. Aýaklary has yzraga süýşen we uçanda sallanman, çalaja yza tarap uzaýar. Barmaklarynyň her biriniň derisypat perde parawuzy bolýar.

ох», также кричат в ночное время. Крыло у самцов – 28.5-33.8, самок – 27.1-30 см, вес самцов – около 3.3, самок – 2.03 кг.

Сходства – отличия: от взрослой краснозобой гагары отличается **прямым клювом**, черным пятном на горле (весной) и полосатостью шеи и спины.

Распространение: гнездовая область – от арктических тундр до лесостепной и степной зоны в Северной Евразии и Северо-Западной Америке. Зимует по побережьям Западной Европы и Восточной Азии и тихоокеанскому в Северной Америке, на Черном море, частично – на Каспийском и Аральском морях. В Туркменистане встречается на Каспии, особенно в экстремально холодные зимы.

Образ жизни: пролетная, зимующая, спорадично летующая птица. Осенний пролет с конца ноября, зимующие в декабре-начале февраля, отлет и весенний пролет с конца февраля до середины мая. Питается преимущественно рыбой, изредка мелкими ракообразными, моллюсками, червями.

Статус: немногочисленный вид, охотничьего значения не имеет.

Отряд водоплавающих птиц размерами со среднюю или мелкую утку. На воде сидят низко, хвост почти не заметен, узкие крылья плотно прижаты, шея относительно длинная, клюв короткий, остроконечный, не плоский. Ноги сильно отставлены назад и в полете не свисают, а слегка вытянуты позади. Каждый палец оторочен кожистой

Horazy mäkiýanyňa meňzeş reňkli, diňe ýaş we pasyllaýyn tapawutlary bolýar. Ussatlyk bilen ýüzyärler we çümüp, suwuň aşagynda uzak wagtlap saklanýarlar, höwessiz-agras uçýar, suwdan gury ýere çykmaýar. Gündizine işjeň bolup, gijesine migrasiýa edýär. Örän gagyldyly, ýöne ol diňe jübütleşýän döwründe. Suw ýataklarynyň ýaşajylary bolup, ýekebara ýa-da koloniýa bolup höwürtegeýärler. Suwda ösýän ösümlikleriň arasynda, adatça, ýüzyän höwürtege gurýarlar. Jemi 22 görnüş, onuň tersaýaklar maşgalasyndan 5 weklili Türkmenistanda (*Podicipedidae*). Balykçylaryň we awçylaryň arasynda olar “çümgüçler” diýip nädogry atlandyrylýar.

3. Kiçi tersaýak – *Tachybaptus ruficollis* – Малая поганка

Meýdan alamatlary: keperi öleşinde, maýda ördeklere çalymdaş, bizdäki tersaýaklaryň arasynda iň kiçisi. Böwri ýazyna açyk-goňur, arkasy, kellesi, **boýnunyň yzky bölegi we döşi gara-goňur, boýnunyň öňki bölegi we ýaňaklary goýu-çupar. Erniniň (agzynyň) gyrasy kiçiräk sarymtyl - ýaşylymtyl tegmilli.** Güýz - güş döwründe göwresiniň üstki tarapy çalymtyl - goňur, gapdallary, döşi, boýny we ýaňaklary – çuparrak - ak-sowult, bokurdagy agymtyl. Umumy reňki solgun bolup, ýazky reňkinden has ýagty. Çünki agymtyl uçly gara. Gözleri goňur. Aýaklary goýu-ýaşylymtyl-goňur. Ýaşlarynyň daşky görnüşi uly guşlaryň güýzki-güşky ýelek örtügi bilen meňzeş, ýöne öçügsi we kellesiniň gapdallarynda goňur tegmilleri bolýar. Sesi – batly gykylykly owazlar. Uzynlygy – 24-29, ganaty – 9-11.3, ganatlarynyň gerimi – 35-40 sm, agramy – 125-380 g.

перепонкой. Самец и самка окрашены одинаково, характерны отличия только возрастные и сезонные. В весенний период появляются украшающие перья в виде хохлов и воротников. Прекрасно плавают и ныряют, подолгу находясь под водой, летают неохотно, на сушу не выходят. Активны днем, мигрируют в ночное время. Довольно голосисты, однако, лишь в брачный период. Обитатели водоемов, гнездятся одиночно или колониями. Гнезда обычно плавающие, устраиваются среди водной растительности. Всего 22 вида, из которых в Туркменистане – 5 представителей семейства поганковые (*Podicipedidae*). Среди рыбаков и охотников их неверно называют «нырками».

Полевые признаки: размером с голубя, похожа на мелкую утку, среди наших поганок самая мелкая. Весной бока светло-бурые, спина, голова, задняя часть шеи и грудь – черно-бурые, **передняя часть шеи и щеки – темно-рыжие. По углам рта небольшие желто-зеленоватые пятна.** В осенне-зимний период верхняя сторона туловища серовато-бурая, бока, грудь, шея и щеки – рыжевато-бежевые, а горло – беловатое. Общая окраска размыта и более светлая, чем весной. Клюв черный со светлым кончиком. Глаза бурые. Ноги – темно-зелено-бурые. Молодые птицы по внешнему виду схожи с осенне-зимним нарядом взрослых, но бледнее и имеют по бокам головы бурые пятна. Голос – громкая крикливая трель. Длина – 24-29, крыло – 9-11.3, размах крыльев – 35-40 см, вес – 125-380 г.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **ölçeginiň maýdadygy, boýnunyň gysgadygy, hüpük, dessejik, “gula-jyk”, “ýakajyk” görnüşde bezeg ýelekleriniň ýokdugy bilen beýleki tersaýaklyardan tapawutlanýar.** Ganatlarynda (gysgalan, çowly) **“aýnajygy” ýok.**

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeýän bölegi – Ýewropa, gündogar we demirgazyk oblastlaryndan başgasynda, Kiçi, Alynky, Orta, Merkezi Aziýa, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýa, Merkezi we Günorta Afrika. Orta Aziýada giň ýaýran, ýöne suw-batgalyk ýerlere çekilýär. Türkmenistanda – Amyderýada, Sarygamyşda, çöle akdyrylýan we joşgun suwlaryň toplanan ýerlerinde, Garagum, Murgap, Tejen derýalarynda, Etrek derýasynyň aşaky akumynda we Hazar deňziniň kenarynda. Arealynda höwürtegeýän böleginiň günorta çäginde, Merkezi Ýewropadan, Orta we Merkezi Aziýadan başgasynda güşlap, ol ýerden günortaraga uçup gidýär.

Ýaşajy: uçup geçýän-höwürtegeýän we güşlaýan guş. Ýazky migrasiýasy mart-aprelde, güýzküsi – sentýabr - oktyabrda. Dürli suw ýataklarynyň kenarykasynda ösýän gamyşlyklarda gizlenip ýaşýar. Aprel-maýda höwürtegeýär. Ýüzyän höwürtesini suw we suwýakada ösýän otlaryň arasynda gurýar. 4-6 sany (käte ondan köp) tutuk ak reňkli ýumurtgalary goýýar, olaryň reňki kürk döwrüniň soňunda höwürtgäniň içki düşeginiň çyglylygy sebäpli garalýar, ölçegleri – 26 x 38 mm. Adatça, jüýjelemegi maý aýynda geçýär. Ýymiti – maýda balyklar we suw oňurgasyzlyry.

Statusy: tersaýakşekillileriň arasynda baş sany durnuksyz üýtgeýän adaty görnüş, awçylykda ähmiýeti ýok.

Сходства – отличия: от других поганок отличается очень **мелкими размерами, короткой шеей, отсутствием украшающих перьев** в виде хохлов, пучков, «ушек», «воротников». На крыле (коротком, заостренном) **«зеркальце» нет.**

Распространение: гнездовая часть ареала – Европа, кроме восточных и северных областей, Малая, Передняя, Средняя, Центральная, Южная и Юго-Восточная Азия, Центральная и Южная Африка. В Средней Азии распространение широкое, но тяготеет к водно-болотным местообитаниям. В Туркменистане – Амударья, Сарыкамыш, сбросы и разливы в пустыне, Каракумдарья, Мургаб, Теджен, низовья Этрека и побережье Каспия. Зимует в южных пределах гнездовой части ареала, за исключением Центральной Европы, Средней и Центральной Азии, откуда отлетает южнее.

Образ жизни: пролетно-гнездящаяся и зимующая птица. Весенняя миграция – в марте-апреле, осенняя – в сентябре-октябре. Обитает на различных водоемах в прибрежных заросших участках. Ведет скрытый образ жизни. Гнездование – в апреле-мае. Гнездо – плавучее, располагается среди водной и околоводной растительности. В кладке 4-6 (иногда больше) светлых матово-белых яиц, темнеющих к концу насиживания из-за контакта с мокрой подстилкой гнезда. Размеры яиц – 26 x 38 мм. Птенцы обычно в мае. Питание – мелкая рыба и водные беспозвоночные.

Статус: наиболее обычный вид из поганок с нестабильной численностью, охотничьего значения не имеет.

4. Uly tersaýak – *Podiceps cristatus* – Большая поганка, или чомга

Meýdan alamatlary: ördek ölçeğinde, tersaýaklaryň arasynda has ulusy. Kellesiniň üsti garamtyl, gözünüň üsti zolakly, ýañaklary we boýnunyň öň tarapyak. **Horazynyň kellesinde ýazyna uzap ösen ýeleklerden garamtyl “gulajyk” we çypar-gara “ýakalyk” ýaly ýelekleri anyk görünýär.** Arkasy hem garamtyl, bedeniniň aşagy açyk, böwürleri – çyppak reňkli. Gözleri gyzyly, ýaşlarynyňky – gülgüne. Çünki gyzylymtyl. Aýaklary goýu-ýaşylymtyl. Uçýan wagty (okgunly we göni) boýny we aýaklary uzalandyr, çowly ganatlarynyň öňki gyrasynda ak tegmili we yzkysynda – ak “aýnajygy” bolup, ganatynyň ortasynda bitişýär. Güýz-gyş wagty reňkiniň solakdygy, “gulajygynyň” we “ýakalygynyň” ýokdugy anyk görünýär. **Ýaş guşlar hem edil şonuň ýaly görnüşde, ýöne olaryň kellesiniň gapdallarynda dik garamtyl zolaklary bolýar.** Sesi diňe jübütleşýän döwründe eşidilýär, köplenç güýçli we bogazdan basylyp çykýan dürli gykylyk – “korrr”, “kerrr”, “kruaa”, “krooa”. Uzynlygy – 45-50, ganaty – 17-21, ganatlarynyň gerimi – 85-95 sm, agramy – 700-1500 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **ölçe-giniň has uludugy bilen** beýlekilerden we boýnunyň akdygy hem-de “ýakalygynyň” bardygy bilen çalyňak tersaýakdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi – Ýewropa, demirgazyk oblastlaryndan başgasynda, Kiçi, Alynky, Orta we Merkezi Aziýa, Gazagystan, Demirgazyk-Gündogar Hytaý, Günorta Afrikanyň, Awstraliýanyň we Täze Zelandiýanyň käbir ýerlerinde. Orta Aziýada we Türkmenistanda dürli

Полевые признаки: размером с утку, среди поганок – наиболее крупная. Голова сверху темная, полоса над глазом, щеки и шея спереди – белые. **Весной у самцов на голове хорошо заметны темные «ушки» и рыже-черный «воротник»** из удлинённых перьев. Спина тоже темная, низ тела – светлый, бока – рыжеватые. Глаза красные, у молодых – розовые. Клюв – красноватый. Ноги – темно-зеленые. При полете (стремительном и прямолинейном) шея и ноги вытянуты, а на заостренных крыльях заметны: белое пятно на переднем крае и белое «зеркальце» на заднем, смыкающиеся у основания крыла. В осенне-зимнее время окраска заметно бледнее, «ушки» и «воротник» отсутствуют. Также выглядят и **молодые птицы, но у них по бокам головы имеются темные продольные полосы.** Голос подает только в брачный период – громкие и очень разнообразные горловые крики, чаще – «коррр», «кэррр», «круаа», «крооаа». Длина – 45-50, крыло – 17-21, размах крыльев – 85-95 см, вес – 700-1500 г.

Сходства-различия: **от других поганок отличается крупными размерами,** а от серощекой поганки – белой шеей и наличием «воротника».

Распространение: гнездовая часть ареала – Европа, кроме северных областей, Малая, Передняя, Средняя и Центральная Азии, Казахстан, Северо-Восточный Китай, местами в Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии. В Средней

сух ýataklarda giňişleýin gabat gelýär: Hazar deňzinden we Etrek derýasynyň aşagy akymyndan Amyderýa we Sarygamys kölüne çenli. Höwürtleýän oblastlarynyň çäginde, Gündogar Ýewropadan, Gazagystandan, Merkezi Aziýadan we Demirgazyk-Gündogar Hytaýdan başgalarynda gyşlaýar, ol ýerden günortaraga gyşlamaga uçup gidýär.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtleýän we gyşlaýan guş. Ýazky migrasiýasy mart-aprelde, güýzküsi – oktýabr-noýabrda. Aýratyn jübüt ýada koloniýa bolup, dürli suw-batgalyk ýerlerde höwürtleýär. Höwürtleýäni edil beýleki tersaýaklaryňky ýaly – ýüzüji. 3-5, käte 7-ä çenli tutuk-ak ýumurtgalary goýýar, guşlar kürk bolup oturdygyça ýumurtgalaryň reňki goýu-goňur sypaty alyar, ölçegleri – 32-40 x 46-66 mm. Jüýjelemegi apreliň aýagynda geçýär we gizlin gezýärler. Maýda balyklar, itbalyklar we suw oňurgasyzlyry bilen iýmitlenýär.

Statusy: beýleki tersaýaklar bilen deňeşdirilende adaty guş. Aw möwsümünde awçylar tarapyndan aw guşy hökmünde awlanýar, ýöne ol oňat olja hasaplanmaýar.

5. Çalyňak tersaýak – *Podiceps grisegena* – Серощекая поганка

Meýdan alamatlary: ortaça ördek ölçeğinde; gyzylboýun tersaýakdan biraz ulurak, ýöne uly tersaýakdan ер-esli kiçi. Bedeniniň üsti ýazyna goňurrak-çal, aşagy – ak, **döşüniň ýokarky bölegi we boýnunyň öň tarapy – goňrasrak-çypar. Kellesiniň üsti (gözüne çenli) – kiçiräk hüpükli gara, ýañaklary we bokurdagy – çal. Çünki sary düýpli, çal.** Güýz-gyş döwründe bokurdagy we boýnunyň öňi çal, ýaşlarynyňky – goňurrak-

Азии и Туркменистане встречается широко по различным водоемам: от Каспия и низовьев Этрека – до Амударьи и Сарыкамыша. Зимуют в пределах гнездовых областей, за исключением Восточной Европы, Казахстана, Центральной Азии и Северо-Восточного Китая, откуда на зиму отлетают южнее.

Образ жизни: пролетно-гнездящаяся и зимующая птица. Весенняя миграция в марте-апреле, осенняя – в октябре-ноябре. Гнездится по различным водно-болотным местообитаниям отдельными парами или в колониях. Гнездо как у большинства поганок – плавучее. В кладке – 3-5, иногда до 7 яиц; в начале матово-белого цвета, а к концу насиживания – темно-бурого. Размеры яиц – 32-40 x 46-66 мм. Птенцы появляются с конца апреля, держатся скрытно. Питается мелкой рыбой, головастиками лягушек и водными беспозвоночными.

Статус: обычная, по сравнению с другими поганками, птица. Добывается охотниками во время сезона охоты, но хорошим трофеем не считается.

Полевые признаки: размером со среднюю утку; чуть крупнее красношейной, но немного мельче большой поганки. Весной верх тела буровато-серый, снизу – белый, **верхняя часть груди и шея спереди – каштаново-рыжие. Голова сверху (до глаза) – черная с небольшим хохолком, щеки и горло – серые. Клюв серый, с желтым основанием.** В осенне-зимний период горло и шея спере-

çypar garyndyly reňkli. Ýaşlarynyň kellesiniň gapdallaryndan garamtyl dik zolaklar geçýär. Gözi goňur. Aýaklary daş ýüzünden garamtyl we içki tarapdan – sarymtylrak-ýaşylymtyl. Sesi, diňe jübütleşýän döwründe, pert gurylyjk “çek-çek” we pesden sogup çykýan “kaouuu”. Uzynlygy – 40-49, ganaty – 15-20, ganatlarynyň gerimi – 75-85 sm, agramy – 700-1200 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **ýaňaklarynyň ýazyna açyk-çal** alamaty, beýleki tersaýaklarda gabat gelmeýär. **Gyşyna – tutuşlygyna gözünüň deňine çenli barýan garamtyl-çal “telpejikli”. Ganatlaryndaky ak tegmil we ak “aýnajyk”** uçýan wagtynda **olar galtaşmaýarlar.**

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeýän bölegi – Merkezi we Gündogar Ýewropa, Gazagystan, Gündogar Sibir, Aziýanyň demirgazyk-gündogary we Demirgazyk Amerikanyň demirgazyk - günbatary. Orta Aziýada we Türkmenistanda – suw-batgalyk ýerleriň hemmesinde ýaýran: Sarygamyşda, Garaguma suw joşgunynyň baran ýerlerinde, Amyderýada, Garagum, Murgap, Tejen derýalarynda, Etrek derýasynyň aşaky akumynda we Hazar deňiziniň kenarýakasynda. Gyzylboýun tersaýak üçin häsiýetli bolan oblastlarda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-gyşlaýan, az sanda höwürtlegeýän guş. Ýazyna mart - aprelde, güýzüne – sentýabrda uçup geçýär. Yzgary söýýän ösümlikleriň gür ösen dürli suw ýataklarynda gabat gelýär. Aýratyn jübüt bolup, gizlenip gezyär, şeýle-de höwürtlegeýär. Höwürtesini, adatyça kenarýakadaky gür ösen otlaryň arasynda gurýar. 2-4, käte 6 sany tutuk-ak ýumurtgalary goýýar,

ди – серые, а у молодых – с примесью буро-рыжего цвета. По бокам головы у молодых заметны также темные продольные полосы. Глаза бурые. Ноги – черноватые снаружи и желтовато-зеленоватые с внутренней стороны. Голос – только в брачный период – резкое скрипучее «чек-чек» и низкое протяжное «каооуу». Длина – 40-49, крыло – 15-20, размах крыльев – 75-85 см, вес – 700-1200 г.

Сходства – отличия: **весной – светло-серые щеки**, признак, не встречающийся у других поганок. **Зимой – сплошная темно-серая «шапочка»,** **доходящая до уровня глаз.** В полете **на крыле – белое пятно и белое «зеркальце», которые не соединяются.**

Распространение: гнездовая часть ареала – Центральная и Восточная Европа, Казахстан, Восточная Сибирь, на северо-востоке Азии и северо-западе Северной Америки. В Средней Азии и Туркменистане – везде по водно-болотным местообитаниям: на Сарыкамыше, по разливам в Каракумах, на Амударье, Каракумдарье, Мургабе, Теджене, в низовьях Этрека и на побережье Каспия. Зимуют в тех же областях, что и красношейная поганка.

Образ жизни: пролетная, зимующая птица, в небольшом числе гнездится. Весенний пролет – в марте-апреле, осенний – в сентябре. Встречается на различных водоемах, заросших влаголюбивой растительностью. Держатся скрытно отдельными парами, также и гнездятся. Гнезда – обычно среди густой прибрежной растительно-

soňra ol höwürtgäniň düşeginiň ýokundysyndan ýaşylymtylrak ýa-da goňurrak reňke geçýär, ölçegleri – 31-38 x 48-58 mm. Adatyça, maý aýynda jüýjelemegi geçýär. Suwdaky maýda oňurgasyzlar, şeýle-de balyklar bilen ýymitlenýär.

Statusy: baş sany durnuksyz, az sanly görnüş. Awçylykda ähmiýeti ýok, ýöne käte awçylar tarapyndan awlanýlýar.

6. Gyzylboýun tersaýak – *Podiceps auritus* – Красношейная поганка

Meýdan alamatlary: garaboýun tersaýakdan sähelçe ulurak, ýöne çalyňak tersaýakdan kiçi. Arkasy **ýazyna** goýy - goňur, bedeniniň gapdallary we boýny **goňrasrak-çypar**, bokurdagynyň “telpejigi” we “ýakajygy” – gara, **kellesindäki “şahjagaz” çypar reňkli.** Çüňküniň düýbi sary, agymtyl uçly gara. Gözi gyzyl. Aýaklary, edil garaboýun tersaýagyňky ýaly, daşky ýüzi garamtyl we içki tarapy – ýaşylymtyl-çal. Güýz-gyş döwründe çypar reňki solýar, ýaňaklary we boýnunyň öň tarapy ak reňki alýar. Ýaş guşlar gyşyna ulularyna çalyndaş, ýöne bedeniniň gapdallarynda, maňlaýynda, döşünde we arkasynda çal reňkiň goşundy mukdary köpdür. Sesi şyryldyly sesler – “ýuirrr”, “ýaorr” ýa-da “kriirrr”. Uzynlygy – 30-38, ganaty – 13.5-15.9, ganatlarynyň gerimi – 59-66 sm, agramy – 240-380 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **çüňküniň düýbi bilen gözleriniň aralygy insiz ýagty zolakly.** Ganatlarynda iki ak meýdançajyklary bolýar (çalyňak tersaýagyňky ýaly).

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeýän bölegi – Ýewraziýanyň we

сти. В кладке 2-4, иногда 6 яиц матово-белого цвета, в результате загрязнения о гнездовую подстилку становятся зеленоватыми или коричневатыми. Их размеры – 31-38 x 48-58 мм. Птенцы обычно в мае. Питается мелкой рыбой, а также водными беспозвоночными.

Статус: немногочисленный вид с нестабильной численностью. Охотничьего значения не имеет, но изредка добывается охотниками.

Полевые признаки: чуть крупнее черношейной, но мельче серощекой поганки. **Весной** спина темно-бурая, **бока тела и шея – каштаново-рыжие**, «шапочка» горло и «воротник» – черные, **на голове «рожки» рыжего цвета.** Клюв черный со светлым кончиком, желтоватый к основанию. Глаза красные. Ноги, как у черношейной поганки – черноватые снаружи и зеленовато-серые с внутренней стороны. В осенне-зимний период рыжий цвет отсутствует, щеки и шея спереди – белые. Молодые птицы похожи на взрослых зимой, но с большей примесью серого цвета по бокам тела, на лбу, груди и спине. Голос – журчащее «юирrrr», «яорrrr» или «криирrrr». Длина – 30-38, крыло – 13.5-15.9, размах крыльев – 59-66 см, вес – 240-380 г.

Сходства – отличия: **между ос-нованием клюва и глазом – тонкая светлая полоска.** На крыле – два белых поля (как у серощекой поганки).

Распространение: гнездовая часть ареала – умеренные и субар-

Demirgazyk Amerikanyň aram we subarktika giňişlikleri. Türkmenistanda, edil Orta Aziýanyň hemme ýerinde bolşy ýaly, ýaýraýşy derýa jülgeleri we suw ýataklary bilen baglanyşykly: Amyderýa, Sarygamyş, çöldäki akynydy we joşgun suwlaryň toplanan ýerleri, Garagum, Murgap, Tejen derýalary, Etrek derýasynyň aşaky akymy we Hazar deňziniň kenarýakasy. Demirgazyk-Günbatar we Günorta-Gündogar Ýewropada, Orta Aziýanyň günortasynda we Gündogar Aziýanyň gyrak çetlerinde we Demirgazyk Amerikanyň kenarýakalarynda guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän we guşlaýan görnüş. Ýazky migrasiýasy aprel-maýda, güýzküsi – awgust-sentyabrda. Suw we suwýaka ösümlüklerine baý bolan suw ýataklarynda saklanýar. Höwürtgisini kenarýakasynyň ösgün ösen ösümlüklilikli ýerlerinde gurýar. Aýratyn jübüt bolup höwürtleýär. Adatça, 4-5, käte 7 sany ak reňkli ýumurtgalary goýýar, soňra olaryň höwürtgäniň çañly düşeginiň ýokundysyndan garmasy geçýär, ölçegleri – 29-39 x 40-50 mm. Jüýjeleme - apreliň aýagynda we maý aýynda. Suw oňurgasyzlary, az mukdarda maýda balyklar bilen ýumitlenýär.

Statusy: seýrek guş, awçylykda ähmiýeti ýok.

7. Garaboýun tersaýak – *Podiceps nigricollis* – Черношейная поганка

Meýdan alamatlary: kiçi tersaýakdan ulurak, ýöne gyzylboýun tersaýakdan kiçi. **Ýazyna arkasy, kellesi we tutuş boýny gara**, bedeniniň gapdallary çyпар, gözleriniň zyzында – inçejik altyn öwüşginli ýelekleriň dessejigi bolýar. Bokurdagy we döşi güýz-guş döwründe ak, boýunyň

ктические широты Евразии и Северной Америки. В Туркменистане, как и всюду в Средней Азии, распространение связано с долинами рек и водоемами: Амударья, Сарыкамыш, сбросы и разливы в пустыне, Каракумдарья, Мургаб, Теджен, низовья Этрека и Каспийское побережье. Зимуют на побережьях Северо-Западной и Юго-Восточной Европы, юге Средней и крайних пределах Восточной Азии и по побережьям Северной Америки.

Образ жизни: пролетный, зимующий вид. Весенняя миграция – в апреле-мае, осенняя – в августе-сентябре. Придерживается водоемов богатых водной и околоводной растительностью. Гнездо, как правило, устраивает в зарослях прибрежных растений. Гнездится отдельными парами. В кладке – обычно 4-5, иногда до 7 яиц белого цвета, которые темнеют, окрашиваясь в результате соприкосновения с грязной подстилкой гнезда. Размеры яиц – 29-39 x 40-50 мм. Птенцы – с конца апреля и в мае. Питается водными беспозвоночными, в меньшей степени мелкой рыбой.

Статус: редкая птица, охотничьего значения не имеет.

Полевые признаки: крупнее малой, но мельче красношейной поганки. **Весной спина, голова и вся шея черные**, бока тела рыжие, за глазами – пучки тонких золотистых перьев. В осенне-зимний период горло и грудь – белые, шея спереди – светло-серая, бока – се-

öňi – ачык-çal, gapdallary – çal. **Çüňküniň uju yokaryk galyp duran jaýty.** Uly guşlaryň gözleri gyзыл, ýaşlarynyňky – goňur. Aýaklary daşyndan garamtyl-rak, içki tarapyndan ýaşylymtyl-çal. Ýaş guşlar ulularynyň guşky ýelek örtügi bilen meňzeş. Sesi diňe köpelyän döwründe eşidilýär – güýçli inçe sykylyklar: “uit-uit” ýa-da “piit-piit”. Uzynlygy – 28-34, ganaty – 12-13.9, ganatlarynyň gerimi – 55-60 sm, agramy – 300-450 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çüňküniň **tutuşlygyna garadygy we biraz yokaryk galyp durandygy (“jaýty burun”) bilen tersaýaklaryň ählisinden tapawutlanýar. Ganatlaryny yzky gyrasynda diňe bir ak tegmili bolýar** (“aýnajyk”).

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän böleginiň aralary üzülen – Merkezi, Günorta-Gündogar we Gündogar Ýewropa, Günbatar Sibiriň günortasy, Gazagystan, Hytaýyň demirgazyk-gündogary, Demirgazyk Amerikanyň günorta-günbatary we Afrikanyň günortasy. Orta Aziýada giň ýaýran we ol diňe suw-batgalyk ýerleri bilen baglanyşykly. Türkmenistanda – Amyderýada, Sarygamyşda, Mertkezi Garaguma suw akan ýerlerde, Garagum, Murgap, Tejen, Etrek derýalarynyň ugrunda, Hazaryň kenarýakasynda duşýar. Günbatar Ýewropada, Ortaýer deňzinde, Alyňky Aziýada, Orta Aziýanyň günortasynda we Gündogar Aziýanyň kenarýakasynda, Afrikada we Merkezi Amerikanyň günortasynda guşlaýar.


Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtleýän, guşlaýan guş. Ýazky migrasiýasy aprel-maýda, güýzküsi – sentýabr-oktyabrda. Dürli göwürümlü – suwýaka ösümlüklerine baý bolan maýda, şeýle-de iri suw ýataklarynda

рые. **Конец клюва вздернут.** Глаза красные у взрослых, коричневые у молодых. Ноги снаружи черноватые, с внутренней стороны зеленовато-серые. Молодые птицы схожи со взрослыми в зимнем оперении. Голос подает только в период размножения – громкие тонкие свисты «уит-уит» или «пиит-пиит». Длина – 28-34, крыло – 12-13.9, размах крыльев – 55-60 см, вес – 300-450 г.

Сходства – отличия: от всех поганок отличается **полностью черным и немного вздернутым («курносим») клювом. На крыле – только одно белое пятно** по заднему краю («зеркальце»).


Распространение: гнездовая часть ареала разорвана – Центральная, Юго-Восточная и Восточная Европа, юг Западной Сибири, Казахстан, северо-восток Китая, юго-запад Северной Америки и юг Африки. В Средней Азии распространение широкое и связано исключительно с водно-болотными местообитаниями. В Туркменистане – по Амударье, на Сарыкамыше, разливам в Центральных Каракумах, в зоне Каракумдарья, Мургаба, Теджена, Этрека и побережья Каспия. Зимуют в Западной Европе, Средиземноморье, Передней, на юге Средней и побережью Восточной Азии, юге Африки и Центральной Америки.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся и зимующая птица. Весенняя миграция – в апреле-мае, осенняя – сентябре-октябре. Встречается по различным водоемам, как мелким, так и крупным, с богатой околоводной растительностью. Держатся в стаях. Гнезда



Guşlaryň suwdaky oturyşy: 1 – derýa ördegi; 2 – tüňňele ördek; 3 – jüptün ördek; 4 – gorçy; 5 – ýogla; 6 – tersaýak; 7 – sakarbarak; 8 – garajagaz; 9 – çarlak.

Посадка птиц на воде: 1 – речная утка; 2 – нырок; 3 – крохаль; 4 – савка; 5 – гагара; 6 – поганка; 7 – лысуха; 8 – баклан; 9 – чайка.



Guşlaryň uçup barýarka görnüşi: 1 – ördek; 2 – garajagaz; 3 – sakarbarak; 4 – tersaýak; 5 – ýogla.

Птицы в полете: 1 – утка; 2 – баклан; 3 – лысуха; 4 – поганка; 5 – гагара.

gabat gelyär. Süri bolup gezyär. Koloniya bolup, yuzyan adajyklarda ya-da tummeklerde, suwaka osumlikleriň seýrek osen yerlerinde ya-da gyrmança uşmeklerinde howurtge gurýar. 3-den 5-6 çenli tutuk-ak yumurtgalary goýýar, soň howurtgäniň içki düşeginiň reňkiniň ýokmagynda olaryň ýaşlymytl ya-da goňurrak we goňur öwüşgini almagy mümkin, ölçegleri – 26-34 x 39-49 mm. Jüýjelemegi, adatça, maý aýynda. Esasan, suw oňurgasylary, seýrek maýda balyklar bilen ýymitlenýär.

Status: howurtgeleyän döwri seýrek, uçup geçýän we guşlaýan wagty adaty, käbir yerlerde kop sanly Awçylykda ähmiýeti ýok.

– в колониях, на плавучих островках или на кочках, среди негустой околводной растительности или на илистом грунте. В кладке от 3 до 5-6 яиц. Свеже отложенные – матово-белые, но потом меняют цвет на зеленоватый или коричневатый и даже бурый из-за пачкания о подстилку гнезда. Размеры яиц – 26-34 x 39-49 мм. Птенцы обычно в мае. Питается в основном водными беспозвоночными, редко мелкой рыбой.

Статус: в гнездовое время редка, а на пролетах и в зимний период обычна. Охотничьего значения не имеет.

GOTANŞEKILLILER, ÝA-DA KÜREKAÝAKLYLAR – PELECANIFORMES – ПЕЛИКАНООБРАЗНЫЕ, ИЛИ ВЕСЛОНОГИЕ

Öý ördegininiň maýdasyndan uly gazyň ölçegine çenli bolan, uzyn boýunly, inli hem uzyn ganatly suwda yuzyan guşlar maşgalasy. Bedeni oklawşekilli, dykyz, süýnmek, suwda yuzmäge, garaja gazlar maşgalasynyň wekilleri bolsa, suwa çümüp yuzmäge oňat uýgunlaşandyrlar. Barmagynyň 4-si hem umumy yuzüç perdeli. Horazy hem makiýany meñzeş reňkli, yöne jübütleşýän döwründe horazlarynyň kellesinde, bedeniniň üstki böleginde we söbüginde bezeg ýelekleri peýda bolýar. Dürli möçberli suw ýataklarynyň ýaşajylary. Kiçiräk adajyklarda, agaçlaryň üstünde, gaýalaryň erneklerinde howurtgeleyärler. Guşlaryň jübütleşmesi durnukly, adatça koloniya döredip howurtgeleyärler. Yumurtgalary uzalan - süýrüräk görnüşde. Balyk bilen

Отряд водоплавающих птиц размером от мелкой домашней утки до крупного гуся, с длинной шеей и широкими, длинными крыльями. Тело вальковидное, плотное, обтекаемое, хорошо приспособленное для плавания, а у представителей семейства баклановых – для ныряния. Все 4 пальца заключены в общую плавательную перепонку. Самцы и самки окрашены практически одинаково, но в брачный период у самцов появляются украшающие перья на голове, верхней части тела и голених. Обитатели различных водоемов. Гнездятся на небольших островах, на деревьях, уступах обрывов. Пары постоянные, обычно образуют гнездовые колонии. Яйца удлиненно-эллипсоидной формы. Пи-

ýmitlenýärler. Dünýäde 56 görnüş (6 maşgala), 4-si Türkmenistanda.

Gotanlar – *Pelecanidae* – Пеликановые

Üstki çünki ýasy we aşakysynda özboluşly deripisint haltasy bolýan, suwda ýüzýän iň iri guşlaryň maşgalasy. Ýelek örtügininiň reňki açyk, köplenç ak. Dünýä faunasynynda 8 görnüş, 2-si Türkmenistanda.

8. Gyzgyt gotan – *Pelecanus onocrotalus* – Розовый пеликан

Meýdan alamatlary: beden gurluşy, ölçegi we ininiň boýuna kybapdaşlygy **buýraly gotana çalymdaş, emma uly guşlaryň ýelek örtügininiň reňki agymtyl-gyzgyt. Kellesindäki hüpügi gysga we buýrasyz. Ganatlarynyň uçlary gara diýen ýaly.** Aýaklary sary ýada gyzgyt. Ýaş guşlar goýy-goňur reňkli. Sesi basyk “arlama”, ýöne sesi diňe höwürtegeleýän koloniyasynyň golaýynda eşidilýär, galan wagty ümsüm gezýär. Horazlarynyň ganaty – 70-72, mäkiýanlarynyňky – 64-68 sm, agramy – 10-11 kg çenli.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ýelek örtügininiň mylaýym-gyzgytdygy, kellesindäki we boýnundaky ýelekleriň buýrasyzdygy, hüpügininiň gönüdigini, ganatlarynyň uçlarynyň garadygy, aýaklarynyň açyk reňklidigi bilen buýraly gotandan tapawutlanýar. Buýraly gotandan tapawutlylykda suwda oturan wagty ýugy-ýugydan boýnuny yza gaňyrýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeleýän bölegi edil buýraly gotanyňky ýaly aýry-aýry toplumlardan durýar: Ortaýer we Gara deňzleriniň demirgazyk raýonlary, Günorta Hazarýakasy, Orta Aziýa

таются рыбой. В мире 56 видов (6 семейств), в Туркменистане – 4.

Семейство самых крупных из водоплавающих птиц с характерными большими плоскими надклювьями и своеобразным кожистым мешком под клювом. Окраска оперения светлая, преимущественно белая. В мировой фауне 8 видов, в Туркменистане – 2.

Полевые признаки: строением тела, размером и пропорциями **похож на кудрявого пеликана, но окраска оперения взрослых птиц бело-розовая. Хохолок на голове короткий и не завит.** Концы крыльев почти черные. Ноги желтые или розоватые. Молодые птицы почти темно-бурые. Голос – глуховатый “рев”, но только поблизости от гнездовой колонии, в остальное время молчаливы. Крыло самцов – 70-72, самок – 64-68 см, вес – до 10-11 кг.

Сходства – отличия: от кудрявого пеликана отличается окраской – оперение нежно-розовое, перья на голове и шее не закручены, хохол прямой, концы крыльев черные, ноги светлые. В отличие от кудрявого пеликана, шею, сидя на воде, чаще закидывает назад.

Распространение: гнездовая часть ареала как у кудрявого пеликана мозаична – северные районы Средиземноморья и Черноморья, Южный Прикаспий, Средняя Азия и Казахстан. В Туркменистане – по долинам крупных рек, на внутренних водоемах и морском побе-

ре we Gazagystan. Türkmenistanda – uly derýalaryň jülgelerinde, içki suw ýataklarynda we deňziň kenarýakasynda. Buýraly gotana garanynda giňişleýin gyşlaýar: Demirgazyk-Gündogar Ortaýer deňzinde, Pars aýlagynyň demirgazyk kenarynda, Hindistanyň demirgazyk oblastlarynda hem-de Merkezi we Gündogar Afrikada.

Ýaşaýyşy: uçup geçýän, gyşlaýan we az-owlak höwürtegeleýän guş. Ýazyna fewralyň aýagyndan maý aýynyň ortasyna çenli, güýzüne – awgustyň soňundan noýabryň aýagyna çenli uçup geçýär. Sarygamuş kölündäki adajyklarda, köplenç buýraly gotanlar ýada gara ja gazlar bilen bilelikde koloniýa bolup höwürtegeleýär. Maý aýyndan awgustyň başyna çenli köpeliýär. Adatça, höwürtegesi çägäni üstünde, käte azajyk sypal we ýelek düşelenje çukurjyk. 2-3 sany ak reňkli ýumurtga goýýar. Ýaşaýyş häsiýeti boýunça, buýraly gotan bilen birmeňzeş.

Statusy: örän seýrek, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen görnüş.

9. Buýraly gotan – *Pelecanus crispus* – Кудрявый пеликан

Meýdan alamatlary: guw ölçegli we inli uly ganatly örän uly guş. **Aşaky eňeginiň asty gyzgyt reňkli derişkilli holtumly, uzalan daýaw çüňkli.** Jübütleşýän döwründe holtumy mämişi reňkli, ganatlarynyň uçlary çalymtly-goňur bolup, ýelek örtügi agymtyl-çal. Horazynyň kellesindäki we ýeňsesindäki uzalan ýeleklери buýraly. Mäkiýanynda bu alamat gowşak. Ýaş guşlar goňurrak-çal reňkli. Aýaklary çal. Sesi gyzgyt gotanyňky bilen meňzeş, ýöne has ýokary äheňde. Horazlarynyň ganaty – 72.5-77, mäkiýanlarynyňky – 68.5-

режье. Зимует шире, чем кудрявый пеликан: в Северо-Восточном Средиземноморье, на северном побережье Персидского залива, в северных областях Индостана и в Центральной и Восточной Африке.

Образ жизни: пролетная, зимующая и частично гнездящаяся птица. Весенний пролет – с конца февраля до середины мая. Осенний – с конца августа до конца ноября. Гнездится колониями на островах озера Сарыкамыш, нередко совместно с кудрявым пеликаном или бакланами. Размножение в мае – начале августа. Гнездо – обычно ямка в песчаном грунте, иногда с небольшим количеством веточек и перьев. В кладке – 2-3 яйца белого цвета. По образу жизни во многом сходен с кудрявым пеликаном.

Статус: очень редкий, вид, занесен в Красную книгу Туркменистана.

Полевые признаки: очень крупная птица размером с лебедя и с большими широкими крыльями. **Массивный удлиненный клюв с кожистым мешком розового цвета под нижней челюстью.** В брачный период мешок оранжевого цвета, оперение беловато-серое с серо-бурыми концами крыльев. У самцов **перья на голове и затылке удлиненные с завитками.** У самок этот признак выражен слабее. Молодые птицы буровато-серые. Ноги серые. Голос схож с розовым пеликаном, но более высоких то-

70 sm, agramy - 9-dan-12-13 kg çenli.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: açyk - çal reňki, garamtyl ayaklary, kellesindäki özboluşly buýra ýelekleri bilen gyzgyt gotandan tapawutlanýar. Suwda oturanda boýnuny dik saklaýar.

Ýaşan ýerleri: höwürtegeleýän oblasty örän dürli – Ortaýer we Gara deňizleriniň demirgazyk raýonlary. Demirgazyk Hazarýakasy, Orta we Merkezi Aziýa. Ýaşraýyş höwürtelemek we ýमितlenmek üçin amatly ýerleriň meýdanyna bagly. Türkmenistanda – uly derýalaryň jülgelerinde, içki suw ýataklarynda we deňziň kenarýakasynda gabat gelýär. Gündogar Ortaýer deňzinde, Orta Aziýanyň günorta we Günorta Aziýanyň demirgazyk oblastlarynda gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, bölekleyin gyslaýan we käte höwürtegeleýän guş. Ýazyna fewralyň ikinji ýarymyndan maýyň başyna, güýzüne – awgustyň ikinji ýarymyndan dekabryň başyna çenli uçup geçýär. Sarygamuş kölündäki adajyklarda we Soltansanjar suw howdanynda gyzgyt gotanlar ýa-da garaja gazlar bilen bilelikde koloniýa bolup höwürtegeleýär. Apreliň aýagyndan iýul aýunyň ahyryna çenli köpeliýär. Höwürtegesi ýumşak, harsal gurlan, ini 50 we beýikligi 20-30 sm çenli. 2-3, seýrek 4-5 sany ak reňkli ýumurtga goýýar. Suwda oňat ýüzýär, balyk bilen ýमितленýär, yöne olary çümüp awlamaýar. Balyklary suwuň üstki gatlagyndan, adatyça, olary suwuň ýalpak ýerine gabap tutýar.

Statyusy: örän seýrek görnüş, MSOP-nyň Gyzyl sahypasyna we Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen.

нов. Крыло самцов – 72.5-77, самок – 68.5-70 см, вес – от 9 до 12-13 кг.

Сходства – отличия: от розового пеликана отличается светло-серой окраской, темными ногами и своеобразно закрученными перьями на голове. Шею, сидя на воде, держит вертикально.

Распространение: гнездовая область очень мозаична – северные районы Средиземноморья и Черноморья, Северный Прикаспий, Средняя и Центральная Азия. Распространение зависит от наличия мест, подходящих для гнездования и кормежки. В Туркменистане – по долинам крупных рек, на внутренних водоемах и морском побережье. Зимуют в Восточном Средиземноморье, южных областях Средней и северных областях Южной Азии.

Образ жизни: пролетная, частично зимующая и спорадически гнездящаяся птица. Весенний пролет – со второй половины февраля до начала мая. Осенний – со второй половины августа до начала декабря. Гнездится колониями на островах озера Сарыкамыш и вдхр. Солтансанджар, нередко совместно с розовым пеликаном или бакланами. Размножение с конца апреля до конца июля. Гнезда рыхлые, небрежные, диаметром до 50 и высотой 20-30 см. В кладке 2-3, реже 4-5 яиц белого цвета. Хорошо плавает, питается рыбой, но за ней не ныряет. Добычу ловит в поверхностных слоях водоема, обычно загоняя ее на мелководье.

Статус: очень редкий вид, занесен в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана.

Garajagazlar – *Phalacrocoracidae* – Баклановые

Maýda, öý ördeklerinden kiçiräk, gaz ölçegindäki guşlar maşgalasy. Bedeni uzalan, ayaklary yza süýşen oklawşekilli. Uzyn boýnunda kiçiräk kellesi oturýar. Çünki insiz, başgalar garanyňda uzyn, uýy gaňyrçakly. Dürli görnüşleriň kellesiniň yüz bölegindäki ýalaňaç derisi dürli reňke boýalan. Görnüşleriň horazlarynyň köpüsünde jübütleşýän döwri hüpük we bezeg ýelekleri ösüp çykýar. Dünýä faunasynnda 31 görnüş, 2-si Türkmenistanda.

10. Uly garajagaz – *Phalacrocorax carbo* – Большой баклан

Meýdan alamyty: suwda pes oturýan kiçiräk gaz ölçegindäki guş. Boýnuny göni ýa-da biraz egredip saklaýar. **Ulularynyň reňki ýaşylymtyl metal öwüşginli gara. Bokurdagy we ýaňaklary ak, çünkünüň düýbündäki ýalaňaç deri tegmili sary.** Gözleri gök. Jübütleşýän döwründe horazlarynyň kellesinden, boýnunyň üstki böleginden we injiginden saçşekilli ak ýelekleri ösüp çykýar. Aýaklary gara. Ýaşlary goýy-goňur reňkde, garny ak. Örän oňat ýüzüp we çümüp bilýär, ezilenden soň kenarda ýeleklerini guratmak üçin, ganatlaryny ýazýar. Uçanynda ýygy-ýygdydan biri-biriniň yzyna tirkeşýärler ýa-da nädogry toýnuk görnüşini alýarlar. Sesi basyk gagyldama. Uzynlygy – 90 sm çenli, horazynyň ganaty – 33.3-38.3, mäkiýanynyňky – 32.5-36.5, ganatlarynyň gerimi – 150 sm, horazynyň agramy – 1.8-den-3 kg çenli.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçeginiň uludygy we ýüzündäki “örtügiň” reňkiniň sarydygy bilen kiçi garajagazdan tapawutlanýar.

Ýaşan ýerleri: arealy bölekleyin,

Семейство птиц размером от мелкой домашней утки до небольшого гуся. Тело удлинённое, вальковидное с отнесенными назад ногами. Небольшая голова сидит на длинной шее. Клюв узкий, довольно длинный, с крючком на конце. Голая кожа на лицевой части головы у разных видов окрашена неодинаково. В брачный период у самцов многих видов отрастают хохолки и украшающие перья. В мировой фауне 31 вид, в Туркменистане – 2.

Полевые признаки: размером с небольшого гуся, на воде сидит низко. Шею держит прямо или с небольшим изгибом. **Окраска взрослых черная, с зеленоватым металлическим отливом. Горло и щеки белые, пятно голой кожи у основания клюва – желтое.** Глаза синие. У самцов в брачный период отрастают волосовидные белые перья на голове, верхней части шеи и голени. Ноги черные. Молодые черно-бурые с белым брюшком. Хорошо плавает и ныряет, намокнув, выходит на берег и принимает позу с полураскрытыми крыльями, чтобы их просушить. В полете часто выстраиваются гуськом или неровным клином. Голос – глухое карканье. Длина – до 90, крыло у самцов – 33.3-38.3, у самок – 32.5-36.5, размах крыльев – 150 см, вес самцов – от 1.8 до 3 кг.

Сходства – отличия: от малого баклана хорошо отличается крупными размерами и желтым цветом «маски на лице».

Antarktidadan, Günorta we Demir-gazyk Amerikadan hem-de Demir-gazyk-Gündogar Aziýadan başga dünýäniň hemme ýerlerinde ýaýran. Orta Aziýada we Türkmenistanda – uly derýalaryň jülgeleriniň, oazisleriň we çöllükleriň, deňiz kenarýakasynyň suwbatgalyk ýerleri.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtlegeýän, göçüp gezýän we gyslaýan görnüş. Gyslan ýerinden uçup gitmege we ýazky uçup geçmegi fewralyň ortasyndan apreliň başyna çenli. Uly göwrümlü suw ýataklarda, köllerde, suw joşgunyndan dörän suwlarda we suw howdanlarynda ýaşayar. Apreliň ortasyndan iýulyň aýagyna çenli köpelyär. Hazar deňziniň kenarýakasynda we onuň kert gaýalarynyň erňeklerinde, tekjelerinde (deňizdäki taşlanan buraw meýdançalarda) koloniýa bolup höwürtlegeýär. Içki suwlarda – adajyklarda we kenarýakada ösen gamyşlaryň guran üşmekleriniň, kiçiräk gyrymsylaryň üstünde höwürtlegeýär. Höwürtgese tagaşyksyz, adaça döwlen çybyklaryň böleklerinden durýar, käbir ýerde höwürtgäni köp ýyllap ulanýar. Aprel-maý aýynda 4-6 sany, başgalara garanynda uly, armyt sypatly ak çyrşakly gögümtil reňkli ýumurtgalary goýýar. Ýaşlary iýulyň aýagynda, awgustyň başynda ganatlaryna galýarlar. Köplenç balyklar, leňneçler we kiçi leňneçler bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde köpsanly görnüş. Höwesjeň awçylaryň aw guşy.

11. Kiçi garajagaz – *Phalacrocorax pygmeus* – Малый баклан

Meýdan alamatlary: garga öleşeginde. **Ululary seýrek damjashkilli ak tegmilli we ýaşylymtly**

Распространение: ареал мозаичен и разбросан почти по всему миру, за исключением Антарктиды, Южной и Северо-Западной Америки и Северо-Восточной Азии. В Средней Азии и Туркменистане – водно-болотные угодья в долинах крупных рек, в оазисах и пустыне, на морском побережье.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся, летующий и зимующий вид. Весенний пролет – с середины февраля до начала апреля. Обитает по разным крупным, реже мелким водоемам, озерам, разливам и водохранилищам. Размножение с середины апреля до конца июля. Гнездится колониально на Каспии – в нишах береговых обрывов побережья (в море даже на пустующих буровых платформах). На внутренних водоемах – на островах и берегах с заламами тростника, небольших кустарниках, изредка на деревьях. Гнезда громоздкие, обычно из обломков веток, в некоторых местах гнезда используются много лет. Кладка в апреле-мае, из 4-6 относительно крупных яиц, слегка грушевидной формы и голубоватой окраски с белыми подтеками. Молодые поднимаются на крыло в конце июля, начале августа. Питаются преимущественно рыбой, раками и креветками.

Статус: обычный, местами многочисленный вид. Является объектом любительской охоты.

Полевые признаки: размером с ворону. **Взрослые окрашены в буровато-черный цвет с редкими**

öwüşginli goňurrak-gara reňke boýalan. Kellesi we boýnunyň köp bölegi goňur ýa-da çuparrak-goňur. Jübütleşýän döwründe kellesi we boýny seýrek ak ýelekli gara, çünki we aýaklary – gara. Ýaş guşlar has açyk, goňurrak, köplenç garny aksowult we bokurdagy açyk reňkli. Sesi gagyldy, hyrlama. Horazlarynyň ganaty – 19.8-20, mäkiýanlarynyňky – 18.5-20.5 sm, agramy – 900-1000 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçeginiň kiçidigi we çüňküniň töwereginde ýalaňaç deriniň ýokdugy bilen uly garajagazdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta-Gündogar Ýewropa, Alynky, Orta Aziýa we Günorta Gazagystan. Türkmenistanda, esasan, Sarygamyşda we Amyderýada, şeýle-de soňky ýyllarda Garagum, Murgap, Tejen derýalarynda, Köpetdagiň eteklerinde, Etrek derýasynyň aşaky akymynda az duşýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, höwürtlegeýän we gyslaýan guş. Ýazynda martyň soňunda-aprelde, güýzüne – sentýabr-noýabrda uçup geçýär. Ýaşayan ýeri edil uly garajagazlaryňky ýaly. Maý-iýulda höwürtlegeýär. Gamyşlaryň döwlen baldaklaryndan toplanan üşmeklerde, suwda we kenarýakada ýykylan gyrymsylarda, seýrek agaçlaryň üstünde koloniýa bolup höwürtlegeýärler. Höwürtgese ösümlik sypallaryndan örülen ýarymşar pisintli. 2-8, köplenç 3-5 sany agymtyl ýumurtgalary goýýar. Ýaşlary iýulyň aýagynda uçurym bolýar. Iýmiti maýda balyklar, seýrek ownuk ýerde-suwda ýaşayanlar ýa-da suw oňurgasyzlary.

Statusy: ýurduň günbatarynda az sanly, günortasynda we gündo-

каплевидными белыми пятнышками и зеленоватым отливом. Голова и большая часть шеи бурые или рыжевато-бурые. В брачный период голова и шея черные с редкими белыми перьями, клюв и ноги – черные. Молодые птицы более светлые, буроватые, часто с белесым брюшком и светлым горлом. Голос – каркающий, ворчащий. Крыло самцов – 19.8-20, самок – 18.5-20.5 см, вес – 900-1000 г.

Сходства – различия: от большого баклана отличается мелкими размерами и отсутствием голы кожи вокруг клюва.

Распространение: Юго-Восточная Европа, Передняя и Средняя Азия и Южный Казахстан. В Туркменистане, в основном, Сарыкамыш и Амударья, в последние годы также Каракумдарья, Мургаб, Теджен, предгорья Копетдага, заметно меньше по Этреку.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся и зимующая птица. Весной – в конце марта-апреле, осенний – в сентябре-ноябре. Местообитания как у большого баклана. Гнездование в мае-июле. Гнездится колониально на заламах тростника, прибрежных и растущих в воде кустах, реже на деревьях. Гнездо из обломков растений полушаровидной формы. В кладке от 2 до 8, чаще 3-5 беловатых яиц. Молодые становятся летными в конце июля. Рацион питания, в основном, мелкая рыба, редко мелкие земноводные или водные беспозвоночные.

Статус: немногочисленный вид на западе, обычный в южных и восточных частях страны. Численность колеблется, в отдельные годы ста-

garynynda – adaty görnüş. Sany üýtgeýär, aýry-aýry ýyllarda köpsanly, aýratyn-da güýz-guş döwürlerinde, käbir ýerlerde örän köpsanly (Amyderýada).

LEGLEKŞEKILLILER – CICONIIFORMES – АИСТООБРАЗНЫЕ

Uzyn aýakly, çüňkli we boýunly, orta we uly ölçegdäki guşlar otrýady. Ganatlary inli we kütek uçly. Giň ýaýran, tropik ýurtlarda dürlüligi has ýokary. Koloniýa, seýrek ýekebara bolup, höwürtegeleýär. Mäkiýany we horazy kürk boilup oturýar. Etene çagaly ösüş häsiýetli. Haýwan iýmitini iýýär. Jemi 6 maşgaladan 115 görnüşden durýar, 3 maşgalanyň wekilleri Türkmenistanda gabat gelýär.

Нокгарлар – Ardeidae – Цаплевые

Uzyndan göni çüňkli guşlar maşgalasy. Kenaryakalarynyň jeňňelli we açyk kenarly suw ýataklarynda ýa-da yzgary ýerlerde ýaşaýar. Haýal uçýar. Agaçlaryň ýa-da gamyş sypallarynyň üşmekleriniň üstünde koloniýa bolup höwürtegeleýär. Dünýäde 62 görnüş, şolaryň 7-si Türkmenistanda

12. Накгеý – Botaurus stellaris – Большая выпь

Meýdan alamatlary: uzyn dan deşli çüňkli, başgalara garanynda, gysga aýakly uly nokgar. Kellesi uly, -**boýny ýogyn**. Ýelekleriniň **üsti ýagty tegmilli gara-çyppak reňkli**. Aşaky tarapy **çyppak dik garamtyl tegmilli**. Aýaklary we çüňki ýaşylymytl-sary. Ganatlary kese çyppak zolakly garamtyl. Guýrugynyň aşagy agymtyl. Ýaşlary ulularyndan tapawutlanmaýar. Sesi basyk “gümpüldeme”, guş bu sesi höwürtegeleýän döwüründe yzly-

новится многочисленным, особенно, в осенне-зимний период, а местами (Амударья) даже очень многочисленным.

Отряд птиц средних и крупных размеров с длинными ногами, клювом и шеей. Крылья широкие, тупые. Распространены широко, наиболее разнообразны в тропиках. Гнездятся колониально, редко одиночно. Насиживают самка и самец. Тип развития птенцовый. Употребляют животные корма. Всего 6 семейств – 115 видов, из которых в Туркменистане встречаются представители 3-х семейств.

Семейство птиц с прямым длинным клювом. Обитатели прибрежных зарослей и открытых берегов водоемов, или сырых участков. Полет медленный. Гнездятся в основном колониями на деревьях или зарослях тростника. В мире 62 вида, 7 из которых в Туркменистане.

Полевые признаки: крупная, сравнительно коротконогая цапля с длинным массивным клювом. Голова сравнительно большая, **шея толстая**. Оперение **сверху чернорыжее со светлыми пестринами**. Низ **рыжеватый с продольными темными пестринами**. Ноги и клюв зеленовато-желтые. Крылья черноватые с поперечными рыжими полосами. Подхвостье беловатое. Молодые не отличаются от взрослых. Голос глухой, как бы «бу-

yzyna birnäçe gezek, adatça, gijesine gaýtalayar. Galan döwürde guşuň gödek “kau” sesini eşitmek mümkin. Ganaty – 300-350 mm, horazlarynyň agramy, ortaça, 960, mäkiýanlarynyňky – 860 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: zyra-zyra çyppak reňki bilen nokgarlaryň ählisinden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropa, Aziýa, Afrika. Orta Aziýanyň peslikleriniň hemme ýerlerinde gabat gelýär. Türkmenistanda – Sarygamyşda, Amyderýanyň, Garagum, Murgap, Tejen, Etrek derýalarynyň jülgelerinde duşýar.

Ýaşaýşy: höwürtegeleýär, uçup geçýär we guşlaýar, olaryň bir böleginiň oturymly bolmagy mümkin. Gamyşlyk suw ýakalarynda ýaşaýar. Adatça, kenaryakada gezyýär. Aýratyn jübüt bolup höwürtegeleýär. Höwürtegesi ýerde. 3-6 sany topraksypat-çal reňkli ýumurtgalary goýýar. Gizlin gezyýär, gijesine işjeň, gündizine seýrek görünýär. Howp abananda gymyldaman durýar. Balyk, şeýle hem gurbaga, itbalyklary we suw oňurgasyzlyry bilen iýmitlenýär.

Statusy: uçup geçende adaty, höwürtegelände – seýrek guş, aw ähmiýeti we balykçylyk hojalygy üçin zuýany ýok.

13. Gögebakar – Ixobrychus minutus – Малая выпь

Meýdan alamatlary: nokgarlaryň arasynda iň maýdasy, kepderiden kiçi. **Bedeniniň üsti ýaşyl öwüşginli gara reňke boýalan**. Kellesiniň üsti gara, boýny we döşi çyppak. Gapdallary we boýnunyň yzky tarapy çal. Garnynyň aşagy agymtyl. **Döşüniň gapdallarynyň guralary çyppak**

хающий», который птица в гнездовой период издает несколько раз подряд, обычно в ночное время. В небрачный период можно слышать грубое «кау». Крыло – 300-350 мм, вес самцов, в среднем - 960 г, самок – 860 г.

Сходства – отличия: от всех цапель отличается рыжеватой рябой окраской.

Распространение: Европа, Азия, Африка. В Средней Азии встречается всюду по низменностям. В Туркменистане – на Сарыкамыше, по долинам Амударья, Каракумдарья, Мургаба, Теджена, Этрека.

Образ жизни: гнездится, пролетает и зимует, возможно часть особей оседла. Населяет водоемы с зарослями тростника. Держится обычно по берегам. Гнездится отдельными парами. Гнездо на земле. Кладка из 3-6 яиц землянисто-серого цвета. Держится скрытно, активна ночью, на глаза попадает редко. При опасности затаивается. Питается рыбой, а также лягушками, их головастиками и водными беспозвоночными.

Статус: на пролете обычная птица, на гнездовье – редка, охотничьего интереса, отрицательного значения для рыбного хозяйства не представляет.

Полевые признаки: самая мелкая из цапель, телом меньше голубя. **Верх тела окрашен в черный цвет с зеленым отливом**. Голова сверху черная, шея и грудь рыжеватые. Бока и задняя сторона шеи серые. Брюшко беловатое. **По бокам груди длинные пучки краснова-**

gyzgyt - goňur uzyn ýelek desse-li. Ganatlary gülgüne-sary gara uçly. Guýrugy çuparrak-goňur. Çünki ýaşylymytyl. Barmaklary uzyn. Ýaş guşlar mäkiýanyňa çalymdaş. Çünki sary, aýaklary ýaşylrak-sary. Howp abananda boýnuny we çüňküni ýokaryk süýndürüp gymyldaman durýar. Ýeňillik bilen, hat-da gür jeňňellikden ýokary galýar, ýöne basym ýere gonýar. Ganatlaryny ýugy-ýugydan kakyp, çalt uçýar. **Gamyş baldaklaryna ussatlyk bilen dýrmaşýar.** Ýazyna horazynyň sesi basyk, bölekleyin “pumb...pumb”, galan wagty ýitiden pert – “ke-ke-ke”. Ganaty – 140-150, söbügi – 45-48, çünki – 47-50 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň has kiçidigi bilen beýleki hokgarlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeýän bölegi – Günorta we Orta Ýewropa, Gazagystan, Günbatar Sibiriň günortasy, Orta we Alynky Aziýa, Demirgazyk Hindistan, Afrikanýň günorta bölegi, Günorta-Gündogar Awstraliýa. Orta Aziýanyň ähli peslik böleginde ýaýran. Türkmenistanda – derýalaryň jülgelerinde we Sarygamyşda duşýar. Ondan daşary, dag derýajyklarynyň amatly bolan ýerlerinde hem ýaşaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän-höwürtlegeýän guş. Ýazyna mart-aprelde, güzüne – sentýabr-oktyabrda uçup geçýär. Ýekelikde, gizlin gezýär we gündizine seýrek görünüär. Gyrymsyly we gamyşly jeňňelligi halaýar. Aýratyn jübüt bolup höwürtlegeýär. Höwürtesini gyşaryp ösen gamyşlaryň, gyrymsylaryň ýa-da agaçlaryň üstünde, ýöne elmydama pes boýly bolanlarynda gurýar. Ol daşky görnüşi boýunça beýleki hokgarlaryň höwürtesine çalymdaş, ýöne kiçi. 4-5

то-бурых с рыжеватыми краями перьев. Крылья розовато-желтые с черным концом. Хвост рыжевато-бурый. Клюв зеленоватый. Пальцы длинные. Молодая птица похожа на самку. Клюв желтый, ноги зелено-желтые. При опасности затаивается, вытянув вертикально шею и клюв. Взлетает легко, даже в густых зарослях, но вскоре садится. Полет быстрый с частыми взмахами крыльев. **Прекрасно лазает по ветвям и стеблям тростника.** Голос самца весной – глухое, отрывистое «пумб...пумб», в другое время – резкое «ке-ке-ке». Крыло – 140-150, цевка – 45-48, клюв – 47-50 мм.

Сходства – отличия: от других цапель отличается **очень мелкими размерами.**

Распространение: гнездовая часть ареала – Южная и Средняя Европа, Казахстан, юг Западной Сибири, Средняя и Передняя Азия, Северная Индия, южная половина Африки, Юго-Восточная Австралия. В Средней Азии населяет всю низменную часть. В Туркменистане долины рек и Сарыкамыш. Кроме того, обитает в подходящих местах по горным речкам.

Образ жизни: пролетно-гнездящаяся птица. Весенний пролет – в марте-апреле, осенний – в сентябре-октябре. Держится скрытно, поодиночке и сравнительно редко попадает на глаза. Предпочитает кустарниковые и камышовые заросли. Гнездится отдельными парами. Гнездо – на согнутых стеблях тростника, либо на кустах или даже на деревьях, но всегда низко над землей. По форме похоже на гнезда других цапель, но мельче.

sany бүдүр-сүдир gabykly öçügsi ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 23-27 x 32-39 mm. Apreliň soňunda-may aýynda jüýjeleýär. Olar alagaraňkyda we gijelerine işjeň gezýärler. Maýda balyjaklary, gurbagalary, mörmöjekleri iýýär.

Statusy: adaty guş, aw guşy hasaplanýar, ýöne seýrek awlanýar.

14. Kawguş – *Nycticorax nycticorax* – Кваква

Meýdan alamatlary: gargadan sähelçe uly. **Kellesiniň üsti we egni ýaşylymytyl-gök metal öwüşginli gara. Kellesi hüpükli, olaryň 2-3 sanysy aýratyn uzyn bolup, ak reňkli lenta çalymdaş.** Ýaňaklary, boýny, arkasy we guýrugynyň üsti tüssereňk-çal. Maňlaýnyň, gaşynyň, alkymynyň, bokurdagynyň aşagy we bedeniniň aşak tarapynyň galan bölegi ak ýa-da ýeňiljek çalymytyl öwüşginli. Ganatlary we guýrugy goýu-çal. Çünki gara. Aýaklary gülgüne-goňur. Ýaş guşlaryň üsti goňur, ganatlarynyň we guýrugynyň ýelekleri çal öwüşginde we uçlary ak. Kellesi dik ak zolakly, arkasynyň ýelekleri edil şonuň ýaly zolakly we uçlary agymtyl. Aşaky tarapy ak, çupar we goýu-goňur dik çyzykly. Haýal we ýeňil uçýar. Sesi gaýtalanýan – “kwau-kwau”. Uzynlygy – 58-66, ganaty – 28-31 sm, agramy – 500-800 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: görnüşleriň bizde meňzeşi ýok, özüne mahsus reňki bilen ähli hokgarlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeýän bölegi – Günorta Ýewropa, Kiçi we Orta Aziýa, Hindistan we Günorta-Gündogar Hytaý, Malaý arhipel-

Кладка из 4-5 белых с шероховатой матовой скорлупой яиц, размеры 23-27 x 32-39 мм. Птенцы – в конце апреля-мае. Активна в сумерках и ночью. Питается мелкой рыбой, лягушками, насекомыми.

Статус: обычная птица, считается объектом охоты, но добывается редко.

Полевые признаки: немного крупнее вороны. **Верх головы и плечи черные с зеленовато-синим металлическим отливом. На голове небольшой хохол, 2-3 пера которого особенно удлинены и похожи на ленты белого цвета.** Щеки, шея, спина и надхвостье дымчато-серые. Основание лба, бровь, подбородок, горло и весь остальной низ тела – белые или с легким сероватым оттенком. Крылья и хвост темно-серые. Клюв черный. Ноги розовато-бурые. Молодая птица сверху бурая, перья крыльев и хвоста с серым оттенком и белыми концами. Голова с белыми продольными полосками, перья на спине с такими же полосками и беловатыми концами. Нижняя сторона с белыми, рыжими и черно-бурыми продольными черточками. Полет медленный, легкий. Голос – повторяющееся «квау-квау». Длина – 58-66, крыло – 28-31 см, вес – 500-800 г.

Сходства-отличия: у нас сходных видов нет, от всех цапель отличается характерной окраской.

Распространение: гнездовая часть ареала – Южная Европа, Малая и Средняя Азия, Индостан, Ин-

lagy, Afrika we Amerikanyň köp böle-
gi. Orta Aziýanyň dag giňişliklerinden
başga hemme ýerlerinde duşýar.
Türkmenistanda – Amyderýa, Gara-
gum, Murgap, Tejen, Etrek derýalary.
Günorta Amerikada, Günorta Afrika-
da, Günorta we Günorta-Gündogar
Aziýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwür-
tegeýän guş. Ýazyna apreliň orta-
syndan-may aýynda, güýzüne –
sentýabr-oktyabrda uçup geçýär.
Suw-batgalyk ýerlerde ýaşaýar. Köp-
lenç suwa golaý ösen açaçlaryň,
seýrek gamyş topbaktalarynyň üstün-
de, hokgarlaryň beýleki görnüşle-
ri we garaja gazlar bilen bilelikde
koloniýa bolup höwürtegeýär. Gijesi-
ne gezyň guş, ýöne höwürtegeýän
döwri gündizine hem çykýar. 3-5 sany
gögümtil-ýaşyl reňkli ýumurtgalary
goýýar, ölçegleri – 31-38 x 43-56 mm.
Maý aýynda jüýjeleýär. Ýalpak suw-
larda ýa-da suwda gezip pidasyny
garawullap awlaýar. Aglaba balyklar
we gurbagalar, seýrek mör-möjekler
bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty guş, aw ähmiýeti
ýok.

15. Sary hokgar – *Ardeola ralloides* – Желтая цапля

Meýdan alamatlary: kiçiräk hok-
gar. **Jübütleşme bezeginde kellesi,
gapdallary we boýnunyň yeňsesi
sary.** Boýnunyň öň tarapy, petekesi
we döşüniň gapdallary ачык-çyпар
reňkli. Kellesindäki we boýnunyň
yeňsesindäki ýelekleri insiz gara zo-
lakly. **Yeňsesi uzalan ýeleklerden
durýan hüpükli,** olaryň aklarynyň
iň uzuny garamtyl zolaga gaýalan.
Arkasy çypparrak-goňur reňkli.

докитай и Юго-Восточный Китай,
Малайский архипелаг, Африка и
большая часть Америки. В Средней
Азии распространена повсюду, за
исключением горных областей. В
Туркменистане – по крупным ре-
кам – Амударье, Каракумдарье,
Мургабу, Теджену, Этреку. Зимует
в Южной Америке, Южной Африке,
Южной и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: пролетная, гнез-
дящаяся птица. Весенний пролет
– с середины апреля - в мае, осен-
ний – в сентябре-октябре. Связана
с водно-болотными местообитани-
ями. Гнездится чаще на деревьях,
реже в тростниковых зарослях,
обычно недалеко от воды, колони-
ально совместно с другими видами
цапель, бакланами. Ночная птица,
но в гнездовое время активна и
днем. В кладке 3-5 яиц синевато-зе-
леного цвета. Размеры яиц – 31-38
x 43-56 мм. Птенцы обычно в мае.
Кормится, бродя по мелководью,
или подкарауливает добычу, стоя в
воде. Питается, преимущественно,
рыбой и лягушками, реже насеко-
мыми.

Статус: обычная птица, охотни-
чьего значения не имеет.

Полевые признаки: небольшая
цапля. **В брачном наряде голова,
бока и задняя сторона шеи жел-
тые.** Передняя сторона шеи, зоб
и бока груди ярко-рыжие. Перья
на голове и задней стороне шеи
с узкими черными полосками. **На
затылке хохол из удлиненных
перьев,** самые длинные из них бе-
лые, окаймленные черноватыми
полосками. Спина рыже-бурого

Ganatlarynyň ýokarsy sarymtyl
öwüşginli. Guýrugynyň üsti, bokur-
dagu we aşagy tutuşlygyna sarymtyl
ýokundyly. Ganatlarynyň aşagy ak.
Çünki ujuna tarap garalýan çalymtyl-
gök. Gözüniň töwregindäki ýalaňaç
deri ýaşyl. Aýaklary ачык gülgüne
reňkli. Mäkiýany ölçeginiň kiçidigi we
bezeg ýelekleriniň gowşak ösendigi
bilen tapawutlanýar. Gyşky ýelek ör-
tügünde boýnundaky ýelekleriň köp
böleginiň gyalary goýy-goňur. Ýaş
guşlaryň gyşky ýelek örtügi ululary-
na çalymdaş, ýöne arkasy dik zolakly.
Ganatlaryny seýrek kakyp, haýal
uçuşýarlar. Guş uçup barýarka ak bo-
lup görünýär. Sesi – gödek gagyldyly
gykylyk. Ganaty – 20.6-23.4, söbügi –
5.9-6.3, çüňki – 6-6.8 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: öl-
çeginiň kiçidigi, üstki taparynyň
ýeleklerinde sary reňkiň agdyklyk
edýändigigi we çüňküniň sarymtyl-
gökdügi bilen müsür hokgaryndan
tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwür-
tegeýän bölegi bölünip üzülen – Gü-
norta Ýewropada, Kiçi, Alynky we Orta
Aziýada, Merkezi we Günorta-Gündo-
gar Afrikada. Türkmenistanda – Sary-
gamyş, Etrek, Sumbar, Murgap, Tejen
derýalarynyň we Amyderýanyň käbir
ýerlerinde.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwür-
tegeýän guş. Ýazky migrasiýasy aprel-
de, güýzküsi – sentýabrda. Höwür-
gesini suw basan ýerleriň ortasyndaky
agaçlaryň, gurymsylaryň, seýrek
ýekendir-gamyşlaryň üşmekleriniň
üstünde gurýar. Beýleki hokgarlaryň
ýa-da garaja gazlaryň koloniýasynda
höwürtegeýän jübütleriň birnäçesi
ýyguygydan duşýar. Maý aýunyň
aýagynda 4-6 sany gögümtil-mawy
reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçeg-

цвета. Крылья сверху с желтоватым
оттенком. Надхвостье, горло и весь
низ белые с желтоватым налетом.
Крылья снизу белые. Клюв серо-
голубой, чернеющий к концу. Го-
лая кожа около глаз зеленая. Ноги
светло-розовые. Самка отличается
меньшими размерами и меньшим
развитием украшающих перьев. В
зимнем наряде большая часть пер-
ьев шеи с черно-бурыми краями.
Молодая птица похожа на взрос-
лую в зимнем наряде, но спина с
продольными полосками. Полет
медленный с редкими взмахами
крыльев. В полете птица кажется
белой. Голос – грубый каркающий
крик. Крыло – 20.6-23.4, цевка – 5.9-
6.3, клюв – 6-6.8 см.

Сходства – отличия: от египет-
ской цапли отличается меньшими
размерами, преобладанием желто-
го цвета в оперении верха и желто-
вато-голубым клювом.

Распространение: гнездовая
часть ареала разрознена – в Юж-
ной Европе, Малой, Передней и
Средней Азии, Центральной и Юго-
Восточной Африке. В Туркмениста-
не – местами по Этреку, Сумбару,
Мургабу, Теджену, Амударье, Сары-
камыше.

Образ жизни: пролетная, гнез-
дящаяся птица. Весенняя миграция
– в апреле, осенняя – в сентябре.
Гнездо устраивает на деревьях,
кустарниках, среди подтопленных
участков, редко на заламах трост-
ника и камыша. Часто – по не-
сколько гнезд в колониях других
цаплевых птиц или бакланов. Яйца
в количестве 4-6 синеголубого
цвета в конце мая. Размеры яиц –
27-31 x 35-41 мм. Птенцы – в июне.

leri – 27-31 x 35-41 mm. Iýunda jüýjeleýär. Mör-möjekleriň ululary, suw oňurgasyzlary, gurbagalar bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek guş, balyk hojalygyna zyýany ýok.

16. Müsür hokgary – *Bubulcus ibis* – Египетская цапля

Meýdan alamatlary: orta ölçeğ-däki hokgar. Çünki we boýny başgalara garanynda gysga, kellesi uly. Umumy reňki ak, emma **ýaz-tomus döwründe kellesindäki, döşündäki we arkasyndaky uzyn bezeg ýelekleri goňurrak-sarymtyl.** Çünki gyzyl, diňe uýy sary. Ýüzüniň ýalaňaç bölegi gögümtil-yaşyl. Gözüniň töweregindäki ýalaňaç halka gyzyl. Aýaklary goýy-gyzyl. Emma, guşyna bezeg ýelekleri ýok. Yaş guşlar arassak reňkli, diňe kellesiniň üsti goňurrak-çypar, aýaklary goňur, çünki sary uçly gara. Yeňil we haýal uçýar. Sesi basyk, gysga gagyldy sesler “korr...korr”. Ganaty – 23.3-25.7 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: arkasynyň we döşüniň reňkiniň goňurrak-sary öwürşginlidigi, aýaklarynyň gyzgyltdygy bilen kiçi ak we sary hokgarlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta-Günbatar Ýewropa, Hazar deňziniň ýakasy, Günorta we Günorta - Gündogar Aziýa we Günorta - Gündogar Awstraliýa, Saharadan başga tutuş Afrikada, Merkezi we Günorta Amerika. Türkmenistanda – käwağt Hazar kenarynda, Etrek, Tejen derýalarynyň jülgelelerinde, Merkezi Köpetdägyň dag eteklerinde duşýar.

Ýaşayşy: höwürtegeleýän guş. Suw-batgalyk ýerlerde, oazislereň käbir ýerinde ýaşýar. Aýratyn jübüt bolup, beýleki hokgarlaryň

Питаются крупными насекомыми, водными беспозвоночными, лягушками.

Статус: редкая птица, для рыбного хозяйства отрицательного значения не имеет.

Полевые признаки: цапля средних размеров. Клюв и шея сравнительно короткие, голова сравнительно большая. Общее оперение белое, но в **весенне-летний период на голове, груди и спине – украшающе длинные рассученные перья буровато-желтого цвета.** Клюв красный, а на конце желтый. Голое кольцо вокруг глаз красное. Ноги темно-красные. Но зимой украшающих перьев нет. Молодые птицы чисто-белые, только верх головы коричнево-рыжий, ноги бурые, клюв черный с желтым концом. Полет легкий, медленный. Голос – глухой, короткий каркающий звук вроде «корр...корр». Крыло – 23.3-25.7 см.

Сходства – отличия: от малой белой и желтой цапель отличается буровато-желтыми тонами в окраске спины и груди, красноватыми ногами.

Распространение: Юго-Западная Европа, Прикаспий, Южная и Юго-Восточная Азия и Юго-Восточная Австралия, вся Африка, исключая Сахару, Центральная и Южная Америка. В Туркменистане – спорадично в Прикаспии, в долине Этрека, Теджена, предгорьях Центрального Копетдага.

Образ жизни: гнездящаяся птица. Обитатель водно-болотных угодий, местами в оазисах. Гнездится

koloniyasynda (gök hokgar, kawguş, kiçi ak hokgar) höwürtegeleýär. Höwürtesini ýumşak, gury sypallardan we çybyklardan gurýar. 5-7 sany açyk mawumtyl reňkli ýumurtgalary goýýar. Maý aýynda jüýjeleýär. Suwly otluk ýerlerde, batgalyklarda iýmitlenýär. Dürli mör-möjekler, gurbagalar bilen seýrek iýmitlenýär.

Statusy: örän seýrek görünüş, balyk hojalygyna zyýany ýok.

17. Uly ak hokgar – *Casmerodius albus* – Большая белая цапля

Meýdan alamatlary: uly hokgar. **Ýelek örtügi tutuslygyna ak.** Jübütleşme bezeginde arkasynda towy goýberilen uzyn ýelekleri bolýar, olar guýrugyndan yza çykyр, bedeniniň gapdalyndan sallanýar. Bokurdagynyň öň tarapyň aşaky böleginiň ýelekleri ösgün. **Çünki sary düýpli gara, guşyna – sary.** Gözüniň töweregindäki ýalaňaç halka yaşylymtyl. Aýaklary we barmaklarynyň daş ýüzi gara, içki tarapy – sary. Ýaşlary guşky bezeginde ulularyna meňzeş. Sesi gödek we boguk gopgun. Ganaty – 41-51, söbügi – 16.5-21.2, çünki – 11.6-14 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ýelek örtügininiň akdygy bilen beýleki hokgarlardan, ölçegleriniň mese-mälim uludygy bilen kiçi ak hokgardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta Ýewropa, gündogara – Kiçi Aziýadan Gündogar Aziýa çenli, günorta – Aziýanyň tutuş günorta bölegi we Awstraliýa, Afrikanıň Sahara çölüniň günortasy, Merkezi we Günorta Amerika. Orta Aziýada Amyderýanyň aşaky akymynda, Türkmenistanda – Sarygamuşda we beýleki suw ýataklarda

отдельными парами в колонии других цапель (серая цапля, кваква, малая белая цапля). Гнездо – рыхлая постройка из тонких сухих веток и прутьев. Кладка состоит из 5-7 светлых голубоватых яиц. Птенцы обычно в мае. Кормится по лугам, болотам. Питается различными насекомыми, реже лягушками.

Статус: очень редкий вид, для рыбного хозяйства отрицательного значения не имеет.

Полевые признаки: крупная цапля. **Оперение полностью белое.** В брачном наряде длинные рассученные перья на спине, которые заходят за хвост и несколько свисают с боков тела. На нижней части шеи спереди перья удлинены. **Клюв черный с желтым основанием, зимой желтый.** Голое кольцо вокруг глаз зеленоватое. Ноги и наружная сторона пальцев черные, внутренняя сторона пальцев желтая. Молодые схожи со взрослыми в зимнем наряде. Голос – грубый и хриплый треск. Крыло – 41-51, цевка – 16.5-21.2, клюв – 11.6-14 см.

Сходства – отличия: от других цапель отличается белым оперением, а от малой белой цапли – заметными размерами.

Распространение: Южная Европа, на восток – от Малой до Восточной Азии, на юг – вся южная половина Азии и Австралия, Африка к югу от Сахары, Центральная и Южная Америка. В Средней Азии гнездится в низовьях Амударьи, в Туркменистане – на Сарыкамыше и других крупных водоемах. В

höwürtgeleýär. Suw-batgalyk ýerleriň galan ýerinde uçup geçende we gyslanda giňişleýin gabat gelyär. Höwürtgeleýän oblastlarynyň günorta böleginde gyslaýar.

Ýaşayşy: höwürtgeleýän, uçup geçýän-gyslaýan guş. Ýazyna martda, güýzüne – oktýabr-noýabrda uçup geçýär. Ýalpak suwly, gamyşlyk, jeňňelli köllerde we haýal akýan derýalarda ýa-da kenarýakasy gür ösen ösümlikli akabalarda koloniýa we aýratyn jübüt bolup höwürtgeleýär. Höwürtgesini geçen ýylky guran gamyş üýşmekleriň, seýrek beýik agaçlaryň üstünde gurýar. Aprelde 3-5 sany ýaşylymtyl-mawy ýumurtgalary goýýar. Límiti dürli – balyklar, gurbagalar, maýda gemrijiler we suwulganlar, dürli möjekler.

Statusy: höwürtgeleýän döwüründe az sanly, uçup geçende we gyslanda adaty, Amyderýanyň käbir ýerlerinde köp sanly.

18. Kiçi ak hokgar – *Egretta garzetta* – Малая белая цапля

Meýdan alamaty: uly ak hokgardan takmynan iki esse kiçi. Ýelek örtügi arassa ak. **Ýeňsesinde ýaz döwri iki sany uzyn ýelegi, arkasynda – uzyn insiz towy sökülen ýeleklere bolýar**, olar mäkiýanynda has gowşak ösen. Petekesindeki we eginlerindeki ýeleklere ösgün. Çünki gara, diňe düýbi sary. Üstki çüňküniň düýbündäki ýalaňaç deri mawumtyl (ýaş guşlarda). Aýaklary gara, barklary ýaşylymtyl-sary. Ýaşlarynyň uzyn bezeg ýeleklere ýok. Uçuşy uly hokgarlara garanynda has çalt. Gykylykçy, sesi gagyldyly – “ark-ark-ark”. Ganaty – 26.5-30, söbügi – 8.7-11.3, çüňki – 7.8-9.2 sm.

остальных водно-болотных местобитаниях встречается повсеместно на пролетах и зимовке. Зимуют в южных частях гнездовой области.

Образ жизни: гнездящаяся, пролетная и зимующая птица. Весной пролетает в марте, осенью – в октябре-ноябре. Гнездится колониями и отдельными парами по мелководным, заросшим тростником озерам и медленно текущим рекам или протокам с густой прибрежной растительностью. Гнездо – на заломах прошлогоднего тростника, реже на высоких деревьях. Кладка – в апреле, состоит из 3-5 зеленовато-голубых яиц. Пища разнообразна – рыбы, лягушки, мелкие грызуны и ящерицы, различные беспозвоночные.

Статус: на гнездовье немногочисленна, на пролете и зимовке обычна, а по Амударье местами многочисленна.

Полевые признаки: почти вдвое мельче большой белой цапли. Оперение чисто белое. **В весенний период на затылке – два удлиненных пера, а на спине – узкие, длинные рассученные перья**, у самок они развиваются значительно меньше. Перья на зобе и плечах удлинены. Клюв черный, лишь у основания желтый. Голая кожа в основании надклювья – голубоватая (у молодых – желтая). Ноги черные, пальцы зеленовато-желтые. Молодые не имеют длинных украшающих перьев. Полет более торопливый, чем у крупных цапель. Криклива, голос – каркающее «арк-

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ýelek örtügiňiň akdygy bilen beýleki hokgarlardan, ölçegleriniň mese-mälim kiçidigi bilen uly ak hokgardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta Ýewropa, Kiçi, Orta, Günorta, Günorta-Gündogar Aziýa, Gündogar Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Afrika (Sahara çölünden başga). Orta Aziýada we Türkmenistanda – derýalaryň jülgelelerinde we Köpetdagiň eteklerinde duşýar. Höwürtgeleýän oblastlarynyň çäginde, yöne Günorta Ýewropadan we Orta Aziýadan günortarağa uçup geçip gyslaýar.

Ýaşayşy: höwürtgeleýän, bir bölegi gyslaýan guş. Ýazyna martyň ortasyndan apreliň aýagyna, güýzüne – oktýabr-noýabrda uçup geçýär. Kölleriň we onuň akabalarynyň kenarýakalarynda ösýän gamyşly, gyrymsyly we agaçly ýerlerde beýleki hokgarlar bilen bilelikde koloniýa bolup höwürtgeleýär. Höwürtgesini agaçlaryň, gyrymsylaryň, seýrek gamyş üýşmekleriniň üstünde, düňderilen konus görnüşde, hokgarlara mahsus görnüşde gurýar. 5-6 sany ýaşylymtyl-mawy ýumurtgalary goýýar. Ýalpak suwly kenarýakada, ekin meýdanlarynda we suw basan yzgarly ýerlerde topar bolup iýmitleňýär. Maýda balyklary, gurbagalary, mör-möjekleri iýýär.

Statusy: az sanly guş.

19. Gök hokgar – *Ardea cinerea* – Серая цапля

Meýdan alamatlary: Bizde duşýan hokgarlaryň arasynda iň ulusy. Boýny we aýaklary uzyn, çünki uly. **Bedeniniň umumy reňki açykça, boýnundaky we kellesindeki zolaklar ösgün gara hüpükli**, garny

арк-арк». Крыло – 26.5-30, цевка – 8.7-11.3, клюв – 7.8-9.2 см.

Сходства – отличия: от других цапель отличается белым оперением, а от большой белой цапли – заметно мелкими размерами.

Распространение: Южная Европа, Малая, Средняя, Южная, Юго-Восточная Азия, Восточная Австралия, Новая Зеландия, Африка, исключая Сахару. В Средней Азии и Туркменистане – в долинах рек и в предгорьях Копетдага. Зимуют в пределах гнездовых областей, но из Южной Европы и Средней Азии отлетают южнее.

Образ жизни: гнездящаяся птица, часть особей зимует. Весенний прилет – с середины марта до конца апреля, отлет – в октябре-ноябре. Гнездится колониями совместно с другими цаплями и бакланами по озерам и протокам с заросшими тростником берегами, с кустарниками и группами деревьев. Гнездо – на деревьях, высоких кустарниках, реже на тростниковых заломах, типичной для цапель формы в виде перевернутого конуса. Кладка из 5-6 зеленовато-голубых яиц. Кормятся группами по мелководьям или на берегу, полях и лугах. Питаются мелкой рыбой, лягушками, насекомыми.

Статус: немногочисленная птица.

Полевые признаки: наиболее крупная из наших цапель. Шея и ноги длинные, большой клюв. **Окраска, в целом, светло-серая, полосы на шее и голове и удлиненный хохол черные**, брюхо белое.

ak. Gözleri sary. Cüňki we aýaklary sarymtyl-goňur. Agaçlaryň ýa-da kert gaýalaryň bar ýerlerinde gonýar. Ümsüm. Gykylygy, adatyça uçup barýarka eşidilýär – garyllyk we gödek “krrryank”. Bedeni - 90-96, ganaty – 43-49, ganatlarynyň gerimi – 175-195 sm, agramy – 1-2.1 kg.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: beýleki hokgarlardan umumy reňkiniň açyk-çaldygy bilen tapawutlanýar. Uçup barýarka boýnunyň egriliginiň S harp görnüşdedigi bilen durnalardan we legleklerden anyk tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewraziýa (taýga we tundradan başgalary) we Afrika (Sahara çölünden başgalary). Orta Aziýada we Türkmenistanda derýalaryň jülgelerinde we suwbatgalyk ýerlerde. Arealynyň demirgazyk böleginden guşlar Ortaýer deňzinde, Kawkazda, Kiçi, Alynky Aziýada, Orta we Günorta Aziýanyň günortasynda, şeýle hem Afrikada, oturymly guşlar bilen bilelikde gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup gelyän-gyşlaýan we bölekleyin höwürtleýän guş. Ýazyna martda, güýzüne – sentýabr-oktyabrda uçup geçýär. Suw howdanlaryň ulularynda (Sarygamyş we başg.) ýekebara ýa-da kiçiräk koloniýa bolup, gamyşlyk, jeňňelli ýerde ösen agaçlaryň ýa-da ýylgynlaryň üstünde höwürtleýär. Höwürtleýän gelşiksiz we konusşekilli uly. Aprelde 3-5 sany ýaşylymtyl-gök ýumurtgalary goýýar. Iýunda jüyjeleri çykýar. Kiçiräk balyklary, gurbagalary, mör-möjekleri iýýär.

Statusy: höwürtleýän döwründe az sanly, gyşlaýan döwründe, aýratyn-da uçup geçende adaty.

Глаза желтые. Клюв и ноги желто-бурые. При наличии деревьев или высоких обрывов охотно садится на них. Молчалива. Крик – хрипкое и грубое «кррррянк», обычно в полете. Тело – 90-96, крыло – 43-49, размах крыльев – 175-195 см, вес – 1-2.1 кг.

Сходства – отличия: от других цапель отличается общей светло-серой окраской. От журавлей и аистов в полете хорошо отличается изгибом шеи в виде буквы S.

Распространение: широкое – Евразия (кроме тайги и тундр) и Африка (кроме Сахары). В Средней Азии и Туркменистане по долинам рек и водно-болотным угодьям. Птицы из северных частей ареала зимуют в Средиземноморье, на Кавказе, Малой, Передней, на юге Средней и в Южной Азии, а также Африке, вместе с оседлыми особями.

Образ жизни: пролетная, зимующая и частично гнездящаяся птица. Весенний пролет в марте, осенний – в сентябре-октябре. Гнездятся у крупных водоемов (Сарыкамыш и др.) одиночно или небольшими колониями на деревьях (туранга) или кустах гребенщика, в тростниковых зарослях. Гнездо рыхлое и крупное, конусообразное. Кладка в апреле, состоит из 3-5 зеленовато-голубых яиц. Молодые в июне. Питается, как и другие цапли, небольшой рыбой, лягушками, насекомыми.

Статус: на гнездовье немногочисленна, на зимовке и, особенно на пролете обычна.

20. Çypar hokgar – *Ardea purpurea* – Рыжая цапля

Meýdan alamatlary: barmaklary, boýny örän uzyn we inçelen çüňkli, beden gurluşy gelşikli bolan uly hokgar. **Üsti gök, aşaky tarapy çypar, boýny hem çypar, yöne dik gara zolakly.** Hüpügininiň deregine iki sany uzyn sapakşekilli ýelekleri bolýar. Gözleri sary. Çüňki we aýaklary sarymtyl-goňur. Sesi edil gök hokgaryňky ýaly, yöne beter gaty däl. Bedeni - 78-90, ganatlarynyň gerimi – 120-150 sm, agramy – 0.57-1.47 kg.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: uly ak hokgardan ölçegleri ulurak, yöne gök hokgardan maýda, döşüniň, boýnunyň we kellesiniň çypar reňki boýunça beýleki hokgarlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi Günorta we Günorta-Gündogar Ýewropany, Ortaýer deňzini, Kiçi, Alynky, Orta, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýany, Merkezi, Gündogar we Günorta Afrikany öz içine alýar. Orta Aziýada we Türkmenistanda giň meýdanly suwbatgalyk ýerlerde, uçup geçende ýaýraň duşýar. Guşlaryň köp bölegi Afrikada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtleýän, käbir ýyllarda bölekleyin gyşlaýan görnüş. Ýazyna martda, güýzüne – oktyabr-noýabrda uçup geçýär. Ösümlige baý bolan suw howdanlarda höwürtleýär. Höwürtleýän edil gök hokgaryňky ýaly – gelşiksiz, konusşekilli, esasan, gamyş küdeleriniň we ýylgynlaryň üstünde, yöne agaçlaryň üstünde däl. Adatyça, 4-5 sany ýaşylymtyl-gök ýumurtgalary goýýar. Iýmiti – maýda balyklar, gurbagalar, suw ýulanlary,

Полевые признаки: крупная цапля изящного телосложения, с очень длинными пальцами, шеей и утонченным клювом. **Сверху серая, снизу рыжая, шея тоже рыжая, но с черными продольными полосами.** Вместо хохолка – два длинных нитеобразных пера. Глаза желтые. Клюв и ноги желтовато-бурые. Голос как у серой цапли, но не столь громкий. Тело – 78-90, размах крыльев – 120-150 см, вес – 0.57-1.47 кг.

Сходства – отличия: размерами крупнее большой белой, но мельче серой, по цвету от других цапель отличается рыжей окраской груди, шеи и головы. На деревья, как серая цапля, не садится.

Распространение: гнездовая часть ареала охватывает Южную и Юго-Восточную Европу, Средиземноморье, Малую, Переднюю, Среднюю, Восточную и Юго-Восточную Азию, Центральную, Восточную и Южную Африку. В Средней Азии и Туркменистане – по крупным водно-болотным угодьям, на пролете шире. Зимует большей частью в Африке.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся вид, частично, в отдельные годы зимующий. Весной пролетает в марте, осенью – в октябре-ноябре. Гнездится по водоемам с богатой прибрежной растительностью. Гнездо как у серой цапли – рыхлое конусовидное, в основном на заломах тростника и в гребенщике, не на деревьях. В гнезде, обычно, 4-5 зеленовато-голубых яиц. Питание – мелкая рыба, лягушки, водяные

maýda gemrijiler, mör-möjekler.

Statusy: höwürtegeleýän döwüründe az sanly, uçup geçende adaty, ýöne uly ak we gök hokgarlardan seýrek.

Gamaburunlylar – *Ibididae* – Ибисовые

Çünki uzyn, göni we giňelen uçly ýa-da aşaklygyna egmek guşlar maşgalasy. Adatça kellesiniň bir bölegi, käte boýny açyk reňke boýalan. Agaçlaryň ýa-da gaýalaryň ýa-da suw ýataklaryň we batgalyklaryň kenarларында ösýän gamyşlaryň üstünde koloniýa bolup höwürtegeleýär. Jemi 32 görnüş, şolaryň 2-si Türkmenistanda.

21. Kaşykburun – *Platalea leucorodia* – Колпица

Meýdan alamatlary: uzyn aýakly we boýunly uly guş. **Ýelek örtügi ak, diňe depesindäki hüpügi we petekesindäki tegmili açyk çypar reňkli.** Alkymy we çüňküniň düýbüniň töweregindäki halka ýalaňaç, sary reňkli. **Çüňki uzyn, ýasy, uju giňelen kepje görnüşli.** Gyşda onuň kellesinde hüpük bolmaýar. Ýaş guşlarda hem hüpük ýok. Ganatlarynyň uçlary gara, çünki çalymtyl. Ümsüm gezyär, onuň hüňürdili sesi, diňe höwürtgäniň golaýynda eşidilýär. Ganaty – 37-41 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çüňküniň görnüşiniň aýratynlygy bilen hokgarlardan, durnalardan we legleklerden tapawutlanýar.

Ýayran ýerleri: arealynda höwürtegeleýän oblastlary aýry-aýry bölekli – Günorta we Günorta-Gündogar Ýewropa, Orta, Merkezi we Gündogar Aziýanyň günorta-gündogary, Hindistan we Afrikanyň demirgazyk-gündogar çetleri. Türkmenistanda

ужи, мелкие грызуны, насекомые.

Статус: на гнездовье немногочисленна, на пролете обычна, но реже большой белой и серой цапель.

Семейство птиц с длинным клювом, прямым и расширенным на конце, или изогнутым книзу. Часть головы, иногда и шея, обычно ярко окрашены. Гнездятся колонияльно, на деревьях или скалах, или в тростнике по берегам водоемов и болот. Всего 32 вида, из них в Туркменистане 2 вида.

Полевые признаки: крупная птица с длинными ногами и шеей. **Оперение белое, только хохол на затылке и пятно на зобе светло-рыжие.** Подбородок и кольцо вокруг основания клюва голые, желтого цвета. **Клюв длинный, плоский, расширенный на конце в виде лопатки.** Зимой на голове нет хохла. У молодых птиц хохол также отсутствует. Концы крыльев черные, клюв сероватый. Молчаливая птица, ее голос, напоминающий ворчание, слышен только у гнезд. Крыло – 37-41 см.

Сходства – отличия: от цапель, журавлей и аистов отличается характерной формой клюва.

Распространение: в гнездовой области ареала пятнистое – Южная и Юго-Восточная Европа, юго-восток Средней, Центральная и Восточная Азия, Индостан и крайний северо-восток Африки. В Туркменистане на пролете тяготеет к доли-

– uçup geçende derýa jülgelerine, Hazaryň kenaryna ýakyn çekilýär. Günorta-Gündogar Hytaýda, Hindistanda, Pars aýlagynyň gündogar kenarynda, Gyzyly we Ortaýer deňizleriniň günbatarynda, Nil derýasynyň jülgesinde gyşlaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän guş, höwürtegelemegi hem mümkin. Ýazky migrasiýasy dowamly fewral-martdan maý aýyna, güýzküsi – sentýabr-oktyabr aýlarynda. Uly köllerde we suw akan ýerlerde ýaşaýar. Höwürtegesi gamyşlaryň arasynda, seýrek agajyň üstünde; hokgarlar, garaja gazlar, gamaburunlar bilen bilelikde koloniýa bolup höwürtegeleýär. 3-5 sany goňur menekli ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 58-75 x 41-45 mm. Adatça, iýunda jüýjeleýär. Suwda gezyän dürli jandarlary – maýda balyklary, mör-möjekleri we olaryň içinkalaryny, balykgulaklary, leňneçleri iýýär. Ýygy-ýygudan gurbagalary, seýrek – suwulganlary tutýar.

Statusy: seýrek görnüş, Türkmenistanyň Gyzyly kitabyna girizilen.

22. Gamaburun – *Plegadis falcinellus* – Каравайка

Meýdan alamatlary: uly garaga ölçegli, uzyn aýakly guş. Uzyn **çüňküniň uju aşaklygyna egmek.** Jübütleşme bezeginde, ýazyna, bedeniniň üstki tarapy metal öwürgünde poslurak - goňras - goňur reňke boýalan. Guýrugynyň aşagy gara. Çünki we kellesiniň ýalaňaç bölegi (gözünüň töweregindäki halka we alkymy) ýaşylymtyl-goňurak. Aýaklary ýaşylymtyl-gara. Bedeniniň aşagy gyzylyt-goňurak. Kellesi we boýnunyň üstki böleginiň ýelekleri gyşky örtükde ak gaýmaly

нам рек, каспийскому побережью. Зимует в Юго-Восточном Китае, Индии, по восточному побережью Персидского залива, западному Красного и южному Средиземного моря, в долине Нила.

Образ жизни: пролетная птица, не исключено, что у нас гнездится. Весенняя миграция – растянута с февраля-марта по май, осенняя – в сентябре-октябре. Обитает по крупным озерам и разливам. Гнезда – в зарослях тростника, реже на деревьях. Гнездится колониями, часто совместно с цаплями, бакланами, каравайками. В кладке 3-5 белых с коричневыми пятнами яиц. Размеры 58-75 x 41-45 мм. Птенцы обычно в июне. Питается разнообразными водными животными – мелкой рыбой, насекомыми и их личинками, моллюсками, рачками. Нередко ловит лягушек, иногда ящериц.

Статус: редкий вид, внесен в Красную книгу Туркменистана.

Полевые признаки: размером с крупную ворону на высоких ногах. **Длинный клюв изогнут книзу.** Весной в брачном наряде окрашена в ржаво-каштаново-бурый цвет с металлическим отливом верхней стороны. Подхвостье черное. Клюв и голые части головы (кольцо вокруг глаз и подбородок) зеленовато-буроватые. Ноги зеленовато-черные. Низ тела красновато-коричневый. В зимнем наряде голова и верхняя часть шеи землисто-бурые с белыми каемками

toprakpisint-goňur. Ýaş guşlaryň guşky ýelek örtüginde metal öwüşgini has gowşak ösen. Sesi – boguk, basyk owaz. Ganaty – 26.4-30.6, söbügi – 8.5-10.3, çünki – 10-14.5 sm, agramy – 530-768 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: häsiýetli goýy-goňur reňki bilen tapawutlanýar. Ululygy we sypaty uly ýylkuça çalymdaşlyk edýär, ýöne ondan garamtyl-goňras reňkli. Uçýan wagty kütäk ganatlydyklary bilen tapawutlanýar.

Ýayran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi tegmilleyin – Günorta Ýewropa, Kiçi, Alynky we Orta Aziýa, Hindistanyň we Hindi-Hytaýyň demirgazyk bölegi, Awstraliýa, Merkezi we Günorta-Gündogar Afrikanyň käbir ýerlerinde, Demirgazyk we Merkezi Amerikanyň günorta-gündogar kenarynda. Orta Aziýada we Türkmenistanda – uly derýalaryň jülgelerinde we köllerde, Hazaryň kenarynda duşýar. Höwürtleýän ýerleriniň çäginde, Ýewropadan başgasynda, Günorta-Günbatar we Orta Aziýada, ol ýerden günortaraga uçup gidip guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, käbir ýerlerde höwürtleýän guş. Ýazynda mart-maýda, güzüne – sentýabrda uçup geçýär. Aprel-maý aýlarynda höwürtleýär. Baýy döwlen gamuş üşmeklerinde, agaçlarda, jeňňelli ýerlerde, köplenç hokgarlar, garaja gazlar bilen bilelikde koloniýa bolup höwürtleýär. 3-5 sany açyk-mawy reňkli yumurtgalary goýýar, ölçegleri – 33-58 mm. Adatça, kiçiräk süri bolup gezýär. Ýalpak suwly gyrmançaly ýerlerde iýmitlenýär. Suwdaky mörmöjekleri, balykgulaklary, itbalyklary, maýda gurbagajyklary we balyklaryň liçinkalaryny iýýär.

перьев. У молодой птицы в зимнем оперении металлический блеск развит еще меньше. Голос – хриплый, глухой звук. Крыло – 26.4-30.6, цевка – 8.5-10.3, клюв – 10-14.5 см, вес 530-768 г.

Сходства – отличия: отличается характерной темно-коричневой окраской. Величиной и сложением напоминает большого кроншнепа, но отличается от него темной окраской, а в полете еще и тупыми крыльями.

Распространение: гнездовая часть ареала пятнистая – Южная Европа, Малая, Передняя и Средняя Азия, северные части Индостана и Индокитая, Австралия, местами в Центральной и Юго-Восточной Африке, юго-восточное побережье Северной и Центральная Америка. В Средней Азии и Туркменистане – по крупным речным долинам и озерам, каспийское побережье. Зимуют в пределах гнездовых областей, за исключением Европы, Юго-Западной и Средней Азии, откуда отлетают южнее.

Образ жизни: пролетная, у нас местами гнездящаяся птица. Весенний пролет – в марте-мае, осенью – в сентябре. Гнездование в апреле-мае. Может гнездиться на заломах тростника, деревьях, в тугаях, колониями, часто совместно с цаплями, бакланами. Кладка из 3-5 ярко-голубых яиц, размеры – 33-58 мм. Держатся обычно небольшими стаями. Кормятся по илистым мелководьям. Питание – водные насекомые, моллюски, головастики, мелкие лягушки и мальки рыб.

Статус: немногочисленная, на пролете местами обычная птица,

Statusy: az sanly, käbir ýerde uçup oхотничьего значения не имеет. geçende adaty guş, aw ähmiýeti ýok.

Leglekler – Ciconiidae – Аистовые

Çünki ýeterlik daýaw, göni we uzalan ýa-da sähelçe ýokarlygyna ýa-da aşaklygyna egmek guşlar maşgalasy. Ganatlary inli we uzyn. Görnüşleriniň köpüsi sessiz (mysal üçin, ak leglek), ýöne çünklerini biri-birine urup, şarkyldy sesleri çykarýarlar. Agaçlaryň ýa-da adamyň guran desgalarynyň üstünde höwürtleýärler. Höwürtleýänlerinden soň ýygy-ýygdydan süra toplanýarlar. Jemi 17 görnüş, şolaryň 2-si Türkmenistanda.

23. Ak leglek – Ciconia ciconia – Белый аист

Meýdan alamatlary: uzyn aýakly uzalan çünki uly guş. Boýny uzyn. Ýelek örtügi aglaba ak. **Ganatlarynyň uçlary ýalpyldyly, gara. Çünki we aýaklary gyzyl.** Gözüniň töweregindeki ýalaňaç deri we alkymynyň öňki bölegi gara. Mäkiýany horazyndan biraz kiçiräk, ýöne reňkleri boýunça tapawutlanmaýarlar. Ýaş guşlar ulularyna çalymdaş, ýöne gara öwüşgini goňurrak, eginlerindeki çalymtly ýokundy güýçlüräk ösen. Çünki we aýaklary goýy-goňur. Ümsüm. Ganaty – 55-60 sm, agramy – 4 kg golaý.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: özüni alyp barsy we uçuşy bilen gara leglege çalymdaşlyk edýär, ýöne onuň reňki ak; ganatlaryndaky ikinji tertipdeki pelpelleyji ýelekleriniň garadygy bilen ak durnadan tapawutlanýar.

Ýayran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi – Merkezi we Günorta Ýewropa, Zakawkazýe, Kiçi, Alynky Aziýa we Orta Aziýanyň günorta-gündogary, Afrikanyň demirgazyk-günbatar çetleri we günortasy. Hindistan

Семейство птиц с достаточно мощным клювом, прямым и удлиненным, или слегка загнутым верху, или книзу. Крылья широкие и длинные. Большинство видов (например, белый аист) безголоты, но издают трескучие звуки, щелкая клювом. Гнезда на деревьях или строениях человека. После гнездования часто собираются в стаи. Всего 17 видов, из них в Туркменистане – 2 вида.

Полевые признаки: крупная птица с удлиненным клювом, на высоких ногах. Шея длинная. Оперение преимущественно белое. **Концы крыльев блестящие, черные. Клюв и ноги красные.** Голая кожа вокруг глаз и передняя часть подбородка черные. Самки несколько меньше самцов. Молодые птицы похожи на взрослых, но черный тон с буроватым оттенком, на плечах сероватый налет развит сильнее. Клюв и ноги темно-бурые. Молчалив. Крыло – 55-60 см, вес – около 4 кг.

Сходства – отличия: повадками и полетом похож на черного аиста, но отличается белой окраской; а от белого журавля – черными второстепенными маховыми перьями крыла.

Распространение: гнездовая часть ареала – Центральная и Южная Европа, Закавказье, Малая, Передняя и юго-восток Средней Азии, крайние северо-запад и юг Африки.

da, Merkezi we Günorta-Gündogar Afrikada gyslaýar. Türkmenistanda Amyderýanyň orta akymyda, Murgap, Tejen, Etrek we Sumbar derýalarynyň aşagy akymларында duşmagy ahmal.

Ýaşayşy: uçup geçýän, bizde döwürde höwürtgelän guş. Ýazyna mart-aprelde, güýzüne – sentýabr - oktýabrda uçup geçýär. Gurbagalary, itbalyklary, balyklary, mörmöjekleri, balykgulaklary, süýrenijileri, ýumurtgalary we jüýjeleri, maýda gemrijileri – syçanlary, alakalary, şeýlede beýleki guşlaryň ýumurtgalaryny iýýär.

Statusy: bizde örän seýrek, Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizmäge mynasyp guş.

24. Gara leglek – *Ciconia nigra* – Черный аист

Meýdan alamatlary: ölçegi we daşky görnüşi ak leglege çalymdaş, ýöne has gelsikli. Uly guşlaryň **kellesi, boýny, petekesi, bedeniniň üstki tarapy we guýrugy goýy-ýaşyl we gyzylymtyl - gök metal ýalpyldyly gara.** Döşi, garny, guýrugynyň, ganatlarynyň aşagy ak. **Gözüniň töweregindäki ýalaňaç halka, çünki we aýaklary gyzyt.** Ýaşlarynyň ýelek örtügininiň metal ýalpyldysy gowşak ösen. Kellesi, boýny, döşi, ganatlarynyň üsti we guýrugynyň aşagy alabeder, ýagty menekler bilen bezelen. Çünki we aýaklary çalymtyl-goňur-ýaşylymtyl. Uçup barýan guşuň umumy keşbi – ganatlary inli, uzyn aýaklary yza gönelen, boýny öňe süýnmek. Sesi pessaýja owazlar – “çe-li” ýa-da “çi-lii”. Ganaty – 52-60 sm, agramy – 3 kg golaý.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: häsiýeti we uçuşy ak leglege çalymdaş,

Зимуют в Индостане, Центральной и Юго-Восточной Африке. В Туркменистане не исключены встречи на средней Амударье и в низовьях Этрека (была попытка гнездиться), Сумбара, Мургаба, Теджена.

Образ жизни: пролетная, в прошлом гнездящаяся у нас птица. Весенний пролет – в марте-апреле, осенний – в сентябре-октябре. Питается лягушками, головастиками, рыбой, насекомыми, моллюсками, пресмыкающимися, их яйцами, мелкими грызунами – мышами, крысами, а также яйцами и птенцами других птиц.

Статус: очень редкая у нас птица, рекомендуется для занесения в Красную книгу Туркменистана.

Полевые признаки: размером и обликом как белый аист, но выглядит стройнее. У взрослой птицы **голова, шея, зоб, верхняя сторона тела и хвост черные с темно-зеленым и красновато-фиолетовым металлическим блеском.** Грудь, брюхо, подхвостье, испод крыла белые. **Голое кольцо вокруг глаз, клюв и ноги красные.** У молодых металлический блеск в оперении развит слабо. Голова, шея, грудь, крылья сверху и подхвостье испещрены светлыми крапинками. Клюв и ноги серо-буро-зеленые. Общий облик летящей птицы – широкие крылья, откиннутые назад длинные ноги, шея вытянута. Голос – негромкие звуки «че-ли» или «чи-ли». Крыло – 52-60 см, вес – около 3 кг.

Сходства – отличия: поведением и полетом похож на белого

ýöne kellesiniň, boýnunyň, arkasynyň we guýrugynyň gara reňki bilen tapawutlanýar.

Ýayran ýerleri: arealynda höwürtgelýän bölegi tegmilleyin – Ýewropa, esasan-da Merkezi we Gündogar, Günorta-Gündogar Gazagystan, Günorta Sibir, Baýkalaňrýsy, Kiçi, Alynky, Merkezi we Gündogar Aziýa, Orta Aziýanyň günortasy. Merkezi Aziýada – daglyklar. Türkmenistanda Köpetdagda, Bathyzda we Köýtendagda höwürtgelýär. Uçup geçişi giňişleýin – derýalaryň jülgeleri we dag etekleri.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtgelýän we gyslaýan guş. Dagda barmasy kyn bolan ýerlerde, esasan, gaýalarda we beýik agaçlarda höwürtgelýär. Höwürtgesi uly we ýyrtyjy guşlaryňky ýaly gelsiksiz. Maý-iyunda 3-5 sany kirliräk-ak reňkli ýumurtgalary goýýar. Köplenç balyk bilen iýmitlenýär. Iýmit gözlegine uçan guşlaryň dag eteklerinde gabat gelmegi mümkin.

Statusy: seýrek görnüş, Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizilen. Köpetdag we Köýtendag döwlet goraghanalarynyň guşlarynyň iň täsin wekilleriniň biri.

GYZYLGAZŞEKILLILER – PHOENICOPTERIFORMES – ФЛАМИНГООБРАЗНЫЕ

Suw - batgalyk guşlar otrýady. Uly ölçegli (göwresi gaz ýaly), boýny we aýaklary uzyn. Söbügi injigin-den iki esse diýen ýaly uzyn, öňki üç barmagyň aralary ýüzgüç perdeli, yzky barmagy örän ujypsyz ýa-da düybünden ýok. Kellesi kiçiräk, çünki daýaw we ýognan dyzpisint egmek, gazşekilliler ýaly süzgüç abzally. Ýelek örtügi ýumşak, reňki ýaşuna


аиста, но отличается черной окраской головы, шеи, спины и хвоста.

Распространение: гнездовая часть ареала пятнистая – Европа, в основном, Центральная и Восточная, Юго-Восточный Казахстан, Южная Сибирь, Забайкалье, Малая, Передняя, юг Средней, Центральная и Восточная Азия. В Средней Азии – горные части. В Туркменистане гнездится в Копетдаге, Бадхызе и Койтендаге. На пролете – шире – по долинам рек и предгорьям.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся и зимующая птица. Гнездится в горах в недоступных местах, в основном на скалах и деревьях. Гнездо массивное и грубое как у хищных птиц. Яйца грязно-белого цвета в количестве 3-5 в мае-июне. Питается, преимущественно, рыбой. На кормовых вылетах может попадаться и в предгорьях.

Статус: редкий вид, внесен в Красную книгу Туркменистана. Один из наиболее интересных представителей птиц Койтендагского и Копетдагского государственных заповедников.

Отряд водно-болотных птиц. Размеры крупные (туловище размером с гуся), шея и ноги длинные. Цевка длиннее голени почти в два раза, три передних пальца соединены плавательной перепонкой, задний редуцирован или отсутствует совсем. Голова небольшая, клюв массивно-утолщенный коленно-изогнутый, с цедильным



Guşlaryň uçup barýarka görnüşi: 1 – durna; 2 – hokgar; 3 – gamaburun; 4 – ak leglek; 5 – gyzyl gaz; 6 – kaşykburun; 7 – gara leglek.

Птицы в полете: 1 - журавль; 2 - цапля; 3 - каравайка; 4 - белый аист; 5 - фламинго; 6 - колпица; 7 - черный аист.

bagly. Dünýä faunasynnda bir maşgala (*Phoenicopteridae*), 6 görnüş, Ýewropada, Aziýada, Afrikada we Amerikada ýaýran. Türkmenistanda 1 görnüş.

аппаратом как у гусеобразных. Оперение рыхлое, цвет зависит от возраста. В мировой фауне одно семейство (*Phoenicopteridae*) с 6 видами, распространенные в Европе, Азии, Африке и Америке. В Туркменистане – 1 вид.

25. Gyzyl gaz – *Phoenicopus roseus* – Обыкновенный фламинго

Meýdan alamatlary: aýaklary we boýny örän uzyn, kellesi kiçi, ýogyn egmek häsiýetli bolan çünki guş. Ulularynyň ýelekörtügi, pelpelleýiş ýelekleriniň gara reňkine ters gelyän agymtyl-gülgüne öwürgini bilen tapawutlanýar. Uçan wagty ganatlary gyzyl-gülgüne bolup görünýär. Aýaklary, çünküniň düýbi, gözünüň töweregindäki deri örtügi gülgüne. Çünküniň ujy gara, gözleri sary. Ýaş guşlar (üç ýaşyna çenli) kirliräk-çal ya-da goňurrak-çal, guýrugy – çetki ýelekleri garamtyl zolakly ak. Çünki we aýaklary goýuçal ýa-da gara diýen ýaly. Ulularynyň boýnunyň beýikligi 1,5 m geçýär. Ganaty – 43.5-49 sm, horazlarynyň agramy – 3.9-4.4, mäkiýanlarynyňky – 1.9-2.4 kg.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: görnüşleriň meňzeşi ýok, häsiýetli alamaty, aýratyn-da çünki we reňki bilen aňsat tanalýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän oblastlary dürli-dürli: Ortaýer deňzi, Günbatar, Gündogar we Günorta Afrika, Merkezi Amerika, Alynky Aziýa we Merkezi Gazagystan. Uçup geçişi giňişleýin. Ýewraziýanyň we Afrikanyň köp raýonlarynda duşýar. Gyşlaýan ýerleri hem bölünen – Afrikanyň we Arabystanyň kenarýakalary, Merkezi Amerika, Hindistan. Türkmenistanda, köplenç, Hazaryň kenarýakasynnda

Полевые признаки: высоко-рослая птица с очень длинными ногами и шеей, небольшой головой и толстым клювом с характерным изгибом. Оперение взрослых беловато-розовое различных оттенков, контрастирующее с черными маховыми перьями. Крылья в полете выглядят красно-розовыми. Ноги в основании, кожа вокруг глаз розовые. Конец клюва черный, глаза желтые. Молодые птицы (до трех лет) грязновато-серые или буровато-серые, хвост белый с темной полосой по краю. Клюв и ноги темно-серые или почти черные. В высоту взрослые самцы превышают 1,5 м. Крыло – 43.5-49 см, вес самцов – 3.9-4.4, самок – 1.9-2.4 кг.

Сходства – отличия: сходных видов нет, легко отличаются характерным строением, особенно клювом и окраской.

Распространение: гнездовая область мозаична: Средиземноморье, в Западной, Восточной и Южной Африке, Центральной Америке, Передняя Азия и Центральный Казахстан. На пролете – шире, во многих районах Евразии и Африки. Места зимовок также разорваны – на побережьях Африки и Аравии, Центральной Америки, Индостана. В Туркменистане, преимущественно

we seýrek içki suw ýataklarynda saklanýar.

Ýaşaýsy: uçup geçýän, käte uçup gezyän we gyşlaýan guş. Ýazyna martmaý aýlarynda uçup geçýär, uçup gezyänleri – iýun-awgustda gabat gelýär. Güýzüne – sentýabr-noýabrda uçup geçýär. Hazar deňziniň ýalpak suwly ýerlerinde durnukly ýaşaýar, çendenaşa sowuk ýyllarda olar ýene-de gaýdyp geler ýaly günorta tarap göçýärler. Maýda suw oňurgasyzlary bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty, käbir döwürlerde gyş sany kesgitli üýtgeýän köpsanly görnüş, Türkmenistanyň Gyzyt kitabynda girizilen. Hazar döwlet goraghanasynyň iň täsin görnüşleriniň biri we onuň nyşany hasap edilýär.

GAZŞEKILLILER – ANSERIFORMES – ГУСЕОБРАЗНЫЕ

Ýaşaýsynyň köp bölegi suw ýataklary bilen baglanyşykly guşlaryň uly otrýady. Olara häsiýetli – guwlar, gazlar, ördekler. Guşlar maýuşgak ýelek örtüklü bolup, onuň aşa gynda dykyz sütük ýelekleri ýerleşýär. Reňki, aglaba boýaglaryň özgeren garşylykly reňkleriniň görnüşleri. Ölçepleri boýunça, esasan, orta we uly, boýny başgalara garanynda uzyn we aýaklary gysga, olaryň öňki barmaklarynyň arasy ýüzgüç perdesi bilen birleşýär. Çünki, düzgün bolşy ýaly, gysgalan we ýokarsyndan aşaklygyna basylan, onuň gyralarynyň içki tarapy suwy süzmäge gatnaşýan köpsanly gyllygynjyklar bilen örtülen. Kenarýakalarynyň jeňňelli ýa-da ýalpak suwly dürli suw ýataklaryň giňişliklerinde ýaşaýarlar we oňat ýüzýärler. Kenarýakalarynyň jeňňel-

но, на побережье Каспия и реке на внутренних водоемах.

Образ жизни: пролетная и зимующая, изредка летующая птица. Весенний пролет в марте-мае, летующие – в июне-августе. Осенью – в сентябре-ноябре. В обычные зимы встречаются на мелководьях Каспия постоянно, в экстремально холодные наблюдаются их откочевки еще южнее с последующими возвращениями. Питаются мелкими водными беспозвоночными.

Статус: обычный, в некоторые зимы многочисленный вид с резкими колебаниями численности, внесен в Красную книгу Туркменистана. Является одним из наиболее интересных видов и символом Хазарского государственного заповедника.

Обширный отряд птиц, связанных большей частью с водоемами. Облик характерный – лебединый, гусиный, утиный. Оперение упругое, под перьевым покровом плотный пуховой покров. Окраска чаще контрастная с различными цветовыми вариациями. По размерам, в основном среднего и крупного, с относительно длинной шеей и короткими лапами, передние пальцы которых соединены плавательными перепонками. Клюв, как правило, укорочен и уплощен сверху вниз, края его покрыты изнутри многочисленными щетиночками, служащими для процеживания воды. Населяют берега различных водоемов с прибрежными зарослями или открытие мелководья, хорошо плавают. Гнездятся по берегам в

liklerde ýa-da gös-göni kenarda höwürtegeleýär. Jüýjeleri ýumurtgadan çykanlaryndan soň ulularyň gözegçiliginde höwürtgäni taşlaýarlar. Ösümlük we haywan iýmiti bilen iýmitlenýärler. Kontinentleriň (Antarktidadan başga) hemmesinde ýaýran, görnüşleriň köpüsi möwsümleýin uçup gitmäni amala aşyrýar. Dünýäde 160 görnüş, şolaryň 33-si Türkmenistanda, olar ördekler (*Anatidae*) maşgalasyna degişli: guwlar, gazlar, ala ördekler, derýa ördekleri, tüňňele ördekler, jüptün ördekler we gorçy ördekler aşaky maşgalalaryna bölünýär.

Guwlar – Cygninae – Лебединые

Ganatlary inli we uzyn, boýny inçeden uzyn örän uly guşlar. Horazlary reňki boýunça mäkiýanlaryndan tapawutlanmaýar, yöne sähelçe ulurak. Uly guşlaryň ýelek örtügininiň reňki ak, ýaşlarynyňky – kirliräk-çal, ýa-da goňurrak. Suwuň yüzünden ylgap, bat alyp ýokary galýar. Ganatlaryny haýal kakyp, agyryk bilen göni uçýarlar. Höwürtegeleýän döwründe jübüt we jüýjeleri bilen, güýz-gyş möwsümde – topar we süri bolup gezyärler.

26. Tauty (gyzylçunk guw) – *Cygnus olor* – Лебедь-шипун

Meýdan alamatlary: Gazdan biraz tokarrak uly guş. Ýaşy ýetenleri arassa ak reňkli. Horazy mäkiýandan **üstki çüňküniň düýbündäki gara uly ösüntgisi bilen tapawutlanýar, ol mäkiýanynda anyk görünmeýär.** Çünki tutuşlygyna gyzyt, diňe üstki çüňküniň gyralary, burun deşiginiň töweregi we çünki bilen gözünüň arasyndaky ýalaňaç ýeri gara. Gözleri goýy goňur, aýaklary gara. Ýaşlary

зарослях или непосредственно на берегу. Птенцы после вылупления покидают гнездо в сопровождении взрослых. Питаются растительной и животной пищей. Распространены по всем континентами (за исключением Антарктиды), большинство видов совершает сезонные перелеты. В мире 160 видов, в Туркменистане – 33, относящиеся к семейству утиные (*Anatidae*), которое состоит из подсемейств (или родов, по мнению некоторых ученых) – лебединые, гусиные, пеганковые, речные утки, нырковые утки, крохалиные и савковые.

Очень крупные птицы с широкими и удлиненными крыльями и длинной тонкой шеей. Самцы по окраске не отличаются от самок, но несколько крупнее. Оперение взрослых птиц белое, молодых – грязно-серое или буроватое. С воды взлетают с длинным разбегом. Полет прямой, тяжелый с медленными взмахами. В гнездовое время держатся парами и выводками, в осенне-зимнее – группами и стаями.

Полевые признаки: крупная птица несколько больше гуся. Взрослые особи чисто белые. Самец отличается от самки **большим черным выростом (шишкой) в основании надклювья, который у самки менее заметен.** Клюв в целом красный, только края надклювья, область ноздрей и голый участок между клювом и глазом черные. Глаза темно-карие, ноги

çalymtyl-goňur, garyn tarapy arkasyndan agymtylrak, boýny göwresinden ýagty reňkli. Ganatlarynyň ujy çalymtyl, guýrugy külreňk-çal, ýöne uçlary ak reňkli bolýar. Çünki goňur, aýaklary gyzyl. Ümsüm, howp abananda gaty hyşyldy ses edýär. Uzynlygy – 150-ä golaý, ganaty – 57 sm, agramy – 8-13 kg.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: sohradan biraz ulurak, ululary gyzyl çünkli, ýaşlary – çünküniň düýbünüň garadygy bilen beýleki guwlardan tapawutlanýar. **Sohradan tapawutlylykda boýnuny S-şekilli egreldýär, guýrugy mese-mälim uzynrak, çünküni we kellesini suwuň üstünde kese saklaýar.** Boýny sohraňkydan ýogyndygy üçin, ol has gysga ýaly bolup görünýär. Suwda oturan tautynyň arkasynyň keşbi burçlurak, sohranyňky – tegelegräk görünýär.

Ýaýran ýerleri: endigan däl – Ýewraziýa, Günbatar, Merkezi we Günorta-Gündogar Ýewropada, Gazagystanda, Günbatar Sibiriň günortasynda, ýek-tük Merkezi Aziýada höwürtegeleýär. Orta Aziýanyň günortasynda we ondan-da günortarakda – Pars aýlagynyň kenarynda gyslaýar. Demirgazyk Amerikada, Günorta Afrikada, Awstraliýada akklimatizirlenen - ýaşamaga öwrenişdirilen. Türkmenistanda, esasan, Hazar deňziniň kenaryakasynda, ýek-tük içki suwlarda duşýar.


Ýaşayşy: uçup geçýän-gyşlaýan, seýrek höwürtegeleýän görnüş. Höwürtelemek üçin ösgün suwotuly, çöldäki uzakda ýerleşen suw ýataklarynda (Sarygamyş, Jarsay) saklanýar, uçup geçende we gyşlaýan wagty giňişleýin duşýar – Hazar deňziniň aýlaglarynda we içki uly suw

черные. Молодые серовато-бурые, брюшная сторона светлее спинной, шея – светлее туловища. Концы крыльев сероватые, хвост дымчато-серый, но на конце белого цвета. Клюв бурый, ноги красные. Молчалив, при угрозе издает громкое шипение. Длина – около 150, крыло – 57 см, вес – 8-13 кг.

Сходства – отличия: несколько крупнее лебедя-кликунa, от других лебедей взрослые отличаются красным клювом, молодые – черным основанием клюва. **В отличие от кликуна шею изгибает S-образно, хвост заметно длиннее, клюв и голову держит наклонно к поверхности воды.** Шея толще и поэтому кажется более короткой, чем у кликуна. У сидящего на воде шипуна контур спины угловатый, у кликуна – округлый.

Распространение: неравномерное – в Евразии, гнездится в Западной, Центральной и Юго-Восточной Европе, Казахстане, юге Западной Сибири, частично в Центральной Азии. Зимовки на юге Средней Азии и еще южнее – на побережье Персидского залива. Акклиматизирован в Северной Америке, Южной Африке, Австралии. В Туркменистане в основном на побережье Каспия, частично на внутренних водоемах.

Образ жизни: пролетный, зимующий, единично гнездящийся вид. На гнездовье предпочитает заросшие водной растительностью, удаленные в пустыне внутренние водоемы (Сарыкамыш, Джарсай), на пролете и зимовке шире – заливы на побережье Каспия и крупные внутренние водоемы. Пары



Guşlaryň uçup barýarka görnüşi: 1 – sohra; 2 – tauty; 3 – uly sakar gaz; 4 – gyzyl petekeli ýogla; 5 – kösükpşint gaz; 6 – aňk; 7 – ala gaz; 8 – guba gaz.
Птицы в полете: 1 - лебедь-кликун; 2 - лебедь-шипун; 3 - белолобый гусь; 4 - краснозобая казарка; 5 - гуменник; 6 - огарь; 7 - пеганка; 8 - серый гусь.

ýataklarynda. Guşlar jübütligini ömürlik saklaýar. Höwürtesini gamyş baldaklaryndan toplanan üşmeklerde, suwda ýüzýän galyň gamyş dykynlarynda, çüýrän gamyş üşmekleriniň üstünde gurýar. 7-9 sany kirliräk-gögümtil ýa-da çalymtyl-ýaşyl reňkli ýumurtgalary goýýar. Esasy iýmiti – suw ösümlükleriniň pudaklary, kökleri we kökbaldaklary, olary kellesini we boýnuny suwa çümdürip, çünki bilen suwotlary goparyp alýar.

Statusy: ýaz-tomus aýlarynda seýrek we güýz-gyşda – adaty görünüş, edil beýleki guwlar ýaly keramatly guş hasaplanýar, gözelligi ähmiýetli. Hazar we Sarygamyş çäkli goraghanasynyň nyşany hasaplanylýar. Guşlary awlamak gadagan.

27. Kiçi, ýa-da tundra guwy – *Cygnus columbianus (bewickii)* – Малый, или тундровый лебедь

Meýdan alamatlary: guwlaryň arasynda iň maýdasy. Ululary arassa ak reňkli. Jynsny anyk tapawutlandyryjy alamaty ýok, ýöne mäkiýany horazyndan biraz kiçi. **Çünki gara, onuň düýbünüň gapdallary, burun deşiklerine ýetmeýän sary tegmil-i.** Gözleri goýy goňur, aýaklary gara. Ýaş guşlaryň bedeniniň üstki tarapy külreňk-çal, kellesiniň gapdallary we boýnunyň yzky bölegi – goňur, galan ýelek örtügi ak. Çünki we aýaklary sarymtyl ýa-da goňurrak. Sesi sohranyňky ýaly, ýöne basygrak. Uzynlygy (süýnen boýny bilen) – 120, ganaty – 55 sm, ganatlarynyň gerimi – 200 sm çenli, agramy – 6 kg.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň anyk kiçidigi, boýnunyň göwresine bolan gatnaşygynyň gysgadygy, kellesiniň togalagrak görnüşdedigi (sohranyňky süýnmek

могут сохраняться всю жизнь. Гнезда устраиваются на камыше, сплавинах, кучах отмерших стеблей. В кладке – 7-9 яиц грязно-голубого или серо-зеленого цвета. Основной корм – побеги, корни и корневища водных растений, который добывают, опуская голову и шею под воду, выдергивая клювом.

Статус: редкий в весенне-летнее и обычный в осенне-зимнее время вид, как и другие виды лебедей, является священным, имеет огромное эстетическое значение. Считается знаковым видом Хазарского заповедника и Сарыкамышского заказника. Охота запрещена.

Полевые признаки: самый мелкий из лебедей. Взрослые особи чисто белые. Отчетливые половые различия отсутствуют, но самки несколько меньше самцов. **Клюв черный, по бокам его основания – желтые пятна, не достигающие до ноздрей.** Глаза темно-карие, ноги черные. У молодых птиц верхняя сторона тела дымчато-серая, бока головы и задняя часть шеи – бурые, остальное оперение белое. Клюв и ноги желтоватые или коричневатые. Голос как у кликуна, но приглушен. Длина (с вытянутой шеей) достигает 120, крыло – 55, размах крыльев – до 200 см, вес – 6 кг.

Сходства – отличия: от лебедей-кликуна отличается заметно меньшими размерами, шея, по отношению ко всему туловищу, короче, голова более округлой формы (у

bilen sohradan tapawutlanýar; kiçi guwuň çüňküniň düýbündäki sary tegmil burun deşiklerine ýetmän gönüburç bolup tamamlanýar, sohrada ol toýnuk görnüşinde burnunyň yzyna geçýär, ýöne bu alamat guşlaryň diňe bir ýaşyna çenli bolan döwri üçin häsiýetli bolýar. Kiçi guw sohra bilen deňeşdirilende has beýik ses äheňli we hoş owazly.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän oblastlary Ýewraziýanyň we Demirgazyk Amerikanyň tundra zolagyny öz içine alýar. Ýewropada höwürtegeleýär, adatyça Angliýanyň kenarýakasynda guşlaýar, Aziýada – Ýaponiýada we Gündogar Hytaýda höwürtegeleýär. Orta Aziýada we Türkmenistanda (Hazar deňzinde we içki howdanlarda) guşyna selçeň gabat gelyär.

Ýaşayşy: uçup geçýän, seýrek guşlaýan guş. Güýzüne noýabrda uçup gelyär, Hazaryň kenarýakasynda duşýar, olaryň içki suw ýataklarynda gabat gelmekleri hem ahmal, fewralmarta uçup gidýär. Esasy iýmiti – suwasty we suwüsti ösümlükler.

Statusy: örän seýrek, bizde öwrenilmedik görünüş, onuň duş gelmegi baradaky islendik maglumat uly ylmy gyzyklanma döredýär. Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizmege mynasyp guş.

28. Sohra (sykylykçu guw) – *Cygnus cygnus* – Лебедь-кликун

Meýdan alamatlary: tautydan ölçegleri boýunça kiçi. Ýelek örtügi ak, dykyz. Bedeni süýnmek, boýny göni, göwresiniň uzynlygy bilen deň. Adatyça, ganatlary göwresine berk gysylan we gapdalyndan arkasy tegelegräk görnüşde bolýar. Çünki kellesiniň uzynlygyna deň, göni, inli, öňki ujy

кликун – вытянутая); **желтое пятно в основании клюва** у малого лебеда не доходя до ноздрей **заканчивается под прямым углом**, у кликуна заходит за ноздри **в виде клина** (этот признак заметен только у птиц в возрасте старше года). Голос малого лебеда отличается более высокими тонами и большей мелодичностью, по сравнению с кликуном.

Распространение: область гнездования охватывает зону тундры Евразии и Северной Америки. Гнездящиеся в Европе, зимуют обычно у берегов Англии, гнездящиеся в Азии – в Японии и Восточном Китае. В Средней Азии и Туркменистане зимой – единичные особи на Каспии и внутренних водоемах.

Образ жизни: пролетная, частично зимующая птица. Осенью появляется в ноябре, изредка попадает на побережье Каспия, не исключены встречи на внутренних водоемах, отлетает в феврале-марте. Основной корм – подводная и надводная растительность.

Статус: очень редкий, у нас не изученный вид, любая информация о встречах представляет большой научный интерес. Рекомендуются для занесения в Красную книгу Туркменистана.

Полевые признаки: по размерам меньше лебеда-шипунa. Оперение белое, густое. Тело вытянутое, шея прямая, по длине равна туловищу. Крылья обычно плотно прижаты к телу и спина в профиль имеет округлые очертания. Клюв по длине равен голове, прямой, ши-

tegelenen, **çykyntgysyz. Onuň uçly böleginiň reňki gara, galan ýeri, burny bilen bilelikde sary.** Gözleri goňur, aýaklary gara, gysga we daýaw, has yza tarap süýşen. Ýaşlarynyň arka tarapy küleňk-çal, garny – ak. Kelle-si we boýny açyk-goňur, çüňküniň düýbi goňurrak-gyzyl, aýaklary çalymytyl-gyzgyt. Sesi – turbadan çykýan ýaly gaty. Uzynlygy (boýny süýndürilende) 150, ganaty – 60, ganatlarynyň gerimi – 250 sm çenli, agramy – 12 kg çenli.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: boýnuny göni saklamak endigi, çüňküniň düýbünüň sarydygy bilen tautydan, ölçegleriniň has uludygy bilen kiçi guwdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewraziýanyň demirgazyk böleginde, tundra zolagynyň demirgazyk böleginden başgasynda, giňişleýin höwürtegeýär. Günbatar we Günorta-Gündogar Ýewropanyň kenaryakasynda, Ýaponiýada we Gündogar Hytaýda, şeýle-de Hazar deňzinde we Orta Aziýanyň günortasyndaky suw ýataklarynda, Türkmenistanda – deňziň kenaryakasynda, ýek-tük içki suw ýataklarynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: Uçup geçip gidýän we gyşlaýan guş. Güýzüne oktýabr-noýabrda uçup geçýär, fewral-martda uçup gidýär. Jübütlik häsiýeti köp ýyllaryň dowamynda saklanýar. Ösümlik, şeýle-de haýwan iýmiti bilen iýmitlenýär, suwda ösýän ösümlikleriň kökbaldaklaryny we suwotularyň ýaşyl böleklerini hemde dürli maýda suw oňurgasyzlary çöpleýär.

Statusy: az sanly görnüş, gyşlanda yzygiderli duşýar, aýratyn-da Hazar deňziniň kenaryakasynda, beýleki guwlar ýaly gözellig ähmiýetli, awlamak gadagan.

рокий, спереди округлый, **без нароста. Вершинная его часть черная, остальная, включая ноздри, желтая.** Глаза карие, ноги черные, короткие и массивные, отнесены далеко назад. У молодых спинная сторона дымчато-серая, брюшная – белая. Голова и шея светло-бурые, основание клюва буровато-красное, ноги серовато-красные. Голос громкий трубный. Длина (с вытянутой шеей) – 150, крыло – 60, размах крыльев – до 250 см, вес – до 12 кг.

Сходства – различия: от лебедя-шипунa отличается манерой держать шею прямо, желтым основанием клюва, от малого – более крупными размерами.

Распространение: гнездится широко в северной половине Евразии, исключая северные части зоны тундры. Зимует на побережье Западной и Юго-Восточной Европы, в Японии и Восточном Китае, а также на Каспии и водоемах юга Средней Азии. В Туркменистане – морское побережье, частично внутренние водоемы.

Образ жизни: пролетная и зимующая птица. Осенний пролет – в октябре-ноябре, отлетают в феврале-марте. Пары сохраняются в течение многих лет. Питаются как растительной, так и животной пищей, поедают корневища и зеленые части водных растений и различных мелких водных беспозвоночных.

Статус: не многочисленный вид, регулярно встречается на зимовке, особенно на побережье Каспийского моря, как и другие лебеди, имеет огромное эстетическое значение, охота запрещена.

Gazlar – Anserinae – Гусиные

Öý gazlary ýaly orta we uly ölçegli guşlaryň aşaky maşgalasy. Ol gazlary, petekeli suwda üýzýän, ýöne köplenç suwda däl-de, gury ýerde gezyän guşlara degişli ördekleri özünde jemleýär. Bedeni dykyz gurluşly guşlar. Ganatlary başgalara garanyňda uzyn, inli, boýny orta uzynlykda. Reňkinde jyns we möwsümleýin dimorfizm ýok, mäkiýany horazyndan maýda. Suwda oturanda guşlaryň keşbi ördekler bilen deňeşdirilende ýokarda görünüär. Uçup gezyärler we ýerde aňsatlyk bilen hereket edýärler. Esasan, ösümlik bilen iýmitlenýär (suwotularyň we suwýaka ösümlikleriň pudaklary, ýaz otlary, ýabany we däneli ösümlikleriň ösüntgileri).

Подсемейство птиц среднего и крупного размеров, с домашнего гуся. Включает в себя гусей и казарок, относящихся также к водоплавающим птицам, но держащихся больше на суше, чем на воде. В целом сложены плотно. Крылья сравнительно длинные, широкие, шея умеренной длины. Половой и сезонный диморфизм в окраске отсутствует, самки мельче самцов. Поза сидящей на воде птицы, по сравнению с утками, высокая. Летают и передвигаются по земле легко. В основном растительноядные (зеленые побеги водной и околводной растительности, эфемеры, всходы диких и культурных злаков).

29. Kösökpsint gaz – Anser fabalis – Гуменник

Meýdan alamatlary: uly gaz, ýöne guba gazdan maýda. Ulularynyň reňklerinde tapawut ýok. **Kellesi, boýny we göwresiniň üstki tarapy goňur.** Pilçe böleginiň ýelek örtügi has ýagty we arkasynyňky garamtylrak. Petekesi we döşi açyk-çal, garny we guýrugynyň düýbi ak. Göwresiniň gapdallary ak kese zolakly goňurrak. Ganatlary goňur, guýrugy has garamtyl. Çüňki başgalara garanyňda daýaw we uzyn, ortarasy mämişi ýada gyzylymytyl tegmilli gara. Aýaklarynyň reňki sarydan gyzyla çenli üýtgeýär. Ýaşlarynyň reňki ulularyna çalymdaş, ýöne has tutuksy. Garny goňurrak maýda menejikler bilen örtülen, çalymytyl-ak, gapdallary ýagty zolakсыz. Sesi – guba gazyň sesine örän çalymdaş. Uzynlygy 90-a golaý, ganaty – 50, ganatlarynyň gerimi –

Полевые признаки: крупный гусь, но меньше серого гуся. Различий в окраске взрослых нет. **Голова, шея и верхняя сторона туловища бурые.** Оперение более светлое в области лопаток и темнее на спине. Зоб и грудь светло-серые, брюхо и основание хвоста – белые. Бока туловища буроватые с белыми поперечными полосами. Крылья бурые, хвост более темный. Клюв относительно массивный и длинный, черный с оранжевыми или красноватыми пятнами посередине. Цвет ног варьирует от желтого до красноватого. Окраска молодых похожа на взрослых, но более тусклая. Брюхо серовато-белое, покрытое мелкими буроватыми пятнами, светлых полос на боках нет. Голос сильно похож на голос серого гуся.

160 sm, agramy – 3-4 kg.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: **çüň-künüň iki reňklidigi** - sarymtyl-mämişi çüňk öňi zolagynyň garydygy, kel-lesiniň (göwresinden garamtylrak) we boýnunyň garamtyl reňklidigi bilen beýleki gazlardan tapawutlanýar. Ondan daşary – aýaklarynyň mämişi (gülgüne däl) reňki boýunça guba gazdan, maňlaýynda ak tegmiliň ýokdugy bilen uly sakar gazdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewraziýanyň demirgazyk taýga we tundra zolagynda höwürtegeleýär. Günbatar we Merkezi Ýewropada, bölekleýin Adrýatik we Gara deňizleriniň kenarýakasynda, şeýle-de Orta Aziýanyň, Gündogar Hytaýyň, Koreýanyň we Ýaponiýanyň suw ýataklarynda gýşlaýar. Türkmenistanda – Amyderýanyň käbir ýerlerinde we ýurduň beýleki suw ýataklarynda duşýar.

Ýaşayşy: bizde wagtal-wagtal gýş-laýan guş, noýabrdan mart aralygynda köllerde, suw howdanlarynda we beýleki içki suwlarda gabat gelmegi mümkin. Esasy ýumyry – gury ýer ösümlükleriň ýaşyl bölekleri we tohumlary.

Statusy: beýleki gazlar ýaly, höwesjeň awçylaryň aw guşy, bizde seýrek guş hökmünde goralmaga mynasyppdyr.

30. Uly sakar gaz – *Anser albifrons* – Белолобый гусь

Meýdan alamatlary: orta ulylykdaky gaz, kösükpisint gazdan maýda. **Üstki çüňküniň düýbi we maňlaýy ak, kellesi goňurrak-çal, olaryň arasynda araçäk-gara zolak bolýar.** Arkasy goňurrak-çal, biliniň ýelekleri has ýagty reňkli. Ganatlary we guýrugy garamtylrak-goňur, guýruk

Длина – около 90, крыло – 50, размах крыльев – 160 см, вес – 3-4 кг.

Сходства – различия: от других гусей **отличается двухцветным клювом** - черным с желто-оранжевой предвершинной полосой, темной (темнее туловища) окраской головы и шеи. Кроме того – от серого гуся отличается оранжевым (не розовым) цветом ног, а от белолобого – отсутствием белого пятна на лбу.

Распространение: гнездится в зоне северной тайги и тундры Евразии. Зимует в Западной и Центральной Европе, частично на побережье Адриатического и Черного морей, а также на водоемах Средней Азии, Восточного Китая, Кореи и Японии. В Туркменистане – местами по Амударье и некоторым водоемам восточных частей страны.

Образ жизни: у нас спорадически зимующий вид, может быть встречен с ноября по март на озерах, водохранилищах и других внутренних водоемах. Основной корм – зеленые части и семена наземных растений.

Статус: как и другие гуси – объект любительской охоты, но заслуживает охраны, как очень редкая у нас птица

Полевые признаки: гусь средней величины, меньше гуменника. **Основание надклювья и лоб белые, голова буровато-серая, между ними заметна пограничная темная полоса.** Спина буровато-серая, оперение поясницы более светлое. Крылья и хвост чер-

ные. Дөşi, гарны we guýrugynyň aşagy gara menekli açyk-çal. Çüňki gülgüne, aýaklary mämişi reňkli. Ýaşlarynyň maňlaýy ak tegmilsiz, bedeniň aşaky tarapy maýda garamtyl menekli, çüňki çalymtyl we düýbüniň töweregi ak halkasyz. Sesi edil guba we kösükpisint gazlaryňky ýaly gagyldama, ýöne has sesli. Uzynlygy – 75, ganaty – 40, ganatlarynyň gerimi – 140 sm, agramy ortaça – 2.5 kg.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: kiçi sakar gaza örän çalymdaş, tebigatda maňlaýyndaky ak tegmiliň ölçeginiň kiçidigi, **gözüniň töwreginde insiz sary halkanyň ýokdugy**, şeýle-de sesi boýunça kynlyk bilen tapawutlanýar. Guba gazdan – ganatlarynyň üstki tarapynyň garamtyldygy, kösükpisint gazdan – ölçegleriniň kiçidigi, maňlaýynyň ak tegmillidigi we garnynyň gara meneklidigi bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Demirgazyk Amerikanyň we Ýewraziýanyň, Skandinawiyadan beýleki tundra böleginde höwürtegeleýär. Günbatar we Günorta-Gündogar Ýewropanyň deňizleriniň kenarýakasynda, Dunaýda, Gara we Hazar deňizlerinde, Yrakda, Gündogar Hytaýda, Koreýada we Ýaponiýada, Demirgazyk Amerikanyň atlantik ummanyň kenarýakasynda we Meksika aýlaglarynda gýşlaýar. Orta Aziýanyň suwly ýerlerinde az sanda gýşlaýar, Türkmenistanda – Hazar deňziniň kenarýakasynda saklanýar.

Ýaşayşy: höwürtegeleýän arealyn-da tundranyň suwa ýanaşyk gury, ösgün otjumak ösümlikli ýerlerini saýlaýar. Bizde uçup geçýän we gýşlaýan guş, oktýabrda uçup gelýär, fewralda uçup gidýär. Otlaryň pudak-

новато-бурые, последний с белыми вершинами. Грудь, брюхо и подхвостье – светло-серые с черными пятнами. Клюв розоватый, ноги оранжевые. У молодых нет белого пятна на лбу, на нижней стороне тела – мелкие темные пестрины, а клюв сероватый без белого кольца вокруг основания. Голос – гоготание как у серого гуся и гуменника, но более звонкое. Длина – 75, крыло – 40, размах крыльев – 140 см, вес, в среднем – 2.5 кг.

Сходства – различия: очень похож на гуся-пискульку, в природе с трудом отличается лишь меньшим размером белого пятна на лбу, **отсутствием тонкого желтого кольца вокруг глаза**, а также голосом. От серого гуся – темным верхом крыла, от гуменника – меньшими размерами, **наличием белого пятна** на лбу и черными пятнами на брюхе.

Распространение: гнездится в тундрах Северной Америки и Евразии, исключая Скандинавию. Зимует на морских побережьях Западной и Юго-Восточной Европы, по Дунаю, на Черном и Каспийском морях, в Ираке, Восточном Китае, Кореи и Японии, на атлантическом побережье Северной Америки и в Мексиканском заливе. В небольшом числе зимует и на водоемах Средней Азии, в Туркменистане – тяготеет к побережью Каспия.

Образ жизни: в гнездовом ареале предпочитает сухие участки тундры вблизи водоемов, заросших травянистой растительностью. У нас пролетная и зимующая птица, прилетает в октябре, отлетает в феврале. Питается, преимущественно

lary we tohumlary bilen iýmittenýär.

Statusy: seýrek görnüş, beýleki gazlar ýaly höwesjeň awçylaryň aw guşy, onuň berk goraga alynmagy we aw etmek wagtynyň kesgitlenilmeği zerurdyr.

31. Kiçi sakar gaz – *Anser erythropus* – Пискулька

Meýdan alamatlary: uly sakar gazdan has kiçi ölçegli gaz. Horazy mäkiýany birmeňzeş reňki ýelek örtüklü. **Çüňküniň düýbi ak zolakly bolup, maňlaýynda tegmil döredýär, depesi örän gara. Gözüniň töweregindäki ýalaňaç deri, sähelçe “pökgeren” sarymtyl-ýaşyl reňkli. Arkasy goňurrak-çal, bili has garamtyl.** Pelpelleyji ýelekleri ak sütünli garamtyl, guýruk ýelekleri ýagty jähekli gara. Göwresiniň aşaky tarapy: petekesi, döşi we böwürleri gaýalan açyk-çal reňkli, döşi gara tegmilli, garnynyň we guýrugynyň aşaklary ak. Çüňküniň düýbi galyň sarymtyl-gülgüne. Aýaklary açyk-mämişi. Ýaşlarynyň ýelek örtügininiň reňki has öçügsi. Çüňküniň düýbi bilen maňlaýynyň arasy gara ýelekli, ak tegmili ýok. Çüňkü ulularyna garanynda gysga gülgüne-çal. Döşi garamtyl menekli çalymtyl, aýaklary çalymtyl-sary. Gagyldamasy uly sakar gazyň gagyldysyna çalymdaş, ýöne ol jynňyldyly we has beýik sesli – “kin-kin”. Uzynlygy – 60-a golaý, ganaty 35, ganatlarynyň gerimi – 130 sm, agramy – 2 kg çenli.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: uly sakar gaza örän çalymdaş, ýöne ölçegi kiçi we ganaty has ýiti uçly, maňlaýyndaky ak tegmiliň ölçegi uly we **gözüniň töweregi ýeleksiz sarymtyl insiz halkaly**, çünki özgele-

венно, побегами и семенами трав.

Статус: редкий вид, как и другие гуси, служит объектом любительской охоты, но нуждается в строгой регламентации охот.

Полевые признаки: небольшой гусь, меньше белолобого гуся. Самец и самка имеют сходную окраску оперения. **У основания клюва – белая полоса, образующая на лбу пятно, темя очень темное. Вокруг глаза кожа голая, слегка «припухшая», желто-зеленого цвета.** Спина буровато-серая, поясница более темная. Маховые темные с белыми стержнями, перья хвоста черные со светлыми каемками. Нижняя часть туловища: зоб, грудь и бока светло-серые с каемками, на груди черные пятна, брюхо и подхвостье белые. Клюв высокий у основания, желтовато-розовый. Ноги светло-оранжевые. У молодых оперение более тусклое. У основания клюва на границе со лбом черные перья, белого пятна нет. Клюв короче, чем у взрослых, розовато-серый. Грудь сероватая с темными пестринами, ноги серовато-желтые. Гоготание похоже на ритм гогота белолобого гуся, но он пискливый и более высокий – «кин-кь-кин». Длина – около 60, крыло – 35, размах крыльев – 130 см, вес – до 2 кг.

Сходства – различия: очень похож на белолобого гуся, но меньше размером и более острокрылый, на лбу белое пятно большего размера и **вокруг глаз имеется неоперен-**

re garanynda gysga.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeýän oblastlary üzňe we Ýewraziýanyň tutuş günorta böleginiň tundrasyny we tokaýtundrasyny öz içine alýar. Üzňe meýdanlarda – Günorta Angliýanyň, Gollandiýanyň, Günorta Ýewropanyň kenäýakasynada, Günorta Hazarýakada, Günorta-Gündogar Hytaýda gyslaýar. Orta Aziýada we Türkmenistanda wagtal-wagtal ýurduň dürli künjegindäki suw ýataklarynda duşýar.

Ýaşayşy: arealynda höwürtegeýän bölegi, umuman, uly sakar gazyňky ýaly. Diňe bir tundrada we tokaýtundra zolaklarynda däl, eýsem ol daglyk-taýga landşaftlarynda hem gabat gelyär. Bizde uçup geçýän-gyslaýan guş, onuň beýleki gazlar bilen bilelikde güýz-gyş döwürlerinde dürli suw ýataklarynda duş gelmeği mümkin.

Statusy: örän seýrek guş, hemme ýerde olaryň baş sany azalýar. MSOP-nyň Gyzyly sahypasyna we Türkmenistanyň Gyzyly kitabyna girizilen. Awlamak düýbünden gadagan, ýöne gynansak-da, awçylar bu gazy uly sakar we beýleki gazlar bilen bilelikde parhsyz awlaýarlar.

32. Guba gaz – *Anser anser* – Серый гусь

Meýdan alamatlary: öý gazyna çalymdaş, uly gaz, ýöne gelşikli bedenli we ölçegi sähelçe kiçi. Ýelek örtügi çalymtyl-goňur, ýöne eginleri – açyk-çal (kümüşsow-çal). Aýaklary we çüňkü daýaw gülgüne reňkli. Horazy we mäkiýany birmeňzeş reňkli, ýöne mäkiýanynyň ölçegi kiçi. Ýaşlary böwürlerindäki gowşak saýgardýan ýagty zolaklary bilen tapawutlanýar,

ное тонкое желтоватое кольцо, клюв относительно короче.

Распространение: области гнездования разобщены и охватывают южную часть тундры и лесотундры по всей Евразии. Зимует также на разобщенных участках на побережье Южной Англии, Голландии, Южной Европы, Южном Прикаспии, в Юго-Восточном Китае. В Средней Азии и Туркменистане – спорадически на водоемах в разных частях страны.

Образ жизни: гнездовая часть ареала, в целом, как у белолобого гуся. Встречается не только в тундровой и лесотундровой зонах, но и горно-таежном ландшафте. У нас – пролетная, зимующая птица, которая может быть встречена вместе другими гусями на различных водоемах в осенне-зимний период.

Статус: очень редкий вид, численность которого повсеместно сокращается. Внесен в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана. Добыча категорически запрещена, но, к сожалению, этот гусь без разбора может добываться охотниками вместе с белолобым и другими гусями.

garyn tarapy garamtyl meneksiz, umumy reňki, ulularyna garanynda bir öwüşginli. Gönümel, sürüde – kese ýa-da toýnuk görnüşde uçýarlar. Hüşgär guş. Sesi – güýçli gagyldama. Uzynlygy – 75-95, horazlarynyň ganaty – 43-52 we mäkiýanlarynyňky – 40-46, ganatlarynyň gerimi – 140-180 sm.

Meňzeşlikleri–tapawutlary: reňkiniň açyk-çaldygy bilen uly sakar we kösükpisint gazlardan tapawutlanýar. Ondan daşary – uly sakar gazdan **maňlaýynda ak we garnynda uly gara tegmiliň ýokdugy**, kösükpisint gazdan-kellesiniň birmeňzeş ýagty we **çüňküniň gülgüne reňkdedigi**, kiçi sakar gazdan **ölçeginiň has uludygy**, gözüniň töwereginde sary halkanyň (diňe ýakyn aralykdan görünüýär) we **maňlaýynda ak tegmiliň ýokdugy** bilen tapawutlanýar.

Ýaýraýn ýerleri: Ýewraziýa, Skandinawiýadan Uzak Gündogara çenli suw ýataklary boýunça demirgazyk taýgadan çöllük zolaga çenli tegmilleýin höwürtegeýär. Orta Aziýada (Türkmenistan hem goşulanda) we Aziýa kontinentiniň günorta ýarymynyň merkezi böleginde gyşlaýar. Bizde derýalaryň jülgelerindäki we çöldäki uly suwly howdanlarda, az mukdarda Hazaryň kenaryakasynda gabat gelyär.

Ýaşayşy: uçup geçýär we gyşlaýar. Ýazyna fewraldan uçup gidýär, marta uçup geçme başlanýar, güýzüne oktýabryň ortasynda uçup gelyär, ýöne ol sowugyň düşmegi bilen bagly. Suw howdanlarynda, köllerde, akundy suwlaryň ýaýran ýerlerinde topar we uly süri bolup gabat gelyär, kenaryakadaky ýalpak suwly, taşlanan we suwarymly ýerlerde iýmit toplýar.

ными светлыми полосами на боках, брюхо без темных отметин в целом окраска более монотонна, чем у взрослых. Полет прямолинейный, в стаях, в виде косой линии или клина. Осторожная птица. Голос – громкое гоготание. Длина – 75-95, крыло – 43-52 у самцов и 40-46 – у самок, размах крыльев – 140-180 см.

Сходства – различия: от белолобого гуся и гуменника, в целом, отличается светло-серой окраской. Кроме того, от белолобого гуся – **отсутствием белого пятна на лбу и больших черных отметин на брюхе**. От гуменника – светлой одноцветной головой и **розовым цветом клюва**. От пискульки – **более крупным размером**, отсутствием желтого кольца вокруг глаз (видно только вблизи) и **белого пятна на лбу**.

Распространение: Евразия, гнездится от Скандинавии до Дальнего Востока мозаично по водоемам в полосе от северной тайги до пустынь. Зимует в Средней Азии (включая Туркменистан) и центральных частях южной половины Азиатского континента. У нас на внутренних водоемах по долинам рек и в пустыне, меньше на побережье Каспия.

Образ жизни: пролетает и зимует. Весенний отлет с февраля, пролет в марте, осенью появляются с середины октября, но, в основном, с наступлением похолоданий. Встречаются в группах и больших стаях на водохранилищах, озерах, сбросных разливах, кормятся по береговому мелководью, залежам и полям. Питаются зеленой массой

Suwda we suwýakalarynda ösýän ösümlikleriň ýaşyl bölekleri, ýaz otlary bilen iýmitlenýär, ýabany we medeni däneli ösümlikleriň öslerini çokýar.

Statusy: gazlaryň arasynda gyşna baş sany boýunça adaty, käbir ýerlerde köpsanly görnüş, soňky ýyllarda sany köpeliýär. Aw guşy.

33. Bellik: Amyderýa jülgesine, gazlaryň beýleki görnüşlerinden **garaçüňk gazyň – Anser cygnoides** tötänden uçup gelendigi bellendi (2005 ý.). Garaçüňk gaz – ölçegi boýunça kösükpisint gaz ýaly, ýöne has uzyn boýunlydygy we çüňküniň garadygy, kellesiniň üstki hem-de boýununyň yzky tarapynyň reňkiniň goňurrak-melemtildigi bilen tapawutlanýar. Türkmenistana guşlaryň şeýle uçup gelmegi örän seýrek duşýar.

34. Gyzył petekeli gaz – Branta ruficollis – Краснозобая казарка

Meýdan alamatlary: garşylykly (kontrast) reňkli orta ölçegdäki gaz. **Döşi we boýununyň öňki tarapy goňurrak-gyzyly.** Ganatlary garamtyl. Kellesiniň üsti we boýununyň yzky tarapy, arkasy we garny gara. Guýrugynyň aşagy we gapdalyndaky inli zolak – ak, döşüniň we boýununyň goňurrak-gyzylyt ýelekleriniň insiz ak zolaga gaýalandygy ýakýndan oňat görünýär. Horazy, mäkiýany we ýaşlary reňki boýunça tapawutlanmaýarlar, ýöne ýaşlarynyň reňki aksowult. **Çüňki gysga** we aýaklary gara. Sesi – güýçli gagyldama. Uzynlygy – 54-56, ganaty – 33-39, ganatlarynyň gerimi – 115-135 sm.

Meňzeşlikleri–tapawutlary: meňzeş görnüşleri ýok, ýelek örtügindäki gyzyly-goňur, gara we ak reňkiniň saz-

водной и околводной растительности, эфемерами, кормятся (пасутся) на всходах диких и культурных злаков и зерновых.

Статус: на зимовке среди гусей самый обычный, местами многочисленный. Объект любительской охоты.

33. Примечание: Из других видов гусей недавно (2005 г.) был отмечен залет **сухоноса – Anser cygnoides** в долину Амударьи. Сухонос – гусь размером с гуменника, но с более длинной шеей и отличается черным клювом и коричнево-бурой окраской верха головы и задней стороны шеи. Подобные залеты в Туркменистан могут случаться, но крайне редко.

Полевые признаки: среднего размера гусь с контрастной окраской. **Грудь и передняя сторона шеи – коричнево-красные.** Крылья темные. Верх головы и задняя сторона шеи, спина и брюхо – черные. Подхвостье и широкие полосы по бокам – белые, а вблизи видно, что белые узкие полосы окаймляют коричнево-красное оперение груди и шеи. Самцы, самки и молодые не отличаются, но окраска молодых бледнее. **Короткий клюв** и ноги черные. Голос – звонкий гогот. Длина – 54-56, крыло – 33-39, размах крыльев – 115-135 см.

Сходства – различия: сходных видов нет, легко узнается по сочетанию красно-коричневого, черного и белого цветов в оперении.

Распространение: гнездовая

laşygy boýunça aňsat tanalýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi – Taýmyryň, Gydanyň we Ýamal adasynyň tundrasy. Esasan, Gara deňziň günbatar kenarynda, Hazar deňziniň günortasynda bölekleýin gyslaýar.

Ýaşayşy: Bizde guş döwründe Hazar deňziniň kenaryakasynda gabat gelmegi mümkin. Kiçiräk topar bolup gezyär. Kenaryakalarynda we suw akur çyglanan ýerlerde gögeren däneli ösümlikleriň ýaş maýsalar bilen iýmitlenýär.

Statusy: örän seýrek görnüş, MSOP-nyň Gyzyl sahypasyna we Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen.

Ala gazlar – *Tadorninae* – Пеганковые

Ördekleriň aşaky maşgalasy (bizde iki görnüşü duşýar) bolup, daşky keşbi we ýaşayş aýratynlygy boýunça, gazlaryň we ördekleriň arasyndaky geçiş, ýagny aralyk toparyny emele getirýär. Olar öz höwürtgelerini hinlerde gurmaklyga ýygyn edýändigleri sebäpli, ýer ördekleri diýip hem atlandyrylýar.

35. Aňk – *Tadorna ferruginea* – Огарь, или отайка

Meýdan alamatlary: ýelek örtüginе ачык-çyпар reňk häsiýetli uly ördek. Kellesi çyпarrak-ak. Ganatlarynda uly **ak tegmili** we ýaşyl “aýnajygy” bolýar. **Horazynyň insiz “boýunbagy” gara reňkli, ol mäkiýanynda ýok.** Mäkiýany we ýaşlary – öçügsi reňkli. Çüňki, aýaklary we guýrugy – gara. Ýerde uzak wagtлаp gezyär, uçanynda gykylykly. Sesi – güýçli, yöne ýumşak “gaang-gaang-gaang”. Uzynlygy – 60-68, horazlarynyň ganaty – 35-40, mäkiýanlarynyňky – 32-37, ganatlarynyň gerimi – 120-145 sm.

часть ареала – тундры Таймыра, Гыдана и Ямала. Зимует, в основном, на западном побережье Черного моря, частично на юге Каспия.

Образ жизни: у нас может встречаться на побережье Каспийского моря в зимний период. Держится небольшими группами. Кормятся на прибрежных участках и заливных лугах молодой порослью злаков.

Статус: очень редкий вид, внесен Красный список МСОП, и в Красную книгу Туркменистана

Подсемейство утиных (у нас два вида), которое по облику и особенностям жизни представляет промежуточную, переходную группу между гусями и утками. Их называют еще земляными утками, поскольку тяготеют к устройству своих гнезд в норах.

Полевые признаки: крупная утка с характерной **ярко-рыжей окраской** оперения. Голова рыжевато-белая. **На крыле большое белое пятно** и зеленое «зеркальце». **У самца – узкий «ошейник» черного цвета, у самки его нет.** Самки и молодые – блеклые. Клюв, ноги и хвост – черные. На земле держатся подолгу, много ходят, в полете крикливы. Голос – звонкое, но мягкое «гаанг-гаанг-гаанг». Длина – 60-68, крыло самцов – 35-40, самок – 32-37, размах крыльев – 120-145 см.

Сходства – различия: сходных

Meňzeşlikleri–tapawutlary: ýelek örtüginini reňki boýunça meňzeş görnüşleri ýok.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi – çöllük we sähra zolaklary, daglardaky köller – Demirgazyk-Günbatar Afrikadan Mongoliýa we Günbatar Hytaýa çenli. Türkmenistanda Hazar deňzinden Amyderýa çenli bölekleýin, aglaba, düzlüklerde duşýar. Kiçi we Alynký Aziýada, Hindistanda, Demirgazyk-Günbatar we Demirgazyk-Gündogar Afrikanyň käbir ýerlerinde gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýär, höwürtleýär, gyslaýar. Uçup geçende we gyslaýan döwri – derýalaryň jülgerlerinde we uly suw howdanlaryň kenarlarynda saklanýar. Höwürtleýän wagty şor, seýrek süýji suwly kölleri we suw basan ýol-ýodasyz ýerleri eýeleýär, ýalpak suwly çöp-çalamsyz ýerlerde gezyär. Guşlar özbaşdak ýapgyt gazan, çuň hinlerinde ýada olar tilkileriň, ýabany pişikleriň köne sürenlerinde, gaýalardaky daş üýşmekleriniň aşagyndaky oýlarda höwürtleýär. Aprel-maý aýynda 10-12 sany sarymtyl reňkli ýumurtgalary goýýar. Ösümlük we haýwan iýmiti bilen iýmitlenýär, yöne köplenç ter baldaklary, dänelileriň we ýaz otlaryň tohumlaryny çokýar.

Statusy: höwürtleýän döwründe seýrek, yöne gyslanda, käbir ýerlerde adaty we hat-da köpsanly görnüş. Awlamak gadagan, yöne ol aw söýüjileriň aw guşy bolup biler (ýerli ady – “aňkawja” ýa-da “ogorek”).

36. Ala gaz – *Tadorna tadorna* – Пеганка

Meýdan alamatlary: ýaşylbaşdan ulurak ölçegli, uly ördek. Reňkinde ak we gara öwürşginler utgaşýar we ördek

видов по окраске оперения нет.

Распространение: гнездовая часть ареала – зоны пустынь и степей и горные озера – от Северо-Западной Африки до Монголии и Западного Китая. В Туркменистане неравномерно от Каспия до Амударьи, преимущественно на равнинах. Зимует в Малой и Передней Азии, Индии и Индокитае, местами в Северо-Западной и Северо-Восточной Африке.

Образ жизни: пролетает, гнездится, зимует. На пролете и зимовке – по долинам рек и берегам крупных водоемов. На гнездовье населяет соленые, реже пресноводные озера и разливы в пересеченной местности, тяготеет к мелководьям, лишенным растительности. Гнездо – в относительно глубоких наклонных норах, которые выкапываются птицами самостоятельно или они занимают старые норы лисиц, диких кошек, или естественные ниши в обрывах и углубления с нагромождениями камней. Кладка в апреле-мае из 10-12 яиц кремового цвета. Питается животной и растительной пищей, но больше побегами и семенами злаков и эфемеров.

Статус: на гнездовье редкий, но на зимовке, местами обычный и даже многочисленный вид. Добыча запрещена, однако, может служить объектом любительской охоты (местное охотничье название – “огорёк”).

Полевые признаки: крупного размера, крупнее кряквы. Окраска – характерное сочетание светлых

uzakdan ala (gara-ak) bolup görünýär. Kellesi we boýny ýaldyrawuk gara, **döşündäki “boýunbagy” açyk-goňras reňkli**, ganatyndaky “aýnajyk” goýy ýaşyl öwüşgin atýan reňkli. **Çünki açyk-gyzyl, horazynyň maňlaýynda düwünjik (çişjagaz) bolýar.** Aýaklary gülgüne, ýaşlary ala we öçügsi reňkli. Ganatlaryny seýrek kakyp, agyr uçýarlar. Suwda iýmitlenýär, ýöne suwa çümmeýär. Mäkiýanyň sesi basyk, ýumşak we pessajya gagyldy, horazynyňky -sykylykly “dýu-dýu-dýu-dýu”. Uzynlygy – 55-70, horazlarynyň ganaty – 30-35, mäkiýanlarynyňky – 27-32, ganatlarynyň gerimi – 110-130 sm.

Meñzeşlikleri–tapawutlary: görnüşleriň meñzeşi ýok, ýöne uçup barýan mahaly uly ýa-da uzynçünkli jüptün ördekleriň horazlary bilen çalyndaşlyk etmegi mümkin, emma burnunyň ýasydygy bilen olardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewraziýada tegmilleýin ýaýran. Höwürtegeýän döwründe – Demirgazyk-Günbatar Ýewropanyň kenaryndan, tokaýsähra, sähra we ýarymçöllük zolakdan Gündogar Mongoliýa çenli, Orta we Alyňky Aziýanyň çölleriň käbir ýerinde duşýar. Orta Aziýada we Türkmenistanda düzlük giňişliklerde höwürtegeýär, uçup geçýän wagty daglyk ýerlerde duşmaklary mümkin. Günbatar Ýewropanyň kenarýakasýnda, Ortaýer deňzinde, Alyňky Aziýada we Günorta-Gündogar Hytaýda bölekleýin gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýär we höwürtegeýär, bölekleýin gyslaýar. Kiçiräk topar bolup, ýa-da aýry-aýrylykda, seýrek kenarýakadan daşda höwürtegeýär. Jübütligi durnukly. Höwürtesini ýumşak toprakly ýerden gazan hininde

и темных тонов, из далека утка выглядит черно-белой. Голова и шея черные с отблеском, **на груди «ошейник» светло-каштанового цвета**, на крыле – «зеркальце» темно-зеленого переливчатого цвета. **Клюв ярко-красный и у самцов – с характерным вздутием у лба.** Ноги розовые. Молодые пестрые и окрашены бледнее. Полет тяжелый с нечастыми взмахами крыльев. Кормится на воде, не ныряет. Голос самки – глухое, мягкое и низкое кряканье, а самца – свистовое «дью-дью-дью-дью». Длина – 55-70, крыло самцов – 30-35, крыло самок – 27-32, размах крыльев – 110-130 см.

Сходства – различия: сходных видов нет, но в полете можно спутать с самцом большого или длинноносого крохалея, от которого отличается широким носом.

Распространение: пятнистое в Евразии. На гнездовье – от побережья Северо-Западной Европы, зоны лесостепей, степей и полупустынь до Восточной Монголии, местами – пустыни Средней и Передней Азии. В Средней Азии и Туркменистане на равнинах, гнездится, в горах, может быть, встречается на пролете. Зимует на побережьях Западной Европы, в Средиземноморье, частично в Передней Азии и Юго-Восточном Китае.

Образ жизни: пролетает и гнездится, частично зимует. Гнездятся небольшими группами или разрозненно, нередко вдали от берега. Пары постоянны. Гнездо устраивает в норах, которые выкапывает в мягком грунте, но часто использует норы лисиц или естественные уг-

gurýar, emma ýygy-ýygydan tilkileriň sürenlerinden ýa-da gum gaýalaryň tebigy köweklerinden peýdalanýar. Aprel - maýda 8-10 sany sarymtyl reňkli ýumurtgalary goýýar (birnäçe mäkiýanyň bir höwürtgä ýumurtga goýmaklary mümkin). Suwdaky dürli oňurgasyzlar, aýratyn-da leňňeçjikler, suwotulary bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly görnüş, uçup geçende käbir ýerlerde adaty, aw söýjileriň aw guşy, ol goramaga degişli guş.

Derýa ördekleri – Anatinae – Речные утки

Uly we orta ölçegdäki suwda ýüzýän guşlar. Boýny we aýaklary başgalara garanyňda gysga. Beýleki ördeklerden yzky barmagyň inli deripisint gyra parawuzynyň ýokdugy bilen tapawutlanýar. Umuman, tebigatda çümyän ördeklerden suwda beýik oturýandygy bilen tapawutlanýar. Reňkleri dürli, görnüşleriň köpüsiniň ganatynda reňkli “aýnajyk” bolýar, jyns tapawudy (dimorfizm) aýdyň görünýär. Iýmitlenende doly suwa çümmeýär, olar suwa kellesini çümdürende, seýrek dik başsak bolup, guýrugyny dik ýokarlygyna tutup saklanýarlar. Iýmiti gatýşyk, ösümlik (tohumy, suw we suwýka ösümlikleriň baldagy), görnüşleriň bir topary bolsa, haýwan (suw oňurgasyzлары) bilen iýmitlenýärler.

37. Sakarja ördek – Anas penelope – Свиззь

Meýdan alamatlary: ýaşylbaşdan has kiçi ölçegli ördek. Çünki we aýaklary gurşunpisint-çal reňkli. Gysgalan boýny we çünki bilen tapawutlanýar, emma başgalara garanyňda **ganatlary uzyn we guýrugy çowly. Horazynyň kellesi goňurrak-goňras, maňlaýy**

лубления и ниши. В гнезде до 8-10 яиц кремового цвета (но в одно гнездо могут откладывать яйца несколько самок) в апреле-мае. Питается различными водными беспозвоночными, особенно рачками, водорослями.

Статус: немногочисленный вид, местами на пролете обычный, объект любительской охоты, охоты подлежит регламентация.

Водоплавающие птицы крупных и средних размеров. Шея и ноги сравнительно короткие. Отличаются от других уток отсутствием широкой кожистой оторочки заднего пальца. В целом, от нырковых уток в природе отличаются высокой посадкой на воде. Окраска разнообразная, у многих видов на крыле цветное «зеркальце», хорошо выражен половой диморфизм. При кормежке полностью не ныряют, опуская голову в воду, нередко становясь вертикально хвостом кверху. Питание смешанное, употребляют растительную пищу (семена и стебли водных и околководных растений), ряд видов питаются животными кормами (водные беспозвоночные).

Полевые признаки: утка размером значительно меньше кряквы. Клюв и ноги свинцово-серого цвета. Отличается укороченными шейей и клювом, но относительно **длинными крыльями и заостренным хвостом. У самца голова коричневато-каштановая, лоб**

– sarymtyl-altyn öwüşginli, döşi – goýy-gyzyl, egni – ak, “aýnajygy” – ýaşyl. Mäkiýanyň “aýnajygy” çalymtyl-gara, ýelek örtüginini galany tutuşlygyna gara menekli çalymtyl-goňur. Ýaş guşlary mäkiýanyndan tapawutlandyrmak kyn. Uçýan mahaly häsiýetli ak tegmili ganatlarynda görünýär. Saplakly hereket edip, çalt uçýar. Seýrek suwa çümýär. Horazynyň sesi ýiti sykylyk – “whiirru”, mäkiýanyňky sesli gagyldama-“krerr-krerr”. Uzynlygy 45-50, horazlarynyň ganaty – 25-28, mäkiýanlarynyňky – 22-26, ganatlarynyň gerimi – 75-85 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: horazlary beýleki ördekleriň arasynda kellesiniň goňurrak-altyn öwüşginli reňki, mäkiýanlary bolsa, garnynyň akdygy we çüňküniň çaldygy bilen tapawutlanýar.

Ýaşayan ýerleri: Arealynyň höwürtleýän bölegi – Demirgazyk Ýewraziýa. Günbatar Ýewropada, Ortaýer deňzinde, Kiçi, Alynky Aziýada, Demirgazyk Hindistanda, Merkezi we Gündogar Afrikanyň käbir ýerlerinde gyşlaýar. Orta Aziýanyň düzlük we daglyk ýerlerindäki dürli suw ýataklarda, Türkmenistanda Hazardan Amyderyça çenli gabat gelýär.

Ýaşayşy: Uçup geçýän-gyşlaýan guş. Ýazky migrasiýasy mart-aprelde, güýzküsi – oktyabr-noýabrda. Gyş döwründe uly toplanma döretmeýär. Köllerde we suw howdanlarynda, derýa jülgelerinde, çöldäki akyndy suwlarda saklanýar. Köplenç ösümlik iýmiti – suwotular, danelileriň şinelän tohumlary, seýrek oňurgasyzlar bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, käbir ýerde seýrek görnüş, aw söýüjileriň aw guşy.

– желтовато-золотистый, грудь – темно-красная, плечи белые, «зеркальце» – зеленое. У самки «зеркальце» серо-черного цвета, а все оперение, в целом, – серо-бурое с темными пестринами. Молодые почти неотличимы от самок. В полете на крыльях видны характерные белые пятна. Полет маневренный и быстрый. Нырятся редко. Голос самца – резкий свист «вхи-ирру», самки – трескучее кряканье «крерр-крерр». Длина – 45-50, крыло самцов – 25-28, самок – 22-26, размах крыльев – 75-85 см.

Сходства – различия: самцы среди других уток выделяются коричнево – золотистой головой, а самки – белым брюшком и серым клювом.

Распространение: гнездовая часть ареала – Северная Евразия. Зимует в Западной Европе, Средиземноморье, Малой, Передней Азии, Северной Индии и Индокитае, местами в Центральной и Восточной Африке. В Средней Азии по различным водоемам на равнинах и горах, в Туркменистане от Каспия до Амударьи.

Образ жизни: пролетная, зимующая птица. Весенняя миграция в марте-апреле. Осенняя – в октябре-ноябре. В зимний период больших скоплений не образует. Придерживается озер и водохранилищ в долинах рек и сбросовых разливов в пустыне. Питается, преимущественно растительной пищей – водорослями, всходами злаков, редко беспозвоночными.

Статус: немногочисленный, местами редкий вид, объект любительской охоты.

38. Çal ördek – *Anas strepera* – Серая утка

Meýdan alamatlary: öý ördeginde we ýaşylbaşdan kiçi. Ganatında gara-ak häsiýetli “aýnajyk”. Horazy goýy-çal reňkli, döşi we gapdal böwürleri teňnesypat-çüwdürim nagyşly. Mäkiýany gara menekli goňur. Aýaklary sarymtylmämişi, horazynyň çüňki garamtyl, mäkiýanyňky – sary. Ýaş guşlar mäkiýanlary bilen meňzeş. Uçup barýarka bir reňkde bolup, ýaşylbaş çaly edýär, emma bedeni gelşikli. Guşlar süri bolup uçanlarynda has gykylykly, ýygy-ýygydan “gepleşän” ýaly eşidilýär. Sesi – mäkiýanyňky gagyldama, emma ýaşylbaş garanynda has pert, horazynyňky inçeräk we owazly – “krrrek-krrrek”. Uzynlygy 45-55, horazlarynyň ganaty – 25-28, mäkiýanlarynyňky – 23-26, gerimi – 84-95 sm.

Meňzeşligi-tapawudy: beýleki ördeklerden ganatlarynyň goňrasgoňur reňkinde gara-ak “aýnajygy” bilen tapawutlanýar. Horazynyň kellesiniň reňki tutuk, mäkiýanyň çüňki sary.

Ýaşayan ýerleri: höwürtleýän döwründe - Ýewraziýanyň we Demirgazyk Amerikanyň sähralyk tokaý, sähra we çöllük zolaklary. Orta Aziýada we Türkmenistanda düzlük giňliklerdäki köllerde we derýalaryň jülgelerinde, aýratynda olaryň hanalarynda, Sarygamyş kölünde duşýar. Ýewropanyň günorta-günbatarynda, Afrikanyň demirgazyk-gündogarynda, Alynky Aziýanyň käbir ýerlerinde, Orta Aziýanyň günortasynda, Hindistany demirgazygynda, Hytaýyň we Demirgazyk Amerikanyň günortasynda gyşlaýar.

Полевые признаки: размером меньше домашней утки и кряквы. На крыле характерное черно-белое «зеркальце». Самец темно-серого цвета с характерным чешуйчато-струйчатым рисунком на груди и боках. Самка бурая с черными пестринами. Ноги желто-оранжевые, клюв – темный у самца и желтый у самки. Молодые схожи с самками. Полет быстрый, легкий и относительно шумный. В полете выглядит однотонно, напоминая крякву, но стройнее и более криклива, птицы в стае часто «переговариваются». Голос у самки – кряканье, но более резкое, чем у кряквы, у самца – звучное и низкое «кrrрек-кrrрек», напоминающее голос ворона. Длина – 45-55, крыло самцов – 25-28, самок – 23-26, размах крыльев – 84-95 см.

Сходства – различия: от других уток отличается черно-белым «зеркальцем» на фоне каштаново-коричневых крыльев. У самца неяркая голова, у самки – желтый клюв.

Распространение: на гнездовье – лесостепная, степная и пустынная зоны Евразии и Северной Америки. В Средней Азии и Туркменистане в равнинных частях по озерам и разливам в долинах рек, особенно в их дельтовых частях, на озере Сарыкамыш. Зимует на юго-западе Европы, северо-востоке Африки, местами в Передней и юге Средней Азии, на севере Индии и юге Китая и на юге Северной Америки.

Образ жизни: пролетный вид, частично гнездится и зимует. На гнездовье предпочитает острова

Ýaşayşy: uçup geçýän, ýek-tük höwürtleýän, gyslaýan görnüş. Höwürtelän döwründe köllerdäki adalarda, suw ýataklarynyň otluk, yzgarly kenarýakalaryny saylaýar. Aprel-maý aýlarynda 5-12 sany sarymtyl-çalymtyl - ýaşylymtyl öwüşginli ak reňkli ýumurtgalary goýýar. Uçup geçende we gyslanda kiçiräk süri bolup gezyär. Suwotular we beýleki suw ösümlikleri bilen ýymitlenýär.

Statusy: az öwrenilen görnüş. Aw söýüjileriň aw guşy (ýerli ady “çalja”), emma baş sany az.

39. Sykylykçy jünekeý – *Anas crecca* – Чирок-свистунок

Meýdan alamatlary: ördekleriň arasynda iň maýdasy. **Horazynyň böwürleri inli ýaşyl zolaklanan bolup, kellesi goňras-goňur.** Emma, kellesi tutuşlygyna uzakdan gara ýaly bolup görünýär. Böwürleri çal bolup, garamtyl çüwdürim pisintli. Mäkiýany – gara menekli, goňur öwüşginli. **Guşlaryň ikisi-de ýaşyl reňkli “aýnajyk” ýalpyldawuk metal öwüşginli.** Çünki kiçiräk we gara. Ýaşlary mäkiýana meňzeş. Guşlaryň uly sürä toplanmaklary hem mümkin, olar çalt uçýarlar. Horazynyň sesi üzlem-saplam we inçe sykylyk - “týurk-týurk” bolup, gylguýruk ördegiň horazynyň sesine meňzeş. Mäkiýany batly gagyldyly. Uzynlygy - 34-39, horazlarynyň ganaty – 17-20, mäkiýanlarynyňky – 16-19, ganatlarynyň gerimi – 58-65 sm.


Meňzeşlikleri-tapawutlary: beýleki ördeklerden, uly jünekeý ördekden we beýlekilerden, göwreleriniň kiçidigi, emma, kellesinde ak ýa-da sary reňkiň ýokdugy bilen has oňat tapawutlanýar. Mäkiýany uly jünekeý ördekden guýrugynyň gapdallary-

озер, сырые травянистые берега водоемов. Кладка – в апреле-мае из 5-12 яиц белого цвета с желто-вато-серино-зеленоватым оттенком. На пролете и зимовке встречается небольшими стаями. Питается, в основном, водорослями и другой водной растительностью.

Статус: Недостаточно изученный вид. Объект любительской охоты (местное охотничье название – “серушка”), но численность не столь велика.

Полевые признаки: самая мелкая среди наших уток. У **самца голова каштаново-коричневая с широкими зелеными полосами по бокам.** Но издали вся голова кажется темной. Бока серые с темным струйчатым рисунком. Самка – бурого оттенка с черными отметинами. У **обоих полов – «зеркальце» зеленого цвета с металлическим блеском.** Клюв небольшой и черный. Молодые схожи с самками. Могут образовывать стаи, птицы в полете быстры и маневренны. Голос самца – отрывистый и низкий свист – «тюрк-тюрк», чем-то схожий с голосом самца шилохвосты. Голос самки – криканье – высокое и звонкое. Длина – 34-39, крыло у самцов – 17-20, у самок – 16-19, размах крыльев – 58-65 см.

Сходства – различия: мелким размером хорошо отличается от других уток, кроме чирка-трескунка, но от него отличается отсутствием белого или желтого цвета на голове. Самка отличается от чирка-



Ördekleriň uçup barýarka görnüşü: 1 – ýaşylbaş; 2 – gylguýruk ördek; 3 – sakarja ördek; 4 – çal ördek; 5 – tamdyra ördek; 6 – uly jünekeý ördek; 7 – uly jüptün ördek; 8 – sykylykçy jünekeý; 9 – uzynçüňkli jüptün ördek; 10 – kiçi jüptün ördek.

Утки в полете: 1 - кряква; 2 - шилохвость; 3 - свиязь; 4 - серая утка; 5 - широконоска; 6 - чирок-трескун; 7 - большой крохаль; 8 - чирок-свистунок; 9 - длинноносый крохаль; 10 - луток.

ndaky ýagty tegmilleri we ýaşyl “aýnajygy” bilen tapawutlanýar.

Ýayran ýerleri: giň, arealynda höwürtegeleýän bölegi-Ýewraziýanyň demirgazygy we demirgazyk Amerikanyň (demirgazyk-gündogar oblastlaryndan başgalary) sähralyklaryndan tundra çenli aralygy öz içine alýar. Orta Aziýanyň we Türkmenistanyň suw ýataklarynyň hemmesinde duşýar, suwly köllere, düzlükdäki derýalaryň suw akan ýerlerine we çölde akynly suwlaryň toplanan ýerlerine ýakyn durýar. Ýewropanyň günorta-günbattarynda we günortasynda, Ortaýer deňzinde, Alynky Aziýanyň käbir ýerlerinde, Orta Aziýanyň günortasynda, Hindistanyň hemme ýerinde, Merkezi Amerikada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-gyşlaýan guş. Ýazky migrasiýasy fewralyň ortasyndan mart aýynyň aýagyna çenli, güýzküsi - sentýabr-oktyabrda. Suw howdanlarynda bölekleyin ýayran. Derýalaryň jülgelerinde, köllerde we ýurduň günorta bölegindäki suw basan ýerlerde, ýalpak suwly howdanlaryň kenarlarynda köp saklanýar, soňky ýyllarda guşlarda uly sürülere toplanyp gezmegi azaldu. Suwda we suwýakasynda ösýän ösümlükler, az mukdarda suwdaky mör-möjekler we olaryň liçinkalary bilen iýmitlenýär.

Statysy: adaty, käbir ýerlerde köp sanly, uçup geçende hem örän köpsanly görnüş, aw söýüjileriň aw guşy.

40. Ýaşylbaş – *Anas platyrhynchos* – Кряква

Meýdan alamatlary: öý ördegi ölçegli (öý ördekleriň köpüsiniň nesilbaşsýsý), ýabany ördekleriň

трескунка светлыми пятнами по бокам хвоста и зеленым «зеркальцем».

Распространение: широкое, гнездовая часть ареала – северная половина Евразии и Северной Америки (кроме северо-восточных областей) от степей до тундр включительно. В Средней Азии и Туркменистане повсюду, где имеются водоемы, тяготеет к озерам и водоемам в долинах равнинных рек и сбросовым разливам в пустыне. Зимует на юго-западе и юге Европы, в Средиземноморье, местами в Передней и на юге Средней Азии, по всему Индостану и Индокитаю, в Центральной Америке.

Образ жизни: Пролетная, зимующая птица. Весенняя миграция с середины февраля и до конца марта, осенняя – в сентябре-октябре. Распределение по водоемам неравномерное. Тяготеет к речным долинам, озерам и разливам южной половины страны, придерживается мелководных берегов, массовых скоплений на зимовках в последние годы не образует. Питается зелеными частями водной и околоводной растительности, в меньшей степени водными насекомыми и их личинками.

Статус: обычный, местами многочисленный, на пролетах очень многочисленный вид, объект любительской охоты.

Полевые признаки: наиболее известная среди диких уток, размером с домашнюю (родоначальница большинства пород домашних

arasýnda has tanalýany. Horazlaryna we mäkiýanlaryna **ak zolak bilen aýlanan gök-ýaşyl “aýnajyk” häsiyetli.** Olar galan alamatlary boýunça hem tapawutlanýarlar: horazynyň döşi goňurrak-goňras, **boyny we kellesi metal öwüşginli yaşyl reňkli,** guýrugynyň üstündäki ýelekleri ýo-karlygyna gaňrylan, “ýakalygy” insiz ak we çünki sarymtyl-ýaşyl. **Mäkiýany we ýaşlary garamtyl tegmillenen goňur ýelek örtüklü.** Köplenç süri bolup gezýärler, howada toýnuk ýa-da kese çyzyk tutup, dowamly uçýarlar. Ýyrtyjy ýa-da adam tarapyndan abanan howpy mäkiýan ördekler ýaraty yaly jögülik edip, höwürtgeden daşlaşdymaga çalyşýar. Sesi - hemmäniň oňat tanaýan, gagyldama owazydyr. Uzynlygy - 50-65, horazlarynyň ganaty - 27-31, mäkiýanlarynyňky - 25-29, ganatlarynyň gerimi - 85-100 sm. Meñzeşlikleri-tapawutlary: beýleki ördeklerden gök-ýaşyl “aýnajygy” we uly ölçegli bilen tapawutlanýar.

Ýayran ýerleri: giň – Ýewraziýanyň we Demirgazyk Amerikanyň (olara demirgazyk oblastlary goşulmanda) hemme ýerlerinde duş gelýär. Şol kontinentleriň günorta böleginde gyşlaýar. Türkmenistanda – dürli görnüşli suw ýataklarynda, Hazar deňzinden Amy-derýa çenli.

Ýaşayşy: uçup geçýär, höwürtegeleýär we gyşlaýar, bir bölegi oturymly ýaşýar. Deňziň, kölleriň, suw howdanlaryň, suw joşgunyndan döran suwlaryň we düzlüklerdäki suw ýataklarynyň kenarlarynda gezýär. Gyşda sürümden soň suwarylyan ýerlerde duşýar. Olaryň jübütleşmegi güýz-gyş döwründe geçýär. Adatça, ýerde, süýji suwly

уток). Для самцов и самок **характерно сине-зеленое «зеркальце», окаймленное белой полоской.** В остальном они между собой отличаются: у самца – коричнево-каштановая грудь, **шея и голова зеленого цвета с металлическим отливом,** над хвостом – закрученные кверху концы перьев, узкий белый «воротник» и желто-зеленый клюв. **У самки и молодых оперение бурое с темными пятнами.** Часто держатся в стаях, летят клином или косой линией. Полет энергичный. При опасности со стороны хищников или человека самка пытается отвести в сторону от гнезда, притворяясь раненной. Голос – хорошо знакомое всем кряканье. Длина – 50-65, крыло у самцов – 27-31, у самок – 25-29, размах крыльев – 85-100 см.

Сходства – различия: от других уток отличается сине-зеленым «зеркальцем» и крупными размерами.

Распространение: широкое – почти вся Евразия и Северная Америка, исключая их северные области. Зимует в южных частях тех же континентов. В Туркменистане – от Каспия до Амударьи, в местах с наличием водоемов различного типа.

Образ жизни: пролетает, гнездится и зимует, часть особей оседла. Придерживается морских побережий, озер, водохранилищ, разливов и других водоемов на равнинах. В зимнее время попадают на полях залитых водой. Пары формируются в осенне-зимний период. Гнездятся обычно на земле, среди травянистой растительно-

howdanlaryň kenarlarynda ösýän otlaryň arasynda höwürtegeýär. Aprelde 7-13 sany ýaşylymytl öwürşigini, gabygy ak ýumurtgalary goýýar. Jüyjeleri ýumurtgadan çykandan soň höwürtgäni taşlaýarlar we 1,5-2 aýdan soň uçurym bolýarlar. Suwda we suwýakasynda ösýän ösümlükleriniň ýaşyl böleklerini çürtýärler, şeýle-de, az mukdarda suwdaky oňurgasyzlyry iýýärler.

Statysy: höwürtegeýän döwründe az sanly, emma uçup geçende we gyslanda iň bir adaty ördekler, käbir ýerlerde köp sanly, hatda örän köp sanly. Awçylaryň iň bir söýgüli aw guşlarynyň biri.

41. Gylguýruk ördek – *Anas acuta* – Шилохвость

Meýdan alamatlary: ýaşylbaşdan kiçi we gelşikli bedenli, orta ölçegdäki ördek. **Guýrugynyň bizsekili uzalandygy we boýnunyň inçedigini bilen tanalýar (horazy).** Çünki çalymytyl-mawy, aýaklary çal, goýy çal ýüzgüç perdeli. **Horazyň kellesi we boýny melemtil-goňur reňkli.** Bedeniniň ýokarky bölegi we **garamtyl çüwdürim** nagyşly, böwürleri çal, **döşi we garny ak. Bürünç öwürşiginli goýy-ýaşyl “aýnajygyň”** ýokarsy çypar gaýmaly, aşagy bol-sa gara-ak zolakly. Mäkiýanynyň ýelek örtügi bir reňkli çalymytyl - goňur bolup, garamtyl menekli, “aýnajygy” garamtyl-goňur. Ýaşlary mäkiýanlaryna meňzes, ýöne üstki tarapy garamtyl, guýrugynyň ortasyndaky ýeleklere uzalmadyk. Çünki goýy-çal. Suwa oturanda guw ýaly boýnuny saklaýar (“S” harp), emma uçan wagty ony süýindirýär. Çalt we ýeňil uçýar. Horazyň sesi gykylykly

сти по берегам пресных водоемов. Кладка – в апреле, состоит из 7-13 яиц белого цвета с зеленоватым оттенком. Птенцы гнездо покидают после вылупления, на крыло становятся через 1.5 - 2 месяца. Употребляет зеленые части водной и околводной растительности, поедает также водных насекомых, но в меньшей степени.

Статус: в гнездовое время немногочисленна, но на пролетах и зимовках одна из самых обычных уток, местами многочисленна и даже очень многочисленна. Один из излюбленных объектов охоты.

Полевые признаки: утка средних размеров, меньше кряквы и заметно стройнее. **Узнается (самцы) по удлинённому шиловидному хвосту и тонкой шее.** Клюв сероголубой, ноги серые с темно-серыми перепонкам. **У самца голова и шея шоколадно-бурого цвета.** Верхняя часть тела и **бока серые** с темным струйчатым рисунком, **грудь и брюшко – белые. Темно-зеленое «зеркальце»** с бронзовым отливом, окаймлено сверху рыжей, а снизу черной и белой полосками. **У самки оперение однородного серо-бурого цвета** с темными пестринами, а **«зеркальце» черновато-бурое.** Молодые схожи с самками, но сверху темнее, центральные хвостовые перья не удлинены. Клюв темно-серый. Нырять плохо и неохотно. Сидя на воде, короткую шею держит как лебедь (буквой «S»), но в полете ее вытягивает. Полет быстрый и легкий. Голос самца – крики «фюрррк-

– “fýurrrk-fýurrrk”, mäkiýanynyňky – öý öredeginiň gagyldysyna örän çalymdaş, ýöne ol diýen güýçli däl. Horazyň uzynlygy - 60-75, mäkiýanynyňky – 50-56, horazlarynyň ganaty – 25-29, mäkiýanlarynyňky – 23-27, ganatlarynyň gerimi – 85-100 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: horazlary uçan mahaly döşüniň we garnynyň arassa akdygy anyk görünýär. Ondan daşary, horazlary inçeden uzyn guýrugy, mäkiýanlary çyppak “aýnajykly”, boýnunyň uzynlygy we çüňküniň çaldygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: giň - Ýewraziýa, Merkezi we Demirgazyk Amerika, Demirgazyk Afrika. Arealynda höwürtegeýän bölegi – Sähradan Tundra çenli uzalýar. Günbatar Ýewropada, Ortaýer deňzinde, Kiçi we Alyňky Aziýada, Hindistanda we Hindihytaýda, şeýle-de Merkezi Afrika we Merkezi Amerikada gyslaýar. Orta Aziýanyň, şeýle-de Türkmenistanyň suw joşgunyndan akan we düzlüklerdäki ýalpak suwly suw ýataklary ýerlerinde duş gelyär.

Ýaşayşy: uçup geçýän, bölekleyin gyslaýan görnüş. Ýazky migrasiýasy has aýdyň - fewralyň ortasyndan apreliň aýagyna çenli, güýzkisi – sentýabryň ortasyndan noýabryň ortasyna çenli geçýär. Kölleriň, suw joşup toplanan suwlaryň, deňiz kenarýnyň ýalpak suwly ýerlerinde kiçiräk süri bolup duşýar. Köplenç ösümlük, az mukdarda haýwan ýemi, şol sanda mör-möjekler, olaryň içinkalary, balykgulaklar we leňneçler bilen ýemtilenýär.

Statysy: adaty görnüş, awçylaryň söýýän aw guşy.

фюрррк», самки – очень похож на крякву домашней утки, но не столь громкий. Длина у самцов – 60-75, у самок – 50-56, крыло самцов – 25-29, самок – 23-27, размах крыльев – 85-100 см.

Сходства – различия: в полете у самцов хорошо заметны чисто белые грудь и брюхо. Кроме того, самцы отличаются длинным тонким хвостом, а самки – удлиненной шеей, рыжеватым «зеркальцем» и серым клювом.

Распространение: широкое – Евразия, Центральная и Северная Америка, и Северная Африка. Гнездовая часть ареала – от степей до тундр включительно. Зимует в Западной Европе, Средиземноморье, Малой и Передней Азии, Индии и Индокитае, а также Центральной Африке и Центральной Америке. В Средней Азии, также и в Туркменистане – разливы и другие мелководные водоемы на равнинах.

Образ жизни: пролетный, частично зимующий вид. Весенняя миграция более заметная и происходит с середины февраля до конца апреля, осенняя – с середины сентября до середины ноября. Встречаются в небольших стаях на мелководьях по берегам озер, разливов, морском побережье. Питаются, преимущественно, растительными, в меньшей степени животными кормами, в частности, насекомыми, их личинками, моллюсками и рачками.

Статус: обычный вид, объект любительской охоты.

42. Uly jünekeý ördek – *Anas querquedula* – Чирок-трескунок

Meýdan alamatlary: sykylykçy jünekeý ördekden sähelçe ulurak, maýda ördek. **Horazy goýy-goňur, kellesindäki inli ak gaşy bilen tapawutlanýar**, döşi hem edil şol reňkde, emma garamtyl çüwdürim nagyşly. **Çalymtyl-yaşyl “aýnajygy” ak gaýmaly, ganatlarynyň öňki tarapy çalymtyl-mawy reňkli. Mäkiýanynyň garamtyl bellikli ýelek örtügi goňur, çalymtyl “aýnajygy” ýalpyldysyz.** Häsiýeti boýunça sykylykçy jünekeý ördekden tapawutlanmaýar. Horazynyň sesi şowhunly-“kerr-kerr”, mäkiýanynyňky – batly we gaty sesli, sykylykçy jünekeýiňki ýaly gagyldama. Uzynlygy - 34-40, horazlarynyň ganaty – 18-21, mäkiýanlarynyňky – 18-20, ganatlarynyň gerimi – 60-69 sm.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: mäkiýanlary we ýaşlary sykylykçy jünekeý ördekden kynlyk bilen tapawutlanýar, emma olardan tapawutlylykda uly jünekeý ördegiň guýrugynyň gapdalarynda ýagty menekleri ýok we çünki tutuşlygyna goýu-çal reňkli.

Ýaýran ýerleri: arealynyň höwürtleýän bölegi – Ýewraziýa, günorta sähralyk zolagyndan tokaý tundra çenli. Orta Aziýada düzlüklerdäki we daglardaky suw ýataklarynda, Türkmenistanda – derýalaryň jülgelerinde we Hazar deňziniň kenarýakasynda. Hindistanda, Hindihytaýda we Merkeziy Afrikada, Sahara çölünden günorta tarapda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, bölekleyin uçup gezýän we gyşlaýan görnüş. Ýazky migrasiýasy martyň ortasy-

Полевые признаки: мелкая утка, чуть крупнее чирка-свистунка. **Самец отличается широкой белой бровью на темно-бурой голове, грудь того же цвета, но с темным струйчатым рисунком. «Зеркальце» серо-зеленое с белой каймой, а передние части крыльев серо-голубой окраски. Оперение самки бурое с темными отметинами, «зеркальце» сероватое без блеска.** По поведению почти не отличается от чирка-свистунка. Голос самца – трескучее «кэrr-кэrr», самки – звонкое и высокое кряканье как у самки чирка-свистунка. Длина – 34-40, крыло у самцов – 18-21, у самок – 18-20, размах крыльев – 60-69 см.

Сходства – различия: самки и молодые с трудом отличаются от чирков-свистунков, но в отличие от них у чирка-трескунка по бокам хвоста нет светлых пятен и клюв весь темно-серого цвета.

Распространение: гнездовая часть ареала – Евразия – в полосе от южных степей до лесотундры. В Средней Азии – водоемы на равнинах и в горах, в Туркменистане – по долинам рек и побережью Каспия. Зимует в Индии, Индокитае и Центральной Африке к югу от Сахары.

Образ жизни: пролетный вид, частично летующий и зимующий. Весенняя миграция с середины марта и до начала мая, осенняя – с середины августа и до конца октября. Придерживается водоемов различных типов, но чаще мелководных озер и разливов с травянистой растительностью. Питается растительной, но больше живот-

ndan maý aýynyň başyna çenli, güýzküsi – awgustyň ortasyndan oktyabryň aýagyna çenli. Suw ýataklarynda, ýalpak suwly köllerde we suw akan otluk ýerlerde saklanýar. Ösümlük, köplenç haýwan (balykgulaklar, mör-möjekleriň liçinkalary, pes derejeli leňneçler) iýmiti bilen has köp iýmitlenýär.

Statusy: uçup geçende adaty, galyan wagty seýrek görnüş, awçylaryň aw guşy, awda onuň orny ujypsyz.

43. Tamdyra ördegi – *Anas clypeata* – Широконоска

Meýdan alamatlary: yaşylbaşdan kiçi, orta ölçegdäki ördek. **Adaty bolmadyk “kepje” görnüşli**, çünki garamtyl (aýratyn-da, horazynyňky) reňki bilen tapawutlanýar. Aýaklary mämişi. **Horazynyň kellesi we boýny metal öwüşgünli yaşyl, reňkleriň tapawudy ak döşinde aýdyň görünýär.** Garny we böwürleri goňras reňkli, ganatlarynyň öňki böleginiň üsti mawy, aşagy – ak. **Mäkiýany gara menekli çyparrak-goňur bolup, ganatlary yaşyl “aýnajykly”.** Ýaşlary mäkiýanlaryna çalymdaş, ýöne has tutuk reňkli. Uly sürä toplanmaýarlar we suwda pes oturýarlar, şonuň üçin hem boýuny has gysga ýaly bolup görünýär. Ümsüm. Mäkiýan guşlaryň sesi batly gagyldama, horazynyňky pessaýja şapbyldama – “ssok-ssok”. Uzynlygy – 45-52, horazlarynyň ganaty – 23-25, mäkiýanlarynyňky – 21-24, ganatlarynyň gerimi – 70-85 sm.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: uçan wagtynda anyk görüňän garamtyl garny, şeýle-de, **häsiýetli ýasy çünki bilen** ördekleriň beýleki görnüşlerinden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: giň - tutuş Ýewra-

ной пищей (моллюски, личинки водных насекомых, низшие ракообразные).

Статус: на пролете обычный, в остальное время редкий вид, объект любительской охоты, роль которого в добыче незначительна.

Полевые признаки: среднего размера утка, заметно мельче кряквы. Отличается **необычным клювом в виде «лопатки»** темного (особенно у самца) цвета. Ноги оранжевые. **У самца голова и шея зеленые, с металлическим отблеском, контрастируют с белой грудью.** Брюхо и бока каштановые, передняя часть крыла – сверху голубая, а снизу – белая. **Самка – рыже-бурая с черными пестринами и зеленым «зеркальцем»** на крыле. Молодые похожи на самок, но более тусклые. Больших стай не образует, на воде держится низко, и поэтому шея кажется очень короткой. Довольно молчалива. Голос у самок – звонкое кряканье, а у самцов – негромкое чмокающее «цсок-цсок». Длина – 45-52, крыло самцов – 23-25, у самок – 21-24, размах крыльев – 70-85 см.

Сходства – различия: от других уток отличается темным брюхом, хорошо видимым в полете, а также **характерным расширенным клювом.**

Распространение: широкое – почти вся Евразия, Северная Аме-

ziýa, Demirgazyk Amerika (olaryň demirgazyk oblastlaryndan başga) we Demirgazyk-Gündogar Afrika. Arealynda höwürtegeleýän bölegi – günorta tundradan tä sähralyga çenli zolak. Orta Aziýada we Türkmenistanda, esasan, derýalaryň jülgelerindäki suw ýataklarynda we çöle akdyrylan suw toplumlarynda. Günorta-Günbatar we Günorta Ýewropada, Kiçi we Alynky Aziýada, Hindistanda, Hindihytaýda, Demirgazyk Amerikanyň günortasynda gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-gyslaýan, bölekleýin höwürtegeleýän görnüş. Ýazyna mart-aprelde, güýzine – sentýabryň ortasyndan noýabryň ortasynda çenli uçup geçýär. Düzlik giňliklerindäki süýji we şor suwly köllerde saklanýar. Maý-ijun aýlarynda höwürtegeleýär we 4-11 sany sarymtly reňkli ýumurtgalary goýýar. Suw oňurgasyzlar – leňneçjikler, balykgulaklar bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly görnüş, awçylaryň aw guşy.

44. Ekinçi ördek – *Marmaronetta angustirostris* – Мраморный чирок

Meýdan alamatlary: ölçegi kiçiräk, ýöne sykylykçy jünekeýden ulurak ördek. Çünki uzalan, horazynyňky çal we mäkiýanynyňky - gara reňki, olaryň ikisiniň hem aýaklary goňur. **Horazynyň we mäkiýanynyň reňki meňzeş, arkasy we böwürleri bir reňkde, ýagty süýri tegmilli çyparrak-çal**, şolaryň hasabyna “mermer nagyşlary” döreyär. Gözünden ýeňsesine tarap garamtyl zolak geçýär. Ganatlarynda “aýnajyklary” ýok. Mäkiýanlary we ýaşlary azyrak öçügsi reňkli. Uçan mahaly beýleki jünekeý ördeklere çalyň edýär, emma çalt we göni uçýar. Uzynlygy – 40 sm.

рика, за исключением их северных областей, и Северо-Восточная Африка. Гнездовая часть ареала – в полосе от южных тундр до степей включительно. В Средней Азии и Туркменистане в основном на водоемах по долинам рек и разливах в пустыне. Зимует – в Юго-Западной и Южной Европе, Малой и Передней Азии, Индии и Индокитае, на юге Северной Америки.

Образ жизни: пролетный, зимующий, частично гнездящийся вид. Весенний пролет в марте-апреле, осенний – с середины сентября до середины ноября. Придерживается мелководных как пресных, так и солоноватых водоемов на равнинах. Гнезда в мае-июне, в кладке от 4 до 11 яиц желтоватого цвета. Питается, в основном, водными беспозвоночными – рачками, моллюсками.

Статус: немногочисленный вид, объект любительской охоты.

Полевые признаки: небольшая по размерам утка, но крупнее чирка-свистунка. Клюв удлинен, у самцов серого цвета, у самок – черного, ноги у тех и других бурые. **Окраска обоих полов однотонная рыже-серая с округлыми светлыми пятнами на спине и боках**, за счет которых образуется «мраморный рисунок». От глаза к затылку проходит темная полоса. **«Зеркальце» на крыле отсутствует.** Самки и молодые несколько тусклее. В полете похож на других чирков, полет быстрый и прямой. Длина – 40 см.

Сходства – различия: сходных

Meňzeşlikleri-tapawutlary: görnüşleriň arasynda ýelek örtüginini reňki boýunça meňzeşi ýok.

Ýaşan ýerleri: arealynda höwürtegeleýän bölegi tegmilleýin – Ýewropanyň günorta-günbatar çetleri, Kiçi, Alynky we Orta Aziýada. Orta Aziýada düzlükden akýan derýalaryň jülgelerinde we Türkmenistanda, Etrekde, Garagum derýasynda, Amyderýa boýunda, Murgap we Tejen derýalarynda duşmamaklary mümkin. Ortaýer deňzinde, Alynky Aziýada, Hindistanyň demirgazyk-günbatar çetlerinde, Afrikanyň merkezi böleginiň käbir ýerlerinde gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtegeleýän görnüş, bir bölegi gyslaýar. Ýazyna apreliň aýagynda uçup gelýär, güýzine – noýabrda uçup gidýär. Süýji suwly, düýbi we kenarlary gyrmançaly ýalpak köllerde saklanýar. Oazisleriň golaýyndaky oba hojalyk ekerançylyk we adamlaryň howp döretmegi mümkin bolan ýerlerinde mekan tutýar. Beýleki ördeklerden giç höwürtegeleýär. Maý aýunyň ortasynda kenardaky gury ýerlerde höwürtegeleýär we 7-12 sany ak-goňur öwürginli ýumurtgalary goýýar. Adatça, tomsuň ortasynda jüýjeleri çykýar. Ýalpak suwly ýerlerde iýmitlenýär, onuň esasyny ösümlikler we maýda oňurgasyzlar düzýär.

Statusy: örän seýrek, ýeterlik öwrenilmedik görnüş, MSOP-nyň Gyzyl sahypasyna we Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen.

Çümýän ördekler – *Aythya* – Ныркковые утки

Uly we orta ölçegdäki suwda ýüzýän guşlar. Boýny we aýaklary beýlekilere garanyňda gysga. Ördekleriň beýleki görnüşlerinden yzky bar-

видов в окраске оперения нет.

Распространение: гнездовая часть ареала пятнистая – на крайнем юго-западе Европы, в Малой, Передней и Средней Азии. В Средней Азии по долинам равнинных рек, в Туркменистане в низовьях Этрека, по Каракумдарье и Амударье, возможно Мургабу и Теджену. Зимует в Средиземноморье, Передней Азии, крайнем северо-западе Индостана, местами в центральных частях Африки.

Образ жизни: прилетный, гнездящийся вид, часть особей зимует. Весной прилетает с конца апреля, осенью отлетает в ноябре. Придерживается мелководных пресных озер с илистыми берегами и дном. Селится в оазисах поблизости от сельскохозяйственных угодий, где может подвергаться угрозам со стороны человека. Сроки размножения поздние. Гнезда на сухих береговых участках не ранее середины мая, в кладке 7-12 белых с буроватым оттенком яиц. Птенцы обычно в середине лета. Кормятся на мелководьях, основу питания составляют растения и мелкие беспозвоночные.

Статус: очень редкий, недостаточно изученный вид, включен в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана.

Водоплавающие птицы крупных и средних размеров. Шея и ноги сравнительно короткие. Отличаются от других уток наличием

magynda deripisintli inli parawuzyň we çüňküniň ulynda inli “dymajygyň” bardygy bilen tapawutlanýar. Tebigatda, derýa ördeklerinden tapawutlylykda, suwda pes oturýandygy bilen tapawutlanýar. Reňkleri dürli, görnüşleriň köpüsiniň ganatlarynda ak “aýnajyk” bolýar we jynsy dimorfizm (horazynyň mäkiýandan tapawudy) anyk görünýär. Derýa ördeklerinden tapawutlylykda gury ýerde, bedenini has dik tutup, agyrylyk bilen hereket edýär. Adatça, iýmitlenen wagty suwa çümýär. Iýmitinde haýwan iýmiti (suw oňurgasyzlyry) agdyklyk edýär, görnüşleriniň birnäçesi ösümlikler (tohumlary, suw we suwýaka ösümlikleriň baldaklary) bilen iýmitlenýärler.

45. Almabaş ördek – *Netta rufina* – Красноносый нырок

Meýdan alamatlary: uly, emma, ýaşylbaşdan kiçi ördek. **Horazynyň çypar kellesi** gysgajyk hüpükli, boýny, döşi we gary gara, böwürleri ak. **Çüňki ачык-gyzyl. Mäkiýany birmeňzeş goňurrak-çal, duluklary ýagty-çal reňkli. Çüňki gara. Olaryň ikisiniň hem aýaklary gyzyl, ganatlarynyň yzky gyrasy boýunça ýagty zolagyň geçýändigini oňat görüňýär.** Horazynyň gözi gyzyl, mäkiýanynyňky – goňur. Ýaşlary mäkiýana çalyndaş, ýöne garamtyrak. Çümyän ördekler edil beýlekileri ýaly suwuň üsünden ylgaп, bat alandan soň ýokarlygyna galýar, emma gerek bolanda, oturan ýerinden uçmagada ukyplydyr. Adatça horazlary ümsüm, mäkiýanynyň sesi – “kerr-kerr-kerr” pert gagyldama. Uzynlygy – 52-57, ganaty – 23-27, ganatlarynyň gerimi – 85-89 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çüňküniň ачык-gyzylдыgy we kellesiniň

широкой кожистой оторочки заднего пальца и широкого «ноготка» на конце клюва. В целом, от речных уток в природе отличаются низкой посадкой на воде. Окраска разнообразная, у многих видов на крыле белое «зеркальце», хорошо выражен половой диморфизм. По земле передвигаются тяжело, держа тело, по сравнению с речными утками, более вертикально. При кормежке обычно ныряют. В питании преобладают животные корма (водные беспозвоночные), ряд видов употребляет и растительную пищу (семена и стебли водных и околоводных растений).

Полевые признаки: крупная утка, но меньше кряквы. **У самца голова рыжая** с коротким хохолком, шея, грудь и брюхо черные, бока белые. **Клюв ярко-красный. Самка однородной окраски-буровато-серая со светло-серыми щеками. Клюв черный. Ноги у обоих полов красные, а по всему заднему краю крыла хорошо видна светлая полоса.** Глаза у самца – красные, у самки – бурые. Молодые похожи на самок, но темнее. Как и другие нырковые утки взлетает после разбега по воде, но при необходимости может взлетать сразу. Самцы обычно молчаливы, голос самки – резкое кряканье – «кerr-кerr-кerr». Длина – 52-57, крыло 23-27, размах крыльев – 85-89 см.

Сходства – различия: от других уток самцы отличаются ярко-красным клювом и рыжей головой, а

çyparдыgy, mäkiýanynyň bolsa, duluk-larynyň agymtyldygy bilen beýleki ördekleriň ählisinden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Merkezi, Günorta we Günorta-Gündogar Ýewropada bölekleyin höwürtegeleýär, esasy höwürtegeleýän ýerleri – Gazagystanyň çöllük-sähra zolagy (gündogara Altaý daglaryna çenli) we Orta Aziýada Türkmenistanyň derýalarynyň jülgeleri bilen bilelikde. Ortaýer deňziniň, Zakawkaziýanyň, Alynky we Orta Aziýanyň käbir ýerlerinde, esasan, Hindistanyň demirgazygynda gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtegeleýän we gyslaýan görnüş. Ýazky migrasiýasy – fewralyň aýagyndan apreliň başyna çenli, güýzküsi – sentýabr-oktyabrda. Noýabrda ol gys-lamaga geçýär. Düzlüklerdäki kölleriň gamyşlyk ýerlerinde saklanýar. Höwürtesini gamyş üýsmekleriniň we gamyş dykynlarynyň üstünde gurýar. Maý-iyun aýlarynda 6-15 sany çyparrak-ak reňkli ýumurtgalary goýýar. Hazar deňzinde we içki suwlarda uly süre toplanyşyp gyslaýar. Suw ösümlikleri, olaryň tohumlary we baldaklary bilen iýmitlenýär.

Statusy: Höwürtegeleýän döwri az sanly ýa-da adaty, uçup geçende we gyslanda köpsanly, käbir ýerlerde has köpsanly görnüş. Awçylaryň iň gowy görýän aw guşy (“owgançy”).

46. Gyzylbaş garamtyl ördek – *Aythya ferina* – Голубая чернеть, или красноголовый нырок

Meýdan alamatlary: öý ördegin-den kiçi, orta ölçegdäki ördek. **Horazynyň kellesi we boýny goňras-goňur reňkli,** arkasy çüwdürim nagyşly mawymtyl-çal, döşi we

самка – светлыми щеками.

Распространение: гнездится разрозненно в Центральной, Южной и Юго-Восточной Европе, основная область гнездования – пустынно-степная зона Казахстана (на восток до Алтая) и Средней Азии, включая речные долины Туркменистана. Зимует местами в Средиземноморье, Закавказье, Передней и Средней Азии, но, в основном, – на севере Индостана.

Образ жизни: пролетный гнездящийся и зимующий вид. Весенняя миграция – с конца февраля до начала апреля, осенняя – в сентябре-октябре, в ноябре переходит в зимовку. Придерживается равнинных озер, заросших тростником и другой прибрежной растительностью. Гнезда обычно на тростниковых наносах и сплавилах. В кладке 6-15 яиц рыже-белого цвета в мае-июне. Зимуют на Каспии и внутренних водоемах, образуя местами очень большие стаи. Питается, в основном, водной растительностью, их семенами и побегами.

Статус: на гнездовье немногочисленный или обычный, на пролете и зимовке – многочисленный, местами очень многочисленный вид. Один из излюбленных объектов охоты (местное охотничье название – «афганка»).

Полевые признаки: среднего размера утка, заметно мельче домашней. **У самца голова и шея каштаново-коричневого цвета,** спина голубовато-серая с темным

guýrugynyň üstigara. Çünki gara bilen mawy. Gözleri gyzyly. **Mäkiýanyň ýelek örtügi birmeňzeş goňur reňkli**, bokurdagy ýagty tegmili, arkasy çal. Çünki mawymtylrak gara. Aýaklary çal. Ýaşlary mäkiýana meňzeş, ýöne duluklary has agymtyl we bedeniniň aşagy menekli. Mäkiýanyň we ýaş guşlaryň gözleri goňur. Suwda guýrugyny aşak sallap we arkasyny eňňit edip, pes oturýar. Çalt uçýar, emma suwdan sesli we agyr göterilýär. Köpelyän döwründe horazynyň sesi pessaýja sykylyk “fir-firr”, mäkiýanyňky pert we basyk gagyldama – “kerr-kerr”. Uzynlygy – 41-49, ganaty – 18-22, ganatlarynyň gerimi – 70-80 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ganatlary boýunça ak zolagyň geçmeýändigini, emma, ganatlarynyň ikinji tertipdäki pellpeleýiş ýelekleriniň ýagty-çal reňkli yerleri bilen ýakyn görnüşlerden tapa-wutlanýar.

Ýaýran ýerleri: tutuş Ýewropa, demirgazykdan başgalary, Aziýa – sähra, tokaýsähra we tokaýly zolagyň günorta oblastlary, gündogara tä Baýkal kölüne çenli. Alynky Aziýada höwürtegeýän ýerleri uly derýalaryň hanalary, Türkmenistanda - Amyderýanyň aşaky akymynda we Sarygamyş kölünde, uçup geçende we gyşlaýan wagty – Hazar deňzinden Amyderýa çenli uly suw ýataklarda. Günbatar Yewropada, Ortaýer deňzinde, Alynky we Orta Aziýanyň günortasynda, Hindistanyň we Hindihytaýyň demirgazygynda hem günortasynda, Demirgazyk-Gündogar Afrikada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän we gyşlaýan, bölekleýin höwürtegeýän guş. Suw ýataklarynyň dür-

струйчатый рисунком, грудь и надхвостье черные. Клюв голубой, с черным. Глаза красные. У **самки оперение** однородно **бурого цвета**, на горле светлое пятно, спина серая. Клюв черный с голубоватостью. Ноги серые. Молодые сходны с самками, но с более бледными щеками и более пятнистым низом тела. Глаза у самок и молодых бурые. Посадка на воде низкая, с опущенным хвостом и покатою спиной. Полет быстрый, но с воды поднимается шумно и тяжело. Голос – у самца в период размножения – негромкий свист – «фирр-фирр», у самки – резкое и хриплое кряканье – «кэrr-кэrr». Длина – 41-49, крыло – 18-22, размах крыльев – 70-80 см.

Сходства – различия: в отличие от близких видов по крылу не проходит белая полоса, но на второстепенных маховых перьях крыла имеется участок светло-серого цвета.

Распространение: вся Европа за исключением северных областей, в Азии – степная, лесостепная и южные области лесной зоны, на восток до Забайкалья. В Средней Азии районы гнездования ограничены дельтами крупных рек, в Туркменистане низовьями Амударьи и озером Сарыкамыш, на пролете и зимовке – по всем крупным водоемам от Каспия до Амударьи. Зимует в Западной Европе, Средиземноморье, Передней и юге Средней Азии, на севере Индостана и южном Индокитае, Северо-Восточной Африке.

Образ жизни: пролетная и зимующая птица, возможно гнездящаяся. Населяет водоемы различных типов,

li yerlerinde mekan tutýar, deňiz kenarýakasyndan tä Amyderýa çenli çuň süýji suw ýataklarynda saklanýar. Ýazyna fewralyň ikinji ýarymynda we martda uçup geçýär, güýzkisi – sentýabr-oktyabrda. Noýabrda uçup geçmegi dowam edýär we basym ol gyşlamaga ýazyp, uly sürülere toplanýar, aýratyn-da Hazar deňzinde we içki suwly ýerlerde. Ösümlükler (ýaşyl baldaklary), seýrek haýwanlar (balykgulaklar, leňneçler we mör-möjekleriň içinkalary) bilen iýmitleňýär.

Statusy: adaty, käbir ýerde has köp we has köpsanly görnüş. Awçylaryň aw guşy (ýerli ady “gyzylbaş” ýa-da “çalja”).


47. Gara ördek – Aythya nyroca – Белоглазая чернеть, или белоглазый нырок

Meýdan alamatlary: gyzylbaş garmtyl ördekden kiçi, emma, jünekeylerden ulurak, başgalardan maýda ördek. **Çyparrak-goňras ýelek örtüginde arkasy goýu goňur, guýrugynyň üsti we garny ak, ganatynyň yzky gyrasy kese ak zolakly (uçýan wagty).** Çünki gara, aýaklary çal. Mäkiýany horazyna meňzeş, emma **goňur bilen çyparrak-goňras öwüşgini çalyşýar.** Ýaşlary mäkiýana meňzeş. Horazlarynyň gözi ak, mäkiýanyňky we ýaşlarynyňky – gyzylymtyl-goňur. Suwa oňat çümýär we suwdan ýeňillik bilen howa göterilýär. Çalt we köp hereketli uçýar. Adatça ümsüm. Horazynyň sesi pessaýja basyk sesler, mäkiýanyňky – pert gagyldama (gyzylbaş garmtyl ördegiňki ýaly). Uzynlygy – 37-43, ganaty – 17-20, gerimi – 63-68 sm.

предпочитает более глубоководные, от морских побережий до пресноводных озер. Весенний пролет – во второй половине февраля и в марте, осенний – в сентябре-октябре. В ноябре пролет продолжается и, переходит в зимовку, образуются большие скопления, особенно на Каспии и крупных внутренних водоемах. Питается растительной (зеленая масса водных растений), реже животной (моллюски, рачки и личинок насекомых) пищей.

Статус: обычный, местами многочисленный и очень многочисленный вид. Один из охотничьих видов птиц (местные охотничьи названия – «краснобаш» или «седыш»).

Полевые признаки: сравнительно мелкая утка, мельче голубой чернети, но крупнее чирка. **Оперение рыжевато-каштановое с темно-бурой спиной, белым подхвостом и брюшком и белой полосой (в полете) вдоль заднего края крыла.** Клюв темный, ноги серые. Самка схожа с самцом, но **рыжевато-каштановый фон заменен бурым.** Молодые схожи с самкой. **Глаза у самца белые**, у самок и молодых – красно-бурые. Хорошо ныряет, с воды взлетает легко. Полет быстрый и маневренный. Обычно молчаливы. Голос самца – тихий хриплый звук, у самки – резкое кряканье почти как у самки голубой чернети. Длина – 37-43, крыло – 17-20, размах крыльев – 63-68 см.



Ördekleriň uçup baryarka görnüşi: 1 – almabaş ördek; 2 – gara ördek; 3 – gyzylbaş garamtyl ördek; 4 – jygaly ördek; 5 – garamtyl deňiz ördek; 6 – kekilli garamtyl ördek; 7 – deňizçi ala ördek; 8 – gögümtil ördek; 9 – uly gara ördek.

Утки в полете: 1 - красноносый нырок; 2 - белоглазый нырок; 3 - красноголовый нырок; 4 - гоголь; 5 - морская чернеть; 6 - хохлатая чернеть; 7 - морянка; 8 - синьга; 9 - турпан.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: reňkiniň çyparrak-goňrasdygy we guýrugynyň aşagynyň akdygy, horazynyň bolsa, gözünüň akdygy bilen beýleki çümyň ördeklerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Merkezi, Günüorta-Gündogar, tegmilleýin Günüorta Ýewropada, Gazagystanda, Orta we Alynky Aziýanyň käbir ýerlerinde höwürtegeýär. Ortaýer deňzinde, Orta we Alynky Aziýanyň günorta bolügininiň käbir ýerlerinde, Hindistanyň demirgazyk-günbatarynda, Gündogar we Merkezi Afrikanyň ýek-tük ýerlerinde gýşlaýar. Orta Aziýada we Türkmenistanda – düzlüklerdäki derýalaryň jülgelelerinde.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtegeýän, bölekleyin gýşlaýan guş. Ýazyna fewralyň aýagyndan apreliň ortasyna çenli, güzüne – sentýabr-oktyabrda uçup geçýär. Jübüt ýa-da kiçiräk topar bolup, suwdaky topbak ösen gamyşlaryň ýa-da dykyn bolan gamyşlaryň üstünde höwürtegeýär. 7-15 sany ýaşylymtyl öwüşginli açygoňur ýumurtgalary goýýar. Dürli höwürtegelerdäki ýumurtgalardan çykan jüýjeler sürä toplanýarlar, olar iýulyň aýagynda we awgustda uçurym bolýarlar. Suw ösümlikleri, şeýle-de oňurgasyz haýwanlar (balykgulaklar, mör-möjekler) bilen iýmitlenýär.

Statusy: gowşak öwrenilen seýrek görnüş, MSOP-nyň Gyzyl sahypasynda we Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen.

48. Kekilli garamtyl ördek – *Aythya fuligula* – Хохлатая чернеть

Meýdan alamatlary: garamtyl we gyzylbaş deňiz ördekden sähelçe kiçi, orta ölçegdäki ördek. **Horazynyň kel-**

Сходства – различия: от других наших нырков отличается рыжевато-каштановой окраской и белым подхвостьем, а самцы – белыми глазами.

Распространение: гнездится в Центральной, Юго-Восточной, пятнами в Южной Европе, Казахстане, местами Средней и Передней Азии. Зимует в Средиземноморье, местами на юге Средней и в Передней Азии, на северо-западе Индостана, в Восточной и кое-где Центральной Африке. В Средней Азии и Туркменистане по долинам равнинных рек.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся, частично зимующая птица. Весной пролетает с конца февраля и до середины апреля, осенью – сентябрь-октябрь. Гнездится на заломах или сплавинах тростника у воды, парами, или небольшими группами. В гнездах 7-15 светло-бурых с зеленоватым оттенком яиц. Птенцы из разных гнезд после оставления гнезда собираются в стайки, летными становятся в конце июля-начале августа. Питается как водными растениями (водоросли и семена), так и беспозвоночными животными (насекомые, моллюски).

Статус: слабо изученный редкий вид, внесен Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана.

Полевые признаки: утка средних размеров, чуть меньше голубой и морской чернотей. **У самца на го-**

lesi sallanyp duran uzyn hüpükli. Reňki gara-ala, böwürleri we garny ak, ýelek örtügininiň galan ýeri gara. Gözleri sary, çünki we aýaklary gara ýüzgiç perdeli çal. **Mäkiýany gowşak görüňän hüpükli goňur (diňe kellesiniň yzky böleginde gara reňk saklanýar),** garny agymtyl we çünkiniň düýbi ak tegmilli. Ýaşlary mäkiýanyna meňzeş, emma hüpüksiz we gözleri goňnurrak-sarymtyl. Okgunly uçýar, suwa oňat çümýär, suwdan ýeňillik bilen ýokary galýar. Ümsüm. Horazlarynyň sesi pessaý, basyk sykylyk, mäkiýanynyňky – gödek gyryljyk gagyldama, garamtyl deňiz ördegininiňki ýaly. Uzynlygy – 40-45, horazynyň ganaty – 19-22, mäkiýanlarynyňky – 18-21, ganatlarynyň gerimi – 66-74 sm.

Meňzeşlikleri–tapawutlary: horazy arkasynyň garadygy we hüpükli-digi, mäkiýanynyň – çünkiniň düýbinde ak halkanyň ýokdugy (diňe tegmiljik) bilen garamtyl deňiz ördekden tapawutlanýar. Gözüniň sarydygy bilen gyzylbaş garamtyl ördekden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeleýän bölegi Ýewraziýada – tutuş Ýewropa, günorta oblastlaryndan başgalarynda, Aziýa – inli zolak bolup, sähra zolagyndan, tundranyň günorta gyrasyna we Kamçatkanyň gündogaryna çenli. Gündogar Ýewropada, Ortaýer deňzinde, Gara we Hazar deňizlerinde, Orta we Alynky Aziýanyň günorta böleginde, Demirgazyk Hindistanda we Günorta Hytaýda, Demirgazyk - Gündogar Afrikada gyslaýar. Alynky Aziýada we Türkmenistanda – Hazar deňziniň kenaryakasynda we içki suw howdanlarda.

Ýaşayşy: uçup geçýän-gyslaýan

лове длинный ниспадающий хохолок. Окраска контрастная, черно-белая, бока и брюшко – белые, остальное оперение черное. Глаза желтые, клюв и ноги серые с черными перепонками. **Самка бурая (черный цвет только на задней части головы) с менее заметным хохолком,** беловатым брюшком и белым пятнышком у основания клюва. Молодые схожи самками, но без хохолка и с буровато-желтыми глазами. Полет стремительный, хорошо ныряет, с воды поднимается легко. Молчаливы. У самца голос – негромкий, приглушенный свист, у самки – грубое, хриплое кряканье, как у морской чернети. Длина – 40-45, крыло у самцов – 19-22, у самок – 18-21, размах крыльев – 66-74 см.

Сходства – различия: от морской чернети самец отличается черной спиной и хохолком, а самка отсутствием белого кольца (только пятнышко) у основания клюва. От голубой чернети отличается желтыми глазами.

Распространение: гнездовая часть ареала в Евразии – вся Европа, кроме южных областей, в Азии – широкая полоса от степной зоны до южной кромки тундры и на восток до Камчатки. Зимует в Западной Европе, Средиземноморье, Черном и Каспийском морях, южных частях Средней и Передней Азии, Северном Индостане и Южном Китае, Северо-Восточной Африке. В Средней Азии и Туркменистане – по каспийскому побережью и внутренним водоемам.

Образ жизни: пролетный. зимующий вид. Весенний пролет – с конца марта и в апреле, осенний – в

гörnüş. Ýazyna martyň soňundan we aprelda, güýzine – oktýabr we noýabrda uçup geçýär. Süri bolup ýygý - ýygýdan gyzylbaş, garamtyl ördkler bilen bile uly suw ýataklarynda we deňiz kenaryakasynda saklanýar. Suw ösümlükleriniň ýaşyl garyndysy we tohumlary bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde köpsanly, hatda örän köpsanly görnüş. Awçylaryň aw guşy (ýerli ady “garaja”).

49. Deňiz garamtyl ördegi – *Aythya marila* – Морская чернеть

Meýdan alamatlary: gyzylbaş we kekilli garamtyl ördekden ulurak, daşky sypatlary has meňzeşiräk, orta ölçegdäki ördek. Emma, **horazynyň kellesi, döşi we guýrugynyň üsti gara, böwürleri we garny ak. Arkasy garamtyl kese suw çüwdürimli nagyşlanan açyk-çal. Mäkiýanynyň gara reňki goňur bilen çalyşýar. Çünkiniň düýbiniň töweregi anyk saýgardýan ak halkaly.** Käte gulagyna ýanaşyk ýagty tegmili bolýar. Gözleri sary, çünki we aýaklary mawymtyl-çal. Ýaşlary mäkiýanlary ýaly, emma, çünkleriniň düýbindäki ak halka gowşak saýgardýar ýa-da bolmaýar. Gözleri sarymtyl-goňur. Suwa örän oňat çümýär, suwdan ýeňillik bilen ýokary galýar, çalt uçýar. Horazynyň sesi sykylyga meňzeş, emma, gaty däl – “switii...”, mäkiýanynyňky – gödek gagyldama “kyrrr-kyrrr”. Uzynlygy – 41-50, ganaty – 20-24, ganatlarynyň gerimi – 70-85 sm.

Meňzeşlikleri–tapawutlary: horazy arkasynyň ýagty-çaldygy we hüýpüginiň ýokdugy, mäkiýany – çünkiniň düýbinde inli ak halkanyň bardygy bilen kekilli garamtyl ördekden tapawutlanýar. Gözüniň sarydygy bilen gyzylbaş garamtyl ördekden

октябре и ноябре. Держится в стаях по крупным водоемам и на морских берегах, в стаях часто с голубой чернетью. Питается, преимущественно, зеленой массой и семенами водной растительности.

Статус: обычный, местами многочисленный и даже очень многочисленный вид. Объект любительской охоты (местное охотничье название – «чернушка»).

Полевые признаки: утка средних размеров, крупнее голубой чернети и хохлатой, с которой больше схожа внешне. Но **у самца голова, грудь и надхвостье черные, бока и брюшко белые. Спина светло-серая с темным поперечным струйчатым рисунком. У самки черный цвет заменен бурым. Вокруг основания клюва хорошо заметное светлое кольцо.** Иногда имеется светлое пятно и в области уха. Глаза желтые, клюв и ноги – голубовато-серые. Молодые почти как самки, но кольцо у основания клюва менее выражено или отсутствует. Глаза желто-бурые. Прекрасно ныряет, с воды поднимается легко, полет быстрый. На пролете и зимовке молчаливы. Голос самца – свист, но не громкий – «свити...», у самки грубое кряканье – «кыррр-кыррр». Длина – 41-50, крыло – 20-24, размах крыльев – 70-85 см.

Сходства – различия: от хохлатой чернети самец отличается светло-серой спиной и отсутствием хохолка, а самка – белым широким кольцом у основания клюва. От голубой чернети отличается желтыми

tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynyň höwürtleýän bölegi – Ýewraziýanyň we Amerikanyň tundra, tokaýly tundra we demirgazyk taýga zolagy. Ýewropanyň we Gündogar Aziýanyň deňizleriniň kenarýakasynda, Demirgazyk Amerikanyň günbatarynda we gündogarynda gyşlaýar. Orta Aziýada we Türkmenistanda – Hazar deňziniň kenarýakasynda we beýleki uly suw ýataklarda.

Ýaşayşy: uçup geçýän-gyşlaýan görnüş. Oktýabrda uçup gelýär, martda – uçup gidýär. Ýekelikde ýa-da kekilli we gyzylbaş garamtyl ördekler bilen kiçiräk topar bolup gezyýär. Haýwan, şeýle-de ösümlik bilen iýmitlenýär, olary suwdan ýa-da suwuň ýüzünden çöpleýär.

Statusy: seýrek guş, awçylar beýleki çümýän ördekler bilen bilelikde aw guşy hökmünde awlaýarlar.

50, 51, 52. Bellik: alaja kekil-li ördek – *Anas falcata*, tötänden uçup gelip, içki suw ýataklarynda duşmagy ahmal, onuň horazy we mäkiýany daşky görnüşü boýunça sykylykçy jünekeý ördegiň horazy-na we mäkiýanyna meňzeş, emma soňkydan mese-mälim uly.

Hazar deňzinde, aýratyn-da, noýabr-ýanwar aýlarynda, seýrek çümýän deňiz ördekleriniň tötänden uçup gelen görnüşleriniň duşmagy mümkin: **Deňizçi ala ördegi – *Clangula hyemalis*,** onuň horazy çüňkiniň gysgadygy, guýrugynyň uzyn sarakşekillidigi we boýunyň akdygy; mäkiýany bolsa, gysga guýruklydygy, kellesiniň açyk reňkli, emma depesiniň we ýaňaklarynyň garamtyldygy bilen tapawutlanýar. **Gögümtil ördek –**

глазами.

Распространение: гнездовая часть ареала – тундра, лесотундра и северная тайга Евразии и Америки. Зимует на морских побережьях Европы и Восточной Азии, запада и востока Северной Америки. В Средней Азии и Туркменистане попадает на Каспии и других крупных водоемах.

Образ жизни: пролетный, зимующий вид. Прилетает в октябре, отлетает в марте. Держится одиночно или небольшими группами в стаях с хохлатой или голубой чернетями. Питается как животной, так и растительной пищей, которую добывает в воде или с ее поверхности.

Статус: редкая птица, добывается во время охоты вместе с другими нырками.

50, 51, 52. Примечание: На внутренние водоемы не исключены крайне редкие залеты **касатки – *Anas falcata*,** самец и самка которой внешне в чем-то схожи с самцом и самкой чирка-свистунка, но заметно крупнее.

На Каспии, особенно в ноябре-январе, могут редко попадаться залетные морские нырковые утки: **морянка – *Clangula hyemalis*,** отличия у самца короткий клюв и длинный нитеобразный хвост и белая шея; а у самок хвост короткий, голова светлая, но с темным темением и щеками; **синьга – *Melanitta nigra*,** самец полностью черного цвета, а самка – бурая со светлыми «щеками», у обоих полов – хвост клиновидный и жесткий, у основания надклювья имеется утолщение

***Melanitta nigra*,** onuň horazy tutuşlygyna gara reňkli, mäkiýany – agymtyl “ýaňakly” goňur. Guşlaryň ikisiniň-de guýrukly pahna şekilli we gaty, üstki çüňküniň düýbinde ýogna ösüntgi bolýar.

в виде выроста.

53. Uly gara ördek – *Melanitta fusca* – Обыкновенный турпан

Meýdan alamatlary: öý ördegiň ölçeginde. **Horazynyň ýelek örtügi, kiçiräk ak “aýnajykda” we gözünüň aşagyndaky menekden galan ýeri tutuşlygyna gara.** Çüňki mämişi, düýbi gara we sähelçe çişik. Aýaklary gara ýüzgüç perdeli gyzylymtyl-gülgüne. **Mäkiýanyň ýelek örtügi goýy goňur, gulaklary ak bellikli** we çüňki bilen gözünüň arasy ýagty täk tegmilli (mydama däl). Ýaşlary mäkiýanlaryna meňzeş, emma kese zolakly, aýratyn-da, garyn tarapy has ala. Agyrlyk bilen az hem höwessiz uçýar, yöne örän ökdelik bilen suwa çümýär. Horazy ümsüm, örän seýrek basyk-hyžyldyly ses çykarmagy mümkin, mäkiýany uçýan mahaly pelttek pessaý gagyldaýar – “kraa-kraa-kraa”. Uzynlygy – 50-59, horazlarynyň ganaty – 26-29, mäkiýanlarynyňky – 23-27, ganatlarynyň gerimi – 90-100 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: bizdäki çümýän ördekleriň görnüşleriniň arasynda meňzeşi ýok. Gögümtil ördekden ak “aýnajygy” we kellesiniň gapdallaryndaky menekleri, uçýan wagty – ganatlarynyň yzky bölegindäki ak reňki bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän ýerleri Ýewropada – gunorta tundranyň demirgazyk taýga zolagy, Aziýada we Demirgazyk Amerikada

Полевые признаки: крупная утка, размером с домашнюю. **У самца все оперение черное с небольшими белыми «зеркальцем» и отметиной под глазом.** Клюв оранжевый с черным и слегка вздутым основанием. Ноги красно-розовые с черными перепонками лап. **У самки оперение темно-бурое с белой отметиной на ухе** и нечетким светлым пятном (не всегда) между клювом и глазом. Молодые схожи с самками, но более пестрые, с поперечными полосами, особенно на брюхе. Полет тяжелый, летает мало и неохотно, но прекрасно ныряет. Самцы молчаливы, очень редко могут подавать шипяще-хриплые звуки; самка кричит обычно в полете – низкое картавое кряканье – «краа-краа-краа». Длина – 50-59, крыло самцов – 26-29, самок – 23-27, размах крыльев – 90-100 см.

Сходства – различия: среди других наших нырковых уток сходных видов нет. От синьги отличается белыми «зеркальцем» и отметинами по бокам головы, а в полете – белым цветом на задней половине крыла.

Распространение: область гнездования в Европе – полоса южной тундры с северной тайгой, в Азии и Северной Америке шире – от южной тундры до степной зоны.

giň – günorta tundradan sähra zolagyna çenli. Günbatar we Demirgazyk-Günbatar Ýewropanyň, Gündogar Aziýanyň kenarýakalarynda, Demirgazyk Amerikanyň günbatarýnda we gündogarynda, Gara we Hazar deňizlerinde gyslaşar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-gyslaşan görnüş. Oktýabrda uçup gelýär, martda – uçup gidýär. Hazarda gyslaşan wagty beýleki çümyň ördekler bilen bilelikde duş gelýär. Oňurgasyzlyryň liçinkalary we balykgulaklar bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek, käbir ýyllarda örän seýrek, bizde entäk öwrenilmedik guş.

54. Jygaly ördek – *Bucephala clangula* – Обыкновенный гоголь

Meýdan alamatlary: başgalara garanynda inçe boýunly, süýri uly kelleli, orta ölçegli ördek. **Horazynyň arkasy we guýrugy gara, kellesi hem gara, emma ýaşyl öwüşginli,** çünkiniň we gözünüň aralygy ak süýri tegmilli. Çünki gara, gysga, ujy çowly. **Mäkiýanynyň kellesi we boýny meneksiz melemtil-goňur reňkli, emma “boýunbagy” insiz ak.** Çünki çal, uç tarapyňyň öň ýany sary zolakly. Ýelek örtügiňiň galan ýeri çalymtyl-goňur, ýagty “aýnajykly”. Guşlaryň ikisiniň-de aýaklary gara ýüzgüç perdeli mämişi-sary. Guşlar dowamly çümmäge ukyply. çalt uçýar, ganatlarynyň kakuw tizliginde häsiýetli zarply ses eşidilýär. Hüşgär we örän ümsüm. Sesi seýrek eşidilýär, basyk gagyldama. Uzynlygy – 40-50, horazlarynyň ganaty – 20-23, mäkiýanlarynyňky – 18,5-20,5, ganatlarynyň gerimi – 65-83 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: bizdäki beýleki çümyň ördekleriň arasynda meňzeş görnüş ýok.

Зимует на побережьях Западной и Северо-Западной Европы, Восточной Азии, запада и востока Северной Америки, Черном и Каспийском морях.

Образ жизни: прилетно-зимующий вид. Прилетает в октябре, отлетает в марте. На каспийских зимовках попадает вместе с другими нырками. Питается личинками беспозвоночных и моллюсками.

Статус: редкая, в некоторые годы очень редкая, почти не изученная у нас птица.

Полевые признаки: утка среднего размера с округлой заметно большой головой на сравнительно тонкой шее. **У самца спина и хвост черные, голова тоже черная, но с зеленым отливом** и округлым белым пятном между клювом и глазом. Клюв черный, короткий, суживающийся к вершине. **У самки голова и шея шоколадно-бурого цвета без пятна, но с белым узким «ошейником».** Клюв серый с желтой предвершинной полоской. Остальное оперение серо-бурое, со светлым «зеркальцем». Ноги у обоих перепонками лап. Птица способна подолгу нырять. Полет быстрый, при взмахах слышен характерный звенящий звук. Осторожен и очень молчалив. Голос, подает редко. Кряканье хриплое, длина – 40-50, крыло у самцов – 20-23, у самок – 18,5-20,5, размах крыльев – 65-83 см.

Сходства – различия: среди

Ýaşýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi – Ýewraziýanyň we Demirgazyk Amerikanyň tokaý zolaklary. Günbatar we Günorta Ýewropada, Orta Aziýada, Gündogar Aziýanyň kenarlarynda, Demirgazyk Amerikanyň günbatarýnda we gündogarynda gyslaşar. Orta Aziýada we Türkmenistanda – içki suw ýataklarynda we Hazar deňzinde bölekleyin ýaşýan.

Ýaşayşy: uçup geçýän-gyslaşan guş. Ýazyna fewralyň aýagyndan apreliň ortasyna çenli, güýzine – oktýabr we noýabr aýlarynda uçup geçýär. Adatça, ýekelikde ýa-da kiçiräk topar bolup gezyär. Suwdaky oňurgasız haýwanlar we maýda balyklar bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly görnüş, beýleki çümyň ördekler bilen bilelikde awlanýan guş.

Juptün ördekler – *Merginae* – Крохалиные

Ördekleriň balyklar bilen iýmitlenmäge ýöriteleşen toparý bolup, çünkleriniň inçeden uzynlygy we gýalarynyň tyrançak balygy saklamak üçin ýiti dişlidigi we çünkiniň ujynyň “dyrnak” görnüşinde gaňurçaklydygy bilen tapawutlanýarlar. Bedeniniň gurлуşy tersaýakýalylara we ýogla şekillilere meňzeş. Suwda oňat we dowamly çümyär.

55. Kiçi juptün ördek – *Mergellus albellus* – Луток

Meýdan alamatlary: jünekey ördeklerden sähelçe gabarak, hüpükli (almabaş ördek ýaly), kiçiräk ördek. **Horazynyň ýelek örtügi, gara arkasyndan we ganatlaryndaky gara nagyşlardan galany tutuşlygyna ak.** Gözleri goýy-çal. Boýunynyň yzky

других наших нырковых уток сходных видов нет.

Распространение: гнездовая часть ареала – лесная зона Евразии и Северной Америки. Зимует в Западной и Южной Европе, Средней Азии, на побережьях Восточной Азии, запада и юга Северной Америки. В Средней Азии и Туркменистане – неравномерно по внутренним водоемам и на Каспии.

Образ жизни: пролетная, зимующая птица. Весенний пролет проходит с конца февраля до середины апреля, осенний – в октябре и ноябре. Держится обычно одиночками или небольшими группами. Питается водными беспозвоночными животными и мелкой рыбой.

Статус: немногочисленный вид, может добываться охотниками вместе с другими нырками.

Группа специализированных уток, отличающихся узким удлиненным клювом с острыми зубцами на краях для удержания скользкой рыбы, которой питаются, и «ноготка» в виде крючка на конце клюва. Телосложением схожи с поганками и гагарами. Хорошо и подолгу ныряют.

Полевые признаки: небольшая утка, размером чуть крупнее чирка, с небольшим хохолком (как у красноногого нырка). **У самца все оперение белое, кроме черной спины и черного рисунка на крыльях.** Глаза темно-серые. На зад-

tarapy gara menekli, çüňkiniň we gözüniň arasy gara tegmilli, uçýan wagtynda, olar görünüär. Bówürleri açyk çal reňkli. **Mäkiýanyň ýelek örtügiňiň hemmesi çal, kellesi goňur, garny, petekesi we duluklary ak.** Gözleri gyzylymtyl-goňur. Iki guşuň hem aýaklary we çüňki çal. Suwda oňat ýüzyär we çümyär. Uçuşy çalt we köp hereketli. Örän ümsüm. Horazynyň sesi şowhunly - "kirr-rik", mäkiýanyňky gyrylyk - "frrr-frrr". Uzynlygy - 37-45, horazlarynyň ganaty - 19-21, mäkiýanlarynyňky - 17-19, ganatlarynyň gerimi - 55-70 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: görnüşleriň arasynda ýelek örtügiňiň reňki boýunça meňzeşi ýok. Jüptün ördekleriň arasynda iň maýdasy. Uçup barýarka sykylykçy jünekeý bilen çalymdaşlyk edýär, emma ondan tokarrak görünüär.

Ýaýran ýerleri: höwürtgeleýän ýerleri Ýewraziýa - tokaýly sähra zolagyndan günorta tundra çenli. Merkezi we Günbatar Ýewropada, Gara we Hazar deňizlerinde, Orta we Alyňky Aziýanyň käbir ýerlerinde, Gündogar we Günorta-Gündogar Hytaýda gyşlaýar. Türkmenistanda - bölekleýin, balyga baý bolan suw ýataklarynda duşýar.

Ýaşayşy: uçup gelyän-gyşlaýan guş. Ýazyňa fewralyň ortasyndan we martda, güyzine - oktyabryň ortasyndan we noýabrda uçup geçýär. Balyga baý bolan suw ýataklarynda saklanyp, olar bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, uçup geçende käbir ýerlerde adaty görnüş. Aw guşy hökmünde awçylaryň arasynda meşhur däldir.

ней стороне шеи черная отметина, между клювом и глазом черное пятно, которое видно и в полете. Бока светло-серые. **У самки почти все оперение серое, голова коричневая, брюхо, зоб и щеки белые.** Глаза красно-бурые. Ноги и клюв у обоих полов серые. Хорошо плавают и ныряют. Полет быстрый и маневренный. Очень молчалив. Голос у самца - трескучее «кирр-рик», у самки - хриплое - «фррр-фррр». Длина - 37-45, крыло у самцов - 19-21, у самок - 17-19, размах крыльев - 55-70 см.

Сходства - различия: сходных видов в окраске оперения нет. Самый мелкий из всех крохалей. В полете можно спутать с чирком-свистунком, но выглядит крупнее.

Распространение: область гнездования в Евразии - от лесостепной зоны до южной тундры. Зимует в Центральной и Западной Европе, на Черном и Каспийском морях, местами в Средней и Передней Азии, в Восточном и Юго-Восточном Китае. В Туркменистане неравномерно по всем водоемам, богатым рыбой.

Образ жизни: пролетно-зимующий вид. Весенний пролет с середины февраля и в марте, осенний - с середины октября и в ноябре. Придерживается водоемов, богатых рыбой, которой и питается.

Статус: немногочисленный, местами на пролете обычный вид. Как дичь среди охотников популярностью не пользуется.

56. Uzynçüňkli jüptün ördek - *Mergus serrator* - Длинноносый, или средний крохаль

Meýdan alamatlary: orta ölçeqli ördek. **Ýeňsesindäki hüpügiň arasy biraz bölünen.** Çüňki sähelçe ýokaryk gaýsak - jaýty. **Horazynyň kellesi gara, goýu-ýaşyla ýakyn,** arkasy gara, ganatlarynyň düýpleri, garny we boýuny ak, emma onuň yz taraplary gara zolakly, **petekesi gara tegmilli goňur.** Bówürleri çal, ganatlarynyň daşky tarapy garamtyl dik zolakly. **Mäkiýanyň ýelek örtügi çalymtyl-goňur, kellesi we boýny çypar, döşi çalymtyl-çypar (ýuwulan ýaly).** Ýaşlary mäkiýanyňa meňzeş, emma has çal, ýelek örtügi garamtyl, hüpügi gysga. Iki guşuň hem gözleri, çüňki we aýaklary gyzyly. Ýaşlarynyň aýaklary sarymtyl-goňur. Suwda örän oňat çümyär. Suwdan agyrylyk bilen, ylgap göterilýär, ganatlaryny ýugy-ýugydan kakyp, çalt uçýar. Örän ümsüm. Sesi gödek we boguk - "kreh-kreh-kreh". Uzynlygy - 50-63, horazlarynyň ganaty - 22-26, mäkiýanlarynyňky - 21-24, ganatlarynyň gerimi - 70-88 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: uly jüptün ördeğine çalymdaş, emma göwresi kiçi, petekesiniň goýu-goňrasdygy we bówürleriniň çaldygy, şeýle-de horazynyň hüpüklidigi, mäkiýanyň - boýnunyň we garnunyň araçaginiň anyk dældigi bilen tapawutlanýar. Ol gylguýruk ördek bilen çalymdaşlyk edýär, emma reňki we häsiýetli, inçe çüňki bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtgeleýän ýerleri Ýewraziýa we Demirgazyk Amerika, esasan, tokaý we tundra zolagynyň bölekleri. Demirgazyk - Günbatar we Günorta - Gündogar Ýewropada, Orta Aziýada, Pars aýlagynda, Gündogar Hytaýyň we Ýaponiýanyň kenarýakalarynda, Demirgazyk Amerikanyň günorta-günbatarynda we günorta -

Полевые признаки: внешне - с утку среднего размера. **На затылке хохол, несколько раздвоенный.** Клюв слегка вздернут. **У самца темно-зеленая, почти черная, голова,** черная спина, белые основания крыльев, брюшко и шея, но с черной полосой по задней ее стороне, **зоб бурый с черными пестринами.** Бока серые с темными продольными полосками снаружи крыла. **У самки оперение серобурое с рыжей головой и шеей, и серо-рыжее (размытое) на груди.** Молодые схожи с самкой, но с более серым и темным оперением, хохол укорочен. У обоих полов глаза, клюв и ноги красные. У молодых ноги желтовато-бурые. Прекрасно ныряет. С воды поднимается тяжело, с разбега, полет быстрый с частыми взмахами. Очень молчалив. Голос грубый и хриплый - «крех-крех-крех». Длина - 50-63, крыло у самцов - 22-26, у самок - 21-24, размах крыльев - 70-88 см.

Сходства - различия: похож на большого крохала, но меньше, отличается темно-каштановым зобом и серыми боками, а также - у самца - хохол, у самки - размыта граница между шеей и брюшком. Чем-то схож с шилохвостью, но отличается окраской и характерным тонким клювом.

Распространение: область гнездования в Евразии и Северной Америке, в основном, лесная и часть тундровой зоны. Зимует в Северо-Западной и Юго-Восточной Европе, в Средней Азии, Персид-

gündogarynda gyslaýar. Orta Aziýada, Pars aýlagynda, Gündogar Hytaýyň we Ýaponiýanyň kenarýakalarynda, Demirgazyk Amerikanyň günorta - günbatarynda we günorta - gündogarynda gyslaýar. Orta Aziýada we Türkmenistanda – içki suw ýataklarynda we Hazar deňzinde duşýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-gyslaýan görnüş. Ýazyna martyň ikinji ýarymyndan we aprelde, güýzine-oktyabrda we noýabrda uçup geçýär. Amyderýadan Hazar deňzine çenli, emma, balyga baý bolan suw ýataklarynda saklanýar we balyklar bilen iýmitleýär.

Statusy: seýrek, az öwrenilen görnüş, awda ähmiýeti uly däl.

57. Uly jüptün ördek – *Mergus merganser* – Большой крохаль

Meýdan alamatlary: öý ördegin-den tokarrak, inçe, uýj sähelçe egmek çüňkli, uly ördek. **Horazynyň arkasy, boýny gara we kellesi hüpüksiz (ýaşyl yalpyldyly).** Garny we böwürleri – gülgüne-ak. Ganatlarynyň üsti uly ak tegmilli. **Mäkiýany şähelçe kiçi, arkasy çal, boýny (bokurdagy ak tegmilli) we kellesi gyzylymtlygoňras reňkli. Ýeňsesi gysga hüpükli.** Aýaklary we çüňki gyzyly. Gözleri garamtyl. Ýaşlary mäkiýana meňzeş, emma kellesi garamtyl çyzyklanan we hüpügi gysga. Aýaklary – goýu sary. Batly we göni ugra uçýar, kellesiniň we ganatlatynyň uçlarynyň garamtyldygy aýdyň görünýär. Örän ümsüm. Sesi güňleş – “bo-bob”, mäkiýanyňky hyrryldy – “hrrrr”. Uzynlygy – 58-68, horazlarynyň ganaty – 26-30, mäkiýanlarynyňky – 24-27, ganatlarynyň gerimi – 80-98 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çüňküniň inçedigi bilen beýleki ördek-

ском заливе, на берегах Восточного Китая и Японии, юго-запада и юго-востока Северной Америки. В Средней Азии и Туркменистане на внутренних водоемах и Каспии.

Образ жизни: пролетный, зимующий вид. Весной пролетает во второй половине марта и в апреле, осенью – в октябре, частично ноябре. Образ жизни в наших условиях схож с большим крохалем.

Статус: редкий, у нас слабо изученный вид, охотничье значение невелико.

Полевые признаки: крупная утка, крупнее домашней, с характерным узким, на конце слегка загнутым клювом. **У самца черные спина, шея и голова (с зеленым отблеском) без хохолка.** Брюхо и бока – розовато-белые. Сверху на крыле – большое белое пятно. **Самка чуть меньше, у нее серая спина, красновато-каштановые шея (с белым пятном на горле) и голова. На затылке короткий хохолок.** Ноги и клюв красные. Глаза темные. Молодые схожи с самкой, но с темными штрихами на голове и коротким хохолком. Ноги – темно-желтые. Полет стремительный и прямолинейный, хорошо заметны темные голова и концы крыльев. Очень молчаливы. Голос – глухое «бо-боб», у самки – хриплое «хрррр». Длина – 58-68, крыло у самцов – 26-30, у самок – 24-27, размах крыльев – 80-98 см.

Сходства – различия: от дру-

lerden tapawutlanýar. Uzynçüňk jüptün ördege çalyndaş, emma ondan ölçegleri kiçi, horazy petekesiniň we böwürleriniň akdygy, mäkiýany – boýnundaky çypar reňkiň anyk araçäk bolup durýandygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeýän ýerleri - Ýewraziýa we Demirgazyk Amerika, esasan, tokaý zolaklary, şeýle hem Orta we Merkezi Aziýanyň daglyk etraplary. Günbatar, Günorta Ýewropa, Orta we Merkezi Aziýanyň günbatarynda, Günorta-Gündogar Hytaýda, Demirgazyk Hindistanda, Demirgazyk Amerikanyň günorta böleginde gyslaýar. Türkmenistanda – içki suw ýataklarynda duşýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-gyslaýan görnüş. Ýazyna fewralyň aýagynda we martda, güýzine – oktyabryň ahyrlarynda we noýabrda uçup geçýär. Amyderýadan Hazar deňzine çenli, emma balyklara baý bolan dürli suw ýataklarynda saklanýar.

Statusy: seýrek, uçup geçen-de käbir ýerlerde adaty görnüş, awçylaryň awynda mukdary köp däl.

Gorçylar – *Oxyurinae* – Савковые

Ördekleriň aşaky maşgalasyndan bizde duşýan ýeke-täk wekilli.

58. Gorçy – *Oxyura leucocephala* – Савка, или белоголовая утка

Meýdan alamatlary: ganatlary gysga, orta ölçegli ördek. Horazy **uly ak kellesiniň gara depelidigi, çişik çüňküniň mawymtyldygy we pahnäşekilli guýrugunyň ýokaryk galyp durandygy** bilen aňsat tanalýar. Garabaşly horazlarynyň ýaz-tomus döwründe duşmaklary mümkin. Ýelek örtügininiň galan ýerleriniň reňki mele we goýu reňkleriň utgaşmagynda

гих уток отличается узким клювом. Можно спутать с длинноносом крохалем, но он меньше размерами; самец – с белым зобом и боками, а самка – с резкой границей рыжего цвета на шее.

Распространение: область гнездования в Евразии и Северной Америке, в основном, лесная зона, но также горные районы Средней и Центральной Азии. Зимует в Западной, частично Южной Европе, в Средней и западе Центральной Азии, Юго-Восточном Китае, Северном Индостане, южной половине Северной Америки. В Туркменистане – по внутренним водоемам.

Образ жизни: пролетная, зимующая птица. Весенний пролет – с конца февраля и в марте, осенний – с конца октября и в ноябре. Придерживается водоемов различных типов от Амударьи до Каспия, но больше богатых рыбой, которой питается.

Статус: редкий, на пролетах местами обычный вид, доля в любительской охоте невелика.

Подсемейство утиных с единственным у нас представителем.

Полевые признаки: утка средних размеров с короткими крыльями. Самец легко узнается **по крупной белой голове с черным теменем, голубому вздутному клюву и клиновидному, вздернутому хвосту.** В весенне-летний период могут встречаться темноголовые самцы. Окраска остального оперения темно-рыжая, в сочетании с бурыми и

goýy-çypar. **Mäkiýanyň kellesi iki sany kese ak zolakly goýy-goňur, çünki calymtyl-mawy.** Iki guşuň hem aýaklary gyzyl öwüşginli çal, ýüzgüç perdesi çalymtyl-garamtyl reňkli. Ýaşlary mäkiýana meňzeş. **Suwda guýrugyny ýatyrp ýa-da dik ýokary galdyryp oturýar.** Suwa ýeňillik bilen we oňat çümýär. Hyjuwsyz uçýar. Örän ümsüm, eger-de sesini çykarýsa, onda manysyz basyk gagyldy çykýar. Uzynlygy – 43-49, horazlarynyň ganaty – 16-17,5, mäkiýanlarynyňky – 15-17, ganatlarynyň gerimi – 63-71 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: meňzeş görnüşleri ýok.

Ýaşýan ýerleri: Ortaýer deňzinde, Zakawkaziýada, Hazar ýakasynda, Gazagystanda we Günbatar Sibiriň günortasynda höwürtegeýär. Türkmenistanda – Hazar deňzinde, Etrek, Garagum, Tejen, Murgap derýalary boýunça we Amyderýa jülgesinde duşmagy mümkin. Orta we Alyňky Aziýanyň günortasynda gyşlaýar.

Ýaşýşy: uçup geçýän, gyşlaýan, şeýle-de ýurduň demirgazyk we gündogar böleklerinde höwürtegeýär. Ýazda fewralyň aýagynda we marta, güýzine – oktýabr - noýabrda uçup geçýär. Süýji we şorlaşan suw ýataklarynda saklanýar. Iýun-iyulda köpeliýär. Adatça, gamyş jeňnelligindäki ösümlüklerden höwürtege gurýar, 5-7 sany irimçik, bür-şüdir, mawy gabykly uly ýumurtgaly goýýar. Gizlin gezyär. Ösümlük (ýaprak, suwoty, tohum) we haýwan (maýda balyklar, leňneçsekkilliler, balykgulaklar) iýmiti bilen iýmitlenýär.

Statusy: örän seýrek, gowşak öwrenilen görnüş, MSOP-nyň Gyzyl sahypasyna we Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen.

коричневыми тонами. **У самки голова темно-бурая с двумя поперечными белыми полосами, клюв серо-голубой.** Ноги у обоих полов серые с красным оттенком, перепонки лап серо-темные. Молодые схожи с самкой. **На воде хвост или опущен, или торчит почти вертикально.** Легко и хорошо ныряет. Летает неохотно. Очень молчалива, если подает голос, то в виде приглушенного трескучего кряканья. Длина – 43-49, крыло у самцов – 16-17,5, у самок – 15-17, размах крыльев – 63-71 см.

Сходства и различия: сходных видов нет.

Распространение: гнездится разрозненно в Средиземноморье, Закавказье, Прикаспии, Казахстане и на юге Западной Сибири. В Туркменистане на Каспии, возможно местами по долинам Этрека, Каракумдары, Теджена, Мургаба и Амударьи. Зимует на юге Средней и Передней Азии.

Образ жизни: пролетная, зимующая, на севере и в восточных частях страны, возможно, гнездящаяся птица. Весенний пролет с конца февраля и в марте, осенний – в октябре-ноябре. Придерживается пресных или солоноватых водоемов. Размножение – в июне-июле. Гнездо, обычно, из стеблей и листьев в зарослях тростника. В кладке 5-7 голубых крупных яиц с грубой, зернистой скорлупой. Держится скрытно. Питается растительной (листья, водоросли, семена) и животной (мелкие рыба и ракообразные, моллюски) пищей.

Статус: очень редкий, слабо изученный вид, внесен в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана.

LAÇYNŞEKILLILER – FALCONIFORMES – СОКОЛООБРАЗНЫЕ

Orta we uly ölçegli, daýaw gaňyrçak çünkli we şonuň ýaly egri ýiti dynakly ýyrtyjy guşlar otrýadyna degişli. Çünkünüň düýbünü ýalaňaç deri – “mumlyjyk” örtýär. Ýelek örtügi gaty, aýratyn-da ganat we guýruk ýeleklere örän gaty. Ganatlary dürli görnüşde: tokaýda ýaşýanlarynyňky – gysga we tegelenen, howada ganatlaryny ýaýup uçýanlarynyňky – inli we uly, öz pidalaryny işjeň yzarlaýan görnüşleriňki – insiz we uzyn bolýar. Barmaklary we söbükleri ýeleksiz, emma injiklerindäki ýelekler uzalyp ösen we “balak” sypatyny alýar. Gözleri uly, taraplara seredip, sähelçe öňe çykýar. Ýelek örtüginin reňki tutuk we adatça goňur, çal, gara, ak reňkleriň utgaşmasy bolup geçýär. Görnüşleriniň käbiriniň horazy mäkiýana görä açyk reňkli, emma jyns tapawutlary adatça ölçeglerde ýüze çykýar – köplenç mäkiýany horazyndan ulurak bolýar. Aýratyn jübüt bolup höwürtegeýär-ler, emma käbirleri (maýda laçynlar, dazarkeller) kiçiräk topar emele getirýär. Guşlaryň jübütligi durnukly – monogam. Jüýjeleri mejalsyz we haýal ösýär. Esasan, haýwan iýmiti – mörmöjekler, balyklar, süýrenijiler, guşlar, süýdemdirijiler, käbirleri – maslyk we zir-zibilleriň galyndylary bilen iýmitlenýär. Bu özünde 290 golaý görnüş jemleýär, Türkmenistanda üç maşgala degişli görnüşleriniň 36-sy duşýar.

Отряд хищных птиц относительно среднего и крупного размера с крепким крючковатым клювом и, как правило, кривыми острыми когтями. Основание клюва прикрыто голой кожей – «восковицей». Оперение жесткое, особенно крыльев, хвоста, и очень твердое. Крылья различной формы – короткие и закругленные у обитающих в лесу, широкие и большие – у парителей, узкие и длинные – у активно преследующих свою жертву видов. Пальцы и цевка не оперены, однако на голени перья удлинены и имеют форму так называемых «штанов». Глаза большие, обращены в стороны и несколько вперед. Окраска перьевого покрова неяркая и обычно представляет собой сочетание бурого, серого, черного и белого цветов. У некоторых видов самцы окрашены ярче, чем самки, но обычно половое различие проявляется в размерах – часто самки крупнее самцов. Гнездятся отдельными парами, но некоторые (мелкие соколы, сипы) образуют небольшие колонии. Моногамы, т.е. пары постоянны. Птенцы беспомощны и развиваются медленно. Питаются, главным образом, животной пищей – насекомыми, рыбой, пресмыкающимися, птицами, млекопитающими, некоторые – падалью и отбросами. Отряд включает около 290 видов, в Туркменистане встречаются 36, относящихся к трем семействам.

Üýşegen bürgütler – *Pandionidae* – Скопиные

Ýelek örtüginde ak we goýy-çal reňkler utgaşan, orta ölçegli, balyk iýýän ýurtyjy guşlar maşgalasyna degişli. Onuň jemi ýeke wekili duşýar.

Семейство рыбоядных хищных птиц средних размеров, в окраске оперения сочетаются белые и темно-серые цвета. Всего один представитель.

59. Balykçy bürgüt – *Pandion haliaetus* – Скопа

Meýdan alamaty: uly guş. Horazy mäkiýany bilen birmeňzeş sypatda. Ganatlary insiz we başlara garanda uzyn, guýrugy gysga we göni. **Kellesi ak, gözünüň üstünden inli gara zolak geçýär, ýeňsesindäki ýelekleri ösgün (hüpük). Arka tarapyň reňki goýy-goňur, aşagy gara tegmilli ak.** Guýrugy kese garamtyl zolakly. Ganatlarynyň eplenýän ýeriniň aşak tarapy gara tegmilli. Aýaklary daýaw barmakly gögümtil-çal we birden egrelen üiti dyrnakly. Sesi gysga – “kaý-kaý-kaý”. Uzynlygy – 55-60, ganatlary – 45-50 sm, horazlarynyň agramy - 1.6, mäkiýanlarynyňky – 1.9 kg çenli.

Meňzeşligi-tapawudy: ölçegleri boýunça beýleki ýakyn ýurtyjy guşlardan aşagy tarapyň sarymtylrak öwüşginli akdygy, üstünüň garamtyl we **agymtyl, kellesinde gözünüň üstünden geçýän gara zolagyň bardygy** bilen anyk tapawutlanýar.

Ýaýran ýeri: arealynda höwürtleýän bölegi – Demirgazyk Amerika we Ýewraziýa, onuň demirgazyk taraplarynda käbirleri, Awstraliýada. Merkezi Amerikada, Gündogar we Günorta Afrikada, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýada gyslaýar. Orta Aziýada we Türkmenistanda uçup geçende uly suw ýataklarynyň hemmesinde – Hazar deňzinden Amyderýa çenli bolan aralykda duşýar.

Полевые признаки: относительно крупная птица. Самцы и самки выглядят примерно одинаково. Крылья узкие и сравнительно длинные, хвост короткий, прямой. **Голова белая, через глаз проходит широкая темная полоса, на затылке удлинённые перья (хохол).** Характерная окраска – **спинная сторона темно-бурая, низ белый с темными пестринами.** Хвост с поперечными темными полосами. На сгибе крыла снизу хорошо заметно темное пятно. Лапы синевато-серые с мощными пальцами и круто загнутыми острыми когтями. Голос – короткое «кай-кай-кай». Длина – 55-60, крыло – 45-50 см, вес самцов около 1.6, самок – до 1.9 кг.

Сходства – отличия: от других хищных птиц, близких по размеру, хорошо отличается белым с легкой желтизной низом, темным верхом и **черной полосой, проходящей через глаз по светлой голове.**

Распространение: гнездовая часть ареала – Северная Америка и Евразия кроме северных их областей, Австралия. Зимовки в Центральной Америке, Восточной и Южной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии. В Средней Азии и Туркменистане на пролете встречается по всем крупным водоемам

Ýaşayşy: uçup geçýär, soňky ýyllarda gyslamaga galýar. Ýazyna mart-aprelde, güýzine - sentýabr-oktyabrda uçup geçýär, olaryň gijä galanlary noýabrda gabat gelýär. Uly, dury suwly, gonmak üçin amatly bolan – agaç sütünli, beýk agaçly, balyklara baý suw ýataklarynda, köllerde ýa-da suw howdanlarynda gabat gelýär. Elmydama balyk iýýär, bat bilen suwa özüni urup, gysga wagtda bedeniniň aşagy bölegini suwa çümdürüp, balygy penjeleýär. Balykly guş suwdan agyrylyk bilen göterilýär.

Statusy: seýrek guş, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen.

– от Каспия до Амударьи.

Образ жизни: пролетный вид, в последние годы отмечается и на зимовке. Весенний пролет – в марте-апреле, осенний – в сентябре-октябре, запоздалые птицы встречаются и в ноябре. Встречается на относительно крупных водоемах, богатых рыбой, предпочитает озера или водохранилища с прозрачной водой, необходимым условием является наличие мест для присады – столбов, крупных деревьев. Питается почти всегда рыбой, которую ловит, бросаясь в воду с разлета, на короткое время погружая в воду нижнюю часть тела. С пойманной рыбой летит тяжело.

Статус: редкая птица, включена в Красную книгу Туркменистана.

Gyrgylar – *Accipitridae* – Ястребиные

Uly ölçegli, ganatlary inli we tegelenen, başlara garanyňda uzyn guýrukly, ölçegleri uly, dürli möçberli ýurtyjy guşlar topary. Reňki üýtgeýän, adatça, melemtilrak-goňur ýa-da çal, köp ýa-da az görnüşde anyk menekli. Aw awlaýuş usuly we tutýan haýwanlary hem örän dürli-dürli. Bu maşgalanyň wekilleri tebigy zolaklaryň hemmesinde ýaşaýar. Olaryň umumy sany 220-ä golaý. Türkmenistanda – 26-sy duşýar.

Разнородная группа хищных птиц крупных размеров с закругленными и широкими крыльями и относительно длинным хвостом. Окраска очень изменчива, обычно буровато-коричневая или серая с более или менее заметными пестринами. Способы добывания корма и объекты питания также очень различны. Представители этого семейства обитают во всех природных зонах. Около 220 видов, в Туркменистане 26.

60. Aryşy – *Pernis apivorus* – Обыкновенный осоед

Meýdan alamatlary: gargadan ulurak ölçegli, orta ululykdaky guş. Kellesiniň üsti goňur, gögümtilrak, aşagy tarapyň reňki güýçli özgerýär – garamtyl dik menekli açyk-goňurdan ak reňke çenli.

Полевые признаки: средней величины, размером с крупную ворону. Голова сверху бурая, сизоватая, окраска низа сильно варьирует – от светло-бурой до белой, с темными продольными пестринами. Эти

Guşlaryň bu reňk özgermesi dürli ýaş toparlarynda ýüze çykýar. **Uçýan wagty guýrugynyň aşagynda üç gara zolak görünýär, şolardan iň inlisi soňky zolak.** Horazy mäkiýany bilen meňzeş reňkli, ýaşlarynyň üsti agymtyl-çypar menekli. Ýaşy ýeten guşlaryň göreji sary, ýaşlarynyňky - çal ýa-da çalymtyl-sary. Howada ýeňil uçýar, emma haýal, seýrek gaýýar. Umuman, ümsüm guş, sesi belent – “kiiýu-kiiýu”. Uzynlygy – 52-59, ganatlary – 37-43.5 sm, agramy 600-950 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: uçup barýan guşuň şekili adaty syçança çaly m edýär, emma, guýrugynyň uzynlygy we üç zolagynyň bardygy, boýnunyň has süýnmekdigi, kellesiniň ölçeginiň kiçidigi, garçygaýdan – ganatynyň insizdigi bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeýän bolegi Ýewraziýa – Beýik Britaniýadan Günbatar Sibire çenli, Kiçi we Alynky Aziýa. Merkezi we Günüorta Afrikada gýşlaýar. Orta Aziýada we Türkmenistanda tötänden uçup geçende gabat gelmegi mümkin.

Ýaşayşy: arylar, ýabany balarylary we olaryň liçinkalary, käwagt beýleki mör-möjekler, şeýle-de süýrenijiler, maýda guşlar we gemrijiler bilen iýmitlenýär.

Statusy: örän seýrek, bizde öwrenilmedik görnüş, goraga mätäç, onuň bilen duşuşyklar baradaky maglumatlaryň hemmesi ylým üçin gymmatlydyr.


цветовые вариации проявляются у птиц разных возрастных групп. **На хвосте в полете видны три темные полосы, самая широкая из которых на конце.** Самец и самка окрашены примерно одинаково, молодые сверху с беловато-рыжими пятнами. У взрослых глаза желтые, у молодых – серые или серовато-желтые. Полет легкий, но медленный, парит редко. В общем, молчаливая птица, голос – высокое «киию-киию». Длина – 52-59, крыло – 37-43.5 см, вес – 600-950 г.

Сходства – отличия: летящая птица своим силуэтом напоминает обыкновенного канюка, но отличается длинным хвостом и тремя полосами, более вытянутой шеей и головой меньшего размера, а от ястреба-тетеревятника – узкими крыльями.

Распространение: гнездовая часть ареала в Евразии – от Великобритании до Западной Сибири, в Малой и Передней Азии. Зимует в Центральной и Южной Африке. В Средней Азии и Туркменистане может быть встречен на пролете и залетах.

Образ жизни: питается осами, шмелями и их личинками, иногда другими насекомыми, а также пресмыкающимися, мелкими птицами и грызунами.

Статус: очень редкий, у нас не изученный вид, нуждается в охране, все сведения о встречах представляют большую научную ценность.



Ýurtyjy guşlaryň uçup barýarka görnüşi: 1 – tüýlek aýakly syçançy; 2 – depe syçançysy; 3 – syçançy; 4 – aruçy; 5 – laçyn; 6 – meýdan gulatysy (horazy); 7 – garçygaý; 8 – gara çaykel; 9 – batga (gamyş) gulatysy (horazy).

Хищные птицы в полете: 1 - зимняк; 2 - курганник; 3 - канюк; 4 - осоед; 5 - сапсан; 6 - полевой лунь (самец); 7 - тетеревятник; 8 - черный коршун; 9 - болотный (камышевый) лунь (самец).

61. Gara çaýkel – *Milvus migrans* – Черный коршун

Meýdan alamatlary: garga-dan tokarrak, orta ululykdaky guş. Mäkiýany horazyndan sähelçe uly, emma, reňkleri meňzeş. Arkasy goýu-goňur, kellesi biraz ýagty, aşaky tarapy çuparrak-goňur (arkasyndan açygrak), dik garamtyl çyzykly. **Guýrugy oýuk, aýratyn-da uçanda oňat görünyär.** Ýaşlary uluçypar tegmilli goýu-goňur reňkli we guýrugy ak uçly. Ýaşynyň üçünji ýylynda doly uly guşlaryň sypatyny alýar. Aýaklary başgalara garanynda, has gysga, çünki we dyrnaklary gara. Sesi taýçanagyň kişgemesini ýatladýar, sandyrowukly gykylyk - “iiiiý-ýuýuýüýüýü”. Uzynlygy – 48-58, ganaty – 41-51.5 sm, agramy 800 g golaý.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ýurtyjy guşlaryň beýlekilerinden **guýrugynyň oýukdygy bilen oňat tapawutlanýar.**

Ýaýran ýerleri: giň – tutuş Ýewraziýa, onuň demirgazyk welaýatlaryndan başgasynda, Afrika-da, Awstraliýada. Orta Aziýada we Türkmenistanda düzlük, şeýle-de daglyk giňişlikleriniň hemme ýerlerinde duş gelýär. Afrikanyň we Günorta Aziýanyň tropik welaýatlarynda guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýär, höwürtleýär, bir bölegi guşlaýar ýa-da uçup gezýär (uly guşlaryň käbirleri köpelmäge gatnaşmaýar). Uçup geçýän wagty dowamly: ýazyna fewralyň aýagyndan maýyň başyna çenli, güýzüne – awgustyň soňundan noýabryň aýagyna çenli geçýär. Höwürtelände derýalaryň ýa-kasyndaky jeňňellikde, pisseliklerde we dagetegi düzlüklerlerdeki gan-dymlykda, derelerdäki gyrymsy agaçlarda, daglardak arçalarda,

Полевые признаки: средней величины, крупнее вороны. Самка чуть больше самца, хотя окрашены одинаково. Спина темно-бурая, голова несколько светлее, низ рыже-вато-коричневый (светлее спины), с темными продольными штрихами. **Хвост с хорошо заметной, особенно в полете, вырезкой.** Молодые темно-бурые, в крупных рыжих пятнах и с белым концом хвоста. Окончательный наряд появляется к третьему году жизни. Ноги относительно короткие, клюв и когти черные. Голос – вибрирующий крик, напоминающий ржание жеребенка – «ииииий-юююююю». Длина – 48-58, крыло – 41-51.5 см, вес – около 800 г.

Сходства – отличия: от других хищников **хорошо отличается выемчатым хвостом.**

Распространение: широкое – вся Евразия, кроме северных областей, Африка, Австралия. В Средней Азии и Туркменистане встречается повсеместно как на равнинах, так и в горах. Зимует в тропических областях Африки и Южной Азии.

Образ жизни: пролетает, гнездится, часть особей зимует или летует (некоторые взрослые не участвуют в размножении). Сроки полета растянуты: весной – с конца февраля до начала мая, осенью – с конца августа до конца октября. На гнездовье предпочитает приречные тугаи в долинах, фисташники и кандымники в предгорьях, древесно-кустарниковые участки в ущельях и арчевники в горах, редко – по обрывам чинков. Гнездятся

се́рек гаýalaryň erňeklerinde höwürtleýär. Aýratyn jübüt, ýöne seýrek topar bolup höwürtleýär. Apreliň birinji ýarymynda, käte martda 2-3 sany goňur menekli kirliräk-ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 41-44 x 54-59 mm. Ýulyň birinji ýarymynda jüyjeleri uçurym bolýar. Ýymiti örän dürli - maýda guşlar, gemrijiler, süýrenijiler (ýylanlar, pyşdyllar), suwuň ýüzüne gaýýan balyklary, mörmöjekleri, maslyklary we zir-zibilleri çöplemekleri hem mümkin.

Statusy: az sanly, uçup geçýän döwüründe, käbir ýerlerde adaty guş.

62. Uzynguýruk suw bürgüdi – *Haliaeetus leucoryphus* – Орлан-долгохвост

Meýdan alamatlary: beden gur-luşy gelşikli, örän uly, emma akguýruk suw bürgüdinden kiçiräk guş. Ýaşy ýeten horazy ýaşyl öwüşgünli gara-goňur reňkli, kellesi, bokurdagy we petekesi agymtyl, ganatlary gara, **düýbi goňur we ujy zolakly ak guýrukly.** Mäkiýany horazyndan biraz ulurak we öçügsi reňkli. Ýaşlarynyň ilkinji ýelek örtügi açyk-goňur reňkli, kellesiniň gapdallary gara zolakly, guýrugy gara, ýetişen guşuň sypatyna, diňe, dördünji ýyl gutarnyky geçýär. Sesi üýrjü – “kuok-kuok”. Uçuşy ýeňil, howada oňat gaýýar. Ganaty – 52-65 sm, agramy – 2.5-4 kg.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ýaşy ýeten guşlar beýleki ýurtyjy guşlardan kellesiniň has agymtyldygy we **goýu-goňur uçly guýrugynyň ak uzyndygy** bilen oňat tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän arealy – Gazagystan, Merkezi Aziýa, günorta Gimalaý daglarynyň dag-eteklerine çenli ýaýran. Orta we Alynyk

отдельно, но нередко и группами. Гнезда – в первой половине апреля, а иногда и с конца марта. Кладка – 2-3 грязно-белых с бурыми пятнами яиц, размеры – 41-44 x 54-59 мм. Вылет молодых – в первой половине июля. Питается очень разнообразной пищей – некрупными птицами, грызунами, пресмыкающимися (змеями, мелкими черепахами), снулой рыбой, насекомыми, может подбирать падаль и отбросы.

Status: немногочисленная, местами на пролете обычная птица.

Полевые признаки: очень крупная птица стройного телосложения. Меньше орлана-белохвоста. Взрослый самец черно-бурый с фиолетовым блеском, голова, горло и зоб беловатые, крылья черные, **хвост белый с бурым основанием и полосой на конце.** Самки несколько крупнее самцов и окрашены тусклее. Молодые в первом гнездовом наряде светло-бурые, по бокам головы – темные полосы, хвост черный, окончательный взрослый наряд – только на четвертом году жизни. Голос – лающий «куок-куок». Полет относительно легкий, хорошо парит. Крыло – 52-65 см, вес – 2.5-4 кг.

Сходства – отличия: взрослые птицы хорошо отличаются от других крупных хищников более светлой головой и довольно длинным **белым с темно-бурой вершиной хвостом.**

Распространение: гнездовой ареал – Казахстан, Центральная

Aziýanyň günortasynda, Päkistanda we Demirgazyk Hindistanda gyslaşar. Türkmenistanda – Hazar deňziniň kenarykasynda, köllerde, suw howdanlarynda we uly derýalaryň jülgelelerinde duşmagy mümkin.

Ýaşayşy: uçup geçýär we gyslaşar, bizde höwürtegeýändigigi belli däl, ýöne tomsuna duşýandygy belli. Gyslaşan guşlar fewral aýynyň ikinji ýarymyndan uçup gidýär, güzüne - sentýabryň aýagynda-oktyabrda ilkinji uçup geçýän guşlar hökmünde gabat gelýär. Uly suw ýataklarynyň kenarlarynda ýaşayar. Akguýruk suw bürgüdi ýaly, esasan, balyklar, şeýle-de suwda ýüzýän guşlar, maýda süýdemdirijiler bilen iýmitlenýär, maslykdan hem ýüz öwürmeýär.

Statusy: örän seýrek görnüş, MSOP-nyň Gyzyly sahypasyna we Türkmenistanyň Gyzyly kitabyna girizilen. Onuň gabat gelýändigigi baradaky habarlar gymmatly ylmy maglumatdyr.

63. Akguýruk suw bürgüdi – *Haliaeetus albicilla* – Орлан-белохвост

Meýdan alamatlary: biziň ýurdumyzyň ýurtyjy guşlaryndan iň ulularynyň biri. Bürgütdeň ulurak. Çünki we aýaklary örän däýaw, umumy beden gurluşy deşlek we süňni agyr. **Ganatlary inli we uzyn** (gerimi 2.5 m çenli). Reňki goýy-goňur, kellesi, boýny we bedeniniň aşaky tarapyndaky ýelekleri has açyk reňkli. Guýrugy **başgalara garanynda, gysga, pahnäşekilli, ulularynyňky ak we ýaşlarynyňky – garmtyl.** Mäkiýany diňe ölçegleriniň uludygy bilen tapawutlanýar. Ýaşlarynyň üsti goňur, aşagy - açyk-goňur reňkli. Ýaşynyň dördünji ýylynda uly guşlaryň reňkini alýar. **Uly guşlaryň**

Азия, к югу до предгорий Гималаев. Зимовки – на юге Средней и Передней Азии и южнее – в Пакистане и Северной Индии. В Туркменистане может встречаться на побережье Каспия, по озерам, водохранилищам и долинам крупных рек.

Образ жизни: пролетает и зимует, у нас гнездование не доказано, хотя летние встречи известны. Отлет зимующих особей уже во второй половине февраля, осенью первые пролетные птицы появляются в конце сентября – в октябре. Обитает по берегам крупных водоемов. Питается, как орлан-белохвост, в основном, рыбой, а также водоплавающими птицами, мелкими млекопитающими, не гнушается падалью.

Статус: очень редкий вид, включен в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана. Сведения о встречах представляют большой научный интерес.

Полевые признаки: одна из крупных хищных птиц нашей страны. Крупнее беркута. Клюв и лапы очень массивны, телосложение, в целом, мощное и тяжелое. **Крылья широкие и длинные** (в размахе до 2.5 м). Окраска темно-бурая, более светлая на голове, шее и нижней стороне тела. Хвост **относительно короткий, клиновидный, белый у взрослых и темный у молодых.** Самки отличаются только более крупными размерами. У молодых весь верх бурого цвета, низ светло-бурый. Окончательный наряд – на четвертом году жизни. **Клюв у взрослых желтого, молодых**

çünki sary, yaşlarynyňky – garmtyl reňkli, söbügi yeleksiz. Sesi gagyldayly - “kra-kra-kra” ýa-da üýrüji - “kiý-kiý-kiý”. Beýleki bürgütlere garanynda has agyr uçýar, emma olardan tapawutlylykda howada seýrek gaýýar. Uzynlygy – 60-100, ganaty – 55-71.5 sm, agramy – 2-3-den 6-9 kg çenli.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: beýleki bürgütlerden, olar uçan wagty ganatlarynyň uzynlygy we inlidigi, guýrugynyň gysgadygy we **sähelçe pahnäşekilli akdygy bilen** oňat tapawutlanýar. Ýaşlarynyň beden örtüginini tutuşlygyna garmtyldygy sebäpli, kesgitlemek kyn. Çünkiniň äpet uly bolmagy ünsüni çekýär.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeýän ýerleri – Demirgazyk we Gündogar Ýewropa, Grenlandiýa, gündogara – Demirgazyk Aziýa, Kamçatka we Uzak Gündogara çenli, günorta – Merkezi, Orta, Alyňky we Kiçi Aziýanyň käbir ýerlerinde. Gyşyna bu guşlaryň bir bölegi günorta tarap, arealynda höwürtegeýän raýonlaryna we sähelçe günorta – Gimalaý daglarynyň etegine çenli uçup gidýär. Türkmenistanda, esasan, deňziň we ýurduň içki suw ýataklarynyň kenarykasynda, uly derýalaryň jülgelelerinde gabat gelýär.

Ýaşayşy: uçup geçýär we gyslaşar, bir bölegi uçup geçýär. Ýazyna marta we apreliň aýagyna çenli, güzüne – noýabrda uçup geçýär. Güýz-gyş döwründe bu guşlar Hazar deňzinde, Sarygamyş kölünde we Derýalyk zeý akabasynda has köp duşýar. Esasan, gurpdan gaçan, keselli, suwda ýüzýän guşlar (sakarbaraklar, ördekler, seýrek – guwlar, gyzyly gazlar), balyklar hatda maslyk bilen hem iýmitlenýär.

Statusy: gyş döwründe sany dur-

– **темного цвета,** лапы не оперены. Голос – каркающее или лающее «кра-кра-кра» или «кий-кий-кий». Полет более тяжелый, чем у орлов, но в отличие от них редко парит. Длина – 60-100, крыло – 55-71.5 см, вес – от 2-3 до 6-9 кг.

Сходства – отличия: взрослая птица от других орлов в полете хорошо отличается длинными и широкими крыльями, коротким и **слегка клиновидным белым хвостом,** молодых определить труднее из-за темного оперения всего тела. Обращает на себя внимание необычно массивный клюв.

Распространение: область гнездования – Северная и Восточная Европа, Гренландия, на восток – Северная Азия, за исключением тундр, до Камчатки и Дальнего Востока. К югу – местами в Центральной, Средней, Передней и Малой Азии. Зимой часть особей отлетает в южные районы гнездовой части ареала и чуть южнее – до предгорий Гималаев. В Туркменистане встречается, в основном, на морском побережье и водоемам внутри страны, включая долины крупных рек.

Образ жизни: пролетает и зимует, часть особей летует. Пролет весной в марте и до конца апреля, осенью – в ноябре. Относительно больше этих птиц отмечается в зимний период на Каспии, Сарыкамыше и по Дерьялыку. Питаются, в основном, ослабевшими и больными водоплавающими птицами (лысухи, утки, режы – лебеди, фламинго), рыбой и даже падалью.

Статус: редкий вид со стабильной численностью в зимний пери-

nukly, seýrek görnüş. Tutmak we awlamak gadagan.

64. Sakgally garaguş – *Gypaetus barbatus* – Бородач

Meýdan alamatlary: ýurtyjy guşlaryň iň ulularynyň biri. **Ganatlary insiz we uzyn.** Üsti gamtyl ýa-da gara, kellesi we aşaky tarapy çypar ýokundyly agymtyl. **Çünkinden başlanýan zolak gözünüň üstünden geçýär we** gara gyllardan ýa-da saçpisint gaty ýeleklerden emele gelen **çowly “sakgaljygy”** bolýar. **Guýrugy uzyn, pahnäşekilli, arkasy bilen birmeňzeş reňkde.** Horazy we mäkiýany daşky sypaty boýunça tapawutlanmaýarlar, ýaşlarynyň üsti goýy-goňur, aşagy-açyk-goňur, uly guşuň ýelek örtüginini birnäçe ýyldan soň alýar. Adatça, ümsüm, sesi sykylyga çalymdaş. Uzynlygy – 105-125, ganaty – 72-93 sm, ganatlarynyň gerimi - 2,75 m çenli, agramy - 5-7 kg.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: öz-boluşly daşky görnüşi–“sakgaljygy”, **guýrugynyň pahnäşekilli uzyndygy** we ganatlarynyň insizräk uzyndygy bilen aňsat tanalýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta Ýewropanyň daglyk ýerleri (käbir ýerlerinde), Kiçi we Alynky Aziýa, Kawkaz, Orta we Merkezi Aziýa, Günorta Gimalaý daglary, Demirgazyk we Gündogar Afrika, Arabystan. Türkmenistanda – Uly we Kiçi Balkan daglarynda, Köpetdagda, Badhyzda, Köýtendagda, mümkin Garabilde, Gubadagda.

Ýaşayşy: oturymly guş. Daglaryň ýokarky kemerlerinde - arçalyk zolakda, gaýalaryň arasynda, çuň derelerde we beýik dag ulgamynyň gyra çetlerinde höwürtegeýär. Ýimit gözleginde dagetegindeki düzlükle-

од. Отлов и добыча запрещены.

Полевые признаки: одна из крупных хищных птиц. **Крылья узкие и длинные.** Верх темный или почти черный, голова и низ беловатые с рыжеватым налетом. **Полоса, идущая от клюва через глаз, и острая «бородка»,** образованы из черных щетинок или жестких волосяных перьев. **Хвост длинный, клиновидный, одинакового со спиной цвета.** Ноги слабые, оперены до пальцев. Самцы и самки внешне не отличаются, молодые сверху темно-бурые, снизу – светло-бурые, смена наряда у них в окончательный взрослый происходит в течение нескольких лет. Обычно молчалив, голос похож на свист. Длина – 105-125, крыло – 72-93 см, размах крыльев – до 2,75 м, вес – 5-7 кг.

Сходства – отличия: легко узнается по своеобразной внешности – наличию «бородки», **длинному клиновидному хвосту** и длинным не широким крыльям.

Распространение: в горных областях Южной Европы (локально), Малой и Передней Азии, Кавказа, Средней и Центральной Азии, в Южных Гималаях, Северной и Восточной Африке, Аравийском полуострове. В Туркменистане – Большие и Малые Балханы, Копетдаг, Бадхыз, Койтендаг, возможны залетов, Карабиль, Кубадаг.

Образ жизни: оседлая птица. Гнездится в верхнем поясе гор – в зоне арчи, среди скал, по глубоким ущельям и окраинам высокогор-

re hem aralaşýar. Gyşyna – dekabrdä 1-2 sany çypar ýokundyly agymtyl ýumurtgalary goýýar. Ýanwar-fewralda jüýjeleýär we iýunda olar uçurym bolýarlar. Esasan, toýnakly, ýabany we öý haýwanlaryň maslyklary, maýda süýdemdirijiler, puşdyllar bilen iýmitleýär.

Statusy: örän seýrek, sany azalýan görnüş. Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen. Tutmak we awlamak gadagan. Türkmenistanyň daglyk ýerlerindeki goraghanalaryň guşlarynyň iň täsin wekilleriniň biri.

65. Maslykçy – *Neophron percnopterus* – Стервятник

Meýdan alamatlary: beýleki garaguşlara garanynda, uly guş, emma gajarlaryň arasynda maýdasy hasaplanýar. Çünki inçeden uzyn, ejiz, onuň ýarysyna golaýyny “mumjyk” tutýar. **“Ýüzi” we bokurdagy mämişi reňkli, ýalaňaç. Ýeňsesiniň we boýununyň ýelekleri özboluşly ýaka emele getirýär. Uly guşlaryň gara ganatlary çowly ak reňkli.** Guýrugy uzyn, basgançakly. Aýaklary inçe we uzyn, mawymtyl-çal reňkli. Ýaşlary çypar menekli goňur, ýaşynyň başinji ýylynda uly guşlaryň ýelek örtüginine geçýär. Ümsüm. Uzynlygy – 55-65, ganaty – 46-72 sm, agramy – 2.0-2.4 kg.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ululary ölçegleriniň kiçidigi we gajarlaryň beýleki görnüşlerinden – ýelek örtügininiň akdygy we ganatlarynyň uçlarynyň garadygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Afrika, tropik tokaý zolagyndan başgasynda, Günorta Ýewropa, Arabystan, Kiçi, Orta we Günorta Aziýa. Türkmenistanda - oazislardan we aklaň gum depeli


ных плато. В поисках корма может вылетать в предгорья. Кладка – 1-2 беловатых с рыжеватым налетом яиц, гнездование зимой – с декабря. Птенцы вылупляются в январе-феврале, и только к середине июня они поднимаются на крыло. Питается, в основном, падалью диких копытных или домашних животных, более мелких зверей, черепаками.

Статус: очень редкий, сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу Туркменистана. Один из интересных представителей наших горных заповедников.

Полевые признаки: относительно крупная птица, хотя среди грифов считается мелким. Клюв тонкий длинный слабый, почти половину его занимает восковица. **«Лицо» и горло голые, оранжевого цвета. Перья затылка и шеи образуют своеобразный воротник. Взрослые – белого цвета с заостренными черными крыльями.** Хвост длинный, ступенчатый. Лапы тонкие и длинные, голубовато-серого цвета. Молодые бурые, с рыжеватыми пестринами, окончательный взрослый наряд приобретают на пятом году жизни. Молчалив. Длина – 55-65, крыло – 46-52 см, вес – 2.0-2.4 кг.

Сходства – отличия: взрослые особи отличаются от других грифов меньшими размерами, и белым оперением с черными концами крыльев.

Распространение: Африка, включая зону тропических лесов, Южная Европа, Аравия, Малая, Средняя и Южная Азия. В Туркме-



Ýyrtýjy guşlaryňuçup barýarka görnüşi: 1 – gajar; 2 – dazarkel; 3 – sakally garaguş; 4 – maslykçy; 5 – bürgüt (ýaşı); 6 – bürgüt (ýaşı ýeteni); 7 – akguýruk suw bürgüdi; 8 – uzyn-guýruk suw bürgüdi; 9 – mazar garaguşy; 10 – balukçy bürgüt; 11 – sähra garaguşy; 12 – ýylançy gurgy.

Хищные птицы в полете: 1 - черный гриф; 2 - белоголовый сип; 3 - бородач; 4 - стервятник; 5 - беркут (молодой); 6 - беркут (взрослый); 7 - орлан-белохвост; 8 - орлан-долгохвост; 9 - могильник; 10 - скопа; 11 - степной орел; 12 - змеяед.

giňşliklerden gaçarak durup, hemme ýerlerde duşýar. Demirgazyk Afrikada, Arabystanda, Alynky Aziýada we Demirgazyk Hindisranda gýşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýär we höwürtegeleýär. Martyň başynda uçup gelyär we oktyabrda uçup gidýär. Olaryň uçup gelyän wagty, köpelyän döwri bilen gabat gelyär. Baýyrykdaky gum gaýalarda, dagyň eginlerindäki tekjelerde höwürtegeleýär. Jübüt guşlar azyndan iki höwürtege gurýar we olary dürli ýyllarda gezeleşdiriip ulanýar. Apreliň soňky günlerinde (has gijä galany – iýun aýunyň ikinji ýarymynda) 2 sany çyppak-ak ýumurtga goýýar, ölçegleri - 43-56 x 58-76 mm. Jüýjeleri iýunda uçurym bolýarlar. Esasan, maslyk we zyňyndy zir-zibiller bilen ýmitlenýär.

Statusy: az sanly guş, MSOP-yn Gyzyt sahypasyna we Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizilen.

66. Gajar – *Aegypius monachus* – Черный гриф

Meýdan alamatlary: agramy boýunça sakgally garaguşdan we akguýruk suw bürgütinden ýokary bolan uly ýyrtýjy guş. Ulularynyň ýelek örtügi goýy-goňur, ganatlary gara. «Ýüzi» ýalaňaç, kellesi goňur sütük ýelekler bilen örtülen, şonuň ýaly ýalaňaç boýny edil «ýüzi» ýaly, gögümtil ýa-da agymtyl reňkli. **Boýnunyň çykýan yeriniň töweregindäki ýakalyk agymtyl-goňur ýeleklerden durýar, boýnunyň sütük ýelekleri tüýdülip aýrylýar.** Ganatlary uzynadan inli, uçlary, aýratyn-da gaýyp uçanda gerilip açylyar. Ýaşlary ululara garanynda garamtylrak – gara-goňur. Deşli çünki goýy-şahsypat reňkli, dyrnaklary gara. Sesi – özboluşly hyžlama. Uzynlygy

нистане встречается почти повсеместно, избегает оазисов и барханных песков. Зимовки – Северная Африка, Аравия, Передняя Азия и Северный Индостан.

Образ жизни: пролетный и гнездящийся вид. Прилетают, примерно, в начале марта, отлет в октябре. Начало размножения совпадает с прилетом. Гнездится по обрывам холмов, чинкам и карнизам скал. Пары имеют не менее двух гнезд, занимаемых поочередно в разные годы. Кладка в конце апреля (известны и более запоздалые – во второй половине июня), состоит из 2 рыжевато-белых яиц, размеры – 43-56 x 58-76 мм. Вылет молодых в июне. Питается, главным образом, падалью и отбросами.

Статус: немногочисленная птица, внесена в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана.

Полевые признаки: очень крупная хищная птица, по весу превосходящая даже бородача и орлана-белохвоста. Взрослые сплошь темно-бурые, крылья черные. «Лицо» голое, голова покрыта бурым пухом, голая шея, как и «лицо», голубоватого или белесого цвета. **Воротник вокруг основания шеи из бледно-бурых перьев, пух на шее обнашивается.** Крылья широкие длинные, концы растопырены, особенно, при парении. Молодые темнее взрослых – черно-бурые. Массивный клюв темно-роговой, когти черные. Голос – своеобразное шипение. Длина – 100-115, крыло – 71.5-82.5 см, вес – 7-12.5 кг.

– 100-115, ganaty – 71.5-82.5 sm, agramy – 5-12.5 kg.

Meňzeşlikleri–tapawutlary: daz-zarkelden reňkiniň garamtyldygy, akguýruk suw bürgütiden guýrugynyň we çüňküniň garamtyldygy bilen tapawutlanýar, olaryň gabarasy birmeňzeş, emma dürbüsiz görnüşlerini uzakdan tapawutlandyrmak kyn.

Ýaýran ýerleri: Günorta Ýewropanyň, Demirgazyk-Günbatar Afrikanyň, Arabystanyň, Krymyň, Kawkazyň, Alynky, Ortaky, Merkezi we Günorta Aziýanyň daglyk ýerlerinde. Kawkazda, Alynky we Merkezi Aziýada we Hindistanyň demirgazygynda gyslaýar. Türkmenistanda – Uly we Kiçi Balkanda, Köpetdagda, Garabilde, Köýtendagda, köpelenden soň Garagumuň käbir ýerlerinde.

Ýaşayşy: höwürtgelyär, bölekleyin oturymly, emma köpüsi sowuk wagty günorta tarap göçýär. Güzüne oktyabryň aýagynda we noýabrda uçup gidýär, ýazyna – fewralda uçup gelýär. Agaçlaryň üstünde, dagda arça agajynda, Bathyzda - pissede höwürtgelyär. Iýmit gözlegi üçin uzakdaky düzlük giňişliklere gidýär. Mart-apreliň başynda gabygy kirliräk-ak reňkli 1 ýumurtga goýýar, ölçegleri – 62-72 x 84-97 mm. Maýaýynda jüýjesi çykýar, iýulda uçurym bolýar, awgustda höwürtgäni taşlayar. Esasan, ölen gara mallaryň, ýabany toýnaklylaryň, uly gemrijileriň maslyklary, käte suwulganlar bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek, baş sany azalýan görnüş hökminde MSOP-ýň Gyzyt sahypasyna we Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizilen. Türkmenistanyň daglyk ýerlerindäki goraghanalaryň we Bathyzyň guşlarynyň iň täsin wekilleriniň biri.

Сходства – отличия: от белоголового сипа отличается темной окраской, от орлана-белохвоста – темным хвостом и клювом, их силуэты схожи, но без бинокля высоко в полете они трудно различимы.

Распространение: горные области Южной Европы, Северо-Западной Африки, Аравии, Крыма, Кавказа, Передней, Средней, Центральной и Южной Азии. Зимой на Кавказе, в Передней и Центральной Азии и на севере Индостана. В Туркменистане – Большие и Малые Балханы, Копетдаг, Бадхыз, Карабиль, Койтендаг, вне гнездовое время местами в Каракумах.

Образ жизни: гнездящаяся, частично оседлая птица, но большинство в холодное время года отлетает к югу. Осенний отлет – с конца октября и в ноябре, весной появляются в феврале. Гнездится на деревьях: в горах на арче, в Бадхызе на фисташках. Кормовые вылеты совершает далеко на равнины. Кладка – в марте-начале апреля, состоит из одного яйца грязновато-белого цвета, размером 62-72 x 84-97 мм. Вылупление птенцов в мае, в июле они поднимаются на крыло, в августе покидают гнездо. Питаются, в основном, падалью – павшим скотом, дикими копытными, крупными грызунами, иногда ящерицами.

Статус: как редкий, сокращающийся в численности вид включен в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана. Один из интересных представителей птиц Бадхызского и горных заповедников Туркменистана.

67. Dazzarkel – *Gyps fulvus* – Белоголовый сип

Meýdan alamatlary: ganatlary uzyndan inli uly guş. Umumy reňkli ýagty, **kellesi we boýny gytyk ak sütük ýelekler bilen örtülen, ýakalygy gür ösen açyk reňkli sütük ýeleklerden durýar.** Arkasy we ganatlarynyň üsti melemtil-goňur reňkli, aşagy garamtylrak, çuparrak-goňur, **ganatlarynyň aşagy we biraz tegelenen guýrugy gara.** Ýaşlarynyň dayaw çüňki goňur, uly guşlaryňky – sarymtylrak, aýaklary çal. Ýaşlary uly guşlara garanynda garamtylrak, goňurrak, ýakalygy uzyn, çowly çuparrak-goňur ýeleklerden durýar. Işjeň uçmakdan howa göterilende we jübütleşme oýunlarynda peýdalanýar, adatça gaýup uçýar. Uzynlygy – 95-110, ganaty – 69-76 sm, agramy – 7 kg golaý.

Meňzeşlikleri–tapawutlary: gajardan reňkiniň ýagtydygy, kellesiniň we ýakalygynyň akdygy, maslykçydan ölçegleriniň has uludygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Demirgazyk-Günbatar we Demirgazyk-Gündogar Afri-kanyň, Günorta Ýewropanyň, Krymyň, Kawkazyň, Alynky we Merkezi Aziýanyň daglary – Tibet we Gimalaý daglaryna çenli. Türkmenistanda, esasan, Uly Balkanda, Köpetdagda, Bathyzda, Garabilde, Köýtendagyna çenli; bölekleyin Murgar, Amyderýa jülgelerinde we Garagumda duş gelýär.

Ýaşayşy: höwürtgelyär, bölekleyin oturymly, gonup-göçýän guş. Esasan, daglyk ýerlerde ýaşayar, emma derýalaryň gaýaly kenarlarynda hem seýrek duşýar. Bu guşlaryň esasy bölegi noýabr we mart

Полевые признаки: крупная птица с длинными широкими крыльями. Общая окраска светлая, **голова и шея покрыты коротким белым пухом, воротник из густого светлого пуха.** Спина и верх крыльев землянисто-бурого цвета, низ темнее, рыжевато-бурый, **крылья снизу и несколько закругленный хвост – черные.** Массивный клюв бурый у молодых и с желтизной у взрослых, ноги серые. Молодые темнее взрослых, коричневатые, воротник из длинных заостренных рыжевато-бурых перьев. Активным полетом пользуется только при взлете и брачных играх, обычно парит. Длина – 95-110, крыло – 69-76 см, вес около 7 кг.

Сходства – отличия: от черного грифа отличается светлой окраской, белой головой и воротником, от стервятника заметно крупными размерами.

Распространение: горы Северо-Западной и Северо-Восточной Африки, Южной Европы, Крыма, Кавказа, Передней и Центральной Азии – до Тибета и Гималаев. В Туркменистане распространен, в основном, в горах: от Больших Балханов на восток – Копетдаг, Бадхыз, Карабиль – до Койтендага; нерегулярно встречается по долинам Мургаба и Амударьи, в Каракумах и Прикарабогазье.

Образ жизни: гнездящаяся, частично оседлая, кочующая птица. Обитает, в основном, в гористых местностях, но изредка по обрывистым речным берегам. Основная часть птиц между ноябрем и мартом откочевывает на юг. В последние годы, особенно в теплые зимы,

áylarnyň aralygynda günorta tarap göçýär. Soňky ýyllarda, ýyly gýşlarda höwürtgeler ýerlerinde galýar. Olar kiçiräk topar bolup, käte ýekelikde hem höwürtgeler ýär. Jübütligi durnukly, barmasy kyn bolan gaýalarda guran höwürtgelerini birnäçe ýyllap ulanýar. Fewralda, martyň başynda 1 sany kirliräk-ak ýumurtgany goýýar, ölçegleri - 64-75 x 81-101 mm. Iýulda jüýjeleri uçurym bolýarlar. Esasan, öý haýwanlarynyň, seýregräk ýabany toýnaklylaryň maslyklary bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly görnüş, emma iýmit goruna baglylykda olaryň sanynyň azalmagy mümkin. Tutmak we awlamak gadagan.

68. Ýylançy gyrgy – *Circaetus gallicus* – Змея

Meýdan alamatlary: garaguş keşpli uly ýyrtyjy guş. **Oturan guşyň kellesi çal, uly sary gözleri çäksiz uly ýaly bolup görünýär.** Arka tarapy goňur, garny üýtgäp durýan nagyşly agymtyl, ýygy-ýygydan garamtyl kese zolaklar geçýär, bokurdagy we petekesi ala-goňur. Ganatlary inli, uçýan wagty uçgy ýelekleri dürli taraplara ýerbe-ýer goýulan, başgalara garanynda, uzyn, sähelçe tegelenen guýrugy 3-4 sany tutuk garamtyl zolakly. Horazy-mäkiýany daşyndan tapawutlanmaýar, ýaşlarynyň ganatlarynyň we guýrugynyň uçlary agymtyl gaýalan. Uçýan döwründe, edil göwenek ýaly ganatlaryny ýygy-ýygydan kakurp, dowamly saklanyp bilýär. Uzynlygy – 62-69, ganaty – 52-60.5 sm, agramy – 1.2-2.0 kg.

остаются в районах гнездования. Гнездится, чаще всего, небольшими колониями, но отмечаются и одиночно расположенные гнезда. Пары постоянны, гнезда, построенные на труднодоступных карнизах скал и обрывов, используются в течение нескольких лет. Кладка, скорее всего, в феврале – начале марта, состоит из одного яйца грязно-белого цвета, размером 64-75 x 81-101 мм. Молодые поднимаются на крыло в июле. Питается, в основном, падалью, основу которой составляют трупы домашних животных, реже диких копытных.

Статус: немногочисленный вид, численность может сокращаться в зависимости от кормовой базы. Отлов и добыча запрещены.

Полевые признаки: довольно крупная хищная птица с орлиным обликом. **У сидящей птицы серая голова с крупными желтыми глазами кажется несоизмеримо большой.** Спинная сторона бурая, брюшная беловатая с изменчивым рисунком, чаще с темными поперечными полосками, горло и зоб – в коричневатых пестринах. Крылья широкие, в полете перья на концах расставлены в разные стороны, довольно длинный, слегка закругленный хвост с 3-4 неяркими темными полосами. Самец и самка внешне не отличаются, у молодых концы крыльев и хвоста со светлыми каймами. Во время полета может ненадолго повисать, как пустельга, вибрируя крыльями. Длина – 62-69, крыло – 52-60.5 см, вес – 1.2-2.0 кг.

Meňzeşlikleri–tapawutlary: uçýan wagty reňki çalymtyl görünýär, depe syçaңcydan guýrugyndaky zolaklary, tüýlek aýakly syçaңcydan we balykçy bürgütünden – ganatlarynyň eplenýän ýerlerinde gara tegmiliň yokdygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtgeler ýän döwründe ýaýrawy giň - Afrika-Sahara çölünden başga-da, Günorta we Orta Ýewropa, Alyňky we Orta Aziýa, Hindistanyň demirgazygy. Türkmenistanda - Garagumdan başlap, daglyklara çenli, dageteklerinde we derýalaryň jülgelerinde gabat gelýär. Afrikada, Arabystanda we Aziýanyň günortasynda gýşlaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän-höwürtgeler ýän guş. Ýazyna martda uçup gelýär, güýzine - awgust-sentyabrda uçup gidýär. Agaçlaryň üstünde höwürtgeler gurýar: çölde sazagyň, Bathyzda pissäniň, dagda arçalaryň ýa-da gaýalaryň erňeklerinde. Martyň soňyndan maýyň başyna çenli 1 sany ak reňkli ýumurtgany goýýar, ölçegleri - 59 x 75 mm. Düzlük giňişliklerde aw edýär, ýylanlar we suwluganlar, (hažžyklar, ýylançyrlar) bilen iýmitlenýär.

Statusy: sany azalýan görnüş, Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizilen. Tutmak we awlamak gadagan.

69. Gamyş (batga) gulatysy – *Circus aeruginosus* – Болотный лунь

Meýdan alamatlary: gargadan ulurak, gulatylaryň içinde has ulusy. Horazy we mäkiýany biri-birlerinden oňat tapawutlanýarlar. **Horazyň üsti goňur, emma kellesi we eginleri açyk reňkli, çyparrak, aşaky tarapy agymtyl-çyparrak. Guýrugy goňurrak-gögümtil çal. Mäkiýany bir reňde goýy-goňur, kellesiniň üsti**

Сходства – отличия: в полете кажется серым, от курганника отличается полосами на хвосте, от зимняка и скопы – отсутствием темных пятен на сгибе крыла.

Распространение: на гнездовье широко распространен в Африке, исключая Сахару, в Южной и Средней Европе, в Передней и Средней Азии, на севере Индии. В Туркменистане встречается во многих местах, начиная от Каракумов до горных районов, предгорий и речных долин. Зимует в Африке, Аравии и на юге Азии.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весной прилетает с конца марта, осенний пролет с середины августа, в сентябре. Гнезда строит на деревьях, например в пустыне на саксауле, в Бадхызе на фисташке, в горах на арче, или скальных выступах. Кладка – с конца апреля до начала мая, состоит из одного яйца белого цвета, размеры, в среднем – 59 x 75 мм. Птенцы появляются в конце мая – начале июня. Охотится в открытых местностях, питается змеями и ящерицами (агамами, сцинками).

Статус: сокращающийся в численности вид, включен в Красную книгу Туркменистана. Отлов и добыча запрещены.

Полевые признаки: больше вороны, из луней наиболее крупный. Самец и самка хорошо отличаются друг от друга. **У самца верх бурый, но голова и плечи светлые, рыжеватые, а низ беловато-рыжеватый. Хвост буровато-сизый, серый. Самка однородно темно-бурая, верх головы и горло и**

we bokurdagy, ganatlarynyň öňki tarapy agymtyl-çypar, melemtil-goňur, bokurdagy agym-tyl. Ýaşlary mäkiýanyna çalymdaş. Howada işjeň uçuşyny gaýup uçmak bilen utgaşdyryp, ýeňil we dowamly saklanýar. Gamyşly jeňňelliklerde pidasyna tiztizden topulýar. Sesi myňňylldawuk jynňyldy. Uzynlygy – 43-58, ganaty – 39-43.5 sm, agramy - 400- 950 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: beýleki gulatlardan ölçegleriniň uludygý we has garamtyl reňklidigi, şeýle-de **guýruk üstüniň ak dældigi** bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: giň – Ýewropa, demirgazyk-günbatar welaýatlardan başgalarynda, Günorta Sibir, Günorta-Günbatar we Merkezi Aziýadan Demirgazyk-Gündogar Hytaýa we Koreýa çenli, Afrikanyň günorta böleginde we Madagaskar, Awstralyýa we Taze Zelandiýa. Orta Aziýanyň suwsyz we beýiki daglyk ýerlerinden başga, hemme ýerlerde gabat gelyär. Türkmenistanda - Hazar deňzinden Amyderýa we Sarygamyşa çenli suw ýataklarynyň ählisinde (derýalaryň jülgelerinde, kölleriniň, suw howdanlaryň, kanallaryň, akyn dy suwlaryň kenarynda) duşýar. Ýewropanyň günorta böleginde we Aziýada Hindistanda we Afrikada gyslaşýar.

Ýaşayşy: höwürtegeleýär, uçup geçýär we gyslaşýar. Ýazyna fewralyň ikinji ýarymyndan we martda, güýzkisi – sentýabr - noýabrda uçup geçýär; gysky uçup geçmegi iýmit gözlegleri bilen baglanyşyklydyr. Höwürtegeleýän, uçup gezýän we gyslaşýan döwürleri derýalaryň jülgelerinde, suw ýataklarynyň kenaryakalarynda saklanýar. Jeňňelliklerde gamyş üýsmekleriniň üstünde gyrymsylaryň çy-

передняя часть крыла беловаторыжие, кремовые, горло беловатое. Молодые похожи на самок. Легко и долго держится в воздухе, сочетая активный полет со скольжением. Часто бросается на добычу в заросли тростника. Голос – гнусавый писк. Длина – 43-58, крыло – 39-43.5 см, вес – 400-950 г.

Сходства – отличия: от других луней отличается несколько крупными размерами и более темной окраской, а также **отсутствием белого надхвостья.**

Распространение: широкое – Европа, кроме северо-западных областей, Южная Сибирь, Юго-Западная и Центральная Азия до Северо-Восточного Китая и Кореи, южная часть Африки и Мадагаскар, Австралия и Новая Зеландия. В Средней Азии встречается повсеместно, за исключением безводных участков пустынь и высокогорий. В Туркменистане – по всем водоемам (долины рек, берега озер, водохранилищ и каналов, сбросные водоемы), от Каспия до Амударьи и Сарыкамыш. Зимует в южной половине Европы и Азии, вплоть до Индостана, в Африке.

Образ жизни: гнездится, пролетает и зимует. Весенний пролет – во второй половине февраля и в марте, осенний – сентябрь-ноябрь, связанные с кормодобыванием. Как на гнездовье, так и на пролете и зимовке держится по речным долинам, берегам водоемов. Довольно крупное гнездо сооружает из сухих веток, травы, тростника на кочках среди густых зарослей. Кладка в первой половине апреля, обычно

byklaryndan, otlaryň sypallaryndan uly höwürtege gurýar. Aprel aýunyň birinji ýarymynda 4 sany ak reňkli ýumurtglary goýýar, ölçegleri - 35-41 x 45-53 mm. Jüýjeleri iýun aýunyň ikinji ýarymynda uçurym bolýarlar. Esasan, bu guşlar, gemrijiler we beýleki maýda süýdemdirijiler, suwulganlar, mörmöjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty guş, uçup geçýän we gyslaşýan döwürlerinde sany mese-mälim ýokarlanýar.

70. Meýdan gulatysy – Circus cyaneus – Полевой лунь

Meýdan alamatlary: garga möçberli, orta ölçegli guş, ganatlarynyň we guýrugynyň uzyndygý sebäpli, uçýan wagty uly ýaly bolup görünýär. Horazy mäkiýanyndan reňki boýunça anyk tapawutlanýar. **Uly horazyň üsti açyk-gögümtil, aşagy we guýrugynyň üstü ak, ganatlarynyň ujy gara. Mäkiýanyň üstü goňur, kellesi we eginleri çyparrak tegmilli. Guýrugynyň üstü ak, kese goýugöňur zolakly.** Aşagy agymtyl, dik göňur menekli. Ýaşlary mäkiýana çalymdaş, emma üstki tarapy çyparrak gaýmaly, aşagy garamtylrak, çyparrak. Gyssanman uçýar, ganatlaryny kakyp bat alyp, ýere ýakyn gaýup uçmak häsiýeti bolýar. Sesi – “gi-gi-gi” ýa-da “piirr”. Uzynlygy – 45-55, ganaty – 33-40 sm, agramy - 400 g golaý.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: horazy batga gulatydan açyk - gögümtil reňkidigi; sähra gulatydan – ganatynyň uçlarynyň tutuşlygyna garadygy; meýdan şertlerinde mäkiýany ýaşlaryndan tapawutlandyrmak örän kyn, beýleki gulatlara garanda, guýrugynyň üstündäki ak zolagynyň has inlidigi bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: giň - Ýewraziýanyň

из 4-х почти белых яиц, размеры – 35-41 x 45-53 мм. Вылет молодых во второй половине июня. Питается, главным образом, птицами, также ловит грызунов и других мелких млекопитающих, ящериц, насекомых.

Статус: обычная птица, наиболее многочисленный из луней, численность заметно увеличивается во время полета и зимовки.

Полевые признаки: среднего размера, величиной с ворону, но в полете кажется крупнее благодаря длинным крыльям и хвосту. Различия в окраске между самцом и самкой сильно выражены. **Взрослый самец сверху светло-сизый, низ и надхвостье светлые, концы крыльев черные. Самка сверху бурая, с рыжеватыми пестринами на голове и плечах. Надхвостье белое, хвост в темно-бурых поперечных полосах.** Низ беловатый, с бурыми продольными пестринами. Молодые похожи на самок, но сверху с рыжеватыми каймами, а низ темнее, рыжеватый. Полет неторопливый, характерен чередованием взмахов крыльев со скольжением низко над землей. Голос – «ги-ги-ги» или «пииррь». Длина – 45-55, крыло – 33-40 см, вес – около 400 г.

Сходства – отличия: самец от болотного луня отличается светлосизой окраской, от степного луня – целиком черной вершиной крыла; самка и молодые в полевых условиях очень трудно различимы, главный признак – белое надхвос-

we Demirgazyk Amerikanyň merkezi welayatlary. Günorta Ýewropada, Kiçi, Alynky we Merkezi Aziýada, Demirgazyk Hindistanda gyslaşar. Orta Aziýada we Türkmenistanda, uçup geçende we gyslanda hemme ýerlerde diýen ýaly duşýar.

Ýaşayşy: uçup geçýär we gyslaşar. Ýazyna mart - aprel we güýzine - oktýabr - noýabrda uçup geçýär. Höwürtleýän ýeri - Köpetdagyň ýokarky kemerlerindäki sähralyk ýerleri, gyslanýnda we uçup geçenlerinde - derýalaryň jülgelerinde, dag-eteginde, ekerançylyk we ýanaşyk çöllük ýerlerde duşýar. Adatça düme ekerançylygynda ýa-da pes boýly gyrymsylarda höwürtleýän gurýar, 2-5 sany ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 43 x 36 mm. Guşlar (köplenç torgaýlar), maýda gemrijiler bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, uçup geçende käbir ýerlerde adaty guş.

71. Sähra gulatysy – *Circus macrourus* – Степной лунь

Meýdan alamatlary: orta ölçegdäki guş. **Ýetişen horazynyň üsti gögümtil-çal, aşagy ak, döşi gögümtil ýokundyly, ganatларыnyň ujy gara.** Guýrugy kese goňurrak zolakly açyk-gögümtil. **Mäkiýanynyň üsti goýy-goňur, ýelekleri çypparak gaýmaly, guýrugynyň agymtyl üsti garamtyl kese zolakly.** Aşagy goňur meneklenen agymtylrak - çypparak reňkli. Ýaşlary mäkiýanyna çalyndaş, emma üstki ýelekleri inli çypparak gaýmaly, **aşagy meneksiz açyk-goňur ýa-da çyppar** reňkli. Sesi dürli-dürli – sandyraýan batly owazlar, basyk sykylyk. Uzynlygy – 40-50, ganaty – 31-36 (horazy) we 33-39

тѣ несколько шире, чем у других луней, и зоб (у самцов) более сизоватый.

Распространение: широкое – в северных и центральных областях Евразии и Северной Америки. Зимует в Южной Европе, Малой, Передней и Средней Азии, Северной Индии. В Средней Азии и Туркменистане на пролете и зимовке встречается почти повсеместно.

Образ жизни: пролетает и зимует. Весенний пролет – в марте-апреле, осенний – октябре-ноябре. Встречается по степным горным и предгорным участкам, на пролете – долины рек, предгорья, сельскохозяйственный ландшафт и прилегающие пустынные территории. Питается птицами (чаще жаворонками), мелкими грызунами.

Статус: немногочисленная птица, на пролетах местами обычен.

Полевые признаки: среднего размера. **Взрослый самец сверху сизо-серый, низ белый, грудь с сизым налетом, концы крыльев черные.** Хвост светло-сизый в буроватых поперечных полосах. **Самка сверху темно-бурая с рыжими каемками перьев, надхвостье беловатое с темными поперечными полосками.** Низ беловатосыжеватый с бурыми пестринами. Молодые похожи на самок, но сверху с широкими рыжеватыми каймами перьев, а **низ светло-коричневый или рыжий, без пятен.** Голос разнообразный – дребезжащие звонкие звуки, приглушенный

(mäkiýany) sm, agramy - 400 g çenli.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: uly horazy beýleki gulatlardan ganatларыnyň ujundaky gara reňkli ýerleriniň az meýdanlydygy (gabawly), mäkiýanynyň - guýruk üstüniň ýagty ýerleriniň insiz we azdygy bilen tapawutlanýar, emma mäkiýanynyň ýaş guşlar ýaly bolmagy, ak gulatydan tapawutlandyrmagy kynlaşdyrýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewraziýanyň sähra we sähra-tokaýlyk ýerleri – Dunaý derýasynyň aşagy akumyndan Baýkal kölüne çenli, günortada Syrderýanyň ortaky we aşagy akumyna hem-de Eýranyň demirgazyk-günbatar böleginde, Aziýanyň günortasynda we Afrikada gyslaşar. Türkmenistanda Etrek derýasynyň aşagy akumyndan Amyderýa çenli bolan düzlükleriň köp ýerlerinde gabat gelýär.

Ýaşayşy: uçup geçýär we gyslaşar. Ýazyna käbiri martyň aýagyndan apreliň ortasynda, ýek-tükleri onuň ahyryna çenli uçup gelýär, güýzine – sentýabryň aýagyndan noýabryň soňuna çenli gabat gelýär. Derýalaryň jülgelerinde saklanýar, emma, çöllük ýerlerde hem duşýar, gysyna, esasan, oazislerde mekan tutýar. Ýymiti dürli-dürli – gemrijiler, maýda guşlar, suwulganlar, mör-möjekler.

Statusy: seýrek görnüş, MSOP-yn Gyzyly sahypasyna we Türkmenistanyň Gyzyly kitabyna girizilen.

72. Ak gulaty – *Circus pygargus* – Луговой лунь

Meýdan alamatlary: orta ululykdaky guş. Horazynyň mäkiýänyndan tapawudy anyk görünýär. Onuň üsti **goýy-gögümtil, ganatlary gara zolakly, guýrugynyň üsti agymtyl-**

свист. Длина – 40-50, крыло – 31-36 (самцов) и 33-39 (самок) см, вес – до 400 г.

Сходства – отличия: от других луней взрослый самец отличается меньшим развитием (охватом) черного цвета на конце крыльев, у самки более узкое и менее светлое надхвостье, но от лугового луня самка, как и молодая птица, трудно отличимы.

Распространение: степные и лесостепные районы Евразии от низовьев Дуная до Байкала, на юге распространен до среднего течения и низовьев Сырдарьи и северо-западной части Ирана. В Туркменистане встречается во многих равнинных местах от низовьев Этрака до Амударьи. Зимует на юге Азии и в Африке.

Образ жизни: пролетает и частично зимует. Весной пролетает с конца марта до середины, а отдельные особи до конца апреля, осенью встречаются с конца сентября до конца ноября. Предпочитает долины рек, но встречается и в пустынной местности, зимой держится, главным образом, в оазисах. Питание разнообразное – грызуны, мелкие птицы, ящерицы, насекомые.

Статус: редкий вид, включен в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана.

Полевые признаки: средней величины лунь. В окраске взрослых имеется значительное различие между полами. Самец сверху **темно-сизый, на крыльях черная**

gögümtil, garyn tarapy agymtyl dik çypar tegmilli, **ganatynyň aşagy alarak, uçlary gara**. Mäkiýanyň üsti goňur, kellesi we eginleri çypar tegmilli. Garyn tarapy agymtyl dik çypar reňkli. Ýaşlary mäkiýana çalyndaş, emma arka tarapy goýu-goňur, garyny – aýyk-goňur ýa-da çypar reňkli. Sesi bölünip-bölünip çykýan – “pik-pik-pik” ýa-da sykylykly – “pirr”. Uzynlygy – 39-50, ganaty – 32-39 sm, agramy – 260-380 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ho-razy uçanda ganatlarynyň aşagynyň zolaklydygy we böwürleriniň çypar tegmillidigi bilen beýleki gulatylardan tapawutlanýar, meýdan şertinde oturan guşuň ganatlarynda häsiýetli gara zolagyň bolmagy, mäkiýany ýaşlaryndan tapawutlandyrmakda künçylyk döredýär.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeýän bölegi – Günbatar we Günorta - Günbatar Ýewropadan Günorta-Gündogar Gazagystana we Baýkal kölüniň aňrysna çenli, Kawkaz we Demirgazyk-Günbatar Eýran. Türkmenistanda uçup geçende we gýşlanda, günbatarda Etrek derýasynyň aşak akymyndan Köpetdagyň etegine, Tegen, Murgap, Garagum derýalarynyň jülgelerine, gündogarda Amyderýa çenli bolan giňişliklerde gabat gelyär. Afrikada we Hindistanda gýşlaýar.

Ýaşaýyşy: uçup geçýän-gýşlaýan görnüş hem höwürtlegeýän. Ýazyna aprelde we güýzine – awgustyň aýagyndan noýabryň başyna çenli uçup geçýär. Derýalaryň jülgelerinde we ekerançylyk ýerlerinde mekan tutýar. Ýeke-bara guşlar oazisden has uzakda - çöllük ýerlerde hem gabat gelyär. Esasan, maýda gemrijiler we guşlar, şeýle-de süýrenijiler we

полоса, надхвостье бело-сизое, брюшная сторона беловатая с продольными рыжими пестринами, **снизу крылья кажутся полосатыми, концы черные**. Самка сверху бурая, с рыжеватыми пестринами на голове и плечах. Надхвостье белое с коричневато-рыжими продольными пестринами. Брюшная сторона беловатая с продольными рыжими полосами. Молодые похожи на самок, но спинная сторона темно-бурая, а брюшная – светло-коричневая или рыжая. Голос – отрывистый «пик-пик-пик» или свистящее «пиррь». Длина – 39-50, крыло – 32-39 см, вес – 260-380 г.

Сходства – отличия: самец в полете от других луней отличается полосатым низом крыльев и рыжими пестринами на брюхе, у сидящей птицы – характерная черная полоска на крыле, самка и молодые птицы в природных условиях почти неотличимы.

Распространение: гнездовая часть ареала – от Западной и Юго-Западной Европы до Юго-Восточного Казахстана и Забайкалья, на Кавказе и в Северо-Западном Иране. В Туркменистане на пролете и зимовке встречается широко – от низовьев Этрека на западе, в предгорьях Копетдага, в долинах Теджена, Мургаба, Каракумдарьи, до Амударьи на востоке. Зимует в Африке и Индостане.

Образ жизни: пролетный, частично зимующий спорадически гнездящийся вид. Сроки пролета: весной – в апреле, осенью – с конца августа до начала ноября. Места обитания приурочены к долинам рек, сельскохозяйственному ланд-

mör-möjekler (çekirtge, ýaşyl çekirtge, tomzak, byzaw) bilen iýmitlenýär.

Statusy: sany köp däl, sähra gulatysyndan ýygryrak duşýar, emma meýdan gulatysyndan seýregräk.

73. Garçygaý – *Accipiter gentilis* – Тетеревятник

Meýdan alamatlary: gargadan sähelçe ulurak. Arka tarapy **goňurrak ýa-da gögüräk-çal, kellesi arkasyndan gararak, maňlaýy we gaşy agymtyl**, guýrugy çala saýgardýan goňurrak kese zolakly we has **inli gara zolakly**. Garyn tarapy **agymtyl-çal, kese insiz goňur nagyşly**. Ýaşlarynyň üsti çyparrak teňňe nagyşly, aşagy – çalymtyl-çypar, dik inli goňur tegmilli. Uly guşlaryň gözi gyzlymtyl-mämişi we ýaşlarynyňky – agymtyl-sary. Sesi dürli – pert gykylyk, käte sesli “mýawlama”. Horazynyň uzynlygy – 49-56, mäkiýanynyňky – 58-64, horazynyň ganaty – 30-35 we mäkiýanynyňky 31-39 sm, horazlarynyň agramy - 572-740, mäkiýanalrynyňky – 915-1200 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: öl-çegleriniň has uludygy, inli guýrugynyň uzyndygy we ganatlarynyň gysga kütekdigigi bilen beýleki gyrgylardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Demirgazyk Amerika we Ýewraziýa, Ýewropayň günbatar araçäginden Ýaponiýa çenli. Türkmenistanyň, esasan, günorta we günorta-günbatar böleklerinde duşmagy mümkin.

Ýaşaýyşy: bize seýrek, tötänden

шафту. Отдельные птицы встречаются и в пустынных районах вдали от оазисов. Питается, главным образом, мелкими грызунами и птицами, а также пресмыкающимися и крупными насекомыми (саранчой, кузнечиками, жуками, медведками).

Статус: численность невысокая, встречается чаще степного луня, но реже, чем полевой лунь.

Полевые признаки: несколько крупнее вороны. Спинная сторона **буровато- или сизо-серая, голова темнее спины, лоб и брови беловатые**, хвост со слабо заметными буроватыми поперечными полосками и более **широкой темной полосой**. Брюшная сторона **беловато-серая с тонким бурым поперечным рисунком**. У молодых птиц верх бурый с рыжеватым чешуйчатым рисунком, низ серовато-рыжеватый в широких бурых продольных пятнах. Глаза красновато-оранжевые у взрослых и бледно-желтые у молодых птиц. Голос – разнообразные резкие крики, иногда громкое «мяуканье». Длина самцов – 49-56, самок – 58-64; крыло у самцов – 30-35, у самок – 31-39 см; вес самцов – 562-740 г, самок – 915-1200 г.

Сходства – отличия: от других ястребов отличается более крупными размерами, а от крупных соколов – длинным широким хвостом и короткими тупыми крыльями.

Распространение: широкое – Северная Америка и Евразия от западных границ Европы до Японии. В Туркменистане может попадать-

uçup gelýän guş. Agaçly we gyrymsy agaçly ýerlerde saklanýar. Esasan, guşlary buky ýerlerden uçup, awlap iýmitleňýär.

Statusy: seýrek duşýan guş, käbir ýerli awçylar elguş hökmünde ulanýarlar.

74. Bedeneçi gyrgy – *Accipiter nisus* – Перепелятник

Meýdan alamatlary: kepderiden kiçiräk, **sary ýa-da mämişi** gözli guş. Horazy reňki, sypaty boýunça garçygaýa meňzeş, emma ondan iki esse kiçi. Mäkiýany horazyndan ep-esli uly, olar diňe reňki boýunça tapawutlanýarlar. Ýetişen horazyň **üsti gögümtil, boýnunyň zynda we eginlerinde tertipsiz ýerleşen ak tegmilleri bolýar, aşaky tarapy agymtyl, insiz goňurrak-çypar kese geçen zolakly. Mäkiýanyň üsti goňur we has anyk garamtyl-goňur kese zolakly**, gözünüň üsti agymtyl gaşly. Ýaşlary goýy-goňur, ýeňsesi, eginleri, arkasy we ganatlary ak bellikli. Aw edende agaçlaryň şahalarynyň arasynda ümsüm oturyp, pidasyňa duýdansyz topulýar. Sesi dürli, ýygy-ýygydan çalt gaýtalanýan “kik-kik-kik”-güýçli sesli. Horazlarynyň uzynlygy – 29-34, mäkiýanlarynyňky – 35-41, horazyň ganaty – 19-22, mäkiýanyňky – 22-26 sm, agramy – 200-250 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: sykylykçy gyrgydan gözleriniň sarydygy ýa-da mämişidigi, reňki boýunça çaly m edýän maýda laçynlardan bol-sa, guýrugynyň uzyn we inli, küték uçlydygy bilen tapawutlanýar.

ся, в основном, в южной и юго-западной части страны.

Образ жизни: у нас - пролетно зимующая птица. Предпочитает местообитания с древесно-кустарниковыми участками. Питается, в основном, птицами, на которых охотится, вылетая из засады.

Статус: редкий вид, некоторыми местными сокольниками используется в качестве ловчей птицы.

Полевые признаки: некрупная, размером меньше голубя птица **с желтыми или оранжевыми глазами**. Самцы – почти вдвое уменьшенная копия тетеревины – и по окраске, и по внешнему облику. Самки значительно крупнее самцов, отличаются они и окраской. Взрослый самец **сверху сизый, на зашейке и плечах неправильные белые пятна, снизу беловатый с тонкими буровато-рыжими поперечными полосками**. Самка – **бурая сверху** и с более резкими темно-коричневыми поперечными полосками, **над глазом светлая беловатая бровь**. Молодые – темно-бурые, с белыми отметинами на затылке, плечах, спине и крыле. Во время охоты затаивается в кронах деревьев, затем внезапно бросается на жертву. Голос разнообразен, часто – громкое, быстро повторяющееся «кик-кик-кик». Длина самцов – 29-34, самок – 35-41, крыло у самцов – 19-22, у самок – 22-26 см, вес – 200-250 г.

Сходства – отличия: от тювика отличается желтыми или оранжевыми глазами, от сходных по окраске мелких соколов – длинным и

Ýaýran ýerleri: giň, arealynda höwürtegeýän bölegi - Ýewraziýanyň (günorta Gimalay daglaryna çenli) düzlük we dag tokaýlyklaryny, şeýle-de Afrikanyň demirgazyk-günbatar çetlerini öz içine alýar. Orta Aziýada, şol sanda Türkmenistanda hem, aýratyn-da, uçup geçýän döwründe, hemme ýerlerde duşýar. Günorta we Günbatar Ýewropada, Kawkazda, Alynky Aziýada, Orta Aziýanyň günortasynda, Günorta, Günorta-Gündogar we Gündogar Aziýada gyşlaýar.

Ýaşaýşy: höwürtegeýär, uçup geçýär we gyşlaýar. Köpetdagda, Uly Balkanda wagtal-wagtal höwürtegeýär. Uçup geçende we gyşlanda giňişleýin duşýar. Ýazyna mart-aprelde, güýzine - sentýabryň aýagyndan noýabryň soňuna çenli uçup geçýar. Daglarda arçalykda (1500 m we ýokary), köplenç arça agajynda höwürtegeýär, 2-5 sany melemtil-goňur menekli ak reňkli ýumurtgalary goýýar. Iýulda uçurym bolan guşlar duşýar. Maýda guşlar – tiňildewüklerden jok-jokylara çenli, käte gumrylar bilen iýmitleňýär.

Statusy: höwürtegeýän ýerlerinde az sanly, uçup geçende we gyşlanda adaty, aýratyn-da derýalaryň jülgelerinde. Doly öwrenilmedik. Elguş hökmünde ulanylýar, emma garçygaý ýa-da uly laçynlar ýaly meşhurlygy ýok.

75. Ýewropa sykylykçy gyrgy – *Accipiter brevipes* – Европейский тювик

Meýdan alamatlary: kepderi öleşli, ganatlary başlара garanynda insiz we **guýrugy gysgalan garamtyl kese ýygjam bellikli** guş. Horazyň we mäkiýanyň ölçegleri birmeňzeş. **Ganatlarynyň uçlary ga-**

широким хвостом, широкими при- тупленными крыльями.

Распространение: широкое, гнездовая часть ареала охватывает равнинные и горные леса Евразии (на юге до Гималаев), а также крайний северо-запад Африки. В Средней Азии, в том числе и в Туркменистане, встречается повсеместно, особенно на пролете. Зимовки – в Южной и Западной Европе, на Кавказе, в Передней, на юге Средней, в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии.

Образ жизни: гнездится, пролетает и зимует. Нерегулярно гнездится в Копетдаге и Больших Балханах и Койтендаге. На пролете и зимовке – шире. Весенний пролет в марте-апреле, осенний – с конца сентября до ноября. Гнездится в горах в зоне арчи (1500 м и выше). Гнездо устраивает на деревьях, чаще на арче. Кладка из 2-5 яиц белого цвета с буро-коричневыми пятнами. Подросшие птенцы встречаются в июле. Питается мелкими птицами – от пеночки до дрозда, иногда горлицами.

Статус: на гнездовье немногочислен, на пролете и зимовке – более обычен, особенно по долинам рек. Используется в качестве ловчей птицы, хотя охота с ним не популярна, как с крупными соколами или тетеревиныками.

Полевые признаки: размером с голубя, с относительно узкими крыльями и укороченным **хвостом с темными поперечными, частыми отметинами**. Самец и самка одинакового размера. **Концы кры-**

ramtyl, ol uçanda oňat görýnär.

Üstki tarapynyň reňki gögümtil-goýy-çal, aşagy – kese çypar we ak zolakly, ýaşlarynyňky – maýda we ýürek sypatly ýygjam tegmilli. Gözleri goýy-gyzyl. Sesi pert, kesgitli wagtal-wagtal gaýtalanýan sykylyk – “ki-wik”. Uzynlygy – 30-37, horazlarynyň ganaty – 21-23, mäkiýanlarynyňky – 23-24 sm, agramy – 200-250 g.

Meňzeşlikleri–tapawutlary: bedeneçi gyrgydan ganatlarynyň has çowludygy, gözlriniň garamtyldygy; sykylykçy gyrgydan – ýürekşekilli damja bellikleri bedeniniň aşak tarapyndalygy, aýratyn-da, ýaşlaryna mahsusdygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeleýän bölegi - Günorta-Gündogar Ýewropadan Zakawkaziýa çenli, Kiçi Aziýanyň günbataryny öz içine alýar. Ýakyn Gündogarda we Arabystanyň demirgazyk böleginde gyslaýar. Türkmenistanda, onuň günbatarynda (Etrek derýasynyň aşaky akymynda), şeýle-de gündogarynda (Amyderýanyň jülgesinde) bellendi.

Ýaşayşy: tötänden uçup gelýän görnüş. Esasan, daglyk ýerlerde we derýalaryň jülgelerinde saklanýar. Maý aýynda we sentýabrda duş gelýär. Maýda suwulganlar we guşlar, mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: örän seýrek, bizde gowşak öwrenilen guş, ol baradaky maglumatlar gymmatlydyr.

76. Sykylykçy gyrgy – Accipiter badius – Тювик

Meýdan alamatlary: bedeneçi gyrgy ölçegindäki kiçiräk ýurtyju guş. Ýaşy ýeten horazyň üstki tarapy gögümtil-goňur, aşagy - agymtyl, goňurrak-çypar kese zolakly. **Agymtyl**

льев темные, что хорошо видно

в полете. Сверху окрас голубовато-темно-серый, снизу – поперечные рыжие и белые полосы, а у молодых – мелкие и частые сердцевидные пятна. Глаза темно-красные. Голос – характерный резкий, повторяющийся через определенное время свист – «ки-вик». Длина – 30-37, крыло у самцов – 21-23, у самок – 23-24 см, вес – 200-250 г.

Сходства – отличия: от перепелятника отличается относительно заостренными крыльями, темными глазами, от тювика – характерными сердцевидными каплями на нижней стороне тела, особенно у молодых.

Распространение: гнездовая часть ареала охватывает Юго-Восточную Европу, до Закавказья включительно, Малую Азию, запад Передней Азии. Зимовки на Ближнем Востоке и северной половине Аравии. В Туркменистане отмечен как на западе (низовье Этрека), так и на востоке (долина Амударьи).

Образ жизни: залетный вид. Держится, главным образом, в горах и по долинам рек. Встречался в мае и сентябре. Питается мелкими ящерицами и птицами, крупными насекомыми.

Статус: очень редкая, у нас слабоизученная птица, информация о которой представляет большую ценность.

Полевые признаки: некрупный хищник, размером с перепелятника. Взрослый самец сверху сизовато-бурый, низ светлее с буро-рыжеватыми поперечными полосами.

bokurdagynda dik garamtyl zolaklary bolýar. Gözleri gyzlymtyl-goňur. Mäkiýanynyň üstki tarapy ýagty, gögümtil ýokundysyz, döşündäki we garnyndaky zolaklar garamtylrak. Ýaşlarynyň arkasynyň ýelek örtügi çypar gaýmaly, garyn tarapynyň menekleri soňra kese zolaklara geçýär. Sesi sogdyrylan uzyn sykylyk – “týu-wik,týu-wik”. Horazlarynyň ganaty – 18.2-22.3, mäkiýanlarynyňky – 20.5-23.6 sm, agramy – 200-250 g.

Meňzeşlikleri–tapawutlary: bedeneçi gyrgydan bokurdagyndaky garamtyl dik zolagy, üstki tarapynyň has goňurdygy we gözleriniň gyzlygoňurdygy; ýewropa sykylykçy gyrgysyndan – reňkiniň solgundygy we bokurdagynyň garamtyl zolaklydygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta Gazagystanda, Orta, Alynky we Günorta Aziýada höwürtlegeleýär. Türkmenistanda - daglaryň yokarky kemerlerinden we çöllügiň agaç ösümliksiz ýerlerinden başga ýerlerinde köp gabat gelýär. Päkistanda we Hindistanda gyslaýar.

Ýaşayşy: höwürtlegeleýär we uçup geçýär, käbirleri gyslaýar. Ýazyna aprelde-maýyň başynda, güýzüne-sentýabrda-oktyabryň başynda uçup geçýär. Daglarda, derýalaryň gyrmança basan ýerlerinde, oazislerde, seýrek ilatly nokatlardaky seýilgäherde höwürtlegeleýär. Agaçlaryň üstünde (toraňny, tut, glediciýa we başg.) höwürte gurýar. Maý aýynda 2-7, köplenç 3-4 sany ýaşylymtyl öwüşginli ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 28.3 x 37.4 mm. Iýulda - awgustyň başynda jüyjeleri uçurym bolýar. Ownuk guşlar we suwulganlar, mör-möjekler (tomzaklar, çekirtgeler) bilen iýmitlenýär.

На беловатом горле есть темная продольная полоса. Глаза красновато-бурные. Самка светлее сверху и без сизого оттенка, полосы на груди и брюхе темнее. У молодых перья на спине с рыжими каемками, на брюшной стороне с пятнами, переходящими в поперечные полосы. Голос – характерный, протяжный свист «тью-вик, тью-вик». Крыло самцов – 18.2-22.8, самок – 20.5-23.6 см, вес – 200-250 г.

Сходства – отличия: от перепелятника отличается темной продольной полосой на горле, более бурым верхом и красно-бурыми глазами, от европейского тювика – более бледной окраской и темной полосой на горле.

Распространение: гнездится в Южном Казахстане, Средней, Передней и Южной Азии. В Туркменистане встречается во многих местах, за исключением верхнего пояса гор и лишенных древесной растительности участков пустыни. Зимовки – в Пакистане и Индостане.

Образ жизни: гнездится и пролетает, отдельные особи зимуют. Весенний пролет – апрель-начало мая, осенний – сентябрь-начало октября. Гнездится в горах, поймах рек, оазисах, нередко в парках населенных пунктов. Гнезда устраивает только на деревьях (туранга, тутовник, гледичия и др.). Кладка в мае из 2-7, чаще 3-4 белых с зеленоватым оттенком яиц, размеры – 28.3 x 37.4 мм. Птенцы вылетают в конце июля-начале августа. Питается мелкими птицами и ящерицами, крупными насекомыми (жесткокрылыми, саранчовыми).

Statusy: adaty, goşmaça öwrenilmeği talap edýär.

77. *Syçançy – Buteo buteo* – Обыкновенный канюк, или сарыч

Meýdan alamatlary: gargadan ulurak, ganatlary inli we **sähelçe tegelenen, gysga guýrukly guş**. Horazy mäkiýanyndan reňki boýunça tapawutlanmaýar, emma **mäkiýany horazyndan mese - mälim ulurak**. Ýelek örtügi ýokarsyndan goýu-goňur we aşagyndan ganatларыnyň uçlary gara, garyn tarapynda çal nagyşlar we zolaklar bolup, agymtyl uly tegmilli, guýrugy – goňur garamtyl kese zolakly. Guşlaryň ачык reňkleri gabat gelýär, olaryň üsti goňurрак-çyпар, agymtyl tegmilli ganatlary ala, aşagy solgun tegmilli agymtyl. Uly guşlaryň gözleri goňur, ýaşlarynyňky – mawymtyl. Çalt bolmasa-da, howada oňat uçýar, käte ganatlaryny çalt-çaltdan kakyp, edil göwenek ýaly bir ýerde saklanýar. Sesi güýçli we sogdyrylan - “piu-piu” ýa-da sykylykly - “keý-keý”. Uzynlygy - 46-58 sm, horazларыnyň ganaty – 33,5-38,0, mäkiýanларыnyňky – 42-45 sm, agramy – 900-990 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: depe we tüýlek aýakly syçançylardan ölçegleriniň kiçidigi, ganatlarynyň бүкүлүян ýerinde garamtyl tegmiliň yokdygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewraziýanyň düzlük tokaýlyklary we daglary, günortada Kiçi Aziýa, Demirtgazyk Eýrana, Gimalaý dagларыna, şeýle-de Azor, Kanar, Madeýra, Ýaşыл burun, Korsika, Sardiniýa we Ýapon adalaryna çenli. Orta Aziýada daglyk ýerlerde, Türkmenistanda – Köpetdagda, migrasiýa we guşlaýan döwründe hemme ýerde.

Статус: обычен, нуждается в дополнительном изучении.

Полевые признаки: несколько крупнее вороны с относительно широкими крыльями и **коротким, слегка закругленным хвостом**. Самец и самка окраской между собой не отличаются, но **самки заметно крупнее самцов**. Оперение темно-бурое сверху и снизу, концы крыльев почти черные, а снизу большие беловатые пятна с серым рисунком и полосами, хвост – бурый в темно-поперечных полосах. Встречаются птицы светлой окраски, у них верх буро-рыжий, пестрые крылья с беловатыми пятнами, низ беловатый с бледными пестринами. Глаза коричневые у взрослых и голубоватые у молодых. Хорошо летает, хотя полет не быстрый, иногда, трепеща крыльями, задерживается на одном месте как пустельга. Голос – громкое и протяжное «пиу-пиу», или посвист «кей-кей». Длина – 46-58, крыло самцов – 33,5-38, самок – 42-45 см, вес – 900-990 г.

Сходства-различия: от курганника и зимняка отличается меньшими размерами, отсутствием контрастных темных пятен на сгибе крыла.

Распространение: лесные равнины и горы Евразии, на юге до Малой Азии, Северного Ирана, Гималаи, а также острова: Азорские, Канарские, Мадейра, Зеленого мыса, Корсика, Сардиния и Японские. В Средней Азии населяет горные районы, в Туркменистане – Копетдаг, хотя во время миграций и в зимние периоды может встречаться

Ýaşaýşy: höwürtegeleýär, uçup geçip gidýär we guşlaýar. Ýazyna mart-aprelde, güzüne – sentýabr-oktyabrda uçup geçýär. Gaýalarda höwürtegeleýär. Baýyrylyk, çöllük giňliklerde, depe syçançyныňky bilen meñzeş ýerlerde ýaşaýar. Aprelde 2-3 sany goňur menekli agymtyl-ýaşыл ýumurtгалary goýýar, ölçegleri – 40-41 x 50-53 mm. Esasan, maýda gemrijiler we mör-möjekler, käte maýda guşlar bilen ýymitlenýär. Sütünleriň we agaçларыň üstünde dynç alýar.

Statusy: az sanly, aýratyn-da, höwürtegeleýän döwründe, hemme ýerlerde gorap saklamak gerek.

78. *Depe syçançysy – Buteo rufinus* – Курганник

Meýdan alamatlary: reňki üýtgeýän, syçançydan has ulurak guş. Guşlaryň ачык (ýygy-ýygydan) we garamtyl (seýrek) reňkleri gabat gelýär. Ачык reňkli guşларыň üsti ачык-goňur, **guýrugynyň üsti çyпар we guýrugy ачык-çyпар** reňkli. Guýrugy zolakly дәл ýa-da gowşak saýgardýan ачык-çalymtыл ýokundy zolakly. Garyn tarapy ачык goňur ýa-da çyпар, aýratyn-da, böwürleri. Ganatlary аşак yüzünden öň tarapy goňur, yz tarapy - goňrasyrak, **garamtyl tegmil бүкүлүян ýerinde anyk görünýär**. Ýaşларыnyň şu görnüsdäki boýaglary аşакы tarapyны ala nagyşы edýär, ol guýrugynda has anyk görünýär, garynyň kese nagyşлары dik tegmiller bilen çalyşýar. Guşларыň garamtyl boýaglary goýu-goňur reňkli, ganatlary we guýrugy kese zolakly. Ýygy-ýygydan gaýур, aýlanyp, kаn ýokary galman uçýar, sütünlere, wyşkalara,

почти повсеместно.

Образ жизни: гнездится, пролетает и зимует. Весной пролетает в марте-апреле, осенью – в сентябре-октябре. Гнездится в Копетдаге. Имеет схожие местообитания с курганником, особенно на пролете, предпочитает холмистые опустыненные пространства. Кладка в апреле из 2-3 яиц беловато-зеленых с коричневыми пятнами яиц, размеры – 40-41 x 50-53 мм. Питается, в основном, мелкими грызунами и насекомыми, иногда мелкими птицами. Часто отдыхает на столбах, высоких деревьях.

Статус: немногочислен, особенно в гнездовое время, подлежит повсеместной охране.

Полевые признаки: заметно крупнее канюка, с изменчивой окраской. Встречаются птицы светлой (чаще) и темной (реже) окраски. Птицы светлой окраски сверху светло-бурые, **с рыжим надхвостом и светло-рыжим хвостом**. Хвост без полос или с сероватыми малозаметными полосами. Брюшная сторона светло-коричневая или рыжеватая, особенно по бокам. Крылья снизу бурые спереди и светлые сзади, **на изгибе хорошо заметны темные пятна**. Молодые этого типа окраски снизу имеют полосатый рисунок, на хвосте более четкий, и без поперечного рисунка на брюхе, который заменен продольными пятнами. Птицы темного типа окраски – темно-бурые, с поперечным темным рисунком на крыльях и хвосте. Часто парит кругами не очень высоко, охотно

çulbalara, tümmeclere gonmany halaýar. Ümsüm, köpelyän döwründe özboluşly sozulan wak-waklyly sesi eşidilýär. Uzynlygy - 50-61 sm, horazlarynyň ganaty - 40,5-43,8, mäkiýanynyňky - 44,2-47,5 sm, ag-ramy - 1-1,5 kg.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: sy-çaңcydan ölçegleriniň has uludygy we ganatyndaky garamtyl menekleri hem-de guýrugynyň uzynlygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Demirgazyk Afrika, Günorta - Gündogar Ýewropa, Arabystanda, Kiçi Aziýa, ondan gündogara Mongoliýa we Hindistana çenli duşýar. Orta Aziýada beýik dag ge-rişlerinden başga ýerlerde giňişleýin ýaýran. Türkmenistanda - çöllükden daglyklara çenli hemme ýerde gabat gelýär.

Ýaşayşy: oturmly görünüş, gy-şyna bir bölegi göçüp-gonýar we günorta tarap süýşýär. Sazakda, gandynda, gum gaýalarynda ýa-da dag etegindäki daşly gaýalarda, derýalaryň jülgelerinde höwürtgge gurýar. Mart, kâte fewralyň ortasynda 2-5, köp-lenç 3-4 sany goňur menekli kirliräk - ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 43-50 x 53-66 mm. Ýumurtgalaryny ýitiren ýagdaýlarynda, gaýtadan höwürtggeleýär. Apreliň aýagynda jüýjeleri çykýar, höwürtgede jüýjeleriň ululy-kiçili bolmagy mümkin. Maý aýynda jüýjeleri uçurym bolýarlar. Aglaba, gemrijiler, aýratyn-da, uly boz syčanlar we inçebarmak alakalar, şeýle-de süýrenijiler we maýda guşlar bilen iýmitlenýär.

Statusy: uly ýurtyjy guşlaryň arasynda adaty guş, gemrijiler bilen iýmitlenip, olaryň sanyny kadalaşdyrýar.

сидится на столбы, вышки, курганы. Молчалив, своеобразный протяжный клекот можно слышать в период размножения. Длина - 50-61, крыло самцов - 40,5-43,8, самок - 44,2-47,5 см, вес - 1-1,5 кг.

Сходства - различия: от канюка отличается более крупным размером и относительно длинным хвостом, и темным пятном на крыле.

Распространение: Северная Африка, Юго-Восточная Европа, Аравийский полуостров, Малая Азия, далее на востоке до Монголии и Индии. В Средней Азии распространен широко, отсутствует только в высокогорье. В Туркменистане встречается повсеместно - от пустынь до горных районов.

Образ жизни: оседлый вид, часть особей зимой кочует и может перемещаться к оазисам или отлетать южнее. Гнездится на саксауле, кандыме, на стенах и уступах глинистых или каменных обрывов в предгорьях и пустыне. Кладка из 2-5, чаще 3-4 грязно-белых, с бурыми пятнами, яиц в марте, иногда даже с середины февраля. Взамен утраченных кладок бывают повторные. Размеры яиц - 43-50 x 53-66 мм. Появление птенцов, обычно, в конце апреля, бывает значительная разница их возраста в одном гнезде. Вылет молодых - в мае. Питается, преимущественно, грызунами, особенно песчанками и сусликами, а также пресмыкающимися и мелкими птицами.

Статус: у нас самый обычный среди крупных хищных птиц, питаясь грызунами, способствует контролю их численности.

79. Tüýlek aýakly syçaңcy - *Buteo lagopus* - Зимняк

Meýdan alamatlary: syçaңcydan ulurak we aýyk reňkli. Bedeniniň üsti goýy - goňur ýa-da aýyk goňur, aşagy - agymtyl, döşi damjapisint garamtyl tegmilli. **Kellesi we ganatларыnyň aşagy aýyk reňkli, ganatларыnyň бүкүлүян ýeri garamtyl tegmilli.** Guýrugynyň düýbi ak ýa-da uýy inli garamtyl zolakly bolup, tutuşlygyna ak, kâte olaryň birnäçe insiz zolaklara bölünmegi mümkin. **Söbүginiň öň tarapy barmakларыna çenli ýelek örtүkli,** yz tarapy - uly teňňeler bilen ýapylan. Ýaşlary ulularыna garanynda garamtyl. Uçup geçende we gyşlaýan döwri ümsüm. Uzynlygy - 49-50 sm, horazларыnyň ganaty - 38,5-44,5, mäkiýanларыnyňky - 42,5-48,6 sm, ag-ramy - 850-1100 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: syçaңcydan ölçegleriniň ep-esli uludygy, reňkiniň akdygy, döşүniň we ganatларыnyň бүкүlen ýeriniň garamtyl zolaklydygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtggeleýän ýerleri - Ýewraziýanyň, Aziýanyň we Demirgazyk Amerikanyň tundra we tokaý tundra zolaklary. Şol materik-leriň orta giňişliklerinde gyşlaýar.

Ýaşayşy: Türkmenistanda gyşyna gabat gelýär, esasan, derýalaryň jülgelerinde we oazislerde. Esasan, maýda gemrijiler bilen iýmitlenýär.

Statusy: örän seýrek görünüş, ol baradaky islendik habarlar gymmatlylymy maglumatdyr.

Полевые признаки: крупнее и светлее канюка. Верх тела темно-бурый или светло-бурый, низ довольно светлый, на груди тем-ные каплевидные пятна. **Голова и нижняя часть крыла светлые, на изгибе крыла темное пятно.** Основание хвоста белое или весь белый с широкой темной полосой на вершине, иногда вершинная полоса разбита на несколько бо-лее узких полос. **Цевка спереди оперена почти до пальцев,** сзади покрыта крупными щитками. Молодые обычно темнее взрослых. Молчалив (вне брачного периода). Длина - 49-59, крыло самцов - 38,5-44,5, самок - 42,5-48,6 см, вес - 850-1100 г.

Сходства - различия: от канюка отличается несколько крупными размерами, более светлой окраской, темными пятнами на груди и изгибе крыла и темной полосой на конце хвоста. Зимующие в Туркменистане зимняки почти не отличимы от курганников светлого типа окраски.

Распространение: на гнездовье - тундра и лесотундра Европы, Азии и Северной Америки. На зимовках - в средних широтах тех же материков.

Образ жизни: в Туркменистане может встречаться осенью и зимой, больше по долинам рек и оазисам. Питается, в основном, мелкими грызунами.

Статус: очень редкий у нас вид, любая информация о встречах представляет научный интерес.

80. Uly garaguşyk – *Aquila clanga* – Большой подорлик

Meýdan alamatlary: uly ýurtyjy guş. **Bedeni goýy-goňur reňkli, göwresiniň üsti we aşagy gara diýen ýaly, guýrugynyň üsti agymtyl-çypar we söbügi ala.** Bu guşlar güýze ýakyn, aýratyn-da, üstki tarapy goňur reňki alýar. Ýaşlary garamtylrak, emma üstki we aşaky taraplarynda çypar dik tegmilleri bolmaýar. Howada oňat gaýýar, ýöne, köplenç ganatyny ýugy-ýugydan kakur, ýokarlygyna seýrek uçýar. Ölçegleriniň uludy-gyna garamazdan, agaçlaryň ara-syndan çalasyňlyk bilen uçýar. Sesi batly ýa-da sykylyklama - “kli-kli”. Uzynlygy - 59-69, horazlarynyň ganaty – 49-53, mäkiýanlarynyňky – 52-56 sm, horazlarynyň agramy -1,6-2 kg, mäkiýanynyňky - 2,1-3,2 kg.

Meñzeşlikleri–tapawutlary: beýleki bürgütlere (bürgüt, mazar garaguşy, sähra garaguşy) meñzeş, emma örän garamtyl reňkiligi we ölçegleriniň biraz kiçidigi bilen tapawutlanýar, ýöne gaýur uçup ýören garaguşjagazy sähra garaguşy ýa-da bilen garjaşdyrmaly däl.

Ýaýran ýerleri: Ýewraziýanyň tokaý zolagynda mekan tutýar, Azi-ýanyň günorta welaýatlarynda gyslaýar. Orta Aziýada diňe Gazagystanda höwürtgelayar, uçup geçende we gyslaýan döwri giňişleýin ýaýraýar. Türkmenistanda - Hazar deňzinden Amyderýa çenli bolan aralykda gabat gelmegi mümkin.

Ýaşayşy: uçup geçýän görnüş, käbir osblarynyň gyslamagy ahmal. Ýazyna martyň aýagynda-aprelde, güýzüne – oktýabr-noýabrda uçup geçýär. Derýalaryň jülgelerinde saklanýarlar. Maýda we orta ölçegli

Полевые признаки: довольно крупный хищник. **Темно-бурый, почти черный сверху и снизу, с беловато-рыжеватым надхвостом и пестринами на цевке.** К осени птицы становятся бурыми, особенно сверху. Молодые тоже темные, но с рыжими продольными пятнами сверху и снизу. Хорошо парит, но часто летит, используя машущий полет, редко поднимается высоко. Несмотря на крупные размеры, ловко летает среди деревьев. Голос – звонкое «кли-кли» или свистящие звуки. Длина – 59-69, крыло самцов – 49-53, самок – 52-56 см, вес самцов – 1.6-2, самок – 2.1-3.2 кг.

Сходства – различия: от других орлов (беркут, могильник, степной орел) отличается однородной, очень темной окраской и несколько меньшими размерами, однако, парящего большого подорлика, можно спутать со степным орлом.

Распространение: населяет лесную полосу Евразии, зимует в южных областях Азии. В Средней Азии гнездится только в Казахстане, на пролете и зимовке распространен гораздо шире. В Туркменистане может встречаться от Каспия до Амударьи.

Образ жизни: пролетный вид, возможна зимовка отдельных особей. Весенний пролет – в конце марта-апреле, осенний – в октябре-ноябре. На пролете держится, главным образом, по долинам рек. Питается мелкими и среднего размера млекопитающими, птицами, ящерицами, падалью.

süýdemdirijiler, guşlar, suwulganlar hem-de maslyk bilen ýymitlenýär.

Statusy: seýrek, az öwrenilen görnüş, MSOP-yn Gyzyl sahypasyna we Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen.

81. Sähra garaguşy – *Aquila nipalensis* – Степной орел

Meýdan alamatlary: uly ýurtyjy guş. **Reňki birmeñzeş goňur, kätekellesi çypar we guýrugynyň üsti açyk agymtyl** osoblary hem duşýar. Aşaky tarapy arkasyna garanynda açyk reňkli. Könelen, ütülen ýelekleri solak-goňur. **Ýaşlary açyk-goňur, guýrugynyň üsti agymtyl we ganatlary ýygrylanda çypar zolakly,** guýrugynyň aşagy açyk-çypar reňkli. Gaty ýokardan gaýur uçýar, işjeň uçuşdan seýrek peýdalanýar. Ümsüm. Uzynlygy – 62-74, horazlarynyň ganaty – 51-59, mäkiýanlarynyňky – 52,5-63,8 sm, agramy - 3 kg golaý.

Meñzeşlikleri–tapawutlary: bürgütten we mazar garaguşyndan biraz göwresiniň kiçidigi we açyk birmeñzeş reňklidigi, uly garaguşykdan – ölçegleriniň has uludygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewraziýanyň sähralyklarynda, Dunaý derýasynyň aşaky akymyndan Baýkal kölüniň ýakasyna çenli, günorta Kawkaza, Üstýurdyň demirgazyk bölegine çenli, Pamir-Altaý daglarynyň käbir ýerleri. Türkmenistanda uçup geçende hemme ýerde diýen ýaly duşýar. Alyňky Aziýada, Hindistanda, Gundogar we günorta Afrikada gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-gyslaýan görnüş. Ýazyna martda-apreliň başynda, güýzine-sentyabr-oktýabrda

Статус: редкий, малоизученный вид, включен в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана.

Полевые признаки: довольно крупный орел. **Окраска однотонно-бурая,** иногда встречаются особи **с рыжей головой и светлым надхвостом.** Низ несколько светлее спины. Обношенное перо становится бледно-бурым. Молодые светло-коричневые, **со светлым надхвостом и рыжими полосами на сложенных крыльях,** подхвостье светло-рыжее. Высоко парит, редко пользуется активным полетом. Молчалив. Длина – 62-74, крыло самцов – 51-59, самок – 52.5-63.8 см, вес – около 3 кг.

Сходства – различия: от беркута и могильника ненадежно отличается несколько меньшими размерами и более светлой однотонной окраской, от большого подорлика – более крупными размерами.

Распространение: степные районы Евразии от низовьев Дуная до Забайкалья, на юг до Кавказа, северной части Устюрта, местами в Памиро-Алае. В Туркменистане на пролете встречается почти повсеместно. Зимует в Передней Азии, Индии, в Восточной и Южной Африке.

Образ жизни: пролетный, зимующий вид. Весенний пролет – в марте-начале апреля, осенний – в сентябре-октябре и начале ноя-

we noýabryň başynda uçup geçýär. Möwsümleýin migrasiýa döwründe käbir ýerlerde (Amyderýa jülgesinde, Köpetdagyň eteklerinde, Etrek derýasynyň aşaky akymynda) topar bilup uçýar. Esasan, ýurdumyzyň günorta böleginde gyslaýar. Gemrijiler (inçebarmak alaka, boz syçan), towşan, käte guşlar, süýrenijiler hem-de maslyk bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, baş sany gemrijileriň ýagdaýyna baglylykda üýtgeýär, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen.

82. Mazar garaguşy – *Aquila heliaca* – Могильник

Meýdan alamaty: ganatlary inli we guýrugy gysgarak, uly guş. Reňki goýu-goňur, **kellesi we boýunyň zýy açyk-çypar reňkli, eginleri uly ak tegmilli.** Ýaşlary göňurak-mele, bili agymtyl we eginleri ak tegmilsiz, garyn tarapy çyparrak, dik garamtyl meneklenen we zolakly. Gaýup, seýrek ganatlaryny kakyp, haýal uçýar. Sesi itiň üýrüşine çalyň edýär – “týaf-týaf”. Uzynlygy – 70-83, horazlarynyň ganaty – 54-61,5, mäkiýanlaryňky – 57-66,5 sm, agramy – 3 kg golaý.

Meňzeşligi-tapawutlary: guýrugy gysgarak bürgütten ýa-da sähra garaguşdan uçup ýören wagty tapawutlandyrmak kyn. Oturan uly guşuň “telpejigi” agymtyl (bürgüdinki pos reňkli) we eginleri ak tegmilli.

Ýaýran ýerleri: Ýewropanyň günorta-gündogar bölegi, gündogara Baýkal kölüne çenli, günorta Alyňky Aziýadan Hindistana çenli. Orta Aziýanyň köp ýerlerine ýaýran, Türkmenistanda azu-köp hemme ýerde gabat gelmegi mümkin. Orta, Alyňky we Günorta Aziýada we Afrikanyň demirgazyk-gündogarynda gyslaýar.

брю. Во время сезонных миграций в некоторых местах (долина Амударьи, предгорья Копетдага, низовья Этрека и др.) летят в относительно больших стаях. Зимой, главным образом, в южной половине страны. Питается грызунами (суслики, песчанки), зайцами, иногда птицами, пресмыкающимися, падалью.

Статус: немногочисленный вид, численность подвержена колебанию, обуславливаемому состоянием грызунов. Включен в Красную книгу Туркменистана.

Полевые признаки: крупный орел с широкими крыльями и относительно коротким хвостом. Окраска темно-бурая, **голова и зашеек светло-рыжие, на плечах заметные белые пятна.** Молодые коричневато-бурые, со светлой поясницей и без белых пятен на плечах, брюшная сторона рыжеватая с темными продольными пятнами и полосами. Полет парящий, медленный, с редкими взмахами крыльев. Голос – похож на лай «тъяф-тъяф». Длина – 70-83, крыло самцов – 54-61.5, самок – 57-66.5 см, вес – около 3 кг.

Сходства – различия: в полете трудно отличим от беркута или степного орла, хвост кажется коротким. Сидящая взрослая птица отличается светлой «шапочкой» (у беркута ржавчатого цвета) и белыми пятнами на плечах.

Распространение: юго-восточная часть Европы, на восток до Байкала, на юге от Передней Азии до Индии. В Средней Азии распространен во многих местах, в Тур-

Ýaşaýşy: uçup geçýän höwürtegeýän we gyslaýan görnüş. Ýazyna mart-aprelde, güýzüne – oktýabr-noýabrda, aýratyn-da, ýurduň günorta - günbataryndan uçup geçýär. Höwürtelän döwründe derýalaryň jeňňelli ýerlerinde, uçup geçýän we gyslaýan wagty giňişleýin duşýar. Derýalaryň jülgelerindäki uly agaçlarda höwürte gurýar, aprelde 2-3 sany goňur menekli ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 53-62 x 69-79 mm. Uly gemrijiler we guşlar, towşanlar bilen iýmitlenýär, maslyklary işdämen iýýär.

Statusy: sany azalýan görnüş, MSOP-ýň Gyzyl tagtasynyň sanawuna, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen.

83. Bürgüt – *Aquila chrysaetos* – Беркут

Meýdan alamaty: ganatlary **insizräk we guýrugy başgalara görä uzynrak** bolan bizdäki garaguşlaryň arasynda iň ulusy. Umumy reňki goýu-goňur, **ýeňsesindäki uzalan ýeleklere poslurak ýa-da goýu-çypar reňkli.** Garyn tarapy arkasy-na görä ýagtyrak, guýrugy agymtyl, guýrugynyň aşagy çyparrak. Oturan guşuň göwresine ganatlary doly gysylman, sähelçe gapdaldurýar. Ýaşlary – gara-goňur, **guýrugy ak, guýrugynyň ujunda gara zolak bolýar, ganatlarynyň aşagy ak tegmilli.** Sesi gödek, inçeräk pert üýrmä çalymdaş – “kýek-kýek-kýek”. Uzynlygy – 80-93, horazlarynyň ganaty – 59,5-68, mäkiýanlarynyňky – 65-

кменистане может быть встречен, более или менее повсеместно. Зимует в Средней, Передней и Южной Азии, на северо-востоке Африки.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся и зимующий вид. Весенний пролет отмечается в марте-апреле, осенью – в октябре-ноябре, особенно на юго-западе страны. Предпочитаемые места обитания: в гнездовое время – речные долины с тугайной растительностью, а в период полета и зимой встречается шире. Гнезда устраивает на крупных деревьях в долинах рек. Кладка в апреле, из 2-3 белых с коричневатыми пятнами яиц, размеры – 53-62 x 69-79 мм. Питается крупными грызунами и птицами, зайцами, охотно кормится и падалью.

Статус: сокращающийся в численности вид, включен в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана.

Полевые признаки: наиболее крупный среди наших орлов, с относительно **узкими крыльями и сравнительно длинным хвостом.** Общая окраска темно-бурая, **на затылке удлиненные перья ржавого или густо-рыжего цвета.** Брюшная сторона светлее спины, хвост беловатый, подхвостье рыжеватое. У сидящей птицы сложенные крылья не прилегают к туловищу, а слегка расставлены в стороны. Молодые – черно-бурые, **хвост белый с черной полосой на конце, белые пятна снизу на крыльях.** Голос – грубое «кыек-кыек-кыек», похожее на резкий утонченный лай. Длина – 80-93, крыло самцов –

74 sm, horazlarynyň agramy - 2,8-4,1, mäkiýanlarynyňky -3,8-6,3 kg.

Meňzeşligi-tapawutlary: bürgütleriň ýaşlary (3-4 ýaşyna çenli) ak guýrugynyň ujundaky gara zolagy we ganatynyň aşagyndaky uly ak tegmilleri bilen anyk tapawutlanýar. Uly guşlaryň guýrugynyň düýbünüň agymtyldygy, ganatlarynyň insizräkdigi we güýçli ösen dyrnaklary bilen tapawutlanýar. Uzak aralykdan mazar ýa-da sähra gara-guşlary bilen garjaşdyrmak mümkin.

Ýaýran ýerleri: Ýewraziýa-atlantikanyň kenarýakasyndan Sahalina we Gimalaý daglaryna çenli, Demirgazyk Afrika we Demirgazyk Amerika. Orta Aziýada giňişleýin höwürtegeleýär. Türkmenistanda-Garabogaz ýakasy, Uly we Kiçi Balkanda, tutuş Köpetdagda, Bathyzda, Köytendagda, Garagumuň käbir ýerinde.

Ýaşayşy: oturymly guş. Ýylyň sowuk döwri olaryň bir topary dikligine migrasiýa geçirýär. Jübütligi durnukly. Şol bir ýeri köp ýyllap eýeleýär, hatda iýmit gory az bolan ýyllary hem guşlar köpelmän, höwürtegeleýän ýerlerinde galýarlar. Dagda-kert gaýalaryň erňeklerinde we arça agaçlarynda, çölde – çulbalarda, harabalaryň diwarlarynda, sazakda, sözende höwürtege gurýar. Fewralda jübütleşýär we onuň soňky senelerinde – martyň başynda 2, käte 3 sany goňurrak menekli, kirliräk-ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 56-64 x 70-80 mm. Aprelde jüýjeleýär (ýaşynyň 70-nji günlerinde höwürteden uçup gidýär). Gemrijiler, ruşdyllar, kirpiler, towşanlar, tilkiler, käbir guşlar, şeýle-de maslyklar bilen iýmitlenýär.

59.5-68, самок – 65-74 см, вес у самцов – 2.8-4.1, у самок – 3.8-6.3 кг.

Сходства – различия: молодые беркуты (до 3-4-х лет) легко отличаются белым хвостом с черной полосой на конце и крупными белыми пятнами на нижней стороне крыльев. У взрослых птиц светлое основание хвоста, относительно узкие крылья и очень сильные когти. На расстоянии можно спутать с могильником или степным орлом.

Распространение: в Евразии – от атлантического побережья до Сахалина и Гималаев, Северная Африка и Северная Америка. В Средней Азии гнездится повсеместно, а в Туркменистане от Прикарабагзыя, Больших и Малых Балханов по всему Копетдагу, в Бадхызе, Койтендаге, неравномерно в Каракумах.

Образ жизни: оседлая птица. Часть особей совершает вертикальные миграции в холодное время года. Пары постоянные. Одни и те же гнездовые участки занимают по много лет, даже при ухудшении кормовых условий, не размножаясь, остаются в районе гнездования. Гнезда: в горах – по обрывам скал и на арче, в пустыне – на останцах, стенах развалин, на саксауле. Спаривание в феврале. Кладка из 2, реже 3 яиц грязно-белых с буроватыми пятнами, в конце февраля-начале марта. Размеры яиц – 56-64 x 70-80 мм. Птенцы появляются в апреле (гнезда покидают в 70-дневном возрасте). Питается грызунами, черепаками, ежами, зайцами, лисами, некоторыми птицами, а также падалью.

Статус: сокращающийся в численности вид, включен в Красную

Statusy: sany azalýan görnüş, Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizilen. Tutmak gadagan. Gadymda elguşçylar, bürgütler bilen towşanlary, tilkileri awlapdyrlar, emma bizde bürgütli aw etmek soňky ýyllarda ulanylmaýar.

84. Göýdük garaguş – *Hieraetus pennatus* – Орел-карлик

Meýdan alamatlary: garaguşlaryň arasynda iň maýdasy, çäykelden kiçi ölçegli guş. Olaryň garamtyl we aýyk reňkleri hem duşýar. Garamtyl guşlar – **tüsse ýokudyly melemtil-goňur reňkli, guýrugy goýy-goňur çala görünüňan garamtyl zolakly.** Ýagty reňkli guşlaryň **arka tarapy goňur, garny poslyrak-agymtyl, guýrugy agymtyl zolaksyz.** Ýaşlary reňkleri boýunça uly guşlardan tapawutlanmaýar, emma, olary ýelek öwüşgininiň has tekizdigi we ýagtydygy bilen tanap bolýar. Sesi – garaguşlara mahsus wak-wakyly ýa-da ýygy-ýygydan gaýtalanýan-“ki-ki-ki” ýa-da “kli-kli-kli” soňra “pi-pi-pik” görnüşlerde ses çykaryp geçip gidýär. Uzynlygy - 42-51, horazlarynyň ganaty – 34,7-39,5, mäkiýanlarynyňky – 35,0-43,5 sm. Horazlarynyň agramy 510-750, mäkiýanlarynyňky – 840-900 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: garaguşlaryň beýleki görnüşlerinden maýdalygy, ýulançy gyrgydan we gyrgypisint garaguşdan – guýrugynyň bir reňklidigi bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta Ýewropa, Afrikada, Alynky we Orta Aziýa, gündogara Baýkal kölüniň ýakasyna çenli, Täze Gwineýa we Awstraliýanyň günorta bölegi. Ýewraziýada ýaýran guşlar Afrikada, Hindistanda gýşlaýarlar. Türkmenistanyň daglarynda - Uly Balkandan we Günbatar Köpet-

книгу Туркменистана. Отлов запрещен. В прошлом охотились с беркутом на зайцев, лисиц, однако, в последнее время охота с беркутом у нас не практикуется.

Полевые признаки: самый маленький среди орлов, по размерам меньше коршуна. Встречаются птицы темного и светлого окраса. Темные птицы – **коричневато-бурые с дымчатым налетом, хвост темно-бурый с едва заметными темными полосами.** У светлых птиц **спинная сторона бурая, брюшная рыжеватобеловатая, хвост светлый без полос.** Молодые по окраске почти не отличаются от старых птиц, но их можно опознать по более ровным и ярким тонам оперения. Голос – типичный орлиный клекот или часто повторяющиеся «ки-ки-ки» или «кли-кли-кли», переходящие в «пи-пи-пик». Длина – 42-51, крыло самцов – 34.7-39.5, самок – 35-43.5 см, вес у самцов – 510-750, у самок – 840-900 г.

Сходства – различия: от других орлов отличается явно меньшими размерами, от змеяда и ястребиного орла – почти одноцветным хвостом.

Распространение: Южная Европа, Африка, Передняя и Средняя Азия, на восток до Прибайкалья, Новая Гвинея и южные части Австралии. Птицы, населяющие Евразию, зимуют в Африке, Индии. В Туркменистане распространен в горных районах от Больших Балханов и Западного Копетдага до Кой-

dagdan Köýtendaga çenli, şeýle-de Amyderýanyň, Murgap we Tejen derýalarynyň jülgeleri.

Ýaşayşy: höwürtgelyär, uçup geçýär, bir böleginiň oturymly bolmagy mümkin. Ýazyna aprelede, kábiri martda uçup gelyär, güýzüne - sentýabr-oktyabrda uçup geçýär. Dagdaky ýaprakly arça tokaýlyklarda, düzlükde-derýalaryň jeňňelli jülgelerinde mekan tutýar, agaçlaryň üstünde, ýerden 4 m ýokarda höwürtgge gurýar, 1-2, käte 3 sany ýumurtga goýýar, ölçegleri - 43-45 x 54-56 mm. Maý aýynda jüýjeleýär, iýulda – olar uçurym bolýarlar. Gögerçinler, käkilikler, ördekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, tutmak gadagan.

85. Gyrgypisint garaguş – *Hieraetus fasciatus* – Ястребиный орел

Meýdan alamatlary: ýugnalan ganatlaryndan çyкyp duran uzyn guýrukly, orta ölçegdäki garaguş. Üstki tarapy goýy-goňur, aşagy ak garamtyl dik tegmilli “balagy” we guýrugynyň aşagy ala, çal guýrugy garamtyl kese zolakly, onuň ujundaky zolak has garamtyl we inli. Onuň yaşlary ýagty tegmilli ýa-da kellesindäki ýelekleriň uçlary gaýmaly, aşagy çypar ýa-da çyparrak-goňur, guýrugy garamtyl insiz zolakly. Çalt, ýöne seýrek gaýup uçýar. Uzynlygy - 55-65, horazlarynyň ganaty – 46-49, mäkiýanlarynyňky – 49,0-52.5 sm, agramy – 1,5-2,5 kg.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleri: göydük garaguşdan has uludygy we guýrugynyň zolaklydygy; ýylançy gyrgydan ganatlarynyň aşagynyň garamtyldygy; balykçy

тендага, а также по речным долинам Амударьи, Мургаба и Теджена.

Образ жизни: пролетает, гнездится, возможно, часть особей живет оседло. Весной появляется в апреле, отдельные птицы могут отмечаться и в марте, осенний пролет – в сентябре-октябре. В горах населяет как лиственные, так и арчевые леса, на равнине – тугаи в речных долинах. Гнезда устраивает на деревьях, на высоте около 4 м от земли. Кладка из 1-2, иногда 3 яиц, размеры – 43-45 x 54-56 мм. Птенцы, разновозрастные, появляются в мае, покидают гнезда в июле. Питается, в основном, птицами – голубями, кекликами, утками и др.

Статус: малочислен, отлов запрещен.

Полевые признаки: среднего размера орел с длинным хвостом, который выходит за концы сложенных крыльев. Окраска контрастная: **верх темно-бурый, низ белый с продольными темными пестринами, «штаны» и подхвостье полосатые**, хвост серый с поперечными темными полосами, а на конце широкая, более темная полоса. Молодые птицы со светлыми пятнами или каемками на вершинах перьев головы, низ рыжий или рыже-бурый, хвост без широкой темной полосы. Полет быстрый, парит редко. Длина – 55-65, крыло самцов – 46-49, самок – 49-52.5 см, вес – 1.5-2.5 кг.

Сходства – различия: хорошо отличается от других орлов схожих размеров контрастной окраской,

bürgütiden ganatlarynyň бүкүлүян ýerinde gara tegmilleriň ýokdygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran yerleri: Günorta Ýewropa, Ortayär deňziniň adalary bilen bilelikde, Afrika, Kіçi Aziýadan, Arabystandan Koreýa çenli. Orta Aziýada beýik bolmadyk dag çöllerinde ýaýran. Türkmenistanda - Köpetdagda, Bathyzda we Köýtendagda gabat gelyär.

Ýaşayşy: oturymly görnüş, arealynda höwürtgelyän böleginden daşarda “sallah” guşlar gonup-göçýär. Ýaşamaga daglaryň eteklerinde beýik bolmadyk, çölleşen giňişlikleri saýlap alýar. Olaryň jübütligi durnukly. Gum gaýalarynda, käte agaçlaryň üstünde höwürtgge gurýar, fewral aýynda 1-2, käte 3 sany goňur menekli ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 51-57 x 65-71 mm. Iýunyň başyna jüýjeleri çykýar. Esasan, orta ölçegdäki guşlar (käkilikler, kepderiler), şeýle-de maýda süýdemdirijiler, süýrenijiler, ýerde-suwda ýaşayanlar bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek görnüş, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen. Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda bar bolan guşlarynyň täsin wekilleriniň biri.

Laçynlar – *Falconidae* – Соколиные

Kellesi uly, ganatlary uzynдан ýiti uçly (ujunda ýelekleriniň arasy açylmaýar) we insiz guýrukly orta we maýda ölçegli ýurtyjy guşlar maşgalasy. Gözleri uly, gözleriniň töweregindäki ýalaňaç deri hal-kasy garamtyl. Aýaklary gysga we ýelek örtüksiz. Dürli landşaftlarda

от орла-карлика – более крупными размерами и полосой на хвосте, от змееяда – темным низом крыльев, от скопы – отсутствием темных пятен на изгибе крыльев.

Распространение: Южная Европа, включая острова Средиземного моря, Африка, от Малой Азии и Аравии почти до Кореи. В Средней Азии населяет невысокие горы. В Туркменистане распространен в Копетдаге, Бадхызе и Койтендаге.

Образ жизни: оседлый вид, холостые птицы кочуют за пределы гнездовой части ареала. Основные места обитания приурочены к невысоким опустыненным горам и предгорьям. Пары постоянны. Гнезда, в основном, на скалах, иногда – на деревьях. Кладка в феврале из 1-2, редко 3 белых, с буроватыми крапинками яиц, размеры – 51-57 x 65-71 мм. Птенцы появляются с начала июня. Питается, в основном, птицами средних размеров (кеклики, голуби), а также мелкими млекопитающими, рептилиями, земноводными.

Статус: редкий вид, включен в Красную книгу Туркменистана. Добыча запрещена. Один из наиболее интересных представителей птиц горных заповедников Туркменистана.

Семейство хищных птиц. Полевые признаки – размеры средние и мелкие, с относительно крупной головой, длинными острыми крыльями (не растопыренными перьями на концах) и узким хвостом. Глаза относительно крупные, темные, с кольцом голой кожи вокруг глаз.

mekan tutýar, emma açyk giňişlikli landşaftlary halaýar. Adatça, özleri höwürte gurmaýar, beýleki ýurtyjy guşlaryň ýa-da gargalaryň köne höwürtgelerini eýeleýär. Dag gaýalarynyň erňeklerinde, uçutlarda jaýlaşýarlar. İşjeň ýurtyjylar, howada okgunly, gaýman uçýarlar. Naýwan iýmiti bilen iýmitlenýärler, onda-da pidasyny howada ýa-da ýerde tutup iýýär. Görnüşleriň käbirleri örän oňat eldekileşýär we aw etmek üçin ulanylýar.

86. Sähra göwenegi – *Falco naumanni* – Степная пустельга

Meýdan alamatlary: beden guruşy gelşkli maýda laçyn (kepderiden kiçi). Ýaşy ýeten **horazynyň kellesi, guýrugy we guýrugynyň üsti gögümtil, arkasy meneksiz açyk çupar, guýrugynyň aşagy açyk reňkli we uýy kese geçýän gara zolakly.** “Murty” çala bildirýär, dyrnaklary ak. Mäkiýany we ýaşlary garamtyl kese zolakly açyk-çupar reňkli, döşi we böwürleri öçügsi çupar, döşi dik zolakly. Sesi sogdurylan – “kli-kli-kli”. Uzynlygy – 27-33, ganaty – 22.3-25.0 sm, horazlarynyň agramy – 132-172, mäkiýanlarynyňky – 153-201 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: göwenekden meýdan şertinde tapawutlandyrmak kyn, esasy tapawudy – sähra göweneginiň **arka tarapy meneksiz has açyk reňkli.**

Ýaýran ýerleri: Demirgazyk-Günbatar Afrika, Ýewropanyň günortasy, Kiçi, Alynky, Orta we Merkezi Aziýa. Orta Aziýanyň hemme ýerlerinde höwürtegeleýär. Türkmenistanda-Hazar deňziniň kenaryndan we Eterek derýasynyň aşaky akymyndan

Лапы короткие, не оперенные. Населяют разнообразные ландшафты, но в большей мере открытые. Сами обычно гнезд не строят, а занимают старые гнезда других хищных, или врановых птиц. Селятся на выступах чинков и скальных обрывах. Активные хищники, полет стремительный, без парения. Питаются животной пищей, причем живой добычей, которую ловят в воздухе или на земле. Некоторые виды прекрасно приручаются и используются для соколиной охоты. Всего 58, у нас в стране - 9 видов.

Полевые признаки: мелкий сокол (мельче голубя) со стройным телосложением. У взрослого самца **голова, надхвостье и хвост сизые, спина ярко-рыжая без пестрин, хвост – снизу светлый и на конце с черной поперечной полосой.** «Усы» почти незаметны, **когти белые.** Самки и молодые светло-рыжие с темными поперечными полосами, грудь и бока бледно-рыжие, на груди продольные полоски. Голос – протяжное «кли-кли-кли». Длина – 27-33, крыло – 22.3-25 см, вес самцов – 132-172, самок – 153-201 г.

Сходства – отличия: в полевых условиях трудно отличима от обыкновенной пустельги, основное отличие – у самца степной пустельги **спинная сторона** более яркой окраски **без пестрин.**

Распространение: Северо-Западная Африка, юг Европы, Малая, Передняя, Средняя и Центральная Азия. В Средней Азии гнездится почти повсеместно. В Туркмениста-

Amyderýa jülgesine we Köýtendaga çenli giň ýaýran. Afrikada, Arabystanda, Günorta Aziýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: höwürtegeleýär, uçup geçýär, käbirleri gyşlaýar. Ýazyna martyň aýagyndan apreliň birinji ýarymynda, güzüne – sentýabr - oktýabrda uçup geçýär. Uçup geçýän döwründe köplenç derýalaryň jülgerlerinde saklanýar, dag eteklerinde duşýar. Kiçiräk topar (koloniýa), käte jübüt bolup, dagda we dagetek düzlüklerde, derýalaryň gum gaýalarynda, harabalyklarda höwürtegeleýär. Apreliň aýagynda we maýyň birinji ýarymynda 3 - 5 sany gyzylymtyl-goňur menekli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 25-31 x 34-39 mm. Iýunyň soňunda – iýulyň başynda jüýjeleri uçurym bolýar. Höwürtegeleýän ýerleri durnuksyz. Mör-möjekler, seýrek suwulganlar, maýda gemrijiler we guşlar bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek görnüş. MSOP-yn Gyzylymtyl we Türkmenistanyň Gyzylymtyl kitabyna girizilen.

87. Göwenek – *Falco tinnuculus* – Обыкновенная пустельга

Meýdan alamatlary: ganatлары inli we guýrugy uzyn, başgalara garanynda maýda laçyn. Ýaşy ýeten horazynyň **üsti süýri tegmillenen gyzylymtyl - goňur, kellesi külreňk-gögümtil, guýrugynyň üsti we guýrugy gögümtil, aşagy öçügsi- çupar, goňur damja tegmilli, çala görünýän “murty” goňurak-çal, dyrnaklary gara.** Mäkiýanyň üsti, kellesi, arkasy we guýrugy dik kese zolakly çuparrak. Aşaky tarapy goňur tegmilli öçügsi çupar reňkli. Ýaşlary uly mäkiýana çalymdaş, emma

не распространена широко – от побережья Каспия и низовьев Этрека до долины Амударьи и Койтендага. Зимует в Африке, на Аравийском полуострове, в Южной Азии.

Образ жизни: гнездится, пролетает, отдельные особи зимуют. Весенний пролет – в конце марта-первой половине апреля, осенью – в сентябре-октябре. На пролете больше придерживается долин рек, встречается в предгорьях. Гнездится небольшими колониями, иногда отдельными парами в пустыне, горах и предгорьях, речных обрывах, на развалинах. Кладка состоит из 3-5 яиц, покрытых красновато-бурыми пятнами, гнездование в конце апреля-первой половине мая. Размеры яиц – 25-31 x 34-39 мм. Птенцы покидают гнезда в конце июня-начале июля. Гнездовые участки непостоянны. Питается насекомыми, реже ящерицами, мелкими грызунами и птицами.

Статус: редкий вид. Включен в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана.

Полевые признаки: мелкий сокол с относительно широкими крыльями и длинным хвостом. У взрослого самца **верх красновато-коричневый с округлыми пестринами, голова пепельно-сизая, надхвостье и хвост сизые, бледно-рыжеватый низ в буроватых каплевидных пестринах, буровато-серые «усы» мало заметны, когти черные.** Самка сверху рыжеватая, на голове продольные, на спине и хвосте поперечные полосы. Низ бледно-рыжий с буры-

aşagynyň tegmilleri has inli we gü. Sesi batly - "kli-kli-kli". Aw edişi özbo-
luşly, iýmit gözlände aýlanyp uçýär
we soňra ganatlaryny çalt-çaltdan
kakyp, howada asyl-asyl bolup durýar.
Uzynlygy-31-37, horazlarynyň ganaty
– 23.0-25.3, mäkiýanlarynyňky – 24.2-
27.5 sm, horazlarynyň agramy – 159-
200, mäkiýanlarynyňky – 190-280 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary:
sähra göweneğinden ölçegleriniň
sähelçe uludygy, dyrnaklarynyň ga-
radygy, şeýle-de horazy tegmilli ar-
kasy bilen tapawutlanýar. Göwene-
gi, aglaba, kiçi gyrgy diýip nädogry
atlandyryýarlar, olaryň reňkleriniň hiç
hili umumylygy ýok.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwür-
tleýän bölegi – Ýewraziýanyň, de-
mirgazyk welaýatlaryndan başgala-
rynda, Afrika. Orta Aziýada, şol sanda
Türkmenistanda giňişleýin ýaýran.
Alynky Aziýada, Orta Aziýanyň gü-
nortasynda, Günorta Hindistanyň de-
mirgazygynda we Günorta-Gündo-
gar Aziýada, Merkezi we Demirgazyk
Afrikada gyslaşýar.

Ýaşayşy: höwürtleýär, uçup
geçýär we gyslaşýar, bir bölegi
oturymly ýaşýar. Ýazyna mart - ap-
relde, güýzine – sentýabr-oktyabrda
uçup geçýär. Daglarda, derýa jülge-
lerinde, ekerançylyk, çöllük ýerlerde
höwürtleýär, köplenç, höwür-
gesi agaçlaryň üstünde. Martyň
aýagyndan maýyň başyna çenli 3-7
sany possyrak-goňur menekli çypar
reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçeg-
leri - 29-33 x 36-42 mm. Gaýtadan
ýumurtga goýmaklary hem müm-
kin. Apreliň aýagynda sütük ýelekli
jüýjeleri çykýar, emma daglarda
gijiräk bolmagy hem ahmal. Maý
aýunyň soňunda we iýunyň başynda

ми пятнами. Молодые похожи на
взрослую самку, но пестрины снизу
более широкие и густые. Голос –
звонкое «кли-кли-кли». Характерен
своеобразный полет при охоте –
летает кругами и затем повисает в
воздухе, мелко вибрирует крыль-
ями, как бы трясется. Длина – 31-37,
крыло самцов – 23.0-25.3, самок –
24.2-27.5 см, вес у самцов – 159-200,
у самок – 190-280 г.

Сходства – отличия: от степной
пустельги отличается несколько
крупным размерами и черными
когтями, самцы также пятнистым
верхом. Многие неправильно на-
зывают пустельгу кобчиком, хотя
в окраске между ними нет ничего
общего.

Распространение: гнездовая
часть ареала – Евразия, за исклю-
чением северных областей, Афри-
ка. В Средней Азии, в том числе и
в Туркменистане, распространена
повсеместно. Зимовки в Передней
и на юге Средней Азии, в Южной
(север Индостана) и Юго-Восто-
чной Азии, Центральной и Северной
Африке.

Образ жизни: гнездится, проле-
тает и зимует, часть особей живет
оседло. Весенний пролет – в марте-
апреле, осенний – в сентябре-ок-
тябре. Гнездится в горах, по доли-
нам рек, в сельскохозяйственном и
пустынном ландшафте, гнезда чаще
на деревьях. Кладки из 3-7 яиц, ры-
жеватого цвета с ржаво-коричне-
выми пятнами, гнездование с конца
марта до начала мая. Размеры яиц
– 29-33 x 36-42 мм. Бывают повтор-
ные кладки. Пуховые птенцы появ-
ляются в конце апреля, хотя в горах,
возможно, позднее. Вылет птенцов,

jüýjeleri uçurym bolýar. Gemrijiler,
dürlü mör-möjekler, suwulganlar,
maýda guşlar bilen iýmitlenýär.

Statusy: bizde adaty laçynlaryň
biri, gemrijiler bilen iýmitlenip, olaryň
sanyny kadada saklaýar.

**88. Bellik: Kiçi gyrgy - Falco
vespertinus** - tötänden uçup
geçýän, örän seýrek görnüş. Gara-
bogaz kenarynda (1938 ý.) we mer-
kezi Kopetdagda, Guryhowdanda
(1986 ý.) gabat geldi. Horazy beýleki
maýda laçynlardan üstki tarapyň
goýu-çal reňklidigi, mäkiýany – ke-
deriçi laçyndan kellesiniň çyparlygy
we guýrugynyň gyrasynda zolagyň
ýokdygy bilen tapawutlanýar.

89. Кепдерічі лаçын – Falco columbarius – Дербник


Meýdan alamatlary: ganatlary
gysga, maýda laçyn. Horazyň
üsti **goňurrak-gök, boýnunyň yzy
çyparrak tegmilli**, guýrugy gök,
uç tarapy zolakly, **aşagy dik öçü-
si-çyparrak tegmilli**. Mäkiýanyň
üstki tarapy gögümtil ýokundyly
**goňur, aşagyndan-döşi açyk çypar
reňkde dik goňur we garын tarapy
damjaşekilli garamtyl tegmilli**. Ýaş
guşlary mäkiýana çalymdaş – goýu-
goňur reňkli, olardan mawumtyl
“mumjygy” bilen (mäkiýanynda
sary) tapawutlanýar. Sesi laçynyňky
ýaly pert we batly - “ke-e, ke-e, ke-
e” ýa-da “ki-ki-ki”. Uzynlygy – 26-33,
horazlarynyň ganaty – 18.4-23.5,
mäkiýanlarynyňky – 20.1-25.8 sm,
horazlarynyň agramy – 163-215,
mäkiýanlarynyňky – 162-300 g.

соответственно, в конце мая или в
начале июня. Питается грызунами,
различными насекомыми, ящери-
цами, мелкими птицами.

Статус: у нас один из наиболее
обычных соколов, питаюсь грызу-
нами, способствует контролю их
численности.

**88. Примечание: Falco
vespertinus - Кобчик.** Очень
редкий, залетный вид. Встречался
у Карабогазгола (1938 г.) и в Цен-
тральном Копетдаге, в урочище
Гурыховдан (1986 г.). Самец отли-
чается от других мелких соколов
характерным темно-серым окра-
сом верха; самка от дербника отли-
чается рыжей головой и отсутстви-
ем полосы по краю хвоста.

Полевые признаки: мелкий
сокол с относительно короткими
крыльями. Самец сверху **бурова-
то-сизый с рыжими пятнами на
зашейке**, хвост сизый с черной
полосой на вершине, низ **белова-
то-рыжеватый с продольными
пестринами**. Самка сверху бурая
с сизым налетом, снизу **светло-
рыжая с бурыми продольными
пятнами на груди и темными
каплевидными – на брюхе**. Тем-
но-бурые молодые птицы похожи
на самок, от которых отличаются
голубоватой восковицей (у самок
– желтая). Голос – обычное отры-
вистое соколиное – «ке-е, ке-е, ке-
е» или «ки-ки-ки». Длина – 26-33,
крыло у самцов – 18.4-23.5, у самок
– 20.1-25.8 см, вес самцов – 163-215,



Ýurtyjy guşlaryň uçup barýarka görnüşi: 1 – turlutaý; 2 – göwenek (horazy); 3 – göwenek (mäkiýany); 4 – kepderiçi laçyn; 5 – laçyn; 6 – kiçi gyrgy ; 7 - kiçi gyrgy (mäkiýany); 8 – sähra göwenegi; 9 – bedeneçi gyrgy.

Хищные птицы в полете: 1 - чеглок; 2 - обыкновенная пустельга (самец); 3 - обыкновенная пустельга (самка); 4 - дербник; 5 - сапсан; 6 - кобчик (самец); 7 - кобчик (самка); 8 - степная пустельга; 9 - перепелятник.

Meñzeşlikleri–tapawutlary: hora-zy howada uçanda gara “murtunyň” ýokdugy we “balagynyň” çypardygy, mäkiýany – arkasynyň we kellesiniň reňkiniň meñzeşdigi bilen kiçi laçyn-dan tapawutlanýar.

Ýaşran ýerleri: Ýewraziýanyň we Amerikanyň demirgazyk zolagy. Arealynda höwürtegeleýän bölegi demirgazyk tokaýly tundra bilen araçäkleşýär, günortasynda Merkezi Gazagystanda we Týan-Şan daglaryna çenli ýetýär. Günorta Aziýada, Afrikada gyşlaýar. Türkmenistanda – günorta araçäkden Tejen jülgelerine çenli, onuň gündogara süýşmegi hem mümkin.

Ýaşayşy: uçup geçýän-gyşlaýan görnüş. Güzüne oktýabrda uçup gelyär, ýazyna – martda uçup gidýär. Kepderiçi laçyn tundranyň, tokaýly tundranyň we sähra giňişlikleriň ýaşayjysy, ol gyşlaýan wagty we uçup geçende, suw ýataklarynyň golaýynda saklanýar. Maýda guşlar – torgaýlar, atjagazlardyr, sarlar bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly görnüş, aýratyn-da, ýurduň gündogar böleginde, Tytmak gadagan.

самок – 216-300 г.

Сходства – отличия: самец в полете от чеглока отличается отсутствием черных «усов», и рыжих «штанов», самка – одноцветной со спиной головой.

Распространение: северная полоса Евразии и Америки. На севере гнездовая часть ареала граничит с лесотундрой, на юге доходит до Центрального Казахстана и Тянь-Шаня. Зимует в Южной Азии, Африке. В Туркменистане распространен, главным образом, от западных границ до долины Теджена, возможно и восточнее.

Образ жизни: пролетный, зимующий вид. Осенью появляется в октябре, отлетает в марте. Как обитатель тундры, лесотундры и степи, дербник на зимовке и пролете держится на открытых пространствах, в долинах рек, у водоемов. Питается, в основном, мелкими птицами – жаворонками, коньками, скворцами.

Статус: немногочисленный, особенно в восточной части страны, вид. Отлов запрещен.

90. Turlutaý – *Falco subbuteo* – Чеглок

Meýdan alamatlary: ganatlary yzyn we guýrugy başgalara garanýnda, gysga, kiçiräk laçyn. Arka tarapy goňurrak-gök, kellesi biraz garamtyl, bokurdagy we “duluklary” ak, gara “murty” inli, aşagy – açyk reňkli, dik tegmilli. **Guýrugynyň aşagy we “balagy” çypar reňkli.** Ýaşlarynyň reňki tutuk, çyparrak ýokundyly, ol arkasynda teňňeşekilli nagyşlary döredýär. Sesi laçynlara

Полевые признаки: небольшой сокол с длинными крыльями и относительно коротким хвостом. Спинная сторона буровато-сизая, голова несколько темнее, горло и «щеки» белые, **широкие «усы» черные**, низ светлый, с продольными пестринами. **Подхвостье и «штаны» рыжие.** Молодые окрашены менее ярко, с рыжеватым налетом, который образует на спине

häsiýetli gykylyk - "ki-ki-ki". Uzynlygy – 29-35, horazlarynyň ganaty – 24.5-27.5, mäkiýanlarynyňky – 25.8-29.6 sm, horazlarynyň agramy – 150-330, mäkiýanlarynyňky – 230-380 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: "bala-gynyň" çypardygy, ölçegleriniň kiçidi-gi; gök bähriden, garşylykly reňki we oňat saýgardýan "murty" bilen beýleki maýda laçynlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwür-tgeleýän bölegi – Ýewraziýanyň demirgazyk bölegi, çetki demirgazyk welaýatlaryndan başgalynda we Demirgazyk - Günbatar Afrikada. Orta Aziýada, Türkmenistany hem goşanynda, çäge-çöllükden başga, hemme ýerlerde gabat gelmegi mümkin. Bizde uly derýalaryň jülge-lerinde, oazislere, dagda we onuň eteklerinde ýaýran. Günorta Afrika-da, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: höwür-tgeleýär we uçup geçýär. Ýazyna aprele-de, güýzine – sentýabr - oktyabr aýlarynda, noýabryň ortasyna çenli uçup geçýär. Şol döwürde ol agaç, gyrymsy agaçlyk ýerlerde gezýär, höwür-tgesini beýik agaçlaryň üstünde – çynarda, adaty glediçiyada, toraňnyda, arçada gurýar. Apreliň aýagynda-maýyň başynda 2-3 sany goňur reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 32-34 x 40-43 mm. Iýunyň soňunda we iýulyň başynda jüýjeleri uçurym bolýar. Howada çalasyň we çalt, köpugrly hereketleri edip uçýar we maýda torgaýlardan jokjokylara çenli guşlary awlaýar, şeýle-de uly mör-möjekler, ýaryganatlar bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly görnüş, tutmak gadagan.

чешуйчатый рисунок. Голос – характерный соколиный крик «ки-ки-ки». Длина – 29-35, крыло у самцов – 24.5-27.5, у самок – 25.8-29.6 см, вес самцов – 150-330, самок – 230-380 г.

Сходства – отличия: от других соколов отличается рыжими «штанами», от сапсана меньшими размерами, от других мелких соколов – контрастной окраской и хорошо заметными «усаами».

Распространение: гнездовая часть ареала – северная половина Евразии, исключая крайние северные области, и Северо-Западная Африка. В Средней Азии, включая Туркменистан, может попадаться повсеместно, за исключением пустынь. У нас – по долинам крупных рек, в оазисах, предгорьях и горах. Зимует в Южной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: гнездится и пролетает. Весенний пролет в апреле, осенний – в сентябре-октябре, до середины ноября. Как на пролете, так и на гнездовье, связан с местообитаниями с древесно-кустарниковой растительностью. Гнезда устраивает на высоких деревьях – чинаре, гледичии, тополе, на арче. Кладка в конце апреля-начале мая, чаще из 2-3 коричневатого цвета яиц, размеры – 32-34 x 40-43 мм. Летные молодые появляются в конце июня-начале июля. Обладает ловким, маневренным полетом, позволяющим в воздухе ловить птиц – от мелких жаворонков и ласточек до дроздов, также питается крупными насекомыми, летучими мышами.

Статус: немногочисленный вид, отлов запрещен.

91. Ütelgi – *Falco cherrug* – Балобан

Meydan alamatlary: beden gurluşy daýaw, beýlekilere görä uly laçyn. Horazy we mäkiýany reňkleri boýunça meňzeş, emma ölçegleri dürli. **Açyk we gamtyl reňkli** guşlar tapawutlanýar. Uly guşlaryň üsti gamtyl-goňur ýada açyk-goňur, ýelekleri çyparrak gaýmaly, **kellesiniň reňki arkasyna garanynda agymtyl ýa-da ak damjaşekilli goňur tegmilli.** Ýaşlarynyň üsti birmeňzeş goýy-goňur, aşaky ýüzi – dik goňur tegmilli, açyk reňkli. Uly guşlarda **"mumjyk", gözüniň töweregindäki halka we aýaklary sary,** ýaşlarynyňky - **gögümtil.** Sesi çagyryjy – "kee-kee-kee" ýa-da pert, howasalaly gykylyk - "ki-ki-ki". Uzynlygy – 47-55, horazlarynyň ganaty – 34.5-38.5, mäkiýanlarynyňky – 37-41 sm, horazlarynyň agramy – 730-800, mäkiýanlarynyňky – 1000-1300 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: beden gurluşy daýaw, ölçegleriniň uludygy bilen maýda laçynlardan-gök bähriden-kiçidigi, reňkiniň garşylykly we oňat görünüň "murty" bilen beýleki maýda laçynlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwür-tgeleýän bölegi giň – Ýewraziýanyň tokaýly sähra, sähra, çäge-çöllük we dag ýerleri, günbatarynda Dunaýyň aşaky akymyndan gündogara, Hingana çenli ýaýran. Orta Aziýanyň, beýik dag gerişlerinden we ösümlük örtüksiz düzlük ýerlerinden başgalynda giňişleýin duşýar. Türkmenistanda daglyk, çöllük ýerlerde, uçup geçende derýa jülge-lerinde

Полевые признаки: крупный сокол относительно массивного телосложения. Самец и самка по окраске схожи, но отличаются размерами. Различают птиц **светлого и темного окраса.** У взрослых птиц верх темно-бурый или светло-бурый, с рыжеватыми каемками перьев, **голова светлее спины, низ рыжеватого-беловатый или почти белый, в каплевидных бурых пятнах.** Молодые имеют сверху более однообразную темно-бурую, а снизу светлую окраску, с бурыми продольными пятнами. У взрослых птиц **восковица, кольцо вокруг глаз и лапы желтые,** у молодых – **синеватые.** Голос – призывный крик «кее-кее-кее» или тревожное, резкое «ки-ки-ки». Длина – 47-55, крыло у самцов – 34.5-38.5, у самок – 37-41 см, вес самцов – 730-800, самок – 1000-1300 г.

Сходства – отличия: от мелких соколов отличается довольно крупным, массивным телосложением, от сапсана – отсутствием широких черных «усов» и мало контрастной окраской.

Распространение: гнездовая часть ареала широкая – лесостепные, степные, пустынные и горные области Евразии – от низовьев Дуная на западе, до Хингана на востоке. В Средней Азии распространен повсеместно, за исключением высокогорий и участков равнин, лишенных растительности. В Туркменистане встречается в горной местности, в пустыне, на пролетах в долинах рек. Зимовки – в Малой,

gabat gelýär. Kiçi, Alynky, Günorta (Hindistanyň demirgazyk bölegi) we Gündogar Aziýa, Afrikanyň demirgazygynda käbir ýerlerde, Demirgazyk Amerikanyň günorta-günbatar welaýatlarynda orurymly ýaşaýar.

Ýaşayşy: ütelginiň türküstan aşaky görnüşi, bizde oturymly ýaşaýar, güýzüň soňundan ýaz aýunyň başyna çenli az - owlak dikligine (dagda) we keseligine (düzlükde) aralaşma uçsulary geçirýär. Ütelginiň adaty aşaky görnüşi – uçup geçýär we gyslaýar. Fewralda we martyň birinji ýarymynda uçup gidýär güýzine - oktýabrda uçup gelýär. Uçup geçende, aчык giňliklerde, şol sanda çöllük ýerlerde saklanýar. Höwürtgisini dagda uçut gaýalaryň erňeklerinde ýa-da barmasy kyn bolan ýerlerde, Garagumda – çulbalarda we gyrlaryň erňeklerinde gurýar. Şol bir höwürtgäni köp ýyllap ulanýar. Fewralyň aýagynda-martyň başynda höwürtgeläp başlaýar, 2-3, käte 1 ýa-da 4 sany gyzylmytyl ýa-da çyparrak-goňur menekli aчык-goňur ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 40.3-44 x 53-61 mm. Dürli guşlar, gemrijiler, towşanşekilliler bilen ýymitlenýär. Ýymit düzümi awlaýan görnüşleriniň gürlüğine we awlagyň elýeterlidigine bagly.

Statusy: seýrek görnüş, MSOP-ýň Gyzyl sahypasyna we Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen. Tutmak we awlamak düýbinden gadagan. Laçyn guşlar hökmünde laçynlaryň arasynda uly meşgurlyga eýedir. Laçyn guşlar bilen aw etmek, gadymy döp-dessury galkyndyrmak we dikeltmek maksady bilen, ýerli laçynçylary tutmak we saklamak üçin, Türkmenistanyň Tebigaty goramak

Передней, Южной (северная половина Индостана) и Восточной Азии, местами на севере Африки, в юго-западных областях Северной Америки живет оседло.

Образ жизни: туркестанский подвид балобана у нас живет оседло, совершая с поздней осени до ранней весны незначительные вертикальные (в горах) и горизонтальные (на равнине) перемещения. Обыкновенный подвид балобана пролетает и зимует. Отлет и весенний пролет в феврале-первой половине марта, осенью появляется в октябре. На пролете предпочитает открытый ландшафт, включая пустыню. Гнезда в горах устраивает в нишах отвесных скал или под выступами, в Каракумах – по останцам и чинкам. Одно и то же гнездо занимают много лет подряд. К гнездованию приступают рано – в конце февраля-начале марта. В кладке обычно 2-3 яйца, иногда 1 или 4, светло-коричневых, с красноватыми или рыжеватобурными пятнами, размеры – 40.3-44 x 53-61 мм. Питается различными птицами, грызунами, зайцами. Рацион зависит от обилия и доступности объектов охоты.

Статус: редкий вид, включен в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана. Отлов и добыча категорически запрещены. Может содержаться в питомниках. Как ловчая птица пользуется большой популярностью среди сокольников. С целью возрождения и поддержания древней традиции охоты с ловчими птицами для содержания сокольниками необходима выдача специального разрешения

ministriginiň berýän ýörite rugsatnamasy zerurdyr.

Министерства охраны природы Туркменистана.

92. Çyparbaş laçyn – *Falco peleginoides* – Шахин

Meýdan alamatlary: gysga guýrukly we ganatlary uzyn, ýiti uçly orta ölçegdäki laçyn. Mäkiýany horazyndan ulurak. **Kellesi çypar ýa-da gyzylmytyl, “murtynyň” nagşy hem çypar reňkli**, arkasy gowy gögümtil, garyn tarapy sarymytyl-gyzgyt-çypar reňkli bolýar. Ýaş guşlarda çypar öwüşgin agdyklyk edýär, aýratyn-da, garyn tarapynda, aýagy, üstki çüňkündäki “mumjyk” we gözünüň töwergindäki halka agymtyl-sary reňkli, ýetişen guşlardan tapawutlylykda, olaryň bedeniniň bu bölek agzalary sary. Horazlarynyň uzynlygy – 33-37, mäkiýanynyňky – 36-39, horazlarynyň ganaty – 27.4-30.2, mäkiýanlarynyňky – 31.2-33.6 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: beýleki laçynlardan, ilki başdan, gök bähriden depesiniň çypardygy bilen oňat tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Orta we Günorta Aziýa (Demirgazyk-Günbatar we Demirgazyk - Gündogar Afrikadan başgalarynda aşaky görnüş gabat gelýär). Türkmenistanda dagda we dag eteklerinde, uçup geçýän döwründe derýa jülgelerinde ýaşaýar.

Ýaşayşy: höwürtgeläp, uçup geçýär, bölekleyin gyslaýar. Ýazyna martda, güýzine – oktýabryň soňunda - noýabryň başynda uçup geçýär. Gaýalaryň eginlerinde, dereleriň uçutlarynda höwürtgeläp. Jübütligi durukly, beli bir ýerde höwürtgeläp. Martyň aýagynda jübütleşme geçýär. Aprelyň soňunda-maýyň başynda 2-3 sany ýumurtga goýýar, adatça 2, seýrek 3 ýa-da 1 sany sütük ýelekli

Полевые признаки: среднего размера сокол, с относительно коротким хвостом и длинными острыми крыльями. Самка крупнее самца. **Голова рыжая или красноватая, каемка «усов» также рыжая**, спина темно-сизая, брюшная сторона имеет ржаво-рыжеватый цвет. У молодых преобладают рыжие тона, особенно с брюшной стороны, а лапы, восковица и кольцо вокруг глаз бледно-желтого цвета, в отличие от взрослых, у которых все эти участки тела желтого цвета. Длина самцов – 33-37, самок – 36-39, крыло у самцов – 27.4-30.2, у самок – 31.2-33.6 см.

Сходства – отличия: от других соколов, прежде всего от сапсана, хорошо отличается рыжим темением.

Распространение: Средняя и Южная Азия (в Северо-Западной и Северо-Восточной Африке встречается другой подвид). В Туркменистане распространен в горных и предгорных районах, на пролете по долинам рек.

Образ жизни: гнездится, пролетает, частично зимует. Весенний пролет в марте, осенний – в конце октября-начале ноября. Гнездится в нишах и на карнизах скал, по обрывам ущелий. Места гнездования и пары постоянны. Брачные игры и спаривание наблюдаются с конца марта. Кладка в конце апреля-начале мая, состоит из 2-3 яиц. В выводке обычно 2, редко 3 или 1 птенец. Выводки держатся вместе

jüýjeleri bolýar. Jüýjeleri sentýabra çenli uçurym bolýar. Aglaba, bu guşlar (maýdadan orta ölçegli serçeşekillilere çenli bolan jandarlary, käte uly gazlary hem awlaýar), şeýle-de ýarganatlary bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek we sany azalýan görnüş hökmünde MSOP-nyň Gyzyly sagypasyna we Türkmenistanyň Gyzyly kitabyna girizilen. Tutmak gadagan. El guşy üçin ulanylýar. Laçynlary saklamak üçin, edil ütelgi ýaly, Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň berýän ýörite rugsatnamasy zerurdyr.

93. Gök bähri – *Falco peregrinus* – Сапсан

Meýdan alamatlary: başgala-gara garanynda uly laçyn, emma ölçegi boýunça ütelgiden kiçi. **Has garşylykly** reňklenen – uly gök bähriniň üsti gögümtil-çal (mäkiýanyň arkasy horazyna görä garamtyrak), **kellesi arkasyna garanynda garamtyrak**, aşagy ýagty, döşi we bedeniniň böwürleri kese zolakly, **gözünden aşaklygyna gidýän garazolak – “murty” aýdyň görünýär.** Bokurdagy we “duluklary” agymtyl reňkli. Ýaşlarynyň üsti goýy melemtil-goňur, aşagy – dik tegmilli. Sesi - “ke-e, ke-e” ýa-da “kýäk-kýäk-kýäk”. Horazlarynyň uzynlygy – 38-45, mäkiýanlarynyňky – 46-51, horazlarynyň ganaty – 28.9-34.1, mäkiýanlarynyňky – 33-39 sm, horazlarynyň agramy – 500-800, mäkiýanlarynyňky – 540-1090 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: “murtunyň” garadygy bilen ütelgiden, kellesiniň garadygy bilen çypar laçyndan, ölçegleriniň uludygy we çypar “balagynyň” ýokdugy bilen turlutaýdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: dünýäniň hemme

иногда до сентября. Питается, преимущественно, птицами (от мелких до средних размеров воробьиных, но иногда крупных птиц), а также летучими мышами.

Статус: как редкий и сокращающийся в численности вид включен в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана. Отлов запрещен. Используется в качестве ловчей птицы. Для содержания сокольникам, как и для балобана, выдается специальное разрешение Министерства охраны природы Туркменистана.

Полевые признаки: относительно крупный сокол, хотя по размерам несколько уступает балобану. Окрашен **более контрастно** – взрослый сапсан сверху сизовато-серый (спина у самки темнее, чем у самца), **голова несколько темнее спины**, снизу светлый с поперечными полосами на груди и боках тела, **ярко выражены «усы» – опускающиеся от глаз вниз.** Горло и «щеки» светлые. У молодых верх коричневатобурый, низ светлый с продольными пестринами. Голос – «ке-е, ке-е», или «кьяк-кьяк-кьяк». Длина самцов – 38-45, самок – 46-51, крыло у самцов – 28.9-34.1, у самок – 33-39 см, вес самцов 500-800, самок – 540-1090 г.

Сходства – отличия: от балобана отличается черным «усами», от шахина – темной головой, от чеглока – крупными размерами и отсутствием рыжих «штанов».

Распространение: по всему миру, за исключением равнинной части Южной Америки и Централь-

ýerlerinde - Günorta Amerikanyň we Merkezi Awstraliýanyň düzlük böleginden başga ýerlerde. Orta Aziýada uçup geçende, köp ýerlerde gabat gelýär. Türkmenistanda - Uly Balkanda, Köpetdagda we Köýtendagda mekan tutýar, uçup geçende we guşlaýan wagty Hazar deňziniň gündogar kenarynda, Köpetdagyň eteklerinde, der-ýalaryň jülgelerinde gabat gelýär.

Ýaşaýşy: uçup geçýär we guşlaýar, dagda bir bölegi oturymly ýaşaýar. Açyk giňişlikleri we suw-batgalyk meýdanlary halaýar. Güýzüne oktyabryň ikinji ýarymynda uçup gelýär we martyň soňuna çenli galýar. Bu guşlar guşlaýan döwründe jübüt bolup gezyýärler. Dagda höwürtegeýär, aprelda 2-3 sany köpsanly goňur menekli agymtylrak-çypar ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 41-42 x 55-56 mm. Elmydama ýabany guşlar bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek we sany azalýan görnüş hökmünde Türkmenistanyň Gyzyly kitabyna girizilen. Tutmak gadagan. Gök bähri ýurtlaryň köpüsünde ykrar edilen guş hökmünde awçy laçyn. Bizde onuň bilen aw etmek, ütelgä garanynda meşhur däldir.

94. Hindi ütelgesi – *Falco jugger* – Лаггар

Meýdan alamatlary: ütelginiň ýa-da çypar laçynyň ölçeginde. Üstki tarapy çalymtyl-goňur reňkli, kellesiniň üsti çypparak, aşagy goňur tegmilli ak. **“Balagy” birmeňzeş goňur, söbüginiň ýokarky bölegi ýelek örtükli.** Ýaş guşlaryň arka ýelekleri çypar gaýmaly we çypparakak garny garamtyl dik zolakly. Uly guşlaryň aýaklary sary, ýaşlarynyňky – mawymtyl. Uzynlygy – 43-46, ganaty – 30.5-37.0 sm, agramy - 780 g

ной Австралии. В Средней Азии во многих местах встречается на пролете. В Туркменистане населяет Большие Балханы, Копетдаг и Койтендаг, на пролете и зимовке встречается на восточном побережье Каспия, в предгорьях Копетдага, по долинам рек.

Образ жизни: пролетает и зимует, часть особей в горах живет оседло. Также предпочитает открытый ландшафт, водно-болотные угодья. Осенью появляется во второй половине октября и остается до конца марта. Пары не распадаются и зимой. Гнездование в горах. Кладка из 2-3 беловато-рыжеватых с многочисленными коричневыми пятнами яиц, в апреле. Размеры яиц – 41-42 x 55-56 мм. Питается почти всегда дикими птицами.

Статус: как редкий и сокращающийся в численности вид включен в Красный список МСОП и в Красную книгу Туркменистана. Отлов запрещен. Сапсан – признанный во многих странах охотничий сокол. Охота с ним у нас, по сравнению с балобаном, почти не практикуется.

Полевые признаки: размером с балобана или шахина. Верхняя сторона серовато-бурого цвета, верх головы рыжеватый, низ белый с бурыми пестринами. **«Штаны» одноцветно бурые, цевка оперена в верхней части.** Молодые птицы с рыжими каемками на перьях спины и темными продольными полосами на рыжеватобелом брюхе. Лапы у взрослых желтые, у молодых – голубоватые. Длина – 43-46, крыло

(Çäçe obasynyň gündogaryndan tutulan arryk mäkiýan guş).

Meñzeşlikleri-tapawutlary: daşyndan ütelgä çaly m edýär, emma ondan biraz syratly. Ölçeğleri çypar laçyna meñzeş, ondan “balagynyň” goňurdygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta (Päkistan, Hindistan, Mýanma) we Alynky (Owganistan) Aziýa. Orta Aziýada Gazagystanyň günortasynda, Özbegistanda we Türkmenistanda (Gündogar Köpetdagyň eteginde) ýekeklikde gabat gelýär.

Ýaşayşy: Türkmenistan boýunça maglumat ýok. Oturymly ýaşayar. Aprelde - maýda höwürtegeleýär. Hindi ütelgesiniň iň ýakyn höwürtegeleýän ýeri Owganystan. Gemrijiler we orta ululykdaky guşlar (kepderi, gok garga we başg.) bilen iýmitleňýär.

Statusy: juda seýrek, tötänden uçup gelyän görnüş. Tutmak we atmak gadagan. Bu laçynyň duşandygy baradaky islendik maglumat örän gymmatly.

TOWUKŞEKILLILER – GALLIFORMES – КУРООБРАЗНЫЕ

Boýuny gysga, kellesi kiçiräk we çünki kelte, öňe çykyp durýan petekeli, dykz beden gurluşly orta, seýrek uly ýa-da maýda möçberli gury ýer guşlary. Daýaw aýakly, orta uzynlykdaky güýçli barmakly (öňe üç barmagy we biri yza gönügýär), gysgajyk çala egmek uýy kütek dymakly. Görnüşleriň köpüsiniň horazlarynyň aýaklarynda ökje ösüntgisi bolýar. Ganatlary gysga we inli, ýelek örtügi dykz hem gaty. Görnüşleriň aglabasynyň horazlarynyň we mäkiýanlarynyň arasyndaky tapawut aýdyň görünýär. Horazlary açyk reňkli, mäkiýanlaryň ýelek örtügi

– 30.5-37.0 см. Вес (единственной отловленной у нас восточнее пос. Чааче худой самки) составлял 780 г.

Сходства – отличия: внешне напоминает балобана, но несколько стройнее. По размерам сходен с шахином, от которого отличается бурими «штанами».

Распространение: в Южной (Пакистан, Индия, Мьянма) и Передней (Афганистан) Азии. В Средней Азии единичные птицы встречались на юге Казахстана, Узбекистана и Туркменистана (предгорьях Восточного Копетдага).

Образ жизни: данных по Туркменистану почти нет. Ведет оседлый образ жизни. Гнездится в апреле-мае. Ближайшие места гнездования лаггара – в Афганистане. Питается грызунами и птицами средней величины (голуби, сизоворонки и др.).

Статус: крайне редкий залетный вид. Отлов и добыча запрещены. Любая информация о встречах этого сокола очень ценна.

Наземные птицы средней, реже крупной или мелкой величины. Телосложение плотное, с выступающим зобом, голова небольшая с короткой шеей и коротким клювом. Ноги сильные, средней длины с крепкими пальцами (три пальца направлены вперед и один назад), с короткими слегка изогнутыми тупыми когтями. На ногах самцов многих видов имеются шпоры. Крылья короткие и широкие, оперение плотное и жесткое. У большинства видов выражены различия между самцами и самка-

ýaşayan ýeriniň reňki bilen utgaşýar. Köpüsi ýerde iýmitleňýär we şol ýerde hem höwürtegeleýär. Ýerde çalasy m we çalt hereket edýärler. Dik ýokarlygyna, onda-da, sesli uçýarlar. Okgunly, emma agyrylyk bilen, adaçça, gysga aralyga uçýarlar. Görnüşleriň köpüsi oturymly (bedene uçup geçýän guş), jübüt bolup ýaşayarlar. Görnüşleriň köpüsünde jübütleşmek warkyldama bilen geçýär, guşlar şol döwürde kiçiräk sürä toplanýarlar. Nesil aladasy m mäkiýan guş çekýär. 6-dan 18-e çenli maýdarak ýumurtgalary goýýar. Ýylda bir gezek köpeliýär we 3-den 4 hepde çenli kürk bolup oturýarlar. Ýumurtgalarynyň gabygy galyň we berk, reňki ala ýa-da birmeñzeş. Jüyjeleri ýumurtgadan sütük ýelekli çykýar we çalt ösýärler. Awçylaryň awlag guşy, awlag guşlaryny ösdürip ýetişdirmekde gymmatly görnüş. Dünýäde 250-den gowrak görnüşi bolup, bizde sülgünler maşgalasyndan (*Fhasianidae*) 6 görnüş.

95. Dag hindi towugy – *Tetraogallus caspius* – Каспийский улар

Meýdan alamatlary: hindi towuk ölçegli, käkilik sypatly guş, şonuň üçin onuň ady “dag hindi towugy” diýip tutulýar. Towukşekillileriň arasynda iň ulusy. **Horazy we mäkiýany birmeñzeş reňkde.** Depesi goýy-çal, arkasy garamtyl-çal. **Bokurdagynyň gapdallary çal zolakly, alkymy we bokurdagy ak, petekesi açyk-çal.** Döşi çal, çyparrak-sary öwüşginli we gara tegmilli. Guýrugynyň aşagy ak, garny dik çypar çyzyklanан goýy-çal. **Gysga aýaklary daýaw, sarymtyl-mämişi reňkli, çünki sarymtyl-reňkli.** Ganatlary gysga, guýrugy baş-

ми. Самцы окрашены ярче, оперение самок более гармонирует с окраской местности. Большинство кормятся и гнездятся на земле. Движение по земле ловки и быстры. Взлетают почти вертикально и с шумом. Полет стремительный, но тяжелый, обычно на короткое расстояние. Большинство видов ведут оседлый образ жизни (хотя перепел перелетная птица), живут парами. Спариванию у многих видов предшествует токование, при котором птицы скапливаются в небольшие группы. Забота о потомстве ложится на самок. Яйца относительно мелкие, в кладках от 6 до 18 яиц. Кладка – раз в году, насиживают от 3 до 4 недель. Скорлупа яиц толстая и прочная, окраска – пестрая или одноцветная. Птенцы после вылупления покрыты густым пухом, развиваются относительно быстро. Объекты спортивной охоты, ценятся при дичеразведении. В мире более 250, у нас 6 видов из семейства фазановые (*Fhasianidae*).

Полевые признаки: по облику напоминает кеклика, но размером с индюка, поэтому его нередко называют «горной индейкой». Среди куриных – самая крупная птица. **Самец и самка окрашены почти одинаково.** Темя – темно-серое, спинная сторона черно-серая. **По бокам горла серые полосы, подбородок и горло белые, зоб светло-серый.** Грудь серая с рыжеватого-желтоватым оттенком и черными пятнами. Подхвостье белое, брюхо темно-серое с рыжеватыми продольными штрихами.

galara garanyňda uzyn we sähelçe tegelenen. Mäkiýany horazyndan kiçi. Sesi ýazyna – özboluşly güpürdili gykylyk, güýçli mylaýym sykylygyň we güýjeýän “rýuli-rýull-rýull...” saýrama heňine çalymdaş owaz bilen gutarýar. Ganaty – horazlarynyňky – 296-312, mäkiýanlarynyňky – 270-290, guýrugy – 195-199, çüňki – 34-35 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: meňzeş görnüşleri Türkmenistanda ýok.

Ýaýran ýerleri: Kawkaz, Kiçi we Alynky Aziýanyň daglyk ýerlerinde, şeýle-de Orta Aziýada, diňe Türkmenistanda – Merkezi Köpetdagyň ýokarky guşaklygynda (deniz derejesinden 2000 m gowrak) gabat gelýär.

Ýaşayşy: oturymly guş, seýrek arçalykly, ýalaňaç eňňitli gerşir we süýgün daşly ýerler bilen aralaşýan uçut gaýaly jülgeleriň barmasy kyn bolan eňeklerinde ýaşayar. Tomusda – suwa ýanaşyk, ösümlikleri guramadyk ýerlerde; gyşyna – aşagrakda, dagyň az garly, gününň şöhesine ýylyýan ýerlerinde (1400-1500 m) gezyär. Guşlaryň jübütligi durnukly (monogam), ýaşynyň ikinji ýylynda köpelip başlaýar. Horazlaryň wakwaky fewralyň aýagyndan başlanýar, aprel-maýda ýokary derejä galýar we iýunyň ortasynda tamamlanýar. Höwürtgese ýerde, içine otlaryň sypallary, mohlar, guşlaryň ýelekleri düşelen çukurjyk, seýrek höwürtgisini daşlaryň aşagynda, gaýalaryň eňeklerinde, gyrymsynyň aşagynda gurýar. 6-dan 13-e çenli açyk toprak sypatda öçügsi ýaşylymytl öwüşginli we goňurrak-gyzyl meneklenen, çowly tarapy tegmillije (kütek tarapy tegmilsiz) ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 65.4 x 45.9 mm.

Ноги короткие сильные, желтовато-оранжевого цвета, клюв желтоватого цвета. Крылья короткие, хвост относительно длинный и слегка закругленный. Самки несколько меньше самцов. Голос весной – своеобразные рокочущие крики, заканчивающиеся громким мелодичным свистом и ускоряющейся трелью, похожей на «рюли-рюль-рюль...». Крыло – у самцов – 296-312, у самок – 270-290, хвост – 195-199, клюв – 34-35 mm.

Сходства – отличия: в Туркменистане сходных видов нет.

Распространение: Кавказ, горные области Малой, Передней, а также Средней Азии, где встречается только в Туркменистане – верхний пояс (более 2000 м над ур.м.) Центрального Копетдага.

Образ жизни: оседлая птица, обитающая по труднодоступным карнизам и крутым склонам ущелий с разреженными арчевниками, чередующимися с голыми склонами и осыпями. Летом – на участках с невысокой растительностью вблизи водоемов; зимой – нижние, прогреваемые солнцем малоснежные участки гор (1400-1500 м). Пары постоянные, моногамы, размножаются на второй год жизни. Токование самцов – с конца февраля, пик – апрель-май, и заканчивается к середине июня. Гнезда – на земле – ямка, выстланная сухими травинками, мхом, перьями самой птицы, реже гнезда бывают в нише скалы, под камнем, кустом. В кладке от 6 до 13 яиц. Яйца – светло-землянистого цвета с матовым зеленоватым отливом и отдельными коричнево-красными крапинками и пятнами

Maý aýunyň başyndan iýunyň başyna çenli jüýjeleýär. 8-10 sany jüýjeleri sentýabra çenli, mümkin gyşda-da bile dargaman gezyär. Güýzde 10-20 sany bolup, toplanýarlar. Ýazyna – ösümlikleriň baldaklary, gülleri, ýapraklary; güýzine we gyşyna – tohumlary, miweleri, ýerasty özgeren baldaklary, soganlary bilen iýmitleňýär.

Statusy: örän seýrek görnüş, ýaýran ýerleri çäkli, Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizilen. Köpetdag döwlet goraghanasynyň guşlarynyň iň täsin we gymmatly wekilleriniň biri.

96. Käkilik – *Alectoris chukar* – Кеклик

Meýdan alamatlary: ululygy kiçiräk towuk ýaly. Üstki tarapy mawymtylrak çal, gyzylymytl-goňur öwüşginli. Bokurdagy açyk çypar reňkli we ýaňaklary gözünden başlanýan gara zolak bilen gaýalan. Petekesi we garnynyň öňki tarapy mawymtyl-çal, garnynyň galan bölegi çyparrak-açyk goňur. **Böwürleri inli ak, gara we çypar kese zolakanan.** Mäkiýany horazyndan kiçi. **Çüňki we gözünüň töweregindäki halka gyzyl, aýaklary – gyzylymytl - gülgüne.** Sesi guşa häsiýetli gykylyk – “ke-ke-lek, ke-ke-lek”. Şol gykylygy boýunça ol öz adyny alan. Ganaty – 164-172 (mäkiýanlary) we 170-180 (horazy) sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçeginiň uludygy, çüňküniň, aýagyň gyzylymytl-gülgünedigi we bokurdagyň akdygy bilen çil käkilikden tapawutlanýar. Türk-

na ostrom konçe, na tупом они почти отсутствуют. Размеры яиц – 65.4 x 45.9 мм. Птенцы – с начала мая – до начала июня. Выводок – 8-10 птенцов, не распадается до сентября, возможно, до зимы. Осенью образуют табунки до 10-20 особей. Питаются, главным образом, растительной пищей: побегами, цветами, листьями – весной; семенами, плодами, корневищами, луковичками – осенью и зимой.

Статус: очень редкий вид, с ограниченным распространением, внесен в Красную книгу Туркменистана. Один из наиболее важных и интересных представителей Копетдагского заповедника.

Полевые признаки: размером с курицу. Верхняя сторона голубовато-серая с красновато-бурым оттенком. **Светло-рыжее горло и щеки окаймлены черной полосой, идущей к глазам.** Зоб и передняя часть брюха голубовато-серые, остальное брюхо рыжеватое-светло-коричневое. Бока – в широких белых, черных и рыжих поперечных полосах. Самка меньше самца. **Клюв и кольцо вокруг глаз – красные, ноги красно-розовые.** Голос – характерный крик «ке-ке-лек, ке-ке-лек». По этому крику птица получила свое название. Крыло – 164-172 (самки) и 170-180 (самцы) см.

Сходства – отличия: от пустынной куропатки отличается крупными размерами, красно-розовыми клювом и лапами и белым горлом. В Туркменистане – 4 формы кекликов:

menistanda käkilikleriň 4 sany - köpetdag, bathyz-garabil, balkan, üstýurt-garagum, gyzylgum atly şertli aşaky görnüşleri tapawutlandyrylýar. Olar öz aralarynda birmeňzeş, emma ýelek örtügininiň reňk öwüşginini, ölçegleri boýunça aýry.

Ýaşan ýerleri: Kawkaz, Ýakyn Gündogar, Alyny, Orta we Merkezi Aziýa, Gimalaý daglary. Türkmenistanda – daglarda we dagetek düzlüklerde we derýalaryň jülgelerinde, şeýle-de Günbatar Uzboýda, Hazaryakasynda we Garabogazýakasynda, Günorta Üstýurtda, Merkezi Garagumuň käbir ýerlerinde duşýar.

Ýaşayşy: oturymly görnüş, emma ýylyň sowuk döwründe dikligine, ýokary galma hereketlerini geçirýär. Ýerde ýaşýar. Jübüt ýa-da süri bolup gezyär. Höwürtgesi daşlaryň, gyrymsynyň ýa-da ösgün otlaryň aşagynda içine ösümlikleriň çüýrän sypallary düşelen kiçiräk çukurjyk. Aprel-maý aýlarynda 6-dan 19-a çenli maýdajik nagyşlyja ak ýa-da goňurrak ak ala ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 35-45 x 26-29 mm, agramy – 16-19 g. Maýdan iýunyň aýagyna çenli jüýjeleri çykýar. Jüýjeleri bir günden soň höwürtgäni taşlaýarlar we olaryň ösüşi çalt geçýär. Bir-üç hepdelik ýaşdaky jüýjeleri 30-40 we ondan-da köp bolup, sürä toplanýarlar we güzgyş döwründe bile gezyärler. Esasan, ösümlikleriň tohumlary, miweleri, ýapraklary, ter baldaklary, soganlary, ýerasty özgeren baldaklary, şeýle-de haýwandan – mör-möjekler, möýler, balykgulaklar bilen iýmitlenýär. Tomsuna uzygiderli suw içmäge gatnaýar.

Statusy: adaty görnüş, emma kadadan köp awlanýandygy üçin, onuň

копетдагская, бадхыз-карабильская, балхан-устюрт-каракумская и казылкумская. Они очень схожи, но отличаются оттенками оперения и размерами.

Распространение: Кавказ, Ближний Восток, Передняя, Средняя и Центральная Азия, Гималаи. В Туркменистане в горах и предгорьях и по долинам рек, а также по Западному Узбою, в Прикаспии и Прикарабогазье, на Южном Устюрте, местами в Центральных Каракумах.

Образ жизни: оседлый вид, но совершает вертикальные перемещения в холодное время года. Ведет наземный образ жизни. Держатся парами или стайками. Гнездо в небольшой ямке, слабо выстланное растительной ветошью, под камнями, прикрытием куста, травы. Кладка – с апреля по май, а птенцы – с мая до конца июня. В полных кладках от 6 до 19 белых или буровато-белых яиц с пестринами и мелким точечным рисунком. Размеры яиц – 35-45 x 26-29 мм, вес – 16-19 г. Через сутки после вылупления птенцы покидают гнездо. Развиваются птенцы быстро. В возрасте одной-трех недель выводки объединяются и образуют стаи по 30-40 и более птиц, которые держатся вместе в течение осени и зимы. Основной корм – семена, плоды, листья, зеленые побеги, луковицы, клубни растений, а также животные корма – насекомые, пауки, моллюски. Летом регулярно посещают водопои.

Статус: обычный вид, но из-за чрезмерной охоты, объектом которой он является, численность резко

baş sany azalýar. Guşlary köplenç suwa gelende, hatda gadagan edilen usullar bilen – daşyna açyk reňkli mata bölekleri tutulan çatmada oturyp tüpeňleyärler. Türkmenistanda olary emeli ýagdaýda köpeltmegiň ylmy esaslary işlenilip düzülde. Baş sanyna gözegçilik we aw etmegiň wagtyny anyk kesgitlemek gerek.

97. Çil käkilik – *Ammoperdix griseogularis* – Пустынная куропатка

Meýdan alamatlary: kepderiden kiçi, emma bedeneden ulurak. Umumy reňki çalymtyl - “çöl reňkli”. Horazynyň arkasy çypparrak-gülgüne ýokundyly. **Maňlaýy we gözüniň üstündäki zolak gara, gözüniň yzy dik ak tegmilli.** Petekesi we döşi gülgüne-çyppar bolup, ýuwaş-ýuwaşdan garnynda ak reňke geçýär. Bówürleri - gyralary poslyrak dik inli gara zolakly. Çünki mämişi, aýaklary kirliräk sary. Mäkiýany has tutuk reňkli, gözüniň üstünde açyk sarymtyl gaşy bolýar. Ganaty – 124-133 mm, agramy – 180-220 g. Horazlarynyň ganaty – 125-138, mäkiýanlaryňky – 120-125, guýrugy – 60-65, çüňki – 10-12 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň kiçidigi, aýaklarynyň we çüňküniň agymtyldygy we bokurdagynda ak tegmiliň ýokdygy bilen beýleki käkilikden tapawutlanýar.

Ýaşan ýerleri: Alyny we Orta Aziya. Türkmenistanda – Gubadagda, Uly we Kiçi Balkan daglarynda, Köpetdagda, Bathyzda, Garabilde, Köýtendagda duşýar.

Ýaşayşy: oturymly guş. Dag eteklerinde we dagyň aşaky kemerinde ýaşýar. Ýarymçöllük we sähralaşan ýerleri halaýar. Yumurtgalayan döwri dowamly, ol ilkinji goýulan

сокращается. Добывается ружьем с подхода, у водоемов, и порой запрещенными методами – под прикрытием щита, затянутого яркими кусками материи. В Туркменистане разработаны научные основы искусственного разведения. Необходим контроль за численностью и строгая регламентация охоты.

Полевые признаки: меньше голубя, но крупнее перепела. Окраска в целом сероватая, «пустынная». У самцов спина с рыжевато-розовым налетом. **Лоб и полосо над глазом черные. Зоб и грудь розовато-рыжие**, постепенно переходящие в беловатый тон на брюхе. На боках – продольные черные широкие полосы с ржавчатыми краями. **Клюв оранжевый, ноги грязно желтые.** Самка окрашена в более тусклые тона, над глазом видна лишь желтоватая светлая бровь. Крыло – 124-133 мм, вес – 180-220 г. Крыло у самцов – 125-138, у самок – 120-135, хвост – 60-65, клюв – 10-12 мм.

Сходства – отличия: от кеклика отличается меньшими размерами, светлыми ногами и клювом и отсутствием белого на горле.

Распространение: Передняя и Средняя Азия. В Туркменистане – Кубадаг, Большие и Малые Балханы, Копетдаг, Бадхыз, Карабиль, Койтендаг.

Образ жизни: оседлая птица. Обитает в предгорьях и нижнем поясе гор. Предпочитает полупустынные и остепненные участки. Период яйцекладки сильно растянут, что связано гибелью первых кладок и с

ýumurtgalaryň gyrylmany hem-de bir ýýllyk we uly ýaşly guşlaryň köpelmeginiň ara tapawudy bilen bagly. Apreliň soňundan maýyň aýagyna çenli ýumurtga goýýar. Höwürtgese örän gizlin ýerde, içine sähelçe ösümlük sypallary düşelen daşlaryň aşagyndaky çukurlyk. Höwürtgede 14-e çenli meneksiz mesge reňkli ýumurtgalar bolýar. Awgustyň ortasyna çenli jüýjeleýär. Ösümlükleriň tohumy we miweleri bilen iýmitleýär. Jüýjelerini mör-möjekler bilen iýmitlendirýär.

Statusy: sany azalýan görnüş. Awçylaryň awlag guşy (ýerli ady – “çil”), edil käkilik ýaly, baş sanyna gözegçilik we aw etmegiň wagtyny anyk kesgitlemek gerek.

98. Bedene – *Coturnix coturnix* – Перепел

Meýdan alamatlary: sar ululykdaky, towukşekillileriň arasynda iň maýdasy, ýerde ýaşayan guş. Üsti köpsanly garamtyl we aýyk dik tegmilli, sarymtyl-goňur reňkde garny sarymtyl-ak öwüşginli. Guşlaryň ikisi-de birmeňzeş reňkli. **Horazynyň bokurdagynyň ortasy gara.** Çünki çalymtyl-goňur. Guşlaryň penalaýjy reňki oňat ösen, şonuň üçin olary otlaryň arasynda saýgarmak kyn. Seýrek uçýar, çalt ylgaýar we güroltlaryň arasynda bukulýar. **Ýerden sesli ýokaryk göterilýär, guýrugy gysga, kiçijek towukjagaza çalymedýär. Ganatlaryny ýygy-ýygydan kakyp, ýere golaý, çalt uçýar we ýere gonmazyndan öňürti gaýýar.** Iýmit gözlände aýaklary bilen ýeri peşeyär, toprak böleklerini zyňşdyrýar, hezil edip, kirşene oýkanýar. Agaçlara gonmaýar. Horazynyň sesi iki tapgyrdan durýar

разницей начала яйцекладки годовальными и старыми птицами. Кладка – с конца апреля до конца мая. Гнездятся очень скрытно в ямках на земле со скудной травянистой выстилкой под укрытием нависающих камней. В полной кладке до 14 яиц сливочного цвета без пятен. Выводки наблюдаются до середины августа. Питается семенами и плодами растений. Птенцов выкармливают и насекомыми.

Статус: сокращающийся в численности вид. Объект любительской охоты (местное охотничье название – “чиль”), но также как у кеклика необходимы контроль за численностью и регламентация охоты.

Полевые признаки: наземная птица, самая мелкая из куриных, величиною со скворца. Сверху окрашен в желтовато-бурый с многочисленными темными и светлыми продольными пестринками, брюшко желтовато-белого тона. Оба пола окрашены почти одинаково. **У самца центр горла – черный.** Клюв серо-бурый. Окраска покровительственная, и заметить птицу, особенно в траве, очень трудно. Редко поднимается на крыло, быстро убегает и затаивается в густой растительности. **Взлетает с шумом, короткохвостая, напоминает миниатюрную курочку. Летит быстро, низко над землей, часто взмахивая крыльями и планируя перед посадкой.** При кормежке копается в земле, разбрасывая и разгребая ее ногами, охотно купается в пыли. На деревьях

– ýuwaşja gygyldama “wa-wwa, wa-wwa” we güýçli – “podt-polot”, “podt-polot”, “pip-pilip, pip-pilip”, “pitt-podaý, pitt-podaý”. Horazlarynyň ganaty – 104-115, mäkiýanlaryňky – 117, guýrugy – 39-42, çüňki – 10 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: towukşekillileriň beýleki wekillerinden ölçegleriniň kiçidigi bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürgteýän bölegi Ýewraziýada - günorta-gündogar çetlerinden Uzak Günogara we Günbatar Hytaýa çenli, şeýle-de Afrikanyň demirgazyk-günbatary we günortasy. Türkmenistanda uçup geçende giňişleýin duşýar, derýalaryň jülgelelerinde, dag eteklerinde, ekerançylyk meýdanlarynda we Köpetdagyň, Köýtendagyň, Bathzyň we Garabiliň sähralykarynda höwürgteýär. Demirgazyk Hindistanyň we Afrikanyň, köpüsi günorta böleklerinde gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürgteýän guş. Ýazyne aprelde we maýyň başynda, güýzine – sentýabrda we oktyabryň aýagyna çenli uçup geçýär. Horazlary uçup gelenlerinden soň güýçli ses çykarýar (“soweş” başy), bu köpelyän döwründe geçýär. Guşlaryň jübütligi durnuksyz. Horazlaryň köpüsi dürli mäkiýanlar bilen goşalaşýarlar. Höwürtgese gyrymsylaryň ýa-da güroltlaryň arasyndaky çukurlyk, 8-20 sany gara-goňur meneklenen, goňur reňkli ýumurtgalary goýýar. Jüýjeleri çalt ösýär we 35-40 günlük bolanda, uly bedenleriň ölçegini alýar. Ösümlük iýmiti (tohumy, baldaklary), tomsuna-mör-möjekler we käbir oňurgasyzlar bilen iýmitleýär.

Statusy: adaty görnüş, awçylaryň aw guşy. Ketekde saklap köpeldmek mümkin.

не садится. Крик самца состоит из тихого хриплого «ва-вва», «ва-вва» и звонкого – «подь-полоть», «подь-полоть», «пип-пилип, пип-пилип», «пить-подай, пить-подай». Крыло у самцов – 104-115, у самок – до 117, хвост – 39-42, клюв – 10 мм.

Сходства – отличия: от других представителей куриных отличается мелкими размерами.

Распространение: гнездовая часть ареала в Евразии от крайнего юго-запада до Дальнего Востока и Западного Китая, а также на северо-западе и юге Африки. В Туркменистане на пролете повсеместно, гнездится в речных долинах и предгорьях, на полях, в степеподобных участках на Копетдаге, Койтентаге, Бадхызе и Карабиле. Зимуют в Северной Индии и в Африке, больше в южной половине.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весенний пролет – в апреле и начале мая, осенний – в сентябре и до конца октября. После прилета самцы издают громкие крики (т.н. «бой»), это происходит в период размножения. Пары не постоянны. Самцы спариваются с разными самками. Гнездо в ямке под кустиками или в густой траве. В кладке – 8-20 яиц буроватого цвета с черно-бурыми пестринами. Молодые растут быстро, в возрасте 35-40 дней достигают размеров взрослых птиц. Растительные (семена, побеги), летом питаются насекомыми и некоторыми беспозвоночными животными.

Статус: обычный вид, объект спортивной охоты. Может содержаться в неволе.

99. Sülgün – *Phasianus colchicus* – Фазан

Meýdan alamatlary: öý to-wugyna çalymdaş, emma **guýrugy inçeden uzyn.** Horazynyň bezegi ala, altynsow, goýy-ýaşyl, mämişi we mawumtyl reňkleriň utgaşygy. **Kellesiniň gyalarynda uzalan ýelek dessejiklerinden döran “şah-jagazy” bolýar.** Guýrugy sarymtyl-gyzylymyl-ýaşyl öwüşginli, sarymtyl-goňur reňkli. **Mäkiýany sada bezegli – boýny syýa öwüşginli goňurraksary, boýny çirnil reňk öwüşgüli.** Horazy mäkiýanyndan ep-esli uly we guýrugy ondan has uzyn. Ýiganda kellesini we boýuny öňe süýndürüp, guýrugyny ýokary galdyrýar. Ýerden uly goh bilen “şem alawy” ýaly dik ýokarlygyna duýdansyz göterilýär, şondan soň ganatlaryny ýaýyp 70-150 m uçup, ýere düşýär. Gowşak we az uçýar, ikinji gezek uçanyndan soň gaýtadan uçmaýar, jeňňelikde bukulýar. Horazynyň sesi iki ýa-da üç tapgyrly: “ke-ke” ýa-da “ke-ke-re” ýa-da “koh-koh”. Horazlarynyň bir näçe gezek gaýtalanýan ýuwaşdan mylaýym sesiniň bolmagy mümkin: “çu-çu-çu”. Horazlarynyň ganaty – 228-263, guýrugy – 457-628, çünki – 18.1-22.4, mäkiýanlaryňky – 214-236, guýrugy – 283-433, çünki – 16.6-19.4 mm, horazlarynyň agramy – 2 kg çenli, mäkiýanlaryňky – 1.4 kg çenli.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: guýrugynyň uzynlygy bilen towukşekillileriň ählisinden tapawutlanýar; Türkmenistanda 4 aşaky görnüşü duşýar (pars, murgap, amyderýa we hywa), olar ýelek örtüginini, ýumurtgalarynyň reňkleriniň dürlüdigini, köpelyän wagtlary we ýaşayan ýerleri boýunça tapawutlanýarlar.

Полевые признаки: по складу тела похож на курицу, но **отличается тонким длинным хвостом.** В пестром наряде самцов сочетаются золотистые и темно-зеленые, оранжевые и фиолетовые цвета. **По краям головы – пучки удлиненных перьев, образующих наподобие «рожек».** Хвост желтобурого цвета с медно-фиолетовым отливом. **Самки имеют скромный наряд – буровато-желтый с фиолетовым отливом на шее.** Самец заметно крупнее самки и хвост у него длиннее. При беге голова и шея наклонены вперед, а хвост приподнят. Взлетает с большим шумом круто вверх, «свечей», затем планирует, пролетев 70-150 м, спускается. Летает плохо и мало и после повторных взлетов не поднимается вовсе, прячется в зарослях. Крики – из двух или трех колен, нечто вроде «ке-ке» или «ке-ке-ре» или «кох-кох». Самцы могут подавать и тихий, неоднократно повторяемый, нежный звук: «чу-чу-чу». Крыло у самцов – 228-263, хвост – 457-628, клюв – 18.1-22.4, крыло у самок – 214-236, хвост – 283-433, клюв – 16.6-19.4 мм, вес самцов – до 2, самок – до 1.4 кг.

Сходства – отличия: **от всех куринных отличается длинным хвостом;** в Туркменистане встречаются 4 подвида (персидский, мургабский, амударьинский и хивинский), которые различаются оттенками оперения, цветовому разнообразию яиц, разницей в сроках размножения и районами обитания.

Распространение: Западная и

Ýaýran ýerleri: Günbatar we Günorta Ýewropa, Kawkaz, Alynky, Orta, Merkezi we Gündogar Aziýa. Amerikanyň, Awstraliýaň, Täze Zelandiýanyň we Tasmaniýanyň käbir ýerlerinde uýgunlaşdyrylan (akklimatizasiýalaşdyrylan). Türkmenistanda – Günbatar Köpetdag we Tejen, Murgap, Garagum derýalarynyň, Amyderýanyň jülgeleri.

Ýaşayşy: oturymly guş, jeňňeliklerde, gamyşlyklarda, ýylgynlyklarda, ösgün otlyk we ekerançylyk ýerlerde, şor suw akabalaryň, suwly ýaplaryň kenarýakalarynda ýaşayar. Günorta etraplarda wak-waky fewralyň başyndan maýyň aýagyna çenli (martyň ortasyndan kürük bolýar), demirgazykda (Daşoguz oazisinde) – martýn ortasyndan iýulyň başyna çenli geçýär (maýyň başyndan kürük bolýar). Günortada guşlaryň ilkinji jüýjeleri apreliň birinji ýarymynda, demirgazykda – maýyň başynda çykýar. Höwürtesi ýerde, içine ösümlikleriň çybyjyklary, baldajyklary ýa-da otlaryň çüýrän galındylary we öz ýelekleri gatyşdyrylyp düşelen oýtajyk. 4-19 ýumurtga goýýar. Hywa aşaky görnüşiniň amyderýa we murgap aşaky görnüşlerine garanyňda, ýumurtgalary garamtyl reňkli (ýaşylymtyl-goňur we ýaşylymtyl-çal öwüşginli ýa-da garamtyl-agymtyl we goňur reňkler agdyklyk edýär), soňky iki aşaky görnüşleriň ýumurtgalarynyň reňki orta we gowşak derejede (ýaşylymtyl-çal we ýaşylymtyl-agymtyl, ачык-agymtyl, çäge reňki agdyklyk edýär). Ýaş jüýjeler başaýlyk bolanda uly guşlardan tapawutlanmaýarlar. Iýýän iýmiti örän dürli: ösümlikleriň miweleri we tohumlary, tut kömelegi, gur-

Южная Европа, Кавказ, Передняя, Средняя, Центральная и Восточная Азия. Местами акклиматизирован в Америке, Австралии, Новой Зеландии и Тасмании. В Туркменистане – в Западном Копетдаге и по долинам Теджена, Мургаба, Каракумдарьи и Амударьи.

Образ жизни: оседлая птица, обитает в тугаях, тростниковых, гребенщиконых и травянистых зарослях, в сельскохозяйственном ландшафте по бахчам, окраинам полей, оросительным и дренажным каналам. Токование в южных районах – с начала февраля до конца мая (насиживание с середины марта), на севере (Дашогузский оазис) – в середине марта до начала июля (насиживание в начале мая). Первые птенцы на юге появляются в первой половине апреля, на севере в начале мая. Гнездо – небольшое углубление в почве, выстланное веточками, стебельками или растительной трухой, часто с примесью собственных перьев. Количество яиц в кладке – 4-19. Яйца хивинского подвида имеют более интенсивную и темную окраску (с преобладанием зеленовато-бурых и зеленовато-серых тонов или наличие яиц с темно-бежевой и бурой скорлупой), чем яйца амударьинских и мургабских подвигов, у которых окраска средней и слабой интенсивности (зеленовато-серые, зеленовато-бежевые, светло-бежевые, песчаные). К пятимесячному возрасту молодые птенцы не отличаются от взрослых. Пища очень разнообразная и состоит из плодов и семян, тутового гриба, червей, улиток, мокриц, паукообразных, и

çuklar, balykgulaklar, eşekýassyklar, möýsekilliler, hatda maýdaja balyklar, suwulganlar we ýylanlar, gemrijileriň tezekleri. Esasy duşmanlary: alahekek, garga, hüwi, şagal, tilki, ýabany we öý pişikleri, çopan we eýesiz itler.

Statusy: sany üýtgäp durýan görnüş, aw etmegiň wagtyny anyk kesgitlemeli we gadagan etmeli. Türkmenistanda sülgüni elde ösdürip ýetişdirmegiň ylmy esaslary we amaly çäreleri işlenilip düzüldi.

100. Turaç – *Francolinus francolinus* – Турач

Meýdan alamatlary: käkilikden sähelçe ulurak. Ýetişen **horazyň reňki gara, bedeniniň aşaky tarapy tegelek ak tegmilli, arkasy we ganatlary dik goňurrak-çypar nagyşly**, bili we guýrugy kese gara-ak zolakly. **Boýny poslurak-goňur halka bilen gabalan. Ýañaklarynda ak tegmili bolýar. Çünki gara, aýaklary gyzyl.** Mäkiýany öçügsi reňkli; aşagy kese gara zolakly, üstki tarapynda poslurak-sarymytyl öwüşgin oňat ösen. Alkymy we bokurdagynyň ýokarsy ak. Howp abananda gaçýar we “şem alawy” ýaly howa sesli göterilýär. Ýerde boýnuny öne süýndürüp ylgaýar. Horazy wak-wak dowründe kellesini arkan gaýşardyp, guýrugyny ýelpewaç ýaly ýaýýar we ganatlarynyň ýarpysyny aşak düşürip, ýerde çyzyk edip aýlanýar, ýokaryk towusýar, ganatlaryny kakýar, kellesini aýlaşdyrýar. Sesi – “kuok, kiiik ki-kii-ko ki-kiiik”. Ganaty – 148-180 mm, agramy – 400-550 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: garmytyl tegmilli ýelek örtügi bilen beýleki towuksekillilerden aňsat tapawutlanýar.

даже мелких рыб, ящериц и змей, и экскрементов грызунов. Основными врагами являются сорока, ворона, филин, шакал, лисица, дикие и домашние кошки, пастушьи и бродячие собаки.

Статус: вид с колеблющейся численностью. Охота регламентируется и может запрещаться. В Туркменистане разработаны научные основы практических мероприятий искусственного разведения фазана.

Полевые признаки: по размерам несколько крупнее кеклика. Окраска взрослого **самца черная с белыми круглыми пестринами на нижней стороне тела, с буровато-рыжим продольным рисунком на спине и крыльях** и черно-белыми поперечными полосками на пояснице и хвосте. **Вокруг шеи ржаво-коричневое кольцо. На щеке – белое пятно. Клюв черный, ноги красные.** Самка окрашена в более бледные тона; снизу с черными поперечными пестринами, сверху сильнее развит рыжеватого-желтоватый оттенок. Подбородок и верх горла белые. При опасности убегает, затем с шумом «свечой» взлетает. На бегу обычно вытягивает шею. Самец при токовании опрокидывает назад голову, распускает веером хвост и чертит по земле полураспущенными крыльями, подпрыгивает, хлопает крыльями, вертит головой. Крик – «куок, кииик ки-кии-ко ки-кииик». Крыло – 148-180 мм, вес – 400-550 г.

Сходства – отличия: от других наших куриных легко отличается

Ýaýran ýerleri: Kipr, Kiçi we Alynký Aziýa, Gündogar Zakawkaziýe we Demirgazyk Hindistan. Orta Aziýada – diňe Türkmenistanyň günorta-günbatarynda, Etrek we Sumbar jülgelelerinde.

Ýaşaýşy: oturymly guş. Suw ýaktalarynyň golaýyndaky ýylgynlyk, böwürslenlik, ýandakly jeňňelliklerde; derýanyň gamyşlyk, ösgin otluk bilen gezekleşýän ýerlerinde we ekerançylygyň çetlerinde hem mekan tutýar. Bu guşlaryň jübütligi durnukly. Mart-awgust aralygynda, kábiri iki gezek köpelyär. Höwürtgese gyrymsynyň aşagynda, içine guran ot-çöpleriň sypallary düşelen kiçiräk çukurjyk, 6-8, seýregräk 10 sany ak meneklije ýaşylymytyl-goňur reňkli ýumurtgalary goýýar. Ýaşlary maýyň ikinji ýarymyndan oktyabryň ortasyna çenli duşýar. Güz we gyş aýlary süri bolup gezýär. Ösümlük (ýaprak, ter baldak, şireli miwe, tohumlar, dänelileriň tohumlary) we haýwan iýmiti (murtly çekirtge, ýasmyk, jyk-jyk, garynjalar, gurçuklar, suwulganlar, balykgulaklar) bilen iýmitlenýär.

Statusy: örän seýrek, sany azalýan görnüş, Türkmenistanyň Gyzylyk kitabyna girizilen, awlamak gadagan. Hazar we Sünt-Hasardag döwlet goraghanalarynyň guşlarynyň iň tasin wekilleriniň biri.

DURNAŞEKILLILER – GRUIFORMES – ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ

Suw-batgalyk we gury ýer guşlarynyň uly we dürli toparlarynyň wekilleri içki gurлуşlarynyň ау-

темным пятнистым оперением.

Распространение: Кипр, Малая и Передняя Азия, Восточное Закавказье и Северная Индия. В Средней Азии – только в Туркменистане – на юго-западе, местами по долинам Этрека и Сумбара.

Образ жизни: оседлая птица. Населяет заросли тамарикса, ежевики, верблюжьей колючки вблизи водоемов; камышовые плавни, чередующиеся с высокотравными полянками; не избегает сельскохозяйственных угодий. Пары постоянны. Размножаются с марта по август, некоторые дважды. Гнездо – небольшая ямка, с выстилкой из сухих травинки и веточки, обычно под кустом. В кладке 6-8, реже до 10 яиц зеленовато-бурого цвета с белыми пятнышками. Молодые встречаются от второй половины мая до середины октября. Осенью и зимой держатся стайками. Питается растительной (листья, зеленые побеги, ягоды, семена, зерна злаков) и животной (кузнечики, клопы, жуки, муравьи, гусеницы, ящерицы, моллюски) пищей.

Статус: очень редкий вид, численность которого сокращается, внесен в Красную книгу Туркменистана, охота запрещена. Один из наиболее интересных представителей птиц Хазарского и Сюнт-Хасардагского государственных заповедников.

К этому отряду относятся представители большой и разнородной группы водно-болотных и назем-

ratynlyklaryna esaslanyp, bu otrýada birleşdirilýär. Durnaşekilli guşlaryň ählisi açyk giňişliklerde ýaşaýarlar: sähralyklarda, suwarymly meýdanlarda, suw-batgalyk ýerlerde kábiri suw ýataklaryndaky jeňňelliklerde. Olaryň arasynda maýdasy, orta we uly ölçeglileri duşýar. Dünýä faunasynnda 200-e golaý görnüş bolup, Türkmenistanda 3 maşgala – suw towuklara, durnalara we toklutaýlara jemlenýän 14 görnüş gabat gelýär.

Durnalar – *Gruidae* – Журавлиные

Aýaklary we boýuny uzyn, bedeni gelsyikli uly guşlar maşgalasy. Çünki ýiti uçly, göni. Ganatlary uzyn we tegelenen. Guýrugy gysga, emma uzalan ýelekleriň hemmesiniň üstüni doly ýarpaýandygy sebäpli, guýrugy uly bolup görünýär. Görnüşleriň köpüsiniň kellesinde düwürtik ösüntgiler we gaty saçşekilli gyllar bilen örtülen ýalaňaç deri meýdançasý bolýar (esasan uly guşlarda). Horazy mäkiýanyna meňzeş reňkli. Guşlaryň jübütligi, köplenç, ömrüniň ahyryna çenli saklanýar, monogam. Ýumurtgalary süýrelen-ýumurtga sypatly. Açyk we suw-batgalyk ýerleri bilen baglanşykly landşaftlarda ýaşaýar. Howada oňat gaýýarlar, köplenç ganatlaryny kakyp, işjeň uçuşdan peýdalanýarlar. Ösümlik, seýrek – haýwan iýmiti, esasan, mörmöjekler bilen iýmitlenýärlar. Maşgalada 15 görnüş, ýer togalagynyň hemme ýerlerine ýaýran, olaryň 3-si Türkmenistanda.

ных птиц, объединяемых на основании особенностей внутреннего строения. Все журавлеобразные – обитатели открытых пространств: степей, полей, водно-болотных угодий; некоторые живут в зарослях по водоемам. Среди них есть мелкие, среднего размера и крупные птицы. Мировая фауна насчитывает около 200 видов, в Туркменистане встречаются 14 видов, объединяемых в 3 семейства: журавлиные, пастушковые и дрофиные.

Крупные стройные птицы, ноги и шея длинные. Клюв острый, прямой. Крылья длинные и закругленные. Хвост короткий, но из-за удлинённых крыльев, которые в сложённом состоянии полностью его покрывают, хвост кажется большим. У большинства видов этого семейства на голове (главным образом, у взрослых) имеются участки голой кожи, покрытые бугорчатыми выростами и жесткими волосовидными щетинками. Самцы и самки окрашены одинаково. Моногамы, часто пары сохраняются на всю жизнь. Яйца удлинённо-яйцевидной формы. Населяют открытые ландшафты и связаны с водно-болотными местообитаниями. Хорошо парят, пользуются преимущественно активным полетом. Питаются растительными кормами, реже – животными, больше насекомыми. В семействе 15 видов, распространённых по всему земному шару, из них в Туркменистане – 3.

101. Çal durna – *Grus grus* – Серый журавль

Meýdan alamatlary: umumy reňki çal, kellesi, boýny, aýaklary we ganatlarynyň uýy gara, uly durna. **Ak zolak gözünden kellesiniň gapdallary bilen boýunyň yzyna tarap uzaýar. Depesiniň yzky bölegi we ýeňsesi gyzyl tegmilli, ýalaňaç siňňilsypatly deri bilen örtülen.** Aýaklary gara. Uçýan wagty ganatlarynyň ujundaky ýelekler “ýaýradylan barmaklar” ýaly görünýär. Horazy mäkiýanyndan biraz ulurak. Ýaşlarynyň kellesi ýelek örtüklü, gyzyl reňksiz. Uçanda boýny we aýaklary gönüligine - tekiz uzaýar. Uçup geçýän döwründe uly sürüdüki guşlar pahna ýa-da burç bolup düzülýärler. Sesi güýçli we surnaýly – “kurruk-kurruk...”. Uzynlygy – 96-119, ganatlarynyň gerimi – 180-245, boýy – 110-125 sm, agramy 6 kg çenli.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň has uludygy, döşinde gara reňkiň we kellesinde ak “zülpüň” ýokdygy bilen owadan durnadan, uçanda boýunyň egri dældigi we ganatlarynyň ujunda “ýaýradylan barmak” alamatynyň bardygy bilen gök hokgardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta Ýewropadan we Kiçi Aziýadan Gazagystana we Günbatar Sibire çenli. Günorta Ýewropada, Pars aýlagyndaky ýurtlarda, Özbegistanyň günortasyn-da we Türkmenistanda, Owganistanda, Päkistanda, Hindistanda we Demirgazyk Afrikada gyşlaýar.

Ýaşayşy: Türkmenistanda uçup geçýän we gyşlaýan guş. Açyk landşaftlarda, suw-batgalyk giňişliklerde ýaşaýar. Möwsümleýin migrasiýasy dowamly: fewraldan - maý aýyna we

Полевые признаки: крупный журавль с общей серой окраской, голова, шея, ноги и концы крыльев черные. **От глаз по бокам головы тянется белая полоса, переходящая на заднюю сторону шеи. На задней части темени и затылке красное пятно, покрытое голой бородавчатой кожей.** Ноги черные. В полете концы крыльев выглядят в виде растопыренных пальцев. Самец немного крупнее самки. У молодых голова оперена, красного цвета нет. В полете шея и ноги вытянуты по прямой. Во время перелетов выстраиваются в крупные стаи клином или углом. Голос – характерное громкое и трубное «курлыкание». Длина – 96-119, размах крыльев – 180-245, рост – 110-125 см, вес – до 6 кг.

Сходства – отличия: от журавля-красавки отличается более крупными размерами, отсутствием черного цвета на груди и белых «косиц» на голове, от серой цапли – формой неизогнутой в полете шеи и наличием «растопыренных пальцев» на конце крыла.

Распространение: от Западной Европы и Малой Азии до Казахстана и Западной Сибири. Зимует в Южной Европе, странах Персидского залива, на юге Узбекистана и Туркменистана, в Афганистане, Пакистане, Индии и Северной Африке.

Образ жизни: в Туркменистане прелетная и зимующая птица. Обитатель открытых ландшафтов, населяет водно-болотные участки. Сезонные миграции растянуты – с

awgustyň aýagyndan noýabra çenli. Guşlar topar we suri bolup gezyrler; olaryň sany uçup geçýän döwründe we gyslanda Amyderýanyň, Tejen derýasynyň jülgelerinde, Köpetdagyň eteginde 1000-den hem geçýär. Örän hüşgär, şeýle-de bolsa, käte adamy ýakyna goýberýär. Ösümlik (däne, baldak, kökbaldak) we haýwan iýmiti (mör-möjekler, balykgulaklar, maýda gemrijiler, gurbagalar) bilen iýmitlenýär.

Statusy: uçup geçende adaty, käbir ýerlerde köpsanly görnüş, edil beýleki durnalar ýaly asyly-keramatly hasaplanýar, tebigy owadan, çeperçilik ähmiýetli, awlamak gadagan. Köpetdag döwlet goraghanasynyň Mäne-Çäçe çakli goraghanasynyň nuşany hasaplanýar.

102. Ak durna – *Crus leucogermanus* – Стерх

Meýdan alamatlary: çal durnadan ölçepleri has uly. **Ýetişen guşlaryň ýelekleri arassa ak, diňe ganatlarynyň uýy gara. Kellesiniň ön tarapyndaky deriniň ýalaňaç ýeri, çünki we aýaklary açyk-gyzyl.** Horazy mäkiýanyndan ulurak. Ýaşlarynyň reňki çypar tegmilli. Sesi beýleki durnalaryň sesinden tapawutlanýan güýçli kurruklaýjy gykylyk. Uzynlygy – 105-135, ganatlarynyň gerimi – 200-260, boýy – 120-140 sm, agramy 10 kg çenli.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: Özüne mahsus ak reňki bilen beýleki durnalardan, ak ganatlaryndaky gara meýdanyň kiçidigi we kellesiniň ön tarapynda ýalaňaç deriniň açyk-gyzyl reki bilen ak leglekden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda

февраля по май и с конца августа по ноябрь. Держатся группами и стаями, которые во время перелетов и, особенно, на местах зимовки, в частности, по долинам Амударьи, Теджена и в предгорьях Копетдага, могут насчитывать до 1000 и более птиц. Осторожная птица, хотя иногда человека подпускает близко. Кормится растительной (зерна, побеги, корневища) и животной (насекомые, моллюски, мелкие грызуны, лягушки) пищей.

Статус: на пролетах обычный, местами многочисленный вид, как и другие виды журавлей, является священным, имеет огромное культурно-эстетическое значение, охота запрещена. Считается знаковым видом Меана-Чачинского заказника Копетдагского государственного заповедника.

Полевые признаки: очень крупный журавль, больше серого. **Оперение взрослой птицы чисто белое, только концы крыльев черные. Участок голой кожи на передней части головы, клюв и ноги – ярко-красные.** Самец обычно крупнее самки. Окраска молодых с рыжими пятнами. Голос – звонкий курлыкающий крик, отличающийся от голосов других журавлей. Длина – 105-135, размах крыльев – 200-260, рост – 120-140 см, вес – до 10 кг.

Сходства – отличия: от других журавлей отличается характерной белой окраской, от белого аиста – заметно меньшим черным полем на белых крыльях и ярко-красной окраской передней части головы.

höwürrt-geleýän bölegi, tundranyň we Sibiriň demirgazygyndaky tokaýly tundranyň insiz zolagyny eýeleýän, arasy açyk, aýry iki toparly tapawutlanýar – günbatar (Ob) we gündogar (ýakut). Gündogar ak durnalary Hytaýda, günbatardakylar – Gazagystanyň, Azerbaýjanyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň, Owganistanyň we Päkistanyň üsti bilen uçup, Eýranda we Hindistanda gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän görnüş. Ýazyna – martda-apreliň başyna, güýzine – oktýabryň aýagyndan noýabra çenli uçup geçýär. Migrasiýa döwründe Tejen, Murgap, Garagum, Amyderýa jülgelerinde, Köpetdagyň eteklerinde we Hazaryň kenarykasynda duşýar we beýleki ýerlerde tötänden gabat gelmegi mümkin. Ösümlikleriň ýerasty baldaklary, ter otlaryň ýapraklary, seýregräk mör-möjekler we maýda gemrijiler bilen iýmitlenýär.

Statusy: örän seýrek görnüş, guşlaryň günbatar populýasiýasy ýitip gitmäniň ön ýanynda durýar. MSOP-yn Gyzyl sahypasynda, Türkmenistanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň we Azerbaýjanyň Gyzyl kitaplaryna girizilen. Awlamak düýpgöter gadagan. Ol baradaky islendik maglumat ylym we görnüşü goramak üçin wajypdyr.

103. Owadan (akbaş) durna – *Grus virgo* – Журавль-красавка

Meýdan alamatlary: durnalaryň arasynda iň maýdasy. Reňki gögümtiň çal, kellesi, boýny we ganatlarynyň uçlary gara, **kellesiniň gapdallarynda aşaklygyna sallanyp duran uzyn ak ýelekleriň dessejigi bolýar.**

Распространение: гнездовая часть ареала занимает узкую полосу тундры и лесотундры на севере Сибири, представлена двумя изолированными популяциями (группировками) – западной (обская) и восточной (якутская). Стерхи восточной зимуют в Китае, западной – в Иране и Индии, куда пролетают через территории Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Афганистана и Пакистана.

Образ жизни: пролетный вид. Сроки пролета: весной – март-начало апреля, осенью – с конца октября до ноября. В период миграций наиболее вероятны встречи в долинах Теджена, Мургаба, Каракумдарьи, Амударьи, в предгорьях Копетдага и на побережье Каспия, не исключаются случайные встречи и в других местах. Питается корневищами и побегами травянистых растений, иногда насекомыми и мелкими грызунами.

Статус: очень редкий вид, птицы западной популяции находятся на грани исчезновения. Включен в Красный список МСОП, Красные книги Туркменистана, Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана. Добыча категорически запрещена. Данные о встречах представляют огромный интерес для науки и охраны вида.

Полевые признаки: из трех наших журавлей наиболее мелкий. Окраска сизо-серая, голова, шея и концы крыльев черные, **по бокам головы имеются пучки длинных, рассученных белых перьев, об-**

Boýnunyň öň tarapy gara, uzyn ýelek dessejigi ýapýar. Kellesinde ýalaňaç deri meýdançasý bolmaýar. Çüňgi sarymytyl, aýaklary gara. Ýaşlary öçüksü reňkli we goňurrak. Sesi – batly, gyjyrdyly kurruklama. Uzynlygy – 80-100, ganatlarynyň gerimi – 180 çenli, boýy – 90-100 sm, agramy - 2.5-3 kg.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: öl-çeçleriniň kiçidiği kellesiniň gapdallarynyň ak ýelek dessejigidigi we döşüniň gara ýeleklidigi bilen çal durnadan tapawutlanýar.

Ýaşýan ýerleri: Ýewraziýanyň, Demirgazyk Amerikanyň sähra we ýarym çöllük ýerleri; Gazagystanda höwürtegeleýär. Günorta Aziýada we Merkezi Afrikada gyşlaýar. Türkmenistanda Amyderýanyň, Murgap, Tejen derýalarynyň jülgelerinde, şeýle-de Köpetdagaý eteklerinde duş gelýär.

Ýaşýşy: uçup geçýän guş. Ýazyna martyň aýagyndan apreliň aýagyna çenli uçup geçýär. Çal durnadan ýazyna gjiräk, güýzine bolsa, irräk, käte olar bilen sürüde gatyşyp, uçup geçýär. Aglaba, ösümlik ýümiti bilen ýümitlenýär.

Statusy: seýrek görnüş, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen, edil beýleki durnalar ýaly medeni, gözellig, çeperçilik taýdan gymmatly, tutmak we atyp almak düýpgöter gadagan.

Suw towuklary – Rallidae – Пастушковые

Maýda we orta ölçeğlerdäki guşlar maşgalasy. Görnüşleriniň köpüsiniň, suw ýataklarynyň kenaryndaky gür ötlaryň arasyndan, hereket etmäge amatly bolar ýaly, bedeni gapdallaryndan gysylan. Ganatlary

разующих своеобразные косицы. На передней стороне шеи пучок длинных черных перьев. Участков голой кожи на голове нет. Клюв желтоватый, ноги черные. Молодые тусклее и бурее. Голос – звонкое, скрипучее курлыкание. Длина – 80-100, размах крыльев – до 180, рост – 90-100 см, вес – 2.5-3 кг.

Сходства – отличия: от серого журавля отличается меньшими размерами, пучками белых перьев по бокам головы и черных перьев на груди.

Распространение: степи и полупустыни Евразии, Северная Африка; гнездится в Казахстане. Зимует в Южной Азии и Центральной Африке. В Туркменистане встречается по долинам Амударьи, Мургаба, Теджена, а также в предгорьях Копетдага.

Образ жизни: пролетная птица. Весенний пролет с конца марта до конца апреля. Весной пролетает позже серого журавля, а осенью раньше, изредка отмечается и в смешанных с ним стаях. Питается преимущественно растительной пищей.

Статус: редкий вид, включен в Красную книгу Туркменистана, как и другие журавли имеет культурно-эстетическую ценность, отлов и добыча категорически запрещены.

Семейство птиц мелких и средних размеров. Тело у большинства видов несколько сжатое с боков, приспособленное к передвижениям в густых зарослях по берегам водоемов. Крылья короткие и за-

гусга we tegelenen. Howa seýrek göterilýar, gysga aralygy uçup geçýär, emma möwsümleýin migrasiýa döwüründe uzak aralygy gonman uçup geçmäge ukyply bolýarlar. Esasan, gijesine uçup geçýärler. Uzyn hem inçe barmaklary batgalyk ýerlerde hereket etmäge ýa-da otlaryň baldaklaryna dyrmaşmaga mümkinçilik berýär. Görnüşleriň kabirleriniň barmaklary ýüzgüç gasyňly bolýar, suwda diňe bir ýüzmän, eýsem, çümüp hem bilýärler. Kenaryýaka jeňňelliklerde we yzgarly otluk çemenliklerde ýaşaýarlar. Maýda oňurgasyzlary (balykgulaklar, mör-möjekler), ösümlikleriň tohumlaryny, suwotulary we suwýakasynda ösýän ösümlikleriň ýaşajyk baldajklaryny iýýärlerler. Türkmenistanda 8 görnüş bar.

104. Bukanja ýelbe – Rallus aquaticus – Пастушок

Meýdan alamatlary: bedeneden ulurak, kepderiden kiçi. Bedeniniň üstki tarapy **dik uly gara tegmilli** ýaşylymytyl-goňur. Aşaky tarapy garamtyl, böwürleri **inli kese zolaklan**an mawumtyl-çal, **guýrugynyň aşagy açyk reňkli. Çünki we aýaklary uzyn, barmaklary has uzyn.** Bokurdagy gyşky ýelek örtüginde agymtyl. Aşaklygyna sähelçe egmek uzyn çüňkiniň üsti goňur, aşagy -mämişi-gyzyl. Aýaklary gyzlymytyl-goňur. Ýörände gysga guýrugy ýokary galyp silkinýär. Gykylykçy, sesi gaýtalanýan “uit-uit-uit” ýa-da pert “tilk”. Uzynlygy - 230-260, ganaty – 100-130, çüňki – 30-45 mm, agramy – 140 g. golaý.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: uzyn çüňküniň aşaklygyna çalarak egmekdigi bilen çypar ýelbeden we ýelbeden tapawutlanýar.

круглые. Обычно редко поднимаются в воздух, совершают короткие перелеты, но во время сезонных миграций способны покрывать большие расстояния без посадки. Преимущественно ночные мигранты. Пальцы длинные, тонкие, позволяющие легко передвигаться на топких местах, либо лазать в траве, захватывая пальцами пучки стеблей. Некоторые виды имеют на пальцах плавательные лопасти и могут хорошо плавать и даже нырять. Обитатели прибрежных зарослей и сырых лугов. Пища – мелкие беспозвоночные (моллюски, насекомые), семена, водоросли и молодые побеги прибрежных растений. В Туркменистане - 8 видов.

Полевые признаки: меньше голубя, чуть крупнее перепела. Окраска верхней стороны тела зеленовато-бурая, с большими черными продольными пестринами. Нижняя сторона темная, голубовато-серая с **широкими поперечными полосами на боках, подхвостье светлое. Клюв и ноги удлинённые, пальцы очень длинные.** В зимнем оперении горло беловатое. Верх длинного, слегка изогнутого книзу клюва бурый, низ оранжево-красный. Ноги красновато-бурые. При ходьбе подергивает поднятым кверху коротким хвостом. Криклив, голос – повторяющееся «уить-уить-уить» или резкое «тильк». Длина – 230-260, крыло – 100-130, клюв – 30-45 мм, вес – около 140 г.

Сходства – отличия: от коростеля и погонышей отличается

Ýaýran ýerleri: Günbatar Ýewropadan Ýaponiýa çenli. Orta Aziýada giň ýaýran, Türkmenistada suw-batgalyk ýerleriň hemmesinde - Hazar deňziniň kenarýakasynda, çöllük ýerlerdäki suw ýataklarynda gabat gelyär. Ortaýer deňzinden gündogara Arabystan ýarym adasynyň üstünden Günorta-Gündogar Aziýa çenli gyslaýar.

Ýaşaýyşy: uçup geçýän-höwürtleýän we gyslaýan görnüş, guşlaryň bir böleginiň oturymly ýaşaýan bolmagy hem mümkin. Ýazky migrasiýasy mart-aprelde, güýzkisi-sentyabr-oktyabrda. Derýalaryň, kölleriň we suw howdanlaryň gamyşlyk, ýe-kenlik, çayrylyk meýdançaly batgalyk ýerlerinde ýaşaýar. Aprel-maý aýlarynda höwürtleýär, gamyş üşmekleriniň bukyja ýerinde, gury otlaryň sypallaryndan höwürtle gurýar. 5-10 sany gyzlymytyl-goňur meneklenen çypar reňkde bolan ýumurtgalary goýýar. Iňrik garalanda we gijesine işjeň hereketde bolýar. Mör-möjekler, ösümlikleriň üstündäki, şeýle-de olaryň ýere gaçan daneleri bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty, käbir ýerde az sanly görnüş, onuň aw ähmiýeti ýok, şeýle-de bolsa ýurtlaryň birnäçesinde höwesjeň awçylaryň aw guşy hasaplanylýar.

105. Ýelbe (suw towugy) – *Porzana porzana* – Погоньш

Meýdan alamatlary: orta jüýje ölçegli. Garamtyl reňkli, **üsti** açyk we garamtyl tegmilli **çalymytyl - goňurrak-yaşylymytyl, aşak tarapy** ak tegmillerde **gögümtil-çal**, böwürleri **kese zolakly**, garnynyň or-

длинным, слегка изогнутым книзу клювом.

Распространение: от Западной Европы до Японии. В Средней Азии распространен широко, в Туркменистане встречается почти повсеместно, приурочен к водно-болотным угодьям, включая не только побережье Каспия, но и водоемы в пустынных районах. Зимует от Средиземного моря на восток через Аравийский полуостров до Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся и зимующий вид, часть особей, возможно, ведет оседлый образ жизни. Весенняя миграция – в марте-апреле, осенняя – в сентябре-октябре. Обитает в топких местах побережий рек, озер и водохранилищ, заросших камышом, тростником, осокой. Гнездование – в апреле-мае, гнездо строит из сухих стеблей на кочке или в тростнике, в укрытом месте. Кладка – 5-10 яиц рыжего фона с красно-коричневыми пятнами. Активен, преимущественно, в сумерках и ночью. Питается насекомыми, которых собирает как с растений, так и поверхностных слоев почвы.

Статус: обычный, местами немногочисленный вид, у нас охотничьего значения не имеет, хотя в ряде стран считается объектом любительской охоты.

Полевые признаки: размером со среднего цыпленка. Окраска темная, сверху серо-буро-зеленая со светлыми и темными пестринами, **нижняя сторона голубоватосерая** с белыми пятнами, **на боках**

tasy agymtyl, **guýrugynyň aşagy zolaksyz. Çüňküniň düýbi gyzyl, uju yaşylymytyl-sary**, aýaklary yaşylymytyl. Reňki gýşky bezeginde has açygrak. Ýaşlary gýşky bezeginde uly guşlara çalymdaş, emma döşi ak reňkli we garny çyparrak öwüşginli. Sesi ýiti sykylyklanma bolup, uzakdan eşidilýär. Uzynlygy – 190-225, ganaty – 100-125 mm, agramy – 100 g golaý.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **guýrugynyň aşagynyň ala daldigi, sarymytyldygy** we ölçegleriniň has ulurakdygy bilen beýleki ýelbelerden; reňkiniň garamtyldygy we çüňküniň düýbüniň gyzlydygy bilen çypar ýelbeden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: endigan däl, “tegmilleýin” – Ýewropanyň araçäginden Günbatar Sibire we Demirgazyk Gazagystana çenli ýaýran. Orta Aziýada, esasan, suw-batgalyk ýerleri, Türkmenistanda – Hazar deňziniň kenarýakasyndan Amyderýa çenli gabat gelyär. Hindistanda, Päkistanda we Gündogar Afrikada gyslaýar, az bölegi Orta Aziýanyň günorta taraplarynda gyslamaga galýar.

Ýaşaýyşy: uçup geçýän görnüş, käbir görnüşleriniň gyslamaga galmaklary mümkin. Ýazyna-martyň ortasyndan apreliň aýagyna çenli, güýzüne – sentýabr-oktyabrda. Gijesine uçup geçýär. Guşlar günüň dowamynda, emma iňrik garalanda, aýratyn-da, gijesine işjeň bolýar, ýaşyryn gezýär. Aglaba, mör-möjekler, balykgulaklar, seýregräk ösümlikleriň tohumlary we suwotular bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, gowşak öwrenilen guş. Ikinji orunly sport aw guşy, Türkmenistanda beýleki suwda ýüzýän guşlar bilen, tötänden

поперечные полосы, середина брюшка беловатая, **подхвостье не полосатое. Основание клюва красное, конец зелено-желтый**, ноги зеленоватые. В зимнем наряде окраска заметно светлее. Молодые похожи на взрослых в зимнем оперении, но белый цвет на груди и брюхе с рыжим оттенком. Голос – далеко слышное резкое посвистывание. Длина – 190-225, крыло – 100-125 мм, вес – около 100 г.

Сходства – отличия: от других погоньшей **отличается не полосатым желтоватым подхвостьем** и более крупными размерами, от коростеля – темной окраской и красным основанием клюва.

Распространение: неравномерное, «пятнистое» – от побережья Европы до Западной Сибири и Северного Казахстана. В Средней Азии встречается, главным образом, по водно-болотным угодьям, в Туркменистане от побережья Каспия до Амударьи. Зимует в Индии, Пакистане и Восточной Африке, незначительная часть остается в южных районах Средней Азии.

Образ жизни: пролетный вид, возможно, отдельные птицы остаются на зиму. Сроки полета: весной – с середины марта до конца апреля, осенью – в сентябре-октябре. Миграцию совершает в ночное время. Активен круглосуточно, но, особенно, в сумерки и ночью, скрытная птица. Питается, преимущественно, насекомыми, моллюсками, реже семенами растений и водорослями.

Статус: немногочисленная, слабоизученная птица. Второстепенный объект спортивной охоты, в

tutulýar.

106. Kiçi suw towuğu – *Porzana parva* – Малый погоньш

Meýdan alamatlary: sar ölçegli kiçiräk guş. **Üstki tarapy** garamtyl tegmillenen **çalymyl - goňurrak-ýaşyl, bokurdagy we aşagy gögümtil-çal, böwürleri anyk zolakly, guýrugynyň aşagy ala, gara-ak, çüňküniň düýbi gyzyl we ujy sary**, aýaklary ýaşylymtyl-goňur. Mäkiýany horazyna garanynda, açyk reňkli, onuň bokurdagy ak, garny öçügsi-çupar. Ýaşlary mäkiýana görä ýagtyrak, böwürleri goňur kese zolakly, goňurrak çüňkli. Sesi uzakdan eşidilýan warryldyly owaz “kua-kua”. Uzynlygy – 170-190, ganaty – 94-107 mm, agramy- 50 g golaý.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: çüňküniň düýbiniň gyzlydygy we böwürlerinde anyk zolaklaryň ýokdygy (ýaş guşlarda – diňe birinji uçuş ýeleginiň daşky ýelpewajynyň reňki goňur) bilen jüýje ýelbeden, ölçegleriniň kiçidigi we guýruk astynyň aladygy bilen ýelbeden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günbatar Ýewropadan Orta Sibiriň günortasyna, Gazagystanyň demirgazyk bölegine çenli, Orta Aziýada ýaýran. Türkmenistanda derýalaryň jülgelerinde (Amyderýa, Garagum, Murgap, Tejen, Etrek), Hazaryň gündogar kenarynda we beýleki suw-batgalyk ýerlerde duşýar. Ýaýrawy endigan däl. Ýewropanyň günortasynda, Alynky Aziýada, Orta Aziýanyň günorta böleginde, Demirgazyk Hindistanda, Gündogar Afrikada gyşlayar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, bölekleyin höwürtegeýän we gyşlaýan gör-

Туркменистане добывается случайно при охоте на водоплавающую дичь.

Полевые признаки: небольшая птица размером со скворца. Верх серо-буро-зеленый с темными пестринами, **шея и низ сине-серые, без резких полос на боках, подхвостье полосатое, черно-белое, клюв красный у основания и желтый на конце**, ноги зеленовато-бурые. Самка окрашена светлее, чем самец, горло у нее белое, а брюшко бледно-рыжее. Молодые светлее, чем самка, по бокам тела бурые поперечные полосы, клюв буроватый. Голос – далеко слышная квакающая трель «куа-куа». Длина – 170-190, крыло – 94-107 мм, вес – около 50 г.

Сходства – отличия: от погоньша-крошки отличается красным основанием клюва и отсутствием резких полос на боках (молодые – только бурым цветом наружного опахала первого махового пера), от погоньша – мелкими размерами и полосатым подхвостьем.

Распространение: от Западной Европы до юга Средней Сибири, северная часть Казахстана, Средняя Азия. В Туркменистане – по долинам рек (Амударья, Каракумдарья, Мургаб, Теджен, Этрек), восточному побережью Каспия, по другим водно-болотным угодьям. Распространен неравномерно. Зимует на юге Европы, в Передней Азии, южной части Средней Азии, Северной Индии, Восточной Африке.

Образ жизни: пролетный, частично гнездящийся и зимующий вид. Сроки пролета: весной – в мар-

нüş. Ýazyna-mart-maý aýlarynda, güýzüne – sentýabr-noýabryň ikinji ýarymynda uçup geçýär. Dürli landşaftlarda gabat gelýär, emma suwbatgalyk ýerlere ýakyn çekilýär. Örän ýaşyryn gezyän guş, suwda gowy ýüzyär. Apreliň aýagynda we maýda aýratyn jübüt bolup, gür otlaryň arasynda, suwdaky könelşen gamyş dykynlarynyň üşmeklerinde ýada gury kenarda höwürtegeýär. 6-9 sany gyzlymtyl meneklenen sarymtyl-çalymtyl-goňur reňkli ýumurtgalary goýýar. Oňurgasyzlar (mör-möjekler, gurçuklar, balykgulaklar), şeýle-de suw ösümlükleriň tohumlary we ýaşajyk baldajyklary bilen iýmitlenýär.

Statusy: sany ýokary däl. Aw ähmiýeti ýok.

107. Jüýje ýelbe – *Porzana pusilla* – Погоньш-крошка

Meýdan alamatlary: kiçi suw towuk ölçegli we reňki boýunça çalymdaş, emma maýda, **böwürleri kese-ala çyzykly**. Umury reňki goýu-goňur, arkasy açyk çala görüňän tegmilli. **Guýrugynyň aşagy we bedeniniň aşagy gara-ak zolakly, ol döşüniň aşaky bölegine çenli ýetýär. Ganatlarynyň gyrasynda insiz ak zolaklar uçýan wagty görünýär.** Inçeden gysga çüňküniň düýbi ýaşylymtyl reňkli, aýaklary sarymtyl. Sesi assaja sykylyklanma. Uzynlygy – 120-150, ganaty – 50-105 mm, agramy - 50 g golaý.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň has maýdadygy bilen ýelbeleriň ählisinden, çüňküniň düýbiniň ýaşylydygy, böwürleriniň anyk zolaklydygy, aýaklarynyň sarymtyldygy (ýakyn aralykdan birinji pelpelleýiş ýelekleriniň daşky

те-мае, осенью – в сентябре-первой половине ноября. Встречается в различных ландшафтах, но тяготеет к водно-болотным участкам. Очень скрытная птица, хорошо плавает. Гнездится отдельными парами с конца апреля, в мае. Гнезда по берегам заросших растительностью водоемов, обычно на плавучих скоплениях прошлогоднего тростника или же на сухом берегу. Кладка 6-9 желтовато-серо-бурых с красноватыми крапинками яиц. Питается беспозвоночными (насекомые, черви, моллюски), а также семенами и побегами водных растений.

Статус: численность, видимо, не велика. Охотничьего значения не имеет.

Полевые признаки: размером и по окраске похож на малого погоньша, но мельче, **бока резко поперечно-полосатые**. Общий тон окраски темно-бурый, на спине малозаметные светлые пестрины. **Черно-белые полосы на подхвостье и нижней стороне тела доходят до нижней части груди. В полете видны узкие белые полосы по краям крыльев.** Основание относительно тонкого короткого клюва зеленоватого цвета, ноги желтоватые. Голос – негромкое пошвыстывание. Длина – 120-150, крыло – 50-105 мм, вес – около 50 г.

Сходства – отличия: от всех погоньшей отличается наименьшими размерами, от малого – зеленым основанием клюва, резкими полосами на боках, желтоватыми ногами (в непосредственной близости

ýelpewaçlarynyň akdygy görünüär) bilen ýelbedan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewraziýa, Afrika, Awstraliýa, Orta Aziýa – uly derýalaryň jülgelerinde. Türkmenistanda Amyderýanyň, Garagum, Murgap, Tejen derýalarynyň jülgelerinde, Köpetdagyň eteklerinde duşýar. Uçup geçende giňişleýin ýaýraýar. Afrika-da we Günorta Aziýada gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtleýän, bölekleyin gyslaýan görnüş. Aprel-maýda we sentýabr-oktyabrda uçup geçýär. Ösümlüklere baý köllerde ýaşýar (gamyş, ýeken we başg.), köplenç iňrik garalanda we gijesine işjeň bolýar. Maý-iyun aýlarynda höwürtleýär, 6-9 sany gyzylymtyl-çypar meneklenen sarymtyl-çalymtyl - goňur reňkli ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler, balykgulaklar, gurçuklar, seýrek suw ösümlükleriniň tohumlary bilen ýymitlenýär.

Statusy: sany anyklanmadyk, kiçi suw towugyňkydan biraz ýokary bolmagy mümkin, aw ähmiýeti ýok, bizde heniz öwrenilmedik görnüş.

108. Çypar ýelbe – *Crex crex* – Коростель

Meýdan alamatlary: jokjokydan ulurak. **Çünki gysga we konusşekilli, sarymtyl reňkli. Reňki goňurrak-çalymtyl-çypar** bolup, arkasy alarak, böwürleri kese ak zolakly, bokurdagy agymtyl, döşi we petekesi çyppakçal, ganatlary poslurak-goýu-çypar reňkli. Ýerde örän çalt ylgaýar, howa islegsiz göterilýär, gyzga aralyga ýerläp uçanda, uzyn aýaklary taşaşyksyz sallanýar. Sesi – uzakdan eşidilýär, garyljk gykylyk “krek-krek...”. Uzynlygy – 250-290, ganaty – 125-148 mm, agramy - 150 g golaý.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çün-

можно видеть белое наружное опахало первого махового пера).

Распространение: Евразия, Африка, Австралия, в Средней Азии – по долинам крупных рек. В Туркменистане – долины Амударьи, Каракумдарьи, Мургаба, Теджена, в предгорьях Копетдага. На пролете встречается широко. Зимует в Африке и Южной Азии.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся, частично зимующий вид. Пролет – в апреле-мае и сентябрь-октябре. Населяет озера с обильной растительностью (камыш, тростник и др.), активен, преимущественно, в сумерки и ночью. Гнездится в мае-июне, кладка из 6-9 желтовато-серо-бурых с красновато-рыжими крапинками яиц. Кормится насекомыми, моллюсками, червями, реже семенами водных растений.

Статус: численность неизвестна, по-видимому, несколько выше, чем у малого погоныша, охотничьего значения не имеет, у нас почти не изученный вид.

Полевые признаки: несколько крупнее дрозда. **Клюв короткий, более конический, желтоватого цвета. Окраска буровато-серовато-рыжая** с пестринами на спине и белыми поперечными полосами на боках, горло беловатое, **грудь и зоб рыже-серые**, крылья ржавчато-темно-рыжие. Бегаёт очень быстро, взлетает неохотно, при низком полете на короткие расстояния длинные ноги свисают неуклюже. Голос – далеко слышный, скрипучий крик «крэк-крэк...». Длина – 250-290, крыло – 125-148

küniň gysgadygy bilen bukanja ýelbeden, çypar reňki bilen ýelbeden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropanyň günbatar araçäginde gündogara-Günorta Sibire çenli ýaýran. Orta we Merkezi Aziýada diňe Gazagystanyň demirgazygynda we gündogarynda, Altaýda höwürtleýär. Merkezi we Günorta Afrikada, Madagaskarda gyslaýar. Türkmenistanda Hazar deňziniň gündogar kenaryndan Amyderýa çenli, möwsümleýin uçup geçýän döwüründe hemme ýerlerde duşýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän görnüş. Dürli landşaftlarda ýaşýar, köplenç oazislere ýakynlaşanyny gowy görýär. Ýazyna-aprel-maýda, güýzüne – awgustyň ortasyndan oktyabryň aýagyna çenli uçup geçýär. Mör-möjekler, gurçuklar, ösümlükleriň tohumlary bilen ýymitlenýär.

Statusy: sany çäkli, aýratyn-da, ýurduň gündogar böleginde. Käbir ýurtlarda çypar ýelbe ikinji derejeli sport aw guşy hasaplanylýar, emma Türkmenistanda däl.

109. Suw towugy – *Gallinula chloropus* – Камышница

Meýdan alamatlary: aýaklary uzyn, sakarbarakdan kiçi. Beden gurлуşy dykyz, barmaklarynyň arasy ýüzüş perdesiz. **Reňki gara, kellesi we döşi tutuk-gara, arkasy we ganatlary garamtyl-goňur, guýrugynyň aşagy we böwürlerindäki zolak ak. Çünki gysga we maňlaýynyň sakar ýeri gyzyly, çünküniň uju sary**, aýaklary ýaşylymtyl. Ýaşlary ачык-goňur, çünki çalyмtyl-sary reňkli, maňlaýыnda sakar ýeri ýok. Ачык suw giňişiginde oňat ýüzýär we аýaklarynyň hereketinde

мм, вес – около 150 г.

Сходства – отличия: от пастушка отличается коротким клювом, от погонышей – рыжеватой окраской.

Распространение: от западных границ Европы на восток до Южной Сибири. В Средней и Центральной Азии гнездится только на севере и востоке Казахстана, на Алтае. Зимует в Центральной и Южной Африке, на Мадагаскаре. Во время сезонных перелетов в Туркменистане встречается почти повсеместно, от восточного побережья Каспия до Амударьи.

Образ жизни: пролетный вид. Обитатель различных ландшафтов, больше тяготеет к оазисам. Весенний пролет поздний и растянут – в апреле-мае, осенний – с середины августа по октябрь. Питается насекомыми, червями, семенами растений.

Статус: численность ограничена, особенно в восточной части страны. В некоторых странах считается второстепенным объектом спортивной охоты, но в Туркменистане таковым не является.

Полевые признаки: меньше лысухи, на длинных ногах. Телосложение плотное. Пальцы без плавательных перепонок. **Окраска темная, голова и грудь матово-черные, спина и крылья черно-буроватые, подхвостье и полоса на боку белые. Небольшой клюв и бляшка на лбу красные, конец клюва желтый**, ноги зеленоватые. Молодые – светло-бурые, клюв серо-желтый, без бляшки на лбу. На открытой воде хорошо плавает и

kellesi öňe-yza uzaýar, ýerde ýörände jaýtaryp duran guýrugy sandyraýar. Seýrek we höwessiz uçýar. Sesi dürli döwürde dürli, adatça howpdan gorkanda batly "krруuk" we howa göterlende gaýtalanýan "kek-kek". Uzynlygy – 270-350, ganaty – 160-190 mm, ag-ramy - 300 g golaý.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň kiçidigi, çüňküniň we sakarýeriniň gyzyl reňklidigi bilen sakarbarakdan, reňkiniň garamtyldygy bilen beýleki suw towuklardan tapawutlanýar. Meýdanda özüni alyp barşy we ýaşyryn gezişi, edil soltantowuk ýaly. Sakarbarakdan esasy tapawudy ol hiç wagt uly sürä toplanmaýar.

Ýaýran ýerleri: giň – Ýewraziýanyň, demirgazyk we demirgazykgündogar welaýatlaryndan başgalarynda, Merkezi we Günorta Afrikanyň, Amerikanyň, demirgazyk we günortasyndan başga ýerlerinde. Orta Aziýada amatly suw ýataklaryň ählisinde. Türkmenistanda–Hazar deňziniň gündogar kenaryndan Amyderýa çenli höwürtegeýär. Ýewropanyň günbatarynda we günortasynda, Kiçi, Alynky we Orta Aziýanyň günortasynda, Günorta-Gündogar Aziýada gyslaýar.

Ýaşayşy: höwürtegeýär, uçup geçýär we gyslaýar, bir bölegi otu-rymly ýaşaýar. Ýazyna–mart-aprelde, güýzine-sentyabr-oktyabrda uçup geçýär. Ýata suwlaryň, derýalaryň, kölleriň, suwaryş we zeý akabalaryň gamşylyk ýerlerini halaýar. Gyrymsylaryň, dürli otlaryň sypallaryndan ýarymşarşekilli höwürtege gurýar we ony suw basan gyrymsylaryň aşagynda ýa-da buky ýerde ýerleşdirýär. Maý-ýulda 1-6 sany ownuk nokatly melemtil ýa-da

в такт движению кивает головой, при ходьбе подергивает коротким приподнятым хвостом. Летает редко и неохотно. Голос различен в разное время, обычно, при испуге – громкое «крруук» и повторяющееся «kek-kek» в воздухе. Длина – 270-350, крыло – 160-190 мм, вес – около 300 г.

Сходства – отличия: от лысухи отличается меньшими размерами, красным цветом клюва и бляшки, от других пастушковых – темной окраской. Поведение такое же скрытное как у султанки. В отличие от лысухи никогда не собирается в большие стаи.

Распространение: широкое – Евразия, исключая северные и северо-восточные области, Центральная и Южная Африка, Америка, исключая северные и южные области. В Средней Азии гнездится во всех подходящих водоемах, в Туркменистане – от восточного побережья Каспия до Амударьи. Зимовки на западе и юге Европы, в Малой, Передней и на юге Средней Азии, также в Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: гнездится, пролетает и зимует, часть особей оседла. Пролет весной – в марте-апреле, осенью – в сентябре-ноябре. Предпочитает камышовые заросли по берегам стоячих водоемов близ рек, озер, оросительных и дренажных каналов. Гнездо полушаровидной формы из веточек и сухих стеблей, располагается на затопленных кустах или на земле, всегда хорошо укрытое. Размножение с мая по июль, кладка обычно из 1-6 кремово или коричневато-рыжевато-красных мелких крапинками яиц. За сезон

goňurrak-çupar reňkli ýumurtgalary goýýar. Möwsümde iki gezek jüýjeleýär. Suwdaky mör-möjekler we olaryň liçinkalary, balykgulaklar, şeýle-de ösümlik iýmiti bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde köp sanly guş. Awçylaryň aw guşy, emma seýrek atylyp alynýar.

110. Soltantowuk – *Porphyrio porphyrio* – Султанка

Meýdan alamatlary: sakarbarakdan biraz ulurak. Çüňki daýaw, gapdallaryndan gysylan. Aýaklary uzyn, barmaklarynyň arasy ýüzgiç perdesiz. **Reňki metal öwüşginli ýaşylymtylgök, arkasy we garyn tarapy syýa reňkli, guýrugynyň aşagy ak. Aýaklary, çüňki we maňlaýyndaky sakar ýeri mämişi-gyzyl.** Ýaş guşlar birmeñzeş reňkli, emma has öçügsi. Sesi yzly-yzyna gaýtalanýan iňňildi – "kro-o" ýa-da "a-a-a". Ýerden göterilip, onlarça metr uçanyndan soň gonup, ýene-de bukulýar. Uzynlygy – 450-500, ganaty – 257-286 mm.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: görünüşleriň arasynda meñzeşi ýok, ýagty reňk daşky sypatyna häsiýetli. Meýdanda özüni alyp barşy edil suw towugynyňky ýaly

Ýaýran ýerleri: arealy bölünen – Günorta-Gündogar Ýewropa, Hazar deňzi, Pars aýlagy, Afrika, Sahara çölünden başga ýeri, Günorta, Günorta-Gündogar Aziýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Polineziýa. Türkmenistanda – Etrek derýasynda, Hazar deňziniň kenarynda, Merkezi Garagumuň günorta böleginiň suw-batgalyk ýerlerinde (kanallar, akyndy köller) duşýar, olaryň Murgap, Guşgy we Amyderýa jülgeleline aralaşmaklary hem mümkin.

Ýaşayşy: otu-rymly guş, ýaşyryn ýaşaýar. Esasy duşýan ýerleri gü-

птенцов выводит дважды. Питается водными насекомыми и их личинками, моллюсками, а также растительной пищей.

Статус: обычная, местами многочисленная птица. Считается охотничьим видом, но добывается редко.

Полевые признаки: несколько крупнее лысухи. Клюв массивный, сжатый с боков. Ноги высокие, пальцы без плавательных перепонок. **Общая окраска зеленовато-голубая с металлическим отливом, спина и брюшная сторона фиолетовые, подхвостье белое. Ноги, клюв и бляшка на лбу – оранжево-красные.** Молодые птицы окрашены сходно, но более тускло. Голос – неоднократно повторяющийся стон – «кro-o», или «a-a-a». Взлетов, пролетает несколько десятков метров и вновь затаивается. Длина – 450-500, крыло – 257-286 мм.

Сходства – отличия: сходных видов нет, внешность характерная, окраска яркая. Поведение такое же скрытное как у камышницы.

Распространение: ареал разобщен – Юго-Западная Европа, Каспий, Персидский залив, Африка, исключая Сахару, Южная и Юго-Восточная Азия, Австралия, Новая Зеландия, Полинезия. В Туркменистане – по Этреку, побережью Каспия, водно-болотным угодьям (каналы и сбросовые озера) южной части Центральных Каракумов, не исключено проникновение в долины Мургаба, Кушки и Амударьи.

Образ жизни: живет оседло, ведет скрытый образ жизни. Ха-

ösen gamyşlyk jeňňellikleri. Aýratyn jübüt bolup höwürtegeleýär, gamyş sypallarynyň üýşmeklerinde we döwlen gamyşlaryň üstünde höwürtege gurýar. Apreliň ortasyndan iýun aralykda köpelyär. 3-6, käte 9 sany goňur meneklenen çuprarak reňkli ýumurtgalary goýýar. 22-25 gün kürk bolup oturýar. Suw ösümlükleriniň pudajyklary, tohumlary, ýerasty baldaklary we ýeken baldaklarynyň özeni, suw we ýerüsti oňurgasyzlar bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek guş, baş sany üýtgäp durýar, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen, Hazar döwlet goraghanasynyň guşlarynyň iň täsin wekilleriniň biri.

111. Sakarbarak – *Fulica atra* – Лысуха

Meýdan alamatlary: kiçiräk ördek ölçegli guş. **Reňki tutuşlygyna gara, döşi we garny çalymtyl öwüşginli. Çünki gysga we maňlaýyndaky derisypat sakar ýeri ak.** Barmaklary kiçiräk parawuzly (perdeli), aýaklary çal. **Ýaşlarynyň bokurdagy we boýununyň öňki bölegi ak, aşagy çal.** Suwda oňat ýüzüp we çümüp bilýär, ýüzen wagty aýaklarynyň hereketine kellesini öňe-yza ýaýkaýar. Suwdan uçanda, ganatlarynyň we aýaklarynyň kömegi bilen ylgap, suwy töweregine sýçradyp, ýokary göterilýär. Aýaklaryny yza uzadyp, çalt we göni ugur boýunça uçýar. Sesi çasly gykylyk we çagyryş owazly. Uzynlygy – 360-420, ganaty – 190-230 mm, agramy - 900 g golaý.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: suwda oturan guşuň gabarasy ördekləriňkiden anyk tapawutlanýar; suw towuklaryň beýleki görnüşlerin-

рактерные местообитания – густые камышовые заросли. Гнездится отдельными парами, гнезда устраивает на кочках и заламах тростника. Размножение с середины апреля по июнь. В кладке 3-6, иногда 9 яиц рыжеватого цвета с небольшими коричневыми пятнами. Яйца насиживаются 22-25 дней. Питается побегами, семенами водных растений, корневищами и основаниями стеблей рогоза, водными и наземными беспозвоночными.

Статус: редкая птица, численность подвержена колебаниям, включена в Красную книгу Туркменистана. Один из интересных представителей птиц Хазарского заповедника.

Полевые признаки: величиной с небольшую утку. **Окраска сплошь черная с сероватым оттенком на груди и брюхе. Короткий клюв и кожистая бляшка на лбу белые.** Пальцы с небольшими перепонками, ноги серые. **У молодых горло и передняя часть шеи белые, низ серый.** Хорошо плавает и ныряет, при плавании в такт движению ног покачивает головой. С воды взлетает, разбегаясь, разбрызгивая воду и помогая крыльям ногами. Полет быстрый и прямолинейный, с вытянутыми назад ногами. Голос – широкий диапазон зычных криков и позывов. Длина – 360-420, крыло – 190-230 мм, вес – около 900 г.

Сходства – отличия: силуэт птицы, сидящей на воде, сильно отличается от утиног; от других пастушковых отличается крупным размером, темной окраской и бе-

den ölçegleriniň uludygy, reňkiniň garamtyldygy we maňlaýynyň sakardygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeleýän bölegi – Ýewraziýanyň günorta bölegi, Awstraliýa. Türkmenistanda giň yaýran, höwürtegeleýän döwründe – uly derýalaryň jülgerinde, köllerde, höwürtegelemeýän döwri – Hazar deňziniň kenaryakasynda, şeýle - de içki suw ýataklarynda duşýar. Area-lynda höwürtegeleýän yerleriniň günortasynda, şeýle-de Afrikanýň denirgazygynda guşlaýar.

Ýaşayşy: höwürtegeleýär, uçup geçýär, guşlaýar, bir bölegi oturmly ýaşýar. Dürli landşaftlardaky süýji we duzly suw ýataklarynda mesgen tutýar. Höwürtesini gamyşdan, inçejik pürlerden we otlaryň sypallaryndan, ösgün otlaryň arasynda gurýar. Maý aýynda howwürtegeleýär, 3-6 sany, käte 10-15-e çenli, çupar ýokundyly we gara meneklenen çalymtyl reňkli ýumurtgalary goýýar. Iýulyň aýagynda topar we süri bolup gezyän jüyjeleri duşýar. Migrasiýa döwründe we guşda örän uly süri toparlaryny döredýärler. Suw ösümlükleri we oňurgasyzly, seýrek maýda balyklar bilen iýmitlenýär.

Statusy: köp sanly, käbir ýerlerde örän köp sanly guş. Höwesjeň awçylaryň aw guşy (ýerli ady – “каçкалдак”).

Toklutaýlar – *Otididae* – Дрофиные

Beden gurluşy dykyz, uly we orta ölçegdäki guşlar. Boýny uzyn we ýogyn, çünki daýaw we güýçli. Ýelek örtügi gaty we dykyz. Aýaklary uzyn, daýaw, ýöremek we ylgamak

лой бляшкой на лбу.

Распространение: гнездовая часть ареала – южная половина Евразии, Австралия. В Туркменистане распространена широко, в гнездовое время – долины крупных рек, озера, в негнездовое время – как на побережье Каспийского моря, так и на внутренних водоемах. Зимовки в южных областях гнездовой части ареала, а также на севере Африки.

Образ жизни: гнездится, пролетает, зимует, часть особей живет оседло. Населяет пресные и соленые водоемы в различных ландшафтах. Гнездо – сравнительно большая постройка из камыша, тонких веток и травяных стеблей, расположено обычно среди зарослей водной растительности. Гнездится в середине и до конца мая. Кладка из 3-6 яиц (иногда до 10-15) сероватого цвета с рыжеватым налетом и черными крапинками. С конца июля начинают попадаться группами и стайками, в период миграции и зимой образуют очень большие скопления. Питается водными растениями и беспозвоночными, редко мелкой рыбой.

Статус: многочисленная, местами очень многочисленная птица. Объект любительской охоты (местное охотничье название – “качкалдак”).

Крупные и средних размеров птицы плотного телосложения. Шея длинная и довольно толстая, клюв крепкий, короткий. Оперение жесткое и плотное. Ноги относи-

üçin uýgunlaşan. Barmaklarynyň aşak ýüzi mayyşgak gaty ýassyjakly. Uçuşy çakgan, emma az öwrümde, göni uçýar. Sähra, ýarym çöllük, çöllük meýdanlarda ýaşaýar. Guşlar monogam (togdary, bezbeltek) ýa-da poligam (toklutaý) bolýarlar. Ýumurtgalary adaty ýa-da gysgalan ýumurtgaşekilli. Görnüşleriň birinde (togdary) jyns tapawudy reňki boýunça anyk bildirýär, beýlekilerinde ol tapawut ýok. Höwürtgeländen soňky döwürde, süri bolup gezyärler. Ösümlik (pudagy, tohumy), şeýle-de haýwan ýmiti (mör-möjekler, balykgulaklar, kämahal syçaňekilli gemrijiler) bilen ýमितlenýärler. Maşgalada 22 görnüş, şolaryň 3-si Türkmenistanda.

112. Bezbeltek – *Tetrax tetrax* – Стрепет

Meýdan alamatlary: uzyn aýakly, towuga çalymdaş, toklutaýlaryň arasynda iň kiçisi. Jübütleşme bezeginde horazyň arkasy garamtyl çüwdürim nagyşly çalymtyl-çypar reňkli, garyny ak. **Gara boýny insiz ak reňkli iki boýnbagly, ganatlary uly ak aýnajakly we garamtyl uçly.** Aýaklary ýaşylymtyl-çal, käte sarymtyl öwüşginli. Çünki goňurrak-çal. Mäkiýanyň boýny goňurrak ala we “boýunbagsyz”. Horazy guşyna edil mäkiýan ýaly reňkde. Mäkiýany horazyndan kiçiräk. Ýaş guşlar uly mäkiýanlara çalymdaş, diňe bedeniniň üstki tarapy has öçügsi. Çalt we göni, ýere golaý, ganatlaryny ýygy-ýygydan kakyp, tygyrdyly owaz bilen uçýar. Sesi bölünip-bölünip çykýar – “trekk-trek”, köpelmeýän döwürde ümsüm, käte pessaý “pulpul” ses edýär. Uzynlygy – 40-45, ganaty – 23.5-27, ganatlarynyň gerimi

тельно длинные, крепкие, хорошо приспособленные для ходьбы и бега. На нижней стороне пальцев жесткие упругие подушечки. Летают активным, но мало маневренным прямым полетом. Обитатели степей, полупустынь и пустынь. Моногамы (дрофа-красотка, стрепет) или полигамы (дрофа). Яйца правильной или укорочено-яйцевидной формы. Половые различия в окраске у одних видов выражены, у других – нет. Вне гнездового периода, в основном, держатся стаями. Питаются как растениями (побеги, семена), так и животными (насекомые, моллюски, иногда мышевидные грызуны). В семействе 22 вида, из которых в Туркменистане – 3.

Полевые признаки: средней величины птица, похожа на длинноногую курицу, самая мелкая среди наших дроф. Спинная сторона самца в брачном наряде серовато-рыжевато-темная с темным струйчатым рисунком, брюшко белое. **Шея черная с двумя белыми узкими ошейниками, крыло с большим белым зеркалом и темным концом.** Ноги зеленовато-серые, иногда с желтым оттенком. Клюв буровато-серый. У самки шея буроватая с пестринами, «ошейника» нет. Зимой самец окрашен как самка. Самки по величине несколько меньше самцов. Молодая птица похожа на взрослую самку, только верхняя часть тела более бледная. Полет быстрый и прямой, низко над землей, часто взмахивая крыльями с характерным дребезжащим звуком. Голос – отрывистое «трэкс-

– 105-115 см, аgramy 600-950 г.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçeginiň kiçidigi bilen beýleki toklutaýlardan tapawutlanýar, ýazyna horazlarynyň boýnunyň nagyşly häsiyeti bar.

Ýaýran ýerleri: höwürtgeläýän ýerleri Ýewraziýanyň sähralyk zolaklaryny, günbatara Pirineý ý/a, gündogarda Ob derýasyna çenli aralygy, şeýle-de Demirgazyk Afrikany öz içine alýar. Günorta we Günorta-Gündogar Aziýada, soňky ýyllarda Türkmenistanyň günortasynda guşlaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän-höwürtgeläýän we guşlaýan guş. Ýazyna-fewralyň ikinji ýarymyndan martyň aýagyna çenli, güýzine – sentýabryň soňundan noýabra çenli uçup geçýär. Uçup geçende olaryň köp bölegi oazislerde, Köpetdagiň eteklerinde we derýalaryň jülgelerinde saklanýar. Aýratyn jübüt bolup, dagiň sähralyk ýerlerinde höwürtgeläýär. Höwürtgesi ýerde osýän otlaryň arasynda, guran otlaryň sypallaryndan ýuka düşelen uly bolmadyk çukyrjyk. Maýyň başynda 3-5 sany ýalpyldawuk, garamtyl meneklenen, sarymtyl-ýaşyl ýumurtgalary goýýar. Höwürtgeläýän döwri süri bolup gezyärler. Mör-möjekler, dürli ösümlikleriň tohumlary, pudajyklary bilen ýमितленýär.

Statusy: seýrek görnüş, ön sähralygyň ýokary hilli aw guşudy, emma häzir MSOP-yň Gyzyly sahypasyna we Türkmenistanyň Gyzyly kitabyna girizilen. Aw etmek gadagan.

трэкс», вне периода размножения молчалив, изредка издает негромкое «пуль-пуль». Длина – 40-45, крыло – 23.5-27, размах крыльев – 105-115 см, вес – 600-950 г.

Сходства – отличия: от других дрофиных отличается заметно меньшими размерами, а весной самцы еще и характерным рисунком на шее.

Распространение: область гнездования охватывает евразийские зональные степи от Пиренейского полуострова на западе до Оби на востоке, а также Северную Африку. Зимует в Южной и Юго-Западной Азии, в последние годы на юге Туркменистана.

Образ жизни: пролетная, зимующая птица. Весенний пролет со второй половины февраля до конца марта, осенний – с конца сентября до ноября. На пролете держатся стаями, большей частью в оазисах, в предгорьях Копетдага и речных долинах. Зимой часто встречается по озимым полям, особенно в южных частях страны. Гнездился отдельными парами по нагорным степным участкам. Гнездо – небольшая ямка среди травы на земле со скудной выстилкой из сухих травинок. Кладка в начале мая, из 3-5 блестящих, серо-зеленых с темными пятнами яиц. Питается насекомыми, семенами, побегами различных растений.

Статус: редкий вид, когда-то был переловленной степной дичью, но в настоящее время включен в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана. Охота запрещена.

113. Toklutaý – Otis tarda – Дрофа

Meýdan alamatlary: hindi towuk öçegli, uly guş. Üstki tarapynyň reňki kese gara zolakly çypar, kellesi we boýun bölegi tüsse reňkli-çal. **Ýazyna horazynyň bokurdagynyň gapdallary sallanyp duran ak ýelekli – “murtly”, boýnunyň aşagy çypar reňkli.** Ganatlary gara uçly ak (uçanda görünýär). Ümsüm, horazynyň sesi batlanyp, sarsgynly çykýan gysaga “horkuldy”, peselip bady gaçýan “hprrrrr”, howp abananda – arasy bölünen “ongh” sesli, mäkiýany jüýjelerini çagylanda basyk “tuktuk” gysga sesli, ýaslary-naýynjar sykylyklama “çiiio”. Horazynyň ganaty – 57-67, mäkiýanyňky – 45-57 sm, mäkiýanyň agramy – 3.5-8, horazyňky – 6-12 kg.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: ölçeğleriniň uludygy, boýnunda gara zolagyň we “ýakalygyň” ýokdygy bilen togdarydan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewraziýanyň düzlik we dag sähralygy. Türkmenistanda – Hazar deňziniň kenaryndan we Etrek derýasynyň aşagy başyndan Köpetdagyň dagöňüne çenli we uly derýalaryň jülgelerinde seýrek duş gelmegi mümkin. Demirgazyk Garadeňz pesliginde, Hazarýakasynda, Kiçi we Alyňky Aziýanyň käbir ýerlerinde gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän we gyslaýan guş. Ýazyna martda we apreliň başynda, güýzine-oktyabrda we noýabrda uçup geçýär. Ýarym çöllük, ýowşanly sähralyk ýerlerini, oazislerniň gyra çetlerini halaýar. Ýabany otlaryň we medeni danelilerini baldagy we tohumlary, tomzaklar we beýleki käbir mör-möjekler bilen

Полевые признаки: очень крупная птица размером с индюка. Окраска верха рыжая с черными поперечными полосами, голова и часть шеи – дымчато-серые. **У самцов в весенний период по бокам горла длинные рассученные белые перья – «усы», а шея снизу рыжая.** Крылья белые с темными концами (в полете). В основном, молчаливы, голос самца – резонирующее не громкое, очень короткое «хрюканье», переходящее в угасающее «хпrrrrrr», при опасности – обрывистый звук «онгх», самка, призывая птенцов, издает короткие приглушенные «тук-тук», у молодых – жалобный отчетливый посвист – «чиioo». Крыло у самцов – 57-67, у самок – 45-57 см, вес самок – 3.5-8, самцов – 6-12 кг.

Сходства – отличия: от дрофы-красотки отличается крупными размерами, отсутствием черной полосы и «воротника» на шее.

Распространение: равнинные и горные степи Евразии. В Туркменистане может редко попадаться от Каспийского побережья и низовьев Этрека до предгорий Копетдага и долин крупных рек. Зимовки в Северном Причерноморье, Прикаспии, местами в Малой и Передней Азии.

Образ жизни: пролетная и зимующая птица. Весенний пролет – в марте и начале апреля, осенний – в октябре и ноябре. Предпочитает полупустыни, поленные степи, окраины оазисов. Кормится побегами и семенами диких трав и культурных злаков, жуками и неко-

иýmitlenýär.

Statusy: baş sany çendenaşa azalýar, arealy bölünen, ýitip gitmek howpy abanýan görnüş hökmünde MSOP-ýň Gyzyly sahypasyna we Türkmenistanyň Gyzyly kitabyna girizilen. Guşy awlamak düýbinden gadagan.

114. Togdary – Chlamydotis undulata – Дрофа-красотка

Meýdan alamatlary: toklutaýdan has kiçi, emma göwresi uly guş. Horazy mäkiýanyndan ulurak. Arkasy kese tolkunşekilli nagyşly çäge sypatçypar reňkli. **Depesi we ýeñsesi gara ak ýeleklere durýan hüpüklü. Boýnunyň gapdallarydan iki sany gara zolak ýuwaş-ýuwaşdan gara ak ýeleklerniň sallanyp duran dessejigine geçýär we ol özboluşly ýaka emele getirýär.** Alkymynyň aşagy we boýuny petekesine çenli çalymtyl öwürşünde agymtyl, aşagyň galan ýeri-ak. Aýaklary açyk-çal, çünki goňur. Pessaýlap uçuşy, uly çarlaga çalymdaşlyk edýär. Uçanda ganatlarynyň üstündäki ak tegmiller oňat görünýär. Ýakyn aralyga uçup, ylgap gidýär. Ümsüm. Ganaty – 34.5-42.5 sm, agramy – 1.2-2.5 kg.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: boýnunyň gapdalarynyň gara zolaklydygy we ýakalygynyň bardygy bilen beýleki toklutaýlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Demirgazyk Afrikada, Alyňky, Orta we Merkezi Aziýada. Türkmenistanda – ýurduň düzlik böleginiň hemme ýerlerinde duşýar. Günorta-Gündogar Aziýada gyslaýar.

Ýaşayşy: höwürtegeýär, uçup geçýär, az-owlak gyslaýar. Güýzüne oktýabryň we noýabryň başy araly-

торыми другими насекомыми.

Статус: численность катастрофически сократилась, ареал разобщен, вид включен в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана как находящийся на грани исчезновения. Охота категорически запрещена.

Полевые признаки: относительно крупная, но значительно меньше дрофы птица. Самец крупнее самки. Окраска спины песчано-рыжевато-волнистым поперечным рисунком. **На темени и затылке – хохол из черно-белых перьев. По бокам шеи – две черные полосы, постепенно переходящие в пучки рассученных черно-белых перьев и образующие нечто вроде воротника.** Подбородок и шея до зоба – беловатые, с сероватым оттенком, остальной низ – белый. Ноги светло-серые, клюв бурый. Летит низко, напоминая крупную чайку. В полете хорошо видны белые пятна на крыльях сверху. Пролетев небольшое расстояние, бежит. Молчалива. Крыло – 34.5-42.5 см, вес – 1.2-2.5 кг.

Сходства – отличия: от других дроф отличается черной полосой на боках шеи и воротником.

Распространение: Северная Африка, Передняя, Средняя и Центральная Азия. В Туркменистане – повсеместно в равнинных частях страны. Зимует в Юго-Западной Азии.

Образ жизни: гнездится, пролетает, частично зимует. Пролет осенью – между октябрём и началом ноября, весной – уже с февраля.

kda, ýazyna – fewralda uçup geçýär. Toýunly we çägeli-çöllüklerde, şoraly we ýowşanly ýarymçöllüklerde mekan tutýar, aklaň çägelikden gaça durýar, oba hojalyk landşaftynyň gyra çetlerine aralaşmagy hem mümkin. Höwürtesi ýerde, aprelde, çalaja daşy sypalýklara gabalan oýjagaza 2-4 sany anyk bolmadyk çalymtyl meneklenen çalymtyl-ýaşyl reňkli ýumurtgalary goýýar. Ýaşlary awgustyň başyna çenli doly ösüp ýetişýär. Esasan, mör-möjekler we olaryň liçinkalary, maýda gemrijiler, suwulganlar, şeýle-de ösümlikleriň tohumlary, sogan düýpleri, ter pudajyklary bilen iýmitlenýär

Statusy: laçynly awlanýan aw guşy hökmünde görnüşiň söwda gymmaty ýokary. Çenden köp awlanmagy onuň baş sanynyň azalmagyna getirdi, MSOP-ýň Gyzyly sahypasyna we Türkmenistanyň Gyzyly kitabyna girizilen. Guşlary berk goraga almak we emeli usulda ösdürüp ýetdirmek gerek.

ÇULUKŞEKILLILER – CHARADRIIFORMES – РЖАНКООБРАЗНЫЕ

Maýda we orta möçberli, çarlaklar maşgalasynyň wekilleri, uly ölçepli guşlaryň uly topary. Köpüsiniň aýaklary uzyn we barmaklary gowy ösen. Käbiriniň yzky barmagy gowşak ösen ýa-da asla ýok (redusirlenen). Ýüzgüç perdesi diňe öňki barmagyň düýbünde (bizçüňk çulukda) ýa-da maýda deripisint parawuzlanan bolýar (ýüzegejede). Görnüşleriň çüňki aglaba uzyn we inçe, köplenç egmek. Käbiriniňki gysga we gurluşy boýunça kepderiniňkä çalymdaş. Çarlaklaryň çüňküniň uju gaňyrçağrak. Köpüsiniň göwresi jebis we gelşikli. Ganatlary,

Обитает в глинистых и песчаных пустынях и полупустынях с солянковой и полынной растительностью, избегает барханных песков, может встречаться по окраинам сельскохозяйственных ландшафтов. Гнездо на земле, кладка в апреле, состоит из 2-4 яиц, серо-зеленых, с неясными сероватыми пятнами, слегка окружается сухими стеблями. Молодые достигают полного роста к началу августа. Питается, главным образом, насекомыми и их личинками, мелкими грызунами, ящерицами, потребляет также растительные корма – семена, луковичы, побеги.

Статус: вид имеет высокую коммерческую ценность как объект соколиной охоты. Из-за чрезмерного отлова численность катастрофически сократилась, включен в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана. Подлежит строгой охране и искусственному разведению.

Большая группа птиц мелкой и средней величины, некоторые представители чайковых крупного размера. Большинство с длинными ногами и хорошо развитыми пальцами. У некоторых задний палец развит слабо или редуцирован. Перепонки развиты только у основания передних пальцев (шилоклювки), или оторочены мелкими пластинками (плавунчики). Клюв у большинства видов длинный и тонкий, часто изогнут. У некоторых короткий и напоминает по строению голубиный. У чайковых бывает на конце крючковатым. Туловище

bezziltikden galanynyňky uzyn we insiz. Ýelek örtügi dykyz, ýelekleri jübütleşýän döwründe açyk reňkleri alýar (gyzyl petekeliye çuluk, ikburunlar, ýüzegejeler, ýakaly çuluklar). Reňkinde jynsy tapawutlylygy (dimorfizm) gowşak, käte mäkiýany horazyna garanyň ulurak we has ýagty reňkde (ýüzegejelerde). Çuluklaryň köpüsi açyk giňişlikler we suw-batgalyk ýerleri bilen baglanýşyky, emma arasynda dagda we tokaýda ýaşaýanlary hem bolýar. Çulukşekillileriň hemmesi diýen ýaly uçup geçýän guşlar we uzak aralygy – Ýewraziýanyň we Amerikanyň polýar giňişliklerinden Günorta Afrika, Amerika, Awstraliýa çenli uçup geçýärler. Adatça ýerde höwürtegeýärler, arasynda agaçda höwürtegeýäni hem duşýar (goňurarka çuluk agaçlaryň üstündäki beýleki guşlaryň boş höwürtesini eýeleýär). Görnüşleriň köpüsi toplum bolup höwürtegeýär, galan wagty süri bolup gezyärler. Görnüşleriň köpüsünde jübütlik ömürleriniň ahyryna çenli saklanýar. Uly guşlar jüýjelerini ir aýyrýarlar we höwürtegeýän ýerlerinden ilkinji bolup uçup gidýärler. Reňkinde möwsümleýin üýtgeýjilik häsiýeti bolýar. Çuluklaryň köpüsi oňurgasyzlar, aýratyn-da, çuluklaryň käbirleri maýda oňurgalylar, ösümlikleriň baldajyklary we miweleri, çarlaklaryň bir bölegi balyklar bilen iýmitlenýär. Dünýa faunasında 300-den gowrak görnüş. Türkmenistanda 9 maşgala degişli bolan görnüşleriň 70-si düşýär.

Çakyryklar – Burhinidae – Авдотки

Ачык çöllük meýdanlarda, kenarýaka giňişliklerde gezyän we

у большинства видов компактное, стройное. Крылья длинные и узкие, за исключением чибисов. Оперение плотное, яркие тона в окраске проявляются преимущественно в брачный период (краснозобики, веретенники, плавунчики, турухтаны). Половой диморфизм выражен слабо, изредка самки крупнее самцов и ярче окрашены (плавунчики). Большинство видов куликов связано с открытыми пространствами и водно-болотными угодьями, но есть обитатели гор и лесов. Подавляющее большинство ржанкообразных перелетные и мигрируют на большие расстояния – от полярных областей Евразии и Америки до Южной Африки, Америки, Австралии. Гнездятся, как правило, на земле, есть исключения (черныш занимает пустые гнезда других птиц на деревьях). Многие гнездятся колониями, а вне гнездового периода держатся стаями. Большинство видов пары сохраняют всю жизнь. Взрослые рано оставляют птенцов и первыми покидают места гнездования. Наблюдается хорошо выраженная сезонная изменчивость в окраске. Большинство питаются беспозвоночными, особенно кулики, некоторые поедают мелких позвоночных, побеги растений и ягоды, а часть чайковых являются рыбоядными. В мировой фауне более 300 видов. В Туркменистане – 70 видов относящихся к 9 семействам.

Небольшое семейство птиц открытых пустынных ландшафтов,

beýleki suw-batgalyk ýerleriň töwereginde ýaşayan guşlar maşgalasy. Jemi 9, şolardan Türkmenistanda 1 görnüş gabat gelýär.

115. Çakyryk – *Burhinus oedicnemus* – Авдотка

Meýdan alamatlary: gysgalan ýognan çüňkli, uzyn aýakly, **uly sary gözli** bolup, kepderiden ulurak çuluk. Ýaşy ýeten horazlary we mäkiýany birmeňzeş reňkli. Arka tarapy çalymtyl-mele, çuparrak gara menekli. Garny agymtyl. Petekesiniň ortasy garamryl zolakly, böwürlerinde hem şonuň ýaly zolaklar, bolup olar has insiz. **Uçan wagty ganatlarynyň gara uçlary iki-ikiden ak tegmili. Ganatlarynyň gapdallaryndan kese geçýän ak we iki sany gara zolakly.** Aýaklary agymtyl, üç barmakly, çüňküniň düýbi sary, daýaw we uçagazy gara reňkli. Ýaşlarynyň ýelekleriniň gyralary inli ak gaýmaly, has çuparrak reňkli. Sesi ýiti we sokdurylan – “klii-ýurr-liii, týurrr-liii, týurrr-liii” ýygy-ýygydan gijesine eşidilýär. Horazlarynyň ganaty - 225-249, mäkiýanlaryňky – 230-245 mm, agramy - 450 g. golaý.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **uly sary gözleri bilen** beýleki çuluklaryň ählisinden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi endigan däl – Ýewropanyň günorta bölegi, Günorta Gazagystan, Demirgazyk Afrikanyň gyra çetki bölekleri, Ýakyn Gündogar, Kiçi, Alynky, Orta we Günorta Aziýa. Uçup geçende giňişleýin duşýar. Türkmenistanda – düzlük we dagöňi meýdanlarda duşýar. Arealynda höwürtleýän böleginiň günorta oblastlarynda, şeýle-de Afrikanyň günbatarynda we gündogarynda

придерживающихся побережий и других водно-болотных участков. Всего 9, из которых в Туркменистане встречается 1 вид.

Полевые признаки: крупнее голубя с коротким утолщенным клювом, на высоких ногах, **с большими желтыми глазами.** Взрослые самцы и самки окрашены сходно. Спинная сторона серовато-бурая, рыжеватая, с черными пестринами. Брюшко беловатое. На зобе черноватые срединные полосы, на боках тоже полосы, но более узкие. **В полете на черных концах крыльев – по два белых пятна.** Сбоку на крыльях поперечные белая и две черные полосы. Ноги светлые, трехпалые, клюв массивен – в основании желтого, а на конце черного цвета. Молодые более рыжеватые, с широкими белыми каймами на краях перьев. Голос – звонкое и протяжное «клии-юрр-лиии, тюррр-лиии, тюррр-лиии», часто слышен ночью. Крыло самцов – 225-249, самок – 230-245 мм, вес – около 450 г.

Сходства-отличия: от всех куликов хорошо **отличается большими желтыми глазами.**

Распространение: в гнездовой части ареала неравномерное – в южной половине Европы, Южном Казахстане, крайних районах Северной Африки, на Ближнем Востоке, в Малой, Передней, Средней и Южной Азии. На пролетах – шире. В Туркменистане – на равнинах и в предгорьях. Зимует в южных областях гнездовой части ареала, а также, местами, на западе и востоке

Arabystanyň çetinde gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtleýän guş. Ýazyna-martyň aýagynda we aprelde, güýzine – awgustyň soňunda noýabryň başynda uçup geçýär. Iňrik garalanda we gijesine gezmäge çykýar. Çöllük, kirşenli-şorlaşan ýerlerde we takyrlarda, seýregräk – berkän çägeliklerde we oazileriň çetlerinde saklanýar. Apreliň ortasyndan iýun aýunyň başyna çenli höwürtleýär. Gyrymsynyň golaýynda çukurjygyň düýbine sähelçe sypal düşelenje höwürtlege gurýar. Adatça 2, seýrek 3 sany sarymtyl-garamtyl menekli we nokatly ýumurtgalary goýýar. Höwürtleýän döwri jübüt bolup, güzüne-uly bolmadyk sürülerde gezýärler. Uly oňurgasyzlar (tomzaklar, göniganatlylar), gurçuklar we maýda süýrenijiler bilen iýmitlenýär.

Statusy: az öwrenilen, seýrek görnüş.

Çuluklar – *Charadriidae* – Ржанки

Serçeden garga çenli ölçeги guşlar maşgalasy. Aýaklarynyň, çüňkleriniň uzynlygy dürli görnüşlerde üýtgeýär. Gysgadan göni (kepderiňkä çalymdaş) çüňkleri uzynдан göni inçelmä çenli baryp, ýokarlygyna gaýşaklyga ýa-da aşaklygyna egmeklige çenli barylar. Ýaýrawy giň, dünýä faunasыnda 60 görnüş, şolaryň 15-si Türkmenistanda bolup, çuluklar, beziltikler we daş dörüjiler aşaky maşgalasynyň wekilleridir.

116. Kiçi kebez – *Charadrius dubius* – Малый зуек

Meýdan alamatlary: ölçeги serçeden biraz ulurak, maýda çuluk. Orta uzynlykdaky aýaklary ачык-goňur

Африки и побережьях Аравии.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весенний пролет – с конца марта и в апреле, осенний – с конца августа до начала ноября. Активен в сумерках и ночью. Придерживается в пустыне глинисто-солончаковых участков и такыров, реже – закрепленных песков и окраин оазисов. Гнездование – с середины апреля до начала июня. Гнезда в виде ямки под кустом, со слабой выстилкой. В кладке обычно 2, реже 3 желтоватых, с темными крапинами и точками яйца. В гнездовой период держатся парами, осенью – небольшими стайками. Питается крупными беспозвоночными (жуки, прямокрылые), червями и мелкими пресмыкающимися.

Статус: малоизученный, редкий вид.

Семейство птиц (кулики размерами от воробья до вороны), высота ног, длина и форма клювов варьируют. Клювы от коротких прямых (похожих на голубиные) до длинных тонких прямых или изогнутых кверху или книзу. Распространены широко, в мировой фауне 60, из которых в Туркменистане 15 видов – представители подсемейств ржанки, чибисы и камнешарки.

Полевые признаки: мелкий кулик, тело размером чуть крупнее воробья. Ноги средней длины свет-

reňkli. Çünki göni, gysga gara, aşaky çünkiniň düýbi sary. Uly guşlaryň tomusky ýelek örtüginde **kellesi kese zolakly**, gulagyny ýarýan we boýnunyň ýokarsyny gabaýan halka ýelekleri we **petekesi gara. Bokurdagy, boýnunyň ýüzi, böwürleri we bedeniniň aşagy – ak.** Ýaşlarynyň we ulularynyň gýşky ýelekleri tutuk reňkli. Gözüniň töweregindäki ýalaňaç deri sary halkany emele getirýär. Horazlarynyň ganaty - 105-120, mäkiýanlarynyňky – 102-122 mm, horazlarynyň agramy - 31-38, mäkiýanlarynyňky – 35-47 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **gözüniň töweregindäki halkanyň sarydygy** we ganatlarynda ak zolagyň yokdygy bilen demirgazyk kebezden, petekesinde birleşýän gara halkasy we aýaklarynyň reňki (açyk-goňur) bilen deňiz kebezinden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeýän ýerleri-Ýewropanyň hemme ýerleri diýen ýaly, demirgazyk welaýatlaryndan, çöllük giňişliginden we beýik daglaryndan başgalarynda, Hindi-Malaý arhipelagynyň adalarynda. Uçuş geçende giňişleýin duşýar. Türkmenistanda – Hazar deňziniň kenary we içki suwlarda. Afrikanyň orta zolagynda, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýada gýşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän we höwürtegeýän guş. Ýazyna-mart aýunyň soňundan maý aýunyň başynda, güýzine - awgustyň ortasyndan oktýabrda uçup geçýär. Apreliň aýaklaryna höwürteläp başlaýar. Kenarýakadaky, şeýle hem içki suwlardaky ýumşak we daşlyja ýerlerde, ýerde düýbüne düşeklige we töweregi daşjagazlar bilen gabalanja çukurjykda höwürte gurýar. 3-4 sany

ло-бурого цвета. Клюв прямой, короткий, черного цвета с желтым основанием подклювья. У взрослых птиц в летнем пере **поперечная полоска на голове**, кроющие уха и кольцо, охватывающее верх шеи и **зоб, черные. Горло, часть шеи, бока и низ тела – белые.** Молодые и взрослые в зимнем пере окрашены тусклее. Голая кожа вокруг глаз образует желтое кольцо. Крыло у самцов – 105-120, у самок – 102-122 мм, вес самцов – 31-38, самок – 35-47 г.

Сходства – отличия: от галстучника хорошо **отличается желтым кольцом вокруг глаз** и отсутствием белой полосы на крыльях, от морского зуйка – черным замкнутым кольцом на зобе и цветом лап (светло-бурые).

Распространение: область гнездования – почти вся Евразия, за исключением северных областей и обширных пустынь и высокогорий, острова Индо-Малайского архипелага. На пролете очень широко. В Туркменистане – побережье Каспийского моря и внутренние водоемы. Зимует в Экваториальной Африке, в Южной и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: пролетная и гнездящаяся птица. Весенний пролет – с конца марта до начала мая, осенний – с середины августа до октября. Начало гнездования с конца апреля. Гнездится как на песчаных и галечниковых участках побережья, так и на внутренних водоемах. Гнездо – простая ямка в грунте с выстилкой и окружающим валиком из камешков. В кладке 3-4 яйца желтовато-серо-зеленоватого

sarymytl-çalymytl-ýaşyl reňkligür bolmadyk goňur menekli ýumurtgalary goýýar. Köplenç, gaýtadan ýumurtga goýmaklary mümkin. Maý aýunyň ikinji ýarymynda jüýjeleri çykýar. Iýunda uçurym bolýarlar. Gaýtadan göýlan ýumurtgalardan iýun-iýulda jüýjeler çykýar. Mör-möjekler we beýleki maýda oňurgasyzlar bilen iýmitlenýär.

Statusy: uçup geçende adaty, Hazaryň käbir ýerlerinde köpsanly görnüş.

117. Demirgazyk kebezi – *Charadrius hiaticula* – Галстучник

Meýdan alamatlary: kiçi kebezden tokarrak uly bolmadyk çuluk. **Mämişisarymytl aýaklary** orta uzynlykda, **gysga gara çünkiniň düýbi mämişisarymytl reňkli.** Ýaşy ýeten guşlaryň horazlarynyň reňki mäkiýanlaryna meňzeş. Üstki tarapy goňurrak-çal, aşagy ak, petekesinde boýnuny gabaýan kese gara zolak. Ak maňlaýu aşagyndan we ýokarsyndan geçýän kese zolak bilen çäklenen. Böwürleri we aşak tarapy ak. Uçan wagtynda **ganatlaryndaky ak zolak** gowy görünüýär. Ýaşlary we ululary gýşky ýeleginde tutuk reňkli. Çünküniň düýbi tutuk goňurrak. Horazlarynyň ganaty - 122-137, mäkiýanlarynyňky – 123-137 mm, horazlarynyň agramy - 45-62, mäkiýanlarynyňky – 44-63 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çünküniň düýbüniň reňki, **gözüniň töwereginde sary “äýneginiň” yokdygy** we ganatlarynda ak zolagyň bardygy bilen kiçi kebezden we boýun halkasynyň bitişendigi (“boýun bagy”), aýaklarynyň mämişi-sarydygy bilen deňiz kebezinden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürte

цвета с негустым бурым крапом. Часто бывают повторные кладки. Пуховички со второй половины мая. Летными становятся в июне. При наличии повторных кладок птенцы – в июне-июле. Питается насекомыми и другими мелкими беспозвоночными.

Статус: обычный, на пролете местами на Каспии многочисленный вид.

Полевые признаки: небольшой кулик, крупнее малого зуйка. **Ноги** средней длины **оранжево-желтого цвета, клюв короткий черный, с оранжево-желтым основанием.** Взрослые самцы и самки окрашены одинаково. Верх буровато-серый, низ белый, на зобе поперечная черная полоса, охватывающая шею. Белый лоб ограничен черной полоской снизу и сверху. Бока и низ также белые. В полете хорошо видна **белая полоса на крыле.** Молодые и взрослые в зимнем пере окрашены тусклее, и основание клюва у них не яркое, буроватое. Крыло у самцов – 122-137, у самок – 123-137 мм, вес самцов – 45-62, самок – 44-63 г.

Сходства – отличия: от малого зуйка отличается цветом основания клюва, **отсутствием желтых «очков» вокруг глаз** и наличием белой полосы на крыле. От морского зуйка – замкнутым ошейником («галстуком»), оранжево-желтым цветом ног.

Распространение: гнездовая

geleýän bölegi – Baltika deňziniň kenary, Ýewraziýanyň we Amerikanyň tundrasy. Uçup geçende giňişleýin duşýar. Hazar deňziniň günortasynda, Ortaýer deňzinde, Arabystanda, Alynky Aziýada, Afrikada, Madagaskarda, Merkezi we Günorta Amerikanyň kenaryakalarynyň käbir ýerlerinde guşlaýar. Türkmenistanyň içkeri suw ýataklarynda we Hazar deňziniň kenarynda duşýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän we bölekleýin guşlaýan guş. Guşlan guşlaryň uçup gitmegi we ýazky uçup geçmegi mart-aprel aýlarynda, güýzkisi - awgustyň aýagyndan - noýabr aralykda. Maýda oňurgasyzlar – leňneçler, gurçuklar, balykgulaklar bilen ýymitlenýär.

Statusy: bizde ýeterlik öwrenilmedik, seýrek guş.

118. Deňiz kebezi – *Charadrius alexandrinus* – Морской зуйк

Meýdan alamatlary: serçeden ulurak, uzyn bolmadyk gara aýakly we gara gysga çüňkli kiçiräk çuluk. Tomsuna ýaşı ýeten guşlaryň arkasy çäge sypat-goňur. Guýrugynyň üsti we guýrugy garamtyl reňkli. **Depesiniň yzky bölegi we ýeňsesi çuparrak, depesiniň öňki tarapy, we çüňkden gözüne geçýän zolak gara.** Bedeniniň aşak tarapy ak. Petekesiniň gapdallary gara menekli. Ýaş guşlaryň gara reňki guşyna goňur bilen çalyşýar. Horazlarynyň ganaty - 103-113, mäkiýanlarynyňky – 101-113 mm, agramy 35-47 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: demirgazyk we kiçi kebezlerden diňe petekesiniň gapdallarynda gara tegmiliň bardygy, tutuşlaýyn halka emele getirmändigi (boýun bag) bilen tapawutlanýar.

часть ареала – побережья Балтийского моря, тундры Евразии и Америки. На пролете встречается широко. Зимует на юге Каспия, в Средиземноморье, Аравии, Передней Азии, в Африке, на Мадагаскаре, местами по побережьям Центральной и Южной Америки. В Туркменистане – на внутренних водоемах и Каспийском побережье.

Образ жизни: пролетная птица, отдельные особи зимуют. Весенний отлет и пролет в марте-апреле, осенний пролет с конца августа до ноября. Питается мелкими беспозвоночными – рачками, червями, моллюсками.

Статус: недостаточно изученный у нас, редкий вид.

Полевые признаки: небольшой кулик, телом крупнее воробья, на относительно невысоких ногах черного цвета и коротким черным клювом. У взрослых птиц летом спина песочно-бурая. Надхвостье и хвост темнее. **Задняя часть темени и затылок рыжеватые, передняя часть темени и полоса клюва через глаз черные.** Низ тела белый. По бокам зоба черные пятна. Зимой и у молодых птиц черный цвет заменен бурым. Крыло самцов – 103-113, самок – 101-113 мм, вес – 35-47 г.

Сходства – отличия: от галстучника и малого зуйка отличается **наличием только черных пятен по бокам зоба**, а не сплошным кольцом («галстуком»).

Распространение: в гнездовой

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän döwüründe – Ýewraziýanyň, Amerikanyň we Afrikanyň deňizleriniň kenarlarynda we ýyly guşaklygyň uly suw ýataklarynda, uçup geçende bolsa, has giňişleýin gabat gelyär. Türkmenistanda - Hazar deňziniň kenarynda we içki suw ýataklarynda duşýar. Afrikanyň demirgazyk böleginde, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýada we Merkezi Amerikada guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, höwürtegeleýän we bölekleýin guşlaýan guş. Ýazyna-mart-aprelde uçup geçýär. Apreliň soňunda-maý aýynda köpelýär. Aýratyn jübüt ýa-da kiçiräk topar bolup höwürtegeleýär. Höwürtegesi oýjagaz ýa-da çukurjuk, düý-büne hiç zat düşelmedik, gyra erňek-leri daşjagazly. 3 sany kirliräk-sary ýa-da çalymtyl-ýaşyl reňkli maýdaja garamtyl menekli ýumurtgalary goýýar. Maý aýynyň ikinji ýarymynda jüyjeleri çykýar. Höwürtegeleýän döwri uzaga çekýär, gaýtadan ýumurtga goýýan mahaly hem bolýar we dürli ýaşdaky jüyjeleri awgust aýyna çenli gabat gelyär. Uçup gidişi we güzüne uçup geçmegi awgust aýynyň soňundan noýabra çenli dowam edýär. Mör-möjekler, leňneçler, balykgulaklar we beýleki maýda oňurgasyzlar bilen ýymitlenýär.

Statusy: adaty, Hazar deňziniň käbir ýerlerinde köpsanly görnüş.

119. Ýogynçüňk kebez – *Charadrius leschenaultii* – Толстоклювый зуйк

Meýdan alamatlary: sar ölçeginde bolan, gara reňkli uzyn danaw çüňkli uly çuluk. Tomsuna ýaşı ýeten guşlaryň bedeniniň ýokarky bölegi tüsse reňkli-goňur. Çüňkünden gözüne tarap gara zolak gidýär. **Pete-kesi we döşüniň gapdallary çupar**

период – побережья морей и крупных водоемов в теплых широтах Евразии, Америки и Африки, а во время миграций встречается гораздо шире. В Туркменистане – Каспийское побережье и другие водоемы. Зимуют в северной половине Африки, в Южной и Юго-восточной Азии и Центральной Америке.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся и частично зимующая птица. Весенний пролет в марте-апреле. Размножение с конца апреля-начала мая. Гнездится одиночными парами или небольшими колониями на земле. Гнездо – небольшое углубление или ямка в грунте, обычно без подстилки, иногда с камешками по краям. Нормальная кладка из 3 яиц землянисто-желтого или серо-зеленого цвета с мелким темным крапом. Пуховички появляются со второй половины мая. В целом период гнездования растянут, бывают повторные кладки, и поэтому разновозрастные птенцы встречаются до августа. Отлет и осенний пролет – с конца августа до ноября. Питается насекомыми, рачками, моллюсками и другими мелкими беспозвоночными.

Статус: обычный, местами на Каспии многочисленный вид.

Полевые признаки: крупный кулик, наиболее крупный из зуйков, размером тела со скворца, и удлиненным массивным клювом черного цвета. У взрослых птиц летом верхняя часть тела дымчато-бурая. От клюва к глазу идет темная

reňkli. Garyn tarapy ak. Aýaklary goňur. Ýaş guşlaryň gýşky ýelek örtügi has tutuk reňkli, aýaklary kirlirägede-sarymtyl reňkli.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: öleşleriniň uludygy we çüňküniň uzynlygy (19 mm ýokary) bilen mongol kebezinden we döşünde kese gara zolagyň ýokdygy bilen hazar kebezinden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän ýerleri – Merkezi, Orta, Alynky we Kiçi Aziýanyň käbir ýerleri. Migrasiýa döwründe giňişleýin duşýar. Türkmenistada-dürli ýerlerinde, köplenç Hazar deňziniň kenarynda, Günbatar Türkmenistanyň düzlüklerinde we dag eteklerinde duşýar. Gyzyl deňziň, Gündogar Afrikanyň we Madagaskaryň, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýanyň - Awstraliýanyň kenäkalarynda gýşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän höwürtleýän we gýşlaýan guş. Ýazyna-mart-aprelde, güýzine - awgust-noýabrda uçup geçýär. Şorlaşanrak, daşlyrak we takyryrak ýerlerde saklanýar. Köpelyän döwri uzaga çekýär: aprel-maý aýunyň başydan, iýun aýunyň ortasyna – iýulyň başyna çenli. Gurak ýyllarda köpelyän wagty gysgalýar. Höwürtleýiş oýjagaz ýa-da düýbi düşeksiz çukurjuk. 3 sany çypar reňkli, başgalara göre uly garamtyl menekli, köplenç süýri ýumurtgalary goýýar. Jüýjeleri aprel aýunyň soňunda – maý aýynda, uçurym bolanlary – maý aýunyň soňunda-iýunda, duşýar. Dürli möjekler bilen iýmitleýär.

Statusy: az sanyly, käbir ýerlerde uçup geçende adaty görnüş.

полоска. **Рыжий цвет на зобе и боках груди.** Брюшко белое. Ноги бурые. В зимнем перье у взрослых и молодых окраска более тусклая, ноги грязно-желтого цвета.

Сходства-отличия: от монгольского зуйка отличается большими размерами и длиной клюва (больше 19 мм), от каспийского зуйка – отсутствием поперечной черной полоски на груди.

Распространение: область гнездования – в Центральной, Средней, местами Передней и Малой Азии. В периоды миграций – шире. В Туркменистане – в разных частях, но больше на Каспийском побережье, равнинах и предгорьях Западного Туркменистана. Зимует по побережьям Красного моря, Восточной Африки и Мадагаскара, Южной и Юго-Восточной Азии и Австралии.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся и зимующая птица. Весенний пролет в марте-апреле, осенний – августе-ноябре. Тяготеет к солончаковым, щебнистым и глинистым местообитаниям. Период размножения растянут с апреля-начала мая до середины июня-начала июля. В засушливые годы период размножения короче. Гнездо в виде углубления или ямки без подстилки. Нормальная кладка из 3 яиц рыжего цвета с довольно крупными темными пятнами, часто имеющими вытянутую форму. Пуховички с конца апреля – в мае, летные в конце мая-июне. Питается, в основном, различными насекомыми.

Статус: немногочисленный, местами на пролете обычный вид.

120. Hazar kebezi – *Charadrius asiaticus* – Каспийский зук

Meýdan alamatlary: sar möçberindäki uzyn aýakly uly çuluk. Çüňki gara, aýaklary ýaşylymtyl-goňur. Tom-suna ýaşy ýeten guşlaryň arka tarapy çäge reňkli-goňur, garyn tarapy ak. **Petekesiniň ortasyndan inli, aşagy gara jähekli çypar zolak gidýär, ol mäkiýanynda goňur reňkli. Maňlaýy we gözüniň üstündäki inli zolak ak.** Gýşky ýelek örtüginde ýaşy ýeten we ýaş guşlar mäkiýanyna çalyndaş, ýöne reňkleri has tutuk. Horazlarynyň ganaty - 137-159, mäkiýanlaryňky – 136-149 mm, agramy - 85-90 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: kellesinde gara reňkiň ýokdygy, aýaklarynyň has uzynlygy we petekesiniň aşaky böleginiň gara ýa-da goňur zolaklydygy bilen ýogunçüňk we mongol kebezlerinden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän Hazar deňziniň ýakasy, Gyrgyzstan, Orta we bölekleýin Alynky Aziýa. Türkmenistanda dürli ýerlerde duş gelmegi mümkin, emma deňiz ýakasyna we suw ýataklaryna tarap çekilýär. Günorta we Günorta-Gündogar Afrikada gýşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän we höwürtleýän guş. Ýazyna-aprel-maý aýynda, güýzine - awgustyň aýagyndan noýabryň başyna çenli uçup geçýär. Köpelyän döwri uzaga çekýär: aprel aýunyň soňundan iýul aralykda. Höwürtleýiş ýerde, düýbüne ösümlik sypallary we daşjagazlar düşelen oýjagaz. 3 sany çalymtyl-sary reňkli, töwerek bilen oňat utgaşýan iri gara-goňur, köpsanly menekli ýumurtgalary goýýar. Maý aýunyň ikinji ýarymynda-iýunyň başynda jüýjeleri çykýar. Jüýjeleri iýul aýynda-

Полевые признаки: довольно крупный – телом со скворца, длинноногий кулик. Клюв черный, ноги зеленовато-бурые. У взрослого самца летом спинная сторона песочно-бурая, брюшная – белая. **Поперек зоба идет широкая рыжая полоса, окаймленная снизу черным, у самки она бурая.** Лоб и широкая полоса над глазом белые. В зимнем перье взрослые и молодые похожи на самок, но окрашены более тускло. Осторожная молчаливая птица. Крыло самцов – 137-159, самок – 136-149 мм, вес – 85-90 г.

Сходства – отличия: от толстоклювого и монгольского зуйков отличается отсутствием черного цвета на голове, более длинными ногами и черной или бурой поперечной полоской на нижней части зоба.

Распространение: на гнездовье в Прикаспии, Казахстане, Средней и частично Передней Азии. В Туркменистане может встречаться в разных местах, но тяготеет к морскому побережью и другим водоемам. Зимует в Южной и Восточной Африке.

Образ жизни: пролетная и гнездящаяся птица. Весенний пролет в апреле-начале мая, осенний – с конца августа и до ноября. Период размножения растянут с конца апреля по июль. Гнездо – небольшая ямка в земле со скудной выстилкой из стеблей и камешков. Нормальная кладка из 3 яиц серо-желтого цвета с многочисленными крупными черно-бурыми пятнами, хорошо маскирующими кладку. Пуховички во второй половине мая-начале июня. Летными становятся в июле-начале

awgustyň başynda uçurym bolýar. Mör-möjekler - tomzaklar we çekirtgeler bilen ýymitlenýär.

Statusy: az öwrenilen, seýrek görnüş.

121. Bellik: Türkmenistana, şol sanda Hazar deňzine, **mongol kebeziniň - Charadrius mongolus** kâte uçup gelmegi mümkin, tötänden duşýar, ol kellesindäki gara nagyşlary bilen hazar kebezden we ölçegleriniň kiçidigi we çüňküniň (19 mm gysga) gysgalygy bilen ýogunçüňk kebezden tapawutlanýar.

122. Şygyrdawuk çuluk – Eudromias morinellus – Хрустан

Meýdan alamatlary: bedeni serçeden gabarak, **sary reňkli, gysga aýakly** we gysga gara çüňkli kiçiräk çuluk. Tomusky ýelek örtüginde **horazynyň kellesiniň üsti gara**, gözüniň ýokarsyndaky zolak we bokurdagy ak. Arkasy we döşi gögümtilçal. Petekesi gara jähekli, tüsse reňkgoňur. **Garny oň tarapyndan ak zolak bilen çäklendirilen çypar**, garnynyň **yzky bölegi garamtylgoňur ýokundyly**. Guýrugynyň aşagy çyparak öwüşginli ak. Mäkiýany tomsuna horazyndan has açyk reňkli. **Gyşky ýeleginde** ululary tutuk reňkli, **döşünden keseligine geçýän ak zolak anyk** saýgartmaýar, garny agymtyl. Ýaşlarynyň arkasyndaky çypar ýelekleri garamtyl goňur, döşi we böwürleri çypar, köplenç döşünde garamtyl menek bolýar. Horazlarynyň ganaty - 137-155, mäkiýanlarynyňky – 142-153 mm, horazlarynyň agramy 100-120, mäkiýanlarynyňky – 115-145 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: beý-

августа. Питается, в основном, насекомыми (жуками) и саранчой.

Статус: малоизученный редкий вид.

121. Примечание: В Туркменистан, в частности на Каспий, может залетать и спорадически встречается **монгольский зук – Charadrius mongolus**, который от каспийского зуйка отличается черным рисунком на голове, от толстоклювого зуйка – меньшими размерами и клювом (короче 19 мм).

Полевые признаки: не крупный кулик, телом чуть больше воробья с короткими ногами **желтого цвета и коротким черным клювом**. В летнем перье **у самцов верх головы черный**, полоса над глазом и горло белые. Спина и грудь сизо-серые. Зоб дымчато-бурый. **Брюхо рыжее, ограниченное спереди белой полосой, задняя часть брюха с черновато-бурым налетом**. Подхвостье белое с рыжеватым налетом. Самки летом окрашены ярче самцов. **В зимнем перье взрослые окрашены более тускло, поперек груди неясная белая полоса**, брюшко белесое. У молодых птиц спина черновато-бурая с рыжеватыми каймами на перьях, грудь и бока рыжие, часто на груди бывают темные пятна. Крыло у самцов – 137-155, у самок – 142-153 мм, вес самцов – 100-120, самок – 115-145 г.

Сходства – отличия: характерная окраска хорошо отличает хрус-

тана от других куликов, сходных видов нет.

Распространение: гнездовые части ареала в Евразии и охватывают на севере возвышенные сухие тундры и каменистые тундры в альпийском поясе горных областей. На пролете встречается намного шире. В Туркменистане встречается на Каспийском побережье, возможно и на внутренних водоемах. Зимует на крайнем севере Африки, Ближнем Востоке, в Месопотамии и, не исключено, на южном Каспии.

Образ жизни: пролетный вид, придерживается морских и побережий других водно-болотных местообитаний, питается, преимущественно, насекомыми (жуками) и их личинками, моллюсками и червями.

Статус: сеýrek guş.

123. Altynsow çuluk – Pluvialis apricaria – Золотистая ржанка

Meýdan alamatlary: üç barmakly uzyn aýaklary gara reňkli we gara göni çüňkli, gumry ölçegindäki uly çuluk. Tomus möwsümünde horazlary mäkiýanlayna meňzeş reňkli. **Üstki tarapy garamtyl kümüşleşsarymtyl menekli**. Döşi we aşagy tarapy ak zolak jähekli gara, ol peteke tarapynda has inli. **Maňlaýy we gaşlary ak**. Ganatynyň aşagy hem ak. Guýrugy garamtyl kese geçýän ýagty zolakly. Güýz-gyş döwründe bizde bokurdagy we alkymy agymtyl tutuk reňkleri gabat gelýär. **Boýny we petekesi goňurrak sarymtyl menekli**. Garny agymtylrak goňur ýada kümüşleş menekli. Saýraýşy “kriukriu”, yöne, adatça, uçan mahaly sesiz. Horazlarynyň ganaty - 175-190,

Полевые признаки: крупный кулик, тело размером с горлицу, на довольно высоких трехпалых ногах черного цвета и прямым темным клювом. Самцы и самки в летнем сезоне окрашены сходно. **Верх темный с золотисто-желтыми пестринами**. Грудь и нижняя сторона – черные, окаймлены белой полосой, наиболее широкой по стороне зоба. **Лоб и бровь белые**. Испол крыла также белый. Хвост темный с поперечными светлыми полосками. В осенне-зимнее время, когда встречаются у нас, окрашены тусклее, горло и подбородок беловатые. **Шея и зоб буроватые с желтыми пятнами**. Брюшко белесое с бурыми или золотистыми

mäkiýanlarynyňky – 173-192 mm, agramy 200-210 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: üstki tarapynyň kümüşleç-sary-aladygy we **golyk ýelekleriniň ak reňklidigi** bilen tules çulukdan we ganatларыnyň aşaky tarapynyň akdygy, uçларыnyň sähelçe goňurdygy bilen goňurganat çulukdan oňat tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän döwründe - Ýewraziýanyň demirgazyk-günbatар welaýatларыnyň tundra we tokaýly tundarasы. Uçup geçende giň ýaýrawly. Türkmenistada Hazar deňziniň kenarýakasynda we içki suw ýataklarynda duşýar. Günbatар Ýewropada, Ortaýer deňzinde, käte Hazar deňziniň günortasynda guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän guş. Ýazyna-martyň soňunda- maýda, güýzüne-sentyabr-oktyabrda uçup geçýär. Kiçiräk süri bolup, şeýle-de ýekelikde duşmagy mümkin.

Statusy: gowşak öwrenilen, seýrek görnüş.

124. Bellik: Hazar deňzinde we içki suw ýataklarynda tötänden goňurganat çuluk - *Pluvialis fulva* duşmagy mümkin. Ol tundra zolagynda höwürtegeleýär, bizde tötänden uçup geçýän seýrek görnüş hasaplanýar. Ol altynsow çuluga örän çalymdaş, emma maýda, jokjokjy ölçeğinde we has uzyn aýakly. **Goltuk ýelekleriniň түsse reňkli-goňurdygy, şeýle-de arkasynyň we guýruk üstüniň öçүgsidigi** bilen tulesden we altynsow çulukdan tapawutlanýar.

пятнами. Голос – «криу-криу», но на пролете обычно молчалива. Крыло самцов – 175-190, самок – 173-192 мм, вес – 200-210 г.

Сходства – отличия: от тулеса хорошо отличается золотисто-желто-пестрым верхом и **белым цветом подмышечных перьев**. От бурокрылой ржанки также белой нижней поверхностью крыла, чуть буроватой лишь к его концу.

Распространение: в гнездовой период – тундра и лесотундра северо-западных областей Евразии. На пролетах – шире. В Туркменистане – на Каспийском побережье и внутренних водоемах. Зимует в Западной Европе, Средиземноморье, изредка на юге Каспия.

Образ жизни: пролетная птица. Весенний пролет – с конца марта и в мае, осенний – в сентябре-октябре. Может встречаться как в больших стаях, так и одиночно.

Статус: редкий, слабо изученный вид.

124. Примечание: на Каспии и внутренних водоемах может случайно встретиться азиатская или бурокрылая ржанка - *Pluvialis fulva*. Она гнездится в зоне тундр, у нас считается очень редким пролетным видом. Очень похожа на золотистую ржанку, но мельче, размером с дрозда, и более длинными ногами. От тулеса и золотистой ржанки отличает **дымчато-бурый цвет подмышечных перьев**, а также, что **хвост и надхвостье не светлее спины**.

125. Tules çulugy – *Pluvialis squatarola* – Тулес

Meýdan alamatlary: gumrudan uly ölçeqli uly çuluk. Uly guşlaryň tomus döwri kellesiniň gapdallary, bokurdagy, petekesi we garnynyň öňki bölegi gara. Depesi, garnynyň yzky bölegi we guýrugynyň asty ak. Üstki tarapy kese geçýän ak bellikli gara. Ganatlary garamtyl, ganatларыnyň aşaky örtüji ýelekleri agymtylrak, **goltuk ýelekleri gara**. Guýruk ýelekleri ak we gara kese geçýän zolakly, olaryň gyralaryndakylar ak diýen ýaly. Çünki we aýaklary çal ýa-da gara (yzky barmagy bilen). Mäkiýany horazyndan tutuk reňkli, bedeniniň aşaky bölegi ak gatysykly. Ýaşy ýeten guşlar gyşky ýelek örtүгінде (haçan-da bizde duşýanларында) ýaş guşlar bilen birmeñzeş reňkli – **üsti garamtyl-goňur, maňlaýy, kellesiniň gapdallary we bedeniniň aşaky tarapy agymtyl, bölekleýin çalymtыл-sary we goňur bellikli**. Sesi “týulii-týulii” mylaýym sykylyk. Horazларыnyň ganaty - 188-203, mäkiýanyňky – 187-202 mm, agramy - 170-224 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: kümüşleç-sary menekleriň ýokdugy, uçan wagty ganatynyň üstüden uzaboýuna geçýän ak zolagyň bardygy, şeýle-de **goltugasty ýelekleriniň garydygy** we yzky barmagyныň juda ujypsyzdygy bilen goňurganat çuluklardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän döwründe - Ýewraziýanyň we Demirgazyk Amerikanyň tundra zolagy. Uçup geçişi giň. Günorta-Günbatар Ýewropanyň, Afrikanyň, Arabystan y/a, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýanyň, Awstraliýanyň, Merkezi we Günorta Amerikanyň

Полевые признаки: крупный кулик, тело размером больше горлицы. У взрослых **в летнее время бока головы, горло, зоб и передняя часть брюшка – черные**. Темя, задняя часть брюха и подхвостье – белые. Верхняя сторона черная, с поперечными белыми отметинами. Крылья темные, нижние кроющие крыла белесые, **подмышечные – черные**. Хвостовые – с белыми и черными поперечными полосками, крайние из которых – почти белые. Клюв и ноги серые или черные (с задним пальцем). Самки окрашены тусклее самцов, нижняя часть тела с примесью белого. Взрослые в осенне-зимнем оперении (когда встречаются у нас) и молодые окрашены сходно – **с темно-бурым верхом, белесыми лбом, боками головы и нижней части тела, с частыми серовато-желтыми и буроватыми отметинами**. Голос – мягкий свист «тюлии-тюлии». Крыло самцов 188-203, самок – 187-202 мм, вес – 170-224 г.

Сходства – отличия: от ржанок хорошо отличается отсутствием золотисто-желтых пестрин, отчетливой белой полоской сверху вдоль крыла, хорошо видимой в полете, а также **черными подмышечными перьями** и наличием крохотного заднего пальца.

Распространение: в гнездовой период – тундры Евразии и Северной Америки. На пролете – гораздо шире. Зимует на побережьях Юго-Западной Европы, Африки, Аравии, Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии, Центральной и

kenarýakalarynda gyslaýar. Türkmenistada – içki suw ýataklarda we Hazar deňziniň kenarynda duşýar.

Ýaşayşy: uçup-geçýän we gyslaýan guş. Ýazyna-martda-maýyň başynda, giçkileri maýyň aýagynda, güýzine-awgustyň aýagyndan noýabra çenli uçup geçýär. Hazar deňzinde gyslaýanlary käte dekabr-fewralda gabat gelyär. Balykgulaklar, gurçuklar, mör-möjekler we maýda balyklar bilen seyrek iýmitleňýär.

Statusy: gowşak öwrenilen, az sanly görnüş.

126. Tekejyllyk – *Vanellus leucurus* – Белохвостая пигалица

Meýdan alamatlary: gögerçin ölçeginde bolan, **sary reňkli uzyn aýakly**, gara, gysga çüňkli uly çuluk. Horazy mäkiýanyna meňzeş reňkli. Bedeniniň üstki bölegi metal ýalpyldyly tüsse sypat-goňur. Maňlaýy, gaşy we kellesiniň gapdallary goňurrak, bokurdagy ak. Petekesi we depesi goňurrak, ýöne ýalpyldysyz. Döşi külreňk-çal, garny çuparrak-ak. **Guýrugy we ganatlarynyň aşagy ak, uçlary gara.** Ýaşlary tutuk reňkli, ýelekleri öwüşgünsiz, maňlaýy we kellesiniň gapdallary ak reňkli. Sesi “çetri-çetri-cetri” batly. Horazlarynyň ganaty - 167-180, mäkiýanlarynyňky – 167-177 mm, agramy - 200 g çenli.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: aýaklarynyň **reňkiniň açyk sarydygy**, ganatlarynyň “aýnajakly” **akdygy** we guýrugynyň **akdygy** bilen beýleki çuluklardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän ýerleri gyradeň däl – Kiçi, Alynky we Orta Aziýa, Günorta Gazagystan, Hazar deňziniň kenary. Uçup geçende giň ýaýran. Türkmen-

Южной Америки. В Туркменистане – на внутренних водоемах и Каспийском побережье.

Образ жизни: пролетная и зимующая птица. Весенний пролет – в марте-начале мая, позднепролетные – до конца мая. Осенью – с конца августа до ноября. Зимующие на Каспии изредка встречаются в декабре-феврале. Питается моллюсками, червями, насекомыми, иногда мелкой рыбой.

Статус: немногочисленный, в отдельные года обычный вид.

Полевые признаки: крупный кулик, тело размером с голубя **на высоких ногах желтого цвета**, с удлинённым черным клювом. Самцы и самки окрашены сходно. Верхняя часть тела дымчато-бурая с металлическим блеском. Лоб, брови и бока головы буроватые, горло почти белое. Зоб и темя буроватые, но без блеска. Грудь пепельно-серая, брюшко рыжеватое-белое. **Хвост и испод крыла белые, концы крыльев черные.** Молодые окрашены тусклее, без блеска в оперении, с белым цветом на лбу и боках головы. Голос громкий – «четыре-четыре-четыре». Крыло самцов – 167-180, самок – 167-177 мм, вес – до 200 г.

Сходства – отличия: от других куликов хорошо отличается **ярким желтым** цветом ног, **белыми** «зеркальцами» на крыльях и **белым** хвостом.

Распространение: в гнездовой области ареала неравномерное – Малая, Передняя и Средняя Азия, Южный Казахстан, Прикаспий. На пролете – шире. В Туркменистане –

istanda – içki suw ýataklarynda we Hazar deňziniň kenarynda duşýar. Müsürde we Demirgazyk-Günbatar Hindistan ý/a, guş amatly gelende, Günorta Hazarda gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geýän-höwürtleýän we käte gyslaýan guş. Derýalaryň jülgelerinde we suw ýataklarynyň kenarlarynda saklanýar. Ýazyna-apreliň ortasyndan-maý aralykda we güýzkisi – awgustyň aýagyndan noýabra çenli uçup geçýär. Apreliň ortasyndan we maýda köpelyär. Suwuň golaýynda kiçiräk topar bolup höwürtleýär. Höwürtgese gury otlaryň sypallarynyň üýsmegine çalyň edýär. Adatça, 2-4 sany garamtyl meneklie we nokatly sarymtly-çuparrak reňkli ýumurtgalary goýýar. Maýyň aýagynda, iýunda-iýulyň ikinji ýarymynda jüýjeleri çykýar. Mörmöjekler bilen iýmitleňýär.

Statusy: az sanly görnüş.

127. Gara depeli tekejyllyk – *Vanellus gregarius* – Кречетка

Meýdan alamatlary: tekejyllykdan ulurak ölçegli. Tomsuna ýaşy ýeten guşlar birmeňzeş reňkli. **Kellesiniň üsti we gözünden geçýän zolak, şeýle-de çüňki we ýaklary gara.** Arkasy we döşi açykgoňurrak-çal. Maňlaýy, gözünüň aşagyndaky we ýokarsyndaky zolak ak. Garnynyň öňki bölegi gara, yzkysy – çupar, guýrugynyň aşagy ak. **Uçan ýagdaýynda ak guýrugynyň uçlary gara tegmilli.** Gyşyna ýaşy ýeten we ýaş guşlaryň ýelek örtügi tutuk reňkli, depesi goňur, garny kirli-ak. Sesi gyrylyjyk “kritç-itç-itç”, sesi adaty, uçan mahaly çykaryar. Horazlarynyň ganaty - 197-208, mäkiýanlarynyňky – 192-204 mm, agramy - 180-195 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: garamtyl (tomsuna gara) “telpeji-

на внутренних водоемах и Каспийском побережье. Зимует в Египте и Северо-Западном Индостане, в благоприятные зимы – на Южном Каспии.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся и изредка зимующая птица. Придерживается речных долин и берегов различных водоемов. Весенний пролет – с конца марта и в мае, осенний – с конца августа до ноября. Размножение – с середины апреля, в мае. Гнездится небольшими колониями вблизи воды. Гнездо в виде кучки сухой травы. В кладке обычно 2-4 яйца желтовато-рыжего цвета с темными пятнами и крапинками. Пуховички – с конца мая, летные – во второй половине июня и в июле. Питается насекомыми.

Статус: немногочисленный вид.

Полевые признаки: размером крупнее белохвостой пигалицы. Взрослые птицы летом окрашены сходно. **Верх головы и полоса через глаз, а также клюв и ноги – черные.** Спина и грудь светло-буровато-серые. Лоб, полосы над и под глазами белые. Передняя часть брюшка черная, задняя – рыжая, подхвостье – белое. **В полете видно черное пятно на конце белого хвоста.** Взрослые в зимнем перье и молодые окрашены тусклее, темя бурое, брюхо грязно-белое. Голос – скрипучее «критч-итч-итч», обычно издает в полете. Крыло – самцов 197-208, самок – 192-204 мм, вес – 180-195 г.

Сходства – отличия: от других куликов отличается темной (летом

gi", gaşynyň akdygy, aýaklarynyň we garnynyň öňki böleginiň garydygy bilen beýleki çuluklardan tapawutlanýar.

Ýaýran yerleri: Demirgazyk Gagystanda we Russiýanyň serhet-yakasynda höwür-geleýär. Uçup geçende Kawkaz öňünde, Orta Aziýada duşýar. Demirgazyk-Gündogar Afrikada, Alynky Aziýanyň käbir ýerlerinde, Päkistanda we Hindistanyň demirgazyk-günbatarynda gyslaýar. Türkmenistada düzlük giňliklerinde duşmagy mümkin, emma zygyderli däl we juda seýrek.

Ýaşayşy: bizde uçup geçýän we gonup, uçup gezýän guş. Ýazyna-mart-aprelde uçup geçýär, gonup uçup gezýänleri käte iýul-awgustda gabat gelýär, güýzine-sentýabr-oktýabrda uçup geçýär. Gündizine işjeň ýaşayşda. Mör-möjekler we olaryň içinkalary bilen iýmitlenýär.

Statusy: az öwrenilen, ýitip gitmek howpy abanýan görnüş. MSOP-nyň Gyzyl sahypasyna we Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen.

128. Bezegli bezziltik – *Vanellus indicus* – Украшенный чибис

Meýdan alamatlary: kepderiden uly ölçegli, sary uzyn aýakly we **gözünüň öňünde gyzyl reňkli ösüntgisi (çykyntgyly)** bolan uly çuluk. **Çüňkiniň düýbi we gözünüň töwergindäki halka hem gyzyl.** Ýelek örtügininiň reňkli garşylykly. Arkasy çägesow-goňur ýaşylymytl metal öwüşginli, ganatlarynyň üstki tarapy mise meňzeş-gyzyl ýalpyldyly. Maňlaýy, kellesiniň üsti we boýny, petekesi we garnynyň ön tarapy gara, aşagyň galan ýeri ak. Ganatlary ak bellikli gara. Guýrugy ak, uşan mahaly kese geçen gara zolaklar

черной) «шапочкой», белой бровью, черными ногами и передней частью брюшка.

Распространение: гнездится в Северном Казахстане и приграничных районах России. На пролете – в Предкавказье, Средней Азии. Зимует в Северо-Восточной Африке, местами в Передней Азии, Пакистане и на северо-западе Индии. В Туркменистане может быть встречен на равнинах, но спорадично.

Образ жизни: у нас пролетная птица. Весенний пролет – в марте, быстротечен, в отдельные годы могут попадаться летующие особи. В течении сентября-октября пролетные стаи задерживаются, особенно на массиве Таллымерджен. Питается различными насекомыми и их личинками.

Статус: малоизученный вид, находящийся под угрозой исчезновения. Внесен в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана.

Полевые признаки: крупный кулик, тело размером больше голубя, на высоких желтых ногах и **с характерным наростом (лопастью) красного цвета впереди глаз. Основание клюва и кольцо вокруг глаз также красные.** Оперение контрастное. Спина песчано-бурая с зеленоватым металлическим, а крылья сверху – с медно-красным блеском. Лоб, верх головы и шея, зоб и передняя часть брюшка черные, остальной низ белый. Крылья черные с белой отметиной. Хвост белый, в полете с хорошо замет-

anyk görünüär. Ýaşlarynda gözünüň öňündäki çykyntgy gowşak ösen. Sesi gyrylyjyk "kree-krik" ýa-da "kree-koo-it". Horazylarynyň ganaty - 214-236, mäkiýanlarynyňky - 217-231 mm, agramy - 300 g çenli.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: gözünüň öňünde **gyzyl ösüntgisiniň** (süýri ösüntgi) bardygy bilen beýleki çuluklardan oňat tapawutlanýar.

Ýaýran yerleri: Alynky Aziýanyň günorta-günbatary etraplary, Hindistan we Hindihytaý, emma, ýazda demirgazyga, Günorta-Gündogar Türkmenistana çenli. Bizde Tejen, Murgar we Guşgy jülgelerinde, seýregräk, Amderýada we günorta Hazara çenli.

Ýaşayşy: höwür-geleýän guş. Ýazyna-martyň ortasyndan - aprelda, güýzine - awgustda uçup geçýär. Apreliň aýagynda maýyň başynda ýerde çukurjykda höwür-geleýär, 3-4 sany ýumurtga goýýar. Mör-möjekler, gurçuklar we balykgulaklar bilen iýmitlenýär.

Statusy: arealynyň çetinde az öwrenilen seýrek görnüş.

129. Bezziltik – *Vanellus vanellus* – Чибис

Meýdan alamatlary: kiçiräk garga ölçeginde, **ganatlary inli, çüňki we aýaklary gara, kellesinde inçejik hü-pügi bolan** uly çuluk. Tomsuna horazlary we mäkiýanlary bir meňzeş reňkli. Arkasy, boýunyň yzky bölegi we kellesi ýaşylymytl metal öwüşginli garmtyl we goýy-gyzyl ýalpyldyly. Ganatlary gara ýalpyldaýan ýaşylymytl-gök. Kellesiniň gapdallary we boýuny ak. Kellesiniň öňki bölegi, çüňk asty zolagy we petekesi gara. Bedeniniň gapdallary, goltugynyň aşagy we garny ak. **Guýrugynyň aşagy we**

ной поперечной черной полосой. У молодых нарост перед глазами развит слабее. Голос – «крее-крик» или «крее-коо-ит». Крыло самцов – 214-236, самок – 217-231 мм, вес – до 300 г.

Сходства – отличия: от всех куликов хорошо отличается наличием **красного нароста** (лопасти) перед глазами.

Распространение: юго-западные районы Передней Азии, Индостан и Индокитай, но в весенний период севернее – до Юго-Восточного Туркменистана. У нас – долины Теджена, Мургаба и Кушки, редко Амударьи и западнее до Каспия.

Образ жизни: гнездящаяся птица. Весной прилетают с середины марта и в апреле, осенью отлетают в августе. Гнездование – в конце апреля-начале мая. Гнездится на земле. Гнездо в виде ямки. В кладке 3-4 яйца. Питается насекомыми, червями, моллюсками.

Статус: малоизученный редкий вид на перефирии ареала.

Полевые признаки: крупный кулик размером с небольшую ворону, **с широкими крыльями, черным клювом и ногами и узким хохолком на голове.** Самцы и самки летом сильно схожи. Спина, задняя часть шеи и голова темные с зеленым металлическим отливом и красно-пурпурным блеском. Крылья черные с фиолетово-синим блеском. Бока головы и шеи белые. Передняя часть головы, полоска под клювом и зоб черные. Бока тела, подмышки и брюшко белые.

üsti çypar reňkli. Guýrugy ak yzky gyrasy gara zolakly. Güýz-gyş döwründe ýaşy ýeten we ýaş guşlar (bizde şeýle ýelek örtüginde ýygy-ýygydan gabat gelyär) öçügsi reňkli, kellesinde ak reňkiň agdyklyk etmeginde gowşak saýgardýan metal öwüşgini we gowşak ösen hüpükli. Sesi “çii-wy-hii-wy”. Horazlarynyň ganaty – 216-237, mäkiýanlarynyňky – 214-230 mm, horazlarynyň agramy - 191-237, mäkiýanlarynyňky – 180-210 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **insiz hüpügi, garamtyl tegelenen ganatlarynyň uludygy we guýrugynyň gyrasyndaky gara zolaklary bilen** beýleki çuluklaryň ählisinden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeýän bölegi – tutuş Ýewraziýanyň sähra, tokaýly sähra, bölekleyin tokaý zolaklary, uçup geçende giň ýaýrawly. Günbatar Ýewropada, Ortaýer deňzinde, Ýakyn Gündogarda, Kiçi, Orta Aziýanyň günortasynda, Alynky, Gündogar we Gönorta-Gündogar Aziýanyň käbir ýerlerinde gyslaýar. Türkmenistanda - içki suwlarda, oazislerde we Hazar deňziniň kenarynda duşýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän, bölekleyin gyslaýan guş. Ýazyna-martyň aýagynda - aprelde, gijä galyp geçýänleri – maýda uçup geçýär, göçüp uçup gezyänleri iýunda gabat gelmeği mümkin. Güýzüne-awgustyň ikinji ýarymynda-noýabrda uçup geçýär. Gurçuklar, balykgulaklar, mörmöjekler, olaryň liçinkalary bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, uçup geçende käbir ýerlerde adaty görnüş. Ikinji derejeli aw guşy.

Подхвостье и надхвостье рыжие.

Хвост белый с черной полосой на заднем крае. Взрослые и молодые птицы в осенне-зимний период (у нас в таком наряде встречаются чаще всего) окрашены тускло, без ярко выраженного металлического блеска с преобладанием белого цвета на голове и слабо развитым хохолком. Голос – «чиии-вы-хьиивы, чиии-вы-хьиивы». Крыло у самцов – 216-237, у самок – 214-230 мм, вес самцов – 191-237, самок – 180-210 г.

Сходства – отличия: от всех куликов хорошо отличается **узким хохолком, большими темными закругленными крыльями и черной полосой по краю хвоста.**

Распространение: гнездовая часть ареала – степная, лесостепная, частично лесная зоны почти всей Евразии, на пролете – шире. Зимует в Западной Европе, в Средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Малой, Передней, на юге Средней и, местами, в Восточной и Юго-Восточной Азии. В Туркменистане – на внутренних водоемах, в оазисах и на Каспийском побережье.

Образ жизни: пролетная, частично зимующая птица. Весенний пролет – в конце марта и в апреле, позднепролетные – в мае, летующие могут попадаться в июне. Осенний пролет – со второй половины августа по ноябрь. Питается червями, моллюсками, насекомыми и их личинками.

Статус: немногочисленный, на пролете местами обычный вид. Второстепенный объект охоты.

130. Daş döriji çuluk – Arenaria interpres – Камнешарка

Meýdan alamatlary: sar ölçegli, konusşekilli gysga **gara çüňkli we aýaklary mämişi reňkli** maýda çuluk. Ýaz-tomus aýlary ala ýelekli, ýaşy ýeten guşlarda ak, gara we goňras reňkler agdyklyk edär. Gara nagyş gözünüň töweregi we çüňki üçin häsiýetli, garny ak. Güýz-gyşky ýelek örtüginde ýaşy ýeten we ýaş guşlaryň reňkleri az garşylykly, aýaklarynyň reňki hem tutuk. Sesi pert “ket-ket-ket”. Horazlarynyň ganaty - 142-153, mäkiýanlarynyňky – 145-157 mm, agramy - 70-150 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: kellesiniň garşylykly reňklidigi, garamtyl çüňküniň gysgalan-toýnukşekillidigi we mämişi aýaklarynyň dört barmaklydygy bilen beýleki maýda çuluklardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeýän bölegi - Ýewraziýanyň we Demirgazyk Amerikanyň deňizleriniň demirgazyk kenaryakalary. Uçup geçende giň ýaýran. Türkmenistanda, aglaba, Hazar deňziniň kenarynda we içki suwlarda duşýar. Günbatar Ýewropanyň, Afrikanyň, Arabystanyň, Gönorta we Gönorta-Gündogar Azýanyň, Awstraliýanyň, Merkezi, Gönorta Amerikanyň kenaryakalarynda gyslaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän, bölekleyin gonup uçup gezyän guş. Ýazyna-aprel-maýda uçup geçýär, gonup uçup gezyänleri iýun-iýulda gabat gelyär, güýzine – awgustyň ikinji ýarymyndan-oktyabrda, gijä galanlary noýabrda uçup geçýärlär. Maýda daşjagazlary peşäp balykgulaklar, leňneçler, mörmöjekler we olaryň

Полевые признаки: небольшой кулик крупнее скворца, с коротким **темным конусовидным клювом и оранжевыми ногами.** В весенне-летнем пестром наряде у взрослых птиц преобладают белые, черные и каштановые оттенки. Около глаз и клюва характерный черный узор, брюхо белое. Осенне-зимний наряд взрослых и молодых менее контрастен и не так ярок, ноги также менее яркой окраски. Голос – резкое «кет-кет-кет». Крыло самцов 142-153, самок – 145-157 мм, вес – 70-150 г.

Сходства – отличия: от других мелких куликов отличается характерной контрастной окраской головы, укорочено-коническим темным клювом и оранжевыми четырехпальными ногами.

Распространение: гнездовая часть ареала – побережья северных морей Евразии и Северной Америки. На пролете – намного шире. В Туркменистане, преимущественно, на Каспийском побережье и внутренних водоемах. Зимует по побережьям Западной Европы, Африки, Аравии, Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии, Центральной Южной Америки.

Образ жизни: пролетная, частично летующая и эризодически зимующая птица. Весенний пролет – в апреле-мае, летующие – в июне-июле, осенний пролет – с начала августа по конец октября, позднепролетные особи – в ноябре. Питаются моллюсками, рачками, насекомыми и их личинками,



Çuluklaryň uçup barýarka görnüşi: 1 – gyzylinjik; 2 – bizçüňk çuluk; 3 – alahekek-çuluk; 4 – ebek; 5 – uly jeňňel ebegi; 6 – tokaý ebegi; 7 – uly ýylkuçy; 8 – uly ikburun; 9 – kiçi kebez; 10 – bezziltik; 11 – altynsow çuluk; 12 – tules çulugy; 13 – gyzyl aýajykly çuluk; 14 – uly ulit çulugy; 15 – daş döwürji çuluk.

Кулики в полете: 1 - ходулочник; 2 - шилоклювка; 3 - кулик-сорока; 4 - бекас; 5 - дупель; 6 - вальдшнеп; 7 - большой кроншнеп; 8 - большой веретенник; 9 - малый зуек; 10 - чибис; 11 - золотистая ржанка; 12 - тулес; 13 - травник; 14 - большой улит; 15 - камнешарка.

liçinkalary bilen ýmitlenýär (guşuň ady şonuň bilen bagly), emma olar ösümlikleriň tohumlary bilen ýmitlenmekleri hem mümkin.

Statusy: az sanly görnüş.

переворачивая при этом камешки или ракушки (отсюда происходит название птицы), но могут питаться и семенами.

Статус: Немногочисленный вид.

Bizçüňkliler – Recurvirostridae – Шилоклювковые

Aýaklary we çüňki uzalan, başgala garanyňda, gowresi uly çuluklar maşgalasy. Gara we ak – garşylykly reňkli. Jemi 4 görnüş, şol sanda 2-si Türkmenistanda.

Семейство сравнительно крупных куликов с удлинёнными ногами и клювом. Окраска контрастная – черно-белая. Всего 4 вида, в том числе 2 – в Туркменистане.

131. Gyzylinjik – Himantopus himantopus – Ходулочник

Meýdan alamatlary: gumrynyň ölçegindäki, ýöne hemme beden bölekleri sazlaşykly bolmadyk, **uzyn gyzyl aýakly we gara reňkli göni inçe çüňkli** çuluk. Uly guşlaryň reňki garşylykly: kellesiniň üstki tapary, arkasy we ganatlary gara, bedeniniň aşaky bölegi we guýrugy ak. Mäkiýanynda garşylykly reňkler az, goňurrak. Ýaşlary çalymtyl, boýny garamtyl-çal öwüşginli we aýaklary goňurrak. Sesi gulagyňy deşiji – “terk-terk-terk”. Horazlarynyň ganaty – 228-248, mäkiýanlarynyňky – 204-233, çüňki – 59-70 mm, agramy – 150 g çenli.

Полевые признаки: кулик размером тела с горлицу, но на непропорционально высоких **красных ногах и с тонким прямым клювом черного цвета**. Окраска взрослых птиц контрастная: верхняя часть головы, спина и крылья черные, нижняя часть тела и хвост белые. Самки менее контрастные, буроватые. Молодые птицы сероватые, с темным серым налетом на шее и буроватыми ногами. Голос – пронзительное «терк-терк-терк-терк». Крыло самцов – 228-248, самки – 204-233, клюв – 59-70 мм, вес – до 150 г.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: aýaklarynyň uzynlygy, çüňküniň göni uzynlygy we ýelek örtügininiň garşylykly reňklidigi bilen çuluklaryň ählisinden tapawutlanýar.

Сходства – отличия: от всех куликов отличается высокими ногами, длинным прямым клювом и контрастным оперением.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeýän ýerleri giň we bölekleyin – Günorta we Günorta-Gündogar Ýewropa, Gazagystan, Kiçi, Alynky, Orta we Merkezi Aziýanyň günbatary, onuň günorta-gündogarynyň käbir çetleri, Demirgazyk Amerikanyň günorta bölegi. Türkmenistanda-ıçki suw ýataklarynda we Hazar deňziniň

Распространение: область гнездования обширна и мозаична – Южная и Юго-Восточная Европа, Казахстан, Малая, Передняя, Средняя и запад Центральной Азии, местами на крайнем ее юго-востоке, южная часть Северной Америки. В Туркменистане – на внутренних водоемах и Каспийском побережье.

kenarynda gabat gelyär. Uçup geçende giňişleýin duşýar. Afrikanyň günorta böleginde, Hindistanda we Hindihytaýda, Awstraliýada, Täze Zelandiýada, Merkezi we Günorta Amerikada gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtleýän guş. Ýazyna martyň aýagyndan maýyň başynda, güýzine – awgustyň soňundan noýabrda uçup geçýär. Maýyň ortasyndan awgustyň aýagynda çenli höwürtleýär. Suwbatgalyk ýerlerde gezýär. Aýratyn jübüt ýa-da topar bolup, ýerde ýa-da tümmekleriň gapdalarynda höwürtleýär. Höwürtleýäniň içine ösümlik sypallary düşelen ýalpaýyk çukurlyk. 4 sany gara-goňur menekli, goňurrak çalymtyl-ýaşyl ýumurtgalyk goýýar. Jüýjeleri iýunyň ortasynda çykýar, iýulyň ikinji ýarymynda – awgustyň başynda uçurum bolýarlar. Balykgulaklar, leňneçler we suwdaky möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: ýaşamaga amatly ýerlerde adaty görnüş.

132. Bizçüňk çuluk – *Recurvirostra avosetta* – Шилоклювка

Meýdan alamatlary: gumry ölçegindäki uly çuluk, ýöne aýaklary we ýokaryk gaýşak **gara reňkli ýasy çüňki inçeden uzyn.** Horazy we mäkiýany birmeňzeş garşylykly reňkli. Kellesiniň üsti, ýeňsesi, boýnunyň yzky tarapy gara, ganatlary gara bilen ak, galan ýelek örtügi ak. Aýaklary mawymtyl-çal, öňki barmaklarynyň arasy perdeli. Ýaşlarynyň gara reňki goňur bilen çalyşýar, ganatlarynyň uçlary çypar reňkli. Sesi – “klýup-klýup-klýup” ýa-da “kwit- kwit- kwit”. Horazlarynyň ganaty - 214-234, mäkiýanlarynyňky – 211-232 mm, ag-

жье. На пролете встречается очень широко. Зимует в южной половине Африки, Индостане и Индокитае, Австралии, Новой Зеландии и Центральной и Южной Америке.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весенний пролет – с конца марта до начала мая. Осенний – с конца августа по ноябрь. Гнездовой период – с середины мая до конца августа. Всюду придерживается водно-болотных местообитаний. Гнездится на земле или кочках отдельными парами или небольшими группами. Гнездо – на сухом месте в виде ямки с выстилкой из обрывков растений. В кладке, обычно, 4 буровато-серо-зеленых с черно-бурыми пятнами яйца. Пуховички появляются с середины июня, летными становятся во второй половине июля-начале августа. Питается моллюсками, раками и водными насекомыми.

Статус: в подходящих местообитаниях обычный вид.

Полевые признаки: крупный кулик, тело размером с горлицу, но на высоких ногах и с длинным **тонким плоским клювом черного цвета, изогнутым кверху.** Самцы и самки окрашены сходно, контрастно. Верх головы, затылок, задняя сторона шеи – черные, крылья – белые с черным, остальное оперение белое. **Ноги голубовато-серые,** на передних пальцах перепонка. У молодых птиц черный цвет заменен бурым, крылья имеют рыжие концы. Голос – «клюп-клюп-клюп» или «квит-квит-квит». Крыло

ramy - 350 g golaý.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **garşylykly gara-ak** ýelek örtüklidigi, mawymtyl-çal reňkli aýaklarynyň uzynlygy we uzyn çüňkiniň ýokarylygyna gaýşakdygy (jaýty) bilen beýleki çuluklardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän döwründe - Günbatar, Günorta we Günorta-Gündogar Ýewropanyň kenar-ýakalary, Gazagystan, Merkezi, Orta (käbir ýerlerinde), Alynky we Kiçi Aziýa, şeýle-de Gündogar we Günorta Afrika. Uçup geçende giň ýaýran. Türkmenistanda-ıçki suw ýataklarynda we Hazaryň kenarynda gabat gelyär. Ýewropanyň günbatar çetlerinde, Ortaýer deňzinde, Hazar deňziniň günortasynda, Pars aýlagynyň demirgazygynda, Hindistanyň demirgazyk-günbatarynda, Afrikanyň günbatar we gündogar kenarlarynda gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, bölekleyin gonup-göçüp gezýän we seýregräk gyslaýan guş. Ýazyna-martyň ikinji ýarymyndan maýyň başynda çenli uçup geçýär, gonup-göçüp gezýänleri iýun-ıýulda duşýarlar. Güýzüne-awgustyň ikinji ýarymyndan noýabra çenli uçup geçýär. Gyş ýyly gelende käte dekabir-fewralda hem gabat gelyär. Maýda oňurgasyzlar bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sany, bizde gowşak öwrenilen görnüş.

Çuluk-alahekekler – *Haematopodidae* – Кулики-сороки

Aýaklary we çüňki gyzy bolan gara-ak reňkli uzynçüňkli uly çuluklar maşgalasy. Maşgala 4 görnüşü özünde jemleýär, onuň 1 wekili Türkmenistanda.

самцов – 214-234, самок – 211-232 мм, вес – около 350 г.

Сходства-отличия: от других куликов отличается **контрастным черно-белым** оперением, высокими ногами голубовато-серого цвета и длинным изогнутым кверху клювом.

Распространение: в гнездовой период – на побережьях Западной, Южной и Юго-Восточной Европы, в Казахстане, в Центральной, местами в Средней, Передней и Малой Азии, а также в Восточной и Южной Африке. На пролете – шире. В Туркменистане – на внутренних водоемах и Каспийском побережье. Зимует на крайнем западе Европы, в Средиземноморье, на юге Каспия, севере Персидского залива, на северо-западе Индостана, западном и восточном побережьях Африки.

Образ жизни: пролетная, частично летующая (спорадически гнездится) и изредка зимующая птица. Весенний пролет – со второй половины марта до начала мая, летующие – в июне-июле. Осенний пролет – со второй половины августа до ноября. В теплые зимы – изредка в декабре-феврале. Питается мелкими беспозвоночными.

Статус: немногочисленный, малоизученный у нас вид.

Семейство крупных длинно-клювых куликов черно-белой окраски с красными ногами и клювом. Семейство включает 4 вида, с одним представителем в Туркменистане.

133. Alahekek-çuluk – *Haematopus ostralegus* – Кулик-сорока

Meýdan alamatlary: kepderi öleşli, **kelteräk ýakly we gyzyl reňkli, uzundan göni çüňkli** uly çuluk. Ýaşy ýeten horazlary we mäkiýanlary meňzeş, garşylykly reňkli. Kellesi, boýny, arkasynyň üsti, ganatlary we guýrugynyň uýy gara, aşaky tarapy ak. Gyş döwründe garşylykly reňkleriniň tapawudy azalýar. Ýaşlarynyň ýelek örtügininiň gara bölegi ak nagyşly goňur bilen çalyşýar. Bokurdagy köplenç ak zolakly ýa-da menekli. Aýaklary üçbarmakly gülgüne reňkli. Sesi başda “kip-kip-kip”, soňra “kli-kli-kli-ä” geçýär. Horazlarynyň ganaty – 241-266, mäkiýanlarynyňky – 237-267, çüňki – 62-101 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: görnüşleriň arasynda meňzeşi ýok.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän döwründe – Ýewropanyň, Gazagystanyň we Günbatar Sibiriň suw ýataklarynyň kenarýakalary, Orta we Gündogar Aziýanyň käbir ýerleri. Uçup geçende giňişleýin duşýar. Türkmenistanda içki suw ýataklarda we Hazar deňziniň kenarýakasynda gabat gelýär. Günbatar Ýewropanyň, Demirgazyk-Günbatar we Gündogar Afrikanyň, Arabystanyň, Hindistanyň, Günorta-Gündogar Hytaýyň we Täze Zelandiýanyň ummanly kenarýakalarynda guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän we käte höwürtleýän guş. Ýazyna-martdan maýyň başyna çenli, güýzüne – awgustdan noýabr aralykda uçup geçýär. Maýyň ortasyndan jübüt ýa-da kiçiräk topar bolup, çägelik, daşlyja adajyklarda we burunlarda höwürtleýär. Höwürtleýäni – içine balykgulak, daşjagazlar, zir-zibil ýa-da

Полевые признаки: крупный кулик размером с голубя, **с невысокими ногами и длинным прямым клювом красного цвета.** Окраска взрослых самцов и самок сходная, контрастная. Голова, шея, верх спины, крылья и конец хвоста черные, нижняя часть белая. В зимний период окраска менее контрастная. У молодых птиц черная часть оперения заменена бурым с беловатыми каймами перьев. На горле часто белая полоска или пятно. Ноги трехпалые розового цвета. Голос – «кип-кип-кип», переходящий в «кли-кли-кли». Крыло самцов – 241-266, самок – 237-267, клюв – 62-101 мм.

Сходства-отличия: сходных видов нет.

Распространение: в гнездовой период – побережья водоемов Европы, Казахстана и Западной Сибири, местами в Средней и Восточной Азии. На пролете – шире. В Туркменистане – на внутренних водоемах и Каспийском побережье. Зимует на океанических побережьях Западной Европы, Северо-Западной и Восточной Африки, Аравии, Индостана, Юго-Восточного Китая и Новой Зеландии.

Образ жизни: пролетная местами гнездящаяся птица, единично в теплые годы зимует. Весенний пролет – с конца марта до начала мая. Осенний – с августа по ноябрь. Гнездится одиночными парами или небольшими колониями на песчаных и галечниковых островках и косах, с середины мая. Гнездо – небольшая ямка с выстилкой из ра-

ösümlük galyndylary düşelenje çukurlyk. 3-4 sany garmtyl goňur menekli çyparrak reňkli ýumurtgalary goýýar. Jüýjeleri iýunyň başynda, iýulda uçurym bolýar. Balykgulaklar, mör-möjekler, daşlaryň aşagyny döwür, olaryň içinkalary bilen iýmitlenýär. Höwürtleýän döwründe beýleki guşlaryň ýumurtgalaryny çökmaklary hem mümkin.

Statusy: az sany, uçup geçende käbir ýerlerde adaty görnüş.

Ebekler – Scolopacidae – Бекасовые

Öleşleri maýda, orta ýa-da uly, çüňki we aýaklary orta uzynlykda bolan çuluk guşlaryň topary. Beýleki çuluklar bilen deňeşdireniňde, örän ýaşyryn gezyärler. Reňkleri penalaýy, tutugrak, adatça, garmtyl dik menekli. Dünýäde 80 görnüş, şolaryň 28-si Türkmenistanda. Olar çäge çuluklaryň aşaky maşgalasynyň ewekleriň, ikburunlaryň, ulitleriň we ýüzegenjeleriň wekilleridir.

134. Island çäge çulugy – *Calidris canutus* – Исландский песочник

Meýdan alamatlary: gumry öleşli uly çäge çulugy. Çüňki we aýaklary gara, ýöne güýz-gyş döwründe (bizde duşýan wagtlary) **aýaklary çalymtly-ýaşyl reňkli.** Horazlarynyň tomusky ýelek örtüginde üstki tarapy garagoňur, ýelekleriniň uçlary agymtyl we poslyrak tegmilli, garyn tarapy, boýny, “duluklary” we bölekleýin boýnunyň yzy goýu-posly reňkli. Garyn agymtyl, guýrugynyň aşagy, goltugy we böwürleri kese nagyşly ak. Mäkiýanlarynyň üsti tüsse reňkli, garyn tarapy meneklenen ak ýelekli. Ulularynyň we ýaslarynyň gyşky ýelek örtügi meňzeş. **Arka tarapy**

кушки, камешков, мелкого мусора или обрывков растений. В кладке 3-4 рыжеватых с темными бурыми пятнами яйца. Пуховички с начала июня, а летные – в июле. Питается, моллюсками, насекомыми и их личинками, которых ищет, переворачивая камешки. В гнездовой период может поедать яйца других птиц.

Статус: немногочисленный, местами на пролете обычный вид.

Группа птиц – кулики мелких, средних или крупных размеров, клюв и ноги средней длины. По сравнению с другими куликами очень скрытны. Окраска покровительственная, не яркая, обычно с темными продольными пестринами. В мире 80 видов, 28 из которых в Туркменистане. Это представители подсемейств песочники, бекасы, веретенники, улиты и плавунчики.

Полевые признаки: крупный, размером с горлицу кулик. Клюв и ноги черные, но **в осенне-зимний период** (когда может встречаться у нас) **ноги серо-зеленого цвета.** Самцы в летнем наряде сверху черно-бурые с белесыми кончиками перьев и ржавчатыми пятнами на их концах, а брюшная сторона, шея, «щеки» и частично зашеек густо-ржавчатые. Брюшко светлое, подхвостье, подмышки и бока белые с поперечным рисунком. Самки сверху более дымчатые, на брюшной стороне с вкраплениями белых перьев. В зимнем оперении

garamtyl түссе reňkli, garny açyk gögümtil ýokundyly. Ganaty - 162-173 mm, agramy – 60-81 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çüňküniň uzynlygy we gönüdigini bilen ikburunlardan (ikburunyňky göni we egmek); aýagynyň uzynlygy we häsiýeti bilen ulitlerden tapawutlanýar. Iýmitlenende köplenç kenarýakadaky ösümlükleriň arasyn-da gezyýär.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän döwründe Ýewraziýanyň we Amerikanyň tundra zolagynda ýaşaýar. Uçup geçende günorta tarapda giň ýaýrawly. Türkmenistanda, aglaba, Hazar deňziniň kenarýakasynda duşýar. Esasan, Merkezi we Günorta Amerikanyň günorta çetlerinde, Günbatar Ýewropada we Günbatar Afrikada, Günorta-Gündogar Aziýanyň kábir ýerlerinde, Awstraliýada, Täze Zelandiýanyň ummanly kenarýakasynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän guş, migrasiýa döwründe ýek-tük osoblary Hazar deňziniň kenarýakasynda we beýleki uly suw ýataklarynda gabat gelmekleri mümkin.

Statysy: bizde entek öwrenilmedik, seýrek görnüş.

135. Çäge çulugy – *Calidris alba* – Песчанка

Meýdan alamatlary: sar ölçegli **kiçiräk gara çüňkli** we yzky barmagy bolmadyk **gara aýakly** çuluk. Tomsuna uly guşlaryň arka ýelekleri poslurak-çypar öwüşginli gara, kellesi, boýny we döşi gara menekli çypparak, garny ak. Ululary, şeýle-de ýaşlary **güýz-gyş döwründe**, bizde duşýan wagtlary, **ýagty-çal, kellesi, boýny we döşi çypparak öwüşsinsiz. Aşaky tarapy ak.** Horazlarynyň ga-

самцы, самки и молодые окрашены сходно. **Спинная сторона темная дымчатая, брюшная – светлая с сизоватым налетом.** Крыло – 162-173 мм, вес – 60-81 г.

Сходства – отличия: от веретенника отличается длиной и формой клюва – короткий и прямой (у веретенника – длинный и изогнутый), от улитов отличается высотой ног и поведением. При кормежке больше держится среди прибрежной растительности.

Распространение: в гнездовой период населяет тундры Евразии и Америки. В периоды миграций – широко к югу. В Туркменистане, преимущественно, на побережье Каспия. Зимует, в основном, на океанских побережьях Центральной и крайнего юга Южной Америки, Западной Европы и Западной Африки, местами Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии.

Образ жизни: пролетный вид (единично может быть летом) на побережье Каспия и, возможно, по другим крупным водоемам.

Статус: редкий, у нас не изученный вид.

Полевые признаки: размером со скворца с **небольшим черным клювом и черными ногами**, на которых отсутствует задний палец. У взрослых птиц летом перья спины черные с ржаво-рыжим налетом, голова, шея и грудь – рыжеватые с черными пестринами, а брюшко белое. Взрослые птицы, как и молодые, в **осенне-зимний период**, когда встречаются у нас, **светло-серые, без рыжего налета**

naty - 115-129, mäkiýanlarynyňky – 114-125 mm, agramy - 45-50 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: kelle-sindäki, boýnundaky, döşündäki we böwürlerindäki çypparak ýokundysy (tomusky ýelek örtüginde), garny tarapynda sary, gyzyly we gara reňkleriň ýokdugy, şeýle-de yzky barmagyň (guşy eliňe alanyňda) ýokdugy bilen beýleki çäge çuluklardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän döwründe - Ýewraziýanyň we Amerikanyň arktika tundrasynda, migrasiýa döwründe günorta tarapda giňişleýin ýaýran. Türkmenistanda – Hazar deňziniň kenarýakasynda we içki suw ýataklarynyň kábirlerinde. Günbatar Ýewropanyň, Afrikanyň, Günorta Aziýanyň, Awstraliýanyň, Merkezi we Günorta Amerikanyň ummanly kenarýakalarynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, bölekleyin gyşlaýan guş. Ýazyna-aprel-maýda uçup geçýär, gijä galanlay iýunda saklanýar. Güýzine – sentýabr-noýabrda. Gyş amatly bolan ýyllary ýekelikde we kiçiräk topar bolup, dekabir-fewralda gabat gelýär. Deniz kenarýakasyňyň çägeli, çägeli-daşly we çagelik-gyрманçaly ýerlerinde, şeýle-de beýleki suw ýataklarynda mekan tutýar. Çybynlar, olaryň liçinkalary, beýleki maýda oňurgasyzlar, káte ösümlükleriň dürli bölekleri bilen iýmitlenýär.

Statusy: az öwrenilen, az sany görnüş.

136. Serçe-çuluk – *Calidris minuta* – Кулик-воробей

Meýdan alamatlary: gönüden gysga çüňkli we aýaklary gara reňkli, **serçe ölçegli maýda çuluklar.** Ýaşy ýeten guşlaryň üstki tarapy

на голове, шее и груди. Низ белый. Крыло самцов – 115-129, самок – 114-125 мм, вес – 45-50 г.

Сходства – отличия: от других песочников отличается (но в летнем оперении) рыжеватым налетом на голове, шее, груди и боках, отсутствием желтого, красного и черного цвета на брюшной стороне, а также отсутствием заднего пальца (видно при непосредственном контакте).

Распространение: в гнездовой период – арктические тундры Евразии и Америки, в периоды миграций – широко к югу. В Туркменистане на побережье Каспия, местами на внутренних водоемах. Зимует, в основном, на океанских побережьях Западной Европы, Африки, Южной Азии, Австралии, Центральной и Южной Америки.

Образ жизни: пролетная, частично зимующая птица. Весенний пролет – в апреле-мае, позднепролетные задерживаются в июне. Осенний пролет – в сентябре-ноябре. В благоприятные зимы одиночки и мелкие стайки – в декабре-феврале. Встречается на песчаных, песчано-галечных, редко песчано-илистых участках морского побережья, не исключено и других крупных водоемов. Питается комарами, их личинками, другими мелкими беспозвоночными, изредка вегетативными частями растений.

Статус: малоизученный, немногочисленный вид.

Полевые признаки: **мелкий кулик размером с воробья**, с прямым коротким клювом и ногами черного цвета. Взрослые птицы

we böwürleri çyparrak, zyra-zyraly. Döşüniň gapdal menekleri gara, aşaky tarapy ak, gözüniň üstündäki gaşy tutuk reňkli. **Guýrugynyň ortaky ýelekleri gara, galanlary ýagty reňkli (uçanda görüňär).** Gyşyna ýelek örtügi we ýaş guşlaryň arkasy çalymtyl-goňur, garyn tarapy ak reňkli, petekesi kirliräk-çypar ýokundyly. Horazlarynyň ganaty - 87-102, mäkiýanlarynyňky - 84-102 mm, agramy - 22-40 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: aýaklarynyň garadygy we arkasynyň çyparrak öwüşginlidigi bilen ak guýruk çäge çulukdan; ölçegleriniň kiçidigi, bokurdagynyň we guýruk üstüniň akdygy, barmaklarynyň gysgadygy bilen beýleki çäge çulukardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeýän döwründe - Ýewraziýanyň, demirgazyk-gündogar böleginden başgalarynda, tundra we tokaýly tundra zolagynda. Migrasiýa döwründe günortada giň ýaýran. Türkmenistanda - Hazar deňziniň kenarýakalarynda, emma köplenç içki suw ýataklarynda. Ortaýer deňzinde, Afrikada we Günorta Aziýada gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, göçüp-uçup gezýän, amatly ýyllarda gyslaýan görnüş. Ýazyna martyň ortasyndan iýunyň başyna çenli uçup geçýär, gonup-uçup gezýänleri iýulda gabat gelýär, güýzüne-awgust-noýabr aralykda. Köplenç çybynlaryň liçinkalary, beýleki maýda oňurgasyzlar bilen seýregräk iýmitlenýär.

Statusy: köp sanly däl, Hazar deňziniň käbir ýerlerinde adaty görnüş.

сверху и с боков рыжеватые, рябые. Пестрины на боках груди черные, низ белый, над глазом неяркая бровь. **Средние перья хвоста черные, остальные светлые (заметны в полете).** В зимнем перье и молодые с серовато-бурой спиной, белым брюшком и грязно-рыжим налетом в области зоба. Крыло самцов - 87-102, самок - 84-102 мм, вес - 22-40 г.

Сходства - отличия: от белохвостого песочника отличается черными ногами и рыжеватым тоном спины, от других песочников - мелкими размерами, белым горлом и надхвостьем, короткими пальцами.

Распространение: в гнездовой период - тундры и лесотундры Евразии, кроме северо-восточной части. В периоды миграций - шире и южнее. В Туркменистане на побережьях Каспия, но, преимущественно, внутренних водоемов. Зимует в Средиземноморье, Африке и Южной Азии.

Образ жизни: пролетный, летующий, в благоприятные годы зимующий вид. Весной пролет с середины марта-до начала июня, попадает и в июле, осенний пролет - с августа по ноябрь. Питается, преимущественно, личинками комаров, реже другими мелкими беспозвоночными.

Статус: малоизученный немногочисленный, местами на Каспии обычный вид.

137. Akguýruk çäge çulugy – *Calidris temminckii* – Белохвостый песочник

Meýdan alamatlary: serçe ölçegli, kiçiräk gara çüňkli we ýaşylymtyl-çal ýa-da sarymtyl aýakly çäge çulugy. Tomsyna ulularynyň arkasy goňurrak-çal bolup, ýelekleri garamtyl sütünli we olaryň pelpelleýjileri goňurrak gyraly. Garyn tarapy ak, petekesi, boýny we döşüniň öňki bölegi çalymtyl-çyparrak ýa-da poslyrak. **Guýrugy ak, emma ortaky sowguç ýelekleri beýlekilerinden gararak we uzynrak.** Gyş-güýz döwründe ulularynyň we ýaşlarynyň arkasy çalymtyl-ýaşyl öwüşginli tüsse reňkli-goňur. Garyn ak, petekesi, boýny we döşüniň öňki bölegi çalymtyl ýokundyly. Horazlarynyň ganaty - 80-103, mäkiýanlarynyňky - 78-105 mm, agramy - 23-33 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: arkasynyň goňurrak öwüşginlidigi we **aýaklarynyň agymtyldygy** bilen beýleki maýda çäge çuluklardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeýän döwründe - Ýewraziýanyň tundra giňişligi. Uçup geçende - günortada giň ýaýran. Türkmenistanda - içki suw ýataklarda we Hazar deňziniň kenarýakasynda. Esasan, Merkezi Afrikada, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýada gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän guş. Ýazyna-martyň aýagynda we maýda hem uçup geçýär, şonda olar güýzkä garanynda köp sanly. Güýzüne - iýulyň aýagyndan oktýabr aralykda uçup geçýär. Beýleki çäge çuluklary ýaly dürli maýda oňurgasyzlar, çybynlar we olaryň liçinkalary bilen iýmitlenýär.

Statusy: ýeterlik öwrenilmedik, seýrek görnüş.

Полевые признаки: размером с воробья, мелкий кулик с небольшим черным клювом и зеленовато-серыми или желтоватыми ногами. Взрослые птицы летом с буровато-серой спиной, темными стержнями перьев и буроватыми краями их опахал. Брюшная сторона белая, с серовато-рыжим или ржавчатым налетом на зобе, шее и передней части груди. **Хвост белый, но средние перья хвоста темные и длиннее остальных.** В осенне-зимний период у взрослых, как и у молодых, спина дымчато-бурая с серо-зеленым оттенком. Брюшко белое с сероватым налетом на зобе, шее и передней части груди. Крыло самцов - 80-103, самок - 78-105 мм, вес - 23-33 г.

Сходства - отличия: от других мелких песочников отличается буроватым тоном спины и **светлыми ногами.**

Распространение: в гнездовой период - тундры Евразии. На пролетах - широко к югу. В Туркменистане - внутренние водоемы и побережье Каспия. Зимует, в основном, в Центральной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: пролетная птица. На весеннем пролете встречается с конца марта и еще в мае, когда более многочисленен, чем осенью. Осенний пролет - уже с конца июля и по октябрь. Питается, как и другие песочники, различными мелкими беспозвоночными, комарами и их личинками.

Статус: недостаточно изученный, редкий вид

138. Gyzyl petekeliye çuluk – *Calidris ferruginea* – Краснозобик

Meýdan alamatlary: sar ölçegli ululykda. **Aýaklary we aşaklygyna sähelçe egmek uzyn çünki gara reňkli.** Tomsuna uly guşlaryň üstki tarapy posly-çypar, ýaňaklary, boýny we garyn tarapy goýy goňras-çypar reňkli. Garnynyň ýelek örtügi insiz ak gaýmaly. Guýrugynyň üsti ak. Ýaş guşlaryň ýokarsy pos öwüşginli garamtyl - goňur, aşagy çyparrak-gögümtilräk bolup, guýrugynyň üsti ak. Horazlarynyň ganaty - 123-132, mäkiýanlarynyňky - 121-133 mm, ag-ramy - 54-66 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň kiçidigi we çüňküniň aşaklygyna sähelçe egmekdigi bilen island çäge çulugyndan we ikburunlardan, edil şonuň ýaly, çünki, şeýle-de tomsuna garnynyň gara tegmilsizdigi we güýz-gyş döwründe - guýrugynyň üstüniň akdygy bilen gara petekeliye çulukdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän döwründe - Aziýanyň arktika tundrasynda, migrasiýa döwründe - gü-nortada giň ýaýran. Türkmenistanda - Hazar deňziniň kenarýakasynda we içki suw ýataklaryň käbir ýerlerinde. Esasan, Günorta Afrikanyň, Madagaskaryň, Günorta, Günorta-Gündogar Aziýanyň we Awstraliýanyň kenarýakalarynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, bölekleyin gonup-uçup gezýän guş. Ýazyna mart-maýda, gonup-uçup gezýänleri iýun-iýulda duşýar, güýzüne awgust-sentyabrda we oktýabryň başynda uçup geçýär. Suwdaky dürli maýda oňurgasylar bilen iýmitlenýär.

Statusy: az öwrenilen, köpsanly däl görnüş.

Полевые признаки: тело размером со скворца. **Ноги и длинный, слегка изогнутый книзу клюв черного цвета.** Летом взрослые птицы **ржаво-рыжие сверху, щеки, шея и брюшная сторона густого каштаново-рыжего цвета.** На брюшке узкие беловатые каймы перьев. Надхвостье белое. Молодые птицы темно-бурые с ржавым налетом сверху, рыжеватосизоватым низом и белым надхвостьем. Крыло самцов - 123-132, самок - 121-133 мм, вес - 54-66 г.

Сходства – отличия: взрослые птицы отличаются от исландского песочника и веретенников мелкими размерами и слегка изогнутым книзу клювом. От чернозобика – тем же клювом, а также оперением, летом – отсутствием черного пятна на брюхе, а в осенне-зимний период – белым надхвостьем.

Распространение: в гнездовой период – арктические тундры Азии, в периоды миграций – широко к югу. В Туркменистане – Каспийское побережье и местами – внутренние водоемы. Зимует, в основном, на побережьях Южной Африки, Мадагаскара, Южной и Юго-Восточной Азии и Австралии.

Образ жизни: пролетная, частично летующая птица. Весенний пролет в марте-мае, летующие – в июне-июле, осенний пролет – в августе-сентябре и начале октября. Питается различными мелкими водными беспозвоночными.

Статус: малоизученный, немногочисленный вид.

139. Gara petekeliye çuluk – *Calidris alpina* – Чернозобик

Meýdan alamatlary: sar ölçegli, orta ululykdaky çuluk. Çünki beýlekilere garanyňda uzyn, aýagy gara reňkli. Uly guşlaryň üstki tarapy çyparrak-menek yzly, ýagty petekesi garamtyl menekli, garnynyň aşagy gara we guýrugynyň üsti goňur reňkli. **Gyşyna bedeniniň ýokarsy we petekesi tüsse öwüşginli, aşak tarapy ak, guýrugynyň üsti garamtyl reňkli.** Ýaşlarynyň üsti gyşky ýelek örtüginde uly guşlara çalymdaş, garyn we böwürleri goňur tegmilli. Horazlarynyň ganaty - 101-126, mäkiýanlarynyňky - 104-126 mm, ag-ramy - 39-57 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çüňküniň gönüdigini, tomsuna garnynyň garadygy, gyşyna guýrugynyň üstüniň garamtyldygy bilen gyzyl petekeliye çulukdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän döwründe Ýewraziýanyň tundra we bölekleyin tokaýlytundra zolagynda we Demirgazyk Amerikada, Kanada arhipelagyndan başgalarynda. Uçup geçende we gyşlanynda Günbatar Ýewropanyň, Demirgazyk Afrikanyň, Arabystanyň deňiz kenarýakalarynda, Ortaýer deňzinde, Orta, Günorta we Gündogar Aziýada, Demirgazyk Amerikanyň günorta böleginde duşýar. Türkmenistanda içki suw ýataklarda we Hazar deňziniň kenarýakasynda.

Ýaşayşy: uçup geçýän, bölekleyin gonup-uçup gezýän we gyşlaýan guş. Uçup gitmegi we ýazyna uçup geçmegi martyň ortasyndan maýyň aýagyna çenli. Gonup - uçup gezýänleri iýun-iýulda duşýar. Güýzüne - awgustdan noýabr aralygynda uçup geçýär.

Полевые признаки: кулик среднего размера – со скворца. Относительно удлинённый клюв и ноги черного цвета. Взрослые птицы рыжеватосизоваты сверху, светлым с темными пестринами зобом, черным брюшком и бурым надхвостьем. **Зимой верх тела и зоб дымчатые, низ белый, надхвостье темное.** Молодые птицы сверху похожи на взрослых в зимнем перье с бурными пятнами на брюшке и боках. Крыло самцов - 101-126, самок - 104-126 мм, вес - 39-57 г.

Сходства-отличия: от краснозобика отличается прямым клювом, летом – черным брюшком, а зимой – темным надхвостьем.

Распространение: в гнездовой период – тундры и частично лесотундры Евразии и Северной Америки, кроме Канадского архипелага. На пролетах и зимовке морские побережья и внутренние водоемы Западной Европы, Северной Африки, Аравии, в Средиземноморье, Средней, Южной и Восточной Азии, южных частях Северной Америки. В Туркменистане – на внутренних водоемах и Каспийском побережье.

Образ жизни: пролетная, частично летующая и зимующая птица. Отлет и весенний пролет – с середины марта до конца мая. Летующие – в июне-июле. Осенний пролет – с августа по ноябрь. Питается мелкими моллюсками, ракообразными, яйцами и личинками насекомых, изредка семенами водорослей (рупии и наяды).

Статус: обычный, особенно на

Maýda balykgulaklar, leňneççekilliler, mör-möjekleriň ýumurtgalary we liçinkalary, suwotularyň tohumlary bilen seýregräk iýmitlenýär.

Statusy: adaty, aýratyn-da, Hazar deňziniň kenarýakasynda görnüş.

140. Bellik: Amerikanyň we Ýewropanyň demirgazyk çetlerinde höwürtleýän **deňiz çäge çulugy – *Calidris maritima*** Hazar deňzinde bit gezek (1972 ý.) tötänden gabat gelyär. Ol ölçegleri meňzeş bolan çuluklaryň ählisinden aýaklarynyň sarydygy ýada çalymtyl-sarydygy we has garamtyl reňklidigi bilen tapawutlanýar.

141. Batga çulugy – *Limicola falcinellus* – Грязовик

Meýdan alamatlary: gara reňkli çüňküniň ujy aşaklygyna egmek, serçe ölçegli maýda çuluk. Aýaklary goýy-çal ýa-da çalymtyl-goňur. Uly guşlaryň üstki tarapy garamtyl-goňur, ala, döşi çyparrak-goňur menekli, garny ak. **Kellesi goňur we gapdallaryndan (biri gözünüň üstünde) geçýän ik sany ak zolakly.** Gyşyna üsti çalymtyl, garny agymtyl. Ýaşlary gyşky ýelek örtüginde ýaşı ýeten guşlara çalymdaş. Horazlarynyň ganaty - 115-129, mäkiýanlarynyňky - 114-125 mm, agramy - 45-50 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çüňküniň aşaklygyna egmekdigi we gapdallaryndan gysylandygy (gapdalyndan ýogyn ýaly bolup görünýär) beýleki çäge çuluklardan; ölçegleriniň kiçidigi we aýaklarynyň garamtyldygy bilen tüýs ebekden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän döwründe Ýewraziýanyň tundra zolagynda, uçup geçende günortada giň ýaýran. Türkmenistanda Hazar deňziniň kenarýakasynda we içki suw

побережье Каспийского моря, вид.

140. Примечание: на Каспии спорадично залетает (с 1972 г.) – **морской песочник – *Calidris maritima***, который гнездится на крайнем севере Америки и Европы. От всех других куликов сходной величины он отличается желтыми или серовато-желтыми ногами и, в целом, более темной окраской.

Полевые признаки: мелкий, размером с воробья, кулик с изогнутым книзу на конце клювом черного цвета. Ноги темно-серые или серовато-бурые. У взрослых птиц верх черновато-бурый, пестрый, грудь рыжеватобурая с пестринами, брюшко белое. **На голове: продольная бурая и две боковые (одна уже над глазом) белые полоски.** Зимой верх сероватый, брюшко беловатое. Молодые птицы похожи на взрослых в зимнем оперении. Крыло самцов – 115-129, самок – 114-125 мм, вес – 45-50 г.

Сходства – отличия: от других песочников отличается изогнутым книзу и уплощенным с боков клювом (в профиль кажется толстым), от гаршнепа – мелкими размерами и темными ногами.

Распространение: в гнездовой период – тундры Евразии, на пролете – широко к югу. В Туркменистане – на Каспийском побережье, реже по внутренним водоемам. Зи-

ятаklarynda seýregräk. Arabystanyň, Günorta Afrikanyň, Günorta, Günorta-Gündogar Aziýanyň, Awstraliýanyň kenarýakalarynyň käbir ýerlerinde guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän guş. Ýazyna aprel-maýda, güýzine – awgustyň aýagynda we oktýabryň başynda uçup geçýär. Iýmiti edil beýleki çäge çuluklarynyňky ýaly.

Statusy: az öwrenilen, seýrek görnüş.

142. Ýakaly çuluk – *Philomachus pugnax* – Турухтан

Meýdan alamatlary: uzyn aýakly we başgalara garanynda gysga çüňkli, gumry ölçegli, uly çuluk. Horazlarynyň arkasy jübütleşýän döwründe ala, çyparrak öwüşginli garamtyl-goňur. Döşi meneksiz sarymtyl, garny ak. Jübütleşýän wagty boýnundan “ýaka” häsiýetli dürli reňkdäki (ak, çypar, gara) uzyn ýeleklere ösüp çykýar. Çüňküne ýanaşyk derisi ýalaňaç, siňňilli. Çünki we aýaklary sary, gyzyly, mämişi ýaly dürli reňklerde bolmagy mümkin. Mäkiýany horazyndan kiçi we onuň jübütleşme bezegi has ýönekeý. Horazynyň we mäkiýanynyň **gyşky ýelek örtügi, bizde duşýan wagty, birmeňzeş reňkli. Arkasy çalymtyl-goňur. Kellesi, boýny we döşi çyparrak-goňur, garny ýagty çyparrak - goňur tegmilli.** Ýaşlary gyşky ýelek örtüginde ulularyna çalymdaş, ýöne bokurdagy, garny we guýrugynyň aşagyndaky ýeleklere ak. Horazlarynyň ganaty - 167-193, mäkiýanlarynyňky - 145-160 mm, horazlarynyň agramy - 130-235, mäkiýanlarynyňky - 95-120 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: köpelyän döwürde “ýakalyk” we “gu-

мует местами по побережью Аравии, Южной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии.

Образ жизни: перелетная птица. Весенний пролет – в апреле-мае, осенний – в конце августа и начале октября. Питание как и у других песочников.

Статус: малоизученный, редкий вид.

Полевые признаки: крупный кулик, размером тела с горлицу, на длинных ногах и с относительно коротким клювом. В брачный период самцы сверху пестрые, черноватобурые с рыжеватым отливом. Грудь с желтизной без пестрин, брюшко белое. На шее в брачный период отрастают характерные «воротники» из длинных перьев различного цвета (белых, рыжих, черных). Возле клюва кожа голая, бородавчатая. Клюв и ноги могут быть окрашены в различные цвета – желтый, красный, оранжевый. Самки мельче самцов, и их брачный наряд более скромный. **В зимнем оперении, когда встречаются у нас, самцы и самки окрашены сходно. Спина сероватобурая. Голова, шея и грудь рыжеватобурые, брюшко светлое с рыжеватобурыми пятнами.** Молодые птицы похожи на взрослых в зимнем перье, но с белым горлом, брюшком и нижними кроющими хвоста. Крыло у самцов – 167-193, у самок – 145-160 мм, вес самцов – 130-235 г, самок – 95-120 г.

Сходства – отличия: в период размножения хорошо отличается

lak" bezegleriniň bardygy bilen oňat tapawutlanýar, **emma onuň bizde höwürtegelemeyändig sebäpli, jübütleşýän bezeginde duşmaýar.** Güzki-gyşky ýelek örtüginde uzyn aýaklarynyň has çalymtyl-ýaşyl reňki olary beýleki çäge çuluklardan; reňkiniň çyppak öwüşgindedigi we has gysga çüňklidigi ulitlerden tapawutlandyryýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän döwründe Ýewraziýanyň otluk, batgalyklarynda we günorta tundranyň çemenliklerinde, tokaýly zolakda we bölekleyin tokaýly sähralykda. Uçup geçende Afrika we Günorta Aziýa çenli hemme ýerde, şol ýerlerde hem gyşlaýar. Türkmenistanda içki suw ýataklarda we Hazaryň kenarýakasynda.

Ýaşayşy: uçup geçýän, bölekleyin gonup-uçup gezyän guş. Ýazyna-mart-maýda uçup geçýär, gonup-uçup gezyänleri iýun-iýulda gabat gelýär, güzüne – awgust-sentyabrda we oktyabryň başynda uçup geçýär. Dürli maýda suw oňurgasyzlygy bilen iýmitlenýär.

Statusy: köp sanly däl görnüş, ikinji derejeli aw guşy.

143. Tüýs ebek – *Lymnocyptes minimus* – Гаршнеп

Meýdan alamatlary: serçeden ulurak maýda çuluk. Çüňki orta uzynlykda, aýaklary gysgarak, uzyn barmakly sarymtyl-goňur reňkli. Tomsuna **arkasy metal öwüşginli garamtyl-goňur we anyk saýgardýan çyppak reňkli dik zolakly.** Döşi gülgüneräk goňur menekli, garny ak. Ganatlarynyň üstki tarapy garamtyl, aşagy açyk reňkli. Depesi gara, gözünüň üsti ýagty zolakly, bokurdagy agymtylrak çyppak menek-

наличием украшающих «воротников» и «ушек», но **у нас не гнездится и поэтому в брачном наряде встречается редко.** В осенне-зимнем наряде от других куликов-песочников отличается более длинными ногами серо-зеленого цвета, от улитов – рыжеватыми тонами в окраске и более коротким клювом.

Распространение: в гнездовой период – травянистые болота и луга южных тундр, лесотундр, лесной зоны и частично лесостепи Евразии. На пролете к югу повсеместно до Африки и Южной Азии, где зимуют. В Туркменистане – внутренние водоемы и побережье Каспия.

Образ жизни: перелетная, частично летующая птица. Весенний пролет в марте-мае, летующие – в июне-июле, осенний пролет – в августе-сентябре и начале октября. Питается различными мелкими водными беспозвоночными.

Статус: немногочисленный вид, второстепенный объект охоты.

Полевые признаки: мелкий кулик, крупнее воробья. Клюв средней длины, ноги невысокие желтовато-бурого цвета с длинными пальцами. Летом **спина черновато-бурая с металлическим блеском и выраженными продольными полосами рыжего цвета.** Грудь палевая с продольными бурыми пестринами, брюшко белое. Крылья сверху темные, снизу – светлые. Темя черное, над глазом

li. Uly we ýaş guşlar meňzeş reňkli, ýöne güýz-gyş wagtlary öçügsiräk (köplenç bizde şol döwürde ýyguygydan duşýar). Arkasyndaky zolaklary anyk saýgarylýar, ýöne metal öwüşgini bolmaýar. Sesi basyk - "totrok-totrok-totrok", emma, ol adatyça, dymyp gezyär. Iňrik garalanda we gijesine işjeň. Horazlarynyň ganaty - 106-118, mäkiýanlarynyňky - 102-113 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň kiçidigi bilen ebekden, çüňküniň inçeden gönüdigini we aýaklarynyň sarymtyl-goňurdygy bilen batga çulugyndan oňat tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeleýän bölegi Ýewraziýanyň tundra zolagynyň günortasy we tokaýly tundrasy. Uçup geçende giňişleýin duşýar. Türkmenistanda içki suw ýataklarda we Hazar deňziniň kenarýakasynda. Ýewropanyň günbatar çetlerinde, Ortaýer deňzinde, Merkezi Afrikada, Zakawkazýada, Alynky we Günorta (Hindistanda) Aziýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, bir bölegi Hazar deňzinde gyşlaýan görnüş. Ýazyna-martyň ortasyndan maýyň ortasyna çenli, güzüne – sentýabr-oktyabrda, gijä galanlary noýabrda uçup geçýärler. Gyş ýyly gelende osoblary dekabir-fewralda ýekelikde duşýar. Gurçuklar, balykgulaklar we maýda mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: az öwrenilen, seýrek görnüş.

144. Ebek – *Gallinago gallinago* – Бекас

Meýdan alamatlary: **uzyn çüňkli** we özgelere garanynda gysga aýakly, ýaşylymtyl öwüşginli, çal reňkli,

светлая полоска, горло белесое с рыжими пестринами. Взрослые и молодые птицы окрашены сходно, но в осенне-зимнее время – тусклее (в это время у нас встречается чаще). Полосы на спине выражены четче, а металлический блеск отсутствует. Голос – глухое «тотрок-тотрок», но, обычно, молчалив. Активен в сумерки и по ночам. Крыло самцов – 106-118, самок – 102-113 мм.

Сходства – отличия: от бекасов хорошо отличается мелкими размерами, от грязовика – прямым тонким клювом и желто-бурими ногами.

Распространение: гнездовая часть ареала – южные тундры и лесотундра Евразии. На пролете – шире. В Туркменистане – на внутренних водоемах и Каспийском побережье. Зимует на крайнем западе Европы, в Средиземноморье, Центральной Африке, Закавказье, Передней и Южной (Индостан) Азии.

Образ жизни: пролетный вид, часть особей зимует и на Каспии. Весенний пролет – с середины марта до середины мая, осенний – в сентябре-октябре, позднепролетные – в ноябре. В теплые зимы одиночные особи встречаются в декабре-феврале. Питается червями, моллюсками и мелкими насекомыми.

Статус: малоизученный редкий вид.

Полевые признаки: крупнее скворца, **с удлинненным клювом** и относительно короткими ногами

sardan ulurak çuluk. **Kellesinň üsti goňurrak-gara, depesiniň ortasy insiz, açyk çypar zolakly we gözünüň üsti inli, edil şonuň ýaly reňkli.** Uly guşlaryň üstki ýelek örtügi tutuşlygyna garamtyl we ýagty menekli sarymtyl-goňur reňkli. Boýny, petekesi we döşi hem dik geçýän garamtyl zolakly sarymtyl-goňur, ýöne garny we böwürleri ak. Goltugynyň aşagy kese geçýän zolakly ak. Ululary we ýaşlary meňzeş, emma güýz-guş döwründe (bizde duşýan wagtlary) – öçügsi reňkli. Çünki inçe uýy, sähelçe ýasy. Üstki çüňküniň uýy gara açykgoňur, aşakysynyň – uýy garamtyl-gyzyl reňkli. Gözleri uly, gara. Iňrik garalanda we gijelerine işjeň. Uçup geçende sessiz, emma ürküzilen ýagdaýynda “szwek” ýaly ses çykarmagy mümkin. Horazlarynyň ganaty - 125-135, mäkiýanlarynyňky - 124-132, çünki - 62-76 mm, agramy - 93-145 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçeginiň sähelçe kiçidigi, ak garnynyň tegmilsizdigi we guýrugynyň çetki ýeleklerinde ak reňkiň ýokdugy, guýrugynyň tutuşlygyna çyparak öwüsginlidigi bilen uly jeňnel ebekden, döşüniň dik tegmilenen goňurdygy bilen ebekden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: orän giň, arealynda höwürtegeýän bölegi Ýewraziýanyň we Demirgazyk Amerikanyň demirgazyk we aram giňişlikleri. Uçup geçende has giňişleýin duşýar. Türkmenistanda içki suw ýataklarda we Hazar deňziniň kenarýakasynda. Günbatar we Günorta Ýewropada, Demirgazyk we Merkezi Afrikada, Kiçi, Alynky, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýada, Demirgazyk Amerikada guşlaýar.

серого цвета с зеленоватым отливом. **Верх головы буровато-черный, посередине темени узкая светло-рыжая полоска и широкая того же цвета над глазами.** Сверху оперение взрослой птицы, в целом, желто-бурого цвета с темными и светлыми пестринами. Шея, зоб и грудь тоже желтовато-бурые с темными продольными полосками, но брюшко и бока белые. Подмышечные белые с поперечными полосками. Взрослые и молодые окрашены сходно, но в осенне-зимний период (когда у нас встречаются чаще) – тусклее. Клюв тонкий с небольшим уплощением на конце. Надклювье светло-бурое с черным окончанием, подклювье – темно-красного цвета с темным концом. Глаза большие, темные. Активен в сумерки и по ночам. На пролете молчалив, но при испугивании может издавать что-то вроде «цжвек». Крыло самцов – 125-135, самок – 124-132, клюва – 62-76 мм, вес – 93-145 г.

Сходства – отличия: от дупеля отличается чуть меньшим размером, белым брюшком без пестрин и крайними перьями хвоста без белого цвета, общим рыжеватым тоном хвоста; от бекаса-отшельника – бурой с продольными пестринами грудью.

Распространение: очень широкое, гнездовая часть ареала – северные и умеренные широты Евразии и Северной Америки. На пролете – гораздо шире. В Туркменистане на внутренних водоемах и Каспийском побережье. Зимует в Западной и Южной Европе, Северной и Центральной Африке, Малой,

Ýaşayşy: uçup geçýän guş, bir böleginiň guşlamaga galmaklary mümkin. Ýazyna - mart-maýda, güýzine-awgustyň aýagyndan noýabr aralykda uçup geçýär. Howa şerti amatly bolan guşlarda osoblary ýekelikde we maýda toparlary dekabir-fewralda Hazar deňziniň kenarýakasynda gabat gelyär. Gurçuklar, mör-möjekler we olaryň içinkalaryny bilen iýmitlenýär.

Statusy: ikinji derejeli aw guşy, emma köp sanly däl görnüş.

145. Uly jeňnel ebegi – *Gallinago media* – Дупель

Meýdan alamatlary: ölçegleri we reňkleri ebege örän çalymdaş, emma çünki başgalara garanyňda gysga we inli. **Bedeniniň aşaky bölegi köpsanly menekli.** Çetki guýruk ýelekleri arassa ak, ýöne gara zolaklylarynyň bolmagy hem mümkin. Oturan ýagdaýynda guýrugy ganatlarynyň ýygnalan uýjandan az-owlak çykyr durýar. Ýaşy ýeten we ýaş guşlar guşyna öçügsi we gowşak garşylykly reňkli. Ümsüm, käte basyk we pessaý “ryah-gryah” sesi çykarýar. Horazlarynyň ganaty - 125-139, mäkiýanlarynyňky - 124-136, çünki - 62-74 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: uçanda ýa-da gonanda ak tegmil ýaly görünüň, **çetki guýruk ýelekleriniň açyk akdygy bilen** beýleki ebeklerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeýän bölegi Ýewraziýanyň (gündogara Ýeniseý derýasyna çenli) demirgazyk we aram giňişlikleri. Uçup geçende giňişleýin duşýar, aýratynda, Ýewropada. Türkmenistanda içki suw ýataklarda we Hazar deňziniň kenarýakasynda. Merkezi we Günorta

Передней, Южной и Юго-Восточной Азии, Центральной Америке.

Образ жизни: пролетная птица, часть особей может оставаться на зиму. Весенний пролет – в марте-мае, осенний – с конце августа и по ноябрь. Одиночные особи и мелкие стайки в благоприятные зимы встречаются на Каспийском побережье в декабре-феврале. Питается червями, насекомыми и их личинками.

Статус: второстепенный объект охоты, но немногочислен.

Полевые признаки: размером и окраской очень похож на бекаса, но клюв относительно короче и шире. **Нижняя часть тела с большим количеством пестрин.** Крайние хвостовые перья чисто белые, но могут быть и с черными полосками. В сидячем положении у птицы хвост несколько выступает за обрез сложенных крыльев. Взрослые зимой и молодые окрашены тусклее и не так контрастны. Молчалив, иногда издает глухое и низкое «рях-грях». Крыло самцов – 125-139, самок – 124-136, клюв – 62-74 мм.

Сходства – отличия: от других бекасов отличается **ярко белыми крайними перьями хвоста**, которые при взлете или посадке бросаются в глаза как светлые пятна.

Распространение: гнездовая часть ареала – северные и умеренные широты Евразии (на восток до Енисея). На пролете встречается шире, особенно в Европе. В Туркменистане – на внутренних водоемах и морском побережье. Зимует в Центральной и Южной Африке.

Afrikada gyslaşýar.

Ýaşasy: bizde uçup geçýän guş. Ýazyna-martyň aýagyndan maýyň ortasyna çenli, güýzine – awgust-oktyabrda uçup geçýär. Iňrik garalanda we gijelerine ýerdäki gurçuklar we maýda mör-möjekler bilen ýmitlenýär.

Statusy: az öwrenilen, seýrek görnüş.

146. Uly dag ebeği – *Gallinago solitaria* – Горный дупель

Meýdan alamatlary: reňki ebege we jeňnel uly ebeğine çalymdaş, ýöne ulurak we uzynrak bolup görünýär. **Tomsuna uly guşlar birmeňzeş reňkli, emma depesinde dik geçen çypar zolagy bolmaýar we çünki gysga, döşi kese ak zolakly sarymtyl-goňur. Ganatlarynyň yzky gyralary insiz ak zolakly.** Gyşyna ýaşy ýeten we ýaş guşlar öçügsi reňkli. Ganaty - 154-167 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **depesinde çypar reňkli zolagyň ýokdygy we sarymtyl-goňur döşüniň kese ak zolaklydygy** bilen ebekleriň ählisinden tapawutlanýar. Uçan wagtynda ebege däl-de tokaý ebeğine köp çalymlary edýär.

Ýaýran ýerleri: Gazagystanyň, Orta, Merkezi we Gündogar Aziýanyň, Gimalaý daglarynyň daglyk ýerleri. Türkmenistanda wagtal-wagtal Köpetdagda we Köýtendagda duşýar.

Ýaşasy: iňrik garalanda we gijesine işjeň gezyär. Adatça, çeşmeleriň we çeşmejikleriň töwereginde saklanýar. Jykjyklar, olaryň içinkalary we beýleki maýda oňurgasyzlar bilen ýmitlenýär.

Statusy: öwrenilmedik, örän seýrek görnüş.

Образ жизни: у нас пролетная, единично зимующая птица. Весенний пролет – с конца марта и до середины мая, осенний – в августе-октябре. Кормится земляными червями и мелкими насекомыми в сумерках и по ночам.

Статус: малоизученный, редкий вид.

Полевые признаки: окраской похож на бекаса и дупеля, но крупнее и выглядит длиннее. **Взрослые летом окрашены одинаково, но на темени нет продольной рыжей полоски и клюв короче, грудь желтовато-бурая с поперечными белыми полосками. По заднему краю крыла – белая узкая полоса.** Взрослые зимой и молодые окрашены тусклее. Крыло – 154-167 мм.

Сходства – отличия: от всех бекасов отличается отсутствием **полоски рыжего цвета на темени и желтовато-бурой грудью с белыми поперечными полосками.** В полете больше напоминает вальдшнепа, а не бекаса.

Распространение: горные области Казахстана, Средней, Центральной и Восточной Азии, Гималаи. В Туркменистане – спорадически в Копетдаге и Койтандаге.

Образ жизни: активен в сумерки и по ночам. Обычно держится у родников и ключей. Питается жуками, их личинками и другими мелкими беспозвоночными.

Статус: почти не изученный, очень редкий вид.

147. Tokaý ebeği – *Scolopax rusticola* – Вальдшнеп

Meýdan alamatlary: açyk-goňur ýa-da goňurak-gyzyl, uýy garamtyl uzyn çüňkli, **gysgarak çalymtyl-gyzyl ýa-da goňur aýakly, kepderiden tokarrak**, ölçegli uly çuluk. Ululary we ýaşlary meňzeş reňkli, emma olar uçup geçenlerinde we güýz-gyş döwründe garamtyrak görünýär. Adatça, **bedeniniň üsti çal, poslurak-çypar we gara-goňur kese zolakly. Depesiniň yzky tarapy we ýeňsesi gara-goňur inli kese zolakly.** Maňlaýy küli reňkli. Bedeniniň garyn bölegi goňur kese zolakly çypparak-çal, bokurdagy ak. Gözleri gara, uly, ýeňsesine tarap şüýşen. Çuluk diňe “tapyşyk” döwründe, ýagny höwürtegeýän ýerlerindäki wak-wakda sesleri çykýar, Türkmenistanda höwürtegelemeýär, sonuň üçin hem ümsüm. Horazlarynyň ganaty - 18.3-20.3, mäkiýanlarynyňky – 18.3-20.5, çünki – 6.9-8.4 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçeg-leriniň uludygy bilen ebekleriň ähli-sinden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeýän bölegi Ýewraziýanyň tokaýly sähra we tokaý zolaklary. Uçup geçende has giňişleýin duşýar. Türkmenistanda Hazar deňziniň kenarýakasynda, derýalaryň jülgerlerinde we oazislarda, hatda dag derýajyklarynyň agaç-gyrymsy agaçly ýerlerinde. Ýewropanyň günortasynda, Demirgazyk Afrikada we Aziýanyň günorta-gündogarynda, günortasynyň käbir ýerlerinde gyslaşýar.

Ýaşasy: uçup geçýän we gyslaşýan guş. Ýazyna-martyň aýagyndan we maýda, güýzine – sentýabr-

Полевые признаки: крупный кулик размером **больше голубя на невысоких серовато-красных или бурых ногах** с длинным светло-бурым или буровато-красным клювом с темным концом. Взрослые и молодые окрашены сходно, но во время полета в осенне-зимнее время они темнее. Обычно **верх тела в серых, ржавчато-рыжих и черно-бурых поперечных полосках. Задняя часть темени и затылок с широкими черно-бурыми поперечными полосками.** Лоб пепельный. Брюшная часть тела рыжеватая-серая в бурых поперечных полосках, горло белое. Глаза черные, большие, смещенные к затылку. Голос подает только во время «тяги», то есть при токовании в местах гнездования, в Туркменистане не гнездится, поэтому молчалив. Длина крыла самцов 18.3-20.3, самок 18.3-20.5, клюва 6.9-8.4 см.

Сходства – отличия: от всех бекасов отличается крупным размером.

Распространение: гнездовая часть ареала – лесостепная и лесная зоны Евразии. На пролете – значительно шире. В Туркменистане – по Каспийскому побережью, долинам рек и оазисам, но в местах с древесно-кустарниковой растительностью даже вдоль горных речек. Зимует на юге Европы, в Северной Африке и юго-востоке, местами на юге Азии.

Образ жизни: пролетная и зимующая птица. Весенний пролет – с конца марта и еще в мае. Осенний

no-ýabrda uçup geçýär. Iňrik garalanda we gijesine ýaşyryn gezyär. Toprakdan ýaguş gurçuklary we mör-möjekleriň liçinkalaryny köwläp iýmitlenýär.

Statusy: bizde ýeterlik öwrenilmedik, seýrek görnüs, ikinji derejeli aw guşy.

148. Uly ikburun – *Limosa limosa* – Большой веретенник

Meýdan alamatlary: kepderiden ulurak ölçegli, uzyn gara ayakly we uzyn, uýy gara, göni çüňkli çuluk. Tomsuna möwsümünde uly guşlar meňzeş reňkli däl. Horazyň döşi we böwürleri goňur ýa-da çypar kese zolakly. Garny, guýrugyny ýapyjy ýelekleri, goltugynyň aşagy we ganatларыnyň aşagy ýüzi ak. Guýrugy gara, düýbi ak we onuň gyralarynda ak reňk agdyklyk edýär. Kellesi, **boýny, petekesi we döşüniň öňki bölegi çypar reňkli**. Kellesiniň üsti goýy-goňur zolakly. Tomsuna mäkiýanyň çypar reňki az. Arkasyndaky çalymtyl-goňur reňk goýalýar. Ýelek örtüginde çypar reňk tutuk-çal bilen çalyşýar. Uly we ýaş guşlar **güýž-gyş döwründe ýumşak goňur öwüşginleriň köpelmeginde meňzeş reňkli** we ýelekleri anyk bolmadyk nagyşly. Sesi bölünip-bölünip çykýan - “tiwek-tiwek”. Horazларыnyň ganaty - 166-225, mäkiýanyňky – 192-229 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **çüňküniň gönüden uzyndygy, guýrugynyň akdygy we ganatларыnyň yzky gyrasynyň gara zolaklydygy** bilen ýylkyçylardan we kiçi ikburundan tapawutlanýar. Uçup barýarka **ganatларыndaky ak zolak we gara ayakларыnyň has yza çyкуп durýadygy** oňat görünýär.

– в сентябре-ноябре. Ведет скрытный сумеречный и ночной образ жизни. Питается дождевыми червями и личинками насекомых, извлекающая их из грунта.

Статус: у нас недостаточно изученный, редкий вид, второстепенный объект охоты.

Полевые признаки: размером крупнее голубя, на высоких ногах черного цвета и длинным прямым клювом, темным на конце. В летний сезон взрослые окрашены неодинаково. У самца грудь и бока с поперечными бурыми или рыжими полосами. Брюхо, нижние кроющие хвоста, подмышки и испод крыла – белые. Хвост черный, у основания белый и по его краям белого цвета больше. Голова, **шея, зоб и передняя часть груди рыжие**. Верх головы с темно-бурыми полосками. Самки летом менее рыжие. На спине сильнее проявляется серовато-бурый цвет. Рыжий цвет в оперении заменен дымчато-серым. Взрослые и молодые птицы **в осенне-зимнее время окрашены сходно, с преобладанием мягких бурых тонов** и неясным рисунком оперения. Голос – отрывистое «ти-век-тивек». Крыло самцов – 166-225, самок – 192-229 mm.

Сходства – отличия: от кроншнепов и малого веретенника отличается **прямым длинным клювом с белым хвостом и черной полосой по заднему крылу**. В полете – хорошо заметной **белой полосой на крыле и далеко выступающими назад черными ногами**.

Ýaýran ýerleri: giň, emma endigan däl. Arealynda höwürtegeýän bölegi Ýewrazyanyň aram giňişligi, uçup geçende giň ýaýran. Türkmenistanda içki suwlarda we deňziň kenaryakasynda. Günorta-Günbatar Ýewropada, Ortaýer deňzinde, Hazar deňziniň günortasynda we Pars aýlagynda, Merkezi Afrika-da, Hindistanyň demirgazygynda, Günorta-Gündogar Aziýada we Awstraliýada gyşlaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän, bölekleýin gonup-uçup gezyän we gyşlaýan guş. Ýazyna - mart-maýda, gonup-uçup gezyänleri iýun-awgystda seýregräk duşýar. Güýzine – sentýabr-noýabrda uçup geçýär, amatly şertli ýyllarda – dekabir-fewralda gyşlaýar. Käbir ýyllarda güýzki uçup geçmegi iýulyň aýagyndan noýabra çenli dowam edýär. Dürli suw oňurgazyzlary bilen iýmitlenýär.

Statusy: ýeterlik öwrenilmedik, köpsanly däl, sany azalýan görnüş. Höwesjeň awçylaryň ikinji derejeli aw guşy.

149. Kiçi ikburun – *Limosa lapponica* – Малый веретенник

Meýdan alamatlary: gara reňkli, uzyn ayakly we goňur reňkli ýokaryk çalaja gaýşak uzyn çüňkli kepderi ölçegli uly çuluk. Tomsuna ýaşy ýeten guşlar uly ikburunyň horazларына çalymdaş, emma **açyk we goýy-çypar reňki bedeniniň aşak tarapyň hemme ýerine, hatda guýrugynyň aşakларына hem ýaýrap**, onda garamtyl kese menekler bolýar. Güýzki migrasiýa döwründe uly we ýaş guşларыň reňkinde açyk öwüşginler azalyp, çägereňk-goňur ýokundylar köpelyär. Sesi uly ikburunyňka çalym-

Распространение: широкое, но не равномерное. Гнездовая часть ареала – умеренные широты Евразии, на пролете – шире. В Туркменистане – внутренние водоемы и морское побережье. Зимует в Юго-Западной Европе, Средиземноморье, на юге Каспия и в Персидском заливе, Центральной Африке, на севере Индостана, в Юго-Восточной Азии и Австралии.

Образ жизни: пролетная и зимующая, частично летующая птица. Весенний пролет – в марте-мае, летующие – изредка в июне-августе. Осенний пролет – в сентябре-ноябре, зимуют в благоприятные годы – в декабре-феврале. В отдельные годы осенний пролет тянется с конца июля до ноября. Питается различными водными беспозвоночными.

Статус: недостаточно изученный, немногочисленный вид, численность сокращается. Второстепенный объект любительской охоты.

Полевые признаки: крупный кулик размером с голубя, на высоких ногах черного цвета и длинным слегка вздернутым кверху клювом темно-бурого цвета. Взрослые птицы летом похожи на самцов большого веретенника, но **рыжий цвет ярче и гуще, распространяется по всему низу тела, включая подхвостье** с темными поперечными пестринами на нем. Взрослые птицы и молодые осенью в период миграций окрашены менее ярко с преобладанием песочно-бурых

daş – “tewe-tewe”. Horazlarynyň ganaty - 199-223, mäkiýanlarynyňky – 199-239 mm, agramy - 194-310 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **çüňküniň ýokaryk gaýşakdygy (jaýty), ganatlarynda ýagty ak zolagyň ýokdygy we aýaklarynyň has gysgadygy** (aýratyn-da, uçup barýarka aýdyň görünýär) bilen uly ikburundan anyk tapawutlanýar

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeleýän bölegi Ýewraziýanyň tundra we tokaýly tundra zolagy. Uçup geçende giň ýaýran. Türkmenistanda Hazar dňziniň kenarýakasynda we içki suw ýataklarda. Günbatar Ýewropanyň, Günbatar, bölekleyin Gündogar Afrikanyň, Pars aýlagynyň, Günorta-Gündogar Aziýanyň we Awstraliýanyň deňizleriniň kenarýakalarynda, gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän we bölekleyin gonup-uçup gezýän guş. Ýazyna martyň aýagynda we maýda, gonup-uçup gezýänleri iýun-awgustda duşýar. Güýzine – sentýabr-noýabrda uçup geçýär. Aglaba, mörmöjekler we olaryň liçinkalary bilen iýmitlenýär.

Statusy: az öwrenilen, seýrek görnüş.

150. Orta ýylkuçy – *Numenius phaeopus* – Средний кроншнеп

Meýdan alamatlary: gara reňkli aýaklary, başgalara garanyňda, uzyn we orta uzynlykdaky **aşaklygyna egmek goňur çüňkli**, kepderi ölçegli uly çuluk. Tomsuna ýaşy ýeten guşlar uly ýylkuça çalymdaş, **ýöne depesi goýy reňkli, ortasy kese geçýän ачык-çуpar zolak bilen bölünen** we gözleriniň üsti ýagty gaşly. Güýzüne we guşyna uly, ýaş guşlaryň reňk

тонов. Голосом похож на большого веретенника – «теве-теве». Крыло самцов – 199-223, самок – 199-239 мм, вес – 194-310 г.

Сходства – отличия: от большого веретенника отличается заметно **вздернутым кверху клювом, отсутствием яркой белой полосы на крыльях и более короткими ногами** (особенно заметно в полете).

Распространение: гнездовая часть ареала – тундра и лесотундра Евразии. На пролете – шире. В Туркменистане – на Каспийском побережье и внутренних водоемах. Зимует на морских побережьях Западной Европы, Западной и, частично, Восточной Африки, Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Австралии.

Образ жизни: перелетная и изредка летующая птица. Весенний пролет – с конца марта и в мае, летующие – в июне-августе. Осенний пролет – в сентябре-ноябре. Питается, преимущественно, насекомыми и их личинками.

Статус: малоизученный редкий вид.

Полевые признаки: крупный кулик размером с голубя, на относительно высоких ногах черного цвета и со средней длины бурым **клювом, изогнутым книзу**. Взрослые птицы летом похожи на большого кроншнепа, но имеют **темно окрашенное темя, разделенное посередине светло-рыжей продольной полосой** и со светлыми

öwüşgini az täsirli, olar bir reňkde. Sesi – “kireý-tiri-kireý-tiri”. Horazlarynyň ganaty - 218-254, mäkiýanlarynyňky – 222-252, horazlarynyň çüňki – 65-85, mäkiýanlarynyňky – 75-90 mm, agramy - 335-415 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: kellesiniň reňki – **depesiniň ortasyndaky ачык-çуpar zolak görnüşdäki “ýelekleriň аçылан çузыgy”** bilen ýylkuçlaryň ählisinden oňat tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeleýän bölegi ala we endigan däl bolup, Ýewraziýanyň we Demirgazyk Amerikanyň demirgazyk etraplaryny gabaýar. Uçup geçende giň ýaýran. Türkmenistanda içki suw ýataklarda we deňziň kenarýakalarynda. Afrikanyň, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýanyň, Awstraliýanyň, Merkezi we Günorta Amerikanyň kenarýakalarynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän we bölekleyin gonup-uçup gezýän guş. Ýazyna giç - aprelden-iýunyň başyna çenli, gonup uçup gezýänleri - iýulda duşýar. Güýzine – awgust-oktyabrda, giçkileri – noýabra çenli uçup geçýär. Mörmöjekler we olaryň liçinkalary bilen iýmitlenýär.

Statusy: ýeterlik öwrenilmedik, seýrek görnüş. Ikinji derejeli aw guşy.

151. *Bellik:* Türkmenistanyň çaklerinde **inçe çüňkli ýylkuçynyň *Numenius tenuirostris*** gabat gelmegi mümkin. Ýaşy ýeten inçeçüňk ýylkuçylar uly ýylkuçlara örän meňzeş, emma reňki ачыgrак we kiçiräk. Çüňki gysga we inçe, аýratyn-da, onuň uç tarapy. Onuň ýene-de bir wajyp alamaty - kellesinde gara

бровями над глазами. Осенью и зимой взрослые и молодые окрашены менее выразительно, они более однотонны. Голос – «кирей-тири-кирей-тири». Крыло самцов – 218-254, самок – 222-252, клюв у самцов – 65-85, у самок – 75-90 мм, вес – 335-415 г.

Сходства – отличия: от всех кроншнепов хорошо отличается окраской головы – **светло-рыжей полоской в виде «пробора» посередине темени**.

Распространение: гнездовая часть ареала мозаична и неравномерно охватывает северные районы Евразии и Северной Америки. На пролете шире. В Туркменистане – внутренние водоемы и морское побережье. Зимует по побережьям Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии, Центральной и Южной Америки.

Образ жизни: пролетная, частично летующая птица. Весенний пролет поздний – с апреля и до начала июня. Летующие – в июле. Осенний пролет ранний – в августе-октябре, позднепролетные – до ноября. Питается насекомыми и их личинками.

Статус: недостаточно изученный, редкий вид. Второстепенный объект охоты

151. *Примечание:* На территории Туркменистана не исключены спорадические встречи **тонкоклювого, или малого кроншнепа - *Numenius tenuirostris***. Взрослые тонкоклювые кроншнепы очень схожи с большими кроншнепами, но явно светлее и мельче. Клюв относительно короткий и тонкий,

zology we depesinde “ýelekleriň açylan çyzygy” ýok. Örän seýrek uçup geçýär, heniz öwrenilmedik güş, MSOP-ýň Gyzyl sahypasyna girizilen. Tebigatda ýylkuçylary tapawutlandyrmak kyn, awçylaryň okundan inçe çüňkli ýylkuçyny goramak üçin, uly we orta ýylkuçylara aw etmegi gadagan etmek zerur.

152. Uly ýylkuçy – *Numenius arquata* – Большой кроншнеп

Meýdan alamatlary: gargadan ulurak, uzyn garamtyl aýakly we goýu-goňur reňkli aşaklygyna egmek uzyn çüňkli, uly ölçegli çuluk. Horazy mäkiýanyna meňzeş. **Ýelek örtügininiň üsti garamtyl bellikli çägereňkli-goňur, aşak tarapy – agymtyl inçe dik menekli.** Ýaşlary uly guşlara çalymdaş, emma göni we gysga çüňkli. Sesi pessaý sykylyk - “kuup-lir-li”. Horazlarynyň ganaty - 288-334, mäkiýanlarynyňky - 275-326, ulularynyň çüňki - 116-179, ýaşlarynyňky, kâte gysga - 110 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **depesiniň birmeňzeş reňkdedigi** - orta ýylkuçydan, **bedeniniň gapdallarynda häsiýetli tegmillidigi** - inçe çüňkli ýylkuçydan we **olaryň ikisinden hem ölçegleriniň uludygy** bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwür-t-geleýän bölegi endigan däl, Ýewraziýanyň aram giňişliklerinde (gündogara Baýkal kölüne çenli). Uçup geçende giň ýaýran. Türkmenistanda – deňziň kenaryakasynda we içki suw ýataklarda. Ýewropanyň,

особенно в вершинной части. Кроме того, важная примета – отсутствуют темные полосы и светлый «пробор» на голове. Крайне редкий пролетный, неизученный вид, внесен в Красный список МСОП. Кроншнепы трудно различимы в природе, чтобы уберечь от охотничьих выстрелов тонкоклювого кроншнепа, необходимо не допускать охоту на большого и среднего кроншнепов.

Полевые признаки: очень крупный кулик, крупнее вороны, на высоких темных ногах и с длинным изогнутым книзу клювом темно-бурого цвета. Самцы и самки схожи. **Сверху оперение песочно-бурого цвета с темными отметинами, снизу беловатое с тонкими продольными пестринами.** Молодые похожи на взрослых, но клюв прямее и короче. Голос – не громкие свисты «куур-лир-ли». Крыло самцов – 288-334, самок – 275-326, клюв взрослых птиц – 116-179, у молодых он иногда короче – 110 мм.

Сходства – отличия: от среднего кроншнепа отличается **одноцветной окраской темени, от тонкоклювого кроншнепа – характером пятен на боках тела и от них обоих – крупными размерами.**

Распространение: гнездовая часть ареала – неравномерная в умеренных широтах Евразии (на восток до Байкала). На пролете – шире. В Туркменистане – на морском побережье и внутренних

Afrikanyň, Kіçi, Alynky, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýanyň deňizleriniň kenaryakalarynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, bölekleýin göçüp-uçup gezyän we gyşlaýan guş. Ýazyna-martyň ortasyndan-maý aralykda, gonup-uçup gezyänleri – iýunda we awgustyň başynda seýregräk duşýar. Güýzine – awgustyň soňundan we noýabrda uçup geçýär. Amatly gyş bolanda dekabrda-fewralda gabat gelýär.

Statusy: ýeterlik öwrenilmedik, seýrek görnüş. Ikinji derejeli aw guşy.

153. Bezemen çuluk – *Tringa erythropus* – Щёголь

Meýdan alamatlary: bedeni gumry ölçegli, emma aýaklary uzyn, uzyn çüňkli uly çuluk. Tomus döwründe bedeniniň üstki tarapy agymtyl menekli doýgun gara reňkli. Aýaklary garamtyl ýa-da gara-gyzyl, aşaky çüňki gyzylyk, bu ony beýleki çuluklardan tapawutlandyryýar. **Güýz-gyş döwründe** (haçan-da bu guşlar bizde duşýan wagty) **uly we ýaş guşlaryň üsti külreňk-çal, aşaky tarapy tutuk menekli ak ýa-da boýny we döşi tutuk ýokundyly. Çüňki gara, düýbi gyzylymtyl reňkli,** aýaklary agymtyl-mämişi ýa-da oçügsy gyzylyk. Sesi howsalaly - “týu-it-krýu-it”. Horazlarynyň ganaty - 160-170, mäkiýanlarynyňky - 154-173 mm, horazlarynyň agramy - 110-165, mäkiýanlarynyňky - 140-175 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: aýaklarynyň güýzde we gyşda gyzylyk reňkli bolmagy sebäpli, olary ýakaly çuluk ýa-da gyzylyk aýakly çuluk bilen garjaşdyrmak mümkin, emma, ol **ganatlarynda ak “aýnajygyň” ýokdygy,** aýaklarynyň we çüňkünüň

водоемах. Зимует на побережье Европы, Африки, Малой, Передней, Южной и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: пролетная, частично летующая и зимующая птица. Весенний пролет – с середины марта и в мае, редкие летующие попадают в июне-начале августа. Осенний пролет – с конца августа и в ноябре. В благоприятные зимы встречается в декабре-феврале.

Статус: недостаточно изученный, редкий вид. Второстепенный объект охоты.

Полевые признаки: довольно крупный кулик, размером тела с горлицу, но на высоких ногах, с длинным клювом. В летний период окраска – насыщенно черная с белыми пестринами на верхней стороне тела. Ноги темные или чернокрасные, подклювье красное, что отличает от других куликов. **Восенне-зимнее время** (когда эти птицы встречаются у нас чаще) **взрослые и молодые сверху пепельно-серые, снизу белые с дымчатыми крапинками или налетом на шее и груди. Клюв черный с красноватым основанием,** ноги бледно-оранжевые или неярко красные. Голос – тревожное «тю-ит - крью-ит». Крыло самцов – 160-170, самок – 154-173 мм, вес самцов – 110-165, самок – 140-175 г.

Сходства – отличия: осенью и зимой из-за общей окраски красных ног можно спутать с турутаном или травником, однако, от травника отличается **отсутствием белого «зеркальца» на крыльях,**

uzyndygy - gyzyl aýakly çulukdan; **çüňküniň düýbüniň gyzlydygy we arkasynyň akdygy** - ýakaly çulukdan; **aýaklarynyň reňkiniň gyzlydygy** bilen uly ulitden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi Ýewraziýanyň tokaýly tundara we demirgazyk taýga zolagy, uçup geçende giň ýaýran. Türkmenistanda Hazar deňziniň kenarýakasynda we içki suw ýataklarda. Günbatar Ýewropada, Ortaýer deňzinde, Pars aýlagynda, Afrikanyň tropik giňişliginde, Hindistanyň demirgazygynda we Günorta-Gündogar Aziýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, bölekleyin gonup-uçup gezyän we gyşlaýan guş. Ýazyna-martyň ortasynda-maýda, gonup-uçup gezyänleri-iýun-awgustda duşýar. Güýzine-awgustyň aýagyndan noýabra çenli uçup geçýär. Gyş ýyly gelen ýyllary, seýrek gyşlaýan osoblary Hazar deňzinde we käbir içki suw ýataklarda gyşlamaga galýarlar. Ownuk balykgulaklar, leňneçler, mör-möjekler we olaryň liçinkalary bilen iýmitlenýär.

Statusy: az öwrenilen, seýrek görnüş.

154. Gyzyl aýajykly çuluk – *Tringa totanus* – Травник

Meýdan alamatlary: bedeni gumry ölçegli, emma, uzyn mämişigyzyl aýakly, düýbi gyzlymytyl, uzalan göni gara çüňkli, uly çuluk. Horazynyň mäkiýanyna tomusky ýelek örtügi meňzeş. Üstki tarapy garamtyl menekli goňurrak-çal we guýrugynyň üsti agymytyl. Kellesiniň üsti garamtyl. Garyn tarapy gara-goňur menekli ak. **Güýz-gyş döwründe uly we ýaş guşlaryň ganatlary ak gaýmaly түsse siňen-goňur reňkli.**

более высокими ногами и удлиненным клювом, а от турухтана – **красным основанием клюва и белой спиной**, от большого улита – **красным цветом ног.**

Распространение: гнездовая часть ареала – лесотундра и северная тайга Евразии, на пролете – к югу шире. В Туркменистане – на Каспийском побережье и внутренних водоемах. Зимует в Западной Европе, Средиземноморье, Персидском заливе, тропической Африке, севере Индостана и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: пролетная, частично летующая и зимующая птица. Весенний пролет – с середины марта и в мае. Летующие – в июне-августе. Осенний пролет растянут с конца августа до ноября. Редкие зимующие особи при теплых зимах остаются на Каспии и некоторых внутренних водоемах. Питается мелкими моллюсками, рачками, насекомыми и их личинками.

Статус: малоизученный редкий вид.

Полевые признаки: крупный кулик размером тела с горлицу, но на высоких оранжево-красных ногах, с прямым удлиненным темным клювом и красноватым его основанием. В летнем наряде самец и самка окрашены сходно. Сверху буровато-серые с темными пестринами и светлым надхвостьем. Верх головы темный. Брюшная сторона белая с черно-бурыми пестринами. **Взрослые в осенне-зимнее**

Ýaş guşlaryň aýaklary sarymytyl. Sesi gysga sykylyklama - "týu-li, týu-li". Horazlarynyň ganaty - 141-166, mäkiýanlarynyňky - 147-168 mm, agramy - 105-150 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: "aýnajyga" çaly m edýän, aýratynda, uçup barýarka gowy görüňän, **ganatlarynyň gyalaryndaky inli ak zolak** bilen çuluklaryň ýakyn görnüşlerinden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi Ýewropanyň, demirgazyk-gündogar taraplaryndan başgalarynda, Demirgazyk Hazarýakasynda, Gazagystanda, gündogara – Primorýa çenli, günorta Gimalaý daglaryna we Gündogar Hytaýa çenli barýar. Uçup geçende giň ýaýran. Türkmenistanda uçup geçende, şeýle-de tomsuna we gyşyna içki suw ýataklarda we deňziň kenarýakasynda. Ýewropanyň, Afrikanyň, Alynyk, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýanyň kenarýakalarynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, mümkin höwürtleýän, gonup-uçup gezyän we gyşlaýan guş. Ýazyna fewralyň aýagyndan-iýunyň başyna, gonup uçup gezyänleri iýundan-awgustyň başyna duşýar. Güýzine – awgustyň ortasyndan-noýabra çenli göçüpgonýar we uçup geçýär. Zygiderli däl gyşlaýan guşlaryň ýekelikde ýada maýda sürüleri Hazar deňziniň kenarýakasynda dekabir-fewralda gabat gelyär. Dürli suw oňurgasyzlygy bilen iýmitlenýär.

Statusy: köp sanly däl, uçup geçen de adaty görnüş. Ikinji derejeli aw guşy.

155. Akarçeşme çulugy – *Tringa stagnatilis* – Поручейник

Meýdan alamatlary: bedeni sar ölçegli, gelşikli, uzyn çalymytyl- has

время и молодые птицы – дымчато-бурые с белыми каемками на крыльях. У молодых ноги желтоватые. Голос – короткий посвист «тью-ли, тью-ли». Крыло самцов – 141-166, самок – 147-168 мм, вес – 105-150 г.

Сходства – отличия: от близких видов куликов хорошо **отличается широкой белой полосой по краю крыла** наподобие «зеркальца», особенно хорошо видимой в полете.

Распространение: гнездовая часть ареала – Европа, кроме северо-восточных областей, Северный Прикаспий, Казахстан, на восток – до Приморья, на юг – до Гималаев и Восточного Китая. На пролете – более широко. В Туркменистане – на пролете, а также летом и зимой на внутренних водоемах и морском побережье. Зимует по побережьям Европы, Африки, Передней, Южной и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: пролетная, возможно, гнездящаяся, летующая и зимующая птица. Весенний пролет – уже с конца февраля и до начала июня, летующие – в июне-начале августа. Осенние кочевки и пролет – с середины августа по ноябрь. Не регулярно зимующие одиночные особи и мелкие стайки на Каспийском побережье встречаются в декабрь-феврале. Питается различными водными беспозвоночными.

Статус: немногочисленный, на пролетах – обычный вид. Второстепенный объект охоты.

Полевые признаки: средний кулик размером тела со скворца, на

ýaşyl aýakly we goňur reňkli, inçeden uzyn çüňkli orta çuluk. Horazy tomsuna mäkiýana meňzeş. Olaryň üstki tarapy garamtyl menekli goňurrakçal we aşagy ak, petekesi we döşi maýda menekli. Ganatlarynyň aşagy we guýrugynyň üsti edil sonuň ýaly ak. Güýz-gyş döwründe ulularynyň we ýaşlarynyň üstki tarapy çalymtyl-goňur reňkli, ganatlarynyň ýelekleri agymtyl gaýmaly. Sesi - "týu-týuk-týu-týuk". Horazlarynyň ganaty - 128-140, mäkiýanlarynyňky - 133-142 mm, horazlarynyň agramy - 55-85, mäkiýanlarynyňky - 66-73 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: bedeniniň **beýik we gelsiklidigi, guýrugynyň üstüniň akdygy we çüňküniň bizsekili, inçelip uzandygy, aýaklarynyň çalymtyl-ýaşyldygy we olaryň uçup barýarkalar guýrugyndan yza mese-mälim çykyp durandygy** bilen goňurarka we çalymtyl çuluklardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeleýän bölegi Gündogar Ýewropa, Gazagystan, Günorta Sibir, gündogara Baýkal kölüniň ýakasyna çenli. Uçup geçende giň ýaýran. Türkmenistanda içki suw ýataklarda we deňziň kenaryakasynda. Ortaýer deňziniň günortasynda, Pars aýlagynda, Merkezi, Günorta Afrikada, Hindistanda, Günorta-Gündogar Aziýada we Awstraliýanyň käbir ýerlerinde guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, seýrek gonup-uçup gezýän we gyşlaýan guş. Ýazyna-mart-maýda, gonup uçup gezýänleri - iýunda-awgustyň başynda gabat gelýär. Güýzine - awgustyň aýagyndan noýabr aralykda uçup geçýär. Gyşlaýan osoblary amatly

высоких стройных **ногах серо-зеленого цвета** и с тонким длинным клювом бурого цвета. Летом самцы и самки окрашены сходно. Сверху они буровато-серые с темными пестринами, снизу белые, на зобе и груди пестрины мельче. Испол крыла и надхвостье также белые. Взрослые и молодые в осенне-зимнее время сверху серовато-бурого цвета с белесыми каемками перьев крыла. Голос - «тью-тьюк, тью-тьюк». Крыло у самцов - 128-140, у самок - 133-142 мм, вес самцов - 55-85, самок - 66-73 г.

Сходства - отличия: по сравнению с чернышом и фифи более **высок и строен, с белым надхвостьем и тонким шиловидным и утонченным клювом, ноги серо-зеленые, в полете они заметно выступают за край хвоста.**

Распространение: гнездовая часть ареала - Восточная Европа, Казахстан, Южная Сибирь - на восток до Забайкалья. На пролете - шире. В Туркменистане - внутренние водоемы и морское побережье. Зимует на юге Средиземного моря, в Персидском заливе, Центральной и Южной Африке, Индостане, Юго-Восточной Азии и, местами, в Австралии.

Образ жизни: пролетная, изредка летующая и зимующая птица. Весенний пролет - в марте-мае. Летующие - в июне-начале августа. Осенний пролет - с конце августа по ноябрь. Зимующие в благоприятные годы остаются в декабре-феврале. Питается водными насекомыми и их личинками.

ýyllada dekabr - fewralda gyşlamaga galýar. Suw mör - möjekleri, olaryň liçinkalary bilen iýmitlenýär.

Statusy: az öwrenilen, seýrek görnüş.

156. Uly ulit çulugy - *Tringa nebularia* - Большой улит

Meýdan alamatlary: kepderi öleşli, uzyn goňur çüňkli, ýokarlygyna sähelçe gaýsak (jaýty) we gelsikli gara reňkli, uzyn aýakly uly çuluk. Tomsuna horazlary mäkiýanlaryna meňzeş, akarçeşme çulugyny ýatladýar, emma ondan tapawutlylykda ganatlarynyň aşagy tüssesiňen kese bellikli. Guýrugynyň üstki ýarýýu ýelekleri garamryl kese zolakly. Aýaklary garamtyl, çalymtyl-ýaşyl ýa-da sarymtyl-çalymtyl-ýaşyl. Güýz-gyş döwründe uly we ýaş guşlaryň reňki öçügsi, üsti goňurrakçal. Sesi gaty sykylyk - "týuiw-týuiw". Horazlarynyň ganaty - 178-194, mäkiýanlarynyňky - 181-195 mm, agramy - 148-195 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň uludygy we **uzyn çüňküniň sähelçe ýokarlygyna gaýsakdygy (jaýty)** akarçeşme çulukdan, aýaklarynyň garamtyl reňklidigi we **ak guýrugynyň garamtyl kese zolaklydygy** bilen gyzyly aýajykly we bezemen çuluklardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeleýän bölegi Ýewraziýanyň Skandinawiyadan Kamçatka çenli tokaý zolaklary. Uçup geçende giň ýaýran. Türkmenistanda içki suw ýataklarynda we deňziň kenaryakasynda. Günbatar Ýewropanyň, Ortaýer deňziniň kenarynda, Afrikanyň ähli ýerlerinde (Sahara çölünden başgalarynda), Arabystanyň, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýanyň, Awstraliýanyň

Статус: малоизученный редкий вид.

Полевые признаки: крупный, размером тела с голубя кулик, с длинным бурым клювом, слегка изогнутым кверху, и высокими стройными ногами темного цвета. Самцы и самки летом окрашены сходно, напоминая поручейника, но, в отличие от него, на испод крыла дымчатые поперечные отметины. Верхние кроющие хвоста с темными поперечными полосами. Ноги темные, серо-зеленые или желтовато-серо-зеленые. Взрослые в осенне-зимнее время и молодые птицы окрашены тускло, верх буровато-серый. Голос - громкий посвист «тюив-тюив». Крыло самцов - 178-194, самок - 181-195 мм, вес - 148-195 г.

Сходства - отличия: от поручейника отличается крупными размерами и **слегка изогнутым кверху длинным клювом**, от травника и щеголя - темным цветом ног и **белым с поперечными темными полосами хвостом.**

Распространение: гнездовая часть ареала - лесная зона Евразии от Скандинавии до Камчатки. На пролете - к югу шире. В Туркменистане - внутренние водоемы и морское побережье. Зимует на побережьях Западной Европы, в Средиземноморье, по всей Африке (кроме Сахары), побережье Аравии, в Южной и Юго-Восточной Азии, в Австралии.

kenarýakalarynda gyslaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän, seýregräk gonup-uçup gezýän, amatly ýyllarda gyslaýan guş. Ýazyna-martyň ortasyndan-maýda, gonup uçup gezýänler iýunda-awgustyň başynda gabat gelýär. Güýzine – awgustyň soňundan we sentýabrda, gijä galanlary – noýabrda uçup geçýär. Mör-möjekler, olaryň liçinkalary, çaga balyklar bilen seýregräk iýmitleňýär.

Statusy: bizde heniz öwrenilmedik, seýrek görnüş.

157. Goňurarka çuluk – *Tringa ochropus* – Черныш

Meýdan alamatlary: saryň ölçeğinde, kelteräk aýaklary goýy ýaşyl reňkli, başgalara garanyňda gysga garamtyl çüňkli, gözünüň töweregi ak halkaly kiçiräk çuluk. Tomsuna horazlary mäkiýanlaryna meňzeş. Kellesi we boýny çal menekli, arkasy we ganatlary goýy-goňur. **Guýrugynyň üsti açyk ak**, ol aýdyň görünýär. **Garyn tarapy ak** çalymtyl ýokundyly, petekesi, boýny we döşi ala. Ganatlarynyň aşagy garamtyl. Güýz-gyş döwründe ululary we ýaşlary çypar tegmilli çalymtyl öwüşginli. Sesi gaty we pert - “tli-tlipt-tli-tlipt”. Horazlarynyň ganaty - 127-146, mäkiýanlarynyňky – 136-148 mm, agramy - 70-75 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çalymtyl çuluga çalymdaş, emma ganatynyň aşagy garamtyl we guýrugynda kese gara zolaklary az, uçan wagtynda anyk görünýän **guýruk üstünüň akdygy**, çalymtyl we daşajy çuluklara garanyňda has uludygy bilen anyk tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeýän ýerleri – Ýewraziýanyň sähra (bölekleyin), tokaýly sähra we tokaý zolaklary. Uçup geçende giň ýaýran.

Образ жизни: пролетная, изредка летующая, в благоприятные годы зимующая птица. Весенний пролет – с середины марта и в мае, летующие – в июне-начале августа. Осенние кочевки и пролет – с конца августа и в сентябре, позднепролетные – в ноябре. Питается насекомыми и их личинками, редко мальками рыб.

Статус: у нас почти не изученный, редкий вид.

Полевые признаки: небольшой кулик, размером со скворца, на невысоких ногах темно-зеленого цвета, со сравнительно коротким темным клювом, вокруг глаза белое кольцо. Летом оперение самцов и самок сходно. Голова и шея серые с пестринами, спина и крылья темно-бурые. **Надхвостье ярко белое**, хорошо бросающееся в глаза. **Брюшная сторона белая** с серым налетом и пестринами на зобе, шее и груди. Испод крыла темный. Взрослые и молодые птицы в осенне-зимнее время окрашены в сероватые тона с рыжими пятнышками. Голос – громкое и резкое «тли-тлипт-тли-тлипт». Крыло самцов – 127-146, самок – 136-148 мм, вес – 70-75 г.

Сходства – отличия: похож на фифи, но **испод крыла темный** и меньше поперечных черных полос на хвосте, легко отличается **контрастным белым надхвостьем**, хорошо видном при взлете, более крупный по сравнению с фифи и перевозчиком.

Распространение: гнездовая область – степная (частично), ле-

Türkmenistanda içki suw ýataklarda we deňziň kenarýakasynda. Gazagystanyň gunortasynda, Orta, Alynky we Kiçi Aziýada, Ortaýer deňzinde, Afrikanýň tropik ýerlerinde, Arabystanyň kenarýakalarynda, Günorta (Hindistanda) we Günorta-Gündogar Aziýada gyslaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän, seýregräk höwürtegeýän bolmagy hem mümkin, gonup-uçup gezýän, bir bölegi gyslaýan guş. Ýazyna-martyň ikinji ýarymyndan-maýda uçup geçýär. Gonup-uçup gezýänleri iýunda-awgustyň başynda duşýar. Güýzine – awgustyň aýagyndan we noýabrda uçup geçýär. Gyş amatly gelen ýyllary dekabrda-fewralda gabat gelýär.

Statusy: ýeterlik öwrenilmedik, köp sanly däl, uçup geçende käbir ýerlerde adaty görnüş. Awçylaryň tötänden awlamaklary mümkin.

158. Çalymtyl çuluk – *Tringa glareola* – Фифи

Meýdan alamatlary: saryň ölçeğinde, başgalara garanyňda aýaklary gysgarak sarymtyl reňkli, uçan mahalynda guýrugynyň ujyndan yza uzaýan, kiçiräk çuluk. Çüňki uzyn däl, garamtyl. Tomsuna uly we ýaş guşlar goňurarka çuluga örän çalymdaş, emma, kiçi, çal reňki agdyklyk edýär we arkasy köp mukdarda menekli. Guýrugynyň üsti öçügsi-ak, **guýrugy köp sanly kese zolakly**. Güýz döwründe uly guşlar çalymtylrak, çypar tegmilli. Sesi goňyrarka çulugyňkydan has güýçli. Horazlarynyň ganaty - 119-129, mäkiýanlarynyňky – 120-129 mm, agramy - 55-72 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: reňkiniň has açykdygy, **guýrugynyň**

состепная и лесная зоны Евразии. На пролете – шире. В Туркменистане – на внутренних водоемах и Каспийском побережье. Зимует на юге Казахстана, в Средней, Передней и Малой Азии, Средиземноморье, тропической Африке, на побережье Аравии, в Южной (Индостан) и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: пролетная, возможно изредка гнездящаяся, летующая птица, часть особей зимует Весенний пролет – со второй половины марта и в мае. Летующие – в июне-начале августа. Осенние кочевки и начало полета – с конца августа и в ноябре. В благоприятные зимы – в декабре-феврале.

Статус: недостаточно изученный, немногочисленный, местами на пролете обычный вид. Может случайно добываться на охоте.

Полевые признаки: небольшой кулик, размером не более скворца, на относительно коротких, желтоватого цвета ногах, в полете выдающихся за край хвоста. Клюв недлинный, темный. Взрослые и молодые птицы летом очень похожи на черныша, но мельче, с преобладанием серой окраски и большим количеством пестрин на спине. Надхвостье не ярко-белое, а **на хвосте множество поперечных полос**. В осенний период взрослые птицы заметно серее, с рыжеватыми пятнами. Голос более звонкий, чем у черныша. Крыло самцов – 119-129, самок – 120-129 мм, вес – 55-72 г.

Сходства – отличия: от черныша отличается более светлой окра-

üstki ýelekleriniň reňkiniň öçügsidigi, guýrugynyň köp sanly kese zolaklydygy we ganatynyň aşagynyň açyk reňklidigi, şeýlede aýaklarynyň uzyn hem reňki goňurarka çulukdan; arkasynyň, boýnunyň, döşüniň aladygy we has açyk reňlidigi daşajy çulukdan we çüňküniň we aýaklarynyň has gysgadygy bilen akarçeşme çulukdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeýän bölegi Ýewraziýanyň sähra (demirgazyk zolagy), tokaýly sähra, tokaý we bölekleýin tundra zolaklary. Uçup geçende giň ýaýran. Türkmenistanda içki suw ýataklarynda we deňziň kenarýakasynda. Merkezi we Günorta Afrikada, Günorta (Hindistanda) we Günorta - Gündogar Aziýada, Awstraliýanyň käbir ýerlerinde gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, bölekleýin gonup-uçup gezýän guş. Ýazyna martda, esasan hem, aprel maýda, gija galanlary maýyň aýagynda-iýunyň başynda uçup geçýär. Gonup-uçup gezýänleri iýunyň aýagynda-iýulyň başynda duşýar. Güzine – iýulyň soňunda-sentyabrda uçup geçýär. Gijä galyp gelenleri oktýabrda, noýabrda seýregräk duşýar. Käte sürä hem toplanýarlar. Mör-möjekler we olaryň liçinkalary bilen iýmitlenýär.

Statusy: ýeterlik öwrenilmedik, köp sanly däl, uçup geçende käbir ýerlerde adaty görnüş.

159. Egriçüňk çuluk – *Xenus cinereus* – Мородунка

Meýdan alamatlary: **uzyn ýokarlygyna gaýşak (jaýty) garamtyl çüňkli, çalymtyl-sary reňkli** gysga aýakly, sar ölçegli çuluk. Horazy

ской, неярким надхвостьем, **множством поперечных полос на хвосте и светлым исподом крыла**, а также длиной и цветом ног, от перевозчика – пестринами на спине, шее, груди и более светлой окраской, от поручейника – более коротким клювом и ногами.

Распространение: гнездовая часть ареала – степная (северная полоса), лесостепная, лесная и, частично, тундровая зоны Евразии. На пролете – шире. В Туркменистане – на внутренних водоемах и морском побережье. Зимует в Центральной и Южной Африке, Южной (Индостан) и Юго-Восточной Азии, местами в Австралии.

Образ жизни: пролетная, частично летующая птица. Весенний пролет – с марта, но, в основном, в апреле-начале мая. Позднепролетные – до конца мая-начала июня. Летующие – в конце июня-начале июля. Осенний пролет ранний, уже с конца июля и по сентябрь. Запоздавшие особи – в октябре, редко ноябре. Нередко объединяется в стайки. Питается насекомыми и их личинками.

Статус: недостаточно изученный, немногочисленный, местами на пролете обычный вид.

Полевые признаки: кулик размером со скворца, на коротких ногах **серо-желтого цвета, длинным изогнутым кверху темным**

mäkiýanyna meňzeş, bedeniniň üsti tüssesiňen-çalymtyl ýa-da goňurrak garamtyl menekli, aşaky tarapy ak, döşi we boýny insiz menekli. Güzine, uçup geçýän döwründe, meneksiz bir reňkli. Sesi myňňy-myňňyly – “hiiip-hiiip”. Horazlarynyň ganaty - 121-134, mäkiýanlarynyňky – 123-136, çüňki - 37-52 mm, agramy - 47-76 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: inçelen çüňkiniň **ýokarlygyna gaýşakdygy - jaýtydygy bilen** beýleki maýda çuluklardan anyk tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeýän bölegi Gündogar Ýewropa we Demirgazyk Aziýa (tundradan we tokaýly tundra zolaklaryndan başgalarynda). Uçup geçende giň ýaýran. Türkmenistanda Hazar deňziniň kenarynda we içki suw ýataklarynyň käbir ýerlerinde. Günorta we Gündogar Afrikanyň, Arabystanyň, Pars aýlagynyň, Günorta Hindistanyň, Günorta-Gündogar Aziýanyň, Demirgazyk we Günbatar Awstraliýanyň kenarýakalarynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän görnüş. Ýazyna martyň aýagynda we maýda, güzine awgystyň aýagyndan noýabra çenli uçup geçýär. Balykgulaklar, leňneçler, mör-möjekler we olaryň liçinkalary bilen iýmitlenýär.

Statusy: örän seýrek, az öwrenilen görnüş.

160. Daşajy çuluk – *Actitis hypoleucos* – Перевозчик

Meýdan alamatlary: gysgarak aýaklary çal reňkli we kelteräk garamtyl çüňkli, ölçegleri sardan kiçiräk uly bolmadyk çuluk. Horazyň we mäkiýanynyň reňkleri meňzeş. Bedeniniň üstki tarapy бүрүнç reňkyşylymtyl öwüşginli çägepisintgoňur we insiz kese menekli. Aşagy

Клювом. Самец и самка окрашены сходно, верх тела дымчато-серый или буроватый с темными пестринами, низ белый, с узкими пестринами на груди и шее. Осенью, в период полета, окрашены более однотонно, без пестрин. Голос – гнусавое «хииип-хииип». Крыло самцов – 121-134, самок – 123-136, клюв – 37-52 мм, вес – 47-76 г.

Сходства – отличия: от всех мелких куликов хорошо отличается вздернутым **кверху утонченным клювом.**

Распространение: гнездовая часть ареала – Восточная Европа и Северная Азия (кроме тундры и лесотундры). На пролете – шире. В Туркменистане – на Каспийском побережье, местами по внутренним водоемам. Зимует по побережьям Южной и Восточной Африки, Аравии, Персидского залива, Южной Индии, Юго-Восточной Азии, Северной и Западной Австралии.

Образ жизни: пролетный вид. Весенний пролет – с конца марта и в мае. Осенний – с конца августа до ноября. Питается моллюсками, рачками, насекомыми и их личинками.

Статус: очень редкий малоизученный вид.

Полевые признаки: некрупный кулик размером меньше скворца, с относительно короткими ногами серого цвета и недлинным прямым темным клювом. Самец и самка окрашены сходно. Верхняя часть тела песчано-бурая с бронзово-зеленоватым отливом и тонкими

ak, petekesiniň gapdallary goňur ýokungyly, boýny we döşi insiz garamtyl menekli. Gyşyna uly we ýaş guşlar öçügsi reňkli, bedeniniň aşaky tarapy meneksiz. Sesi – “pýuiik-pýuiik”. Horazlarynyň ganaty - 90-114, mäkiýanlarynyňky – 102-114 mm, ag-ramy - 43-74 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **bedeniniň üstki tarapyňyň бүрүңç reňk-ýaşylymtly öwüşginlidi-gi** beýleki maýda çuluklardan we **çüňküniň gysga gönüdig**i bilen egričüňk çulukdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: giň-tutuş Ýewraziýa, günorta we demirgazyk taraplaryndandan başgalarynda. Uçup geçende giň ýaýran. Türkmenistanda içki suw ýataklaryň amatly ýerlerinde we deňiz kenaryakasynda. Ýewropanyň günorta-günbatar çetlerinde, Afrikada (Saharadan başgalarynda), Arabystanyň kenaryakasynda, Günorta, Günorta-Gündogar Aziýada, Awstraliýada gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän we höwürtgeleýän guş. Ýazy-na-martyň ortasyndan we maýda uçup geçýär. Maýyň soňunda iýunda - iýulda höwürtgeleýär. Höwürtge ýerde, düybüne otlaryň sypallary düşelen ýalpak çukurjyk. Adatça, 4 sany gyzlymtly-goňur menekli gülgüne-çyparrak reňkli ýumurtgalary goýýar. Jüýjeleri iýunyň ikinji ýarymynda iýulyň başyn-da peýda bolýarlar. Ýaşlary iýulyň ikinji ýarymynda awgustyň başyn-da uçurym bolýarlar. Güýzki gonup-göçme we uçup-geçme awgustyň aýagyndan noýabra çenli dowam edýär. Ownuk suw oňurgasyzlary bilen iýmitlenýär.

Statusy: gowşak öwrenilen, köp sanly däl görnüş.

поперечными пестринами. Низ белый, с бурым налетом на боках зоба и узкими темными пестринами на шее и груди. Взрослые зимой и молодые птицы окрашены тускло, без пестрин на нижней стороне тела. Голос – «пюиик-пюиик». Крыло самцов – 90-114, самок – 102-114 мм, вес – 43-74 г.

Сходства – отличия: от других мелких куликов отличается **бронзово-зеленоватым оттенком верха тела**, от мородунки – **прямым коротким клювом**.

Распространение: обширное – почти вся Евразия, кроме южных и северных областей. На пролете – шире. В Туркменистане – в подходящих местах по различным водоемам и морскому побережью. Зимует на крайнем юго-западе Европы, в Африке, кроме Сахары, побережье Аравии, в Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии.

Образ жизни: пролетная и гнездящаяся птица. Весенний пролет – с середины марта и в мае. Гнездится в конце мая-июне-июле. Гнездо – на земле в виде неглубокой ямки с выстилкой из размочаленных травинок. Кладка, обычно, из 4 яиц розово-палевого цвета и краснобурными крапинами. Пуховички – во второй половине июня-начале июля. Молодые становятся летными во второй половине июля-начале августа. Осенние кочевки и пролет – с конца августа до ноября. Питаются мелкими водными беспозвоночными.

Статус: слабо изученный, немногочисленный вид.

161. Ikburun ýüzegenje – *Phalaropus lobatus* – Круглоносый плавунчик

Meýdan alamatlary: uzynrak ik görnüşli, yöne sähelçe gapdalyndan gysylan inçe **gara çüňkli**, garamtyl aýakly, barmaklarynyň gyralary deripisint parawuzly, ölçegleri serçe ýaly, maýda çuluk. Jübütleşme lybasynda (bu bezegde bizde örän seýrek gabat gelyär) horazynyň döşi we böwürleri çalymtly, garyny ak, umumy reňki çalymtly-gara, alkymy we bokurdagy ak, boýnunyň gapdallarynda kiçiräk çyparrak meýdançaly. Mäkiýany has ýagty reňkli we anyk nagyşly. Güýz-gyş döwründe (bizde gabat gelyän wagty) ulularynyň we ýaşlarynyň ýelek örtügi, üstki tarapy goýalan agymtyl-çal reňkli. **Garyn tarapy, bokurdagy, kellesiniň gapdallary, maňlaýy we gaşy ak, depesi melemtil-goňur.** Suwda süri bolup gezyär, örän çalt ýüzyär. Sesi gysga - “çirk-çirk”, yöne, serçäniň sesi däl. Horazlarynyň ganaty - 99-112, mäkiýanlarynyňky – 95-116 mm, ag-ramy - 26-46 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: reňki, ölçegleriniň kiçidigi we **uzyn bizşekilli garamtyl reňkli** çüňki bilen ýasyburun ýüzegenjeden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtgeleýän bölegi Ýewraziýanyň we Amerikanyň tundra we tokaýly tundra zolaklary. Uçup geçende, materikleriň içki bölekleri bilen bilelikde giň ýaýran. Türkmenistanda içki suw ýataklarda we Hazar deňziniň kenaryakasynda. Günorta Amerikanyň günbatar kenaryakalarynda, Arabystanyň günortasynda, Aziýanyň günorta - gündogar çetlerinde gyslaýar.

Полевые признаки: мелкий кулик, размером с воробья, с относительно длинным круглым, но слегка сжатым с боков тонким **черным клювом**, темными ногами, лапы с характерными кожистыми оторочками на пальцах. В брачном наряде (в котором у нас встречаются очень редко) у самцов грудь и бока серые, брюшко белое, общая окраска серо-черная, подбородок и горло белые, а по бокам шеи небольшие рыжеватые участки. Самки более яркие и с четким рисунком. В осенне-зимнее время (когда встречаются у нас часто) оперение взрослых и молодых, в целом, светло-серое, более темное сверху. **Брюшная сторона, шея, бока головы, лоб и бровь – белые, а темя – буровато-коричневое.** Держатся на воде в стайках, очень подвижны. Голос – короткие «чирк-чирк», но не похож на воробья. Крыло самцов – 99-112, самок – 95-116 мм, вес – 26-46 г.

Сходства – отличия: от плосконого плавунчика отличается окраской, мелкими размерами и **длинным шиловидным клювом темного цвета.**

Распространение: гнездовая часть ареала – тундровая и лесотундровая зоны Евразии и Америки. На пролете – гораздо шире, включая и внутренние части материков. В Туркменистане – на внутренних водоемах и Каспийском побережье. Зимует на западном побережье Южной Америки, юге Аравии и крайнем юго-востоке Азии.

Образ жизни: пролетная, в от-

Ýaşayşy: uçup geçýän, käýarym gonup-uçup gezyän guş. Ýazyna arpelde we iýunyň başyna çenli uçup geçýär. Gonup-uçup gezyänleri – iýulda duşýar. Güýzine – awgustyň aýagynda-oktyabrda uçup geçýär. Gijä galanlary noýabra çenli, emma seýregräk gabat gelyär. Suwdaky maýda, suwuň ýüzüne gaýýan oňurgasyzlar bilen iýmitleňýär.

Statusy: adaty, käbir ýyllarda köpsanly görnüş. Tötänden awlanýan aw guşy.

162. Ýasyburun ýüzegenje – *Phalaropus fulicarius* – Плосконосый плавунчик

Meýdan alamatlary: gysgarak ýasy çüňkli we çalymtyl-sary aýakly, serçeden ulurak, kiçi çuluk. **Güýz-guş döwründe** (bizde gabat gelende) **uly we ýaş guşlaryň üstki tarapy mawymtylrak-çal, aşaky tarapy – ak reňkli.** Maňlaýy we kellesiniň gapdallary edil şonuň ýaly çalymtyl-çyparrak ýokundyly ak, gözünüň üsti gara zolakly. Sesi sokdyrylan - “krri”. Horazylarň ganaty - 123-134, mäkiýanlarynyňky – 127-138 mm, agramy - 42-61 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ikburun ýüzegenjeden sähelçe ulurak, gysgarak sarymtyl reňkli ýasy çüňki bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi Aziýanyň, Grenlandiýanyň we Amerikanyň arktika tundra zolagy. Uçup geçende has giň ýaýran, emma, materikleriň içki böleklerinde seýregräk. Türkmenistanda – wagtal-wagtal Hazar deňziniň kenaryakasynda hem Sarygamuşda gabat gelyär. Afrikanyň we Günorta Amerikanyň günbatar kenaryakalarynda guşlaýar.

дельные годы летующая птица. Весенний пролет поздно – с начала апреля и до начала июня. Осенний пролет ранний – с конце августа и в октябре. Позднепролетные – до ноября, но редко. Питаются мелкими водными беспозвоночными, собирая их на поверхности воды при плавании.

Статус: обычный, в некоторые годы многочисленный вид. Случайный объект охоты.

Полевые признаки: небольшой кулик, крупнее воробья, с уплощенным коротким клювом и серовато-желтыми ногами. **В осенне-зимний период** (когда может быть встречен у нас) **взрослые и молодые птицы сверху окрашены в голубовато-серый, снизу – в белый цвет.** Лоб и бока головы тоже белые с серовато-рыжеватым налетом, через глаз – черная полоска. Голос – протяжное «крри». Крыло самцов – 123-134, самок – 127-138 мм, вес – 42-61 г.

Сходства – отличия: немного крупнее круглоногого плавунчика, отличается **коротким уплощенным клювом желтоватого цвета.**

Распространение: гнездовая часть ареала – арктические тундры Азии, Гренландии и Америки. На пролете – намного шире, но во внутренних частях материков крайне редок. В Туркменистане может спорадически встречаться на Каспийском побережье, (не исключено на Сарыкамыше). Зимует по западным побережьям Африки и Южной Америки.

Ýaşayşy: uçup geçýän guş. Suwdaky maýda oňurgasyzlar bilen iýmitleňýär.

Statusy: öwrenilmedik, seýrek görnüş.

Garlawaç pisint çuluklar – *Glareolidae* – Тиркушковые

Daşky görnüşü garlawaçlara çalymdaşlyk edýän (takyrýorgadan başgasy), emma olardan ulurak guşlar maşgalasy. Guýrugy ýabaly, ganatlary uzyn çowly, agyz kesimi uly. Uçup geçýärler, ачык giňişliklerde, adатça, suw ýataklarynyň golaýynda, şorluk ýerlerde hem mekan tutýarlar. Ýerde höwürtleýär. Dünýäde 15 görnüş, şolaryň 3-si Türkmenistanda.

163. Takyrýorga – *Cursorius cursor* – Бегунок

Meýdan alamatlary: sar ölçeги çuluk. Horazy mäkiýanyna meňzeş. Arkasy sarymtyl-çägereňk öwüşginli, depesiniň öňki bölegi çypar reňkli. Yzky tarapy mawymtyl-çal bolup, ýeňsesi çala saýgardýan gara tegmilli. Gözünden ýeňsesine tarap ak we gara zolak gidýär. **Yzky bölegi mawumtyl-çal, depesi çala saýgardýan garamtyl tegmilli. Gözünden depesine geçýän iki sany ak we gara zolakly. Uçup barýarka ganatlarynyň aşagy gara, üstki tarapyndan tapawutlylykda, olaryň diňe uçlary gara.** Garyn tarapy we guýrugynyň aşagy ak. Çüňki gara, kellesiniň uzynlygyna deň we sähelçe aşaklygyna egmek. Aýaklary, başgalara garanyňda uzyn, sarymtyl ýa-da goňurrak reňkli. Ýaşlarynyň arkasy goňur kese zolakly, depesi çal reňli däl. Kellesini ýokaryk gaýşardyp ylgaýar. Sesi – “kuett-kuett”. Ganaty - 153-169 mm, agramy - 148-152 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: kel-

Образ жизни: пролетная птица. Питается мелкими водными беспозвоночными.

Статус: не изученный у нас, редкий вид.

Семейство птиц, общим видом напоминающих ласточек (кроме бегунков), но заметно крупнее их. Хвост вильчатый, длинные острые крылья, большой разрез рта. Перелетные, населяют открытые пространства, обычно у водоемов, не избегают солончаков. Гнездятся на земле. В мире 15 видов, из которых в Туркменистане – 3.

Полевые признаки: размером со скворца. Самец и самка окрашены сходно. Спина однотонная желтовато-песочная, передняя часть темени с рыжиной. **Задняя часть голубовато-серая,** с малозаметными черными пятнами на затылке. **От глаза к затылку идут две полосы – белая и черная. В полете крылья снизу черные, а сверху – только их концы.** Брюшная сторона и подхвостье – белые. Клюв черный, равный длине головы и слегка загнут вниз. Ноги сравнительно длинные, желтоватого или буроватого цвета. Молодые птицы с поперечными бурыми полосами на спине, темя без серого цвета. Бегают, высоко задирая голову. Голос – «куэтт-куэтт». Крыло – 153-169 мм, вес – 148-152 г.

Сходства – отличия: от других куликов отличается характерной окраской головы и обилием черного цвета на крыльях, от луговой

lesiniň häsiýetli reňki we ganatlarynyň goýy-gara boýaglydygy beýleki çuluklardan; uzalan çüňkiniň aşaklygyna egmekdigi we aýaklarynyň uzynlygy bilen garlawaç pisint çemen we sähra çuluklaryndan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi temilleýin Afrikanyň günbatar, demirgazyk we merkezi bölekleride (Sahara çölüniň günortasy) çetlerinde, Arabystanyň demirgazykgünbatar bölegi, Ýakyn Gündogar, Alyňky Aziýanyň käbir ýerlerinde we Orta Aziýanyň günbatarynda. Türkmenistanda Garabogaz kölünden we Türkmenbaşydan Köpetdagyň eteklerinde, Bathyza we Murgap jülgesine çenli. Arealynda höwürtleýän böleginiň günortasynda gyslaýar, onuň demirgazyk bölegindäki çäklerinden Gündogar Afrika, Günbatar Arabystana, Päkistana we Demirgazyk-Günbatar Hindistana uçup gidýär.

Ýaşayşy: höwürtleýän guş. Dykyz toprakly, seýrek ösümlikli ýarym çöllük ýerlerde ýaşayar (şor ýerlerde hem gezýär). Ýazynda martyň aýagynda we aprelda uçup gelyär. Güzine - sentýabryň ortasyndan we oktyabrda uçup gidýär. Apreliň aýagyndan awgustyň başyna çenli höwürtleýär. Höwürtleýiş ýerde, düýbüne hiç zat düşelmedik ýalpaýyk çukurlyk, 2 sany goňur menekli çalymtylrak-çypar reňkli ýumurtgalary goýýar. Möwsümde iki gezek ýumurtga goýmaklary hem mümkin. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statysy: seýrek görünüş, Türkmenistanyň Gyzyt kitabynda girizilen. Bathyz goraghanasynyň, şeýle-de Köpetdag goraghanasynyň Mäne-Çäçe çäkli goraghanasynyň guşlarynyň iň täsin wekilleriniň biri.

и степной тиркушек – удлинённым изогнутым вниз клювом и длинными ногами.

Распространение: гнездовая часть ареала мозаична – крайние области на западе, севере и в центре (юг Сахары) Африки, северо-западная часть Аравии, Ближний Восток, местами в Передней и западе Средней Азии. В Туркменистане – от Карабогазгола и Красноводского полуострова до предгорий Копетдага, Бадхыза и долины Мургаба. Зимует в южных частях гнездовой части ареала, а из северных ее областей улетает в Восточную Африку, Западную Аравию, Пакистан и Северо-Западную Индию.

Образ жизни: гнездящаяся птица. Обитатель полупустынных плотно-почвенных участков (не избегает солончаков) с разреженной растительностью. Весенний прилет – с конца марта и в апреле. Отлет – с середины сентября и в октябре. Гнездовой период – с конца апреля и до начала августа. Кладка – в конце апреля-начале мая. Гнездо – небольшое углубление в почве без подстилки. В кладке обычно 2 яйца серовато-рыжего цвета с бурыми крапинами. Не исключено наличие двух кладок за сезон. Питается насекомыми.

Статус: редкий вид, внесен в Красную книгу Туркменистана. Один из наиболее интересных представителей птиц Бадхызского, а также Меана-Чачинского заказника Копетдагского заповедников.

164. Garlawaç pisint çemen çulugy – *Glareola pratincola* – Луговая тиркушка

Meýdan alamatlary: gysga çüňli we aýakly, maýda çarlaklaryň ölçegindäki çuluk. Horazlary we mäkiýanlary tomsuna, eger-de mäkiýanyň “uýanlygynyň” gara däl-de goýy-goňurdygyny hasaba almasaň, meňzeş reňkli. Arkasy çalymtyl-ýaşylymtyl öwüşginli tüssereňk-gönur. Guýrugynyň üsti ak. Bokurdagy we boýnunyň aşagy-agymtyl-çypar. Gözüden aşaklygyna, bokurdagy bilen çäklenip, insiz garazolar geçýär. Döşi tüssereňk-gönur, yzky bölegi çyparrak ýokundyly agymtyl. Garny we guýrugynyň aşagy ak. Ganatlary gara. **Ganatlarynyň aşagy we goltugy goňrasrak ýada ýagty - çypar.** Guýrugy ýabaly. Guýrugynyň çetki ýeleklere uzalan, goňur-gara uçly ak. Çüňki gysga, inli, düýbi gyzylymtyl, gara reňkli, agyz kesimi giň. Aýaklary gara. Gyşyna uly we ýaş guşlar öçügsi reňkli. Olaryň ganatlary we gowşak ýabaly guýrugy agymtyl uçly. Gykylykçy guş, sesi şöwhunly - “kýurre-kek-kittik”. Uzynlygy – 255-270, horazlarynyň ganaty – 182-200, mäkiýanlarynyňky – 185-192, çüňki – 13.3-13.5 mm, agramy – 90 g çenli.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ganatynyň aşagynyň **çypardygy** ýada **goňrasdygy** garlawaç pisint sähra çulukdan; **uçup barýarka uly garlawajy ýada salýan** özboluşly gabarasy bilen beýleki çuluklardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän döwründe Günorta Ýewropanyň, Kiçi, Alyňky we Orta Aziýanyň, Günorta Gazagystanyň, şeýle-de Afrikanyň

Полевые признаки: размером с мелкую чайку, с относительно коротким клювом и ногами. Летом самцы и самки окрашены сходно, за исключением цвета «уздечки» – у самок она темно-бурая, а не черная. Спина дымчато-бурая с серо-зеленым оттенком. Надхвостье белое. Горло и низ шеи светло-рыжие. Вниз от глаз, ограничивая горло, идет узкая черная полоска. Грудь дымчато-бурая, в задней части белесая, с рыжеватым налетом. Брюшко и подхвостье белые. Крылья черные. **Испод крыла и подмышечные – каштановые или ярко-рыжие.** Хвост вильчатый. Крайние хвостовые перья удлиненные, белые с коричнево-черными концами. Клюв короткий, широкий, черного цвета, с красноватым основанием, разрез рта широкий. Ноги темные. Взрослые зимой и молодые имеют более тусклую окраску. Крылья и слабо вильчатый хвост у них имеют светлые окончания. Крикливая птица, голос трескучий – «кюрге-кек киттик». Длина – 255-270, крыло самцов – 182-200, самок – 185-192, клюв – 13.3-13.5 мм, вес – до 90 г.

Сходства – отличия: от степной тиркушки отличается **рыжим** или **каштановым** исподом крыла. От других – своеобразным силуэтом – **в полете напоминает крупную ласточку.**

Распространение: в гнездовой период – побережья водоемов Южной Европы и Малой, Передней и Средней Азии, Южного Казахстана,

günorta böleginiň käbir ýerlerindäki suw ýataklaryň kenarýakalary. Uçup geçende giňişleýin gabat gelýär. Türkmenistanda içki suw ýataklaryň golaýynda we Hazar deňziniň kenarýakasynda. Merkezi we Günorta-Gündogar Afrikada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtleýän guş. Ýazyna martyň aýagyndan maýyň başyna, güýzine – awgustyň soňundan oktyabr aýyna çenli uçup geçýär. Açyk giňişlikleri halaýar, emma, adaçça suw ýataklarynyň golaýynda gezýär. Topar bolup, ýerde höwürtleýär. Höwürtgese kiçiräk çukurjyk. Maý-ijunda 3 sany gür menekli kirliräk-ak ýumurtgalary goýýar. Jüýjeleri iýunyň aýagynda çykýar. Iýulda jüýjeleri uçurym bolýarlar. Uly mör-möjekler, tomzaklar we çekirtgeler bilen, olary ýerden çöplöp we howadan gapyp iýmitlenýär.

Statusy: köp sanly däl we ýeterlik öwrenilmedik görnüş.

165. Garlawaç pisint sähra çulugy – *Glareola nordmani* – Степная тиркушка

Meýdan alamatlary: tomsuna horazlary mäkiýanlaryna meňzeş we garlawaç pisint çemen çulugyna örän çalymdaş, ýöne ondan ulurak, ýabaly guýrugy has çuň oýukly. Reňki has goýy, **ganatlarynyň aşagy gara.** Ýaşlary öçügsi reňkli. Sesi köplenç “kettek”, “ke-ti-tik” ýada “tr-r-rt”. Horazlarynyň uzynlygy – 250-285, mäkiýanlarynyňky – 255-280, horazlarynyň ganaty – 182-204, mäkiýanlarynyňky – 183-200 mm, agramy – 87-105 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: “uçyan garlawaç” gabaraly - beýleki çuluklardan **ganatlarynyň aşagy-**

а также местами в южной половине Африки. На пролете встречается шире. В Туркменистане – вблизи внутренних водоемов и на побережье Каспия. Зимует в Центральной и Юго-Восточной Африке.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весенний пролет – с конца марта до начала мая. Осенний – с конца августа до октября. Тяготеет к открытым пространствам, но, обычно, держится вблизи водоемов. Гнездятся прямо на земле, образуя колонии. Гнездо – небольшая ямка в грунте. Кладки в мае-июне, обычно из 3 грязновато-белых яиц с густыми пятнами. Пуховички – в конце июня. Хорошо летающие молодые – с июля. Питается крупными насекомыми, жуками и саранчой, которых ловит на земле и на лету.

Статус: немногочисленный и недостаточно изученный вид.

Полевые признаки: взрослые самцы и самки летом окрашены сходно и очень похожи на луговую тиркушку, но крупнее ее, а вырезка вильчатого хвоста еще глубже. Окраска более темная, **испод крыла черный.** Молодые птицы окрашены тусклее. Голос – часто «кеттек», «ке-ти-тик», или «тр-р-рт». Длина самцов – 250-285, самок – 255-280, крыло у самцов – 182-204, у самок – 183-200 мм, вес – 87-105 г.

Сходства-отличия: от других отличается характерным силуэтом «**летающей ласточки**», от луговой тиркушки – **черным исподом**

nyň garadygy bilen garlawaç pisint çemen çulukdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta-Gündogar Ýewropanyň we Gazagystanyň sähra zolagynyň suw ýataklaryna ýanaşyk ýerlerinde höwürtleýär. Uçup geçende giňişleýin duşýar. Türkmenistanda içki suw ýataklarda we Hazar deňziniň kenarýakasy. Günorta, Günbatar Afrikanyň käbir ýerlerinde gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän guş, suwdan daş bolmadyk açyk giňişliklerde saklanýar.

Statusy: örän seýrek, bizde heniz öwrenilmedik görnüş, MSOP-nyň Gyzyly sahypasyna girizilen.

Deňizçi çarlaklar – *Stercorariidae* – Поморниковые

Ganatlary uzyn çowly we gurugynyň ortaky ýelekleri uzalan orta ölçeglerdäki guşlar maşgalasy. Daşyndan çarlaklara meňzeş. Deşli çüňkiniň uju gaňyrçakly egmek, aýaklary teňňeli egmek ýiti dyrnakly. Demirgazyk we günotra ýarymşaryň sowuk giňişliklerinde ýaýran. Migrasiýa döwründe uçup, tötänden kontinentleriň içine, şol sanda Orta Aziýa hem aralaşmaklary mümkin. Gemrijiler (lemminigler), balyklar bilen iýmitlenýär. Deňizçi çarlaklar, başgaça, ogy mugthorlar, ýagny beýleki guşlary (çarlaklary, çerikleri) howada kowalap, agzyndaky pidalaryny taşlamaga mejbur edip, iýmitlenýärler. Seýle-de beýleki guşlaryň, aýratyn-da, deňizýakasyndaky guşkoloniýalaryna ýanaşyk ýerlerde öz höwürtgelerini gurup, ýumurtgalaryny we jüýjelerini iýýärler.

Türkmenistanda bu maşgaladan (jemi 5 görnüş), Hazar deňzine

крыла.

Распространение: гнездится на водоемах степной зоны Юго-Восточной Европы и Казахстана. На пролете встречается шире. В Туркменистане – внутренние водоемы и Каспийское побережье. Зимует в Южной, местами в Западной Африке.

Образ жизни: пролетная птица, придерживается открытых пространств недалеко от водоемов.

Статус: очень редкий, почти не изученный у нас вид, внесен в Красный список МСОП.

Семейство птиц средних размеров с длинными острыми крыльями и удлинёнными средними перьями хвоста. Внешне схожи с чайками. Конец мощного клюва загнут крючком, лапки чешуйчатые с острыми загнутыми коготками. Распространены в холодных широтах северного и южного полушарий. Во время миграций могут залетать далеко вглубь континентов, в том числе, и Среднюю Азию. Питаются грызунами (лемминги), рыбой. Поморники – клептопаразиты – то есть отнимают корм у других птиц (чайки, крачки), преследуя их в воздухе, заставляя бросить добычу. Поедают также яйца и птенцов других птиц, особенно морских, вблизи колоний которых устраивают свои гнезда.

Из этого семейства (всего 5 видов) в Туркменистан, на Каспий и Сарыкамыш спорадично мо-

we Sarygamyş kölüne 3 görnüşini seýregräk, tötänden uçup gelmekleri mümkin: deňizçiýany **uzyngúruk çarlak – Stercorarius longicaqudus** (sur. 166), onuň ölçeği keperdi ýaly, deňizýany çarlaklardan iň kiçisi, onuň guýruk ýeleklerinden iki sany ortaky ýeleginiň has uzyndygy, uçup barýarka galgaýandygy oňat görünýär; **posly çarlak – Stercorarius parasiticus** (sur. 167), ölçeğleri deňizýany uzyngúruk çarlakdan ulurak, guýrugynyň ortasynda iki sany çowly ýelekleri bolýar; deňizçiýany **orta çarlak – Stercorarius pomarinus** (sur. 168), olaryň arasynda iň ulusy, onuň guýrugynyň ortasyndaky ýelekleri çowly däl, tegelenen we biraz düýrlenen, şonuň üçin, uçup barýarka aýaklary yza uzalan ýaly bolup görünýär.

Çarlaklar – Laridae – Чайковые

Ululyklary keperiden gazlara çenli bolan, dürli guşlar maşgalasy. Göwresi dykyz, ganatlary inli we uzyn uçlary çowly. Guýrugy orta uzynlykda, inli, käte oýuk ýa-da uzalyp ösen çetki ýa-da ortaky guýruk ýelekli. Umuman, açyk reňkli, emma, üstki tarapy, adatça, garamtylrak – ýulyň möwsümine we guşlaryň ýaşyna baglylykda açyk-gökden gara reňke çenli. Kellesi käte garamtyl “telpejikli”. Çünki orta uzynlykda, daýaw, gapdalyndan gysylan, uýy gapyrgaly, gaňyrçakly ýa-da gaňyrçakly däl. Aýaklary gysgarak, penjeleri, adatça, dört barmakly, öňki 3-si ýüzgüç perdeli. Zeminiň nemme ýerlerinde mekan tutýar, deňizleriň we suw yataklaryň kenaryakalarynda gezyär. Topar (koloniya) bolup ýaşa-

гут залетать 3 вида: **длиннохвостый поморник – Stercorarius longicaqudus** (рис. 166), самый мелкий из поморников, размером с голубя, у него хорошо заметны сильно удлинённые два центральных хвостовых пера (колышутся в полете); **короткохвостый поморник – Stercorarius parasiticus** (рис. 167), размером крупнее длиннохвостого поморника, имеет заострённые два центральных пера на хвосте; **средний поморник – Stercorarius pomarinus** (рис. 168), наиболее крупный из них, у него центральные хвостовые перья не заострены, а закруглены, повернуты вертикально и при виде сбоку выглядят как вытянутые ноги.

Семейство птиц различной величины от голубя до гуся. Туловище плотное, крылья широкие и длинные с острыми концами. Хвост средней длины, широкий, иногда с выемкой или удлинёнными крайними или средними перьями хвоста. Окраска, в основном, светлая, но верх обычно темнее – от светлосизого до черного, в зависимости от сезона года и возраста птицы. Голова иногда с темной «шапочкой». Клюв средней длины, сильный, сжатый с боков, на конце ребристый, с крючком или без него. Ноги невысокие, лапы обычно четырехпалые, 3 передних пальца с перепонками. Населяют все части света, приурочены к побережьям морей

ýarlar. Çägeli burunlarda, adalarda, dag gaýalarynda we agaçlarda seýregräk höwürte gurýarlar. Guşlaryň horazlary hem mäkíýanlary kürk bolup oturýarlar we jüýjelerini bilelikde iýmitlendirýärler. Jüýjeleri ýumurtgadan daşy penalayjy reňkli sütük ýelekli çykýarlar, olar daşy gurandan soň, howp abananda, ylgap gaçýarlar. Guşlaryň toparynyň bimaza edilmegi, olaryň jüýjeleriniň körçülikleýin gyrylmagyna getirmegi mümkin. Haýwan iýmiti, mörmöjekler, balyklar, maýda süýrenijiler we gemrijiler bilen iýmitlenýärler. Dünýäde 46 görnüş, şolaryň 9-sy Türkmenistanda.

169. Garabaş gülegen çarlak – Larus ichthyaetus – Черноголовый хохотун

Meýdan alamatlary: gülegen çarlaklardan ulurak we dykyzrak (uly towuk ululygynda). Üstki tarapy gögümtýl-räk-çal, **ganatlarynyň uýy we kellesi gara**, bedeniniň gалан bölegi-ak. **Çünki daýaw, uýy gyzyl we gara bellikli sary.** Gözleri gara, gabaklary gyzyl, aýaklary sary. Gyşky ýelek örtügi kellesiniň ak garyndylydygy bilen tapawutlanýar. Ýaş guşlaryň arka tarapy çalymtly-goňur, ýelekleri agymtly gaýmaly, **guýrugynyň uýy gara zolakly**, garyn tarapy ak, döşi - çalymtly ýokundyly we petekesiniň gapdallary aýdyň däl menekli. Aýaklary çalymtly-goňur, çünki garamtylrak. Sesi pessaý we bogazdan çykýar, ümsüm, “gülki” sesleri çykarmaýar. Uzynlygy – 70, ganatly – 48, ganatlarynyň gerimi – 152, guýrugy – 19 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **ölçeğleriniň uludygy we kellesiniň garadygy bilen** beýleki çarlaklardan oňat tapawutlanýar.

и водоемам. Ведут колониальный образ жизни. Гнезда устраивают на песчаных косах, островах, обрывистых скалах, реке деревьях. Насиживают и выкармливают оба родителя. Птенцы полувыводковые, сначала в пуховом наряде и имеют покровительственную окраску, при опасности разбегаются. Беспокойство колонии может привести к массовой гибели птенцов. Питаются животной пищей, поедая насекомых, рыбу, мелких рептилий и грызунов. В мире 46 видов, из которых в Туркменистане - 9.

Полевые признаки: крупнее и плотнее чайки хохотуни (величиной с крупную курицу). Сверху голубовато-серый, **концы крыльев и голова черные**, остальные части тела – белые. **Клюв массивный желтый с красной и черной отметиной на конце.** Глаза карие, веки красные, ноги желтые. Зимний наряд отличается примесью белого на голове. У молодых спинная сторона серовато-бурая со светлыми каемками перьев, **хвост с черной полосой на конце**, брюшная сторона белая с сероватым налетом на груди и с неясными пестринами по сторонам зоба. Ноги серовато-бурые, клюв черноватый. Голос низкий и гортанный, довольно молчалива, не издает «хохочущих» звуков. Длина – 70, крыло – 48, размах крыльев – 152, хвост – 19 см.

Сходства – различия: от других чаек хорошо **отличается крупными размерами и черной головой.**

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän ýerleri – Azow we Hazar deňizleri, Gazagystanyň we Merkezi Aziýanyň (käbir ýerlerde) kölleri. Orta Aziýada we Türkmenistanda uçup geçende we gonup - göçende, gyşlanda Hazar deňzinde, Sarygamyşda (höwürtegeleýär) we içki uly suw yataklarda gabat gelyär. Ortaýer deňziniň gündogar kenarynda, Gyzy deňziniň, Pars aýlagynyň, Günorta Arabystanyň we Hindistanyň kenarykalarynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup gelyän-höwürtegeleýän we gyşlaýan guş. Ýazyna mart-aprelde, güýzine – iýul-awgustda uçup geçýär. **Toparlar örän gür bolup höwürtegeleýär.** Höwürtegeleýän ýerine uçup gelenden (mart) we ilkinji höwürtegeleýäni gurýan wagtyna çenli (aprelniň birinji ongünligi) bir aý wagty içine alýar. Kenaryakadaky çäge tükmeçleriniň arasynda, adalarda, gapaklan şorluk ýerlerde höwürtegeleýär. Höwürtegesi – düýbüne çybyjaklardan, balyk-gulakdan we getirip iýen iýmitiniň galyndylaryndan galyň düşelenje oýjagaz. Adatça, 3 sany garamtyl mекli, mesge reňkden mawumtyldan goňura çenli ýütgeýän gabykly ýumurtgaly goýýar, ölçegleri 79 x 54 mm. Maý aýynyň birinji ongünliginde jüýjeleri çykýar. Uly guşlar nätanyş jüýjelere gabanjaň çemeleşýärler, jüýjelerini bir näçe gün geçeinden soň höwürtegeden äkidýärler we “bakja” döredýärler. Esasy iýmiti – maýda balyklar, aglaba ölüleri ýa-da näsaglary, maýda gemrijiler, suwulganlar we mör-möjekler bilen hem iýmitlenmekleri mümkin.

Statusy: bizde seýrek görnüş, Hazar goraghanasynyň we Gaplaňgur

Распространение: область гнездования – Азовское и Каспийское моря, озера Казахстана и Центральной Азии (местами). В Средней Азии и Туркменистане – во время пролета и кочевок: зимой гнездится на Каспии и Сарыкамыше, спорадически на других внутренних водоемах. Зимуют на восточном побережье Средиземного моря, на берегах Красного моря, Персидского залива, Южной Аравии и Индостана.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся и зимующая птица. Весенняя миграция – в марте-апреле, осенняя – в июле-августе. **Гнездится очень плотными колониями.** С момента прилета на места гнездования (март) и до образования первых гнезд (первая декада апреля) проходит около месяца. Гнездится на песчаных дюнах и островах, на участках пухлых солончаков. Гнезда – небольшие углубления с массивной подстилкой из веточек, ракушек и остатков принесенной пищи. В кладке обычно 3 яйца от сливочного, голубоватого до коричневатого цвета с темными пестринами, размером 79 x 54 мм. Птенцы – в первой декаде мая. Взрослые агрессивны по отношению к чужим птенцам. Через несколько дней после вылупления родители уводят птенцов из гнезда и образуют «ясли». Основной корм – мелкая рыба, преимущественно, мертвая или больная, может питаться мелкими грызунами, ящерицами и насекомыми.

Статус: редкий у нас вид. Один из наиболее интересных представителей птиц Хазарского государственного заповедника и Сарыка-

goraghanasynyň Sarygamyş çäkli goraghanasynyň guşlarynyň iň täsin wekilleriniň biri.

170. Bellik: Hazar deňziniň türkmen kenaryna wagtal-wagtal **gарабаş çarлак – Larus melanocephalus**, tötänden uçup gelyär (1977 ý. ilkinji gezek), ol köl çarlagyna çalymdaş, emma biraz ulurak we kellesi goňur däl-de, ýalpyldawuk-garadygy (kellesi gyşyna agymtyl) we ganatlarynyň uçlarynyň akdygy, gapdalyndan gysylan gaňurçagrak çünki bilen tapawutlanýar.

171. Kiçi çarлак – Larus minutus – Малая чайка

Meýdan alamatlary: ululygy kepderi ýaly, çarlaklaryň arasynda iň kiçisi. **Ýazyna kellesi gara, çünki – goýy-gyzyl reňkli. Güýz-gyş döwründe kellesi ak**, depesi we gözünüň yzy (edil köl çarlakdaky ýaly) garamtyl meýdançaly, **çünki – garamtylrak.** Aýaklary merjenreňk-gyzyl, gözleri gara, gabagynyň gyralary gyzyl. Ýaş guşlaryň arka tarapy goýu-goňur, ýelekleriniň gyralary agymtyl. Guýrugynyň üsti ak, uýy gara zolakly. Garyn tarapy ak, petekesiniň gapdallary garamtyl tegmilli, aýaklary gyzylmytyl-goňur. Ganatlarynyň kakyp-kakyp uçýar, sesi ýiti däl – “keý-keý-keý”. Uzynlygy – 28, ganaty – 22, ganatlarynyň gerimi – 70, guýrugy – 9 sm, agramy – 108-119 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **ölçeçleriniň kiçidiği** bilen beýleki çarlaklardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealy bölek-bölek. Demirgazyk Ýewropada, Günbatar Sibirde we Demirgazyk Gazagystanda, Baýkal kölüniň ýakalarynda we Gün-

мышского заказника.

170. Примечание: на туркменском побережье Каспия эпизодически отмечаются (первый раз в 1977 г.) залеты **черноголовой чайки – Larus melanocephalus**, которая похожа на озерную чайку, но чуть крупнее и отличается блестяще-черной, а не коричневой головой (зимой голова светлая) и белыми концами крыльев, и сжатым с боков, крючковатым клювом.

Полевые признаки: самая мелкая из чаек, величиной с голубя. **В весеннее время голова черная, клюв – темно-красного цвета. В осенне-зимнее время голова белая** с темными участками на темени и позади глаз (как у озерной чайки), **клюв – черноватый.** Ноги кораллово-красные, глаза карие, края век красные. У молодых спинная сторона темно-бурая с беловатыми краями перьев. Надхвостье белое, хвост – с черной полосой на конце. Брюшная сторона белая с темным пятном по бокам зоба, ноги красновато-бурые. Полет порхающий, голос не резкий – «кэй-кэй-кэй». Длина – 28, крыло – 22, размах крыльев – 70, хвост – 9 см, вес – 108-119 г.

Сходства – различия: от других чаек **отличается мелкими размерами.**

Распространение: ареал разорван. Гнездятся в Северной Европе, Западной Сибири и Северном

dogar Sibiriň günortasynda, käte Demirgazyk Amerikanyň gündogarynda höwürtegeleýär. Uçup geçende wagtal-wagtal Orta Aziýada, Türkmenistanda, güş döwründe Hazar deňzinde gabat gelyär. Günbatar we Günorta Ýewropanyň kenaryakalarynda, Hazar we Sary deňizleriň kenarlarynda, Demirgazyk Amerikanyň gündogar kenaryakasyňyň käbir ýerlerinde gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-gyslaýan guş. Ýazyna apreliň ortasyndan maýda, güýzine – awgust-sentyabrda uçup geçýär. Aglaba, uçup barýarka mör-möjekleri tutup iýmitlenýär (garlawaçlar ýaly suwuň üstünde aw edýär), maýda we näsag balyklary hem iýýärler.

Statusy: seýrek, bizde az öwrenilen görnüş.

172. Köl çarlagy – *Larus ridibundus* – Озерная чайка

Meýdan alamatlary: ululygy garaga ýaly, orta ölçegli çarлак. Arkasy we ganatlary agymtyl-gök, **ganatlarynyň uçlary gara.** Boýny, garyn tarapy we guýrugy ak. **Kellesi ýazyna goňurrak mele “telpejikli”.** Çünki we aýaklary goýu-gyzyl. **Kellesi Güşky ýelek örtüginde agymtyl,** boýnunyň aşaky bölegi çal, gözünüň zýy goýu-çal menekli. Ýaşlarynyň üstki tarapy goňurrak, garny – ak, bokurdagy we petekesi çupar öwüşginli. Ganatlarynda gara reňk agdyklyk edýär. Guýrugunyň guralary gara kese zolakly, çünki garamtylrak uçly, aýaklary sarymtyl. Sesi süýndirilýän gagyldama çalymdaş. Uzynlygy – 42, ganaty – 32,

Казахстане, в Забайкалье и юге Восточной Сибири, спорадично на востоке Северной Америки. В Средней Азии спорадично на пролетах, в Туркменистане – на Каспии в зимнее время встречается нерегулярно. Зимуют на побережьях Западной и Южной Европы, Каспийском и Желтом морях, местами на восточном побережье Северной Америки.

Образ жизни: пролетная, зимующая птица. Весенний пролет – с середины апреля, в мае, осенний – август-сентябрь. Питаются, преимущественно, насекомыми, которых ловят на лету (как ласточки, охотясь над водой), потребляют и рыбу, в основном, мелкую и большую.

Статус: редкий, слабоизученный у нас вид.

Полевые признаки: чайка среднего размера величиной с ворону. Спина и крылья бледно-сизые, **крылья с черными концами.** Шея, брюшная сторона и хвост белые. **Весной на голове коричнево-бурая «шапочка».** Клюв и ноги темно-красные. **В зимнем оперении голова светлая,** нижняя часть шеи серая, за глазом темно-серое пятно. У молодых верх буроватый, брюшная сторона – белая с рыжим оттенком на горле и зобу. Крылья с преобладанием темных тонов. Хвост с черной поперечной полосой по краю. Клюв с черноватым концом, ноги желтоватые. Голос по-

ganatlarynyň gerimi – 94, guýrugy – 13 sm, agramy – 250-400 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ganatlarynyň uçlarynyň garadygy, emma, ak tegmilleriň ýokdygy we çüňküniň gapdallaryndan gysylan daldigi gara kelle we ak çarlaklardan; ganatynyň aşagynyň akdygy bilen kepderipisint deňiz çarlakdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: giň, endigan däl. Ýewropanyň, demirgazyk-gündogar çetlerinden başgalynda, Aziýanyň tokaý, tokaýly sähra we ýarymçöllük zolaklarynda höwürtegeleýär. Orta Aziýada we Türkmenistanda - derýalaryň jülgelerinde, köllerde, suw howdanlarynda we beýleki suwly ýerlerde, şeýle-de deňiz kenaryakasynda. Ortaýer deňzinde, Gara we Hazar deňizlerinde, Gündogar we Günorta Aziýanyň kenaryakalarynda, Gündogar we Demirgazyk-Günbatar Afrikada gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtegeleýän, bölekleyin gyslaýan we gonup-uçup gezyän (Hazar deňzinde) guş. Ýazyna fewralda uçup gidýär we aprelda uçup geçýär, gijä galanlary maýda, gonup-uçup gezyänleri iýun-awgustda duşýar. Güýzüne-sentyabr-oktyabrda uçup geçýär, gyslaýanlary - dekabrdan gabat gelyär. Suw ýataklaryň kenaryakalarynda, topar döredip, käte çarlaklar ýa-da çerikler bilen bile höwürtegeleýär. Aprelde 3 sany goňur menekli ýaşylymtyl - goňurrak ýumurtgalary goýýar. Iýulda jüýjeleri uçurym bolýarlar. Aglaba, haýwan iýmiti: gur-

хож на растянутое карканье. Длина – 42, крыло – 32, размах крыльев – 94, хвост – 13 см, вес – 250-400 г.

Сходства – отличия: от черно-головой и сизой чайки отличается черными концами крыльев, но без белых пятен и не сжатым с боков клювом. От морского голубка – белым исподом крыльев.

Распространение: широкое, неравномерное. Гнездится в Европе, кроме крайнего северо-востока, в лесной, лесостепной и полупустынной зонах Азии. В Средней Азии и Туркменистане – по долинам рек, озерам, водохранилищам и другим водоемам, а также морскому побережью. Зимует в Средиземноморье, на Черном и Каспийском морях, по побережьям Восточной и Южной Азии, Восточной и Северо-Западной Африки.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся, частично зимующая и летующая (на Каспии) птица. Отлет и весенний пролет в феврале и до апреля, позднепролетные – в мае, летующие – в июне-августе. Осенний пролет в сентябре-ноябре, зимующие – с декабря. Гнездится по берегам водоемов, образуя колонии, нередко с другими чайками или крачками. Кладка – в апреле, состоит из 3 яиц зеленовато-буроватого окраса с бурыми пятнами. Птенцы – в июне, летными становятся в июле. Питается, преимущественно, животными кормами – червями, водными и наземными насекомыми, мелкой большой ры-

çuklar, suw we gury ýer mör-möjekleri, näsag maýda balyklar, gurbagalar, suwulganlar we gemrijiler bilen iýmitleňýär.

Statusy: adaty, uçup geçende käbir ýerlerde köpsanly görnüş.

173. Kepderi pisintli deniz çarlagy – *Larus genei* – Морской голубок

Meýdan alamatlary: ululygy keperdi ýaly guş. **Bedeniniň üstki tarapy gögümtil-çal, kellesi, boýny we guýrugy ak. Ganatlary çal, uçlary gara. Bedeniniň aşaky tarapy agymtyl, garny we döşi gülgüne öwüşginli.** Gyşky ýelek örtüginde gülgüne reňki solýar, gulaklaryny örtüji ýelekleri gara tegmilli, depesi we ýeňsesi çal ýokundyly. Gözleri göwher renk-ak, ýaş guşlaryňky agymtyl-gara, gabaklarynyň gyralary sary. Çünki başgalara garanyňda inçe we uzyndan gyzyly, aýaklary goňurrak-gyzyly. Ýaşlarynyň üsti çalymytyl, aşagy ak, ganatlarynyň uýy gara we guýrugynyň çetki ýelekleri insiz zolakly, çünki we aýaklary garamtyl. Sesi özboluşly “kerr-kerr” sesleri ýadyňa salýar. Ýeňil we gyra deň uçýar. Uzynlygy – 45, ganaty – 30, ganatlarynyň gerimi – 102, guýrugy – 12 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ululary we ýaşlary ölçepleriniň kiçidigi, bedeniniň gelsiklidigi, çünkiniň inçe gönüdigini - ak çarlakdan; höwürtgelyän döwründe uly guşlarda goňur “telpijigini” ýokdygy, höwürtgelanden soň - uly we ýaş guşlaryň ganatlarynyň garamtyldygy bilen köl çarlakdan

бой, лягушками, ящерицами и грызунами.

Статус: обычный, на пролетах иногда многочисленный вид.

Полевые признаки: птица величиной с голубя. **Верхняя часть туловища голубовато-серая, голова, шея и хвост белые. Крылья серые, концы черные. Нижняя сторона тела светлая с розоватым оттенком на брюхе и груди.** В зимнем оперении розоватый оттенок исчезает, на кроющих уха темное пятно, на темени и затылке серый налет. Глаза жемчужно-белые, у молодых птиц светло-карие, края век желтые. Клюв относительно тонкий и длинный, красный, ноги коричнево-красные. Молодые с сероватым верхом и белым низом, с черными концами крыльев и узкой полосой по краю хвоста, клюв и ноги темные. Голос своеобразный, напоминает звук «керр-керр». Полет легкий и ровный. Длина – 45, крыло – 30, размах крыльев – 102, хвост – 12 см.

Сходства – отличия: взрослые и молодые от сизой чайки отличаются меньшими размерами, изящным туловищем, прямым тонким клювом. Взрослые от озерной чайки в гнездовой период отсутствием бурой «шапочки», взрослые вне гнездовой период и молодые – темными тонами крыла.

tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ortaýer, Gara, Azow, Hazar deňzleriniň käbir ýerlerinde, Alynky Aziýanyň we Gazagystanyň käbir köllerinde höwürtgelyýär. Uçup geçende giň ýaýran. Türkmenistanda, aglaba, deňizde, seýregräk içki suw ýataklarda. Köpüsi Gyzyly deňziň, Pars aýlagynyň we Günorta Arabystanyň kenarýakalarynda, bir bölegi höwürtgelyän çäklerinde, gonup-göçüp guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup gelyän-höwürtgelyän, bölekleyin gonup uçup gezyän we guşlaýan guş. Martyň başynda uçup gidýär we uçup geçýär, apreliň aýgyndan iýulyň ortasyna çenli höwürtgelyýär, güzüne -awgustyň soňundan noýabra çenli uçup geçýär. Topar bolup höwürtgelyäme girişän wagtyna çenli kiçiräk süri bolup, gonup-göçüp gezyärler. Gür topar bolup, seýregräk, beýleki çarlaklar bilen bilelikde höwürtgelyýär. Höwürtgesi şora we suwotularyň sypalyndan gurulan galyň düşekli. Höwürtgäniň gyralary guş tezeginden gatap berkeýär we ak reňki alýar. 1-3 sany garamtyl menekli açyk reňki (reňki üýtgeýär) ýumurtgalary goýýar. Iýunda jüýjeleri çykýar, soňra olary guşlar umumy “bakja” äkidýärler, olar iýulyň soňunda uçurym bolýarlar. Maýda balyklar we oňurgasyzlar bilen iýmitleňýär.

Statusy: köpsany däl, käbir ýerlerde adaty görnüş, aw ahmiýeti ýok.

Распространение: гнездится местами на Средиземном, Черном, Азовском, Каспийском морях, некоторых озерах Передней Азии и Казахстана. На пролете широко. В Туркменистане, преимущественно, на море, реже на внутренних водоемах. Большинство зимует у побережья Красного моря, Персидского залива и Южной Аравии, часть особей в пределах гнездовых областей, предпринимая кочевки.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся, частично летующая и зимующая птица. Отлет и пролет – с начала марта, гнездование – с конца апреля до середины июля, осенний пролет – с конца августа до ноября. До образования гнездовых колоний кочуют небольшими стаями. Гнездится плотными колониями, нередко совместно с другими чайками. Гнездо – массивная постройка из веточек солянок и водорослей. От помета птиц край гнезда твердеет и приобретает белую окраску. В кладке 1-3, светлых с темными пестринами яиц (окраска варьирует). Пуховички появляются в июне, затем уводятся взрослыми в общие «ясли», на крыло поднимаются в конце июля. Питается мелкой рыбой и беспозвоночными.

Статус: немногочисленный, местами обычный вид, охотничьего значения не имеет.

174, 175. Bellik: Gündogar Hazara wagtal-wagtal **garamtylarka çarлак – Larus fuscus** tötänden uçup gelýär. Ol uly çarлак bolup, gülegen çarlaga (aýratyn-da, ýaşlary) örän çalymdaş, emma ölçegleri sähelçe kiçiräk we arkasy garamtylrak goýu-goňur, gysyna kellesi - garamtyl me-nekli.

Gündogar Hazaryň (2008 ý.) çar-laklar maşgalasyndan bolan ýene-de bir görnüşiň – **Uly çalymtyl çarlagyň – Larus hyperboreus** tötänden uçup gelendigi bellendi. Ol ölçegleri boýunça bizdäki çarlaklaryň arasyn-da iň ulusy bolup, olardan açyk çalymtyl ganatlarynyň uçlarynyň akdygy (ýaşlarynyň ganatlary - açyk goňurrak-çal) bilen tapawutlanýar.

176. Ak çarлак – Larus canus – Сизая чайка

Meýdan alamatlary: ölçegi garga-dan ulurak, gülegen çarlaga çalymdaş, emma ondan mese-mälim kiçi. Ýazyna uly guşlaryň arkasy we ganatlary agymtyl-çal, **gara uçlary ak tegmilli**. Egniniň ýelekleriniň uçlary ak. Kellesi, boýny, garyn tarapy we guýrugy bir reňk - ak. **Çünki gapdallaryndan gysylan, sary reňkli**, aýaklary ýaşylymtyl, gabaklarynyň gyrasy gyzyly, gözleri gara. Gyşky ýelek örtüginde kellesi çalymtyl tegmilli we çyzykly. Ýaşlarynyň arkasy umumy agymtyl öwüşginli, ýelekleri ýagty goňurrak-çal gaýmaly. **Ganatlary garamtyl ak tegmilli däl**. Guýrugy ak, uçlary gara zolakly, aşaky tarapy ak çalymtyl-goňur bellikli. Aýaklary çalymtyl, **çünki gara, düýbi sarymtyl**

174, 175. Примечание: на Вос-точном Каспии бывают спорадиче-ские залеты **клуши – Larus fuscus**. Эта крупная чайка очень похожа на чайку-хохотунью (особенно моло-дые), но чуть меньших размеров и с темной, черновато-бурой спиной, а голова зимой с темными пестри-нами.

Там же на Восточном Каспии недавно (2008 г.) отмечен залет еще одного вида из семейства чайковых – **бургомистра – Larus hyperboreus**. Эта чайка по разме-рам наиболее крупная из наших чаек и отличается от них еще и бе-лыми концами светло-серых кры-льев (у молодых крылья – светло-буровато-серые), а грудь и брюхо - с буроватыми разводами.

Полевые признаки: размером крупнее вороны, похожа на чайку-хохотунью, но заметно меньше ее. У взрослых весной спина и крылья светло-серые, с **белыми пятнами на черных концах**. Плечи с белы-ми концами перьев. Голова, шея, брюшная сторона и хвост однород-но белые. **Клюв сжатый с боков, желтого цвета**, ноги зеленоватые, края век красные, глаза карие. В зимнем оперении – с сероватыми пятнами и штрихами на голове. У молодых птиц общий тон спины бледный, буровато-серый со свет-лыми каемками перьев. **Крылья без белых пятен на темных кон-цах**. Хвост белый с черной полосой на конце, нижняя сторона белая

reňkli. Sesi ýiti – “kiaa...kiaa” ýa-da “çak...çak”. Uzynlygy – 45, ganaty – 36, ganatlarynyň gerimi – 112, guýrugy – 14 sm, agramy – 375-550 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: öl-çegleriniň kiçidigi we sesi bilen güle-gen çarлакdan; ölçegleriniň uludygy, çünküniň sarymtyl düýpli garadygy we gapdallaryndan gysylandygy, aýaklarynyň sarymtyl - ýaşyldygy, ganatynyň uçlarynyň garadygy bilen keperdi pisint deňiz we köl çarлак-laryndan tapawutlanýar. Ýaşlarynyň guýrugy inli garamtyl zolakly.

Ýaşlan ýerleri: giň, emma en-digan däl. Ýewraziýanyň demirga-zygynda we Demirgazyk-Günbatary Amerikada, tundra zonasynan baş-galarynda, höwürtegeleýär. Günbatary we Günorta Ýewropada, Gündogar Aziýada, Demirgazyk Amerikanyň günbatarynda, Ortaýer, Gara, Hazar we Gyzyly deňzlerinde gyşlaýar. Türk-menistanda migrasiýa döwründe dürli ýerlerde giňişleýin gabat gelýär, deňzleriň kenarýakasynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: ýyllar boýunça sany üýtgýän, uçup geçýän we gyşlaýan guş. Yazyna fewralda - martda uçup geçýär we uçup gidýär, güýzüne – sentýabryň soňundan - noýabrda uçup geçýär, gyşlaýanlary dekabryň başynda uçup gelýär. Dürli suw oňurgasyzlyry, mör-möjekler, maýda oňurgalylyry, ukudaky balyklar, körçülikleýin tutulan balyklaryň galyndylary we beýleki zyňyndylar bilen iýmitleňýär, zir-zibil dökülýän ýerlerde hem gabat gelýär.

Statusy: adaty görnüş, aýratyn-da, gysyna Hazar deňzinde.

с серовато-бурными отметинами. Ноги сероватые, **клюв черный с желтоватым основанием**. Голос – пронзительное «киаа...киаа» или «чак...чак». Длина – 45, крыло – 36, размах крыльев – 112, хвост – 14 см, вес 375-550 г.

Сходства – отличия: от чайки-хохотуньи отличается меньшими размерами и голосом, от морского голубка и озерной чайки крупными размерами, черным с желтоватым основанием и сжатым с боков клю-вом, желтовато-зелеными лапами и черными концами крыльев. Моло-дые – широкой темной полосой на хвосте.

Распространение: широкое, но неравномерное. Гнездится на севере Евразии и в Северо-Запад-ной Америке, исключая зону тундр. Зимует у побережья Западной и Южной Европы, Восточной Азии, запада Северной Америки на Сре-диземном, Черном, Каспийском и Красном морях. В Туркменистане во время миграций встречается в различных местах, зимует на мор-ском побережье.

Образ жизни: пролетная и зимующая птица с колебаниями численности по годам. Отлет и ве-сенний пролет – в феврале-марте, осенний – в конце сентября-ноя-бре, зимующие – с начала декабря. Питается различными водными беспозвоночными, насекомыми, мелкими позвоночными, снулой рыбой отходами рыбных промы-слов и другими отбросами, попада-ется на кормежке на свалках.

Статус: обычный вид, особенно зимой на Каспии.

177. Gulegen çarлак – *Larus cachinnans* – Хохотунья

Meýdan alamatlary: bedeniniň üstki tarapynyň agymtyl-çal we aşagynyň ak, ýazky bezeginde, uly çarлак. Ganatlarynyň uçlary gara. **Aýaklary we çüňki sary, aşaky çüňküniň ujy gyzyl bellikli.** Kelle-si güýzki-gyşky ýelek örtüginde ak, boýny garamtyl inçe menekli. Ýaş guşlar – garamryl tegmilli we zolakly goňurrak. Olar 4 ýaşynda uly guşlaryň ýelek örtüginde geçýär. Sesi – gülki, guşlar kellesini yza gaýşardyp, gülkä çaly edýän owazlary edýär. Uzynlygy – 64, ganaty – 43, ganatlarynyň gerimi – 148, guýrugy – 16 sm.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: **kellesiniň aчык we arkasynyň çal reňkli, aýaklarynyň barmaklary sary we gyzyl bellikli sary çüňkli utgaşmasy** bilen bizdäki çarлакlaryň arasynda oňat saýlanýar.

Ýaýraýn ýerleri: höwürtleýän çäkleri – Günorta Ýewropa, Ortaýer, Gara we Hazar deňizleri, Gazagystan, Baýkal kölüniň ýakasy. Orta Aziýada we Türkmenistanda dürli suw ýataklarda, olaryň has ulularyny saýlaýar. Höwürtleýän ýerleriniň çäklerinde (Gazagystandan we Baýkal kölüniň ýakasyndan başgalarynda), şeýle-de Gyzyl deňizde, Demirgazyk-Günbatar Afrikanyň, Günorta Arabystanyň, Pars aýlagynyň we Günorta - Hytaý deňiziniň kenarkalarynda gyşlaýar.

Ýaşasy: uçup geçýän-höwürtleýän we gyşlaýan görnüş, bir bölegi Hazar deňzinde oturmly. Ýazyna martda-aprelde gonup-уçup migrasiýa geçýär, güyzine – sentýabr-oktyabrda uçup geçýär. Аýry-аýры топарлар ýа-da ýekelikde jübüt bo-

Полевые признаки: крупная чайка, в весеннем наряде со светло-серой верхней и белой нижней сторонами тела. Концы крыльев – черные. **Ноги и клюв желтые, на клюве красная отметина у конца подклювья.** В осенне-зимнем наряде голова белая, на шее темные тонкие пестрины. Молодые – буроватые с темными пятнами и полосками. Они приобретают оперение взрослых птиц на 4-й год жизни. Голос – хохочущие звуки, издавая которые, птица закидывает голову назад. Длина – 64, крыло – 43, размах крыльев – 148, хвост – 16 см.

Сходства – различия: хорошо выделяется среди других наших чаек **сочетанием светлой головы, серой спины, желтых лап и желтого клюва с красной отметиной.**

Распространение: область гнездования – Западная Европа, Средиземноморье, Черное и Каспийское моря, Казахстан, Прибайкалье. В Средней Азии и Туркменистане – на различных водоемах, из которых предпочитают более крупные. Зимуют в пределах областей гнездования (за исключением Казахстана и Прибайкалья), а также на Красном море, побережьях Северо-Западной Африки, Южной Аравии, Персидского залива и Южно-Китайского моря.

Образ жизни: пролетная, гнездящийся и зимующий вид, часть особей на Каспии оседла. Весенние перемещения и миграция – в марте-апреле, осенние – в сентябре-октябре. Гнездится разреженными колониями или одиночными парами,

луп, aglaba, balykgulak-çägelije ýа-da burunlaryň seýrek ösümlikli, gyrmançaly ýerlerinde, şeýle-de kiçräk adajyklarda, tolkunýň gyra çykaran gamyş üşmeklerinde ýа-da tümmeclerinde höwürtleýär. Höwürtgеси gury otlaryň sypallaryndan we ýelek galyndylaryndan galyň düşekli. Apreliň soňundan iýunyň başyna çenli ýumurtgalaýar. 3 sany goýy-çalymtyl-ýaşyl ýа-da çyparrak-çalymtyl-ýaşylymtyl menekli we tegmilli kütek tarapynda gür toplanan ýumurtgalary goýýar. Jüýjeleri takmynan bir aýdan soň çykýar. Az wagtdan juýjelerini "bakja" gabaýarlar, howp abananda suwa tarap ylgap, ýüzüp gidýarler. Güýz-gyş aýlary kiçiräk topar bolup gezyýär. Aglaba suwuň yüzünde gaýýan maýda balyklar, balykgulaklar, leňneçler, maýda gemrijiler, mör-möjekler, guşlaryň ýumurtgalary we jüýjeleri bilen iýmitlenyýär.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde köp sanly görnüş.

178. Bellik: Sarygamyş kölünde, 1988-nji ýylyň aprel aýynda, tötänden uçup gelen **gülgüne çarлак – *Rhodostethia rosea*** görüldi. Bu çarлак **tomus möwsümünde** ýelek örtügininiň ak-gülgünedigi, boýununyň insiz gara halkalydygy, toýnuk guýruklydygy we aýaklarynyň açygyzlydygy bilen beýleki çarлакlardan oňat tapawutlanýar.

Çerikler – *Sternidae* – Крачковые

Çarлакlara garanynda bu maşgalanyň wekilleri has maýda. Gündizine wagtynyň köp bölegini howada, wagtal-wagtal suwda ýüzüp geçirýar. Höwürteländen

преимущественно, на песчано-ракушечных или илистых косах среди редкой растительности, а также на небольших островках, на наносах тростника или кочках. Гнезда – с мощной подстилкой из сухой травы с примесью перьев. Кладка – с конца апреля до начала июня. В кладке 3 темно-серо-зеленых или рыжевато-серо-зеленых яйца с отчетливыми пестринами и пятнами, сгущающимися у тупого конца. Птенцы появляются примерно через месяц после откладки яиц. Чуть позже они образуют «ясли» и при опасности бегут к воде и уплывают. В осенне-зимний сезон держатся небольшими группами. Кормятся рыбой, преимущественно, мелкой и снулой, моллюсками, крабами, мелкими грызунами, насекомыми, яйцами и птенцами птиц.

Статус: обычный, местами многочисленный вид.

178. Примечание: в апреле 1988 г. на оз. Сарыкамыш был отмечен залет **розовой чайки – *Rhodostethia rosea***. Эта чайка **в летний сезон** хорошо отличается от других чаек бело-розовым оперением с узким черным кольцом на шее, клиновидным хвостом и ярко-красными ногами.

Представители этого семейства, в целом, более мелкие, по сравнению с чайками. Большую часть дневного времени проводят в воздухе, плавают посредствен-

soň, içki suw ýataklarda we deňziň kenarýakasynda we burunlarynda saklanýarlar. Bedeni süýnmek, inçe, ganatlary we çünki uzyn, uçlary çowly. Aýaklary gysgajyk, barmaklarynyň arasy ýüzgüç perdeli, guýrugy adatça ýaba, giň oýuk. Uçuşy kör öwrümlü we ýeňil, ganatlaryny çalt, emma seýrek güçli kakyp uçýarlar. Pidasyny synlap, howada saklanyp durýar. Olara ýokardan suwa inip, pidasyna hüjüm etmek häsiýetlidir. Esasan, balyklar we leňneçşekilliler, käte mör-möjekler bilen iýmitlenýärler. Jübütleşýän döwründe orän gohçyl we gykylykçy. Topar bolup, gysylyşyp höwürtgelärler. Çerikleriniň köpüsi höwürtgge gurmaýar, olaryň diňe bir ýerde däl, eýsem, gyrymsylaryň we agaçlaryň üstünde hem höwürtggelemekleri mümkin. Görnüşleriniň käbiri suwda ösümlükleriň sypallaryndan höwürtgge gurýarlar. Köpelyän döwründe toparyň bimaza edilmege, olaryň jüýjeleriniň körçülikleýin gyrylmagyna getirmege mümkin. Jüýjeleri 2-3 hepdeden soň uçurym bolýarlar. Maşgala özünde 43 görnüş jemleýär, olaryň 8-si Türkmenistanda.

179. Garaçünk çerik – *Sterna nilotica* – Чайконосная крачка

Meýdan alamatlary: orta ölçeqli çerik, arkasynyň we ganatlarynyň ýelekleri agymtyl-külreňk-çal bolup, gyralary inli gaýmaly. Ganatlary gögümtil-agymtyl-çal bolup görünýär. Edil şonuň ýaly, reňkli **guýrugy gowşak ýabaly. Bedeniniň aşagy ak, çalymtyl ýokundyly. Kellesiniň üstki bölegi we ýeňsesi ýaldyrawuk-gara.** Gyşky ýelek örtüginde **kellesi açyk-çal, gözünüň yzy garamtyl bellikli.** Ýaş guşlaryň kellesiniň üstki bölegi

но. Вне гнездовое время держатся на берегах и косах внутренних водоемов и морей. Тело вытянутое, тонкое, крылья и клюв длинные и острые. Ноги маленькие с перепонками на лапах, хвост обычно вильчатый, глубоко вырезанный. Полет маневренный, легкий, быстрый с редкими, но сильными взмахами крыльев. Могут зависать на одном месте, высматривая добычу. Типичный прием охоты – пикирование с небольшой высоты в воду. Питаются, в основном, мелкой рыбой и ракообразными, иногда насекомыми. В брачный период очень шумливы и крикливы. Гнездятся колониями, часто большими и плотными. Гнезда многие крачки не строят, хотя гнездятся не только на земле, но и на кустах и деревьях. Некоторые виды делают гнезда из растений на воде. Беспокойство колоний в период размножения может привести к массовой гибели птенцов. Подъем на крыло в возрасте 2-3 недели. Семейство включает 43 вида, из которых 8 – в Туркменистане.

Полевые признаки: средних размеров крачка, перья спины и крыльев светло-пепельно-серые с широкими каемками по краям. Крылья выглядят голубовато-светло-серыми. **Хвост слегка вильчатый** такого же цвета. **Низ тела белый** с серым налетом. **Верхняя часть головы и затылок блестяще-черные.** В зимнем оперении **голова светло-серая, а за глазом темная отметина.** У молодых верх-

ýagty çuparrak ýokundyly, boýnunyň gapdallary sarymytyl tegmilli. Gözleri gara, çünki we aýaklary garamtyl. Sesi – mylaýym, şowhunsyz - “kewek-kewek”. Uzynlygy – 40, ganaty – 30, ganatlarynyň gerimi – 80, guýrugy – 13 sm, agramy – 200 g golaý.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: keltelen çüňküniň has egmekdigi bilen derýa we alaburun çeriklerden tapawutlanýar. Aýaklary inçe we uzyn, barmaklary gysga we arasyndaky ýüzgüç perdesi çuň oýuk. Guýrugy gysga, ýalpak oýukly.

Ýaýran ýerleri: höwürtggeleýän çäkleri – Günorta Ýewropa, Kiçi, Orta Aziýa, Merkezi Aziýanyň käbir ýerleri we Merkezi Amerika. Türkmenistanda Hazar deňziniň gündogarynda we Sarygamyşda höwürtggeleýär. Günorta we Günorta - Gündogar Aziýada, Awstraliýada, Merkezi Afrikada we Günorta Amerikada gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup gelyän-höwürtggeleýän guş. Ýazky migrasiýasy aprel-maýda, güýzkisi – awgust-sentyabrda. Balykgulakly, çägeli ösümlüksiz adalarda höwürtggeleýär. Aralary açyk, seý-regräk topar, emma derýa çeriginden has gürr, bolup höwürtggeleýär. Höwürtggeleýän ýerlerine uçup gelenden, jübütleşip ýumurtga goýýan wagtyna çenli, bir aý geçýär (maýyň 1-nji ongünligi). 3 sany çägereňkden, çalymytyl - ýaşyldan goňurrak-mele reňke çenli ýumurtgalary goýýar, käte gögümtyl reňklileri hem duşýar. Dirli öwüşgindäki menekleri olary töweregine çalymdaş edýär (goraýjy reňk), ölçegleri - 47 x 34 mm. Iýunyň birinji ongünliginde jüýjeleri çykýar. Jüýjeleriniň reňkleriniň bir maşgalada dürli-dürli bolmaklary mümkin. Uly guşlar umurtgadan iň soňky

няя часть головы светлая с рыжеватым налетом, по бокам шеи желтоватые пятна. Глаза карие, клюв и лапки черные. Голос – мягкое, не трескучее «кевэк-кевэк». Длина – 40, крыло – 30, размах крыльев – 80, хвост – 13 см, вес – около 200 г.

Сходства – отличия: от речной и пестроносой крачек отличается более согнутым укороченным клювом. Ноги относительно тонкие и высокие с короткими пальцами и сильно вырезанными перепонками между ними. Хвост короче, с небольшой выемкой.

Распространение: область гнездования – Южная Европа, Малая, Средняя, местами Центральная Азия и Центральная Америка. В Туркменистане гнездится на восточном Каспии и Сарыкамыше. Зимует в Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии, Центральной Африке и Южной Америке.

Образ жизни: прилетная, гнездящаяся птица. Весенняя миграция – в апреле-мае, осенняя – в августе-сентябре. Гнездится на песчано-ракушечниковых островах со скудной растительностью. Образует небольшие колонии разреженного типа, но более плотные, чем речная крачка. Между прилетом на места гнездования и началом яйцекладки (1 декада мая) проходит около месяца. В кладке, обычно, 3 яйца от песочного серо-зеленого до коричнево-бурого цвета, иногда встречаются голубоватые яйца. Покровительственность окраски за счет разнообразных пестрин. Размеры яиц – 47 x 34 мм. Вылупление – в первой декаде июня. Птенцы внутри одного выводка часто

jüýjesi çykandan iki gün geçenden soň, olary yzyna tirkäp alyp gidýär, emma, alaburun çerikler ýaly “bakja” döredmeýärler we derýa çerikleri bilen deňşdireniňde, olarda jüýjelerini bir ýere toplamak endigi ýüze çykýar. Esasy iýmiti – maýda balyklar we mörmöjekler.

Statusy: sany üýtgeýän köp sanly bolmaýan görnüş. Guşlaryň höwürtleýän toparynyň aýratyn goraga alynmagy zerur.

180. Alaburun çerik – *Sterna sandvicensis* – Пестроносая крачка

Meýdan alamatlary: derýa çerigidin sähelçe ulurak, emma sakaw çarlakdan kiçi. Göwresi süýnmek, bedeniniň ýokarky bölegi kümüşleççal, boýny, bili we garny – tekiz ak. Ganatlarynyň uçlary külreňk-çal, guýrugy çalymtyl-ak. Kellesiniň üsti mahmalpisint - gara, **ýeňsesiniň ýelekleri uzalyp, hüpük emele getirýär.** Ganatlary örän uzyn, guýrugy ýabaly. Güýz-gyş döwründe depesi gara, ýelekleriň gyrasyn-da aýlanan ýagty gaýmanyň aýlanan bolmagy, onuň kellesini ala edip görkezýär. Ýaş guşlaryň arkasy garamtyrak we çypar menekli, kellesiniň reňki uly guşlaryň gyşky ýelek örtüginе меңзеş. Çünki uzyn, berk, biraz aşaklygyna egmekli. **Çüňküniň reňki garşylykly: gara, ujy sary.** Gözleri goýy goňur. Aýaklary gara, barmaklaryndaky perdesi kiçi, çuň oýuk. Sesi örän ýiti, aýratyn-da, höwürtleýän döwründe. Uzynlygy ortaça – 43, ganaty – 31, ganatlarynyň gerimi – 94, guýrugy – 17, çüňki – 5.5 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: hüpüginini bardygy we gara çüňküniň ujynyň sarydygy bilen beýleki çeriklerden (sakaw çarlakdan başga)

отличаются расцветкой. Родители уводят птенцов из гнезда на второй день после вылупления последнего птенца. «Ясли», как у пестроносой крачки, не образуются, но по сравнению с речной крачкой имеется тенденция к объединению птенцов. Основной корм – мелкая рыба и насекомые.

Статус: немногочисленный вид с нестабильной численностью. Колонии нуждаются в особой охране.

Полевые признаки: немного крупнее речной крачки, но меньше чегравы. Туловище удлинненное, верхняя часть тела серебристо-серая, шея, поясница и брюшко – атласно белые. Концы крыльев пепельно-серые, хвост серовато-белый. Голова сверху бархатисто-черная, **перья затылка удлинены и образуют хохол.** Крылья очень длинные, хвост вильчатый. В осенне-зимнее время черные перья темени со светлыми оторочками, поэтому голова кажется пестрой. Молодые птицы с черноватыми и рыжими пестринами на спине, окраска головы схожа со взрослыми в зимнем оперении. Клюв довольно длинный, крепкий, несколько загнутый книзу. **Окраска клюва контрастная – черная с желтым концом.** Глаза темно-карие. Ноги черные, маленькие с сильно вырезанными перепонками лап. Голос пронзительный, особенно в гнездовой период. Длина, в среднем – 43, крыло – 31, размах крыльев – 94, хвост – 17, клюв – 5.5 см.

Сходства – различия: от других крачек (кроме чегравы) отличается наличием хохла и черным клювом с

tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: endigan däl-Merkezi Amerikanyň, Günbatar we Günorta Ýewropa kenaryakalary. Orta Aziýada we Türkmenistanda Hazar deňziniň diňe gündogar kenaryakasynda. Ortaýer we Gara deňzleriniň kenaryakalarynda, Atlantik ummanyň günorta böleginde, Pars aýlagynda we Hindistanyň günorthasynda gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtleýän guş. Ýazky migrasiýasy mart-aprelde, güýzkisi – awgust-sentyabrda. Örän gür topr bolup, burunlaryň balykgulakly-çägelik we çäge tümmecli ýerlerinde höwürtleýärler. Höwürtleýän ýerlerine uçup geleninden (martyň ortasynda) we birinji höwürtgäni gurýançalar (apreliň soňy), adatça, bir aý geçýär. Höwürtgеси – ýalpak, aşagy düşeksiz, çukurlyk. Höwürtgäniň gyralary guşlaryň tezeginiň hasabyna gatap, erňek döreyär. 2 sany melementil-sarydan ak reňke çenli, käte öçügsi-gök we goňur reňkdäki ýumurtgalary goýýar. Dürli reňkdäki menekleriň toplumu ýumurtgalary töweregine çalymdaş edýär (goraýy reňk). Ýumurtgalary derýa çeriginkiden biraz ulurak. Iýun aýynyň birinji ongünliginde jüýjeleri çykýar. Keseki jüýjelere gaharly daraýar. Ýumurtgadan jüýjeleriň hemmesi çykandan soňra, olary yzyna tirkäp kenaryaka äkidýär we “bakja” toplýar. Esasy iýmiti maýda balyklar.

Statusy: umuman, az sanly. Hazar döwlet goraghanasynyň guşlarynyň iň täsin wekilleriniň biri, olaryň höwürtleýän toparlaryny aýratyn goraga almak zerur.

желтым концом.

Распространение: неравномерное – побережья Центральной Америки, Западной и Южной Европы. В Средней Азии и Туркменистане – только на восточном побережье Каспийского моря. Зимуют по побережьям Средиземного и Черного морей, на юге Каспия, южной части Атлантики, в Персидском заливе и юге Индии.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весенняя миграция – в марте-апреле, осенняя – в августе-сентябре. **Гнездится очень плотными колониями** на песчано-ракушечных косах и песчаных дюнах. С момента прилета на места гнездования (в середине марта) и до образования первых гнезд (конец апреля) обычно проходит больше месяца. Гнезда – небольшие углубления, преимущественно, без подстилки. За счет помета по краю гнезда образуется твердая корка. В полной кладке обычно 2 яйца, от сливочного до белого цвета, иногда встречаются бледно-голубые и коричневые. Разнообразные пестрины усиливают покровительственную окраску. Яйца несколько крупнее, чем у речной крачки. Вылупление птенцов – в первой декаде июня. Очень агрессивна по отношению к чужим птенцам. После вылупления птенцов родители уводят их из гнезда в прибрежную часть, где образуются «ясли». Основной корм – мелкая рыба.

Статус: в целом малочисленна. Одна из наиболее интересных птиц Хазарского заповедника, гнездовые колонии которой нуждаются в особой охране.

181. Sakaw çarlak – *Sterna caspia* – Чергава

Meýdan alamatlary: çerikleriň arasynda iň ulusy (gargadan ulurak). Göwresi dykyz, bedeniniň aşaky, boýnunyň gapdallary we arkasynyň öňki bölegi ýalpyldawuk-ak reňkli, eginleri çalymtyl-gögümtil. Ganatlary uzyn gylyçşekilli, **guýrugy ýalpak oýuk**. Ganatlarynyň uçlary garamtyl, guýrugy, arka ýeleklerine garanynda ýagtyrak. **Kellesiniň üsti metal ýalpyldyly gara, yeňsesindäki uzalan ýelekleri hüpügi emele getirýärler**. Kellesiniň gýşky bezeginde gara-ak gatyşykly ala ýelekleri bolýar, ýaşlarynyň - arkasy kese goňur tegmilli. **Aýaklary gara**, başgalara garanynda gysga, barmaklarynyň perdesi gowşak oýuk. **Çünki daýaw kellesinden uzyn, merjenreňk-gyzyl**. Gözleri goňur. Sesi – “ra-ra-ra-ra” ýa-da “rak-rak-rak”. Uzynlygy – 52, ganaty – 42, ganatlarynyň gerimi – 130, guýrugy – 15 sm, agramy - 500-700 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň uludygy, **uly gyzyl çüňklidigi** we guýrugynyň oýukdygy bilen beýleki çeriklerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealy endigan däl we arasy bölünen, höwürtegeýän ýerleri Demirgazyk we Günorta-Gündogar Ýewropa, Orta, Merkezi we Gündogar Aziýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Demirgazyk Amerika, Gündogar Afrika, Hindistanyň günortasy. Orta Aziýanyň içki suw ýataklary. Türkmenistanda wagtal - wagtal Gündogar Hazaryň adalarynda we Sarygamyş kölünde. Ortaýer deňzinde, Günbatar Afrikanyň, Günorta we Günorta - Gündogar Aziýanyň, Awstraliýanyň we Mer-

Полевые признаки: самая крупная из крачек (крупнее вороны). Туловище плотное, нижняя часть тела, бока шеи и передняя часть спины блестяще-белого цвета, плечи серовато-голубые. Крылья длинные саблевидные, **хвост с небольшой выемкой**. Концы крыльев темнее, а хвоста светлее оперения верхней части спины. **Верх головы черный с металлическим блеском, на затылке удлинённые перья образуют подобие хохолка**. В зимнем наряде голова имеет пестрое черно-белое оперение, у молодых птиц на спине поперечно-бурые пятна. **Ноги черные**, относительно короткие со слабо вырезанными перепонками лап. **Клюв массивный, длиннее головы, кораллово-красного цвета**. Глаза карие. Голос – «ра-ра-ра-ра», или «рак-рак-рак». Длина – 52, крыло – 42, размах крыльев – 130, хвост – 15 см, вес – 500-700 г.

Сходства – различия: от других крачек отличается крупными размерами, **большим красным клювом** и выемчатым хвостом.

Распространение: ареал спорадичен и разорван, на гнездовье – в Северной и Юго-Восточной Европе, Средней и Центральной и Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, Северной Америке, Восточной Африке, на юге Индии. В Средней Азии гнездится на внутренних водоемах, в Туркменистане спорадично на островах Восточного Каспия и Сарыкамыше. Зимуют в Средиземноморье, на побережьях Западной Африки, Южной и Юго-

kezi Amerikanyň kenarýakalarynda guşlaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän-höwürtegeýän guş. Ýazyna martyň ortasyndan-aprelde, güýzine – sentýabrda uçup geçýär. Adalarda, burunlaryň çägeli ýa-da daşlyja ýerlerinde, seýregräk onlarça jübütten topar bolup höwürtegeýärler. Guşlar kürk bolup oturanda we jüýjeleýän wagtlary keseki guşlara gaharjaň topulýarlar. Höwürtegesi çägede, aşagy düşeksiz, ýalpajyk çukurjyk. Maý aýunyň ikinji ýarymynda 2, seýrek 3 sany, öý ördegiňkä çalymdaş ýumurtgalary goýýar, ölçegleri 66 x 45 mm. Olaryň daşky gabygy ýylmanak, emma ýaldyrawuk däl. Reňki kirliräk-sarydan külreňk-çal ýa-da garamtyl-çal mnekli goňur reňke çenli. Iýunyň ortasynda jüýjeleri çykýar. Aglaba, maýda balyklar, şeýle-de suw oňurgasyzlary bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek, bizde gowşak öwrenilen görnüş. Gaplaňgyr döwlet goraghanasynyň, Sarygamyş çäkli goraghanasynyň guşlarynyň iň täsin wekilleriniň biri.

182. Derýa çerigi – *Sterna hirundo* – Речная крачка

Meýdan alamatlary: orta ölçegli (kepderi ululykda), ganatlary örän uzyn we insiz. Oturan guşuň ýugnalan ganatlarynyň uju guýrugynyň ujuna çenli ýetýär. **Guýrugy, çuň oýuk, ýabaly**. Arkasyna garanynda pelpelleyiş ýelekleri garamtyl, guýrugynyň üsti we guýrugy ak (ýöne guýruk ýelekleriniň çetki gapdal gyalary çal). Üstki tarapynyň ýelek örtügi jübütleşme bezeginde gögümtil külreňk, aşaky tarapy ak, bedeniniň gapdallary çalymtyl öwüşginli. **Kellesi**

Восточной Азии, Австралии и Центральной Америки.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весенний пролет – в середине марта и апреле, осенний – в сентябре. Гнездится на песчаных или галечных косах, по островам, нередко колониями до нескольких десятков пар. В период насиживания и вылупления птенцов весьма агрессивны. Гнезда – небольшие углубления в песке, обычно без подстилки. Яйцекладка во второй половине мая. Кладка из 2, реже 3 яиц. По величине и форме они похожи на яйца домашних уток, размер – 66 x 45 мм. Скорлупа гладкая, но без глянца. Окрас – от грязно-желтого до буроватого с пепельно-серыми или черновато-серыми пестринами. Птенцы – в середине июня. Питаются, преимущественно, мелкой рыбой, а также водными беспозвоночными.

Статус: редкий, слабо изученный у нас вид, один из наиболее интересных представителей птиц Сарыкамышского заказника Кап-ланкырского заповедника.

Полевые признаки: размеры средние (величиной с голубя), крылья очень длинные и узкие. У сидящей птицы концы сложенных крыльев достигают конца хвоста. **Хвост – с глубокой выемкой – вильчатый**. Маховые перья темнее спины, надхвостье и хвост белые (но края боковых крайних перьев хвоста серые). В брачном наряде оперение верхней стороны голубовато-пепельное, нижней – белое с сероватым оттенком на боках тела.

gara "telpejikli". Gyşky lybasynda maňlaýy ak, arkasy we ganatlary çal. Aýaklary gyzyl ýa-da gyzylmytyl-goňur, **merjenreňk-gyzyl çüňküniň ujy gara**. Gözleri goýu-goňur. Ýaş guşlar gyşky ýelek örtüginde ulularyna çalymdaş, ýöne bedeniniň üstki tarapy goňurrak kese tegmilli. Çüňki garamtyl-goňur. Uçuşy ýeňil we köp dürli. Sesi ýiti, aýratyn-da, howsala düşeninde batly – "kirryaýa". Uzynlygy ortaça – 40, ganaty – 27, ganatlarynyň gerimi – 82 sm, agramy – 105-129 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň has uludygy we aýaklarynyň, çüňküniň reňkleri - kiçi çerikden; ýelek örtügininiň has açyk reňklidigi bilen akýaňak çerikden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: giň, höwürtlegeýän ýerleri-Ýewropa, Aziýanyň demirgazyk bölegi, demirgazyk çäklerinden başgalaryn-da, Demirgazyk Amerikanyň merkezi. Orta Aziýada (beýik daglardan başgalarynda) we Türkmenistanda-dürli suw ýataklarda saklanýar. Afrikanyň, Arabystanyň, Hindistanyň, Günorta-Gündogar Aziýanyň, Awstraliýanyň we Günorta Amerikanyň kenaryakalarynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtlegeýän guş. Ýazky migrasiýasy aprel-maýda, güýzkisi – awgust-sentyabrda. Çägeli adalarda we burunlarda, dürli suw ýataklarda gezýär. Seýregräk toplum bolup ýaşaýar. Uçup gelip, höwürteläp, ýumurtgalamaga girişen günlerine çenli (maýyň ilkinji günleri) bir aýa golaý wagt geçýär. Gür ösümlikli, gamyş sypallarynyň üýşen yzgarly ýerlerinde mekan tutýar. 3 sany ýumurtga goýýar. Olaryň reňki ala, bu görünüş bir höwürtgede hem dürli bolmagy mümkin: çägereňk,

На голове черная «шапочка». В зимнем наряде лоб белый, спина и крылья серые. Лапки красные или красно-бурые, **клюв кораллово-красный с черным кончиком**. Глаза темно-карие. Молодые птицы похожи на взрослых в зимнем наряде, но на верхней части тела заметны буроватые поперечные пятна. Клюв черновато-бурый. Полет легкий и разнообразный. Голос пронзительный, особенно во время тревоги – громкое «кирряя». Длина, в среднем – 40, крыло – 27, размах крыльев – 82 см, вес – 105-129 г.

Сходства – отличия: от малой крачки отличается более крупными размерами и окраской лап и клюва, от белошекой крачки – более светлым оперением.

Распространение: широкое, область гнездования – Европа, северная половина Азии, кроме северных областей, центральные области Северной Америки. В Средней Азии (за исключением высокогорий) и Туркменистане придерживаются различных водоемов. Зимуют по побережьям Африки, Аравии, Индостана, Юго-Восточной Азии, Австралии и Южной Америки.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весенняя миграция – в апреле-мае, осенняя – в августе-сентябре. Предпочитает песчаные острова и косы различных водоемов. Образует колонии разреженного типа. С момента прилета на места гнездования до начала яйцекладки (первые числа мая) проходит около месяца. Наиболее охотно селится на сыром грунте среди густой растительности и на спла-

çalymytyl-ýaşylymytyl-çyparrak, çalymytyl-ýaşylymytyl-goňur we goýu-çalymytyl-ýaşyl, mawutyl görnüşlileri hem käte duşýar, ölçegleri - 40 x 31 mm. Maýyň soňunda-iýunyň başynda jüýjeleri çykýar. Jüýjeleri ýumurtgadan çykanlaryndan soň, olary uly guşlar höwürtgeden äkidýär, emma "bakja" döretmeyär. Ýymitiniň esasyly maýda balyklar düzýär.

Statusy: adaty, emma sany durukly däl, başgalara garanynda, oňat öwrenilen guş. Guslaryň höwürtlegeýän toparlary aýratyn gorağa mätäç.

183. Kiçi çerik – *Sterna albifrons* – Малая крачка

Meýdan alamatlary: sar ululyk-da, çerikleriň arasynda iň kiçisi. **Maňlaýy ak**, kellesiniň üstki tarapy we ýeňsesi gara. Bedeniniň üsti açyk-çal, aşagy ak. Depesiniň oň tarapy gyş lybasynda çalymytyl menekli, ýeňsesi gara. Ýaş guşlaryň garyn tarapy ak, arkasy garamtyl tegmilli ala we ýelekleriniň gyralary çypar reňkli. **Çüňki gara uçly mumly sary reňkli, aýaklary sarymytyl - mämişi**. Gözleri gara. Sesi beýleki çeriklere garanynda betert däl - "krek" ýa-da "kreik" häsiýetli. Uzynlygy – 22, ganaty – 18, ganatlarynyň gerimi – 50, guýrugy – 8 sm, agramy – 40-50 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň kiçidigi we başgalara garanynda, ýogyn we gysga sary çüňki bilen beýleki çeriklerden tapawutlanýar. Deryýa çerigine çalymdaş, emma maňlaýy, bedeniniň aşaky tarapy we guýrugy ak.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtle-

винах из тростника. Полная кладка – 3 яйца. Цвет основного фона яиц и пестрины значительно варьируют, иногда даже внутри одной кладки. Основные оттенки фона – песочный, серо-зелено-песочный, серо-зелено-коричневый и темно-серо-зеленый, иногда бывают голубоватые яйца, размеры – 40 x 31 мм. Птенцы – в конце мая-начале июня. После вылупления птенцов родители уводят их из гнезда, но «ясли» не образуются. Основу корма составляет мелкая рыба.

Статус: обычна, но численность не стабильна, относительно хорошо изученный вид. Гнездовые колонии нуждаются в особой охране.

Полевые признаки: самая мелкая из всех крачек, величиной со скворца. **Лоб белый**, а верхняя часть головы и затылок черные. Верх тела светло-серый, низ белый. В зимнем наряде передняя часть темени с серыми пестринами, затылок черный. Молодые птицы на брюшной стороне белые, на спинной – пестрые с темными пятнами и рыжими краями перьев. **Клюв воскового желтого цвета с черным кончиком, ноги желто-оранжевые**. Глаза карие. Голос менее резок, чем у других крачек типа «крэк» или «крэик». Длина – 22, крыло – 18, размах крыльев – 50, хвост – 8 см, вес – 40-50 г.

Сходства – отличия: от других крачек отличается мелкими размерами и относительно толстым и коротким желтым клювом. Похожа на речную крачку, но лоб, нижняя часть тела и хвост белые.

geleýän bölegi – Ýewropanyň, demirgazyk taraplaryndan başgalarynda, Gazagystan, Kiçi, Orta, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýa, Awstraliýa. Türkmenistanda-Hazar deňziniň gündogar kenarynda we Sarygamuşda höwürtegeleýär, uçup geçende giňişleýin gabat gelyär. Afrikanyň, Arabystanyň, Hindistanyň, Günorta-Gündogar Aziýanyň, Awstraliýanyň kenarýakalarynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtegeleýän guş. Ýazky migrasiýasy apreliň aýagynda-maýda, güýzkisi – awgust-sentyabrda. Seýrek ösümlikli dürli suw ýataklaryň açyk kenarlaryny halaýar. Höwürtegeleýän ýerine uçup geleninden (apreliň ortasy) ilkinji höwürtegeler guryançalar bir aý töweregi (maýyň soňy) wagt geçýär. Köpsanly bolmagy toparlarda, birnäçe jübüt-den onlarça jübüte çenli topar bolup höwürtegeleýär. Höwürtegesi ýerde, köplenç düýbi düşeksiz ýalpak çukurlyk. 3, kähalatda 2 sany açyk-külreň ýa-da göýü-goňur menekli, öçügsi kirliräk-sarymtyl reňkli ýumurtgaly goýýar, ölçegleri 32 x 23 mm. Iýunyň ortasynda jýjeleri çykýar. Uly guşlar jýjelerini ýumurtgadan doly çykanlaryndan soň, olary höwürtegeden äkidýärler, emma “bakja” döretmeýärler. Esasy iýmiti -maýda balyklar, az mukdarda suw oňurgasyzlyry.

Statusy: az sanly, gowşak öwrenilen görnüş. Guşlaryň höwürtegeleýän toparlarynyň aýratyn goraga alynmagy zerur.

184. Akýañak çerik – *Chlidonias hybrida* – Белощекая крачка

Meýdan alamatlary: gara we akganat çeriklerden ölçegleri uly, olar bilen deňşdireniňde, **ganatlary we aýaklary uzyn.** Guýrugy

Распространение: гнездовая часть ареала – Европа, кроме северных областей, Казахстан, Малая, Передняя, Средняя, Восточная и Юго-Восточная Азия, Австралия. В Туркменистане – гнездятся на восточном побережье Каспия и Сарыкамыше, на пролете встречаются шире. Зимуют по побережьям Африки, Аравии, Индостана, Юго-Восточной Азии и Австралии.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весенняя миграция – в конце апреля-мае, осенняя – в августе-сентябре. Предпочитают открытые берега различных водоемов с разреженной растительностью. Со времени прилета на места гнездования (середина апреля) до начала яйцекладки (конец мая) проходит больше месяца. Образуют немногочисленные – до нескольких десятков пар колонии разреженного типа. Гнезда – небольшие углубления, в основном, без подстилки. В полной кладке 3, реже 2 яйца матового грязно-желтоватого цвета со светло-пепельными или темно-бурыми пестринами. Размер яиц – 32 x 23 мм. Птенцы – в середине июня. После вылупления птенцов родители уводят их из гнезда, но «яслей» не образуют. Основной корм – мелкая рыба, в меньшей степени водные беспозвоночные.

Статус: малочисленный, слабо изученный вид. Гнездовые колонии нуждаются в особой охране.

Полевые признаки: размером больше черной и белокрылой крачек, по сравнению с ними **крылья и ноги длиннее.** Хвост с неболь-

ьим вырезкой. **Нөwürtegeleýän döwüründe bedeniniň aşagy goýu-çal, kellesiniň gara we ýañaklarynyň ak reňkleriniň garşylykly tapawudy anyk görünýär.** Pelpelleýiş ýelekleri garamtyl uçly gogümtil-çal reňkli. **Güýz-guş wagty gara reňk ýeňsesinde** dik çyzyk görnüşde saklanýar. Çünki açyk gyzyly, aýaklary goňurrak-gyzyly, gözleri gara. Sesi gödek we gagyldyly. Uzynlygy – 28, ganaty – 24, ganatlarynyň gerimi – 72, guýrugy – 8 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: gara çerikden gyzyly çünki, has açyk reňki, ak “ýañaklary” bilen tapawutlanýar. Aýaklarynyň ýüzgüç perdesi beýleki çeriklere garanyňda insiz.

Ýaýran ýerleri: arealy bölek-bölek we durnukly däl. Günorta we Gündogar Ýewropada, Günorta Gazagystanda, Kiçi, Orta, Gündogar we Günorta Aziýada, Awstraliýada, Günorta-Gündogar we Günorta Afrikada höwürtegeleýär. Orta Aziýada we Türkmenistanda uçup geçende uly derýalaryň jülgelerinde, Hazaryň gündogar kenarýakasynda. Afrikanyň günorta böleginde, Günorta-Gündogar Aziýada we Awstraliýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtegeleýän guş. Ýazyna apreliň ortasynda, güýzüne – awgustyň soňunda we sentýabrda üçup geçýär. Dürli suw ýataklarda, aglaba suýji suwlylarynda saklanýar. Batgalyklarda we jeňnelli köllerde topar, käte aýratyn jübüt bolup höwürtegeleýär. Höwürtegesini gyrmança batan tükmeçlerde we ýüzýän ösümlük dykynlarynda gurýar. Maýyň birinji ongünliginde 3 sany garamtyl menekli ýaşylymtyl ýa-da mawymtyl

шой вырезкой. **В гнездовое время низ тела темно-серый, заметен контраст между черной головой и белыми щеками.** Маховые голубовато-пепельного цвета, темнее на концах. **В осенне-зимнее время черный цвет остается на затылке** в виде продольных штрихов. Клюв малиново-красный, ноги коричнево-красные, глаза карие. Голос достаточно грубый и напоминает карканье. Длина – 28, крыло – 24, размах крыльев – 72, хвост – 8 см.

Сходства – отличия: от черной крачки отличается красным клювом, более светлой окраской, белыми «щеками». Перепонка на лапах заметно уже, чем у других крачек.

Распространение: ареал разбросан и нестабилен. Гнездится в Южной и Восточной Европе, Южном Казахстане, в Малой, Средней, Восточной и Южной Азии, Австралии, Юго-Восточной и Южной Африке. В Средней Азии и Туркменистане на пролете по долинам рек и восточному побережью Каспия. Зимуют в южной половине Африки, в Юго-Восточной Азии и Австралии.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весенний пролет – с середины апреля, осенний – с конца августа и в сентябре. Обитатель различных водоемов, предпочитает пресные. Гнездится колониями, иногда отдельными парами на болотах и заросших озерах. Гнездо – на кочках или плавающих растениях. Яйца – в первой декаде мая. Кладка из 3 зеленоватых или голубоватых яиц с черными пестринами (заметно отличается от яиц черной крачки). Птенцы – в июле. Питается мальками рыб, водными

(gara çerigiň ýumurtgasyndan anyk tapawutlanýar) ýumurtgalary goýýar. Iýulda jüýjeleýär. Çaga balyklar, suw orgasyzlary we mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: köp sanly дәл, käbir ýerlerde adaty görnüş.

185. Gara çerik – *Chlidonias niger* – Черная крачка

Meýdan alamatlary: kiçi çerikden sähelçe ulurak. Ganatlary beýleki çarlaklar bilen deňşdireniňde göwresinden has uzyn. **Jübütleşýän döwründe bedeniniň reňki garamtyl-çal, guýrugynyň aşagy-ak. Gyşky ýelek örtüginde diňe depesi we ýeňsesi gara,** maňlaýy we bedeniniň aşaky tarapy – ak, petekesiniň gapdallary garamtyl tegmilli, ganatynyň aşagy agymtyl-çal. Ýaş guşlaryň üstki ýelekleri çypar gaýmaly. Gözleri goňur, çünki çalymtyl-gara, düýbi gyzyl, aýaklary gyzylmytyl-goňur. Sesi pessaý “kek...kek...kek”. Uzynlygy – 26, ganaty – 22, ganatlarynyň gerimi – 62, guýrugy – 8 sm, agramy - 50-70 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçepleriniň kiçidigi we kellesiniň garadygy (gyşky ýelek örtüginde petekesiniň gapdallary garamtyl tegmilli) akýaňak çerikden; ganatlarynyň üstüniň garamtyldygy, aşaky tarapyň agymtyldygy we guýrugynyň garadygy bilen akganat çerikden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän ýerleri – Ýewropa, demirgazyk böleginden başgalarynda, Günorta Sibir, Gazagystan. Orta Aziýada we Türkmenistanda - uly derýalaryň jülgelerinde, Hazaryň gündogar kenarýakasynda. Merkezi Amerikanyň we Afrikanyň günbatar we günorta

беспозвоночными и насекомыми.

Статус: немногочисленный, местами обычный вид.

Полевые признаки: немного крупнее малой крачки. Крылья относительно туловища более длинные, чем у других крачек. **В брачный период окраска тела черно-серая, подхвостье – белое. В зимнем оперении только темя и затылок черные,** лоб и нижняя часть тела – белые, по бокам зоба темные пятна, испод крыла бледно-серый. У молодых перья верха имеют рыжие каемки. Глаза карие, клюв серовато-черный, у основания красный, ноги красно-бурые. Голос – негромкое «kek...kek...kek». Длина – 26, крыло – 22, размах крыльев – 62, хвост – 8 см, вес – 50-70 г.

Сходства – отличия: от белощекой крачки отличается меньшими размерами, черной головой (в зимнем наряде темными пятнами по бокам зоба), от белокрылой крачки – темным верхом крыльев, светлым низом и черным хвостом.

Распространение: область гнездования – Европа, за исключением северных частей, Южная Сибирь, Казахстан. В Средней Азии и Туркменистане по долинам рек и восточному побережью Каспия. Зимуют на побережьях – Центральной Америки и западном и южном Африки.

kenarýakalarynda gyşlaýar.

Ýaşaýyşy: uçup geçýän, höwürtleýän guş. Ýazyna aprel-maýda, güzine-sentyabrda uçup geçýär. Suw basan ýerleriň ortasynda, gyrmança üýmeklerde, ýüzyän gamyş dykynlarynda ýada ýalpak ýerlerde ösen otluklarda höwürtleýär. Höwürtgеси kiçiräk çukurjyk, onuň içine ösümlük sypallaryny toplaýar, 3, seýrek 2 ýada 4 sany garamtyl-goňur menekli, öçügsi-melemtilden çypparak-ak reňke çenli dürli görnüşdäki ýumurtgalary goýýar, ölçegleri 34 x 25 mm. Jüýjeleri ýumurtgadan çykandan soň ер-esli wagt (2 hepde çenli) höwürtgede saklanýar. Iýmiti mör-möjekler we beýleki oňurgasyzlar, käte balyklar.

Statusy: seýrek, uçup geçende käbir ýerlerde adaty görnüş, bizde heniz öwrenilmedik diýen ýaly.


186. Akganat çerik – *Chlidonias leucopterus* – Белокрылая крачка

Meýdan alamatlary: gara çerik ölçegli. Jübütleşýän döwründe ganatlarynyň üsti külreňk-çal, ganatlarynyň aşagy garşylykly, çal (ganatynyň yzky bölegi) we gara, olar bedeniniň edil şonuň ýaly reňki bilen goşuluşýar. **Guýrugy** (ýalpak oýuk) **we guýrugynyň üsti ak.** Kellesi, garny, arkasy mahmalpisint-gara (mäkiýanyň arkasy çalymtyl-gara). **Uçup barýarka ganatlarynyň aşagynyň iki reňklidigi anyk görünýär.** Güz döwründe maňlaýy ak, depesi we ýeňsesi – agymtyl gaýmaly goýy çal, boýny we garny ak, arkasy we guýrugy çal. Gözüniň yzy gara tegmilli. **Çünki gara uçly, goýy-gyzyl,** aýaklary gülgüne-gy-

Образ жизни: пролетная, видимо, гнездящаяся птица. Весенний пролет в апреле-мае, осенний – в сентябре. Гнездятся обычно посреди топких мест, на илистых отмелях, на плавучих островках из травы, тростника или осоки. Для гнезда используется много растительного материала, наверху - небольшое углубление. Кладка из 3, реже 2 или 4 яиц с тонкой матовой скорлупой от бледно-масляного до рыжеватого-белого цвета с черновато-бурыми пестринами различной формы. Размеры яиц – 34 x 25 мм. Вылупившиеся птенцы подолгу (иногда до 2 недель) остаются в гнезде. Питание – насекомые и другие беспозвоночные, иногда мелкая рыба.

Статус: редкая, на пролете местами обычная птица, почти не изученный у нас вид.

Полевые признаки: размером с черную крачку. В брачный период крылья сверху пепельно-серые, испод крыла – контрастный – серый (на задней половине крыла) и черный, который сливается с туловищем такого же цвета. **Хвост** (с небольшой вырезкой) **и надхвостье белые.** Голова, брюхо, спина бархатисто-черные (у самки спина серовато-черная). **В полете бросается в глаза двухцветный окрас крыла снизу.** В осеннее время лоб белый, темя и затылок – темно-серые с беловатыми каемками, шея и брюхо белые, спина и хвост серые. За глазом – черное пятно. **Клюв темно-красный, на конце**



Çerikleriň uçup barýarka görnüşi: 1 – gara çerik; 2 – akganat çerik; 3 – akýaňak çerik; 4 – kiçi çerik.

Крaчки в полете: 1 - черная; 2 - белокрылая; 3 - белошекая; 4 - малая.

zyl. Sesi kâwagt kiçi çerigiňki ýaly - “çr-re”. Uzynlygy – 27, ganaty – 21, ganatlarynyň gerimi – 60, guýrugy – 8 sm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: guýrugynyň akdygy, esasan hem, ganatlarynyň öňki gyrasynyň insiz ak zolaklydygy - gara çerikden; kellesiniň tutuşlygyna garadygy bilen akýaňak çerikden tapawutlanýar. Ýaşlarynyň döşüniň gapdallarynda gara tegmilleri we depesinde gara reňki ýok (akýaňak çerikden tapawutlylykda).

Ýaýran ýerleri: höwürtegeýän ýerleri – Gündogar Ýewropa, Gazagystan, Günortar Sibir, Uzak Gündogar. Orta Aziýada we Türkmenistanda uçup geçende duşýar. Afrikanyň günorta böleginde, Pars aýlagynda, Günorta-Gündogar Aziýada, Malaý arhipelagynda, Awstraliýanyň we Täze Zelandiýanyň kenaryakalarynda gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän görnüş, ýazky migrasiýasy aprel-maýda, güýzkisi – awgust-sentyabrda. Uçup geçende, derýalaryň jüljelerinde we süýji suwly ýataklarda gabat gelmekleri mümkin. Esasy iýmiti mör-möjekler, çaga balyklar we suw oňurgasylary.

Statusy: seýrek, bizde heniz öwrenilmedik diýen ýaly görnüş.

KEPDERIŞEKILLILER – COLUMBIIFORMES – ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ

Kellesi kiçijek gysga boýunly, kepderi beden gurluşly, maýdarak, orta ölçegli guşlar otrýady. Ganatlary uzyn we çowly, guýrugy orta uzynlykda, tegelenen. Aýaklary gysga, dört barmakly. Çünki gysga, göni we inçe, düýbi pökgüje, ýarçykşekilli (mumlyjyk) burun deşigi deri örtük-

черный, ноги кирпично-красные. Голос иногда напоминает «чр-ре», как у малой крачки. Длина – 27, крыло – 21, размах крыльев – 60, хвост – 8 см.

Сходства – отличия: от черной крачки отличается белыми хвостом, а главное – узкой белой полосой по переднему краю крыла; от белошекой крачки – полностью черной головой. У молодых характерно отсутствие темных пятен по бокам груди и черное темя (в отличие от белошекой крачки).

Распространение: область гнездования – Восточная Европа, Казахстан, Южная Сибирь, Дальний Восток. В Средней Азии и Туркменистане на пролетах. Зимуют в южной половине Африки, Персидском заливе, Юго-Восточной Азии, Малайском архипелаге, на побережье Австралии и Новой Зеландии.

Образ жизни: пролетный вид, весенняя миграция – в апреле-мае, осенняя – в августе-сентябре. На пролете может встречаться по долинам рек и пресным водоемам. Основной корм – насекомые, мальки рыб и водные беспозвоночные.

Статус: редкая, почти не изученная у нас птица.

Отряд птиц средних размеров, некрупные, голубиного телосложения, шея короткая с маленькой головой. Крылья обычно длинные и острые, хвост средней длины, закруглен. Ноги короткие, четырехпалые. Клюв небольшой, прямой и тонкий, в основании – вздутие,

li. Ýelek örtügi gür we dykyz. Horazlary we mäkiýanlary reňki boýunça birmeňzeş, emma birinji ikinjiden ulurak. Görnüşleriniň bir bölegi oturymly, adatça, höwürtegeleýän sebitinde guşlaýar. Guşlaryň köpüsi tokaýda, kábiri dagda, oba hojalyk landsaftlarynda we adamlaryň gurluşyk desgaly ýerlerinde ýaşaýar. Monogam, jübütligi örän durnukly. Ağaçlaryň üstünde, gaýalarda, kert diwardaky hinlerde, adamlaryň ýaşaýan jaýlarynda, kábiri – ýerde höwürtegeleýär. Höwürtegeleleri yönekeý, açyk. Guşlaryň ikisi-de ýumurtga basyp oturýar we jüýjelerini iýmitlendirýärler, başda jüýjelerini petekesinden gaýtaryp, “kepderi süýdi” bilen iýmitlendirýärler. Jüýjeleri etene häsiýetli bolup, ýumurtgadan ýalaňaç çykýar we ýelek örtügi doly ösýänçä höwürtegede oturýarlar. Çalt ösýär we 25-nji gün bolanda uçup başlaýarlar. Diňe gündizine işjeň, gijesine ağaçlaryň üstünde dynç alýar. Ýerde oňat yöreýärler we iýmit çöpleýärler. Iýmiti ösümlikleriň tohumlary we miweleri, seýregräk maýda önurgasyzlar, suw içmäge zygyderli gatnaýarlar. Adatça, topar ýa-da süri bolup gezýär, kâte örän uly sürä jemlenýärler. Sport aw guşy. Olaryň köpsanly beseg tohumlaryndan başga, et üçin we hat gatnadyjy tohumlary hem bolýar. Jemi 301 görnüş, Türkmenistanda maşgalanyň wekilleri duşýar: kepderiler 3 görnüş kepderiler we gumrular (*Columbidae*) we bagyrtlaklar (*Pteroklidae*).

Bagyrtlaklar – *Pteroklidae* – Рябковые

Bu maşgaladaky guşlaryň beden gurluşy dykyz, boýny we aýaklary gysga, daşky görnüşi kepderilere çalyndaş, emma guýrugy toýnukşekilli

покрытое кожей (восковица) с щелевидными ноздрями. Оперение густое, плотное. Самцы и самки по окраске не различаются, первые крупнее вторых. Часть видов оседлые, зимовки их обычно в областях гнездования. Большинство – обитатели лесов, некоторые в горах, сельскохозяйственном ландшафте и сооружениях человека. Моногамы, образуют прочные пары. Гнездятся на деревьях, в скалах, норах обрывов, жилищах человека, некоторые виды на земле. Гнезда простые, открытые. Оба родителя насиживают и выкармливают птенцов, причем в начале кормят их отрыжкой из зоба («голубиным молочком»). Птенцы развиваются по птенцовому типу: вылупляются голыми, остаются в гнезде до полного оперения. Растут быстро и в 25-дневном возрасте начинают летать. Ведут дневной образ жизни. Хорошо ходят, пищу собирают на земле. Питание – семена и плоды растений, реже мелкие беспозвоночные, много пьют, постоянно посещают водопои. Держатся, обычно, группами или стаями, иногда очень больших размеров. Являются объектами спортивной охоты. Помимо множества декоративных пород, есть породы мясные и почтовые. Всего 301 вид, в Туркменистане – представители семейств – голубиные (*Columbidae* – голуби и горлицы) и рябковые (*Pteroklidae*).

У птиц этого семейства телосложение плотное, шея и ноги короткие, внешне напоминают голубей, но хвост клиновидный или даже

ýa-da çürelip yza uzalýar. Ganatlary uzyn, çowly, çalt we uzak aralyga uçmaklyga uýgunlaşandyrlar. Gury ýer guşy, yöreý bilýär, oňat ylgaýar, yzky barmagy örän ujypsyz ýa-da asla ýok; dykdykynyň barmaklary bitişip ösen we bitewlikde dabany paşmaksypatyny alýar. Ýerde höwürtegeleýärler. Bagyrtlaklaryň jüýjeleri ýumurtgadan çykanda kepderilerden tapawutlylykda, daşy gür sütük ýelekleri bilen örtülen bolýar we olar höwürtegede uzak saklanmaýarlar. Uly guşlar petekesinde ýa-da garyn ýeleklerini suwa batyryp - ölläp, jüýjelerine suw getirýärler. Iýmiti ösümlikleriň tohumlary we mör-möjekler. Jemi 16 görnüş, olardan 4-si Türkmenistanda.

187. Bagyrtlak – *Pterocles orientalis* – Чернобрюхий рябок

Meýdan alamatlary: beýleki bagyrtlaklar bilen birmeňzeş, yöne ulurak. **Uçup barýarka garynynyň aşagyndaky uly gara tegmil** oňat görünüär. Kellesiniň üsti, boýnunyň yzy we petekesi açyk-çal, bokurdagy poslyrak-goňras reňkli, döşünden keseligine insiz gara zolak geçýär. Üstki tarapy ala, sarymtyl-goňur. Mäkiýanyň reňki tutuk, arka tarapy tolkunsypat kese menekli, bokurdagy ýagty-çypar. Ýaş guşlar mäkiýanlaryna çalyndaş. **Aýaklary ýelek örtüksiz.** Uçuşy çalt, yöne ganatlaryny seýrek kakýar. Sesi – “tçurr-tçurr-tçurr”. Uzynlygy – 330-350, ganaty – 216-246 mm, agramy – 300-550 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: aýaklarynyň sähelçe uzynlygy, guýrugynyň gysgadygy we garynynyň garydadygy bilen beýleki bagyrtlaklardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürte

вытянутый в острие. Крылья длинные, острые, приспособленные к быстрым и дальним перелетам. Исключительно наземные, хорошо ходят и бегают, задний палец очень маленький или совсем отсутствует; у саджи пальцы сросшиеся и имеют сплошную мозолистую подошву. Гнездятся на земле. В отличие от голубей птенцы рябков после вылупления покрыты густым пухом, они не задерживаются долго в гнезде. Родители приносят им воду в зобу или в намокшем оперении брюшка. Пища – семена и насекомые. Всего 16 видов, из которых в Туркменистане – 4 вида.

Полевые признаки: схож с другими рябками, но крупнее. **В полете на брюхе** хорошо заметно **большое черное пятно**. Верх головы, зашеек и зоб светло-серые, горло ржаво-каштановое, поперек груди узкая черная полоска. Верх пестрый, желтовато-бурый. Окраска самки более тусклая, спинная сторона в волнистых поперечных пестринах, горло светло-рыжее. Молодые похожи на самок. **Ноги не оперены.** Полет быстрый, но с редкими взмахами. Голос – «тчурр-тчурр-тчурр». Длина – 330-350, крыло – 216-246 мм, вес – 300-550 г. Сходства – отличия: от других рябков отличаются чуть длинными ногами, коротким хвостом и черным брюхом.

Распространение: гнездовая часть ареала – крайний юго-запад Европы, Северо-Западная Африка, Ближний Восток, Малая, Перед-

geleýän bölegi Ýewropanyň günorta-günbatar çetleri, Demirgazyk-Günbatar Afrika, Ýakyn Gündogar, Kiçi, Alynky we Orta Aziýa hem Gazagystan. Türkmenistanda düzlük böleginiň hemme ýerlerinde duşýar, suw-bat-galyk we aklaň çägelik, derýa jülgelerinden gaça durýar. Hemme ýerde birsydyrgyn höwürtgemeýär, demirgazyk-günbatar böleginde köpüräk, günorta we günorta-günbatarda – guşlaýar, migrasiýasy hem şol etraplar bilen baglanşykly, emma Köpetdagyň eteklerine toplanýar geçýär. Alynky Aziýada we Hindistanyň demirgazyk-günbatar çetinde guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtgemeýän, bölekleyin guşlaýan görnüş, guşlaryň bir bölegi oturymly. Çöl guşy, çöllük we ýarym çöllükdäki dykz toprakly ýerlerde, dag eteklerinde we oazislerniň çetlerinde mekan tutýar. Martda we apreliň birinji ýarymynda uçup gelýär. Güýzüne – sentýabrda we oktyabrda uçup gidýär. Maý-iyunda, seýregräk, käýyllarda. Toýunly ýerdäki hem oýjagazda 3, seýrek 2 sany garamtyl meneklenen açyk çaldan açyk-çalymtly-ýaşyla çenli reňkde ýumurtga guzlaýar, ölçegleri 44-49 x 30-34 mm. Iýunyň ortasynda jüýjeleri çykýar, iýulda – ganatlaryna galýarlar we awgustyň başynda doly uçurym bolýarlar. Awgustda göçüpgonýan sürüleri duşýar. Güýzüne ýüzlerçesiniň, käte müňlerçesiniň toplanan guş sürüleri gabat gelýär. Suwa, guşlaryň onlarçasý bir toplanyp, gatnaw uçuşlary geçirýär. Ag-laba, ösümlük iýmiti bilen iýmitlenýär, az mukdarda mör-möjekleri çokýar. Suw içmäge zygiderli gatnaýar: irden we öýlän, şeýle-de petekesinde

nya и Средняя Азия и Казахстан. В Туркменистане – по всей равнинной части, обычно избегает водноболотные и барханные участки и обширные оазисы. Гнездится неравномерно, больше в северо-западных частях, зимует в южных и юго-западных, миграции приурочены к тем же районам, но концентрируется в предгорьях Копетдага. Зимует в Передней Азии и крайнем северо-западе Индостана.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся, частично зимующий вид, часть особей даже оседла. Пустынная птица, населяет плотно-почвенные участки пустыни и полупустыни, предгорья и окраины оазисов. Прилетают в марте и первой половине апреля. Осенний пролет – в сентябре и октябре. Яйцекладка в мае-июне, редко июле. Яйца откладывают в углубление почвы или на глинистую поверхность без подстилки. В кладке обычно 3, реже 2 яйца, от светло-серого до светло-серо-зеленого цвета с темными крапинками. Размеры яиц – 44-49 x 30-34 мм. Птенцы – в середине июня, в июле начинают перепархивать, в начале августа хорошо летают. В августе встречаются кочующие стаи. Осенью попадают стаи в сотни, иногда тысячи птиц. На водопой летают группами не более нескольких десятков особей. В питании, преимущественно, растительные корма В небольшом числе и насекомые. Регулярно пьют воду, летая на водопой по утрам и вечерам, поят также птенцов, принося и отрывивая им воду.

Статус: обычный, местами на пролете многочисленный вид, как

getiren suwuny gaýtaryp, jüýjelerine suw içirýärler.

Statusy: adaty, uçup geçende köpsanly görnüş, gymmatly aw guşy hökmünde (ýerli ady – “tural”) aýawly çemeleşmek we rejeli peýdalanmak zerurdyr.

188. Gylguýruk – *Pterocles alhata* – Белобрюхий рябок

Meýdan alamatlary: başgalara garanyňda maýda, dykdyky ululygyndaky we bagyrtlak bilen meňzeşligi köp bolan guş. **Uçup baýarka – ýiti uçly uzalan guýrugy we ak garny** görünýär. Depesi, arkasynyň üstki bölegi we egin ýelekleri altynsow-sarymtly tegmili, goňurak-çalymtly-ýaşyl we az sanly garamtyl zolakly. Bokurdagy garamtyl-goňur, garnynyň ak ýerini araçäkleyän garamtyl-goňur zolakly döşünde kese goýy çypar boýunbagy bolýar. Mäkiýanlarynda çal öwüşginler köp, bokurdagy ak, arka tarapy sarymtly we gögümtliräk-çal kese zolakly. Ýaş guşlaryň arka tarapyn-daky ýelek örtügi tolkunsypatly garamtyl zolakly we ýagty sarymtly gaýmaly. Çünki – goýy çal. **Aýaklary** çalymtly-gara, **ýelek örtüksiz**, gözi garamtyl mele. Ýerde gybyrдыклар yöreýär, bolşuna görä, ýeňil ylgaýar. Ganatlaryny sesli kakyp, dikligine howa göterilýär. Sesi – “ghan-ghan” güýçli we bölekleyin. Çünki – 12-13, ganaty – 189-214, guýrugy – 135-178 mm, agramy – 230-290 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: garny-nyň arassa akdygy, guýrugynyň çowlanyp has uzyndygy bilen dykdykydan we bagyrtlakdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtgemeýär

ценная охотничья птица (местное охотничье название – “тураль”) нуждается в бережном отношении и регламентированном использовании.

Полевые признаки: сравнительно мелкий рябок, величиной с саджу и во многом сходен с чернобрюхим рябком. В полете – **удлиненный острый хвост и белое брюхо**. Темя, верхняя часть спины и плечевые перья – буровато-серо-зеленые с золотисто-желтыми пятнами и немногочисленными темными полосками. Горло чернобурое, поперек груди темно-рыжая перевязь, отграниченная от белого брюшка черно-бурой полоской. У самок больше серых тонов, горло белое, спинная сторона в желтых и голубовато-серых поперечных полосках. У молодых – перья на спинной стороне с волнистыми темными полосками и светло-желтыми каемками. Клюв – темно-серый. **Ноги** серо-черные, **не оперены**, радужка темно-бурая. По земле передвигается мелкими шажками, бежит сравнительно быстро. Взлетает с хлопанием крыльев, вертикально. Голос звонкий и отрывистый – «ghan-ghan». Клюв – 12-13, крыло – 189-214, хвост – 135-178 мм, вес – 230-290 г.

Сходства – отличия: от саджи и чернобрюхого рябка отличается чисто белым брюшком, более длинным заостренным хвостом.

Распространение: гнездовая

geleýän bölegi Günorta-Günbataryň Ýewropanyň çetleri, Demirgazyk-Günbataryň Afrika, Mesopotamiýa, Orta Aziýa we Gazagystanyň günortasy. Türkmenistanda düzlüklerde, emma endigan däl, takyr ýere garanynda çölüň çägeli meýdanlaryna ýakyn bolanyny gowy görýär. Alynky Aziýada, Arabystanyň we Afrikanyň käbir ýerlerinde gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtleýän, bölekleyin gyşlaýan görnüş. Ýazyna martda uçup geçýär, emma güýzki ýaly anyk däl. Güýzine –oktyabryň soňky ongünlüginde noýabryň üçünji ongünlüginde çenli uçup geçýär, onu aýratyn-da, Köpetdagyň eteklerinde oňat synlasa bolýar. Guşlar Merkezi Aziýanyň demirgazyk - gündogaryndan uçup geçýärler, onuň esasy ugry - demirgazyk-gündogardan günorta-günbatara tarap. Aýratyn jübüt we topar bolup höwürtleýärler. 2-4, köplenç 3 sany gür açyk-goňur menekli, sarymtyl-çyparrak reňkli ýumurtgalary gös-göni toprakda, aşagy düşeksiz ýerde goýýar. Ýylda iki gezek ýumurtgalamaklary mümkin, maýyň başyndan iýunyň ortasyna çenli, ýumurtgaly höwürtgeleri duşýar. Dürli medeni ösümlikleriň tohumlary, uçup geçende ýandagyň tohumy bilen ýumurtlanýar. Çölde suw içmäge her gün zygiderli uçup gelýär.

Statusy: adaty, uçup geçende köpsanly, käbir ýerlerde örän köpsanly (gysga wagtda) görnüş. Höwesjeň awçylaryň aw guşy hökümünde gymmatly aw guşy (ýerli ady –“turtuşka”). Aýawly çemeleşmek we rejeli - oýlanşykly peýdalanmak zerurdyr.

часть ареала – край Юго-Западной Европы, Северо-Западная Африка, Месопотамия, Средняя Азия и юг Казахстана. В Туркменистане – на равнинах, но не равномерно, больше тяготеет к песчаной, чем к глинистой пустыне. Зимует в Передней Азии, Аравии, местами в Африке.

Образ жизни: пролетно-гнездящийся вид, часть особей может оставаться на зимовку. Весенний пролет в марте, но не так выражен как осенний. Осенний пролет хорошо заметен (особенно в предгорьях Копетдага) с последней декады октября до первой трети ноября. Птицы летят из северо-восточных частей Средней Азии, основное направление полета – с северо-востока на юго-запад. Гнездятся отдельными парами и группами. Гнездо в небольшом углублении почвы. Яйца – прямо на земле без подстилки. Кладка из 2-4, чаще 3-х яиц желтовато-рыжеватого цвета и с густыми ярко-коричневыми пятнами. Период кладки растянут, возможно две кладки в году. Кладка – с начала мая и до середины июня. Питаются семенами различных культурных растений, на пролете – семенами верблюжьей колючки. Совершают регулярные ежедневные перелеты к водопоям в пустыне.

Статус: обычный, на пролетах многочисленный, местами очень многочисленный (в короткое время) вид. Представляет ценность, как объект любительской охоты (охотничье название – “туртушка”). Нуждается в бережном отношении и разумном использовании.

189. Dykdyky – Syrrhaptēs paradokus – Саджа

Meýdan alamatlary: daşky keşbi bagyrtlak sypatly, ýöne bedeni has uzalan, süýnmek. Uçup barýarka **garnynyň aşagy gara tegmilli**, ganatly uçly we uzalan **guýrugynyň soňy iňne ýaly inçelen**. Üsti kese zolaklanan çyparrak-goňur, bokurdagy we maňlaýy çypar, döşi in-siz gara boýunbagy sarymtyl-çal. Mäkiýanyň bokurdagy ak, arka tarapy sarymtyl we gyralary kese zolaklanan mawumtyl-çal. **Aýaklary ýelek örtükli** (barmaklary – “toýnak” görnüşinde bitişen). Ýaş guşlaryň arka tarapyndaky ýelekler tolkunşekilli garamtyl zolakly we gyralary agymtyl-sary gaýalan, şekilli ösmedik guýruk ýelekli. Sesi – batly we güýçli saýrama “trr-trr” we üçgatly – “ku-ru-ru”. Ganaty – 189-214, guýrugy – 185-225, çüňki – 9-10.5 mm, agramy – 200-300 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: uçýan wagtynda garnynyň garadygy bilen gylguýrukdan; guýrugynyň uzyndygy we ganatlarynyň uçlarynyň garadygy bilen bagyrtlakdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Mongoliýada, Demirgazyk Hytaýda we Gazagystanda, Özbegistanyň käbir ýerlerinde höwürtleýär. Olara has uzak aralyga uçuşlary - “çözüşlary” etmek, “ýaýrawuny” giňeltmek häsiýetlidir (aşak seret). Käte ýurdumyzyň dürli künjeklerindäki düzlüklerde duşýar.

Ýaşayşy: çöllük sähra guşy, bizde onuň ýazyna we güýzine, tötdän uçup gelýän-göçüp-gonýan osoblarynyň käbir ýyllarda guşyna-da duşmagy ahmal. Höwürtleýän ýerleriniň çäginde uzaklara (ýokary seret), köplenç günbatara we demir-

Полевые признаки: облик – типичный для рябков, но тело более вытянутое, обтекаемое. В полете – **черное пятно на брюхе**, заостренные и удлинненные крылья и **суживающийся к концу иглой хвост**. Сверху в рыжевато-бурых поперечных пестринах, горло и лоб рыжие, грудь желтовато-серая, с черной узкой перевязью. У самки горло белое, спинная сторона в желтых и голубовато-серых поперечных полосах. **Ноги оперены** (пальцы – сросшиеся виде «копытца»). У молодых перья на спинной стороне с волнистыми темными полосками и светло-желтыми краевыми каемками, перья хвоста не удлинены. Голос – громкая и звонкая трель «trr-trr» и трехсложное «ку-ру-ру». Крыло – 189-214, хвост – 185-225, клюв – 9-10,5 мм, вес – 200-300 г.

Сходства – отличия: в полете от белобрюхого рябка отличается черным брюхом, а от чернобрюхого рябка – длинным хвостом и темными концами крыльев.

Распространение: гнездится в Монголии, Северном Китае и Казахстане, местами в Узбекистане. Характерны так называемые «инвазийные» вылеты на большие расстояния (см. ниже). В Туркменистане – на равнинах спорадически в различных частях страны.

Образ жизни: пустынно-степная птица, у нас считается залетно-кочующей весной и осенью, в отдельные годы может быть встречена и зимой. Особенностью вида являются массовые вылеты далеко за пределы

gazyga tarap körçülikleýin uçup gitmekleri görnüşiniň aýratynlygydyr. Bu hadysa, adaty ýazyna ýa-da gýşyna geçýär, ol guşlaryň bir näçe ýyllaryň dowamynda köpelenlerinden soň, iýmit gorunyň ýetmezçilik döwrüniň gelmegi bilen düşündirilýär. Şeýle ýaýraw “çozuşda” dykdykylar Türkmenistana hem aralaşýarlar.

Statyýa: az sanly görnüş, emma aýratyn ýyllarda adaty, käbir ýerlerde köpsanly bolmagy ahmal. Aw guşlaryň sanawyna girýär (ýerli aw ady – “kopytka”) we beýleki bagrtlaklar bilen bilelikde awlanymagy mümkin, sany köp ýerlerde azalýar, hemme ýerde onuň köp taraplaýyn goralyp saklanmagy we oýlanşykly ulanyl-magy zerurdyr.

190. Bellik. Senegal bagyrtlagy – Pterocles senegallus – tötänden uçup gelyän, ol bir gezek Amyderýanyň jülgesinde, Keif obasynyň demirgazygynda belendi (1889 ý.). Beýleki bagrtlaklardan göwresiniň kiçiräkdigi bilen tapawutlanýar. Horazy gülgüneräk ýa-da çalymtylrak öwüşginli açyk, çagepisint-sarymtyl ýelek örtüklü, garnynyň ortasy gara-goňur, egni gyzylymtyl-goňur tegmilli gülgüneçal, mäkiýanyň arkasy gyzylymtyl goňur-sary öwüşginli gara-goňur menekli.

Кепдерилер – Columbidae – Голубиные

Beden gurluşy we ýelek örtügi dykyz, uýy ýitelen, ganatlary başgalara garanynda uzyn, kelte çüňkli (düýbi oňat ösen “mumlyjykly”), aýaklary we boýny, guýrugy gysgalan we te-

гнездовой области (см. выше), чаще в западном и северном направлениях. Это происходит обычно весной или зимой и, по-видимому, объясняется тем, что за периодом успешного размножения птиц в течение нескольких лет следует период наступившей бескормицы. Во время таких «инвазий» саджи залетают и в Туркменистан. Питаются растительными кормами.

Статус: немногочисленный вид, но в отдельные годы может быть обычным, а местами даже многочисленным. Относится к числу охотничьих птиц (местное охотничье название – копытка), может добываться вместе с другими рябками, численность во многих местах сокращается, нуждается во всемерной охране и разумном использовании.

190. Примечание. Сенегальский рябок – Pretocles senegal-lus – залетный вид, отмечен лишь однажды (1889 г.) в долине Амударьи севернее пос. Келиф. От других рябков отличается чуть меньшими размерами. Оперение у самцов светло-песочное-желтое с розоватым или сероватым оттенком, середина брюшка черно-бурая, плечи розовато-серые с охристыми пятнами; у самки верх с черно-бурыми пятнами на охристо-желтом фоне.

Семейство птиц средней величины, с плотным телосложением и оперением, заостренными, сравнительно длинными крыльями, укороченными клювом (у основания

gelenen orta ululykdaky guşlar maşgalasy. Kepderileriň ählisi ösümlik bilen iýmitlenýärler. Höwürtgelerini ýerden ýokarda gurýarlar. Jüýjeleri bagyrtlaklaryňkydan tapawutlylykda, ýumurtgadan mejalsyz-etene görnüşinde çykýarlar we ep-esli wagtyň dowamynda höwürtgede oturýarlar. Jemi – 285 görnüş, olardan 9-sy Türkmenistanda.

191. Gögerçin – Columba livia – Сизый голубь

Meýdan alamatlary: umumy reňki goýy-gök, **ganatlary** iki sany **gara zolakly**. Uçýan mahaly **biliniň akdygy we guýrugynyň guralarynyň garadygy** görünüär. Boýny inli ýaşylymtyl-goýy gyzyly boýunbasy, mäkiýanynda, ol has gowşak ýalpykdyly. Ýaş guşlaryň gögümtyl ýelek örtügi goňurak öwüşginli, ýalpyldawuk boýunbasy ýok, ýeleklere, aýratyn-da, döşünde we ganatlarynda ýagty gaýamaly. Ýabany kepderileriň şäherlere uçup gelmegi mümkin, olaryň (azu-kän) gara, ak, goňur ýa-da agyntyl-goňur ýeleklere bolýar. Çüňki goňurak-gara. Aýaklary gyzyly. Sesi – häsiýetli warkyldama. Ganaty – 215-235, guýrugy – 110-127, çüňki – 19-21 mm, agramy – 240-360 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: biliniň akdygy, guýrugynyň garamtyldygy we ganatlarynyň üstünden kese iki sany garamtyl zolagyň geçýändigini bilen beýleki kepderilerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: ýabany gögerçiniň arealy–Afrikanyň demirgazyk böleginiň ýarsyny, Ýewropanyň demirgazyk böleginden başga ýerlerini, Günbatar Sibiri, Gazagystany, Orta, Kiçi we Alynky Aziýany, Arabystany we Hindihytaýy öz içine alýar. Si-

которого хорошо развита восковица), ногами и шеей, хвост укорочен и закруглен. Все голубиные питаются растительной пищей. Гнездятся не на земле. Птенцы, в отличие от рябков, вылупляются беспомощными и не сразу покидают гнездо. Всего – 285, из которых в Туркменистане – 9 видов.

Полевые признаки: общая окраска темно-сизая, с двумя **резкими черными полосами на крыльях**. В полете **хорошо заметны белая поясница и черная полоска по краю хвоста**. На шее широкий зелено-пурпурный ошейник, у самки он с более слабым блеском. У молодых буроватый налет на сизом оперении; перья, особенно на груди и крыльях, со светлыми каемками, блестящего ошейника нет. В городах могут попадаться дикие голуби, у которых присутствуют (больше или меньше) черные, белые или коричневые, или бело-коричневые перья. Клюв буровато-черный. Ноги красные. Голос – характерное воркование. Крыло – 215-235, хвост – 110-127, клюв – 19-21 мм, вес – 240-360 г.

Сходства – отличия: от других голубей отличается белой поясницей, темным хвостом и двумя темными полосами сверху поперек крыла.

Распространение: ареал дикого сизого голубя охватывает северную половину Африки, Европу за исключением северных частей, Западную Сибирь, Казахстан, Среднюю, Малую и Переднюю Азию,

nantrop gögerçinler Ýewraziýanyň ähli ilatly nokatlarynda, şeýle-de Amerikanyň köp şäherlerinde ýaşaýar. Türkmenistanyň ähli ýerlerinde, emma endigan düşmäýar.

Ýaşayşy: oturymly görnüş, daglaryň gaýalarynda, derelerinde, jarlarda, derýalaryň gum gaýaly kenarlarynda mekan tutýar, çölde gabat gelyär, obalarda, şäherlerde ýaşaýar. Martda we apreliň başynda jübütleşýär, apreliň ikinji ýarymynda ýumurtga goýýar (ýarym ýabany kepderileriň warkyldamagy we jübütleşmegi ir fewralda başlanýar). Höwürtgisini gaýalaryň ýarçyklarynda, hinlerde we kert gaýalaryň eginlerindäki tekjelerde, jaýlaryň üçeginde, adamyň guran desgalarynda, çöldäki sardoblaryň we guýularyň diwarlarynda gurýar. 2 sany ak ýumurtga goýýar, ölçegleri – 27-31 x 36-43 mm. Ýylda 3-4 gezek jüýje çykarýar. Güýz-gyş aýlary sürä toplanýar we ýerli göçüp-gonma uçuşlary geçirýar. Ýabany we medeni ösümlikleriň tohumlaryny ýerden çöpläp iýmitlenýär.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde köpsanly, oňat tanalýan guş. Sport aw guşy hökmünde, düzgün-tertibe gabat gelyän ýerlerde aw ähmiýetli.

192. Goňur kepderi – *Columba evermanni* – Бурый голубь

Meýdan alamatlary: gögerçinden mese-mälim kiçi we garamtyl, aýratynda, ganatlarynyň aşak ýüzi, **arkasy we ganatlary goňurrak** reňkli. Uçýan mahalynda ýagty arkasy we güýrugynyň üsti oňat görünýär. Kellesiniň üsti çalymtyl-goýy gyzyly reňkli, boýnunyň yz tarapyndaky tegmil ýaşylymtyl-goýy gyzyly ýalpyldawuk reňkli. **Çüňki**

Аравию и Индокитай. Синантропные сизые голуби живут почти во всех населенных пунктах Евразии, а также во многих городах Америки. В Туркменистане повсеместно, но не равномерно.

Образ жизни: оседлый вид, населяет скалы, горные ущелья, овраги, обрывистые берега рек, встречается в пустыне, живет в селах и городах. Спаривание в марте и начале апреля, яйца – во второй половине апреля (воркование и спаривание у полудомашних голубей начинается раньше – в феврале). Гнезда устраивают в трещинах скал, в норах и нишах по обрывам, на карнизах, в постройках человека, кяризах, в стенах сардоб и колодцев в пустыне. Кладка из 2 белых яиц, размеры – 27-31 x 36-43 мм. Выводят птенцов 3-4 раза в году. В осенне-зимнее время собираются в стаи, совершают незначительные кочевки. Питаются семенами диких и культурных растений, собирая их на земле.

Статус: обычная, местами многочисленная, хорошо узнаваемая птица. В соответствующих местах имеет значение как объект спортивной охоты.

Полевые признаки: заметно мельче и темнее сизого голубя, особенно с нижней стороны крыла, **спина и крылья буроватые**. В полете хорошо видны светлые спина и надхвостье. Верх головы серовато-темно-красной окраски, на задней стороне шеи пятно блестящего зелено-пурпурного цвета. **Клюв серый с желтоватым концом**. Вор-

sarymtyl çal uçly. Köpelyän döwüründe warkyldamasy garamtyl billi kepderiňkä örän meňzeş, bir äheňde we pessaý “uu-uu-uu...”. Uzynlygy – 300 çenli, horazlarynyň ganaty – 192-212, mäkiýanlarynyňky – 187-203 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: arkasynyň we ganatlarynyň ýelek örtügininiň goňur öwürşinlidigi, uçanda gögerçine çalymdaşdygy, emma guýrugynyň gysgadygy, ganatlarynyň we bedeniniň aşak tarapyň ýelekleriniň garamtyldygy bilen beýleki kepderilerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Orta Aziýada we Merkezi Aziýanyň günbatarynda höwürtgelyär, Alynky Aziýada we Hindistanyň demirgazyk-günbatarynda gyşlaýar. Türkmenistanda derýalaryň jülgelerinde, Tejen, Murgap we Amyderýa jülgelerinde köp gabat gelyär.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtgelyän guş, derýalaryň kert kenarly ýerlerinde, toraňnyly tokaýlyklarda mesgen tutýar. Ýazyna martyň ikinji ýarymynda-apreliň başyna uçup gelyär. Güýzüne – sentýabrda-oktyabrda uçup gidýär. Agaçlaryň köweklerinde, gum gaýalardaky hinlerde, şeýle-de gurluşyk desgalarynda höwürtgelyär. Ýasy düýpli höwürtgisini gury otlaryň baldajyklaryndan, sypallaryndan pezzik edip gurýar. Maý aýynda birinji, iýunyň soňunda we iýulda ikinji gezek ýumyrtgalaýar. Höwürtgede 2 sany ak ýumurtgasy bolýar. Aglaba, ösümlikleriň tohumlary bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek guş, MSOP-nyň Gyzyly sahypasyna we Türkmenistanyň Gyzyly kitabyna girizilen.

кование в период размножения очень сходно с голосом клинтуха – монотонное и приглушенное «уу-уу-уу ... ». Длина – до 300, крыло самцов – 192-212, самок – 187-203 мм.

Сходства – отличия: от всех голубей отличается бурными тонами в оперении спины и крыльев, в полете похож на сизого голубя, но хвост короче, а оперение нижней стороны крыльев и тела темное.

Распространение: гнездится в Средней и на западе Центральной Азии, зимует в Передней Азии и на северо-западе Индостана. В Туркменистане по долинам рек, несколько больше по Теджену, Мургабу и Амударье.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица, обитает по речным обрывистым берегам, туранговым рощам. Время весеннего прилета – вторая половина марта-начало апреля. Осенний пролет – в сентябре-октябре. Гнездится в дуплах деревьев, в норах по обрывам, а также постройках. Гнездо –рыхлая постройка из сухой травы и веточек с плоским дном. Первая кладка – в мае, вторая – в конце июня и в июле. В кладке 2 белых яйца. Питаются, преимущественно, семенами.

Статус: редкая птица, внесен в Красный список МСОП и Красную книгу Туркменистана.

193. Bellik: Gündogar Köpetdagda we Köýtendagda **gäya keperisi** – **Columba rupestris**, örän seýrek gabat gelýär, ol gögerçine gaty meñzeş, emma guýrugyndaky inli ak zolagy bilen tapawutlanýar. Dag guşy bolup, Türkmenistandan gündogarda – Orta, Merkezi we Gündogar Aziýanyň günortasyndaky daglyklarda we Günorta Sibirdä ýaýran.

194. Garamtyl billi keperisi – Columba oenas – Клинтух

Meýdan alamatlary: gögerçine örän meñzeş, ýöne sähelçe kiçi we guýrugy gysga, **bili arkasy bilen birmeñzeş reňkli – gök**, ganatlaryndaky zolaklar anyk bildirmeyär. Boýny metal öwüşginli ýaşylmytyl-gyzyl, **petekesi-gyzylmytyl**. Çünküniň düýbi gyzyl bolup, ujunda saralýar (agarýar). Aýaklary goýu-gyzyl. Gözi gyzylmytyl-goňur. Gözüniň töweregindäki halka çalymytyl. Ýaş guşlaryň reňki has tutuk we metal öwüşginini ýok. Sesi diňe jübütleşýän döwründe eşidilýär. Warkyldamasy beýleki keperilere meñzemeýär – birdürli, biräheňde, ýürege düşgüç 10-15-e çenli gaýtalanma, güňlenç “huhy-huu-huhu-huu”. Ganaty – 205-230, guýrugy – 110-130, çüňki – 18-19 mm, agramy – 250-340 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: gögerçine meñzeş, emma ganatlarynyň has ýagtydygy, arkasynyň birmeñzeş gögümtildigi, biliniň hem-de aşak tarapyň agymtyldygy bilen, hal keperiden bolsa, ganatlarynda we boýnunda ak reňkiň ýokdygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropanyň, demirgazyk böleginden beýleki

193. Примечание: не исключено, что в Койтендаге и даже в Восточном Копетдаге крайне редко может быть встречен **скалистый голубь – Columba rupestris**, который очень схож с сизым голубем, но отличается широкой белой полосой на хвосте. Эта горная птица распространена восточнее Туркменистана – в горных областях юга Средней, Центральной и Восточной Азии и Южной Сибири.

Полевые признаки: очень похож на сизого голубя, но чуть меньше и короткохвостее, **поясница одного цвета со спиной – сизая**, полосы на крыльях выражены слабо. Шея с металлическим зелено-пурпурным отливом, **а зоб – с красноватым**. Клюв с красным основанием, желтеет (светлеет) на конце. Ноги темно-красные. Глаза красно-бурые. Кольцо вокруг глаза сероватое. У самки цвета более матовые. У молодых нет металлического отблеска. Голос подает только в брачный период. Воркованье не похоже на других голубей – однообразные, монотонные, заунывные, повторяемые до 10-15 раз, глухие звуки «хуху-хуу-хуху-хуу». Крыло – 205-230, хвост – 110-130, клюв – 18-19 мм, вес – 250-340 г.

Сходства – отличия: схож с сизым голубем, отличается более светлыми крыльями, одноцветной сизой спиной и поясницей и более светлым низом, от вяхиря – отсутствием белого на крыльях и шее.

Распространение: вся Европа кроме северных частей, крайний северо-запад Африки, Юго-Запад-

yerlerinde, Afrikanıň demirgazykgünbatar çetleri, Günorta-Günbatar Aziýa, Kawkaz, Günbatar Sibiriň günortasy, Demirgazyk Gazagystan. Orta Aziýada - daglyk yerlerinde, derýa jülgeleriniň käbir yerlerine ýakynlaşýar. Türkmenistanda Amyderýanyň jülgesinde, emma uçup geçende beýleki yerlerde hem duşýar. Ortayer deňzinde we Ýakyn Gündogarda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup, geçip gidýän, höwürtegeýän guş, käbirleriniň gyşlaýan bolmagy mümkin. Jeňlikdäki köp ýaşan we sütünleri köwekli toraňny tokaýlygynda mekan tutýar. Fewralyň soňunda-martyň başynda uçup gelýär. Aýratyn jübüt bolup, agaçlaryň köweklerinde höwürte gurýar, onuň düýbüne otlaryň sypallaryny we çüýrap başlan ýapraklary düşeýär. Ýylda iki gezek köpelyär. 2 sany ak yumurtga goýýar, ölçegleri – 36-37 x 26-28 mm. Ýaşlary iýunyň soňunda we sentýabra çenli gabat gelýär. Güzüne sentýabr-oktyabrda uçup gidýär. Ýabany ösýän ösümlikleriň tohumlary bilen iýmitleňýär.

Statusy: az sany, bizde az öwrenilen, seýrek guş. Ol hem edil beýleki keperiler ýaly aw guşlaryň hataryna girýär, emma seýrek duşýandygy sebäpli, goraga alynmagy zerur.

195. Hal keperisi – Columba palumbus – Вяхирь

Meýdan alamatlary: bizdäki keperileriň arasynda iň ulusy. Uçanda **ganatlarynyň üstündäki ak tegmilleri**, oturan mahaly – **boýnundaky ak we ýaşyl tegmilleri** boýunça aňsat tapawutlanýar. Kellesi we boýny goýu-gök; gapdallary we

ная Азия, Кавказ, юг Западной Сибири, Северный Казахстан. В Средней Азии – тяготеет к горным районам, местами по долинам рек. В Туркменистане – возможно на пролетах в долине Амударьи, встречается и в других местах. Зимует – в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

Образ жизни: пролетная, возможно гнездящаяся птица и часть особей зимует. Тяготеет к пойменным тугаям со старыми и дуплистыми деревьями. Прилетает в конце февраля-начале марта. Селится отдельными парами, гнезда устраивает в дуплах, гнездо – скудная подстилка из веточек и пожухлых листьев. Две кладки в году. В кладке 2 белых яйца, размеры – 36-37 x 26-28 мм. Молодых можно встретить с конца июня и до начала сентября. Осенний отлет, в основном, в сентябре-октябре. Питаются зернами диких злаков и семенами дикорастущих растений.

Статус: немногочисленная, у нас мало изученная птица. Клинтух, как и другие голуби, относится к числу охотничьих птиц, но из-за редкости нуждается в охране.

Полевые признаки: самый крупный из наших голубей. В полете легко отличается по **белым пятнам на крыльях сверху**, а сидя – по **белому и зеленому пятнам на шее**. Голова и шея темно-сизые; бока и задняя сторона шеи, перед-

boýnunyň yzky tarapy, arkasynyň öňki bölegi ýaşylymytyl we gyzyly, metal öwüşginli. Arkasynyň yz tarapy we guýrugynyň üstüni ýapyjy ýelekleri sähelçe ýagty, çalymytyl-gök reňkli. Petekesi we döşi ýaşylymytyl-goýy gyzyly, garny, boýnunyň gapdallary we guýrugynyň aşagy agymtyl-gök. Guýrugy goýy gögümtil, gyalary inli goňurrak-gara zolakly. Çüňküniň esasy bölegi gyzyly, uýy sary. Aýaklary goýy gyzyly. Gözleri agymtyl-sary. Sesi kepderileriň warkyldysyna meňzemeýär, köplenç, uzakdan dürli beýiklikdäki sesli sözleriň sozulusy “ghu-u-huhu... hu-u-huhu...” ýa-da “uehuhu-uehuhu” yaly eşidilýär. Ganaty – 225-270, guýrugy – 145-180, çüňki – 20-24 mm, agramy – 420-620 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: boýnundaky we ganatlaryndaky ak tegmilleri, ölçeginiň uludygy bilen beýleki kepderilerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropanyň demirgazyk çetlerinden başga, hemme ýerlerinde, Demirgazyk-Günbatar Afrikada, Kiçi we Alynky Aziýada, Gimalaý daglarynda, Günbatar Sibirda, Gazagystanda we Orta Aziýada ýaýran. Türkmenistanda Köpetdagda we Köýtendagda, uçup geçende giňişleýin derýalaryň jülgerinde duşýar.

Ýaşayşy: uçup, geçip gidýän, höwürtegeleýän guş. Daglyk ýerlerdäki gyrymsy agaçly ýerlerde mekan tutýar. Ýazyna fewralda (gyş ýyly gelende – ondan hem öňräk) uçup gelyär. Apreliň ortasynda höwürtegemäge girişýär. Höwürtesini agaçlaryň ýa-da gyrymsylaryň gapdal şahalarynda gurup, 2 sany arassa ak yumurtga goýýar, öl-

няя часть спины с металлическим зеленым и пурпурным блеском. Задняя часть спины и верхние кроющие хвоста несколько светлее, серовато-сизые. Зоб и грудь зелено-вато-темно-красные, брюхо, бока шеи и подхвостье светло-сизые. Хвост темно-сизый, с буровато-черной широкой полосой по краю. Основная часть клюва красная, на конце желтая. Ноги темно-красные. Глаза бледно-желтые. Голос не похож на воркование голубей – глухие, далеко слышные звуки с растянутыми отдельными фразами разной высоты «гху-у-хуху... гху-у-хуху...», или «уэхуху-уэхуху». Крыло – 225-270, хвост – 145-180, клюв – 20-24 мм, вес 420-620 г.

Сходства – отличия: от других голубей отличается белыми пятнами на шее и крыльях, крупными размерами.

Распространение: по всей Европе за исключением крайнего севера, Северо-Западная Африка, Малая и Передняя Азия, Гималаи, и Западная Сибирь, Казахстан и Средняя Азия. В Туркменистане – Копетдаг и Койтендаг, на пролетах шире – по долинам рек.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. В горах ее обитание приурочено к участкам древесно-кустарниковой растительности, особенно по ущельям. Весной прилетает в феврале (в теплые зимы даже раньше). К гнездованию приступает в середине апреля. Гнездо обычно на боковых ветвях дерева или на кустах. В кладке 2 чисто-белых яйца, размеры – 26-35 x 34-44 мм. В норме за год – 2-3 цикла размножения. Из последних

çegleri – 26-35 x 34-44 mm. Ýylda 2-3 gezek köpelyär. Soňky goýlan ýumurtgalardan jüýjeler awgustyň soňunda-sentyabryň başynda çykýar. Guşlaryň jüýjeleri uçurym bolandan soň, göçüp-gonyan sürä toplanýarlar. Kepderiler iýmiti ýerden we agajyň üstünden çokmagada ukyplydyrlar. Esasy iýmiti medeni danelileriň we dürli ösümlikleriň, aýratyn-da, ýabany danelileriň we kösüklileriň tohumlarydyr. Şeýle-de olar dürli miweleri çokýarlar (smorodina, itburun, tut, agaçlaryň pyntyklary).

Statusy: az sanly, uçup geçende käbir ýerlerde adaty guş, ikinji derejeli aw guşy, goralмага mynasyp.

196. Halkaly gumry – *Stertopelia decaocto* – Кольчатая горлица

Meýdan alamatlary: gögerçinden maýda, yöne gelşikli, gumrularyň arasynda iň ulularynyň biri. Üstki tarapy açyk goňur, aşak tarapy gülgüne-ak, boýnunyň yzy orakşekilli insiz gara ýarymhalkaly bolup, gyrasy öňünden we zyndan agymtyl gaýalan. Guýrugy uzyn bolup, ak zolagy örän inli. Ýaş guşlaryň boýnunda gara ýarymhalka ýok we guýrugynda ak reňk az. Sesi warkyldysy güňlenç we bir meňzeş owaz “hu-hu-huu...”. Uzynlygy – 280 çenli, ganaty – 160-190, guýrugy – 125-145, çüňki – 16-18 mm, agramy – 193-200 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: boýnundaky häsiýetli gara ýarymhalkasy we guýrugyndaky örän inli ak zolagy bilen gumrularyň hemmesinden, adaty we uly gumrulardan, arkasynyň bir öwüşginli reňki, musaýyja gumrudan, ölçegleriniň has uludygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: giň, çalt ýaýrap, öz arealyny giňeldýän görnüş.

кладок птенцы вылупляются в конце августа-начале сентября. После размножения птицы собираются в кочующие стаи. Вяхири собирают корм не только на земле, но и на деревьях. Основной пищей служат семена культурных злаков и различных растений, особенно диких злаков и бобовых. Поедает также различные ягоды – смородину, шиповник, шелковицу, древесные почки.

Статус: немногочисленная, местами на пролетах обычная птица, как объект охоты имеет второстепенное значение, заслуживает охраны.

Полевые признаки: меньше сизого голубя, изящнее, среди горлиц наиболее крупная. Сверху – светло-бурая, снизу розовато-белая, **на шее сзади – черное узкое серповидное полукольцо**, отороченное спереди и сзади беловатыми каемками. Хвост длинный с очень широкой белой полосой. У молодых нет черного полукольца на шее и мало белого цвета на хвосте. Голос – воркование – глухой и односложный звук «ху – ху – хуу...». Длина – до 280, крыло – 160-190, хвост – 125-145, клюв – 16-18 мм, вес – 193-200 г.

Сходства – отличия: от всех горлиц отличается характерным черным полукольцом на шее и очень широкой белой полосой на хвосте, кроме того, от обыкновенной и большой горлиц – однотонной окраской спины, а от малой – более крупными размерами.

Распространение: широкое,

Kiçi Aziýadan XX asyrdan çykyр, ol Ýewropanyň hemme ýerlerine diýen ýaly ýaýradý, soňra Günorta Urala, Gazagystana we Orta Aziýa geldi. Türkmenistana aralaşmagy Guşgy jülgesi boýunça geçen asyryň ortasyndan başlandy. Häzirkä döwürde ol Amyderýadan Hazara çenli Türkmenistanyň ähli ýerlerinde gabat gelýär, emma günbatarda, günortada we gündogarda häzirikçe sany köp däl.

Ýaşayşy: oturymly görnüş, derýalaryň jülgelerinde, dagöňünde, oazislarda we oba hojalyk landşaftlarynda ýaşaýar. Gyrymsy agaçly ýerlerde aýratyn jübüt bolup höwürtegeleýär, kiçiräk tokaýlary, baglyk, seýilgähleri, ýaşyl zolaklary halaýar. Edil musaýyja gumry ýaly adamlaryň guran desgalaryna ýanaşyk ýaşaýar. Agaçlaryň şahalarynyň arasynda çybyjyklardan we gury sypallardan höwürtege gurýar. Mart-aprelde 2 sany açyk-sargylyt-ak reňkli yumurtga goýýar, ölçegleri – 23-26 x 29-34 mm. Ýylda 2-3 gezek nesil öndürýär. Maýdan awgust aýyna çenli jüýjeleri çykyр. Iýmiti dürli ösümlikleriň däneleri, güýz-gyş aýlary iýmitlenmäge ekerançylyk meýdanlaryna uçup bar-maklary mümkin.

Statusy: adaty, güýz-gyş möwsüminde käbir ýelerde köpsanly guş. Biziň şäherdir şäherçelerimizi bezeyär, ol ýakyndan üns berilmäge we goralma-ga mynasyp guş.

197. Adaty gumry – *Stertopelia turtur* – Обыкновенная горлица

Meýdan alamatlary: kepderiniň ölçeginde, ýöne kiçi, gelsikli we owadan. Kellesiniň üsti we boýnunyň yzy çalymtyl-gök. **Boýnunyň gapdallary,** örän ýagty çalymtyl-mawy

вид быстро расселяется, расширяя свой ареал. В XX веке, проникнув из Малой Азии, он заселил почти всю Европу, затем Южный Урал, Казахстан и Среднюю Азию. В Туркменистан проникновение началось в середине прошлого века по долине Кушки. В настоящее время встречается почти по всему Туркменистану от Амударьи до Каспия, но на западе пока не столь обычна как на юге и востоке.

Образ жизни: оседлый вид, обитает в долинах рек и предгорьях, оазисах и сельскохозяйственных ландшафтах. Гнездится отдельными парами на участках с древесно-кустарниковыми насаждениями, предпочитает рощи, сады, парки, зеленые зоны. Как и малая горлица, не избегает соседства с человеком. Гнездо строит в кронах деревьев из прутиков и сухих стеблей. Кладка – с марта-апреля, состоит из 2 сливочно-белых яиц, размеры – 23-26 x 29-34 мм. В норме – 2-3 кладки в году. Птенцы – в мае-августе. Корм собирает на земле, это семена различных растений, в том числе культурных злаков, осенью и зимой могут летать кормиться на поля.

Статус: обычная, местами в осенне-зимнее время многочисленная птица. Украшает наши города и поселки, заслуживает доброго отношения и охраны.

Полевые признаки: размером с голубя, но меньше, стройнее и изящнее. Верх головы и затылок серовато-сизые. **По бокам шеи – по одному крупному пестрому**

gaýmaly, **gara ýeleklerden emele gelen bir sany uly ala tegmilli.** Biliniň öň tarapy goňurrak, yzky bölegi we guýrugynyň üsti çalymtyl-goňur. Egni we ganatlarynyň daş tarapyň uly bölegi çyparrak inli gaýmaly. Alkymynyň aşagy we bokurdagy agymtyl. Boýnunyň öň tarapy, petekesi, gögümtil-gülgüne, garny agymtyl, bedeniniň gapdallary çalymtyl-gök, guýrugynyň aşagy ak. Guýrugynyň yzky gyrasy insiz ak zolakly gara. Çünki garamtyl, aýaklary solak gyzyly. Gözi mämişi-gyzyly. Sesi güýçli, mylaýym warkyldy “turr-turr...turr-turr...” owazly (görnüşini ylmy ady ses öykünmesi). Ganaty – 160-184, guýrugy – 115-125, çünki – 15-19 mm, agramy – 110-130 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: arkasynyň teňňeşekilli, boýnunyň tegmil sypatly nagşlary bilen halkaly we musaýyja gumrylardan; uly gumrydan, ölçegleriniň kiçidigi, has ýagty reňklidigi we petekesiniň çalymtyldygy (tebigatda tapawutlandyrmak kyn) bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeleýän bölegi giň – tutuş Ýewropa, demirgazyk welaýatlaryndan başga ýerleri, Demirgazyk Afrika, Kiçi, Alynky Orta Aziýa, Gazagystan, Günbatar Sibiriň günortasy we Günbatar Hytaý. Türkmenistanyň hemme ýerlerinde – daglyk we düzüklerinde gabat gelýär. Afrikanyň ekwator böleginde gyşlayar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtegeleýän görnüş. Daglaryň we derýa jülgeleriniň agaçly we gyrymsy agaçly ýerlerinde, toraňnyly jeňňelliklerde, sazakylda, ýylgynly jeňňellerde, ilatly ýerleriň saýaly bagly ýerlerinde mekan tutýar. Ýazynda apreliň soňunda we maýyň başynda uçup gelýär.

пятью, образованному черными перышками с очень светлыми серовато-голубыми каймами. Передняя часть спины буроватая, задняя часть и надхвостье серовато-буроватые. Плечи и большая часть крыла снаружи темные, с широкими рыжеватыми каймами. Подбородок и горло беловатые. Шея спереди, зоб, грудь сизовато-розовые, брюхо беловатое, бока тела серовато-сизые, подхвостье белое. Хвост черный с узкой белой полоской по заднему краю. Клюв черноватый, ноги бледно-красные. Глаза – оранжево-красные. Голос – громкое, нежное воркование, звучащее как «турр-турр... турр-турр...» (научное название вида – звукоподражательное). Крыло – 160-184, хвост – 115-125, , клюв – 15-19 мм, вес – 110-130 г.

Сходства – отличия: от кольчатой и малой горлиц отличается чешуйчатым рисунком на спине, формой пятен на шее. От большой горлицы – меньшими размерами, более светлой окраской и сероватым зобом (в природе трудно отличимы).

Распространение: гнездовая часть ареала широкая – вся Европа за исключением северных областей, Северная Африка, Малая, Передняя, Средняя Азия, Казахстан, юг Западной Сибири и Западный Китай. В Туркменистане повсеместно, как в горах, так и на равнинах. Зимовки – в Экваториальной Африке.

Образ жизни: пролетная, гнездящийся вид. Встречается в горных и речных долинах на участках с древесно-кустарниковой растительностью, в тугаях, саксаульниках, зарослях тамарикса, насаждениях в населенных пунктах. Весной по-

Güýzine - awgustyň soňunda we sentýabrda uçup geçýär. Aýratyn jübüt bolup höwürtegeleýär. Agaçlaryň gapdala uzaýan şahalarynda gury çörjagazlardan pezzik, arasyndan şöhle geçýän aşagy tekiz höwürtege gurýar. Ýylda iki gezek köpelyär. Birinji höwürtegesini maý aýynda gurýar we 2 sany arassa-ak reňkli yumurtga goýýar, ölçegleri 22-25 x 28-35 mm. Ýaşlary iýunyň soňunda we awgustta çenli gabat gelyär. Dürli ýabany ösümlikleriň däneleri esasy iýmiti bolup hyzmat edýär. Bugdaý orulan meýdanlardan ýere gaçan däneleri çöpleýär. Suwa mätäç, zygyderli suw içmäge gatnaýar.

Statusy: köp sanly däl görnüş, sany azalýar, höwesjeň awçylaryň ikinji derejeli aw guşy.

198. Uly gumry – *Stertopelia orientalis* – Большая горлица

Meýdan alamatlary: adaty gumra çalymdaş, ýöne sähelçe ulurak, reňki garamtyl we goňurrak. Kellesiniň üsti gögümtil-çal, **boýnunyň gapdallary gara we çal ýelekleriň toplumundan uly ala tegmilli;** arka tarapy çalymtyl-goňur, aşak tarapy, goýy gök. Petekesi, döşi we garny gülgüne-goýy gyzył reňkli, guýrugynyň aşagy we guýrugynyň çetki ýelekleri ak. Çünki gyzylymtyl-goňur, gabagynyň we gözünüň töwereginiň ýalaňaç deri – gyzył. Gözleri mämişi. Sesi adaty gumra garanynda güýçli we güňlenç, beýleki kepperileriň sesinden tapawutlanýar. Onuň gödeksi, ýogyn sesli warkyldysy “ubu...ubu...tu-bu-bu, ubu...tu-bu-bu...” uzakdan eşidilýär. Ganaty – 170-220, guýrugy – 130-150, çüňki – 15-18 mm, agramy – 200-238 g.

является в конце апреля и начале мая. Осенний пролет – в конце августа и сентябре. Гнездится отдельными парами. Гнездо устраивает обычно на горизонтальных ветвях деревьев. Гнездо плоское, рыхлое и просвечивающего настила из сухих веток с очень плоским лотком. Две кладки в году. Первая кладка в мае, состоит из 2 чисто-белых яиц, размеры – 22-25 x 28-35 мм. Молодые – с конца июня и до конца августа. Основным кормом служат семена различных диких растений. Посещает убранные хлебные поля, где подбирает оставшиеся после уборки зерна. Нуждается в воде и регулярно летает на водопой.

Статус: немногочисленный вид, является второстепенным объектом любительской охоты.

Полевые признаки: похожа на обыкновенную горлицу, но несколько крупнее, окраска темнее и бурее. Верх головы голубовато-серый, **по бокам шеи – по большому пестрому пятну из черных и серых перьев;** верхняя часть спины серовато-бурая, нижняя – темно-сизая. Зоб, грудь и брюшко розовато-темно-красного цвета; подхвостье и край хвостовых перьев белые. Клюв красно-бурый, голая кожа на веках и кольцо вокруг глаз – красные. Глаза оранжевые. Голос у большой горлицы сильнее и глуше, чем у обыкновенной, и вообще отличается от голоса остальных голубиных. Это очень грубое, басовитое, далеко слышное воркование - «убу...убу...ту-бу-бу, убу...убу...ту-бу-бу...». Крыло – 170-220, хвост – 130-150, клюв 15-18 мм, вес

Meňzeşlikleri-tapawutlary: daşky sypaty, özüni alyp baryş häsiýeti we uçuş alamatlary boýunça adaty gumra çalymdaş (uzak aralykdan olary tanamak kyn), emma ondan ölçegleriniň uly hem deşlidigi we bedeniniň üstki tarapynyň has garamtyldygy (goňur öwüşginli) bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeleýän bölegi – Günorta Ural, Günorta we Orta Sibir, Uzak Gündogar, Hindihytaýyň günortasyna çenli. Gazagystanyň günorta - gündogar etraplarynda Orta Aziýada ýaýran. Türkmenistanda – höwürtegelände Köýtendagda, uçup geçende giňişleýin – Amyderýanyň jülgesinde we beýleki ýerlerde gabat gelmegi mümkin. Hindistanda we Günorta-Gündogar Aziýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup, geçip gidýän guş. Köýtendagyň arçalyklarynda höwürtegeleýär. Uçup geçende gyrymsy agaçly ýerlerde saklanýar. Höwürtegesi beýleki gumrularyňka garanynda has uly, arça agajynyň şahasynda ösümlikleriň çybyjaklaryndan we baldajyklaryndan gurýar. Maý aýynda 2 sany ak ýa-da çala sarymtyl reňkli yumurtga goýýar, ölçegleri – 22-26 x 32-37 mm. Jüýjeleri uçurym bolandan soň, uly bolmadyk toparda gezýärler. Dürli dänelileriň tohumlary bilen iýmitlenýär. Suwa mätäç, suw içmäge zygyderli gatnaýar.

Statusy: sany az, bizde az öwrenilen guş. Käbir ýerlerde awçylaryň aw guşy hasaplanýar, goraga alynmaga mynasyp görnüş.

199. Musayýja (kiçi) gumry – *Stertopelia senegalensis* – Малая горлица

Meýdan alamatlary: beýleki gumrulardan has maýda. Üstki tarapy go-

– 200-238 g.

Сходства – отличия: по внешнему виду, повадкам и характеру полета похожа на обыкновенную горлицу (на большом расстоянии их часто путают). Отличается от нее несколько большей величиной, массивностью и более темной окраской верха тела (бурый тон).

Распространение: гнездовая часть ареала – Южный Урал, Южная и Средняя Сибирь, Дальний Восток, к югу до Индокитая. Юго-восточные районы Казахстана и Средней Азии. В Туркменистане – на гнездовье в Койтендаге, на пролете шире – по долине Амударьи, возможны встречи и в других местах. Зимует в Индии и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: перелетная птица. Возможно гнездится в арчевниках Койтендага. На пролетах придерживается участков с древесно-кустарниковыми насаждениями. Гнездо более массивное, чем у других горлиц, из веточек и прутьев, помещается на ветвях арчи. Кладка – с мая, состоит из 2-х белых или чуть желтоватых яиц, размеры – 22-26 x 32-37 мм. Вне гнездовое время держится небольшими группами. Питается различными семенами. Нуждается в воде, регулярно летает на водопой.

Статус: немногочисленная, у нас мало изученная птица. В некоторых местах является объектом спортивной охоты, заслуживает охраны.

Полевые признаки: заметно мельче других горлиц. Сверху бу-

ňurrak-açyk mele reňkli, kellesi goňur-gülgüne we ganatlarynyň gyrasy açyk gögümtil, boýnunyň gapdallary alama-gara tegmilleriň gür üşmegi, alkymy we bokurdagy agymtyl, petekesi we döşi goýy gyzylmytyl-gülgüne, garny we guýrugynyň aşagy, köplenç, gülgüne öwüşginli ak. Mäkiýanlary horazlaryna garanynda biraz öçügsi reňkde. Çünki gara, aýaklary açyk gyzyl. Sesi örän özboluşly, "uu" ýa-da huu" bölekleyin gaýtalanýan owaz. Warkyldysy mylaýym we sesli "krul-grul-krul-grul...". Ganaty – 170-220, guýrugy – 130-150, çünki – 15-18 mm, agramy – 200-238 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň kiçidigi we **boýnunyň gapdallarynyň gara-çypar ala tegmillidigi** bilen beýleki gumrylardan, halkaly gumrydan – boýnunda gara ýarymhalkanyň ýokdygy, uly we adaty gumrylardan – üstki tarapyň birmeňzeş reňklidigi (ala däl) bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Afrikanýň, Hindistanyň, Arabystanyň, Alyny, Kiçi we Orta Aziýanyň, Zakawkazýanyň, Günorta Gazagystanyň, Günbatar Hytaýyň hemme ýerlerinde diýen ýaly ýaýran. Türkmenistanda giňişleýin, derýalaryň we daglaryň jülgelerinde, dag eteklerinde we oazislerde mesgen tutýar, uly şäherlerde, obalarda hatda çölde hem ýaşaýar.

Ýaşayşy: oturymly, arealyny giňeldýän sinantrop görnüş. Ilatly nokatlarda ýaşaýar. Aýratyn jübüt bolup höwürtegeleýär. Pezzik, aşagy tekiz höwürtesini açyk eýwanlaryň kese agaçlarynda, jaýlaryň üçeklerinde, şiferleriň aşagynda, dynç alynýan telälerde, ýoluň gyrasynda ösýän agaçlarda, seýilgälerde we beýleki

ро-песчаного цвета с буро-розовой головой и светло-сизым краем крыла, на боках шеи – сгущения черных пестрин; подбородок и горло беловатые, зоб и грудь темно-красно-розовые, брюшко и подхвостье белые, часто с розовым налетом. Самки окрашены несколько тусклее самцов. Клюв черный, ноги малиново-красные. Голос очень своеобразен, это – повторяемый, отрывистый звук «уу» или «хуу». Воркование мягкое и звонкое – «курль-гурль-курль-гурль...». Крыло – 170-220, хвост – 130-150, клюв – 15-18 мм, вес – 200-238 г.

Сходства – отличия: от всех горлиц отличается мелкими размерами и **черно-ржавыми, пестрыми пятнами по бокам шеи**. От кольчатой горлицы – отсутствием черного полукольца на шее, а от большой и обыкновенной горлицы – однотонным (не пестрым) верхом.

Распространение: почти вся Африка, Индия, Аравия, Передняя, Малая и Средняя Азия, Закавказье, Южный Казахстан, Западный Китай. В Туркменистане – повсеместно в речных и горных долинах, предгорьях и оазисах, обитает как в крупных городах, так и небольших селениях, в том числе в пустыне.

Образ жизни: оседлый, синантропный вид, расширяющий свой ареал. Обитатель населенных пунктов. Гнездится отдельными парами. Гнездо – плоская, рыхлая постройка, располагается открыто на верандах, карнизах, под крышами, на беседках, на деревьях вдоль улиц, в парках и садах. В году бывает до 4-5 кладок с февраля по июль, кладка состоит из 2 белых, почти округлых

ýerlede gurýar. Fewral-iyul aralykda 3-4 gezek köpelyär. 2 sany süýri ak ýumurtga goýýar, ölçegleri 19-22 x 25-29 mm. Iki hepdä golaý kürk bolup oturýar, jüýjeleri 15-16 güne ýakyn höwürtegede oturýar. Jüýjeleri uçurym bolandan soň ýene-de ýumurtga goýýar. Iýmit gözleýän guşlar ýol ýakalarynda, bazarlaryň,un harazlaryň, däne ammarlaryň we öý guşlary saklanýan ketekleriň töwreginde görse bolýar. Dürli ösümlikleriň dänelerin we tohumlaryny çokýar (bugdaý, mäs, seýrek bakja ekinleriň tohumlary). Gumrylar adamlaryň hoşniýetli häsiýetleriniň hemaýatyndan peýdalanyp, çörek owuntyklaryny, dürli iýmit galyndylaryny, şaly, bugdaý we beýleki tohumlary çöpleýärler.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde köp sanly we örän ynanjaň guş. Şäherleriň we obalaryň bezegi bolup, olar adamyň goragyndan peýdalanýarlar. Guşlary goşmaça iýmitlendirmek (aýratyn-da, aňzakly gýşlarda) we goraga almak, aýratyn-da, höwürtesini gargalardan goramak zerurdyr.

IKATÝOKŞEKILLILER – CUCULIFORMES – КУКУШКООБРАЗНЫЕ

Iň kiçisi serçe möçberli we iň ulusy garga ýaly, orta ölçegli guşlar maşgalasy. Agaçlaryň üstünde ýada gury ýerde ýaşaýarlar. Bedeniniň gurluşy gelşikli, ganatlary uzyn we uzalan guýrugy tegelenen, çünki sähelçe aşaklygyna egmek. Aýaklary gysga, dört barmakly, onuň ikisi öňe we ikisi yza gönügýär. Reňki köplenç ala-çal ýa-da goňur. Uçuşy köp ugurly. Reňkinde jynsy dimorfizm ýok ýa-da gowşak ösen. Dünýänyň hemme ýerinde ýaýran, aýratyn-da, yssy ýurtlarda has köp. Görnüşleriniň käbirleri aralyk

яиц, размеры – 19-22 x 25-29 мм. Насиживание продолжается около двух недель, птенцы в гнезде остаются около 15-16 дней. После того как птенцы покидают гнездо, самка приступает к новой кладке. В поисках корма этих птиц постоянно можно видеть на улицах, базарах, элеваторах, складах, в местах содержания домашних птиц. Питается различными семенами и зернами – пшеница, маш, режа семена огородных растений. Очень часто пользуется прикормкой, которую устраивают люди – хлебные крошки, различные остатки пищи, рис, пшеница и другие семена.

Статус: обычная, местами многочисленная и доверчивая птица. Как украшение городов и поселков пользуется покровительством человека. Нуждается в подкормке (в необычно морозные зимы) и защите, в частности, от ворон, разоряющих их гнезда.

Отряд птиц средних размеров, наиболее мелкие – с воробья, самые крупные – с ворону. Ведут древесный или наземный образ жизни. Стройное телосложение, длинные крылья и закругленный хвост, удлиненный, слегка загнутый вниз клюв. Ноги короткие, четырехпалые, два из которых направлены вперед, а два – назад. Окраска в основном серая или бурая, с пестринами. Полет маневренный. Половой диморфизм в окраске отсутствует, или развит слабо. Распространены по всему миру, больше всего в жар-

giňişliklerde höwürtegeýär, uçup geçip gidýär, galany oturymly. Olar beýleki guşlaryň höwürtegelerine ýumurtgalaryny basyp oturmak we jüýjelerini iýmitlendirmek üçin goýup, mugthorçylyk edýärler. Emma, amerika uikatýoklary özleri höwürtege gurýarlar we ýumurtgalaryny basyp oturýarlar. Mugthorçylyk edýän ikatýoklaryň ýumurtgalary örän maýda (guşuň agramyndan 3% golaýy) we reňki, adatyça, hojaýunguşlaryň ýumurtgalaryna meňzeş. Ikatýoklaryň görnüşleriniň köpüsi mör-möjekler bilen iýmitlenýärler. Otrýatda 149 görnüş, olardan ikatýoklar maşgalasynyň (*CUCULIDAE*) 5 görnüşü Türkmenistanda.

200. Adaty ikatýok – *Cuculus canorus* – Обыкновенная кукушка

Meýdan alamalary: jok-joky öleşinde, ýöne ulurak görünýär. Guýrugy bolşuna görä uzyn, basgançakly tegelenen. Horazlarynyň we mäkiýanlarynyň reňkindäki tapawut aýdyň görünýär. Horazlarynyň arkasy we guýrugy goýu çal, bokurdagy we döşi açyk çal. **Ýelek örtügininiň** galan ýerleri ak **kese garamtyl-ala zolakly**. Mäkiýanlary horazlaryna çalymdaş, ýöne garyn tarapyňyň alareňki olarda bokurdagyna ýakyn başlanýar. Mäkiýanlarynyň arkasy tutuşlygyna kese garamtyl zolakly çypar reňkli, ol arkasynyň aşaky böleginde we guýrugynyň üstinde bolmaýar, garyn tarapy insiz kese zolakly ak. Gözleriniň, gabaklarynyň gyrasy sary. Çünki garamtylrak, uýy, sähelçe egmek. Aýaklary gysga, mämişi reňkli. Horazy gygyranda guýrugyny galdyryr we ganatlaryny aşak sallaýar. **Sesi – hemmä mälim “kuk-kuk” etme;** horazynyňky – iki goşul-

ких странах. Некоторые виды, гнездящиеся в умеренных широтах, перелетные, остальные оседлы. Паразитируют на других птицах, подкладывая им в гнезда свои яйца для насиживания и выкармливания птенцов. Однако большинство американских кукушек сами строят гнезда и высаживают яйца. Яйца у паразитических кукушек очень мелкие (около 3 % массы самой птицы) и по окраске обычно сходны с яйцами птиц-хозяев. Большинство видов кукушек питается насекомыми. В отряде 149 видов, из которых в Туркменистане – 5 представителей семейства кукушковые (*Cuculidae*).

Полевые признаки: размером с дрозда, но выглядит крупнее. Довольно длинный, закругленный ступенчатый хвост. Разница в окраске самцов и самок выражена хорошо. У самцов спина и хвост темно-серые, горло и грудь светло-серые. Остальная часть **оперения** белая с **темной поперечной полосатостью**. Самки бывают серого, реже рыжего оттенка. Самки похожи на самцов, но пестрины на брюшной стороне у них начинаются ближе к горлу. У рыжих самок вся спина с темными поперечными полосками, которые отсутствуют только на нижней части спины и на верхней хвоста; брюшная сторона белая с узкими поперечными полосками. Глаза, края век желтые. Клюв черноватый, слегка загнутый у конца. Ноги короткие, оранжевого цвета. Самец во время кукования приподнимает хвост и опуска-

madan “kuk-ku” ýa-da üç goşulmadan – “kuk-kuk-ku”. Uzakdan eşidilýär, ýakynyna baranynda gygyrmadan öňürti garyllyk “hha-ha-ha” gykylygy eşitmek mümkin. Mäkiýany sesli gykylyk “ke-ke-ke” bilen jogap gaýtarýar. Üznüksiz gygyrmgy, adatyça, ondan aňry geçmeýär, ýöne arasynda “rekord” goýulanlaryda belli. Şonda olar arakesmesiz 60 gezek gygyrýar. Uzynlygy – 40 çenli, ganaty – 18-25, guýrugy – 18 sm çenli.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: sesi we ganatlaryny örtüji ýelekleriň aladygy bilen ker ikatýokdan tapawutlanýar. Reňki we ölçegleri boýunça, aýratyn-da, uçýan wagty, kiçiräk gyrgyny ýatladýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeýän bölegi giň – tutuş Ýewraziýanyň, tundra zolagyndan we Afrikanyň demirgazyk-günbatar çetinden başga ýerleri. Türkmenistanda uçup geçende hemme ýerlerde, höwürtegelände – jülgelerde we oazislerde duşýar. Afrikada (Sahara çölünden günortada), Günorta we Gündogar Aziýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän we höwürtegeýän guş, agaç we gyrymsy agaçly hem-de gamşylyk meýdanlar-da – derya jülgeleriniň jeňňelliklerin-de, daglyk ýerlerde, oazislerde saklanýar. Apreliň soňunda we maýyň başynda uçup gelýär. Güzüne ir - iýulyň ortasyndan uçup gidýär, esasy bölegi sentýabrda uçup geçýär. Guşlaryň esasy “ku-kuk” edýän möwsümi maýyň ikinji ýarymy, iýulyň başynda gygyrmasyny bes edýär. Maýyň ortasynda ýumurtga goýýar. Adaty ikatýok guşlaryň 150 görnüşiniň höwürtegesine ýumurtga goýýar. Türkmenistan-

ет крылья. **Голос – всем известное кукование;** у самца – двусложное «кук-ку» или трехсложное «кук-кук-ку». Слышно издали, а если подойти поближе, то перед кукованием можно услышать и хриповатое – «хха-ха-ха». Самка отвечает звонким криком «ке-ке-ке». Число непрерывных кукований обычно не превышает десяти, но известны «рекорды» – до 60 раз без перерыва. Длина – до 40, крыло – 18-25, хвост – до 18 см.

Сходства – отличия: от глухой кукушки отличается голосом и полосатыми кроющими перьями крыла. По окраске и размерам несколько напоминает небольшого ястреба, особенно в полете.

Распространение: гнездовой ареал обширен – почти вся Евразия, за исключением тундр, и крайний северо-запад Африки. В Туркменистане – повсеместно на пролете, по долинам и оазисам – на гнездовье. Зимует в Африке (к югу от Сахары), Южной и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: пролетает и размножается, придерживается участков с древесно-кустарниковой и тростниковой растительностью – в тугаях речных долин, в горах, оазисах. Появляются в конце апреля или начале мая. Осенний отлет ранний – уже с середины июля, основной пролет – в сентябре. Разгар кукования – вторая половина мая, в начале июля оно прекращается. Откладка яиц – в середине мая. Известно около 150 видов птиц, в гнезда которых эта кукушка откладывает яйца, в Туркменистане их находили в гнездах скотоцерки,

da onuň şalkyguýruk çürlentginiň, gara jakjakyň, gamyş guşlaryň dürli görnüşleriniň (görnüş-leriň sany köp, 15-20-ä golaý) höwürgelerinde ýumurtgasy tapyldy. Ýumurtgalaryň reňki dürli-dürli, aglabasy “terbiýeçi” guşuň ýumurtgasyna çalymdaş. Mõwsümde mäkiýany her 1-3 günden, 20-a golaý ýumurtga guzlaýar. Olaryň her biriniň agramy 3 g golaý. Açyk ýerdäki höwürtgelere hem ol ýumurtga guzlaýar. Eger-de höwürtgge ýapyk ýerde - agaçlaryň köweklerinde ýerleşýän bolsa, onda ikatýok ýerde guzlap, soňra ýumurtgany çünki bilen tutup, höwürtgä geçirýär. Mäkiýan guş höwürtgä diňe 1 ýumurtga taşlaýar, käte höwürtgede onuň 2 ýumurtgasy duşýar, bu ýene-de bir ikatýoguň ýumurtga goşandygyny aňladýar. Höwürtgede ýumurtgadan ilkinji ikatýogyň jüýjesi çykýar, ol “terbiýeçi” guşuň jüýjesinden tokarrak bolýar. Ikatýoguň jüýjesi 3-4 günüň dowamynda “terbiýeçi” guşuň ýumurtgalaryndan çykan jüýjelerini gysyp çykarýar. Öweý guşlar ikatýok jüýjesini uçurym bolandan soň hem iýmitlendirýärler. Uly ikatýoklar, mör-möjekler, olaryň liçinkalary, gurçuklary, tomzaklar, göniganatlylar, uly siňekler we perdeganatlylar bilen iýmitlenýärler. Höwürtleýän döwründe käte maýda serçeşekilli guşlaryň ýumurtgalaryny, güýzine az mukdarda miweleri çokýar.

Statusy: amatly bolan ýerde adaty guş.

201. Ker ikatýok – *Cuculus saturatus* – Глухая кукушка

Meýdan alamatlary: adaty ikatýoga örän çalymdaş, ýöne sähelçe kiçiräkdigi, **ganatlarynyň eplenýän ýerindäki ap-ak “aýnajygy”**, şeýle-

черного чекана, разных видов камышевок (но число видов больше – около 15-20). Окраска яиц у кукушек разнообразна, их яйца более или менее похожи на яйца птиц-воспитателей. В течение сезона размножения каждая самка сносит около 20 яиц, откладывая их с интервалами в 1-3 дня. Вес яиц – около 3 г. Если гнездо открытое, кукушка откладывает яйцо прямо в него. Когда гнездо скрыто (например, находится в дупле), кукушка откладывает яйцо на землю, а затем в клюве переносит в гнездо. Подбрасывается только 1 яйцо, но иногда в одном гнезде бывает 2 яйца, это значит, что снесены они разными кукушками. Первым в гнезде обычно вылупляется голый кукушонок, который крупнее птенцов хозяев гнезда. В течение 3-4 дней кукушонок вытаскивает из гнезда яйца или птенцов птицы-хозяина. Приемные родители кормят кукушонка и после того, как он оставит гнездо. Взрослые кукушки питаются, в основном, насекомыми и их личинками – различными гусеницами, жуками, прямокрылыми, крупными мухами и перепончатокрылыми. В гнездовое время нередко поедают яйца мелких воробьиных птиц. Осенью – в небольшом количестве ягоды.

Статус: в подходящих местобитаниях обычная птица.

Полевые признаки: очень похожа на обыкновенную, но отличается чуть меньшими размерами **чисто-белым «зеркальцем» у**

de has garamtyl reňki bilen tapawutlanýar. Horazynyň arka tarapy goýy çal, bokurdagy we döşüniň ýokarky bölegi açyk-çal, döşüniň yzky bölegi we garny kese geçýän garamtyl zolakly. Mäkiýanlary horazlaryna meňzeş, ýöne olaryň garyn tarapyndaky ala ýeri edil bokurdagydandan başlanýar, bokurdagynyň gapdallary we depesi çypar menekli bolýar. Mäkiýanlarynyň käbirleriniň arka tarapy köp sanly goýy çypar menekli, bedeniniň aşagynyň hemme ýerleri garamtyl kese zolakly. Mäkiýanynyň sesi adaty ikatýoguň mäkiýanynyňka çalymdaş we horazynyň saýraýşy basyk sesli “du-du-du...du-du...” – hüýpüpigin sesini ýatladýar. Uzynlygy – 30-32, ganaty – 180-220 mm, agramy – 70-145 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ganatynyň üstüniň doýgun goýy-çal öwüşginlidigi, bedeniniň aşak tarapyň has inli zolaklydygy, guýrugynyň aşagynyň sarymtlydygy we ganatlarynyň epilýän ýerinden aşakda apak “aýnajygyň” bardygy bilen adaty ikatýokdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi Gündogar Ýewropadan Uzak Gündogara, günorta tarapa Hindihytaýa çenli. Türkmenistanda wagtal-wagtal Amyderýanyň we Murgabyň jülgelerinde duşýar. Indoneziýada, Täze Gwineýada we Awstraliýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: iýmiti, özüni alyp baryşy we häsiýetleri edil adaty ikatýogyňky ýaly.

Statusy: Türkmenistanda tötänden uçup gelýän ýa-da seýrek uçup geçende duşýan, heniz öwrenilmedik görnüş.

сгиба крыла, а также более темной окраской. У самцов спинная сторона темно-серая, горло и верхняя часть груди светло-серые, задняя часть груди и брюшко с темными поперечными полосками. Самки схожи с самцами, но пестрины на брюшной стороне у них начинаются от самого горла, на боках горла и затылке бывают рыжие пестрины. Некоторые самки имеют многочисленные темно-ржавые пестрины на спине, а весь низ тела в темных поперечных пестринах. Голос самки, которой похож на голос самки обыкновенной кукушки, и песня самца может быть передана как глуховатое, низкое «ду-ду-ду... ду-ду...», напоминающее голос удода. Длина – 30-32, крыло - 180-220 мм, вес – 70-145 г.

Сходства – отличия: от обыкновенной кукушки отличается более насыщенным темно-серым оттенком верха крыла и более широкими полосами на нижней стороне тела, желтоватым подхвостьем, чисто-белым «зеркальцем» ниже сгиба крыла.

Распространение: гнездовая часть ареала – от Восточной Европы до Дальнего Востока, на юг до Индокитая. В Туркменистане может быть нерегулярно в долинах Амударьи и Мургаба. Зимуют в Индонезии, Новой Гвинее и Австралии.

Образ жизни: питание, поведение и повадки как у обыкновенной кукушки.

Статус: в Туркменистане залетный или спорадически пролетный, неизученный вид.

Bellik:

202. Türkmenistanyň günorta çetinde, Guşgy derýasynyň suw basýan ýerlerinde, tötänden uçup gelen (1954 ý.) **hüpükli ikatýok – *Clamator glandarius*** görüldi. Onuň iň ýakyn höwürtegeýän ýeri. Alynky Aziýa. Daşyndan adaty ikatýoga çalymdaş, emma ulurak, ganatlary ak tegmilli we kellesinde häsiýetli hüpügi bolýar, alahkek bilen meňzeşligi bar.

203. Häzirki Türkmenabat şäheriniň töwereginde **kiçi ikatýogyň – *Cuculus poliocephalus*** tötänden uçup gelendigi bellendi (1910 ý.), onuň höwürtegeýän ýakyn ýeri Gimalaý daglary. Beýleki ikatýoklardan ölçeginiň has kiçidigi, guýrugynyň we ganatlarynyň ak tegmilli gara goňurdygy bilen tapawutlanýar.

204. 2013-nji ýylyň maý aýynda **aziýa koel ikatýogyň – *Eudynamis scolopaceus*** Köýtendag jülgesine tötänden uçup geleni bellendi. Ol ölçegleri boýunça adaty ikatýokdan ulurak. Horazlary mahmal ýaly gök-gara ýaşylymtyl öwüşginli. Mäkiýanlarynyň üsti бүрүнчлеş-goňur çyпар (mor) menekli, aşagy goňursak-mele menekli. Bu guş Türkmenistan we Orta Aziýa üçin täze görnüş. Onuň arealy бүтин Indostan subkontinentini öz içine alýar.

BAÝGUŞŞEKILLILER – STRIGIFORMES – СОВООБРАЗНЫЕ

Esasan, gijesine gezyän, maýda ölçeglerden ula çenli bolan ýurtyju guşlar otrýady. Ganatlary inli, tege-len, guýrugy gysga, ýelek örtügi güр, aralary açygrak we ýumşak. Aýaklary, adatça, dyrnaklaryna çen-

Примечание:

202. В 1954 году на юге Туркменистана в пойме р. Кушки отмечен залет **хохлатой кукушки – *Clamator glandarius***. Ближайшие места гнездования вида – Передняя Азия. Эта кукушка похожа на обыкновенную кукушку, но крупнее, и с белыми пестринами на крыле и характерным хохлом на голове. Чем-то схожа с сорокой.

203. В район современного Туркменабада отмечался (1910 г.) залет **малой кукушки – *Cuculus poliocephalus***, ближайские места гнездования которой – Гималаи. От других кукушек заметно отличается малым размерами. Хвост и крылья – черно-бурые с белыми пятнами.

204. В мае 2013 г. в долине Койтendarьи была встречена залетная птица – **азиатский коэль – *Eudynamis scolopaceus***. Это новый для Туркменистана и Средней Азии вид, ареал которого охватывает весь субконтинент Индостана. Размером – крупнее обыкновенной кукушки. Самцы – бархатисто-синечёрные с зеленоватым отливом. Самки сверху бронзово-коричневые с рыжими пестринами, а снизу – беловатые с буровато-коричневыми пятнами.

Отряд хищных птиц от крупных до мелких размеров, ведущие, в основном, ночной образ жизни. Крылья широкие, закругленные, хвост короткий, оперение густое, рыхлое и мягкое. Лапы обычно оперены до

ли ýelek örtükli. Çünki gysga, üstki çünki aşaklygyna ýiti gaňyrçak bolup egrelen, düýbi derijik örtükli. Aýaklary kuwwatly, dyrnaklary ýiti uçly we birden egrelen. Kellesi uly, gözleriniň nazary öne gönügen, maýdajyk ýelejiklerden ýüzi tegelek gabalan. Baýguş şekillileriň köpüsiniň gulagynyň üstünden ýörite ösen ýelek dessejigi (“gulajyk”) ýokaryk çýkýar. Uçuşy köpugrly we sessiz, oňat ösen görüş we eşideş organlaryndan peýdalanyp, gijesine olaryň kömeginde pidasyny gözleýär we yzarlap awlaýar. Giň ýaýran, tundradan tropik tokaýlyklaryna we çöllüklere çenli. Köpüsi oturymly ýaşaýar. Monogam, aýratyn jübüt bolup, köweklerde, jaýryklarda, hinlerde we beýleki buky ýerlerde höwürtegeýärler. Haýwan ýymiti, esasan-da, oňurgaly haýwanlar – syçanşekilli gemrijiler we başgalар bilen ýymitlenýärler. Dünýäde 133 görnüş, Türkmenistanda olaryň bir maşgalasyna degişli häzirki baýguşlardan 9 görnüşi duşýar (*Strigidae*).

205. Sykylykçy hüwüjik – *Otus scops* – Сплюшка

Meýdan alamatlary: tegelek ýüzi doly däl we kiçijek ýelek “gulajykly” maýda hüwüjik. Ýelek örtüginini umumy reňki goňurrak-çal. Arka tarapynyň reňki poslyrak-çaldan tä goňurrak-çyпар reňke çenli. Ganatlary goňur. Guýrugy çalymtyl-goňur. Garyn tarapy ýagty anyk dik menekli. **Aýaklary barmaklaryna çenli ýelek örtükli.** Mäkiýanlary horazlaryndan ulurak. Çünki garamtyl-şah reňkli. Gözleri sary. Sesi mylaýym owazly – “splýu-ýu”, “splýu-ýu”, onuň köp gezek gaýtalanmagy mümkin. Uzynlygy 200-220, ganaty 140-160 mm, agramy 80 g golaý.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **reň-**

когтей. Клюв короткий, надклювье загибается вниз острым крючком, основание его покрыто кожей. Ноги сильные, когти острые и круто загнуты. Голова большая, глаза направлены вперед, как правило, окружены лицевым диском из мелких перышек. У многих сов над ушами специфические торчащие пучки перьев («уши»). Полет маневренный и бесшумный, что помогает выслеживанию добычи, которую птицы отыскивают, пользуясь как зрением, так и хорошо развитым слухом. Распространены широко – от тундр до тропических лесов и пустынь. Большинство оседлые. Моногамы, гнездятся отдельными парами в дуплах, расщелинах, норах и других укромных местах. Питаются животной пищей, в основном, позвоночными животными – мышевидными грызунами и др. В мире 133 вида, из которых в Туркменистане – 9 видов одного семейства – совиные (*Strigidae*).

Полевые признаки: мелкая сова с неполным лицевым диском и маленькими перьевыми «ушками». Общий тон окраски оперения коричневато-серый. Спинная сторона – от ржавчато-серых до буро-рыжих тонов. Крылья бурые. Хвост серовато-бурый. Брюшная сторона светлей, с более четкими продольными пестринами. **Ноги оперены до пальцев.** Самки крупнее самцов. Клюв темно-роговой. Глаза желтые. Голос – мелодичное «сплю-ю», «сплю-ю», которое может повторяться многократно. Длина – 200-220, крыло – 140-160 мм, вес –

kiniň has ýagtydygy we söbüginiň ýelek örtüklidigi (barmaklary ýelek örtüklü däl) bilen melemtil sary hüwüjiden tapawutlanýar.

Ýayran ýerleri: Günorta we Gündogar Ýewropa, Günorta Sibir, Altaý, Orta we Kiçi Aziýa. Orta Aziýanyň gündogar we günortasynda dag etekleri, pes daglyk we daglyk zolaklaryň hemme ýerlerinde ýaşaýar. Türkmenistanda Uly Balkanda, Köpetdagda, Köýtendagda. Afrikanyň tropik zolaklarynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtleýän görnüş. Ýazyna aprelde, güzüne – sentýabrda uçup geçýär. Daglaryň jülgelerinde we beýleki garaňkyrak ýerlerinde höwürtleýär. Ağaçlaryň köweklerinde, seýregräk gaýalaryň tekjelerinde ýumurtga goýýar, şeýle-de alahekegiň köne höwürtlegerini ulanýar. Maý aýunyň soňunda 2-6 sany ak reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 25-28 x 30-33 mm. Gündizine, adatça agajyň sütünine gysylp oturýar we iňrik garalyp, gowy garaňky düşenden soň awa çukýar. Mör-möjekler, syçaňsekilli gemrijiler we maýda guşlar bilen seýregräk iýmitleýär.

Statusy: az göze ilýän görnüş, uçup geçende adaty we höwürtleýänlerinde köp sanly däl.

206. Melemtil sary hüwüjik – Otus brucei – Буланая, или пустынная совка

Meýdan alamatlary: ýelek “gula-jykly” kiçi hüwüjik. Arka tarapy inçejik we insiz menekli sarymtyl-çalymtyl-çäge reňkli. Ganatlary goýugonur. Guýrugy çägereňk-çal. Çünki garamtyl-şah rehкли, üstki çüňküniň ortasy sarymtyl. Gözleri sary. Sesi basyk we sodyrylan - “kuuu”, guş ony uzak gaýtalaýar. Uzynlygy – 200-

около 80 г.

Сходства – отличия: **от буланой совки отличается более яркой окраской и оперенной цевкой (пальцы перьями не прикрыты).**

Распространение: Южная и Восточная Европа, Южная Сибирь, Алтай, Средняя и Малая Азия. В Средней Азии обитает на востоке и юге – по всему поясу предгорий, низкогорий и гор. В Туркменистане – Большие Балханы, Копетдаг, Койтендаг. Зимует в тропических областях Африки.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся вид. Весенний пролет – в апреле, осенний – в сентябре. Гнездится в горах по ущельям и другим затененным местам. Яйца откладывает в дуплах деревьев, реже в нишах по обрывам, использует также старые сорочьи гнезда. Кладка из 2-6 белых яиц, в конце мая, размеры – 25-28 x 30-33 мм. Охотится после наступления темноты. Днем обычно сидит, прижавшись у ствола дерева. Питается насекомыми, реже ловит мышевидных грызунов и мелких птиц.

Статус: малозаметный вид, обычный на пролете и немногочисленный на гнездовье.

Полевые признаки: мелкая сова с перьевыми “ушками”. Спинная сторона желтовато-серовато-песочная с тонким крапом и узкими пестринами. Крылья темно-бурые. Хвост песочно-серого цвета. Клюв темно-роговой с желтоватой серединой надклювья. Глаза желтые. Голос – глухое и протяжное

220, ganaty – 150-170 mm, agramy – 100 g golaý.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **reňkiniň solgundygy we söbüginiň ýelek örtüklidigi (barmaklarynyň düybüni hem ýelekler ýarýar) bilen sykylykçy hüwüjiden tapawutlanýar.**

Ýayran ýerleri: höwürtleýän ýerleri Arabystany, Ýakyn Gündogary, Alyňky we Orta Aziýany öz içine alýar. Orta Aziýada-günorta Aral deňzinden guňdoraga Fergana jülgesine çenli. Türkmenistanda–Amyderýanyň, Murgar, Tejen derýalarynyň jülgelerinde we Köpetdagyň eteginiň käbir ýerlerinde. Arealynda höwürtleýän ýerleriniň günorta böleginde we Demirgazyk Hindistanda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtleýän guş. Ýazyna martyň soňunda we aprelde uçup gelýär, sentýabryň başynda uçup gidýär. Derýalaryň jülgelerinde (jeňnellikde) we oazislerde mesgen tutýar. Adatça, köweklerde höwürtleýär, alahekegiň köne höwürtlegerinden ýygy-ýygudan peýdalanýar. Aprel-maýda 4-6 sany ak reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri 25.5-29.5 x 26-34 mm. Gijesine gezyän guş. Pidasyny uçup barýarka ýerden ýa-da şahalaryň üstünde tutýar. Mör-möjekler, syçaňsekilli gemrijiler we maýda guşlar bilen iýmitleýär.

Statusy: az göze ilýän, seýrek görnüs.

207. Hüwi – Bubo bubo – Филин

Meýdan alamatlary: **“gulaklary” oňat ösen örän uly hüwi.** Arka tarapyň umumy reňki ala. Reňki has garadan açyk reňke çenli üýtgeýär,

«кууух-кух», которое птица повторяет долго. Длина – 200-220, крыло – 150-170 мм, вес – около 100 г.

Сходства – отличия: **от сплюшки отличается блеклой окраской и оперением цевки (оперением прикрыты и основания пальцев).**

Распространение: область гнездования охватывает Аравию, Ближний Восток, Переднюю и Среднюю Азию. В Средней Азии – к югу от Аральского моря на восток до Ферганской долины. В Туркменистане – в долинах Амударьи, Мургаба, Теджена и местами в предгорьях Копетдага. Зимует в южных частях гнездовой области своего ареала и в Северном Индостане.

Образ жизни: прилетная, гнездящаяся птица. Весенний прилет – в конце марта и апреле, отлет – в начале сентября. Населяет долины рек (в тугаях) и оазисы. Гнезда обычно в дуплах, часто использует старые гнезда сорок. Кладка из 4-6 белых яиц, в апреле-мае, размеры – 25.5-29.5 x 26-34 мм. Ночная птица. Добычу ловит в полете на земле или на ветвях. Питается насекомыми, мышевидными грызунами и мелкими птицами.

Статус: малозаметный, редкий вид.

Полевые признаки: **очень крупная сова с хорошо развитыми «ушами».** Общая окраска спинной стороны пестрая. Окра-

aýratyn-da, garyn tarapy sarymtyl-ak diýen ýaly. Bówürleri we garnynynda insiz dikligine geçen garamtyl reňkli menekler bolýar. Aýaklary dyrnaklaryna çenli ýelek örtükli. Gözi gyzylmtyl-mämişi reňkli. Horazlary, mäkiýanlary we ýaş guşlar birmeňzeş reňkli. Sesi sogdurylan “u-huu-t”. Uzynlygy - 620-720, ganaty – 410-550 mm, agramy - 2.1-3.2 kg.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçe-giniň örän uludygy we anyk görünüň “gulagy” bilen beýleki hüwilerden tapawutlanýar.

Ýayran ýerleri: Ýewraziýanyň, demirgazyk we günorta çäklerinden galan ýerlerinde, Demirgazyk-Günbatar Afrika. Orta Aziýada we Türkmenistanda hemme ýerlerde duşýar.

Ýaşayşy: oturmly görünüş. Dürli landşaftlarda mekan tutýar, oňa hemme ýerde duşmak mümkin, emma adamsyz ýerleri saýlap alýar. Gaýalaryň eginlerinde, jarlarda, harabaçylyklarda, gum gaýalaynyň aşagynda höwürtegeleýär. Höwürtegesi kiçiräk çukurlyk, seýrek ýyrtyjy guşlaryň höwürtegesini peýdalanýar. Aprelde 2-3 sany ak reňkli ýumurtgaly guzlaýar, ölçegleri 46-49 x 54-59 mm. Pidasyny uçup barýarka synlaýar ýa-da buky ýerde amatly wagt bolýança garawullap oturýar. Dürli haýwanlar bilen ýymitlenýär (towşanlar, kirpiler, ördekliler, syçanşekilli gemrijiler, maýda serçeşekilli guşlar).

Statusy: az sanly, endigan däl ýaýrawda duşýan guş, goraga alynmagy zerur.

208. Ak hüwi – *Bubo scandiaca* – Белая сова

Meýdan alamatlary: örän uly hüwi. **Ýelek örtügi ak**, horazynyň kellesi, mäkiýanlarynyň bolsa, arkasy

ска варьирует от очень темной до светлой, почти сливочно-белой, особенно на брюшной стороне. На боках и брюхе тонкие продольные пестрины темного цвета. Лапы оперены до когтей. Глаза красновато-оранжевые. Самцы, самки, молодые окрашены одинаково. Полет медленный, бесшумный, обычно низко над землей. Голос – протяжное «у-хуу-ть». Длина – 620-720, крыло – 410-550 мм, вес 2.1-3.2 кг.

Сходства – отличия: от других сов отличается очень крупными размерами и хорошо заметными «ушами».

Распространение: Евразия, за исключением северных и южных областей, Северо-Западная Африка. В Средней Азии и Туркменистане – повсеместно.

Образ жизни: оседлый вид. Обитатель различных ландшафтов, его можно встретить повсюду, однако, селится в безлюдных местах. Гнездится в нишах скал, оврагах, развалинах, под обрывами. Гнездо – небольшая ямка, реже используются гнезда хищных птиц. Кладка в апреле из 2-3 белых яиц, размеры – 46-49 x 54-59 мм. Добычу высматривает в полете или подстерегает, сидя в укромных местах. Питается различными животными – зайцы, ежи, утки, мышевидные грызуны, мелкие воробьиные птицы.

Статус: немногочисленный вид с неравномерным распространением, нуждается в охране.

Полевые признаки: очень крупная сова. **Оперение белое**, у самца с редкими темными пестри-

we garyn tarapy seýrek garamtyl menekli. Ýaş guşlaryň diňe yüz tegelegi ak. **Aýaklary doly ýelek örtükli, dyrnagy gara reňkli.** Gözi ýagty-sary. “Gulagy” ösmedik.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: reňkiniň akdygy bilen beýleki hüwülerden oňat tapawutlanýar.

Ýayran ýerleri: Ýewraziýanyň we Amerikanyň demirgazyk çetleri. Türkmenistanda gýşyna dürli ýerlerde, köplenç düzlük giňişliklerde gabat gelyär.

Ýaşayşy: tundrada ýaşaýar, oturmly, bölekleyin göçüp-göňýän görünüş, gýş döwründe hüwüler iýmit gözleginde günorta tarap, sähralyga, hatda çöllük zolaga çenli göçüp-gonýar. Gemrijiler we guşlar bilen iýmitlenýär.

Statusy: tötänden uçup gelyän seýrek guş, bizde diňe gýşyna, onda adatdan daşary sowuk gýşlarda gabat gelyär.

209. Baýguş – *Athene noctua* – Домовый сыч

Meýdan alamatlary: sardan sähelçe ulurak, uly bolmadyk ölçegdäki baýguş. Arka tarapy açyk goňur ýa-da çäge reňkli, has uly bolmadyk togalak kellesi **ýagty dik menekli**, egnindäki ýeleklerde şöhlelenýän ak tegmiller tegelenip görünýär. Garyn tarapy dik geçen nagyşly goňur ak. **Ýüz tegelegi doly däl aşaky bölegi boýunyň ýelekleri bilen goşulýar.** Ganatlary çalymtyl uçly goňur. Guýrugy hem goňur bolup, sarymtyl-agymtyl zolakly. Çünki sary, dyrnaklary gara. Ýaş guşlar ulularyna çalymdaş, ýöne goňur reňk çalymtyl öwüşginli. Howp abananda birnäçe üýtgeме hereketlerini edýär – aýaklaryny uzadýan ýaly

нами на голове, у самок на спине и брюшной стороне. У молодых птиц белый только лицевой диск. **Лапы оперены полностью, когти черного цвета.** Глаза ярко-желтые. «Уши» не развиты.

Сходства – отличия: от других сов хорошо отличается белой окраской.

Распространение: крайний север Евразии и Америки. В Туркменистане может быть встречена зимой в разных местах, преимущественно на равнинах.

Образ жизни: обитатель тундры, оседлый, частично кочующий вид, в зимнее время в поисках кормов эти совы совершают кочевки на юг, порой до зоны степей и даже пустынь. Питаются грызунами и птицами.

Статус: редкая залетная птица, которая у нас может появляться только зимой, особенно в необычно холодные годы.

Полевые признаки: сова небольшого размера, чуть крупнее скворца. Спинная сторона светло-бурая или песочная, на относительно небольшой, круглой голове – **светлые продольные пестрины**, на плечевых перьях просвечивают округлые белые пятна. Брюшная сторона белая с бурым продольным рисунком. **Лицевой диск неполный – нижняя часть сливается с оперением шеи.** Крылья бурые с сероватыми концами. Хвост тоже бурый с рыжеватобеловатыми полосками. Клюв желтый, когти черные. Молодые очень похожи на взрослых, но бурый цвет

görnüşde göwresini galdyryp, ýene-de oturýar, şondan soň ol uçup gidýär. Uçuşy tolkunşekilli, çalt. Sesi, adatyça “kuu-it, kuu-it, kuu-it” ýiti. Uzynlygy – 230-280, ganaty – 149-180 mm, ag-ramy – 160-180 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: öz ölçegindäki baýguşlardan barmaklarynyň ýelek örtüklidigi we “gulaklarynyň” ýokdygy bilen tapawutlanýar.

Ýayran ýerleri: Orta we Günorta Ýewropa, Demirgazyk Afrika, Alynyk we Orta Aziýa, gündogara Hytaýa, Koreýa çenli. Orta Aziýada we Türkmenistanda hemme ýerlerde, daglarda 2-2,5 müň m ýokary bolmadyk ýerlerde mekan tutýar.

Ýaşayşy: oturmly guş. Dürli landşaftlarda ýaşayar. Köplenç açyk ýerleri eýeleýär, ýygy-ýygydan oazislerde duşýar. Gum gaýalaryndaky hinlerde, gowaklarda, dag gaýalarynyň köweklerinde, gurlup taşlanan ýa-da bozulyp üçegi alynmadyk jaýlarda höwürtegeleýär. Gum gaýalarynda guşlaryň özleri hem hin gazynmaga ukyplydyr. Martyň soňunda – aprelda 4-8 sany ak reňkli ýumurtga guzlaýar, ölçegleri - 26-30 x 31-36 mm. Apreliň ahyrynda-maýda jüýjeleri çykýar. Maýda gemrijiler, guşlar (serçeler, torgaýlar) bilen iýmitlenýär, şeýle-de suwulganlary we mör-möjekleri tutýar. Diňe bir alagaraňkyda däl, eýsem, gündizine hem aw edýär. Telegraf sütünlerinde we beýik tümmekleriň üstünde ýygy-ýygydan dynç alýar, şonuň üçin ol beýleki baýguşlara görä köp görünýär.

Statusy: adaty görünüş. Gemrijileri köp awlaýan guş hökmünde goralmaga mynasyr. Baýguş adamlaryň ýaşayan ýerlerinde duşup, betbagytlyk

с сероватым оттенком. При опасности может сделать несколько резких движений, как бы вытянуться на ногах и тут же присесть, после чего улетает. Полет быстрый волнообразный. Голос – обычно резкое «куу-ить, куу-ить, куу-ить». Длина – 230-280, крыло – 149-180 мм, вес – 160-180 г.

Сходства – отличия: от других сов своего размера отличается оперенными пальцами и отсутствием «ушей».

Распространение: Средняя и Южная Европа, Северная Африка, Передняя и Средняя Азия, на восток – до Китая, Кореи. В Средней Азии и Туркменистане обитает повсеместно, в горах не выше 2-2.5 тыс. м.

Образ жизни: оседлая птица. Обитатель различных ландшафтов. Населяет, преимущественно, открытую местность, часто встречается в оазисах. Гнездится в норах и пещерах, расположенных в обрывах, в промоинах и скалах, в заброшенных или разрушенных зданиях, на чердаках. Способен сам делать норы в глинистых обрывах. Кладка из 4-8 белых яиц в конце марта – апреле. Размеры яиц – 26-30 x 31-36 мм. Птенцы – в конце апреля и в мае. Питается мелкими грызунами, птицами (воробьи, жаворонки), ловит также ящериц и насекомых. Охотится не только в сумерках, но иногда днем. Часто отдыхает на телеграфных столбах и возвышенных местах, поэтому, по сравнению с другими совами более заметен.

Статус: обычный вид. Как птица, истребляющая грызунов, заслуживает охраны. Поверье, что она при-

getirýär diýen urymlar esassyzdyr.

носит несчастье, поселяясь рядом с человеком, лишено оснований.

210. Çalymtyl hüwi – *Strix aluco (nivicola)* – Серая неясыть

Meýdan alamatlary: orta ölçegdäki, gysga guýrukly hüwi (gardadan ulurak). **Kellesi uly, “gulagy” ýok.** Ýokarsy kese garamtyl-goňur, ala nagyşlanan we gowşak çypar öwüşginli ýelek örtügi agymtyl. Aşagynyň ýelek örtügi edil şonuň ýaly reňkli, ýöne tolkunşekilli görünüşde we kese geçýän zolaklary köp; çypar ýokundylary has aýdyň görünýär. Aşaky tarapy tutuşlygyna agymtyl öwürsýär. Aýaklarynyň ýelek örtügi kese açyk-agymtyl zolakly. Guýrugy goňur bolup, çypar, agymtyl-çal we garamtyl-goňur kese zolakly we tegmilli. Mäkiýany horazyndan ulurak. Çünki gögümtil-şah sypatly bolup, gapdaly we depesi sary, dyrnagy şah reňkli. **Gözleri gara.** Sesi “kuwii-kuwii-kuwii”. Ganaty – 294-332 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: otalgaly we batga hüwülerden “gulagynyň” ýokdygy, **çünküniň sary we gözleriniň garadygy** bilen tapawutlanýar.

Ýayran ýerleri: Ýewropa, Afrika-nyň demirgazyk-günbatar bölegi, Aziýada gündogara Gündogar Hytaýa we Koreýa çenli. Orta Aziýada daglyklarda gabat gelyär, Türkmenistanda Günbatar Köpetdagda we Köýtendagda duşýar.

Ýaşayşy: oturmly görünüş. Onuň halaýan ýeri dag jülgeleriniň uçut gaýaly we gür ösen agaçdyr, gyrymsy agaç ösümlikli ýerler. Gijesine geçýän guş. Agaçlaryň köweklerinde höwürtegeleýär. Aprelda 2-6 sany togalak ak reňkli ýumurtga goýýar, ölçegleri - 36-39 x 45-50 mm. Bir hö-

Полевые признаки: сова средних размеров (крупнее вороны), с коротким хвостом. **Голова большая, без «ушей».** Сверху оперение беловатое с темно-бурым поперечным и пятнистым рисунком и с легким рыжим оттенком. Снизу оперение имеет примерно такой же, но волнистый рисунок и большое число поперечных полосок; рыжеватый налет выражен сильнее. Весь низ выглядит беловатым. Оперение ног – с бледно-беловатыми поперечными полосками. Хвост бурый с рыжими, беловато-серыми и черно-бурыми поперечными полосками и пятнами. Самка крупнее самца. Клюв синевато-роговой с желтым ребром и вершиной, когти рогового цвета. **Глаза черные.** Голос – «кувии-кувии-кувии». Крыло – 294-332 мм.

Сходства – отличия: от ушастой и болотной сов отличается отсутствием «ушей», **желтым клювом и черными глазами.**

Распространение: Европа, северо-западная часть Африки, в Азии на восток – до Восточного Китая и Кореи. В Средней Азии встречается в горных районах, в Туркменистане – в Западном Копетдаге и Койтендаге.

Образ жизни: оседлый вид. Места обитания – заросшие горные ущелья с крутыми склонами и древесно-кустарниковой растительностью. Ночная птица. Гнездится в дуплах деревьев. Откладка яиц – в апреле. В кладке 2-6 круглых белых

würtgede jüýjeleriň dürli ýaşda bolmagy mümkin. Syçanşekilli gemrijiler bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, bizde gowşak öwrenilen görnüş.

211. Bellik. Türkmenistanyň günorta-günbatar çetinde, Esengulyda (1942 ý.) we Merkezi Köpetdagda (1983 ý.) boguk hüwiler *Tytonidae* maşgalasyndan **boguk hüwiniň – Tyto alba** tötänden uçup gelendigi bellendi. Bu görnüşüň iň ýakyn ýaşaýan we höwürtegeleýän ýeri Mesopotamiýa. Onuň ýürekşekilli süýnmek ýüz tegeleginiň gözine ýakyn ýerleriň poslurak-goňur reňklidigi we gyralarynyň ýylmanak-akdygy, aýaklarynyň uzyndygy, şeýle-de gulak ýaly uzalan ýelekleriniň ýokdygy bilen beýleki hüwürlerden tapawutlanýar.

212. Otagaly hüwi – *Asio otus* – Ушастая сова

Meýdan alamatlary: orta ölçeglerdäki hüwi. **Gulak ýelekleriniň des-sejiginiň uzyndygy** oňat görünýär. Ýelek örtügi çypar we goňur reňkli ala. Ýüz tegelegi çalymtyl. **Çüňküniň töweregi ýarymhalka görnüşde. Gözüniň üsti gara tegmilli.** Ganatlary köpsanly garamtyl-çal menekli. Aşagy dik uly menekli çypar reňkli. Çüňki we dyrnaklary gara. Ýaş guşlaryňky garamtylrak reňkli. Sesi «hu-huu» basyk ýa-da «u-u-u» gaýgyly we beýleki sesler. Uzynlygy – 350-390, ganaty – 270-300 mm, agramy – 240-330 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: gulaklarynyň uzyndygy we böwürleriň insiz kese nagyşydygy bilen batga hüwüsinden tapawutlanýar.

Ýayran ýerleri: Ýewraziýa demir-

яиц, размеры – 36-39 x 45-50 мм. Птенцы из одного гнезда бывают разного возраста. Питается мышевидными грызунами.

Статус: немногочисленный, плохо изученный у нас вид.

211. Примечание. На крайнем юго-западе Туркменистана, у Эсенгулы (1942 г.) и в Центральном Копетдаге (1983 г.) были отмечены залеты **сипухи – Tyto alba** – представителя семейства сипуховых *Tytonidae*. Ближайшее место обитания и гнездования данного вида – Месопотамия. Эта птица отличается от других сов своим вытянутым сердцевидным лицевым диском ржаво-коричневого цвета у глаз и атласно-белым по краю, длинными лапами, а также отсутствием удлинённых ушных перьев.

Полевые признаки: сова средних размеров. Хорошо заметны **длинные ушные пучки перьев.** Оперение пестрое с рыжими и бурыми тонами. Лицевой диск сероватый. **У клюва белое полукольцо. Над глазами черные пятна.** Крылья с многочисленными темно-серыми пестринами. Низ ржавчатого цвета с крупными продольными пестринами. Клюв и когти черные. У молодой птицы верх тела окрашен темнее. Голос – глухое «ху-хуу» или жалобное «у-у-у» и другие звуки. Длина – 350-390, крыло – 270-300 мм, вес – 240-330 г.

Сходства – отличия: от болотной совы отличается длинными «ушами».

Распространение: Евразия, к

gazyga tokaý zolagynyň aňryçägine çenli, gündogara Ýaponiýa, günorta – Alynky, Orta we Merkezi Aziýa çenli, Gimalaý daglary, Demirgazyk we Günbatar Afrika, Demirgazyk Amerika. Türkmenistanda derýalaryň jülgelerinde, oazislere we dagetek giňişliklerinde duşýar, uçup geçende giň ýaýran. Beýan edilen arealynyň günorta böleklerinde gyşlaýar.

Ýaşaýşy: höwürtegeleýär, uçup geçýär we gyşlaýar. Ýazyna mart-aprelde, güýzine – oktýabr-noýabrda uçup geçýär. Gargalaryň, gündizki ýyrtyjy guşlaryň köne höwürtegelerinde, seýrek agaçlaryň köweklerinde höwürtegeleýär. Aprelde 5-6 sany ak reňkli ýumurtga guzlaýar. Güýzüne ýygy-ýygydan 15-20 we ondan-da köp bolup, toparlara ýygnanýarlar. Gije gezyň guş. Syçanşekilli gemrijiler, seýrek guşlar bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, ýetýerlik öwrenilmedik görnüş.

213. Batga hüwüsi – *Asio flammeus* – Болотная сова

Meýdan alamatlary: orta ululykdaky hüwi. Sarymtyl reňki jynsyna, ýaşyna we möwsümine baglylykda üýtgeýär. Arkasyndaky ýelekleri agymtyl ýa-da çypparrak jähekli. Garyn tarapy açyk reňkli bolup, garamtyl sütünşekilli menekli. **Gözüniň töweregi garamtyl halkaly. “Gulagy” çala görünýär.** Çüňki we dyrnaklary gara. Uçanynda **ganatlarynyň epinlerinde garamtyl menekler oňat saýgardýar.** Äwmän uçýar. Uzynlygy – 340-423, ganaty – 281-335 mm, agramy – 320-430 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: “gulaklarynyň” gysgadygy we böwürlerinde kese çyzyklaryň ýokdygy bilen otagaly hüwürden tapawutlanýar.

северу до пределов лесной зоны, на восток до Японии, к югу – Передняя, Средняя и Центральная Азия, Гималаи, Северная и Западная Африка, Северная Америка. В Туркменистане встречается по долинам рек, в оазисах, и предгорьях, на пролете шире. Зимует в южных частях описанного ареала.

Образ жизни: гнездится, пролетает и зимует. Весенний пролет – в марте-апреле, осенний – в октябре-ноябре. Гнездится в старых гнездах других птиц – врановых, дневных хищников, реже в дуплах деревьев. Кладка с конца апреля, из 5-6 яиц белого цвета. Осенью часто собираются в группы по 15-20 и более особей. Ночная птица. Питается мышевидными грызунами, реже птицами.

Статус: немногочисленный, недостаточно изученный вид.

Полевые признаки: сова средних размеров. Желтоватая окраска изменчива в зависимости от пола, возраста и сезона. Перья на спине бурые с беловатыми или рыжеватыми каемками. Брюшная сторона светлая с темными стержневыми пестринами. **Вокруг глаз темные кольца. «Уши» едва заметны.** Клюв и когти черные. В полете **на сгибе крыла хорошо заметны темные пятна.** Полет неторопливый. Длина – 340-423, крыло – 281-335 мм, вес – 320-430 г.

Сходства-отличия: от ушастой совы отличается короткими «ушами» и отсутствием поперечной штриховки на боках.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeýän bölegi – Ýewraziýanyň hemme ýerleri we Demirgazyk Amerika, Günorta Afrika, Günorta Amerikanyň käbir ýerleri. Günorta Yewropada, Alynky, Orta we Günorta-Gündogar Aziýada, Afrikada guşlaýar. Orta Aziýada we Türkmenistanda dürli landşaftlarda duşýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän we guşlaýan görnüş. Açyk landşaftlarda – otluk çemenliklerde, kölleriň kenarýakalarynda, oazislerde ýaşaýar. Ýazyna martdan apreliň başyna çenli, güýzüne – oktyabrda uçup geçýär. Gündizine aw edýär. Gemrijiler, käte maýda guşlary awlap iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde adaty guş, emma ýaýraýşy endigan däl.

GÜNDIZKÖRŞEKILLILER – CAPRIMULGIFORMES – КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ

Ganatlary we guýrugy uzyn, ýumşak we gowşak, ýelek örtügi gözilginç bolmadyk penalaýjy reňke boýalan maýda we orta ululykdaky guşlar otrýady. Kellesi uly, boýny gysga, aşaklygyna sähelçe egmek kiçijek çüňkli, emma agyz kesimi örän uly we erniniň gyralary gylşekilli ýelejikler we gatan gyljagazlar bilen parawuzlanan. Agyz kesiminiň giň bolmagy, howada uçup barýarka pidasyny awlamagy bilen bagly. Gözleri alagaraňkyda we gijesine uçup aw edýändigini sebäpli, beýleki guşlaryňka görä has uly we öňe tarap seredýär. Aýaklary gysga, barmaklary gowşak. Olaryň ýelek örtügininiň ýumşak bolmagy baýguşlara çalyň edýär. Giň ýaýran, olar ýer togalagynyň hemme ýerlerinde gabat gelýärler, diňe polýar sebitlerinde duşmaýar. Gündizkörler monogam. Özleri hususy höwürtege

Распространение: гнездовая часть ареала – почти вся Евразия и Северная Америка, Южная Африка, местами в Южной Америке. Зимует в Южной Европе, Передней, Средней и Юго-Восточной Азии, Африке. В Средней Азии и Туркменистане встречается в различных ландшафтах.

Образ жизни: пролетный и зимующий вид. Населяет открытые ландшафты – пойменные луга, побережья озер, оазисы. Весенний пролет – в марте и до начала апреля, осенний – в октябре. Охотится в дневное время. Питается грызунами, иногда ловит мелких птиц.

Статус: немногочисленная, местами обычная птица, но распространена неравномерно.

Отряд мелких и средних по величине птиц с длинными крыльями и хвостом, мягким, рыхлым, неброским – покровительственно окрашенным оперением. Большая голова, короткая шея, клюв маленький, слегка загнутый вниз, но разрез рта очень большой и обрамлен длинными волосовидными перьями и щетинками. Наличие широкого разреза рта связано с добыванием пищи на лету, в воздухе. Глаза довольно крупные в связи с сумеречным и ночным образом жизни, они больше, чем у других птиц, направлены вперед. Ноги короткие, пальцы слабые. Наличием рыхлого оперения несколько напоминают сов. Распространены широко, они встречаются во всех странах света, в полярных районах отсутствуют. Козодои – моногамные птицы. На-

гурмаýarlar. Köweklerde, köplenç açyk ýerdäki çukurlarda ýumurtga guzlaýarlar. Jüýjeleriniň ösüşini etene we enesiniň yzyna eýerýän, jüýje tipli guşlaryň aralygynda bolýar, ýagny ýumurtgadan jüýjeleri gözleri açyk çykýar we görnüşleriniň köpüsiniň jüýjeleriniň daşy gür gysgajyk sütük ýelekler bilen örtülen bolýar. Jüýjeleri iýmiti kabul edende, uly guşlaryň çüňkini daşyndan öz çüňki bilen gabap alýar. Ganatlaryna galyp, uçurym bolýança olary ene-atalary iýmitlendirýärler. Bizde duşýan görnüşler guşlamaga günorta tarap uçup gidýärler. Iýmiti mör-möjekler, olary howada uçup barýarkalar tutýar. Otrýad 5 maşgalada 93 görnüşijemleýär, Türkmenistanda olaryň 2 wekili gündizkörler maşgalasyndan (*Caprimulgidae*).

214. Adaty gündizkör – *Caprimulgus europaeus* – Обыкновенный козодой

Meýdan alamatlary: ölçegleri kepderiden maýda. Arka tarapy has garamtyl menekli - goňurrak-çal we garamtyl dikligine geçýän zolakly, şeýle-de köpräk ýa-da azyrak çypar öwüşginli. Garyn tarapy sarymtly-gyzgylt-goňur bolup, garamtylrak-goňur kese geçýän inçejik zolakly. **Bokurdagynyň gapdallary ak tegmilli. Horazlarynyň ganatlarynyň ujunyň üstünde hem ak tegmiller, sönuň ýaly ak tegmiller uzyn guýrugynyň gapdallarynda-da bolýar.** Mäkiýanlary horazlaryndan biraz maýda. Iňrik - gije guşlary, gündizine (ýerde ýa-da agaçlaryň şahalarynda) galman oturýar, iňrik garalandan sessiz howada ýa-da suwuň üstünden uçýarlar. Tekiz uçmaýar, ýygy-ýygydan ugryny birden

стоящих гнезд не делают. Яйца откладывают в дуплах, чаще открыто – в ямку на земле. Развитие птенцов – по промежуточному между птенцовым и выводковым типам, т.е. птенцы вылупляются зрячими и у большинства видов бывают покрытыми густым коротким пухом. Птенцы получают корм от родителей, охватывая своим клювом клюв взрослой птицы. Родители выкармливают их, пока они не становятся способными к полету. На зиму наши виды отлетают на юг. Пища – насекомые, которых они ловят на лету. Отряд включает 5 семейств, объединяющих 93 вида, из которых в Туркменистане – 2 представителя из семейства козодоевые (*Caprimulgidae*).

Полевые признаки: размеры мельче голубя. Спинная сторона буровато-сероватая с более темными пестринами и с черноватыми продольными полосами, а также с более или менее развитым рыжеватым оттенком. Брюшная сторона рыжеватобуроватая с черноватобурными поперечными тонкими полосками. **На горле по бокам белые пятнышки. У самцов на концах крыльев сверху также белые пятна, как и по краям относительно длинного хвоста.** Самки несколько меньше самцов. Сумеречно-ночная птица, днем отсиживается (на земле или ветке дерева), в сумерках бесшумно летает над открытыми участками или над водой. Полет неровный, с частыми крутыми по-

üýtgedip, wagtal-wagtal pert “kru-uwp” edip ganatlaryny kakýarlar. Horazlarynyň sesi – dowamly “trrrrr-trrrrr-trrrrr-trrrrr...” owazy motorjygyň ses kakuwyna çalymdaş. Bu ses owazyny horazy şahada, keseligine däl-de uzaboýuna oturanda saýraýar. Uçan mahaly “tak-tak” kesgitli gykylyk çykarmagy mümkin. Uzynlygy – 260-280, ganaty – 173-200, ganatlarynyň gerimi – 550-600 mm, agramy – 60-105 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: garamtyl reňki bilen melemtil gündizkörden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealalynda höwürtegeleýän bölegi Ýewropanyň, demirgazyk çäklerinden başga ýerlerinde, Afrikanyň demirgazyk - günbatar çetleri, Kiçi, Alynky we Orta Aziýa, Gazagystan we Günorta Sibir, Merkezi Aziýadan günorta Gimalaý daglarynyň eteklerine çenli. Türkmenistanda uçup geçende hemme ýerlerde duşýar, derýalaryň we daglaryň jülgelerinde, eteklerinde we oazislarda höwürtegeleýär. Afrikada (Sahara çölünden günortada), Alynky Aziýada we Hindistanyň demirgazyk-günbatarynda gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup gelyär we höwürtegeleýär. Dagda - ýokarky kemerlerine çenli, düzlük giňişliklerde, aýratyn-da, oazislarda duşýar; çöllük meýdana az aralaşýar. Ýazyna apreliň ortasynda uçup gelyär. Güýzüne – awgustyň soňunda we sentýabrda uçup geçýär. Apreliň soňunda we maýda höwürtegeleýär, 2 sany çalymtyl düşekli çyrşak garamtyl menekli ýumurtga goýýar. Howada gaýýan dürli mörmöjekler, esasan, tomzaklar, kebelekler we sarygarynjalar (termitler) bilen iýmitlenýär

воротами. Временами издает – резкое «круувыв», сопровождаемое хлопанием крыльев. Песня самца – продолжительная трель «trrrrrrr-trrrrrrr-trrrrrrr...», похожая на ровный стук моторчика. Эту «песню» самец исполняет сидя на ветке, но не поперек, а вдоль нее. При взлете может издать резкий крик – «так-так». Длина – 260-280, крыло – 173-200, размах крыльев – 550-600 мм, вес – 60-105 г.

Сходства – отличия: от буланого козодоя отличается темной окраской.

Распространение: гнездовая часть ареала – Европа, кроме северных областей, крайний северо-запад Африки, Малая, Передняя и Средняя Азия, Казахстан и Южная Сибирь, Центральная Азия на юг до предгорий Гималаев. В Туркменистане повсеместно на пролете, на гнездовье по речным и горным долинам, предгорьям и оазисам. Зимовки – в Африке (южнее Сахары), Передней Азии и на северо-западе Индостана.

Образ жизни: пролетает и гнездится. В горах – до верхнего пояса, не избегает равнин, в особенности оазисов, в меньшей степени – в пустыне. Весной прилетают в середине апреля. Осенний пролет – в конце августа и в сентябре. Гнезда – в конце апреля и в мае. В кладке 2 яйца с размытыми темными пятнами на сером фоне. Питаются различными насекомыми, которых ловят на лету, главным образом, жуками, бабочками и термитами.

Statusy: az sanly, ýaşyryn gezyär, bizde az öwrenilen guş.

Статус: немногочисленная, у нас мало изученная птица.

215. Melemtil gündizkör – *Caprimulgus aegyptius* – Буланный козодой

Meýdan alamatlary: adaty gündizköre çalymdaş, ýöne umumy reňki çalymtyl-çägepisint, altyn öwüşginli. **Arka tarapy** reňkleriň umumy öwüşgininde egniniň ýelekleri **garamtyl iňsiz sütiňekilli menekli. Boýnunyň uzy çuparrak.** Döşi garamtyl zyra-zyrally, böwürleri kese geçýän inçejik sary zolakly. Sesi – çalt gaýtalanýan “kre-kre-kre-u-o” metal owazly. Horazlarynyň uzynlygy – 193-212, mäkiýanlarynyňky – 195-208, ganaty – 195-215 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: açyk altynsow-çupar reňki bilen adaty gündizkörden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeleýän bölegi – Demirgazyk-Günbatary Sahara çöli, Ýakyn Gündogar, Alynky we Orta Aziýa we Günorta Gazagystan. Türkmenistanda hemme ýerlerde ýaýran, emma endigan däl. Çöl guşy (daglardan gaça durýar). Demirgazyk-Gündogar we Demirgazyk - Günbatar Afrikada gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtegeleýän görnüş. Ir, apreliň ikinji ýarymynda uçup gelyär, sentýabrda uçup gidýär. Düzlük ýerlerde gyrymsy ösümlikli, çöllük we toýunsow ýerlerde, sazaklaryň arasynda mekan tutýar. Gündizine gum gaýalarynyň ýa-da gyrymsylaryň kölgesinde oturýar. Iňrik garalanda we gijesine ýygy-ýygydan ýollaryň, suw akýan ýaplaryň we açyk ýerlerde gabat gelyär. Höwürtegesi ýonekeý, düýbi düşeksiz çukurjyk. Maý-iyunda 2 sany düşnüksiz çuparrak-goňur menekli çalymtyl-poslyrak ýumurtgalary

Полевые признаки: похож на обыкновенного козодоя, но общий тон окраски серовато-песочный, золотистый. **Спинная сторона** на этом общем тоне окраски – **с тонкими темными стержневыми пестринками** на плечевых перьях. **Зашеек рыжеватый.** Грудь с темной рябью, на боках тонкие поперечные желтые полосы. Голос – быстро повторяемое металлическое «кре-кре-кре-у-о». Длина самцов – 193-212, самок – 195-208, крыло – 195-215 мм.

Сходства – отличия: от обыкновенного козодоя отличается светлой золотисто-рыжей окраской.

Распространение: гнездовая часть ареала – Северо-Западная Сахара, Ближний Восток, Передняя и Средняя Азия и Южный Казахстан. В Туркменистане распространен повсеместно, но не равномерно. Больше – пустынная птица (гор избегает). Зимует в Северо-Восточной и Северо-Западной Африке.

Образ жизни: пролетно-гнездящийся вид. Прилет ранний, во второй половине апреля. Отлет – в сентябре. Селится, в основном, на равнинах – на песчаных и глинистых участках, с кустарниковой растительностью, среди саксаульников. Днем держится в тени обрывов или под кустами. В вечернее время и ночью часто у дорог, арыков и на открытых местах. Гнездо – ямка без всякой выстилки. Кладка в мае-июне, состоит из 2 серовато-ржавчатых с неясными рыжева-

goýýar. Pidasyny howada uçup ýörkã, seýrek ýerden tutýar, mörmöjekler (tomzaklar, gijeki kebelekler, ýasmyklar we göniganatlylar) bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde adaty, ýaşyryn gezýär, gowşak öwrenilen guş.

ATGARLAWAÇŞEKILLILER – APODIFORMES – СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ, ИЛИ ДЛИННОКРЫЛЫЕ

Ganatlary dowamly we işjeň (aktiw) uçmaga üýgunlaşan guşlar topary. Dünýäde 400-e golaý görnüş, biziň faunamyзда otrýaddan bir maşgala – atgarlawaçlar degişli.

Atgarlawaçlar – Apodidae – Стрижиные

Ganatlary uzyn, gylyçşekilli, garlawaja çaly m edýän, emma sãhelçe tokarrak, uly bolmadyk guşlar maşgalasy. Okgunly uçýar, wagtynyň köp bölegini howada geçirýär, ýere we agaçlaryň şahalaryna gonmaýar. Aýaklary örän gysga, öňe gönügen ilişgen barmakly. Kiçijek çüňkli, başgalara görã giň agyzly. Horazynyň reňki mäkiýanyna meňzeş, azyrak ýaş tapawudy bolýar. Gündizine gezýän guşlar. Dürli landşaftlarda gabat gelyär. Topar bolup höwürtgeler, höwürtgelerini buky ýerde – gaýalaryň ýarçyklarynda we uçutlaryň uly bolmadyk köweklerinde, jaýlaryň üçeginiň aşagynda gurýarlar. Howada maýda mörmöjekler (aeroplankton) bilen iýmitlenýärler. Jemi 57, Türkmenistanda – 3 görnüş.

216. Gara atgarlawaç – *Apus apus* – Черный стриж

Meýdan alamatlary: garlawajyň ölçeginde, yöne ganatlarynyň uly bolmagy olary has göwrümlü edip

то-бурыми пятнами яиц. Пищу добывает, преимущественно, на лету, реже на земле. Корм – насекомые – жуки, ночные бабочки, полужесткокрылые и прямокрылые.

Статус: немногочисленная, местами обычная, скрытная, слабо изученная птица.

Отряд птиц, у которых крылья приспособлены к длительному и активному полету. В мире около 400 видов, в нашей фауне отряд представлен одним семейством – стрижиные.

Некрупные птицы, напоминают ласточек, но чуть больше и крылья у них длинные, серповидные. Полет стремительный, большую часть времени проводят в воздухе, на землю и ветви деревьев не садятся. Ноги очень короткие с цепкими пальцами, направленными вперед. Рот сравнительно широкий с маленьким клювом. Самец и самка окрашены одинаково, имеются небольшие возрастные отличия. Активны днем. Встречаются в различных ландшафтах. Гнездятся колониями, гнезда устраивают скрытно – в расщелинах скал и обрывов, в небольших дуплах, под крышами строений. Питаются мелкими насекомыми в воздухе (аэропланктон). Всего 57, в Туркменистане – 3 вида.

Полевые признаки: размером с ласточку, но из-за больших крыльев кажется гораздо крупнее. Крылья –

görkezýär. Ganatlary uzyn, gylyç ýaly egri, guýrugy oýuk. **Ýelek örtügi tuuşlygyna, bokurdagynyň kirli-ak reňkiden başgasy gara-goňur.** Ýaş guşlar ulularyna meňzeş, yöne olaryň ýelekleri açyk zolaklar bilen jäheklenen. Sesi “stri-i-i-i” gulagyňy deşip barýan byzzyldy. Uzynlygy – 16-19, ganaty – 16-18, ganatlarynyň gerimi – 43-50 sm, agramy - 35-60 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: biziň atgarlawaçlarymyzyň arasynda ýelek örtüginini reňkiniň garamtyldygy bilen tapawutlanýar: **kiçi atgarlawaçdan tapawutly-lykda ölçegleri uly we guýrugy uly oýukly, akgaryn atgarlawaçdan bedeniniň aşaky tarapy ak** (sany boýunça has köp we giň ýaýran, köplenç obalarda we şäherlerde hem höwürtgelyär).

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtgelyän bölegi tutuş Ýewraziýa, onuň demirgazyk we gündogar böleginden başga ýerlerinde. Orta Aziýada we Türkmenistanda giň ýaýran, emma derýalaryň jülgelerinde, oazislarda has köp duşýar. Afrikanýň günnorta böleginde gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtgelyän guş. Ýazki migrasiýasy martyň ortasyndan apreliň ortasyna çenli, güýzkisi – iýul-awgustda. Dürli landşaftlarda ýaşayar, emma oazislari, ýaşalyan nokatly ýerleri halaýar. Aprelde we maýda höwürtgelyär. Höwürtgelerini gaýalaryň we uçutlaryň ýarçyklarynda, adamlaryň guran desgalarynda koloniýa ýada kiçiräk topar bolup, gurýar. 2 sany, kãte 3-4 sany ak reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri 16-17 x 23-27 mm. Maý aýynda jüýjeleri çykýar, iýunyň soňunda we iýulyň başynda, daglyklarda - awgustda uçurym bolýar.

длинные, серповидно изогнутые, хвост – с вырезкой. **Все оперение черно-бурое, за исключением горла грязно-белого цвета.** Молодые птицы схожи со взрослыми, но перья у них окаймлены светлыми полосками. Голос – пронзительный визг «стри-и-и-и». Длина – 16-19, крыло – 16-18, размах крыльев – 43-50 см, вес – 35-60 г.

Сходства – отличия: среди наших стрижей выделяется однотонно темной окраской оперения, **от малого стрижа отличается крупными размерами и большой вырезкой на хвосте, от белобрюхого – отсутствием белого на нижней стороне тела** (кроме того, у нас превосходит их по численности и распространен шире, охотно гнездится в поселках и городах).

Распространение: гнездовая часть ареала – почти вся Евразия, за исключением северных и восточных ее частей. В Средней Азии и Туркменистане распространение широкое, но больше по долинам рек, в оазисах. Зимует в южной половине Африки.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весенняя миграция – с середины марта и до середины апреля, осенняя – в июле-августе. Обитает в различных ландшафтах, но предпочитает оазисы, населенные пункты. Гнездование – в апреле и мае. Гнезда устраивает колониально или небольшими группами в расщелинах скал и обрывов, постройках человека. В кладке 2 (иногда 3-4) яйца белого цвета. Размеры яиц – 16-17 x 23-27 мм. Птенцы вылупляются обычно в мае, вылет приходится на конец

lýmiti maýda mör-möjekler.

Statusy: köp sanly, käbir ýerlerde has köp sanly görnüş.

217. Kiçi atgarlawaç – *Apus affinis* – Малый стриж

Meýdan alamatlary: gara atgarlawaja meñzeş, ýöne maýda. Ganatlary uzyn, gylyçşekilli egri, guýrugy uly bolmadyk oýuk. **Bokurdagy we guýrugynyň üsti ak**, arkasy, döşi we garny gara, galan ýelekleri goňur. Sesi edil gara atgarlawajyňky ýaly, ýöne has ýumşak, gulagyňy deşip barmaýar. Uzynlygy – 125-147, ganaty – 131-133, guýrugy – 39-49 mm.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: **ölçegleriniň mese-mälim kiçidigi we guýruk üstüniň akdygy, guýruk oýugyňyň ýalpakdygy** bilen gara we akgaryn atgarlawaçlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Afrika we Günorta Aziýa, höwürtegeleýän döwründe Orta Aziýanyň daglary. Türkmenistanda, Bathyzyň daglyk böleginde (Gezgädik) we Köýtendagda.

Ýaşayşy: höwürtegeleýän görnüş, aprelde uçup gelýär, awgustda uçup gidýär. Daglaryň aşaky ýa-da ortaky kemeriniň çygly jülgelerinde kiçiräk topar bolup, apreliň soňunda höwürtegeleýär. Höwürtesini Garlawajyňky ýaly - kese eginleriň we sallanyp duran gaýalaryň aşagynda palçykdan gurýar. Maý aýynda 2 sany ak reňkli ýumurtga goýýar, ölçegleri - 14 x 23 mm. Maýdajyk mör-möjekler bilen ýymitlenýär.

Statusy: seýrek, az öwrenilen görnüş. Bathyz we Köýtendag goraghanalarynyň guşlarynyň iň täsin wekilleriniň biri.

июня-начало июля, в горах – в августе. Питание – мелкие насекомые.

Статус: многочисленный, местами очень многочисленный вид.

Полевые признаки: схож с черным стрижем, но мельче. Крылья – длинные, серповидно изогнутые, хвост лишь с небольшой выемкой. **Горло и надхвостье белые**, спина, грудь и брюшко черные, остальное оперение бурое. Голос – как у черного стрижа, но намного мягче, не пронзительный. Длина – 125-147, крыло – 131-133, хвост – 39-49 мм.

Сходства – отличия: от черного и белобрюхого стрижей отличается **заметно меньшими размерами и белым надхвостьем, хвост – без глубокой вырезки.**

Распространение: Африка и Южная Азия, а в гнездовой период в горах Средней Азии. В Туркменистане – горная часть Бадхыза (Гезгедик) и Койтендаг.

Образ жизни: гнездящийся вид, прилетает в апреле, отлетает в августе. Гнездится с конца апреля небольшими колониями по сырым местам в ущельях нижнего или среднего пояса гор. Гнезда – «ласточкиного типа» – лепятся под сводами карнизов и нависающих скал. Кладка в мае – 2 яйца белого цвета, размеры – 14 x 23 мм. Питается мелкими насекомыми.

Статус: редкий, малоизученный вид. Один из интересных представителей птиц Бадхызского и Койтендагского государственных заповедников.

218. Akgaryn atgarlawajy – *Tachymarptis melba* – Белобрюхий стриж

Meýdan alamatlary: gara atgarlawaja meñzeş, göräýmäge ulurak; ganatlary uzyn, orakşekilli egri, guýrugy oýuk. **Garny we bokurdagy ak**, petekesi we galan ýelek örtügi goňur. Sesi “skrii...” güýçli. Ganaty – 218-222, ganatlarynyň gerimi – 540 mm çenli.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň uludygy we **garnynyň akdygy** bilen gara we kiçi atgarlawaçlardan we şeýle-de kiçi atgarlawaçdan, **guýrugynyň oýuk ýeriniň uludygy** bilen oňat tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeleýän bölegi – Günorta Ýewropa, Demirgazyk Afrika, Orta we Günorta-Günbatar Aziýa. Türkmenistanda – Köpetdagda, Köýtendagda we beýleki daglyk ýerlerde. Günorta we Gündogar Afrikada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtegeleýän guş. Ýazky migrasiýasy aprelde, güýzkisi – sentýabrda. Daglarda we eteklerinde, seýrek ýaşalýan nokatlarda mekan tutýar. Aprelde we maýda dag gaýalarynyň çüňklerinde, gaýalarda we uçutlardaky ýarçyklarda topar bolup höwürtegeleýär. Maý aýynyň başynda 2-4 sany ak reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 19-30 x 24x34 mm. Maýyň soňunda we iýunyň başynda jüýjeleri çykýar. Maýdajyk mör-möjekler bilen ýymitlenýär.

Statusy: az sanly we ýeterlik öwrenilmedik görnüş.

GÖKGARLAKŞEKILLILIR – *CORACIIFORMES* – РАКШЕОБРАЗНЫЕ

Dykyzlaşan gatawsy ýelek örtüklü, orta we maýda ölçegleri bolan guşlar otrýady. Görnüşleriň köpüsiniň reňki açyk, ala, ýaşyl we gök öwür-

Полевые признаки: схож с черным стрижем, но заметно крупнее; крылья – длинные, серповидно изогнутые, хвост – с вырезкой. **Брюхо и горло белые**, зоб и остальное оперение бурое. Голос – громкое «скрии...». Крыло – 218-222, размах крыльев – до 540 мм.

Сходства – отличия: от **черного и малого стрижей** хорошо отличается крупными размерами и **белым брюхом, от малого, кроме того, большой вырезкой на хвосте.**

Распространение: гнездовая часть ареала – Южная Европа, Северная Африка, Средняя и Юго-Западная Азия. В Туркменистане – Копетдаг, Койтендаг и другие горные районы. Зимует в Южной и Восточной Африке.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весенняя миграция – в апреле, осенняя – в сентябре. Обитает в горах и предгорьях, редко в населенных пунктах. Гнездование – в апреле и мае. Гнездится колониально в расщелинах скал, на чинках и обрывах. Кладка обычно в начале мая, 2-4 яйца белого цвета, размеры – 19-30 x 24-34 мм. Птенцы – в конце мая-начале июня. Питается мелкими насекомыми.

Статус: не многочисленный и недостаточно изученный вид.

Отряд птиц средних и мелких размеров с плотным, жестким оперением. Окраска большинства видов яркая, пестрая, преобладают

günleri artykmaçlyk edýär. Aýaklary ýelek örtüksiz. Çünki uzyn, daýaw we tekiz gyraly göni. Dürli landşaftlarda – tokaylykdan çöllüğe we daga çenli mekan tutýar. Ýapyk ýerlerde – köweklerde, hinlerde, ýarçyklarda höwürrtgeleýärler. Mör-möjekler, maýda oňurgaly haywanlar bilen iýmitlenýärler. Dünýäde 180 gornüş, şolaryň 5-si Türkmenistanda.

Gökgarlaklar – Coraciidae – Сизоворонковые

Кепдери ölçeglerindäki guşlar maşgalasy. Reňkli ýaşylymytyl – mawy. Ganatlary we guýrugy garamtyl-gök meýdançaly, arkasy goňur reňkli, aýaklary güýçli, söbügi kese teňňejikler bilen örtülen, göni we daýaw çünkli.

219. Gökarga – Coracias garrulus – Сизоворонка

Meýdan alamatlary: sähelçe uzalan bedenli we başgalara garanyňda uly kelleli, кепдери ölçegindäki guş. **Kellesi we garyn tarapy mawy, arkasy we eginleri, guýrugunyň üsti mawumtyl-gök reňkli.** Çünki garamtyl-goňur, gargalaryň çüňküne çalyndaş, güýçli we göni. Aýaklary goňur. Sesi pert, azyrak basyk “kra-kra” ýa-da “krek-krek”. Uzynlygy – 320-343, ganaty – 180-208, ganatlarynyň gerimi – 620-660 mm, agramy – 183 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: bizde mezeş görnüşleri ýok.

Ýaýran ýerleri: höwürrtgeleýän ýerlerde – Günorta-Günbatar, Gündogar we Günorta-Gündogar Ýewropa, Günorta Ural, Gazagystan, Orta, Alynky we Kiçi Aziýa, Afrikanyň demirgazyk-günbatar çetleri. Türkmenistanda hemme ýerlerde, emma endigan däl, derýalaryň jülgelerine we

зеленые и синие оттенки. Ноги не оперены. Клюв довольно длинный сильный и почти прямой с гладкими краями. Обитатели различных ландшафтов – от лесов до пустынь и гор. Гнездятся в закрытых местах – дуплах, норах, щелях. Питаются насекомыми, мелкими позвоночными животными. Всего в мире 180 видов, из которых в Туркменистане – 5 видов.

Семейство птиц размерами с голубя. Окраска зеленовато-голубая. На крыльях и хвосте темно-синие участки, спина коричневая, ноги сильные, цевка покрыта поперечными щитками, клюв прямой и сильный. Всего 8, у нас 1 вид.

Полевые признаки: размером с голубя, с чуть удлинённым телом и относительно крупной головой. **Голова и брюхо голубые, спина и плечи рыжие, надхвостье лилово-синее.** У молодых общая окраска бледнее. Клюв темно-бурый, похож на клюв врановых, сильный прямой. Ноги бурые. Голос – резкое, немного хрипловатое «кра-крак» или «крек-крек». Длина – 320-343, крыло – 180-208, размах – 620-660 мм, вес – 183 г.

Сходства – отличия: у нас сходных видов нет.

Распространение: область гнездования – Юго-Западная, Восточная и Юго-Восточная Европа, Южный Урал, Казахстан, Средняя, Передняя и Малая Азия, крайний северо-запад Африки. В Туркменистане – повсеместно, но неравномерно, больше тяготеет к долинам

oazislere ýakyn saklanýar. Afrikanyň günorta böleginde guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürrtgeleýän guş. Ýazyna – apreliň ikinji ýarymynda, güýzine – awgust-sentyabrda uçup geçýär. Dürli landşaftlarda gabat gelýär, emma dagyň depesine tarap ýokary galmaýar. Gum gaýaly jarlarda, suw köwen gorplarda mesgen tutýar. Aýratyn jübüt bolup höwürrtgeleýär. Aprel-maý aýynda 4-6 sany ýaldyrawuk ak reňkli ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler we maýda oňurgalylar bilen iýmitlenýär.

Statusy: amatly ýerlerde, adaty, uçup geçýän mahaly köp sanly görnüş, emma arealynyň köp böleginde gitdigiçe seýrekleyär, şonuň üçin ol MSOP-nyň Gyzyl sahypasyna girizilen.

Sütler – Alcedinidae – Зимородковые

Kellesi uly, çünki ýiti uçly göni, ganatlary, guýrugy, aýaklary gysga, barmaklary ýarpysyna çenli bitişip, gowşak ösen maýda, seýrek orta ululykdaky guşlar maşgalasy. Açyk reňkli. Hemmesi 86, biziň ýurdumyzda 1 görnüş.

220. Süti – Alcedo atthis – Обыкновенный зимородок

Meýdan alamatlary: serçeden sähelçe ulurak. **Bedeni kelte, dykyz, kellesi has gaba, çünki güýçli, uzalan we göni.** Guýrugunyň ujy göni kesilen. Aýaklary gowşak ösen we gysga, yöremek üçin amatsyz. **Üstki tarapyň reňki gögümtiräk-ýaşyl, bedeniniň aşagy poslyrak-çypar, bokurdagy çyparrak-agymtyl reňk-li.** Ýaş guşlaryň döşi garamtyl-ýaşyl

рек и оазисам. Зимуют в южной половине Африки.

Образ жизни: пролетно-гнездящийся вид. Весенний пролет – со второй половины апреля, осенний – в августе-сентябре. Населяют различные ландшафты, но в горы высоко не поднимаются. Обитают, в основном, в местностях с обрывами, оврагами. Гнездятся отдельными парами. Кладка в апреле-мае, состоит из 4-6 белых блестящих яиц. Питается насекомыми и мелкими позвоночными животными.

Статус: у нас в подходящих местах обычный вид, на пролетах даже многочисленный, но во многих частях мирового ареала становится редким, поэтому включен в Красный список МСОП.

Семейство мелких, реже средней величины птиц, с большой головой, острым прямым клювом, короткими крыльями и хвостом, короткими и слабыми ногами со сросшимися до половины пальцами. Окраска яркая. Всего 86, в нашей стране 1 вид.

Полевые признаки: несколько крупнее воробья. **Тело укороченное, плотное, голова массивная, клюв сильный удлинённый прямой.** Обрез хвоста прямой. Ноги слабые, короткие, непригодные для ходьбы. **Окраска верха голубовато-зеленая, низ тела ржаво-рыжий, горло рыжеватобеловатое.** У молодых птиц на груди

ýokundyly. Horazlarynyň çünki goňur we mäkiýanlarynyňky-goňurrak-gyzgylt. Suwa ýakyn şahada ýa-da suwdan çykyp duran daşyň üstünde uzak wagtlap, pidasyny synlap, gymyldaman oturýar. Suwuň üstünden uçanynda göz açyp-ýumasy salymda howada doňýar. Sesi – sokdyrylan inçe gykylyk, “piik-piik” sykylygy ýatladýar. Uzynlygy – 170-190, ganatlarynyň gerimi – 260-280, guýrugy – 69-75 mm, agramy – 35-37 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: bizde meňzeş görnüşleri ýok.

Ýaýran ýerleri: Ýewraziýanyň çöl-lük suwsyz giňişliklerinden başga, günorta bölegi, Afrikanýň demirgazyk çetleri. Orta Aziýada günorta we günorta-gündogar bölekleri, Türkmenistanda Amyderýa, Garagum, Murgap, Tejen, Etrek, Sumbar derýalarynyň jülgelerinde wagtal-wagtal duşýar, şeýle-de Köpetdagyň käbir maýda derýajyklarynda saklanýar.

Ýaşayşy: oturmly guş. Derýalarynyň, kölleriň, beýleki akar we dury suwly howdanlaryň kenarlarynda mekan tutýar. Aýratyn jübüt bolup gezyär. Guşlar gum gaýany erňekläp duran suwa ýakyn edip gazýan hilerinde höwürtegeleýär. Ýylda iki gezek köpelyär, 5-8 sany togalagrak ýaldyrawuk-ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 17-18 x 21-28 mm. Iýun-ýulda jüýjeleýär. Maýdajyk balyjaklar we suw oňurgasyzly bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, gowşak öwrenilen görnüş.

Daraklyklar – Meropidae – Щурковые

Çünki inçe, aşaklygyna sähelçe egmek, ganatlary uzyn çowly, guýrugy uzyn, onuň ortaky ýelekleri

черновато-зеленый налет. Клюв бурый у самцов и буро-красноватый у самок. Подолгу неподвижно сидит на ветке у самой воды или на выступающем над поверхностью воды камне, выглядывая добычу. В полете над водой может на мгновение «замирать». Голос – тонкий протяжный крик, напоминающий свист «пиик-пиик». Длина – 170-190, размах крыльев – 260-280, хвост – 69-75 мм, вес – 35-37 г.

Сходства – отличия: у нас сходных видов нет.

Распространение: южная половина Евразии, за исключением пустынных безводных пространств, крайний север Африки. В Средней Азии – южные и юго-восточные области, в Туркменистане – спорадично по долинам Амударьи, Каракумдарьи, Мургаба, Теджена, Этрека, Сумбара, а также, местами, по мелким речкам Копетдага.

Образ жизни: оседлый вид. Населяет берега рек, озер и других водоемов с проточной и относительно прозрачной водой. Держится отдельными парами. Гнездо в норе, которое выкапывается в береговых обрывах у самой воды. В году размножается дважды, в кладке 5-8 округлых блестяще-белых яиц, размеры – 17-18 x 21-28 мм. Птенцы – в июне-июле. Питается мелкой рыбой и водными беспозвоночными.

Статус: немногочисленный, слабоизученный вид.

Семейство птиц размерами со скворца, с тонким, слегка изогнутым вниз клювом, длинными

insiz we galanyndan has uzyn, sar ölçeglerindäki guşlar maşgalasy. Hemmesi 25, Türkmenistanda 2 görnüş.

221. Altynsow daraklyk – Merops apiaster – Золотистая щурка

Meýdan alamatlary: bedeniniň gurluşy we howada uçuşy boýunça garlawaçlary yatladýan, ýöne ondan ulurak, sar ölçegindäki guş. Onuň reňki ýagty: **depesi we ýeňsesi goňras, bokurdagy sary, ganatlary we guýrugy ýaşylmytyl mawumtyl, arkasy we eginleri - altynsow-çypar reňkli.** Gözüniň üstinden gara zolak geçýär. Mäkiýanlary we ýaş guşlar ýagtyrak reňkli, umumy öwüşgini goýu ýaşyl. Uzalan gara çünki ýiti we azajyk aşaklygyna egmek. Aýaklary gysga we gowşak, goňurrak-gara reňkli. Sesi – güýçli “krýü-krýu” ýa-da “kýürt-kýurt” gykylyk. Uzynlygy – 240-300, ganaty – 140-150, ganatlarynyň gerimi – 400-450 mm, agramy – 50-60 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ýaşyl daraklyga meňzeş, emma bokurdagynyň aчык-sarydygy, boýunbagynyň insiz garadygy we aşak tarapynyň reňkiniň mawumtyldygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta, Günorta-Gündogar Ýewropada, Demirgazyk-Günbatar we Günorta Afrikada, Kiçi, Alynkly we Orta Aziýada höwürtegeleýär. Türkmenistanda - uçup geçende hemme ýerlerde duşýar, emma dageteklerine we oazislere ýakyn çekilýär. Afrikanýň günorta böleginde gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtegeleýän guş. Ýazyna – apreliň ikinji ýarymyndan maýyň ortasyna çenli, güýzine – awgustyň ortasyndan oktyabra çenli uçup geçýär. Düzlük-däki derýalaryň jülgelerinde, daglar-

острыми крыльями и длинным хвостом, средние перья которого узкие и длиннее остальных. Всего 25, в Туркменистане – 2 вида.

Полевые признаки: размером со скворца, по складу тела и полету напоминают ласточек, но крупнее. Ярко окрашенная птица: **темя и затылок каштановые, горло желтое, крылья и хвост зеленовато-голубые, спина и плечи – золотисто-рыжие.** Через глаз проходит черная полоса. Самки и молодые окрашены бледнее, общий тон более зеленоватый. Клюв удлиненный, черный, острый и слегка изогнутый книзу. Ноги слабые, короткие, буровато-черные. Голос – громкий крик «крю-крю» или «кюрт-кюрт». Длина – 240-300, крыло – 140-150, размах крыльев – 400-450 мм, вес – 50-60 г.

Сходства – отличия: очень схожа с зеленой щуркой, но отличается ярко-желтым горлом, тонким черным ошейником и голубой окраской низа.

Распространение: гнездятся в Юго-Восточной и Южной Европе, Северо-Западной и Южной Африке, Малой, Передней и Средней Азии. В Туркменистане на пролете повсеместно, но больше тяготеет к предгорьям и оазисам. Зимуют в южной половине Африки.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весенний пролет – со второй половины апреля до середины мая. Осенью – с середины августа и до октября. Населяет речные долины на равнинах и в горах, оазисы. Гнездятся колониями, ино-

da we oazislerde mekan tutýar. Topar, käte jübüt bolup, jarlaryň, källeriň, kölleriň we gum alnan çukurlaryň diwaryny köwüp gazýan hinlerinde höwürtegeleýär. Maýyň ortasynda 4-5 sany ak reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 21.5 x 27 mm. Iýulda jüýjeleýär. Mör-möjekler, esasan, perdeganatlylary, howada tutup iýmitlenýär.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde uçup geçende köpsany görnüş. Bal-aryçylyk etraplarda olaryň bolmazlygy islenilýär.

222. Ýaşyl daraklyk – *Merops persicus* – Зеленая щурка

Meýdan alamatlary: sar ölçegindäki guş. Maňlaýy, gaşy we gözünüň aşagyndaky zolak mawy. Çünkünden gulagyna tarap gara zolak gözünüň üstünden geçýär. Alkymy sary reňkli. **Uçan wagty ganatynyň aşagyndaky goňras reňki anyk görünüär.** Ýelek örtügininiň galany açyk-ýaşyl reňkli. Ýaş guşlaryň reňki has solak. Edil altynsow daraklyk ýaly, **guýrugynyň ortasyndaky uzalan jübüt ýelekleri** boýunça aňsat tanalýar. Sesi altynsow daraklygyňka çalymdaş, ýöne pes we pert “kri-kri-kri”. Uzynlygy – 400-490, ganaty – 150-200, ganatlarynyň gerimi – 750-850 mm, agramy - 70-120 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: altynsow daraklyga meňzeş, emma sähelçe ulurak. Doýgun goýy ýaşyl reňkli. Gara boýunbagy ýok, ýaňaklary mawumtyl reňkli.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän ýerleri Madagaskar, Afrikanyň demirgazyk-günbatar çetleri, Ýakyn Gündogar, Hazaryakasy, Alynky, Orta, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýa, Täze Gwineýa. Türkmenistanda uçup geçende hemme ýerlerde, emma dag eteklerine we oazislere ýakyn çekilýär.

гда парами по оврагам, лессовым обрывам, карьерам. Гнезда устраивают в норах, которые выкапывают в стенах обрывов. В кладке 4-5 яиц белого цвета, размеры – 21.5 x 27 мм. Кладка – с середины мая, птенцы – в июне. Питаются насекомыми, в основном перепончатокрылыми, которых ловят на лету.

Статус: обычный, местами на пролете многочисленный вид. В районах пчеловодства не желателен.

Полевые признаки: размером со скворца. Лоб, бровь и полоса под глазом – голубые. От клюва через глаз к уху тянется черная черта. Подбородок – желтый. **В полете хорошо заметен каштановый окрас испода крыла.** Остальное оперение изумрудно-зеленое. Молодые птицы окрашены более бледно. Как и золотистая щурка узнается по **удлиненной средней паре перьев хвоста.** Голос похож на голос золотистой щурки, но более низкий и резкий – «кри-кри-кри». Длина – 400-490, крыло – 150-200, размах – 750-850 мм, вес 70-120 г.

Сходства – отличия: схожа с золотистой щуркой, но чуть крупнее. Общий тон окраски насыщенно зеленый. Отсутствует черный ошейник, щеки голубого цвета.

Распространение: область гнездования – Мадагаскар, крайний северо-запад Африки, Ближний Восток, Прикаспий, Передняя, Средняя, Южная и Юго-Восточная Азия, Новая Гвинея. В Туркменистане – на пролете повсеместно,

Afrikanyň günorta böleginde we Hindistan-Awstraliýa arhipelagynda gyşlaýar.

Ýaşyşy: uçup geçýän-höwürtegeleýän guş. Ýazyna apreliň ikinji ýarymynda uçup geçýär. Güýzüne -awgustda, sentýabryň başynda uçup geçýär. Giň gerimli, gum gaýaly çöketlikli, jarly, suw joşgunyndan dörän köwli, gum alnyp oýulan çukurly açyk meýdanlarda mekan tutýar, derýalaryň we kanallaryň boýlarynda gabar gelyär. Höwürtegeleýän wagty we höwürtege guruşy edil altynsow daraklygyňky ýaly. 4-6 sany togalak, ýaldyrawuk-ak reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri -20.9 x 26.2 mm. Iýunyň soňunda we iýulyň başynda jüýjeleri uçurym bolýarlar. Iýmitlenişi edil altynsow daraklygyňky ýaly.

Statusy: adaty, uçup geçen-de käbir ýerlerde köp sany görnüş. Balaryçylyk etraplarda olaryň bolmazlygy barada iş alnyp barylýar.

Нүүрүпиклер – *Upupidae* – Удодовые

Kiçiräk toparlardan düzülen, gurluş aýratynlyklary boýunça orta ölçeglerdäki hususy hüýrүпикleri özünde jemleýän maşgala. Gündizine gezýän guşlar. Esasan, mör-möjekler, seýrek maýda oňurgaly haýwanlar bilen iýmitlenýär. Dünýäde 4 görnüş. Biziň faunamyzda bu maşgalanyň wekili duşýar.

223. Нүүрүпик – *Upupa epops* – Удод

Meýdan alamatlary: kepderiden maýda. Bedeniňiň sypaty we ýelek örtügininiň reňki boýunça aňsat tanalýar. **Kellesinde ýelpewaç şekilli hüþügi bolýar.** Ýelek örtügi goňurrak-çypar reňkli ala, guýrugy we ganatlary aralaşyp geçýän kese gara we ak zolakly. Çünki uzyn we inçe. Sesi basyk “up-up-upi” we ýiti

но больше тяготеет к предгорьям и оазисам. Зимуют в южной половине Африки и Индо-Австралийском архипелаге.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся вид. Весной прилетает со второй половины апреля. Осенний отлет – в августе, в начале сентября. Населяет открытые пространства с участками обрывов, промоин и оврагов, встречается в долинах рек и вдоль каналов. Сроки и способы гнездования как у золотистой щурки. Норы роет в стенах обрывов. В кладке 4-6 почти округлых, блестяще-белого цвета с мелкозернистой скорлупой яиц, размеры – 20.9 x 26.2 мм. Вылет молодых птенцов – в конце июня – начале июля. Питание такое же, как у золотистой щурки.

Статус: обычный, местами на пролете многочисленный вид. В районах пчеловодства не желателен.

Семейство включает небольшую группу птиц средних размеров. Дневные птицы. Питаются, в основном, насекомыми, реже мелкими позвоночными. Данное семейство в нашей фауне представлен одним видом из 4-х.

Полевые признаки: мельче голубя. Легко узнать по форме тела и окраске оперения. **На голове – веерообразный хохол.** Оперение пестрое коричнево-рыжее, хвост и крылья с чередующимися черными и белыми поперечными полосками. Клюв длинный и тонкий. Голос – глухое «уп-уп-упи» и резкое

hyşşyldy. Uzynlygy – 281-325, ganaty – 135-151, ganatlarynyň gerimi – 420-490 mm, agramy, ortaça - 60 g. Meňzeşlikleri-tapawutlary: bizde meňzeş görnüşleri ýok.

Ýaýran ýerleri: giň, höwürtleýän yerleri – Ýewraziýanyň günorta bölegi, Afrika. Türkmenistanda hemme ýerlerde, emma daga garanyňda düzlük ýerlerde köpüräk duşýar. Ýakyn Gündogarda, Alyňky, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtleýän, az mukdarda gyşlaýan görnüşi. Ýazyna – martyň başynda, güýzine – sentýabrda uçup geçýär. Köweklerde, üşmek daşlaryň aşagynda, gaýalaryň ýarçyklarynda, hinlerde we jaryň opurylan dik kenarlarynda we beýleki amatly ýerlerde höwürtleýär. Aýratyn jübüt bolup höwürtleýär. 3-8 sany mawumtyl-ak reňkli yumurtgalary goýýar, ölçegleri - 18.5 x 26.8 mm. Maý aýynda jüýjeleýär. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde adaty görnüş.

DOŇUZGUŞŞEKILLILER – PICIFORMES – ДЯТЛООБРАЗНЫЕ

Orta we maýda (serçe ýaly) öleşdäki, has ululary garga ýaly guşlar otrýady. Çünki göni, isgeneşekilli ýiti uçly, 2 barmagy öňe we 2-si yza bakyp, agaçlaryň sütünlerine dyrmaşmaga uýgunlaşan, gysga we güýçli ayakly. Gaňyrçakly dyrnaklary agaç şahasyna ýarup durmaga oňsat kömek edýär. Ganatlary inli, kütek uçly, guýruk ýelekleri çeye we gaty, uý çowly (şalkyboýndan başgalarynda). Köpüsi gündiziki tokaý guşlary, agaçlaryň köweklerinde ýa-da hinlerde höwürtleýär. Jüýjeleriniň gözleri ýumuk, görnüşleriň birnäçesiniň etene görmüşli, sütük ýeleksiz dogulýar. Oturymly ýaşýar, emma görnüşleriň

шипение. Длина – 281-325, крыло – 135-151, размах крыльев – 420-490 мм, вес, в среднем – 60 г.

Сходства – отличия: у нас сходных видов нет.

Распространение: широкое, области гнездования – южная половина Евразии, Африка. В Туркменистане – повсеместно, но больше на равнинах, чем в горах. Зимуют на Ближнем Востоке, в Передней, Южной и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся вид, в небольшом числе зимует. Весенний пролет – в начале марта, осенний – в сентябре. Гнезда устраивает обычно в дуплах, кучах камней, в расщелинах скал, в норах и промоинах обрывов. Гнездятся отдельными парами. В кладке 3-8 голубовато-белого цвета яиц, размеры – 18.5 x 26.8 мм. Птенцы – в мае. Питаются насекомыми.

Статус: немногочисленный, местами обычный вид.

Отряд птиц мелкой (с воробья) и средней величины, наиболее крупные – с ворону. Клюв прямой, острый долотообразный, короткие и сильные ноги, на которых 2 пальца направлены вперед, а 2 пальца – назад, хорошо приспособленные к лазанию по вертикальным стволам деревьев. Когти крючковатые, что помогает легко удерживаться на ветвях. Крылья широкие, тупые, хвост жесткий, упругий, заостренный на конце (кроме вертишейки). Дневные, в большинстве лесные птицы. Гнездятся в дуплах или норах. Птенцы вылупляются слепыми и у большинства видов голыми, без

көпүси güýzine we guşyna göçüpgonup gezyärler. Doňuzguşlaryň hemmesi mör - möjekler, seyrek ösümlük iýmiti bilen iýmitlenýärler. Ýer togalagynyň tokaýly yerlerinde, Awstraliýadan, Täze Gwineýadan we Madagaskardan başga yerlerde ýaýrandyrlar; aýratyn-da, olaryň sany Günorta Amerikada köp. Dünýäde 6 maşgala degişli 380-386 golaý görnüş bolup, olardan ýarpysy doňuzguşlar maşgalasynyň wekilleridir (*Picidae*), olaryň arasynda 4 görnüş Türkmenistanda.

224. Şalkyboýun guş – *Jynx torquilla* – Вертишейка

Meýdan alamatlary: daşky sypaty doňuzguşlara az çalymdaş, serçe öleşge. Arka tarapy çalymtyl-goňur, agaç gabygy reňkinde. **Depesi we arkasy dik geçýän gara zolakly**, garyn tarapy aksowult-çypar, bokurdagy – sarymtyl-agymtyl kese geçýän insiz garamtyl zolakly, **gapdallary we garny üçburç ýa-da uýy egri bellik (toýnuk) görnüşde ala**. Guýrugy ýumşak we bolşyna görä uzyn, tegehlenen, çowsyz kese garamtyl zolakly. Çünki göni, gowşak ösen we uýy sähelçe egmek. Gözleri sarymtyl-gyzyly, çünki we ayaklary sary. Kellesini ýygy-ýygydan ikiýana aýlaýar. Sesi – batly “kyaý-kyaý-kyaý”, köwekde oturan guş howp abananda ol hyžýldaýar. Uzynlygy – 180-195, ganaty – 78-93 mm, agramy – 35 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: Türkmenistanda meňzeş görnüşleri ýok. Daşdeşenlerden tapawutlylykda ol agaçlaryň sütünini köwmeyär.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi tutuş Ýewropa, çetki demirgazykdan başgalary, Aziýanyň

пухового наряда. Оседлы, но осенью и зимой многие виды кочуют. Почти все дятлы питаются насекомыми, реже употребляют растительную пищу. Распространены во всех лесах земного шара, за исключением Австралии, Новой Гвинеи и Мадагаскара; особенно много их в Южной Америке. В мире около 380 видов относящихся к 6 семействам, половина - представители семейства дятловых (*Picidae*), среди них 4 вида в Туркменистане.

Полевые признаки: размером с воробья, внешне мало напоминает дятлов. Спинная сторона серовато-бурая, цвета древесной коры. **На темени и спине темная продольная полоса**, брюшная сторона беловато-рыжевато-желтовато-бежевое с тонкими темными поперечными полосами, **на боках и брюшке пестринки в виде угольников или «птичек»**. Хвост мягкий и довольно длинный, округлый, не заостренный с поперечными темными полосками. Клюв прямой слабый и слегка загнут на конце. Глаза желтовато-красные, клюв и ноги желтые. Часто вертит головой. Голос – громкое «кяй-кяй-кяй», при угрозе, если птица в дупле, издает шипение. Длина – 180-195, крыло – 78-93 мм, вес -35 г.

Сходства – отличия: в Туркменистане сходных видов нет. В отличие от дятлов не долбит кору деревьев.

Распространение: гнездовая часть ареала – вся Европа, кроме

tokaý zolagy, Gimalaý daglary. Türkmenistanda çup geçende hemme ýerlerde, emma köplenç dag we derýa jülgelerinde, dag eteklerinde we oazislerde gabat gelýär. Merkezi Afrikada we Hindistanyň demirgazyk böleginde gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän guş. Tokaý jeňňelliklerde, beýleki agaçly we gyrymsyly ýerlerde saklanýar. Ýazyna apreliň başyndan maýyň ikinji ýarymyna çenli uçup geçýär. Güzüne – awgust - sentýabr we oktyabryň ortasyna çenli uçup geçýär. Mör-möjekler, köplenç garynjalar bilen iýmitleýär.

Statusy: az sanly, ýaşyryn gezyär, gowşak öwrenilen guş.

225, 226. Bellik: Günbatar Köpetdagyň derelerinde we beýleki agaç ösümlikli meýdanlarynda örän seýrek - **ýaşyl daşdeşen – *Picus viridis*** – kellesi üsti gyzyly “telpejikli”, ýeňsesi we “murty” – gyzyly (mäkiýanynyň “murty” gara), gözünüň töweregi garamtyly meýdanly we **uly ala daşdeşen – *Dendrocopos major*** duşýar (Eýran tarapdan tötänden uçup gelýärler). Ol ýaşyl daşdeşenden ýelek örtügininiň gara-ak-gyzyly reňklidigi, akganat daşdeşenden ,ganatlarynda gara reňkiň has köpdigi bilen tapawutlanýar, şeýle-de olar bilelikde Günbatar Köpetdagda duşmaýarlar.

227. Akganat daşdeşen – *Dendrocopos leucopterus* – Белокрылый дятел

Meýdan alamatlary: boýnunyň yzky tarapy we arkasy yeňiljek gö-

крайних северных областей, лесная зона Азии, Гималаи. В Туркменистане – на пролете повсеместно, но, в основном, горные и речные долины, предгорья и оазисы. Зимуют в Центральной Африке и северной половине Индостана.

Образ жизни: пролетная птица. Тяготеет к лесным, тугайным и другим древесно-кустарниковым участкам. Весенний пролет поздний и растянут с начала апреля до второй половины мая. Осенний – в августе-сентябре и до середины октября. Питается насекомыми, чаще муравьями.

Статус: немногочисленная, скрытная, слабо изученная птица.

225, 226. Примечание: не включено, что в ущелья и на другие участки с древесной растительностью в Западном Копетдаге спорадично могут залетать со стороны Ирана **зелёный дятел – *Picus viridis*** и **большой пестрый дятел – *Dendrocopos major***. У первого верх головы с красной «шапочкой», затылок и «усы» – красные (у самки “усы” черные), вокруг глаз – черное поле. Второй по контрасту черно-бело-красному оперению легко отличается от зеленого дятла; а от белокрылого дятла – преобладанием черного цвета на крыльях, хотя с последним вместе в Западном Копетдаге не обитает.

Полевые признаки: Задняя сторона шеи и спина черные с легким

gümtil ýokundyly gara. **Depesi ýaldyrawuk gysyl.** Kellesiniň gapdalary we boýny ak, bokurdagy we petekesi özara gara zolak bilen çäklenýär. Aşaky tarapy ýagty, **garnynyň yzky bölegi we guýrugynyň aşagy gyzyly.** Ganatlary gara, onda ak reňkiň mukdary köp (aýratyn-da, uçanynda), hatda ganatlary ýugrylanda hem, onuň ortasynda uly ak ýerleri görünüär. Mäkiýanynyň kellesi gyzyly reňkiz, ýöne ýaş guşlaryň depesi – gyzyly. Çünki mawumtyly-gara, aýaklary goýu goňur. Ganaty – 120-133, guýrugy – 78-88 mm, agramy – 67-70 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: uly ala daşdeşene meňzeş, emma reňkinde ak reňkiň, aýratyn-da, ganatlarynda has köpdügi, şeýle-de guşlaryň bilelikde bir ýerde ýaşamaýandyklary bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Orta Aziýanyň ortaky we günbatar bölegi. Türkmenistanda-Garagumda, Günbatar Uzboýda, Tejen, Murgap derýalaryň we Amyderýanyň jülgelerinde, Köýtendagda duşýar.

Ýaşayşy: oturymly guş, derýa ýakalaryndaky toraňnylyklarda, çölüň sazakyklarynda, dag tokaýjyklarynda we baglyk ýerlerde ýaşýar. Martda höwürtelemäge girişýär. Höwürtesini ýerden 1.5-den 6-7 m beýiklikde agaçlaryň (toraňny, garagaç, ak sazак we başgalar) sütünini köwür gurýar. 4-6, seýrek 7 sany ýumurtga goýýar. Iýunda jüýjeleri uçurym bolýar. Aglaba mör- möjekler (tomzaklar) bilen iýmitleýär.

Statusy: az sanly, ýeterlik öwrenilmedik, bölekleyin ýaýran guş. Repetek goraghanasynyň guşlarynyň iň täsin wekilleriniň biri.

синеватым налетом. **Темя блестяще красное.** Бока головы и шеи белые, отделяются от горла и зоба черной полосой. Низ светлый, **задняя часть брюшка и подхвостье красные.** Крылья черные с большим количеством белого (особенно в полете) и даже на сложенном крыле посередине – большое белое поле. Самка без красного на голове, но у молодых темя красное. Клюв голубовато-черный, ноги темно-бурые. Крыло – 120-133, хвост – 78-88 мм, вес – 67-70 г.

Сходства – отличия: очень схож с большим пестрым дятлом, но отличается преобладанием белого цвета в окраске, особенно на крыльях, к тому же совместно эти два вида не обитают.

Распространение: средняя и западная часть Средней Азии. В Туркменистане – Каракумы, Западный Узбой, долины Теджена, Мургаба и Амударьи, в Койтендаге.

Образ жизни: оседлая птица, населяет приречные тугаи, саксауловые заросли в пустыне, горные рощи и сады. Гнездование раннее – с марта. Гнезда в дуплах деревьев (тополь, туранга, карагач, саксаул и др.) на высоте от 1.5 до 6-7 м от земли. Число яиц в кладке 4-6, редко до 7. Летные молодые – в июне. Питается, преимущественно, насекомыми (жуками).

Статус: немногочисленная и не достаточно изученная птица с неравномерным распространением. Один из наиболее интересных представителей птиц Репетекского государственного заповедника.



228. Bellik: Murgap derýasynyň kenaryndaky toraňnylyklarda, Daşköpri bilen Soltanbent aralygynda XX asyryň ortasynda **teňňe nagyşly daşdeşen – *Picus squamatus*** ýaşapdy. Ol ýaşyl daşdeşene örän çalymdaş, ondan bedeniniň aşak tarapyndaky teňňe nagyşlaryň garamtyldygy we çüňküniň sarydygy, şeýle-de olaryň bilelikde bir ýerde ýaşamaýandyklary bilen tapawutlanýar. Daşköpri we Saryýazy suw howdanlary gurlanda köp ýaşan toraňnylary suw basmagy we olaryň çapylmagy, bu görnüşiniň biziň ýurdumyzdan ýitip gitmegine getirdi. Görnüşi Amyderýanyň, Murgap we Tejen derýalarynyň kenaryakalarynda saklanyp galan toraňnylyk ýerlerine getirip göýbermek usuly bilen (Owganystandan ýa-da Päkistandan) dikeltmek mümkin.

SERÇEŞEKILLILER – PASSERIFORMES – ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ

Daşky görnüşi, ýaşayşy, iýmitlenişi we iýmitini tutmak usullary boýunça anyk tapawutlanýan, aglaba maýda we orta ölçegdäki guşlar otrýady. Horazlary mäkiýanlaryndan, adatça, ulurak, reňki boýunça jyns tapawutlary (dimorfizm) görnüşleriň köpüsünde aýdyň görünýär. Kontinentleriň (Antarktidadan we ummanlaryň içindäki käbir adalardan başgalarynda) hemmesinde ýaýran. Olar tropik ýurtlarda has köpdürli we köpsanly bolýarlar. Guşlaryň hemmesi diýen ýaly monogam. Jübüt bolup ýaşýarlar, köpelmeýän wagtlary olaryň köpüsi uly bolmadyk toparlary ýa-da sürüleri döredýärler. Höwürte gurmak ukyby güýçli ösendir we 4-den 9-a çenli ýumurtga guzlaýarlar.

228. Примечание: у нас в тугаях на Мургабе между Дашкепри и Султанбентом в середине прошлого века обитал **чешуйчатый дятел – *Picus squamatus***, который очень похож на зеленого дятла; отличается темным чешуйчатым рисунком на нижней стороне тела и желтым клювом, хотя с ним совместно не обитал. Затопление тугаев при строительстве Ташкепринского и Сарыязынского водохранилищ, а также рубка старых деревьев в тугаях привели к исчезновению этого вида в нашей стране. Его необходимо восстановить путем выпуска птиц (из Афганистана или Пакистана) в сохранившиеся участки тугаев на Амударье, Мургабе и Теджене.

Отряд птиц, преимущественно, мелких и средних размеров, значительно различающиеся по внешнему виду, образу жизни, питанию и способом добывания кормов. Самцы, как правило, крупнее самок, у большинства видов в окраске выражен половой диморфизм. Распространены на всех континентах, кроме Антарктиды и некоторых океанических островов, особенно разнообразны и многочисленны в тропиках. Почти все моногамы. Живут парами, вне периода размножения многие образуют небольшие группы или стаи. Сильно развита способность к гнездостроению. В кладке от 4 до 9 яиц. У большинства видов выкармливают птенцов оба



Guşlaryň uçup barýarka görnüşi: 1 – oba garlawajy; 2 – dag garlawajy; 3 – gara atgarlawajy; 4 – kiçi çerik; 5 – altynsow daraklyk; 6 – garlawaç pisint çemen çulugy; 7 – zakyja garga; 8 – ekinçi garga; 9 – uly garga.

Птицы в полете: 1 - деревенская ласточка; 2 - воронок; 3 - черный стриж; 4 - малая крачка; 5 - золотистая щурка; 6 - луговая тиркушка; 7 - галка; 8 - грач; 9 - ворон.

Görnüşleriň aglabasynda jüýjelerini iýmitlendirmäge guşlaryň ikisi-de gatnaşýar. Görnüşleriň köpüsi ýylda iki gezek köpelyärler. Iýmitleniş gatyşyk, mör-möjekleri, aýratyn-da zyýankeş görnüşlerini we ösümlikleriň – haşal otlaryň tohumlaryny çokýarlar. Ýyly howaly giňişliklerde oturymly we göçüp-gonup, aram hem ýokarky guşaklyklarda-uçup geçip gitmek ýaşayşyny alyp barparlar. Dünýäde 5 müňden gowrak görnüş, olaryň – 189-zyy Türkmenistanda.

Garlawaclar – *Hirundinidae* – Ласточковые

Ululygy serçe ýaly, agyz ke-simi giň, adaçça, ýaba guýrukly, aýaklary ejiz hem gysga, düýbi ýaýraň (ýepbeşik) kelte çüňkli we çowly ganatlary uzyn guşlar maşgalasy. Howada uçup barýarkalar tutan mör-möjekleri bilen iýmitlenýärler. Dünýäde – 75, Türkmenistanda 6 görnüş.

229. Kenar garlawajy – *Riparia riparia* – Береговая ласточка

Meýdan alamatlary: serçeden maýda. Göwresi süýri, **ganatlary uzyn çowly we guýrugu ýalpak oýukly. Arkasy tutuşlygyna goňur we edil şonuň ýaly petekesinde hem-de döşinde kese aýlawy bolýar, bokurdagy ak.** Horazynyň reňki mäkiýanyna meňzeş. Ýaş guşlar arka ýelekleriň jähekleriniň çypardygy we bokurdagyň goňrakdygy bilen tapawutlanýar. Aýaklary gara dyrnakly melemtil-goňur. Çüňki gara. Sesi guraksy, pessaýja jikgildi – “sirr-sirr”. Uzynlygy – 124-142, ganaty – 100-113, ganatlaynyň gerimi – 282-295 mm, agramy 12.8-15.2 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **döşündäki mese-mälim kese goňur**

родителя. Многие виды размножаются дважды в году. Питание чаще смешанное, потребляют насекомых, в том числе вредоносных, и семена растений, в том числе сорняков. В теплых климатических широтах ведут, преимущественно, оседлый и кочующий образ жизни, в умеренных и высоких широтах – перелетные. В мире свыше 5 тыс. видов (73 семейства), в Туркменистане – 189 представителя из 23 следующих далее семейств.

Семейство птиц размером с воробья, с длинными острыми крыльями, короткими слабыми ногами и коротким приплюснутым клювом, широким ртом и, обычно, вильчатым хвостом. Питаются насекомыми, которых добывают на лету. В мире 75, в Туркменистане – 6 видов.

Полевые признаки: размером меньше воробья. Туловище удлиненное, **узкие длинные заостренные крылья и неглубокая вырезка на хвосте. Сплошь бурая спина и такая же перевязь поперек зоба и груди, горло белое.** Самец и самка окрашены одинаково. Молодые отличаются рыжеватыми каемками перьев на спинной стороне и буроватым горлом. Ноги буровато-коричневые с черными когтями. Клюв черный. Голос – негромкое сухое щебетание «цирр-цирр». Длина – 124-142, крыло – 100-113, размах крыльев – 282-295 мм, вес 12.8-15.2 г.

Сходства – отличия: от других

zology we guýrugynyň ýalpak oýukdygy bilen beýleki garlawaçlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: giň, höwürtegeleýän yerleri – Ýewropa, Aziýa, Demirgazyk Amerika, olaryň günorta-gündogar çetinden başgalary. Orta Aziýanyň we Türkmenistanyň hemme ýerlerinde, esasan hem, derýalaryň jülgele-rinde we oazislere. Hindistanda, Afrikanýň günorta böleginde we Günorta Amerikanyň merkezi welayat-laryndan guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän höwürtegeleýän guş. Ýazyna – martyň soňunda, aprelde uçup gelyär, güýzüne – oktýabrda uçup gidýär. Süri bolup gezýär, uly topar bolup, çäge ýada topur alnan oýlarda, köwleriň, kanallaryň, uly ýaplaryň kert kenarly ýerlerinde, käte guýularyň diwarlaryndaky hinlerde höwürtegeleýär. 3-5 sany ak reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 12.45 x 17.63 mm. Maýdajyk mör-möjekler: çybynlar, siňekler, günnlükçiler bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty, gyrađeň ýaýrawly bolmadyk, käbir ýerlerde köpsanly görnüş.

230. Gaýa garlawajy – *Hirundo rupestris* – Скальная ласточка

Meýdan alamatlary: keşbi kenar garlawajy ýaly, emma ulurak. **Guýrugynyň oýuk ýeri ýalpak we ak süýri tegmilleri bolýar.** Arkasy goňur, kesellesi has garamtyl. **Uçan wagtynda garyn tarapy garamtyl, ganatlarynyň aşagy has goňur bolup görünýär.** Çüňki gara, aýaklary aksowult-goňur, gözleriniň göreji goýy goňur. Sesi pessaýja jikgildi. Uzynlygy – 140-151, ganaty – 121-134,

ласточек отличается **четкой бурой полосой поперек груди** и неглубокой вырезкой хвоста.

Распространение: широкое, область гнездования – Европа, Азия, кроме юго-восточных областей, Северная Америка. В Средней Азии и Туркменистане повсеместно, но, в основном, в долинах рек и оазисах. Зимуют в Индостане, южной половине Африки и центральных областях Южной Америки.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весенний пролет – с конца марта и в апреле, осенний – в октябре. Держатся стаями, гнездятся в норах колониями, которые устраивают по обрывистым глиняным или песчаным берегам, карьерам, оврагам, каналам, крупным арыкам, иногда поселяются в стенах колодцев. Одна кладка в году – от 3 до 5 белого цвета яиц, размеры 12.45 x 17.63 мм. Питаются мелкими насекомыми: комарами, мухами, поденками.

Статус: обычный, местами многочисленный вид с неравномерным распределением.

Полевые признаки: обликом с береговую ласточку, но крупнее. **Хвост слабовеямчатый и имеет овальные белые пятна.** Спина бурая, голова более темная. **Брюшная сторона в полете выглядит темной, а испод крыла темно-коричневый.** Клюв черный, ноги бледно-бурые, радужка глаз темно-бурая. Голос – негромкое щебетание. Длина – 140-151, крыло – 121-

ganatlarynyň gerimi – 345 mm, ag-ramy 15.2-18.2 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: guýrugy tegelenen-süýri uly ak (beýleki garlawaçlarda ýok) tegmili bilen beýleki garlawaçlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeýän yerleri – Günorta Ýewropa, Afrikanyň demirgazyk-günbatar çetleri, Kawkaz, Kiçi, Alynky, Orta we Merkezi Aziýanyň günortasy. Türkmenistanda Uly we Kiçi Balkan daglary, Köpetdag, Köýtendag. Höwürtegeýän böleginiň günorta çäklerinde, şeýle-de Gündogar Afrika-da gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtegeýän, göçüp-gonyan, käýerlerde oturymly görnüş. Ýazyna aprelda uçup gelyär, güýzine – awgustda uçup gidýär. Daglaryň 1200-3000 m beýikliklerinde höwürtegeýär. Dag gaýalarynda palçyk lokgajyklaryndan höwürtege gurýar. 2-5 sany melemtil-goňur nokatly we inçe çyzykly ak reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri 14.5 x 21.1 mm. Jüyjeleri, maýyň ortasyndan iýunyň başyna çenli uçurym bolýarlar. Beýleki garlawaçlar ýaly maýdajyk mörmöjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: dag jülgelerinde we dere-lerinde adaty görnüş.

231. Sapak guýrukly garlawaç – *Hirundo smithii* – Нитехвостая ласточка

Meýdan alamatlary: horazla-runyň guýrugunyň gapdal ýelek-leriniň sapakşekilli uzundygy mese-mälim görünýär. Kellesiniň üsti we ýaňaklary ýagty poslurak-çupar reňkli. Üstki tarapy güýçli ýaldyraýan goýu ýaşyl-gök öwüşginli. Aşak tarapy arassa ak. Sesi – pessaýja

134, размах крыльев – 345 мм, вес 15.2-18.2 г.

Сходства – отличия: на хвосте большие округленно-вытянутые белые пятна, чего нет у других ласточек.

Распространение: область гнездования – Южная Европа, крайний северо-запад Африки, Кавказ, Малая, Передняя, юг Средней и Центральная Азия. В Туркменистане – Большие и Малые Балханы, Копетдаг, Койтендаг. Зимуют в южных пределах описанного ареала, а также в Восточной Африке.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся, кочующий, частично оседлый вид. Весной прилетают в апреле, осенью отлетают в августе. Гнездятся в горах на высотах 1200-3000 м. Гнезда строят на стенах скал из комочков глины. В кладке 2-5 белого цвета с небольшим числом буровато-коричневых точек и штрихов яиц. Размеры яиц – 14.5 x 21.1 мм. Птенцы в гнездах – с середины мая до начала июня, хорошо летающие – в середине и в конце мая. Питаются, как и другие ласточки, мелкими насекомыми.

Статус: обычный в горных долинах и ущельях вид.

Полевые признаки: хорошо заметны (только у самцов) длинные нитеобразные боковые перья хвоста. Верх головы ржавчато-рыжего цвета. Верх темно фиолетово-синий с сильным отблеском. Нижняя сторона чисто белая. Голос – негромкое щебетание.

jikgildi. Ganaty – 113-122 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çupar “telpejigi” we guýrugunyň gapdalyndaky sapakşekilli ýelekleri bilen beýleki garlawaçlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealy Afrikanyň günorta bölegini, Günorta (Hindistan, Mýanma), Alynky (Päkistan, Günbatar Owganystan) Aziýany we Orta Aziýanyň günorta bölegini öz içine alýar. Türkmenistanda Guşgy we Köýten derýajyklarynyň jülgelerinde. Günorta Aziýada gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup gelip, höwürtegeýän guş. Aprelda-maýda uçup gelyär, sentýabr-oktyabrda uçup gidýär. Gaýalaryň ýarçyklarynda we gowaklaryň girelgelerinde, köprüleriň aşagynda, käte kenary daşly suwly ýaplarda höwürtegeýär. Aýratyn jübüt bolup gezyär. Höwürtegesi sypallaryň, kökjagzlaryň, ders bölejikleriň palçyga eýlenen lokgasyndan gaýalaryň diwaryna, gowaklaryň girelgelerine ýa-da suwuň üstüne abanyp duran çünlere ýelmenen okarajyk. 2-4 sany gyzylymytyl-goňurak menekli ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri 12.7 x 13.3 mm. Iýun-ýulda jüýjeleýär. Howada uçup barýarka maýda mörmöjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, çakli ýaýran we ýeterlik öwrenilmedik görnüş.

232. Oba garlawajy – *Hirundo rustica* – Деревенская ласточка, или касатка

Meýdan alamatlary: serçe ululyk-da. **Üstki tarapy** maňlaýundan galan ýeri **garamtyl, ýaşylymytyl gök-metal reňkli, seýrek syýa öwüş-ginde bolýar. Maňlaýu, alkymyнуň**

Крыло – 113-122 мм.

Сходства – отличия: от других ласточек отличается рыжей «шапочкой» и нитеобразными боковыми перьями хвоста.

Распространение: ареал охватывает южную половину Африки, Южную (Индия, Мьянма), Переднюю (Пакистан, Западный Афганистан) Азию и южную часть Средней Азии. В Туркменистане – речные долины Кушки и Койтендары. Зимует в Южной Азии.

Образ жизни: гнездящаяся птица. Прилетает в апреле-мае, отлетает в сентябре-октябре. Гнездится в расщелинах скал и пещерных входов, под мостами, даже по берегам каменистых арыков. Держатся отдельными парами. Гнездо – чашечка из глины с примесью былинки, корешков, комочков навоза, прикрепленная к скальным образованиям, сводам пещер, иногда просто в нишах или выбоинах скал над поверхностью воды. В кладке 2-4 белых с красно-коричневыми крапинками яиц, размеры – 12.7 x 13.3 мм. Птенцы – в июне-июле. Питаются мелкими насекомыми, которых ловят на лету.

Статус: немногочисленный и недостаточно изученный вид с ограниченным распространением.

Полевые признаки: величиной не крупнее воробья. **Верхняя сторона**, кроме лба, **темного, си-не-стального цвета с зеленоватым, реже фиолетовым блеском.**

aşagy we bokurdagy posly-goňur.

Petekesi we döşi garamtyl inli kese zolakly. Garyn tarapy ak. Ganatlary we guýrugy ýaldyrawuk gök-gara öwüşginli, guýrugynyň uýj ak tegmilli. Ýaş guşlaryň arkasynyň metal öwüşgini öçügsi, bokurdagy we petekesi çyparak reňkli. Sesi güýçliden pessaýja jikgildi – “wi-wit, çi-wit”. Saýraýşy şowhunly-jikgildili sesler – “til-wili, til-wil-ssrr”. Uzynlygy – 185-206, ganaty – 122-123, ganatlarynyň gerimi – 331-337 mm, agramy 16.6-17.5 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: bokurdagynyň poslyrak, goňur reňki we guýrugynyň çetki ýelekleriniň uzynlygy bilen beýleki garlawaçlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeýän bölegi giň. Tutuş Ýewraziýa we Demirgazyk Amerika, olaryň demirgazyk çetlerinden we günorta çäklerinden başgalarynda. Orta Aziýada we Türkmenistanyň hemme ýerlerinde, Amyderýa, Garagum, Murgap, Tejen, Etrek derýalarynyň jülgelelerinde we oazislerde köprük. Günorta Amerikada, Merkezi we Günorta Afrikada, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän - höwürtlegeýän guş. Ýazyna – mart-aprelde, güýzine – sentýabryň soňunda we oktýabryň ortasyna çenli uçup geçýär. Taşlanan, wagtlaýn peýdalanylmaýan jaýlarda, ammarlarda, şeýle-de köprüleriň aşagynda höwürtlegeýär. Höwürtgese-jaýlaryň diwaryna ýada eýwanyň kese agajyna guşlaryň sülekeyi bilen eýlenen palçyk lokgajyklaryndan gurulan ýarymaýşekilli okarajyk. Höwürte guranlarynda, guşlar palçyk lokgajyklaryna otjagazlary, sypallary, atyň gyllaryny berklik

Лоб, подбородок и горло ржаво-коричневые. Поперек зоба и груди довольно широкая черноватая полоса. Брюшная сторона белая. Крылья и хвост блестящие сине-черные, пятна на конце хвоста белые. Молодые имеют менее выраженный металлический блеск на спинной стороне, горло и зоб рыжеватые. Голос звонкий, но не громкий – щебетание «ви-вит, чивит». Песня – щебечуще-трескучие звуки «тиль-вили, тиль-виль-цпрр». Длина – 185-206, крыло – 122-123, размах крыльев – 331-337 мм, вес – 16.6-17.5 г.

Сходства – отличия: от других ласточек отличается ржаво-коричневым горлом и длинными крайними перьями хвоста.

Распространение: гнездовая часть ареала широкая – Евразия и Северная Америка, исключая крайние северные и южные их области. В Средней Азии и Туркменистане повсеместно, но больше в долинах Амударьи, Каракумдарьи, Мургаба, Теджена, Этрека и в оазисах. Зимует в Южной Америке, Центральной и Южной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весенний пролет – в марте-апреле, осенний – с конца сентября и до середины октября. Гнездится в заброшенных зданиях, верандах, складах, а также под мостами и арками. Гнездо – чашечка, слепленная из комочков глины, помещается, обычно, у потолка на стене или балке. Между комочками глины птицы вкладывают соломинки и травинки, конский волос. Из-

üçin goşýarlar we okarajygyň içine ýumşak otjagazlary, guş ýeleklerini düşeyärler. Birinji gezek 4-6 we ikinjide – 3-4 sany goňrak-gyzyl menekli ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 13.8 x 19.4 mm. Jüýjeler birinji tapgyrda ýumurtgalardan maý aýunyň soňunda, ikinjisi, iýulyň ahyrynda çykýar. Maýdajyk mörmöjekleri, çy-bynlary howada tutup ýimitlenýär.

Statusy: ekerançylyk ýerlerinde adaty görnüş, käbir ýerlerde öňkülere garanynda sany azaldy.

233. Daş garlawajy – *Hirundo daurica* – Рыжепоясничная, или даурская ласточка

Meýdan alamatlary: oba garlawajyndan maýda. Ýaşy ýeten horazlarynyň üstki tarapy ýaldyrawuk **garamtyl-gök** reňkli. Bili, kellesiniň yz tarapy we gapdallary çypar-gülgüne. **Garyn tarapy we ganatlarynyň aşagy** insiz dik garamtyl menekli **agymtyl-çypar**. Çünki gara, aýaklary gyzlymtyl-goňur. Ýaş guşlaryň arka tarapy has öçügsi reňkli, bili çypar dälde, kirliräk-ak. Sesi-pessaýja jikgildi. Uzynlygy – 183-198, ganaty – 114.5-116.8, ganatlarynyň gerimi – 314.5-316.5 mm, agramy 17.7-21 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: biliniň we kellesiniň gapdallarynyň çypar-dygy, bedeniniň aşaky tarapyň aladygy bilen beýleki garlawaçlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta Ýewropa, Kiçi, Alynky, Aziýa, Orta Aziýanyň günortasy, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýa, Gündogar we Demirgazyk Afrikada (käbir ýerlerinde). Türkmenistanda Köýtendagda höwürtlegeýär, galan böleginde uçup

нутри гнездо выстилается мягкой травой, перьями. В первой кладке 4-6, во второй 3-4 белых яйца с буро-красными крапинками, размеры 13.8 x 19.4 мм. Птенцы первой кладки появляются в конце мая, второй – в конце июля. Кормятся мелкими насекомыми, включая комаров, которых ловят в воздухе.

Статус: обычный вид, особенно в сельскохозяйственном ландшафте, местами численность, по сравнению с прошлым заметно уменьшилась.

Полевые признаки: размером меньше деревенской ласточки. Взрослые самцы **сверху темно-синего** блестящего цвета. **Поясница, голова сзади и с боков – рыжеоранжевые.** Брюшная сторона и испод крыла – беловато-рыжеватые с узкими темноватыми продольными пестринами. Клюв черный, ноги красновато-бурые. Молодые отличаются более тусклым цветом спинной стороны, поясница не рыжая, а грязно-белая. Голос – негромкое щебетание. Длина – 183-198, крыло – 114.5-116.8, размах крыльев – 314.5-316.5 мм, вес – 17.7-21 г.

Сходства – отличия: от других ласточек отличается рыжей поясницей и рыжими боками головы, пестрым низом тела.

Распространение: Южная Европа, Малая, Передняя, юг Средней, Южная и Юго-Восточная Азия, Восточная и местами Северная Африка. В Туркменистане гнездится в Койтендаге, в остальных частях может

geçýän mahaly duşmagy mümkin. Günorta (Hindistan, Bangladeş, Mýanma) Aziýada, Merkezi we Günorta-Gündogar Afrikada guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän - höwürtleýän guş. Ýazyna aprelde uçup gelýär, güýzine – awgustda uçup gidýär. Çägesow-mele toprakly gum gaýaly köwlerde we adamlaryň ýaşayan jaýlarynda höwürtleýär. Ýekelikde, seýrek, kiçiräk topar bolup gezyär. Maý-iyun aýlarynda 5-6 sany ak reňkli ýumurtgalary guzlaýar, ölçegleri - 13.14 x 19.12 mm, iýulda – jüýjeleri çykýar. Beýleki garlawaçlar ýaly mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, çäkli ýaýran, gowşak öwrenilen görnüş.

234. Dag garlawajy – *Delichon urbica* – Воронок

Meýdan alamatlary: gelsikli be-den gurluşly uly bolmadyk garlawaç. Kellesi, arkasy, ganatlary we guýrugy goýy gögümtil-gara, bokurdagy, döşi, garny we bili agymtyl ýa-da kirliräk-ak. **Guýrugynyň oýukdygy we guýrugüstiniň inli ak reňklidigi anyk görünýär.** Çünki gysga we gara, aýaklary ýelek örtükli. Sesi güýçli – “tirrç-tirrç”. Ganaty – 103.9-104.2 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: guýrugynyň üstündäki inli ak reňki bilen beýleki garlawaçlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän ýerleri giň. Ýewraziýanyň, demirgazyk çaklerinden başga hemme ýerleri. Orta Aziýada we Türkmenistanda daglyk ýerlerde, seyle-de uçup geçende düzlük giňişliklerde duşýar. Günorta we Günorta-Gündogar Aziýada we Afrikanyň, demirgazyk-gündogar böleginden başgalarynda guşlaýar.

попасться на пролете. Зимует в Южной (Индия, Бангладеш, Мьянма) Азии, Центральной и Юго-Восточной Африке.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весной появляется в апреле, осенний отлет в августе. Гнездится по лессово-песчаным оврагам, в жилищах человека. Встречается одиночно, редко небольшими группами. Кладка из 5-6 белых яиц в мае-июне, размеры 13.14 x 19.12 мм, птенцы – в июле. Питается, как и другие ласточки, насекомыми.

Статус: немногочисленный, слабо изученный вид с ограниченным распространением.

Полевые признаки: небольшая ласточка компактного телосложения. Голова, спина, крылья и хвост темные – синевато-черные, а горло, грудь, брюшко, и поясница – светлые или грязновато-белые. **Хвост с неглубокой, но яркой вырезкой и широким белым надхвостьем.** Клюв короткий, черный, ноги оперены. Голос – звонкое «тиррч-тиррч». Крыло – 103.9-104.2 мм.

Сходства – отличия: от других ласточек отличается широким белым надхвостьем.

Распространение: область гнездования широкая – почти вся Евразия, за исключением северных областей. В Средней Азии и Туркменистане горные районы, на пролете также на равнинах. Зимуют в Южной и Юго-Восточной Азии и Африке, за исключением северо-восточных частей.

Ýaşayşy: uçup geçýän - höwürtleýän guş. Ýazyna mart-aprelde, güýzine – sentýabrda uçup geçýär. Dagda höwürtleýär, adatça, kert gaýalaryň kiçiräk oýuk ýerlerini saýlap alýar. Maý aýynda höwürtleýär. 4-6, käte 7 sany arassa ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 12.2 x 19.4 mm. Uçurym bolan guşlar iýun-iyul aýlarynda duşýar. Ownuk mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: biziň daglarymyzyň käbir ýerlerinde adaty görnüş.

Torgaýlar – *Alaudidae* – Жаворонковые

Ачык meýdan giňişlikleriniň: düzlük meýdanlaryň, sähralyk, çöl-lük, beýik daglardaky otluk ýerleriň ýaşayşy, orta we uly bolmadyk ölçeglerdäki guşlar maşgalasy. Aýaklarynyň yzky barmaklary ýiti we uzyn dyrnakly. Söbüginiň yz tarapy tegelenen we birnäçe teňňejikler bilen örtülen. Ganatlary uzyn hem inli, bu guşlaryň köpüsi saýran mahalynda ganatlaryny tiz kakyp, uçup ýokaryk galýarlar. Torgaý guşlary ýerde köp gezyär we reňki töwerek bilen çalymdaş. Mör-möjekler, ösümlikleriň tohumlary bilen iýmitlenýärler. Ýerde çöl torgaýy gaýalardaky oýuk ýerlerde höwürtleýär. 2-6 sany köpsanly çal we goňur meneklije ak ýumurtgalary goýýar. Dünýäde 70-den gowrak görnüş, olardan 14-si Türkmenistanda.

Образ жизни: пролетно-гнездящаяся птица. Весенний пролет – март-апрель, осенний – в сентябре. Гнездятся в горах, выбирая обычно места на отвесных скалах с небольшими углублениями. Гнезда – в мае. В кладке 4-6, иногда 7, чисто белых яиц, размеры 12.2 x 19.4 мм. Молодые встречаются в июне-июле. Питается мелкими насекомыми.

Статус: в горах у нас местами обычный вид.

Семейство птиц средних и некрупных размеров – обитатели открытых ландшафтов: полей, степей, пустынь, высокогорных лугов. Ноги сильные с острыми и длинными когтями задних пальцев. Цевка сзади округлая, покрыта несколькими щитками. Крылья длинные и широкие, многим жаворонкам характерен трепещущий полет во время пения. Окраска жаворонков хорошо маскирует их на земле. Питаются насекомыми и семенами растений. Гнездятся на земле, только пустынный жаворонк – в выбоинах скал. Кладка из 2-6 белых с многочисленными серыми и бурыми крапинками яиц. В мире более 70 видов, из них 14 – в Туркменистане.

235. Çöl torgaýy – *Ammomanes deserti* – Пустынный жаворонк

Meýdan alamatlary: garasardan sähelçe kiçi. **Gülgüne öwüşginli goňurrak-çal birmeňzeş reňkli. Gözüniň töweregii agymtyl ýelekli.** Kellesiniň üsti dik goňur zolakly. Guýrugynyň üsti agymtyl-

Полевые признаки: величиной несколько меньше скворца. **Общая окраска однотонная буровато-серая с розоватым оттенком.** Вокруг глаз перья беловатые. Верх головы с бурыми продольными полосками.

çypar reňkli. Bedeniniň aşaky tarapy çyparrak-ak. Bokurdagy ak, onuň gapdallary, şeýle-de petekesi we döşüniň öňki bölegi goňurrak meneklenen. Guýrugy, goýu goňur ýelekleri gülgüne-goňurrak jähekli. Çünki goňurrak-şah reňkli, aýaklary goňurrak. Ýaş guşlaryň arkasyndaky ýelekleri ak jähekli. Sesi-guraksy gysga owaz. Saýraýşy batly – “wit-wit-ti-wit-tit-iri-tit-ti-ti”. Uzynlygy 170–180, ganaty – 95-110, ganatlarynyň gerimi – 305-330 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: bir-meňzeş gülgüne reňki bilen beýleki torgaýlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Demirgazyk Afrika, Günorta-Gündogar Aziýa. Merkezi Aziýanyň hemme ýerlerinde. Türkmenistanda Hazar deňziniň gündogar kenaryndan Bathyza, Garabile we Köýtendaga çenli, Günorta Üstýurtda ýaýran.

Ýaşayşy: höwürtegeleýän, guşlaýan we göçüp-gonýan guş. Pes daglyk we beýikli-pesli ýerli meýdanlarda ýaşayar. Jübüt we süri bolup, dag eňňitlerinde, beýik boldadyk kirşenli baýyrlarda, selçeň ösen gyrymsyly daşly ýerlerde gezýär. Çäge-çöllükde seýrek duşýar. Mart aýynda höwürtegemäge girişýär, ýylda iki gezek köpelyär, 5-6 sany ýumurtga goýýar. Ösümlikleriň tohumlary we mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: ýeterlik öwrenilmedik, adaty we käbir ýerlerde seýrek görünüş.

236. Mollatorgaý – *Galerida cristata* – Хохлатый жаворонок

Meýdan alamatlary: garasardan biraz kiçi. Üstki tarapy, goňurrak-çal, dik, inli we ortasy garamyl ýelekli.

Надхвостье бледно-рыжее. Нижняя сторона тела рыжевато-белая. Горло белое, по его бокам, а также на зобе и передней части груди, буроватые крапинки. Конец хвоста темно-бурый с розовато-буроватыми каемками перьев. Клюв буровато-роговой, ноги буроватые. У молодых перья на спинной стороне со светлыми каемками. Голос – короткая сухая трель. Песня – громкое «вит-вит-ти-вит-тит-ири-тит-ти-ти». Длина – 170-180, крыло – 95-110, размах крыльев – 305-330 мм.

Сходства – отличия: от других жаворонков отличается однотонной розовой окраской.

Распространение: Северная Африка, Юго-Западная Азия. В Средней Азии – повсеместно. В Туркменистане – от восточного побережья Каспийского моря до Бадхыза, Карабиля и Койтендага, на Южном Устюрте.

Образ жизни: гнездящаяся, зимующая и кочующая птица. Населяет низкогорья и предгорные равнины с пересеченным рельефом. Держится парами и стайками на горных склонах, невысоких глинистых холмах, каменистых участках с разреженной растительностью. В песчаной пустыне встречается редко. К размножению приступает рано – в марте, две кладки в году, в кладке 5-6 яиц. Питается семенами и насекомыми.

Статус: обычный, местами редкий, не достаточно изученный вид.

Полевые признаки: величиной несколько меньше скворца. Окраска верха буровато-серая с про-

Аşaky tarapy, bokurdagynyň gapdallary we petekesi gara-goňur menekli sarymtyl-ak. Ganatlary we guýrugy goýu goňur. **Kellesi oňat görünýän ýiti uçly hüpükli.** Çünki uzyn we inçe, aýaklary agymtyl-goňur. Ýaş guşlar ala, ak we goňur menekli goňurrak-çalymtyl, şeýle-de ýeňsesindäki ýelekleri uzalan, guýrugynyň gapdallaryndaky ýelekleri çypar reňkli, arkasy we kellesi tegelegräk sarymtyl-agymtyl tegmili. Sesi – “iri-iri-tri-trii” we asaja “džýui”. Saýraýşy-mylymyly, jik-gildili owazlaryň toplumy, köplenç ir säherde asmana galyp saýraýar, ýöne guşuň gyrymsylara gonup, oturan wagty saýramagda mümkin. Jübüt we süri bolup ýerde gezýär. Uzynlygy–190–205, ganaty – 95-118, ganatlarynyň gerimi – 330-370 mm, agramy – 45 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çowly uzyn hüpügi bilen beýleki torgaýlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günbatar Ýewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta-Günbatar Aziýa. Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanyň hemme ýerlerinde.

Ýaşayşy: oturymly guş, ýerli göçüp - gonma uçşlary geçirmegi mümkin. Çöllük, ýarym çöllük, gurak sähra, daglyk (1500-1600 m çenli), derýä jülgelerini we oazislere eýeleýär. Açyk giňişlikli ýerlere ýakyn durýar. Ýylda iki gezek – mart-maý aýlarynda köpelyär. 3-5 sany garamtyl meneklije, agymtyl ýumurtgalary goýýar. Çöl we haşal otlaryň tohumlary, mör-möjekler bilen iýmitlenýär

Statusy: adaty, giň ýaýran, käbir ýerlerde köp sanly guş.

дольными, широкими и темными центрами перьев. Низ сливочно-белый с черно-бурыми пятнами на боках горла и зобе. Крылья и хвост темно-бурые. **На голове хорошо заметный остроконечный хохол.** Клюв длинный и тонкий, ноги бледно-бурые. Молодые пестрые, буровато-серые с белыми и черными пятнышками, а также удлиненными перьями на затылке и рыжеватой окраской боковых перьев хвоста, с желтовато-беловатыми кругловатыми пятнами на спине и голове. Голос «ири-ири-три-трии» и тихое «джюи». Песня – набор мелодичных трелей, поет чаще по утрам, поднимаясь высоко в небо, но может петь и сидя на кусте. На земле держится парами и стайками. Длина – 190-205, крыло 95-118, размах крыльев – 330-370 мм, вес – 45 г.

Сходства – отличия: хорошо узнаваемый жаворонок. От других жаворонков отличается длинным заостренным хохолком.

Распространение: Западная Европа, Северная Африка, Юго-Западная Азия. В Средней Азии, в том числе и Туркменистане – повсеместно.

Образ жизни: оседлая птица, может совершать местные перемещения. Населяет пустыни, полупустыни, сухие степи, горы (до 1500-1600 м), речные долины и оазисы. Тяготеет к открытым местообитаниям. Размножается два раза в году, в марте – мае. Кладка из 3-5 беловатых с темными пятнами яиц. Питается семенами пустынных и сорных растений, насекомыми.

Статус: обычная, местами многочисленная птица с широким распространением.

237. Sähra torgaýy – *Melanocorypha calandra* – Степной жаворонок

Meýdan alamatlary: garasar olçepli, uly torgaý. Bedeniniň ýokarky tarapy dik goňur menekli goňurrak-çal. Garyn tarapy agymtyl. **Petekesiniň gapdallary uly gara tegmilli, käwagt ol tegmilleriň olaryň birleşmekleri hem mümkin,** döşüniň oň tarapy sarymtyl-goňur menekli. Gaşynyň üstündäki zolak agymtyl. Ganatlary we guýrugy goýu-goňur, guýrugynyň gapdallaryndaky zolak ak. Ýaş guşlaryň ýelekleri ak ýa-da sarymtyl jähekli, petekesi we döşi goýu goňur tegmilli. Çünki we aýaklary sarymtyl-goňur. Ýerde gezýär, köplenç ýokaryk galyp howada saýraýar. Saýraýşy gaty sesleriň, beýleki guşlaryň seslerine öýkünme owazlaryň we sykylyklaryň toplumu. Bedeniniň uzynlygy – 198–220, ganaty – 125–135, gerimi – 385–425 mm, agramy – 43,3 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: petekesindeki iki gara tegmili, alaboýun torgaýdan, ganatlarynyň yzky gyrasyndan geçýän ak zolagy, guýrugynyň gapdalyndaky kiçiräk ak tegmilleri we döşüniň aladygy bilen beýleki torgaýlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta Ýewropa, Demirgazyk-Günbatary Afrika, Kiçi we Günorta-Günbatary Aziýa. Orta Aziýada sähra we ýarymçöllük düzlüklere. Türkmenistanda, Etrekde, Köpetdagda, Bathyzda, Garabilde, Köýtendagyň eteginde.

Ýaşaýşy: oturmly we göçürgönýän guş. Dag etekleriniň düzlüklerinde, dagüsti sähralyklarda, oazislere gyraýakalarynda ýaşaýar. Höwürtegeýän wagtlary jübüt we galan döwürde süri bolup, ýerde gezýär.

Полевые признаки: крупный жаворонок, величиной со скворца. Окраска верхней стороны тела буровато-серая с продольными бурыми пестринами. Брюшная сторона светлая. **На боках зоба крупные черные пятна, которые иногда могут соединяться на зобе,** а на передней части груди желтовато-бурые пестрины. Надбровная полоска беловатая. Крылья и хвост темно-бурые, полосы по бокам хвоста белые. Молодые с белыми или желтоватыми каемками на перьях, и темно-бурыми пятнами на зобе и груди. Клюв и ноги желтовато-буроватые. Поет высоко в воздухе чаще, чем на земле. Песня – набор громких звучных трелей и свистов с включением подражаний голосам других птиц. Длина тела 198–220, крыло – 125–135, размах – 385–425 мм, вес – 43,3 г.

Сходства – отличия: от других жаворонков хорошо отличается двумя темными пятнами на зобе, а от двупятнистого жаворонка – белой полосой по заднему краю крыла, небольшими белыми пятнами по бокам хвоста и пестринами на груди.

Распространение: Южная Европа, Северо-Западная Африка, Малая и Юго-Западная Азия. В Средней Азии – степные и полупустынные равнины. В Туркменистане – в низовьях Этрека, предгорья, нижний и средний пояс Копетдага, Бадхыз, Карабиль, предгорья Койтендага.

Образ жизни: оседлая и кочующая птица. Населяет предгорные и нагорные степи, окраины оазисов.

Höwürtegesini ýerde gurýar. Iki gezek – aprel-maý aýlarynda köpeliär. 2-5 sany kirliräk-agymtyl ýa-da goňurrak-çal menekli agymtyl-goňur ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler, çöl hem haşal otlaryň tohumlary bilen ýimtilenýär.

Statusy: dag eteklerinde höwürtegeýän wagty adaty, käbir ýerlerde köpsanly, ýöne daglyk ýerlerde az sanly görnüş. Gyşyna belli-belli ýerlerde örän köpsanly.

238. Alaboýun torgaý – *Melanocorypha bimaculata* – Двупятнистый жаворонок

Meýdan alamatlary: garasar ululygynda. Sähra torgaýyna çalymdaş, ýöne **ganatlarynyň yzky gyrasyndan geçýän ak zolagy we petekesiniň ortasyndaky ownuk menekleri ýok.** Guýrugy, ortaky jübüt ýeleginden galany, ak uçly gara-goňur. Petekesindeki tegmilleri birleşip, insiz kese zolagy döredýär. Ýaş guşlar sähra torgaýyna çalymdaş, ýöne üstüniň umy reňki çalymtyl. Çünki we aýaklary sarymtyl-goňur. Saýraýşy – sähra torgaýynyň owazyňa örän çalymdaş. Ganaty – 111–119 mm.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: sähra torgaýyna örän çalymdaş, ganatlarynyň yzky gyrasyndan geçýän ak zolagyň we döşünde maýda menekleriň ýoklugy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta-Günbatary we Merkezi Aziýa. Bizde Demirgazyk-Günbatary we Günorta-Günbatary

Держится на земле в гнездовое время парами, в остальное – стаями. Гнездо устраивает на земле. Две кладки – в апреле-мае. Кладка из 2-5 грязно-беловатых или бледно-буроватых яиц с буровато-серыми крапинками. Питается насекомыми и семенами пустынных и сорных растений.

Статус: в предгорьях в гнездовое время обычный, местами многочисленный, но в горах немногочисленный вид. В зимнее время местами очень многочислен.

Полевые признаки: величиной со скворца. Похож на степного жаворонка, **но по заднему краю крыла нет белой полосы и мелких пестрин по центру груди.** Рулевые, кроме средней пары, черно-бурые с белыми вершинами. Пятна на зобе соединены в поперечную узкую полосу. Молодые птицы похожи на степного жаворонка, но общий тон верха сероватый. Клюв и ноги желтовато-буроватые. Поет на земле, но чаще в воздухе. Песня очень похожа на песню степного жаворонка. Крыло – 111–119 мм.

Сходства – отличия: очень похож на степного жаворонка, отличается отсутствием белой полосы по заднему краю крыла и мелких пестрин на груди.

Распространение: Юго-Западная и Средняя Азия. У нас – Северо-Западный и Юго-Западный Туркменистан, Большие и Малые Балханы,

tar Türkmenistanda, Uly we Kiçi Balkanda, Köpetdagda we olaryň eteklerinde, Bathyzda, Garabilde, Köytendagyň eteginde, şeýle-de Günorta Üstýurtda.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtlegeýän, ýek-tük gyşlaýan guş. Ýazyna aprelde, güýzine – oktyabryň ikinji ýarymynda we noýabrda uçup geçýär. Selçeň ösümlikli dykыз torrakly, toýunly, daşly we beýleki ýerlerde ýaşayar. Höwürtelände jübüt, galan döwürde süri bolup gezyär. Apreliň ortasyndan iýun aralykda ýerde höwürtlegeýär. 3-6 sany goňur meneklije tutuk-agymtyl ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler, çöl we haşal otlaryň tohumlary bilen iýmitlenýär.

Statusy: oňaly şert bolan ýerlerde adaty, käbir ýerlerde köp sanly guş.

239. Akganat torgaý – *Melanocorypha leucoptera* – Белокрылый жаворонок

Meýdan alamatlary: serçeden ulurak. **Kellesiniň üsti, egni, boýnunyň gapdallary tegmilli we guýrugynyň üsti çypar reňkli.** Arkasy çalymtyl-goňur, arkasyndaky menekler garamtyl - goňur. Aşagy agymtyl bolup, döşüniň gapdallaryndaky menekler çyppak reňkli. **Ganatlarynyň yzky gyrasyndan inli ak zolak geçýär,** guýrugynyň gapdallary hem ak zolakly. Gözüne ýanaşyk halkanyň gaşy ak. Duluklary we boýnunyň gapdaly agymtyl menekli. Aşagy ak, döşüniň gapdallary çypar menekli. Ýaşlary ganatlarynyň aşagyň akdygy, goňur garny we döşi bilen tapawutlanýarlar. Çünki

Копетдаг и их предгорья, Бадхыз, Карабиль, предгорья Койтендага, а также на Южном Устюрте.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся, частично зимующая птица. Весенний пролет в апреле, осенний – во второй половине октября и ноябре. Населяет глинистые, каменистые и другие плотнопочвенные участки с разреженной растительностью. Держится на земле в гнездовое время парами, а в остальное – стаями. Гнездится с середины апреля по июнь. Гнездо устраивает на земле. Кладка из 3-6 яиц – грязно-беловатых с бурыми крапинками. Питается насекомыми и семенами пустынных и сорных растений.

Статус: в подходящих условиях обычная, местами многочисленная птица.

Полевые признаки: заметно крупнее воробья. **Верх головы, плечи, пятна по бокам шеи и надхвостье рыжие.** Спина серовато-бурая, пестрины на спине черновато-бурые. Низ очень светлый с рыжеватыми пестринами по сторонам груди. Бросается в глаза **широкая белая полоса по заднему краю крыла** и белые полосы по бокам хвоста. Кольцо около глаз и бровь также белые. Щеки и бока шеи с беловатыми пятнами. Низ белый с рыжеватыми пестринами по сторонам груди. Молодые птицы отличаются белыми подкрыльями, бурыми брюхом и грудью. Клюв

gara-şah sypatly, aýaklary goňur. Ýerde, käte howa göterilip saýraýar. Saýraýşy ýönekeý öwazlar. Käte beýleki guşlara öýküýän seslerini goşup saýraýar. Uzynlygy – 176–200, ganaty – 122-125, ganatlarynyň gerimi – 355-382, mm, agramy - 47 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: “telpejiginiň”, duluklarynyň we egniniň çypardygy bilen beýleki torgaýlardan tapawutlanýar.

Ýaşran ýerleri: sähra zolakda Günorta-Gündogar Ýewropadan gündogara Altaý daglaryna çenli. Türkmenistanda düzlük giňişliklerde, oazisler, ýöne köplenç dag eteklerine ýakyn çekilýär.

Ýaşayşy: düzlük-sähra görnüş, bizde gyşlaýan guş. Süri bolup, noýabryň başyndan martyň çenli göçüp-gonýar. Haşal otlaryň tohumlary, gyşyna howa maýlanda mörmöjekler bilen iýmitlenýärler.

Statusy: gyşyna adaty, uçup geçende, käbir ýerlerde köpsanly görnüş.

240. *Bellik:* Türkmenistana käbir ýyllarda **gara torgaý – *Melanocorypha yeltoniensis*** uçup gelyär, onuň horazynyň ýelek örtüğine häsiýetli gara reňki, ony beýleki torgaýlardan oňat tapawutlandyryýar, mäkîýany we ýaş guşlar sähra torgaýuna çalymdaş, emma olaryň boýnunyň gapdallary gara tegmilsiz.

241. Kiçi torgaý – *Calandrella brachydactyla* – Малый жаворонок

Meýdan alamatlary: serçe möçberli torgaý. Bedeniniň üstki tarapy garamtyl dik menekli goňur.

черно-роговой, ноги бурые. Поет, сидя на земле, иногда в воздухе. Песня – несложная трель, иногда включает в себя подражания голосам других птиц. Длина – 176-200, крыло – 112-125, размах крыльев – 355-382 мм, вес – 47 г.

Сходства – отличия: от других жаворонков отличается рыжими “шапочкой”, щеками и плечами.

Распространение: степная зона – от Юго-Восточной Европы к востоку до Алтая. В Туркменистане – всюду на равнинах, включая оазисы, но больше тяготеют к предгорьям.

Образ жизни: равнинно-степной вид, у нас зимующая птица. Кочует стаями с начала ноября до марта. Питается семенами сорных растений, а в зимние оттепели также насекомыми.

Статус: зимой обычный вид, на пролетах местами многочисленный.

240. *Примечание:* на территории Туркменистана в редкие годы, зимой могут отмечаться спорадические залеты из Казахстана **черных жаворонков – *Melanocorypha yeltoniensis***, самцы которых хорошо отличаются от других жаворонков характерной черной окраской оперения, а самки и молодые похожи на степного жаворонка, но без черных пятен по бокам шеи.

Полевые признаки: мелкий жаворонок, не крупнее воробья. Верхняя сторона тела буроватая с

Pelpeleyiş ýelekleri agymytyl, gyalary garamtyl-goňur. **Kellesi çyparrak, bedeniniň aşagy agymytyl. Döşi meneksiz, petekesiniň gapdallary tegmilli.** Ýaş guşlaryň üstki tarapy ala, ýelekleriniň ortasy garamtyl we uçlary ak. Petekesi çyparrak, gapdallary uly menekli. Çünki pahnäşekilli güýçli, edil girrik guşlaryňky ýaly. Aýaklary goňurak. Saýraýşy sesli – “wit-wit-ti-wit-tit-iri-tit-ti-ti”. Guşlar ýerden bat bilen ýokary göterilip, howada saýraýarlar. Uzynlygy – 150–170, ganaty – 88-98, ganatlarynyň gerimi – 272-303 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: bedeniniň üstki tarapyň has garamtyl goňurdygy bilen şorluk torgaýdan tapawutlanýar. Meýdanda çal we inçeçüňk torgaýlardan tapawutlandyrmak kyn, ýöne çal torgaýyndan döşünde menekleriň ýokdygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: giň, Günorta Ýewropa we Demirgazyk Afrika, Aziýada, gündogara Mongoliýa we Günorta-Gündogar Hytaýa çenli. Orta Aziýada, şol sanda Türkmenistanda düzlükleriň hemme ýerlerinde.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtegeleýän we gyşlaýan guş. Düzlük giňişlikleriň guşy, ot örtüklü toýunsow we dykyz toprakly ýerlerde gezýär, aklaň çägelikden, jülgelerdäki we oazislardäki agaç, gyrymsy agaçly tokaýlardan gaça durýar. Ýerde jübut, köplenç süri bolup, aýratyn-da, uçup geçýän wagtlary çal torgaýlar bilen bilelikde gezýär. Höwürtegesi ýerde, uly bolmadyk çukurjyk. Aprel-ýun aýlarynda 4-5 sany goňurak we çalymytyl meneklije, gülgüne-goňur reňkli ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler we ösümlikleriň tohumlary

темными продольными пестринками. Маховые перья темновато-бурые со светлыми краями. **Голова рыжеватая, низ тела беловатый. Грудь без пестрин, с темными пятнами по сторонам зоба.** Молодые птицы сверху пестрые с черноватыми серединами и белыми концами перьев. Зоб рыжеватый с крупными пестринками по сторонам. Клюв сильный конический, почти как у вьюрковых птиц. Ноги буроватые. Песня – довольно громкое «вит-вит-ти-вит-тит-ири-тит-ти-ти». Птицы поют в воздухе, поднимаясь рывками вверх. Длина – 150-170, крыло – 88-98, размах крыльев – 272-303 мм.

Сходства – отличия: от солончакового жаворонка отличается более темным буроватым верхом тела. В природе трудно отличить от серого и тонкоклювого жаворонков, но от серого отличается отсутствием пестрин на груди.

Распространение: широкое – Южная Европа и Северная Африка, в Азии – к востоку до Монголии и Юго-Восточного Китая. В Средней Азии, в том числе и Туркменистане – повсеместно на равнинах.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся и зимующий вид. Равнинная птица, придерживается глинистых и других плотно-почвенных местообитаний с развитым травянистым покровом, избегает барханных песков и древесно-кустарниковых участков в долинах и оазисах. Держится парами, но, в основном, стайками на земле, нередко вместе с серыми жаворонками, особенно на пролете. Гнездо на земле, в небольшом углубле-

биле и ýmitlenýär.

Statusy: adaty, uçup geçýän mahaly köpsanly, käbir ýerlerde has köpsanly, giň ýaýran guş.

242. Çal torgaý – *Calandrella rufescens* – Серый жаворонок

Meýdan alamatlary: serçe ululykdaky kiçi torgaýdan sähelçe ulurak. Bedeniniň üstki tarapy goňur, dik garamtyl menekli. Bedeniniň aşagy tarapyň we guýrugynyň gapdal zolaklary çyparrak-ak. Gaşy ak. **Döşi dik goňur menekli,** menekleriň böwründe goşulşmagy, tegmil sypatyny berýär. **Ganatlary we guýrugy goňur.** Ýaş guşlaryň ýeleklerinde ak jähegiň güýçli ösenedigine garamazdan, onuň reňki biraz garamtyl. Howada saýraýar. Saýraýşy – gysga we hatarly jikgildä meňzeş. Uzynlygy – 160–175, ganaty – 88-105, ganatlarynyň gerimi – 280-320 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: üstki tarapyň has garamtyl-goňur reňki bilen şorluk torgaýdan, döşündäki menekleri bilen kiçi we inçeçüňk torgaýlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropada Ispaniýanyň günorta böleginde, Demirgazyk Afrika, Kiçi, Alynky, Ortaky we Merkezi Aziýada gurak sähralyk, ýarym çöllük we çöllükleriň hemme ýerlerinde. Türkmenistanda, kiçi torgaý ýaly, düzlük meýdan giňişlikleriniň hemme ýerlerinde duşýar.

Ýaşayşy: Ähli pasyllarda duşmak mümkin, uçup geçýär, höwürtegeleýär we gyşlaýar. Diňe bir toýunsow

нии. Кладка из 4-5 розовато-бурых с коричневатыми и сероватыми пятнышками яиц, в апреле - июне. Питается насекомыми и семенами растений.

Статус: обычная, на пролете многочисленная, местами очень многочисленная, широко распространенная птица.

Полевые признаки: мелкий жаворонок, величиной с воробья, чуть крупнее малого жаворонка. Верхняя сторона тела буроватая с темными продольными пестринами. Низ тела и полоски по бокам хвоста рыжеватобелые. Бровь белая. **На груди продольные бурые пестрины,** которые кажутся пятнами при сливании на боках груди. **Крылья и хвост бурые.** Молодые птицы с сильным развитием белых каемок перьев, но несколько темнее. Поет в воздухе. Песня – ряд коротких щебетаний и трель. Длина – 160-175, крыло – 88-105, размах крыльев – 280-320 мм.

Сходства – отличия: от солончакового жаворонка отличается более темной буроватой окраской верха. От малого и тонкоклювого жаворонков – пестринами на груди.

Распространение: в Европе – южная часть Испании, Северная Африка, Малая, Передняя, Средняя и Центральная Азия – везде в сухостепных, полупустынных и пустынных областях. В Туркменистане, также как и малый жаворонок, – повсеместно в равнинной части.

Образ жизни: может быть встречен во все сезоны, пролетает,

ýerlerde däl-de, çöllük ýerlerde hem dag eteklerinde duşýar. Jübüt, esasan-da, süri bolup uçup geçýän mahaly, kiçi torgaýlar bilen bile gezyär. Höwürtgisini ýerde otlaryň sypallaryndan örüp gurýar. Aprel-iýun aýlarynda 4-5 sany goňur meneklije agymtyl ýumurtgalary goýýar. Çöl ösümlükleriniň, haşal otlaryň tohumlary, mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: ýazyna we gýşyna adaty, uçup geçýän döwründe köpsanly, käbir ýerlerde has köpsanly, giň ýaýran guş.

243. Şorluk torgaýy – *Calandrella cheleensis* – Солончаковый жаворонок

Meýdan alamatlary: serçe ululykdaky topgaý. **Bedeniniň üstki tarapy açyk reňkli, kültreňk-goňur.** Ganatlary we guýrugy goňur, bedeniniň aşak tarapy, gaşy we ganatlaryndaky zolaklar hem-de guýrugynyň gapdallary agymtyl, döşi dik goňur menekli. Gaşy ak. Ýaş guşlaryň ýeleklerinde ak jähegiň güýçli ösendigi üçin, olaryň umumy reňki çalymtyl.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çal torgaýa örän çalymdaş, açyk-kültreňkliligi bilen kiçi we iňçeçüňk torgaýlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Aziýada Demirgazyk-Gündogar Hazaryakasyndan başlap, Demirgazyk-Gündogar Hytaýa, günorta Tibete çenli. Orta Aziýada, esasan, selçen ösümlikli şorluk çöllüklerde duşýar. Türkmenistanda – Amyderýanyň ortaky we aşaky akymynyň şorluk we ýanaşyk çöllük ýerlerinde gezyär, olaryň Günbatrda Gazagystanyň Garagalpagystan bilen

гнездится и зимует. Придерживается не только глинистых, но и песчаных участков, а также лессовых предгорий. Держится парами, но, в основном, стайками на земле, нередко, особенно на пролете, вместе с малыми жаворонками. Гнездо на земле, из травинки. Кладка из 4-5 беловатых с бурными пятнами яиц, в апреле-июне. Питается семенами пустынных и сорных растений, насекомыми.

Статус: весной и зимой обычная, во время пролетов многочисленная, местами очень многочисленная, широко распространенная птица.

Полевые признаки: мелкий жаворонок величиной с воробья. **Верхняя сторона тела светлая, пепельно-бурая.** Крылья и хвост бурые, нижняя сторона тела, бровь и полосы на крыльях и по бокам хвоста беловатые, на груди продольные бурые пестрины. Бровь белая. Молодые птицы с сильным развитием белых каемок, общий тон сероватый.

Сходства – отличия: очень схож с серым жаворонком, от малого и тонкоклювого жаворонков отличается светло-пепельной окраской.

Распространение: в Азии – от Северо-Восточного Прикаспия на восток до Северо-Восточного Китая, к югу – до Тибета. В Средней Азии, в основном, – солончаковые пустыни с редкой растительностью. В Туркменистане – солончаки и прилегающие пустынные участки среднего и нижнего течения Аму-

араçkleşýän ýerlerinde duşmaklary mümkin.

Ýaşaýşy: uçup geçýän, höwürtleýän guş. Şorluklarda saklanýar, ýöne olaryň toýunly we daşly ýerlerde duşmaklary mümkin. Ýerde jübüt we süri bolup gezyär. Höwürtgisini ýerde gurýar. Aprel-iýun aýlarynda 4-5 sany goňur meneklije, agymtyl ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler, haşal otlaryň däneri bilen iýmitlenýär.

Statusy: bizde öwrenilmedik, örän seýrek duşýan guş.

244. Inçeçüňk torgaý – *Calandrella acutirostris* – Тонкоклювый жаворонок

Meýdan alamatlary: serçe ululykdaky torgaý. **Bedeniniň üstki tarapy çyparrak-çal bolup, arkasy we depesi köpsanly garamtyl tegmilli.** Aşagy çypar öwüşginli agymtyl we döşüniň gapdallary garamtyl tegmilli. Ýerden birden ýokary göterilip, howada saýraýar. Saýraýşy jikgildileriň toplumu. Ganaty 82- 94 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: üstki tarapynyň has garamtyl reňki bilen şorluk torgaýdan, arkasynyň has ýiti çyparrak-çaldygy we aşagynyň akdygy bilen kiçi torgaýdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Alynky, Ortaky we Merkezi Aziýa, günorta Gündogar Tibet we Günorta Gimalaý daglaryna çenli. Hemme ýerde gurak-sähralyk ýerlere, dag ulgamynyň ýarym çöllüklerine we dagetek düzlüklere ýakyn durýar. Türkmenistanda – käte Batlyzda, Garabilde ýa-da Köýtendagda gabat gelmekleri mümkin.

Ýaşaýşy: adaty, dagyň gurak

дарыи, не исключены встречи на Западе и в приграничных районах с Казахстаном и Каракалпакстаном.

Образ жизни: перелетная, гнездящаяся птица. Придерживается солончаковых участков, но может встречаться в глинистых и щебенистых местообитаниях. Держится парами и стайками на земле. Гнездо устраивает также на земле. Кладка из 4-5 беловатых с буроватыми пятнами яиц, в апреле-июне. Питается насекомыми и семенами пустынных и сорных злаков.

Статус: у нас не изученная, очень редкая птица.

Полевые признаки: мелкий жаворонок величиной с воробья. Верхняя сторона **тела рыжеватосерая с многочисленными темными пятнами на спине и темени.** Низ беловатый с рыжеватым налетом и темными пятнами по бокам груди. Поют в воздухе, поднимаясь рывками вверх. Песня – набор щебетаний. Крыло – 82-94 мм.

Сходства – отличия: от солончакового жаворонка отличается более темной окраской верха, от малого жаворонка – более яркой рыжеватосерой спиной и белым низом.

Распространение: Передняя, Средняя и Центральная Азия, к югу до Восточного Тибета и Южных Гималаев. Всюду тяготеет к сухим степям и полупустынным участкам горных и предгорных областей. В Туркменистане спорадически может быть встречен в Бадхызе, Карабилье или Койтендаге.

eteklerinde we selçeň ösümlikli aşaky kemerlerinde ýaşaýar. Ýerde höwürtegeleýär. Aprel-iyun aýlarynda 3-4 sany goňur meneklije, çalymtyl ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler we ösümlikleriň tohumlary bilen ýümitlenýär.

Statusy: Türkmenistanda örän seýrek we heniz öwrenilmedik diýen ýaly.

245. Tokaý torgaýy – *Lullula arborea* – Лесной жаворонок

Meýdan alamatlary: serçe ululykda. Bedeniniň üstki tarapy anyk görünýän dik gara menekli, çuparrak-goňur. Duluklary, ganatlary we guýrugy çuparrak-goňur. Bedeniniň aşagy agymtyl bolup, bokurdagy, petekesi garamtyl menekli, döşinsiz dik goňur menekli. **Gözüniň üstündäki we depesiniň gapdallaryndaky inli agymtyl zolaklar** ýeňsesinde birleşýär. Kellesi kiçiräk hüpkli. Ganatlary goýy-goňur, ýelekleri ýagty jäheklenen bolup, agymtyl uçly. Gysga guýrugy goňur, insiz ak jähekli. Ýaş guşlaryň üstki tarapyň reňki ala, arkasynyň we depesiniň ýelekleriniň ortasy gara we uçlary ak jähekli. Çünki şah reňkli, aýaklary goňur. Saýraýşy batly sesli – “ýuli-ýuli-ýuli-ýul-ýul-ýulýu-ýulýu”. Uzynlygy – 140–165, ganaty - 90-100, ganatlarynyň gerimi – 283-325 mm, agramy – 20-26 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: gaşynyň agymtyldygy, ölçegleriniň maýdadygy we guýrugynyň gysgadygy bilen meýdan torgaýdan tapawatlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropanyň, demirgazyk çäklerinden başgalarynda, Afrikanyň demirgazyk-günbatar çetleri, Kiçi Aziýa, Kawkaz we Demir-

Образ жизни: обычно встречается в сухих предгорьях и нижнем поясе гор с редкой растительностью. Гнездо на земле. Кладка из 3-4 сероватых с бурыми пятнышками яиц, в апреле-июне. Питается насекомыми и семенами растений.

Статус: в Туркменистане очень редкая и почти не изученная птица.

Полевые признаки: величиной с воробья. Верхняя сторона тела рыжевато-бурая с четкими темными продольными пестринами. Щеки, крылья и хвост рыжевато-бурые. Низ тела беловатый с черноватыми крапинками на горле, зобе, а на груди узкие продольные бурые пестрины. **Над глазом и по бокам темени широкие беловатые полосы**, которые соединяются на затылке. На голове небольшой хохолок. Крылья темно-бурые со светлыми каемками и беловатыми концами перьев. Хвост короткий бурый с белой узкой каемкой. Молодые птицы сверху пестрой окраски, перья спины и темени с черным центром и беловатой каймой на конце. Клюв рогового цвета, ноги бурого. Песня – очень громкое «юли-юли-юли-юль-юль-юль-юлю-юлю». Длина – 140-165, крыло – 90-100, размах крыльев – 283-325 мм, вес – 20-26 г.

Сходства – отличия: от полевого жаворонка отличается светлой бровью, мелкими размерами и коротким хвостом.

Распространение: Европа, кроме северных областей, крайний северо-запад Африки, Малая

gazyk Eýran. Orta Aziýada daglyklarda, Türkmenistanda – Uly Balkanda we Köpetdagda.

Ýaşaýşy: oturymly görnüş. Daglaryň selçeň gyrymsyly we agaçly sähralyk ýerlerde ýaşaýar. Ýerde gezýär, käte gyrymsy agaçlarda gonýar. Jübüt we süri bolup gabat gelyär. Ýerde höwürtege gurýar. Aprel-iyun aýlarynda 5-6 sany goňur menekli, ak ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler, ösümlikleriň tohumlary bilen ýümitlenýär.

Statusy: amatly şert bolan ýerlerde adaty, käbir ýerlerde seýrek, gowşak öwrenilen guş.

246. Meýdan torgaýy – *Alauda arvensis* – Полевой жаворонок

Meýdan alamatlary: serçeden sähelçe uly. Bedeniniň üstki tarapy çuparrak, dik goňur menekli, çalymtyl-goňur. Aşagy çuparrak-agymtyl, döşimaýda goňur menekli. Guýrugynyň gapdallary we ganatlarynyň yzky gyrasy insiz ýagty zolakly. Gaşynyň üstünden çuparrak-agymtyl zolak geçýär. **Duluklary poslurak-goňur. Kellesinde inli, yöne beýik bolmadyk hüpjigi bolýar.** Ýaş guşlaryň arkasy ala, ýelekleriniň ortasy garamtylrak, gyralary agymtyl jähekli, ýelekleri aşagynadan – damjasypat çuparrak tegmilli. Saýraýşy – ses saýramalarynyň toplumu. Uzynlygy – 170-205, ganaty – 99-124, ganatlarynyň gerimi – 329-381 mm, agramy - 35.5-44.5 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: guýrugynyň has uzyndygy we ganatynyň yzky gyrasynda insiz agymtyl zolagyň bardygy bilen kiçi meýdan torgaýuna örän meňzeş, yöne ondan sähelçe ulurak. Kellesinde uzyn hüpüginiň ýokdygy, guýrugynyň gapdallaryn-

Азия, Кавказ и Северный Иран. В Средней Азии – горные районы, в Туркменистане – Большие Балханы и Копетдаг.

Образ жизни: оседлый вид. Населяет нагорные степи с разреженными кустарниками и древесными участками. Держится на земле, иногда садится и на кусты. Встречается парами и стайками. Гнездо на земле. Кладка из 5-6 белых с буроватыми пятнышками яиц, в апреле-июне. Питается насекомыми и семенами злаков.

Статус: в подходящих условиях обычная, местами редкая, слабо изученная птица.

Полевые признаки: несколько крупнее воробья. Верхняя сторона тела рыжевато-бурая с продольными бурими пестринами. Низ рыжевато-беловатый, на груди мелкие бурые пестрины. По бокам хвоста и заднего края крыльев – узкие светлые полосы. Надбровные полосы рыжевато-беловатые. **Щеки ржавчато-буроватые. На голове заметен широкий, но не высокий хохолок.** Молодые птицы на спинной стороне пестрые, перья с черноватыми серединами и беловатыми каймами, перья снизу рыжеватые с каплевидными пятнами. Песня – набор звонких трелей. Длина – 170-205, крыло – 99-124, размах крыльев – 329-381 мм, вес – 35.5-44.5 г.

Сходства и отличия: очень похож на индийского жаворонка, но чуть крупнее и с более длинным хвостом и светлой узкой полоской по заднему краю крыла. В отличие

daky zolagyň çypar däl-de, akso-wuldygy bilen mollatorgaydan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: giň. Demirgazyk Afrika, Ýewropa we tutuş Aziýa diýen ýaly, günorta Eýrana, Demirgazyk Owganystana we Günorta-Günbatar Pamir dagyna çenli. Orta Aziýanyň günorta we günorta-gündogar çäklerinde, Türkmenistanda höwürtegeleýan wagty: Uly Balkanda we Köpetdagda, güýz-gyş döwründe hemme ýerlerde, ýöne köplenç düzlük, dageteklerinde we oazislerde.

Ýaşaýşy: uçup geçýän, gyşlaýan we höwürtegeleýän guş. Ýazyna fewral- aprel aralykda, güýzine – oktyabr noýabr aralygynda uçup geçýär. Açyk giňişlikleri, çemenlik, düzlük ýerleri, dag üstüniň sährallyklaryny, derýa jülgelerini eýeleýär. Höwürtegesi ýerde. Aprel-iýun aýlarynda 4-5 sany garamtyl meneklije, çalymtyl ýumurtgalary goýýar. Uçup geçýän we gyşlaýan guşlar süri bolup, käte kiçi meýdan ýa-da çal torgaýlar bilen bilelikde gezyär. Ösümlikleriň tohumlary we mör-möjekler bilen ýymitlenýär.

Statusy: höwürtegeleýän döwründe az sanly, uçup geçýän mahaly adaty, gyşlanda-köpsanly, hatda düzlükleriň käbir ýerlerinde has köpsanly görünüş.

247. Kiçi meýdan torgaýy – *Alauda gulgula* – Индийский жаворонок

Meýdan alamatlary: meýdan torgaýyndan tapawutlan-maýar diýen ýaly, ýöne biraz maýda we ganatlarynyň yzky gyrasynda agymtyl zolagy ýok, guýrugy sähelçe gysga. Ganaty 86.5–103 mm.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: çüňküniň pahnasy patly däl-de, has in-

от хохлатого жаворонка на голове нет длинного хохолка, а хвост с белесыми, а не рыжими полосками по бокам.

Распространение: широкое – Северная Африка, Европа и почти вся Азия к югу до Ирана, Северного Афганистана и Юго-Западного Памира. В Средней Азии – южные и юго-восточные области, в Туркменистане – на гнездовье – в Больших Балханах и Копетдаге, в осенне-зимнее время – повсеместно, но больше на равнинах, в предгорьях и оазисах.

Образ жизни: пролетная, зимующая и гнездящаяся птица. Весенний пролет с февраля по апрель, осенний – с октября по ноябрь. Населяет открытые пространства, луга, поля, нагорные степи, речные долины. Гнездо на земле. Кладка из 4-5 сероватых с темными пятнами яиц, в апреле – июне. На пролете и зимовке птицы держатся стайками, нередко вместе с малыми или серыми жаворонками. Питается семенами растений и насекомыми.

Статус: в гнездовое время многочисленный вид, на пролете – обычный, на зимовке многочисленный, местами в равнинной части даже очень многочисленный.

Полевые признаки: в природе почти не отличим от полевого жаворонка, но мельче и по заднему краю крыла нет светлой полосы, хвост чуть короче. Крыло – 86.5-103 мм.

Сходства и отличия: от малого и серого жаворонков отличается

çeligi bilen kiçi we çal torgaýlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Orta Aziýada Köpetdagdan we Tejen derýasynyň jülgesinden gündogara Çu we Syrderya jülgelerine çenli. Türkmenistanda – Köpetdaguň, Köýtendaguň etekleri, Bathyz, Garabil, Etrek, Tejen, Murgar, Amyderýa jülgeleri.

Ýaşaýşy: uçup geçýän, gyşlaýan we höwürtegeleýän guş. Açyk meýdan giňişliklerinde – dagetek düzlüklerinde, derýa jülgelerinde ýaşaýar. Jübüt we süri bolup, aýratyn-da, uçup geçip gidende we gyşlanda gezyär. Höwürtegesini ýerde gurýar. Aprel-iýunda 3-5 sany meneklije çalymtyl ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler, çöl ösümlükleriniň we haşal otlaryň tohumlary bilen ýymitlenýär.

Statusy: adaty, amatly şert bolan ýerlerde, aýratyn-da, derýa jülgelerinde sany köp görünüş.

248. Şahlyja torgaý – *Eremophila alpestris* – Рогатый жаворонок

Meýdan alamatlary: serçeden ulurak. Bedeniniň üstki tarapy gowşak, gülgüne öwüşginli çalymtyl, garny-ak. Ýeňsesi we boýnunyň yzy gülgüne-çal. Ganatlary goýu goňur, ýelekleri agymtyl nagyşly. Guýrugy gara, ýelekleri agymtyl jähekli. **Kellesiniň iki tarapy “şahjagalar” görünüşli inçeden uzyn gara reňkli ýelekli. Maňlaýy ak ýa-da limonpisint-sary, petekesi gara, bokurdagy agymtyl-sary. Mäkiýany maýdarak bolup, gowşak ösen “şahjagaz” dessejikli. Ýaş guşlaryň üsti ala, maýda ýelekleriniň uçlarynyň öňi gara we uçlary ak tegmilli. Bokurdagy agymtyl-sary. Çüňki garamtyl, aýaklary gara. Saýraýşy jikgildileriň**

более тонким – **не коническим клювом.**

Распространение: в Средней Азии – от Копетдага и долины Теджена к востоку до долин Чу и Сырдарьи. В Туркменистане – предгорья Копетдага, Бадхыз, Карабиль, предгорья Койтендага, долины Этрека, Теджена, Мургаба и Амударьи, на пролете шире.

Образ жизни: пролетная и гнездящаяся птица. Населяет открытые пространства – предгорные равнины, поля и речные долины. Держится парами и стайками, особенно на пролете. Гнездо на земле. Кладка – 3-5 сероватых яиц с пятнами, в апреле-июне. Питается насекомыми и семенами пустынных и сорных злаков.

Статус: обычный вид, в подходящих условиях, особенно в речных долинах, численность выше.

Полевые признаки: крупнее воробья. Верхняя сторона тела сероватая со слабым розоватым оттенком, брюшко белое. Затылок и зашеек розовато-серые. Крылья темно-бурые со светлыми каемками перьев. Хвост черный, с беловатыми ободками перьев. **На голове по обеим сторонам – «рожки» в виде тонких длинных перьев черного цвета. Лоб и горло белые, зоб черный.** Самка мельче и со слабо развитыми пучками «рожек». Молодые птицы сверху пестрые, с черным предвершинным и белым вершинным пятнами на мелких перьях. Горло также бледно-желтое. Клюв черноватый, ноги

toplumy. Uzynlygy – 178–201, ganaty – 98-120, ganatlarynyň gerimi – 320-365 mm, agramy - 32-36 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: kellesindäki gara “şahjagazlary” bilen beýleki torgaýlardan tapawutlanýar.

Ýaşýan ýerleri: giň, ýöne bölekleyin. Demirgazyk Amerikada, Ýewraziýada (tundrada, sähralyklarda, demirgazyk çöllüklerde, beýik daglarda), Afrikanýň demirgazyk - günbatar gyraçetlerinde. Orta Aziýada ýarym çöllüklerde, çöllüklerde, daglaryň gurak sähralyklarynda. Türkmenistanda Garabogaz ýakasynda, Türkmenbaşy belentliginde (käbir ýerlerinde), Uly we Kiçi Balkan daglarynda, Köpetdagda we Bathyзда.

Ýaşayşy: oturymly guş, güýzgys aýlary göçüp-gonma hereketlerini edýär. Gurak, beýikli-pesli ýerlerde we selçen ösümlikli daşly dag eňnitlerinde gezyär, käte düzlük we çöl giňişliklerinde hem duşmagy mümkin. Jübüt we süri bolup ýerde gezyär. Aprelden iýun aýyna çenli dagyň aşaky we ýokarky guşaklyklarynda höwürtleýär. Höwürtgese ýerde, içine ýumşajyk sypallar düşen kiçiräk çukurlyk. 3-5 sany goňur meneklije, kirliräk-ak ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler we ýabany ösümlikleriň tohumlary bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, gyşky göçüp-gonýan döwründe bölekleyin ýaşýan adaty guş.

Geçiguşlar – Motacillidae – Трясогузковые

Adatça uzyn guýrukly, kiçiräk süýnmek kelleli, başgalara garanyňda inçe, bizsekilli uzalan çüňkli, serçe ululykda bolan maýda guşlar maşga-

черные. Песня – набор щебетаний. Длина – 178-201, крыло – 98-120, размах крыльев – 320-365 мм, вес – 32-36 г.

Сходства – отличия: от других жаворонков хорошо отличается черными «рожками» на голове.

Распространение: широкое, но прерывистое – в Северной Америке, Евразии (тундры, степи, северные пустыни, высокогорья), на крайнем северо-западе Африки. В Средней Азии – полупустыни, пустыни, сухие горные степи. В Туркменистане – Прикарабагазье, Красноводское плато (местами), Большие и Малые Балханы, Копетдаг и его предгорья, Бадхыз.

Образ жизни: оседлая птица, предпринимает осенне-зимние кочевки. Населяют сухие холмистые участки и щебнистые склоны гор со скудной растительностью, иногда могут быть встречены и на равнине в пустыне. Держатся парами и стайками на земле. Гнездятся как в нижнем, так и верхнем поясе гор, с апреля по июнь. Гнездо на земле в небольшой ямке с мягкой выстилкой. Кладка – 3-5 грязно-беловатых яиц с бурыми многочисленными пятнышками. Питается насекомыми и семенами диких злаков.

Статус: немногочисленная, на зимних кочевках обычная птица с неравномерным распространением.

Семейство мелких птиц величиной с воробья, обычно с длинным хвостом, небольшой вытянутой головой с тонким, относи-

lasy. Bu guşlara guýrugyny durnuksyz ýaýkamak alamaty häsiýetlidir. Açyk meýdanlarda ýaşýarlar, suwa ýakyn ýerleri halayarlar, ýerde iýmitlenip, dürli oňurgasyzlary çöpleýärler, käte mör-möjekleri howada tutmaklary hem mümkin. Hemmesi 53, Türkmenistanda 11 görnüş.

249. Meýdan atjagazy – Anthus campestris – Полевой конёк

Meýdan alamatlary: bedeni süýnmegräk gelişikli guş. **Üstki taparynyň reňki goňurrak-çal, agymtyl köp bolmadyk goňur menekli. Aşaky tarapy meneksiz çyparrak-agymtyl, döşi anyk bolmadyk seýrek zolakly.** Güýz-gyş döwründäki reňkinde toýunsypatsary öwüşgin ýokundysy bar. Aýaklary agymtyl, inçeden uzyn we berdaşly. Ýaş guşlaryň arka tarapy ala, ýelekleri çyparrak jähekli. Garyn tarapy kirliräk - ak, yeňiljek çypar ýokundyly. Ýerde köp gezim edýär. Ýerde, şeýle-de gyrymsylara gonýar. Sesi – gysga “twi” ýa-da “siriýui”, saýraýşy – gysga, owazly. Uzynlygy – 165, ganatlarynyň gerimi – 250-280 mm, agramy 15-29 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: agymtyl inli gaşy bilen beýleki atjagazlardan, ölçegleriniň maýdalygy we üstki tarapynyň reňkiniň has çaldygy bilen sähra atjagazyndan tapawutlanýar.

Ýaşýan ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi Ýewropanyň günorta bölegi, Günbatar Sibiriň günorta bölegi, Gazagystan, Orta we Merkezi Aziýa. Türkmenistanda dag eteklerinde we daglyk ýerlerde, uçup geçende düzlüklerde hem

тельно длинноватым, шиловидным клювом. Характерная особенность этих птиц – покачивание хвостом. Обитатели открытых пространств, предпочитают околородные местообитания, кормятся на земле, собирая разных беспозвоночных, могут ловить насекомых в воздухе. Всего 53, в Туркменистане 11 видов.

Полевые признаки: стройная птица с удлинённым телом. **Сверху окраска коричнево-серая, светлая, с немногочисленными бурыми пестринками. Нижняя сторона рыжеватобеловатая без пестрин, на груди неясные редкие полоски.** В осенне-зимний период в окраске сильно развит налет глинисто-желтого оттенка. Ноги светлые, тонкие, удлинённые и крепкие. У молодых спинная сторона пестрая с рыжеватыми каемками перьев. Брюшко грязно-беловатое с легким рыжеватым налетом. Много передвигаются по земле. Поют как на земле, так и на верхних веточках кустов. Голос – короткое «тви» или «цириюи», песня – короткая трель. Длина – 165, размах крыльев – 250-280 мм, вес 15-29 г.

Сходства – отличия: от других коньков отличается широкой беловатой бровью; от степного конька – чуть меньшими размерами и более серой окраской верха.

Распространение: гнездовая часть ареала – южная половина Европы, южные части Западной Сибири, Казахстан, Средняя и Центральная Азия. В Туркменистане – предгорные и горные районы, на полете также может быть встречен

duşmagy mümkin. Demirgazyk we Gündogar Afrikada, Ýakyn Gündogarda, Alynky we Günorta Aziýada (Hindistanda) gyslaşar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, höwürtleýän guş, aprel aýynda uçup gelýär, sentýabr-oktýabrda–uçup gidýär. Dag jülgelerini, belentlik ýaýlalary, dag eňňitleriniň otluk we daşlyk ýerlerini eýeleýär. Ýekelikde we jübüt, uçup geçende süri bolup, ýerde gezyýär. Maý-iýun aýlarynda 4-5 sany garamtyl meneklije agymtyl, ýaşylymytl ýa-da gyzylmyl ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 21.4 x 16.9 mm. Maýda mör-möjekler (perdeganatlylar, maýda tomzaklar, teňneganatlylar) bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, amatly bolan ýerlerde çäkli ýaýran adaty görnüş.

250. Bellik: Sähra atjagazy – *Anthus richardi* – Türkmenistana örän seýrek uçup gelýär (birnäçe gezek duşulan bolmagy mälim). Olaryň arasynda meýdan atjagazy iň ulusy bolup, ol guýrugynyň we aýaklarynyň has uzynlygy, şeýlede beýlekilere garanynda, çüňküniň uzynlygy we güýçlidigi bilen kowumdaşlaryndan tapawutlanýar.

251. Tokaý atjagazy – *Anthus trivialis* – Лесной конёк

Meýdan alamatlary: kellesi we arkasy çalymytl-ýaşylymytl öwüşginde dik goňur zolakly. Aşagy garyn tarapyňa agarýan çyparrak-sarymytl reňkli, petekesi we döşi inli gara menekli. Ganatlary goňur, ýelekleri agymtyl jähekli. Gow-

и на равнинах. Зимует в Северной и Восточной Африке, на Ближнем Востоке, в Передней и Южной Азии (Индостан).

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица; прилетает в апреле, отлетает в сентябре-октябре. Населяет горные долины, платообразные участки и травянистые, щебнистые горные склоны. Держится на земле в одиночку и парами, на пролете – стайками. Гнезда обычно в ямке на земле под прикрытием травы или кустиков. Кладка из 4-5 беловатых, зеленоватых или красноватых с темными пятнами яиц, в мае-июне; размеры – 21.4 x 16.9 мм. Питаются мелкими насекомыми (перепончатокрылые, мелкие жуки, чешуекрылые).

Статус: немногочисленный, в подходящих местах обычный вид с ограниченным распространением.

250. Примечание: в Туркменистан очень редко может залетать (известно несколько случаев) **степной конёк – *Anthus richardi***, самый крупный из коньков, который отличается также более длинным хвостом и ногами, а также относительно удлиненным и сильным клювом.

Полевые признаки: на голове и спине бурые продольные полосы на серо-зеленоватом фоне. Нижняя сторона рыжевато-желтоватая, белеющая на брюшке, на зобе и груди широкие черные пестринки. Крылья бурые со свет-

şak oýuk guýrugynyň çetki gapdal ýelekleri–agymtyl. Çünki goňurrak, aýaklary sarymytl-goňur. Ýaş guşlar has goňur ýokundyly. Sesi gysga – “sit-sit”, saýraýşy sesli – “sip-sip-siasia”. Uzynlygy – 168-171, ganaty – 84-87, ganatlarynyň gerimi – 275-277 mm, agramy -12-28 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çemen atjagazy bilen çalymdaş, tebigatda olary tapawutlandyrmak kyn, ýöne arka tarapyndaky gara zolaklaryň we böwürlerindäki çyzyklaryň çemen atjagazyňky ýaly inli daldigi, üns berip synlanynda, anyk görünyär; ol yzky barmagynyň dyrnagynyň güýçli egmekdigi boýunça has ýakyn aralykdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän ýerleri – Ýewropa, onuň demirgazykgündogar böleginden başgalary, Günorta Sibir, Gazagystan, Alynky we Orta Aziýa. Türkmenistanda, esasan, düzlüklerde, dagda az mukdarda duşýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän görnüş. Ýazyna apreliň başynda we maýda, güýzine – awgust-sentýabrda uçup geçýär. Dag eteklerinde, jülgelerde we oazislere, ýaýlalarda, çölde gyrymsylaryň güý ösen ýerlerinde ýaşýar. Ýekelikde, jübüt bolup ýerde we agaçlaryň üstünde, uçup geçende süri bolup gezyýär. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär, iýmiti, esasan, ýerden çöpleýär, käte uçup tutýar.

Statusy: seýrek, uçup geçende, amatly bolan ýerlerde adaty guş.

252. Çemen atjagazy – *Anthus pratensis* – Луговой конёк

Meýdan alamatlary: tokaý atjagazyndan maýda. Horazynyň reňki mäkiýanyňa meňzeş-üstki tarapy

лыми каймами перьев. Крайние боковые перья слегка выемчатого хвоста – беловатые. Клюв буроватый, ноги желтовато-бурые. Молодая птица более буроватого тона. Голос – короткое «цит-цит», песня – громкое «сип-сип-сиа-сиа». Длина – 168-171, крыло – 84-87, размах крыльев – 275-277 мм, вес – 12-28 г.

Сходства – отличия: очень схож с луговым коньком, в природе почти не отличим, но при внимательном рассмотрении заметно, что темные полосы на спине менее четкие, а на боках тела штрихи не столь широкие, как у лугового конька; на очень близком расстоянии отличается по сильно изогнутому когтю заднего пальца.

Распространение: область гнездования – Европа, кроме северо-восточной ее части, Южная Сибирь, Казахстан, Передняя и Средняя Азия. В Туркменистане, в основном, на равнинах, меньше в горах.

Образ жизни: пролетный вид. Весной с начала апреля и в мае, осенью – в августе-сентябре. Населяет предгорья, долины и оазисы, поляны, в пустыне – в заросших участках. Держится на земле и на деревьях в одиночку, парами, на пролётах – стайками. Питаются насекомыми, пищу, в основном, собирают на земле, иногда на лету.

Статус: редкая, в подходящих местах на пролете обычная птица.

Полевые признаки: размером мельче лесного конька. Самец и самка окрашены одинаково – сверху

goňur gowşak ýaşylymytl öwüşginli we anyk, aýratyn-da, güýzüne, **kelle-si we arkasy dik garamtyl zolakly**. Aýaklary agymtyl. Sesi gysga – “pit”. Howadaky saýraýşy birmeňzeş – “it-it-ititi”. Süri bilup gezyär. Uzynlygy – 152-158, horazlarynyň ganatlary – 74-86, mäkiýanlarynyňky – 73-84 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: bedeniň üstki tarapyňyň açyk ýaşylymytl-çaldygy, has ýakýndan synlanyňda bolsa, yzky barmagynyň uzyn dyrnagynyň gowşak egmekdigi bilen beýleki atjagazlardan; arka tarapyndaky anyk garamtyl zolaklary we bedeniniň gapdalaryndaky inli çyzyklary bilen tokaý atjagazyndan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeýän bölegi-Ýewropanyň demirgazyk bölegi we Günbatar Sibir. Orta Aziýada, şol sanda Türkmenistanda, uçup geçende giň ýaýran, ýöne köplenç jüljelere we oazislere ýakyn durýar. Günbatar we Günorta Ýewropada, Demirgazyk Afrikada, Kawkazda, Kiçi, Alynky Aziýada we Orta Aziýanyň günortasynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-gyşlaýan guş, sentýabryň soňyndan apreliň ortasyna çenli, käte gijiräk gabat gelyär. Aglaba, suwarymly ekerançylyk ýerlerinde, kanallaryň ýakasynda, derýalaryň joşup suw basan çygly ýerlerinde saklanýar. Mör-möjekler (ýaprakçy tomzaklaryň içinkalary, uzynaýak çybynlar we möýler) bilen iýmitlenýär.

Statusy: güýz-gyş döwründe adaty görnüş.

253. Gyzył petekeli atjagaz – *Anthus cervinus* – Краснозобый конёк

Meýdan alamatlary: serçeden has kiçi, maýda atjagaz. Bokurdagy, pete-

бурые с легким зеленоватым оттенком и четкими, особенно осенью, **темными продольными полосками на голове и спине**. Ноги светлые. Голос – короткое «пит». Песня в воздухе – однообразное «ит-ит-итити». Держатся стайками. Длина – 152-158, крыло у самцов – 74-86, у самок – 73-84 мм.

Сходства – отличия: от других коньков отличается светлым зеленовато-серым верхом тела, а при очень близком рассмотрении – длинным слабо изогнутым когтем заднего пальца. От лесного конька – более четкими темными полосами на спине и жирными черточками на боках тела.

Распространение: гнездовая часть ареала – северная половина Европы и Западной Сибири. В Средней Азии, в частности, в Туркменистане на пролете – широко, но больше тяготеет к долинам и оазисам. Зимуют в Западной и Южной Европе, Северной Африке, на Кавказе, в Малой, Передней и на юге Средней Азии.

Образ жизни: пролетная, зимующая птица, встречается с последних чисел сентября и до середины апреля, иногда позже. В сельскохозяйственном ландшафте держатся чаще по берегам каналов, в поймах рек, по сырым участкам. Питаются насекомыми (личинками листоедов, комаров-долгоножек), пауками.

Статус: в осенне-зимнее время обычный вид.

Полевые признаки: мелкий конёк, размером мельче воробья.

kesi we döşi posreňk-gyzgytl, ýöne **güýz - gyş döwründe, bizde duşýan wagty, ýelek örtüginde poslyrak-gyzgytl öwüşgini bolmaýar**. Sesi “psýurris” ýa-da “pýurris”. Uzynlygy – 170-173, ganaty – 84-87, ganatlarynyň gerimi – 275-282 mm, agramy – 20.3 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çemen we tokaý atjagazlary bilen çalyndaş (ýöne ýazyna bedeniniň aşaky tarapynda gyzgytl öwüşgini bolýar). Bilindäki we guýrugynyň üstündäki anyk garamtyl menekleri bilen çemen atjagazyndan we aşak tarapyňyň uly garamtyl tegmilli goýu çypardygy, arkasynyň ön tarapyňyň has ýagty zolaklydygy bilen tokaý atjagazyndan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewraziýanyň tundra, tokaýlytundra, taýganyň demirgazyk böleginde höwürtlegeýär; Orta Aziýanyň we Türkmenistanyň hemme ýerlerinden giň ýaýrawda uçup geçýär. Gündogar Afrikada, Alynky Aziýada, Hindistanyň demirgazyk çäklerinde we Günorta-Gündogar Aziýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän görnüş, ýazyna-aprel-maýda, güýzine – sentýabrda uçup geçýär. Antropogen landşaftlaryň, jüljeleriň we dag etekleriniň yzgarly ýerlerinde saklanýar.

Statusy: az sanly görnüş, amatly bolan ýerlerde sany ýokary.

254. Dag atjagazy – *Anthus spinoletta blakistoni* – Горный конёк

Meýdan alamatlary: bedeniniň üstki tarapy çalymytl, aşagy – çyparrak, **döşi solak gülgüne öwüşginli**. Ýaş guşlaryň güýz-gyş ýelek örtüginde tegmilleriň, şol

Горло, зоб и грудь ржаво-красноватые, но **в осенне-зимнее время, когда встречается у нас, ржаво-красные оттенки в оперении отсутствуют**. Голос – «псюррис» или «пюррис». Длина – 170-173, крыло – 84-87, размах крыльев – 275-282 мм, вес – 20.3 г.

Сходства – отличия: схож с луговым и лесным коньками (однако, весной имеет красноватые тона в окраске нижней стороны тела). От лугового конька отличается четкими темными пестринами на поясице и надхвостье. От лесного конька – более рыжеватым низом с крупными темными пестринами и более светлыми полосками на передней части спины.

Распространение: в Евразии гнездится в зоне тундры, лесотундры, отчасти северной тайги; на пролете шире, в том числе, по всей Средней Азии и Туркменистану. Зимует в Восточной Африке, Передней Азии, северных областях Индостана и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: пролетный вид, весной – в апреле-мае, осенью – в сентябре. Придерживается влажных местообитаний в антропогенном ландшафте, долинах и предгорьях.

Статус: немногочисленный вид, в подходящих местообитаниях численность выше.

Полевые признаки: верхняя сторона тела сероватая, нижняя – рыжеватая **со слабым розоватым оттенком на груди**. Молодые схожи со взрослыми в осен-

sanda bokurdagynda, petekesinde we bedeniniň gapdallarynda güýçli ösendigi, olary ýaşaýan guşlara çalymdaş edýär. **Aýaklary gara ýa-da gara-goňur**, çünki gara. Ýerde we howada saýraýar. Sesi pessaýja –“sit-sit-sit”, saýraýşy biraz güýçli. Ganaty – 85-88 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: garamtyl aýaklary, petekesinde we döşünde menekleriň ýokdugy (diňe mäkiýanlarynda bolýar, ol hem örän solak) bilen beýleki atjagazlardan tapawutlanýar. Tokaý atjagazyň häsiýetli uçuşy-wakwaky ses owazlarynyň utgaşmagy çemen atjagazyňka örän meňzeş.

Ýaýran ýerleri: Ýewraziýanyň we Demirgazyk Amerikanyň daglyk ýerleri. Türkmenistanda Uly Balkanda, Köpetdagda, Köýtendagda. Günorta Ýewropada, Demirgazyk Afrikada, Ýakyn Gündogarda, Kiçi, Alynky, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýada gyslaýar.

Ýaşaýşy: höwürtegeleýän, bölekleyin gyslaýan guş. Uçup geçende we gyslanda giňişleýin duşýar, ýöne derýalaryň jülgelelerinde we dag eteklerinde köpdügi mese-mälim görünýär. Ýazyna martyň başyndan apreliň ortasyna çenli, güýzine – okrtýabr-noýabrda uçup geçýär. Jübüt, uçup geçende süri bolup gezyýär. Höwürtegesini ýerde, gür ösen otlaryň arasynda gurýar. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: uçup geçende we gyslanda az sanly, käbir ýerlerde adaty, höwürtegeleýän döwrinde örän seýrek görünüş.

не-зимнем оперении, с сильно выраженной пятнистостью, в том числе на горле, зобе, и боках тела.

Ноги черные или черно-бурые, клюв черный. Поет на земле и в воздухе. Голос – тихое «цит-цит-цит», песня состоит из несколько звонких звуков. Крыло – 85-88 мм.

Сходства – отличия: от других коньков отличается темными ногами и отсутствием пестрин на зобе и груди (они есть лишь у самок и то очень слабые). Также как и для лесного конька характерен токовый полет в сопровождении песенных трелей, очень похожих на его песню.

Распространение: горные области Евразии и Северной Америки. В Туркменистане Большие Балханы, Копетдаг, Койтендаг. Зимуют в Южной Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Малой, Передней, Восточной и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: гнездящаяся, частично зимующая птица. На пролете и зимой встречается широко, но заметно больше в речных долинах и предгорьях. Весенний пролет – с начала марта и до середины апреля, осенний – в октябре-ноябре. Держатся парами, на пролетах – стайками. Гнезда устраивают на земле, среди пучков травы. Питаются насекомыми.

Статус: на пролете и зимовке немногочислен, местами обычен, на гнездовье очень редок.

255. Goyunguş – *Motacilla flava* – Желтая трясогузка

Meýdan alamatlary: serçe möçberli uzyn guýrukly gelşikli guş. **Esasy alamaty:** horazynyň bedeniniň aşagy sary, arkasy ýaşylymtly-goňur, mäkiýanyň aşagy-agymtyl, üstki tarapy-goňur-ýaşylymtly-çypar reňkli. Dürli aşaky görnüşlerinde kellesiniň reňki we nagyşlary üýtgeýär. Tolkunşekilli uçýar; ýerde oturan mahaly guýruguny yzygiderly ýaýkaýar. Uzynlygy – 186, ganaty – 80.4, ganatlarynyň gerimi – 261, çünki – 12 mm, agramy – 17 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: guýrugunyň has gysgadygy, göwresiniň kiçidigi we arkasynyň ýaşylymtlydygy bilen dag goýunguşyndan; kellesiniň reňkiniň çalymtly ýa-da çalymtly-ýaşylymtlydygy bilen sarybaş goýunguşdan we ýelek örtüginini sarymtly-ýaşyl öwüşginliliği bilen geçi-guşdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeleýän bölegi – Ýewropanyň, çetki demirgazyk çäklerinden başgalarynda we Aziýanyň demirgazyk ýarym bölegi, Amerikada–Alýaskanyň günbatary. Orta Aziýada we Türkmenistanda derýalaryň jülgelelerinde, çöllüklerde, ýöne oazislere ýakyn saklanýar. Afrikanyň, Sahara çölünden başga yerlerinde, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýada gyslaýar.

Ýaşaýşy: Orta Aziýanyň hemme ýerlerinde bolşy ýaly, Türkmenistandanda hem uçup geçýän guş. Ýazyna aprelda, güýzine sentýabrda uçup geçýär. Çygly ýerlerde, käte düzlükdäki seýrek gyrymsylykda we daglyk ýerlerde saklanýar, çöllüklerde hem duşmagy mümkin. Süri ýa-da kiçiräk topar bolup, esasan, ýerde, käte

Полевые признаки: стройная небольшая птица, не крупнее воробья с длинным хвостом. **Главный признак – у самца низ тела желтый, спина зеленовато-бурая, а у самки низ беловатый, верх – буро-зелено-рыжеватый.** Окраска и рисунок головы у разных подвигов варьируют. Полет волнообразный; сидя на земле, постоянно покачивает хвостом. Длина – 186, крыло – 80.4, размах крыльев – 261, клюв – 12 мм, вес – 17 г.

Сходства – отличия: от горной трясогузки отличается более коротким хвостом, меньшей величиной и зеленоватой спиной, от желтоголовой трясогузки – серым или серо-зеленым цветом головы, от белой – желто-зелеными тонами оперения.

Распространение: гнездовая часть ареала – Европа, кроме крайних северных областей, и северная половина Азии, в Америке – на западе Аляски. В Средней Азии и Туркменистане – широко по долинам крупных и мелких рек, в пустыне, но тяготеет к оазисам. Зимует в Африке, исключая Сахару, в Южной и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: в Туркменистане, как по всей Средней Азии, пролетная, в подходящих местах гнездящаяся птица. Весенняя миграция – в апреле, осенняя – сентябре. На пролете держится в стаях. Обитает во влажных местностях, иногда поросших редким кустарником. Гнезда – в мае-июне, обычно на земле под кустиками трав, в гнезде 5-6 яиц зе-

sarybaş goýunguşlar bilen bilelikde gezyär. Mör-möjekler (ýaprakçy tomzaklar, maýda kebelekler, garynjalar, ýasmyklar) bilen ýymitlenýär.

Statusy: uçup geçende adaty, käbir ýerlerde az sanly guş.

256. Sarybaş goýunguş – *Motacilla citreola* – Желтоголовая трясогузка

Meýdan alamatlary: beýleki goýunguşlar ýaly ululykda. **Ýaşy ýeten horazlarynyň kellesi we bedeniniň aşaky bölegi tomsuna sary, mäkiýan guşlaryňky–çalymtyl-ýaşylymtyl.** Horazlarynyň arkasy guşky ýelek örtüginde **has çal öwüşginli.** Mäkiýan guşlaryň arkasy goňur ýokundyly, bedeniniň aşak tarapyň sary reňki ýagtyrak. Mäkiýanyň kellesi çalymtyl-ýaşylymtyl, ýöne sary reňki maňlaýynda, gaşynda we bokurdagynda saklanýar. Uzynlygy – 175, ganaty – 78-82, ganatlarynyň gerimi – 245-265 mm, agramy -16-19 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: kellesiniň, aýratyn-da, horazlarynyň sary reňki boýunça beýlekilerden aňsat tapawutlanýar, guýrugynyň gapdalaryndaky ak zolak edil goýunguşyňky ýaly. Meýdan şertinde ýaş guşlary goýunguşlaryň ýaş guşlaryndan tapawutlandyrmak kyn.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän nokatlary Ýewraziýanyň dürli böleklerini öz içine alýar. Gündogar Ýewropa, Demirgazyk Gazagystan, Günbatar Sibir, Merkezi, Orta we Alynky Aziýanyň daglyk ýerleri. Türkmenistanda düzlük we daglyk ýerlerde giňişleýin duşýar, köplenç oazislere we derýalaryň jülgelerine ýakyn saklanýar. Günorta Aziýada gýşlaýar.

Ýaşayşy: ýazyna–martda, güýznezawgust-sentyabrda uçup geçýär. Uçup geçýän döwründe goýunguşlaryň to-

леновато-белого цвета с темными крапинками. Питается насекомыми (листоедами, мелкими бабочками, муравьями, клопами).

Статус: на пролете обычная, местами немногочисленная птица.

Полевые признаки: телосложение как у других трясогузок. **У взрослого самца летом голова и нижняя часть тела желтые. У самки голова серо-зеленая.** В зимнем наряде у самца **спина более серого тона.** У самки на спине буроватый налет, желтая окраска нижней стороны тела светлее. Голова у самки серовато-зеленая, но лоб, брови и горло остаются желтыми. Длина – 175, крыло – 78-82, размах крыльев – 245-265 мм, вес – 16-19 г.

Сходства – отличия: от других трясогузок легко отличается по желтому цвету головы, особенно у самцов, по бокам хвоста белые полосы, как у желтой трясогузки. Молодые особи от молодых желтых трясогузок в полевых условиях почти неотличимы.

Распространение: гнездовая область ареала охватывает различные части Евразии – Восточная Европа, Северный Казахстан, Западная Сибирь, горные области Центральной, Средней и Передней Азии. В Туркменистане встречается широко на равнинах и в горах, но тяготеет больше к оазисам и долинам рек. Зимует в Южной Азии.

Образ жизни: весенний пролет – в марте, осенний – в августе-сентябре. На пролете нередко держатся в совместных стаях с желтыми трясогузками.

paryna goşulyp bile gezyär.

Statusy: goýunguş bilen deňeşdireninde az sany guş.

257. Dag goýunguş – *Motacilla cinerea* – Горная трясогузка

Meýdan alamatlary: **ýaşy ýeten horazlarynyň kellesiniň üstki tarapy, arkasy we eginleri ýazyna kültreňk-çal,** ganatlary – garamtyl-goňur, ýeleklери inli ak jäheklenen. Gözüniň üsti ak zolakly. Bedeniniň aşak tarapy açyk-sary. **Guýrugastynyň ýaşylymtyl-sary reňki boýunça gowy tanalýar, horazlarynyň bokurdagy we petekesi gara.** Goýunguşlaryň beýlekileri ýaly, elmydama ýerde gezende guýrugyny ýaýkaýar. Sesi – “sitt-sitt”, käte “se-se”. Ganaty – 186-190, ganatlarynyň gerimi – 250-257, guýrugy – 90.6-91.1 mm, agramy – 19 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: goýunguşy ýatladýar, ýöne bedeni gelşikli, guýrugy birmeme uzynrak, horazlarynyň goýunguşdan we sarybaş goýunguşdan tapawutlylykda bokurdagy gara tegmilli.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän ýerleri Ýewraziýanyň dürli böleklerinde – Günbatar Ýewropa, Sibir, Kawkaz, Kiçi, Alynky Aziýa, Orta we Gündogar Aziýanyň günorta bölegi. Türkmenistanda daglyk eýerlerde duşýar. Afrikanyň günorta böleginde, Kiçi, Alynky, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýada gýşlaýar.

Ýaşayşy: höwürtleýän guş. Ýazyna–aprelde we maý aýunyň birinji ýarymynda, güýzine–oktyabrda uçup geçýär. Daglardaky derýajyklaryň, suwly ýaplaryň kenarýakalarynda we beýleki çygly ýerlerde saklanýar. Jübüt bolup gezyär, kenarýakalaryndaky ýa-da

Статус: по сравнению с желтой трясогузкой, немногочисленная птица.

Полевые признаки: **у взрослых самцов весной верхняя сторона головы, спина и плечи пепельно-серые,** крылья – темно-бурые с широкими белыми окаймлениями перьев. Над глазом – белая полоса. Нижняя сторона тела светло-желтая. Хорошо **узнается по зеленовато-желтому цвету подхвостья, у самцов черные горло и зоб.** Как и все трясогузки, сидя на земле, постоянно покачивает хвостом. Голос – «цитт-цитт», иногда «це-це». Крыло – 186-190, размах крыльев – 250-257, хвост – 90.6-91.1 мм, вес – 19 г.

Сходства-отличия: напоминает желтую трясогузку, но стройнее и хвост несколько длиннее, самцы, в отличие от самцов желтых и желто-головых трясогузок, с черным пятном на горле.

Распространение: гнездовая область в различных частях Евразии – Западная Европа, Сибирь, Кавказ, Малая, Передняя, южные части Средней и Восточная Азия. В Туркменистане населяет горные районы. Зимует в южной половине Африки, в Малой, Передней, Южной и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: гнездящаяся птица, весенний пролет – в апреле и первой половине мая, осенний – в октябре. Придерживается берегов горных речек, арыков и других увлажненных мест. Дер-жится парами, гнездо устраивает на земле, в углублении на берегу или среди камней. В кладке обычно 5 яиц

daşlaryň arasyndaky ýalpak oýjagazda höwürte gurýar. 5 sany köpsanly sozuk menekler bilen örtülen, agymtyl-sarymtyl-çal reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 18.5-14.2 mm. Goýunguşlaryň beýlekileri ýaly, esasan, MÖR-MÖJEKLER bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, bölekleýin ýaýran görnüş.

258. Geçiguş – *Motacilla alba* – Белая трясогузка

Meýdan alamatlary: serçe öleşli, süýnmek, gelişli bedenli guş. **Guýrugy uzyn, gapdal ýelekleri uçanda aýdyň görünýän ak zolakly. Ýelek örtügininiň umumy öwüşgini çal, ýöne gara we ak meýdançalar anyk tapawutlanýar.** Ýaşy ýeten horazlaryň we mäkiýanlaryň bokurdagy, “telpejigi” we döşüniň ýokarsy gara, olaryň üstki tarapy-külreňk-çal, aşagy – ak. Mäkiýan guşlaryň alkymynyň aşagy we bokurdagy ak, emma arasynda mäkiýanlarynyň horazlaryndan tapawutlanmaýanlary hem duşýar. Ýelek örtügininiň umumy reňki güýzine üýtgemeyär, ýöne horazlarynyň petekesinde ýarymaý şekilli kiçiräk tegmili saklanýar, mäkiýan guşlaryň maňlaýy çalymtly reňki alýar. Ýaş guşlaryň üstki tarapy goňurrak-çal we aşagy-kirliräk-ak. Çünki we aýaklary çal reňkli. Tolkunşekilli uçýar, edil goýunguşlar ýaly mydama guýrugyny ýaýkýar. Sesi batly-“sizi-sýuri-sýurýa-klýuý-klýuý-klýuýwiu”. Uzynlygy – 196-198, ganaty – 88, ganatlarynyň gerimi – 281.8-276.6 mm, agramy - 21.9 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: aşaky tarapyň akdygy bilen goýunguşlardan; boýnunyň we kellesiniň gapdallaryndaky ak zolagy boýunça dulanan goýunguşdan

бледно-желтовато-серого цвета с многочисленными расплывчатыми крапинками, размер 18.5 x 14.2 мм. Как и другие трясогузки питается, в основном, насекомыми.

Статус: немногочисленный вид с неравномерным распространением.

Полевые признаки: небольшая птица с удлиненным стройным телом, размером с воробья. **Хвост длинный с белыми полосками по бокам, что хорошо заметно в полете. Основной тон оперения серый, но с контрастными черными и белыми участками.** Взрослые самцы и самки с черным горлом, “шапочкой” и черной верхней частью груди; верх у них – пельно-серый, низ – белый. У самок подбородок и горло белые, но встречаются самки почти не отличимые от самцов. В осеннее время общий окрас оперения остается, но у самцов на зобе сохраняется лишь небольшое пятно в виде полумесяца, а у самки лоб становится серым. Молодые, в основном, буровато-серые сверху и грязно-белые снизу. Клюв и ноги серого цвета. Полет волнообразный, как и другие трясогузки постоянно покачивает хвостом. Голос – звонкое «цизи-цюрю-цюрю-клюй-клюй-клюйвиу». Длина – 196-198, крыло – 88, размах крыльев – 281.8-276.6 мм, вес – 21.9 г.

Сходства – отличия: от других трясогузок отличается белым низом, а от маскированной трясогузки наличием белой полосы по бокам шеи и головы; в отличие от

we ýaş goýunguşdan ýa-da sarybaş goýunguşdan, geçiguşdan agymtyl gaşynyň ýokdygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: giň. Höwürtegeleýän ýerleri – Ýewropanyň, Aziýanyň, günorta-gündogar çetlerinden başgalarynda, Afrikanyň demirgazynda belli-belli ýerlerde, Grenlandiýa we Alyaska. Orta Aziýanyň we Türkmenistanyň hemme ýerlerinden uçup geçýär, guşyna oazislere we dag eteklerine çekilýär. Günorta Ýewropada, Afrikada, Sahara çölünden we tropik giňişlinden başgalarynda, Arabystanda, Kiçi, Alynky we Günorta Aziýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, bölekleýin gyşlaýan guş. Ýazyna martyň ortasyndan we aprelde, güýzine sentýabr-oktyabrda uçup geçýär.

Statusy: uçup geçende adaty, guş döwrinde az sanly guş.

259. Dulanan goýunguş – *Motacilla personata* – Маскированная трясогузка

Meýdan alamatlary: **ýaşy ýeten guşlaryň boýny, kellesiniň üsti we gapdallary, bokurdagy we döşi gara, arkasy çal ýa-da garamtyl, maňlaýy, gözünüň üstündäki, guýrugynyň gapdallaryndaky we ganatlaryndaky zolaklar we bedeniniň aşaky tarapy ak.** Mäkiýan guşlaryň kellesinde gara reňk bolýar. Ýaş guşlaryň döşündäki “gülyaka” garamtyl-çal. Sesi geçiguşuň sesi bilen birmeňzeş. Uzynlygy – 196-198, ganaty – 78-99, ganatlarynyň gerimi – 265-276 mm, agramy 20.5 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: kellesiniň garamtyldygy bilen beýleki goýunguşlardan, boýnunyň hem döşüniň ýokarsynyň garadygy,

молodyх желтых или желтоголовых трясогузок у молодых белых трясогузок отсутствует светлая бровь.

Распространение: широкое. Область гнездования – Европа, Азия, кроме крайнего юго-востока, локально на севере Африки, в Гренландии и на Аляске. В Средней Азии и Туркменистане – на пролетах повсеместно, зимой тяготеет к оазисам и предгорьям. Зимует в Южной Европе, в Африке, исключая Сахару и тропики, Аравии, Малай, Передней и Южной Азии.

Образ жизни: пролетная, частично зимующая птица. Весенний пролет – с середины марта и в апреле, осенний – в сентябре-октябре.

Статус: обычная на пролетах птица, в зимнее время немногочисленна.

Полевые признаки: **у взрослой птицы шея, верх и бока головы, горло и грудь черные, спина серая или темная, а лоб, полоса через глаз, полоски по бокам хвоста и на крыльях и низ тела – белые.** Развитие черного цвета на голове у разных самок различается. Молодые с черновато-серым «ожерельем» на груди. Голос схож с голосом белой трясогузки. Длина – 196-198, крыло – 78-99, размах крыльев – 265-276 мм, вес – 20.5 г.

Сходства – отличия: от других трясогузок отличается темной головой, от белой трясогузки – черной шеей и верхом груди и белой «маской», охватывающей лоб и гла-

maňlaýyny we gözünü gabaýan ak «ör-tük» bilen geçiğuşdan tapawutlanýar.

Ýayran ýerleri: Günbatar Sibiriň günorta bölegi, Gazagystan, Orta we Alynky Aziýa. Türkmenistanda, esasan, derýa jülgeleriniň düzlüklerinde we daglarda, oazislerde duşýar. Günorta Aziýada guşlaýar.

Ýaşayşy: oturymly guş. Derýalaryň joşup suw basan ýerlerini, dürli suw ýataklarynyň kenarýakalaryny (hat-da ýaplaryň, çüwdürimeleriň hem) we ekerançylyk meýdanlaryny eýeleýär. Ýekelikde ýa-da jübüt bolup gezýär. Ýylda iki gezek köpelyär. Daşlaryň arasynda, guýularyň we daşdan örülen haýatларыň diwaryndaky erneklerde, gaýalaryň ýarçyklarynda, ýerden beýik bolmadyk uçutlarda höwürtgе gurýar. Aprel-iyunda 5-6 sany çal meneklije ak ýumurtгалary goýýar, ölçegleri - 20.5-15.1 mm. Iýun-awgustda – jüýjeleýär. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde adaty, göze ilip duran tanyş guş.

Toganlar – Laniidae – Сорокопүтовые

Çünki «ýyrtyjy» guşlaryňka çalymdaş, gapdallaryndan gysylan, ujy ýiti gaňyrçakly, laçynlara käbir çalymdaşlygy bolan, serçeden jokjokary aralykdaky, orta ölçegli guşlar maşgalasy. Dykyz beden gurluşly. Perde gapjyklary burun deşiklerini ýapmaýar. Ganatlary, adatyça, gysga we tegelesen. Guýrugy dürli uzynlykda, käte örän uzyn, käte-basgançak görnüşinde. Aýaklary orta uzynlykda, berdaşly, dyrnaklary gysga, gaňyrçagrak ýiti uçly we güýçli. Ýelek örtügi ýumşak we gowşak. Ýaş guşlara kese nagyşy ala reňk häsiýetli. Türkmenistanda ýaşayan görnüşleriniň hemmesiniň

за.

Распространение: южные части Западной Сибири, Казахстан, Средняя и Передняя Азия. В Туркменистане, в основном, по долинам рек на равнинах и в горах, в оазисах. Зимует в Южной Азии.

Образ жизни: оседлая птица. Населяет поймы рек, берега различных водоемов (даже арыков, фонтанов) и сельскохозяйственный ландшафт. Держится в одиночку и парами. Две кладки в году. Гнезда среди камней, в стенах колодцев и каменных заборов, в нишах и трещинах скал и обрывов, невысоко над землей. Кладка из 5-6 белых с серыми пятнами яиц, в апреле-июле, размеры 20.5 x 15.1 мм. Птенцы – в июне-августе. Питается насекомыми.

Статус: немногочисленная, местами обычная, заметная птица.

Семейство птиц средних размеров, от воробья до некрупного дрозда, с характерным «хищным» клювом – сжатым с боков, с острым крючком на конце, что придает некоторое сходство с соколиными. Телосложение плотное. Ноздри не прикрыты перепончатыми крышечками. Крыло, обычно, короткое и закругленное. Хвост различной длины, иногда ступенчатой формы. Ноги умеренной длины, довольно толстые, когти короткие, крючковатые, острые и сильные. Оперение мягкое и довольно рыхлое. Для молодых птиц характерна пестрая окраска.

gözünüň üstünden geçýän gara zolagy bolýar (ol ýaş guşlarda bolmaýar). Guşlara agajyň depesinden ýa-da gyrymsydan duýdansyz düşende, dik başaşak, ýereň üstüne golaý uçup, soňra ýene-de ýokary göterilmek häsiýetlidir. Guýrugyny, adatyça, oturanda aşak we ýokary ýaýkaýar. Daglarda, düzlükde we oazislerde ýaşayar. Mör-möjekler we beýleki oňurgasyzlar, maýda oňurgaly haýwanlar bilen iýmitlenýärler. Agaçlaryň tikenlerine awlan awlaryny sançmaga ukyplydyrlar. Höwürtgеsini agaçlarda ýa-da gyrymsylarda açyk, okaraşekilli edip gurýar. Sesi pert we gödegräk. Saýraýşy-beýleki guşlaryň seslerine öýkünme. Maşgalla 67 görnüşden durýar, olaryň 8-si Türkmenistanda.

260. Çyparguýruk togan – Lanius isabellinus – Кашгарский жулан

Meýdan alamatlary: sardan kiçiräk ölçegli. **Kellesi açyk-goňur, bokurdagy ak, gözünüň yzyna gara-goňur zolak uzaýar.** Bedeniniň üstki tarapy çäge reňkde ýa-da goňur, aşaky tarapy çyparrak-gülgüne, döşünde we böwürlerinde ol doýgun öwüsginde bolup, **bili we guýrugy ýagty-çypar reňkli.** Ganatlary açyk-goňur, **kiçiräk ak tegmilli,** olaryň ýelekleri çypar jähekli. Çünki çalymytyl-goňurak, aýaklary goňur reňkli. Mäkiýan guşlaryň reňki solgun, bokurdagynyň we döşüniň gapdallarynda kese çyzyklaryň yzlary bolýar. Ýaş guşlaryň bedeniniň üsti has poslyrak-goňur, şeýle-de agymtyl döşünde we böwürlerinde kese nagyşlary bolýar. Sesi gaty, beýleki guşlaryň sesinden alnan, gatla açy-

ска с поперечным рисунком. Все виды, обитающие в Туркменистане, имеют темную полосу, проходящую через глаз (ее нет у молодых). Характерна манера при спуске с вершины дерева или куста слетать круто вниз, лететь над самой землей, а затем опять взмывать вверх. Имеют обыкновение покачивать хвостом вверх и вниз. Распространены в горах, на равнинах, в оазисах. Питаются животной пищей – насекомыми и другими беспозвоночными, мелкими позвоночными животными. Добычу способны накалывать на шипы деревьев. Гнезда открытые, чашевидные, на деревьях или кустах. Голос резкий и грубоватый. В пении – подражание голосам других птиц. В семействе насчитывается 67 видов, из которых 8 – в Туркменистане.

Полевые признаки: размером мельче скворца. **Голова светло-коричневая, горло белое, за глазом тянется черно-бурая полоса.** Верхняя сторона тела песочная или бурая, нижняя сторона рыжевато-розовая, более насыщенного тона на груди и боках, **поясница и хвост ярко-рыжие.** Крылья светлорыжие с **небольшим белым пятном,** их перья с рыжеватыми каемками. Клюв серо-буроватого цвета, ноги бурые. У самки цвета бледнее, на боках горла и груди следы поперечных линий. У молодых верх тела более ржаво-буроватый, а также поперечный рисунок на светлой груди и боках. Голос – довольно громкое щелкание, включающее строфы, заимствованные у других

landaky ýaly jygyl dama. Ganaty – 88-99, guýrugy – 79.5-89.2, söbügi – 23.7-26.4, çüňki – 10.4-13.5 mm.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: çupar guýrugy bilen bizde bar bolan beýleki toganlardan tapawutlanýar.

Ýaşýan ýerleri: Ýakyn Gündogar we Orta Aziýa. Türkmenistanda, esasan, daglyklarda we dagetekleri, şeýle-de Tejen, Murgap, Garagum derýalarynyň, Amyderýanyň jülgerleri. Hindistanyň demirgazyk-günbatarynda, Arabystanda we Afrikada gyslaşýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän guş, körpenç ýurduň gündogar çetlerinde gabat gelýär. Ýazky migrasiýasy aprelde, güýzkisi sentýabr-oktyabrda. Dürli landşaftlarda ýaşýar, ýöne ol oazise ymtylýar. Beýleki toganlar ýaly ol hem mör-möjekler, seýrek maýda oňurgaly haýwanlar bilen ýymitlenýär.

Statusy: az sanly, bölekleyin ýaşýan guş.

261. Gyzyt togan – *Lanius collurio* – Обыкновенный жулан

Meýdan alamatlary: sardan sähelçe kiçi. Horazynyň kellesiniň üstki tarapy we boýny açyk-çal reňkli. Maňlaýyndaky insiz germew we kellesiniň gapdalaryndaky unli zolak gara. **Arkasynyň ortasy we eginleri çuparrak-goňur.** Bedeniniň aşaky tarapy ak, döşi we böwürleri çalymtyl-gülgüne ýiti öwüşginli. **Gara guýrugynyň ujy tegelenen, üsti külreňk-çal.** Çüňki we aýaklary gara. Mäkiýan guşuň arkasy çuparrak-goňur, kellesi, boýny, guýrugynyň üsti çalymtyl-goňur. Aşak tarapy çuparrak-ak, goňur teňňesypat

птиц. Крыло – 88-99, хвост – 79.5-89.2, цевка – 23.7-26.4, клюв – 10.4-13.5 мм.

Сходства – отличия: от других наших сорокопутов отличается рыжим хвостом.

Распространение: Ближний Восток и Средняя Азия. В Туркменистане, в основном, горные районы и предгорные равнины, а также долины Теджена, Мургаба, Каракумдары, Амударыи. Зимует на северо-западе Индостана, в Аравии и Африке.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица, причем чаще встречается в долинах и предгорьях. Весенняя миграция – в апреле, осенняя – в сентябре-октябре. Обитает в различных ландшафтах, но тяготеет к оазисам. Как и другие сорокопуть питается насекомыми, реже мелкими позвоночными животными.

Статус: немногочисленная птица с неравномерным распространением, в пустыне реже чем в горах.

Полевые признаки: несколько мельче скворца. У самца верхняя сторона головы и шеи светло-серого цвета. Узкая перемычка на лбу и широкие полосы по бокам головы черные. **Середина спины и плечи рыжеватобурые.** Нижняя сторона тела белая, с сильным сероватозеленым налетом на груди и боках. **Конец черного хвоста закругленный, надхвостье пепельно-серое.** Клюв и ноги черные. У самки спина рыжеватобурая, голова, шея, надхвостье – сероватобурые. Нижняя сторона рыжеватобелая

nagyşly. Guýrugy goňur. Ýaşlary mäkiýan guşlara çalymdaş, ýöne teňňesypat nagyşlar arka tarapynda. Bat alyp tolkynşekilli, göni uçýar. Sesi pert – “çek-çek” we güýçli “çza-çza”. Saýraýşy – beýleki guşlaryň seslerine öýkünme. Ganaty – 84-99, guýrugy – 67-82, söbügi – 22.8-25.5, çüňki – 11.2-14.3 mm, agramy – 22.5-38 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: horazlary, beýleki toganlardan, kellesiniň üstündäki, boýundaky, bilindäki külreňk-çal ýokundylaryň utgaşmasy, arkasynyň anyk çuparrak-goňurdygy, ganatlarynyň garadygy we guýrugynyň gara-akdygy bilen tapawutlanýar. Mäkiýan we ýaş guşlaryň esasy tapawutlandyryjy alamaty guýrugynda azajyk hem bolsa ak reňkiň bolmandygy.

Ýaşýan ýerleri: arealynda höwürtegeýän bölegi Ýewraziýada Angliýadan gündogara Ýenesey derýasyna çenli, Orta Aziýada. Türkmenistanda dürli landşaftlarda duş gelmegi mümkin. Merkezi we Günorta Afrikada gyslaşýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän guş. Ýazky migrasiýasy–maýda, güýzkisi-awgust-sentýabrda. Hemme ýerlerde duşýar, dag eteklerine we derýalaryň jülgerlerine, açyk giňişliklere ymtylýar. Dürli mör-möjekler, şeýle-de maýda oňurgaly haýwanlar bilen ýymitlenýär.

Statusy: az sanly, bizde gowşak öwrenilen görnüş.

262. Ýaşyryn togan – *Lanius nubicus* – Маскированный сорокопуть

Meýdan alamatlary: ýeňil bedenden gurluşly, kiçiräk togan. **Gara we ak reňkleriň utgaşmasy häsiýetli.**

с бурым чешуйчатым рисунком. Хвост бурый. Молодые похожи на самку, но на спинной стороне с чешуйчатым рисунком. Полет волнистый, реже – прямой. Голос – резкое «чек-чек» и громкое «чжа-чжа». Песня – подражание голосам других птиц. Крыло – 84-99, хвост – 67-82, цевка – 22.8-25.5, клюв – 11.2-14.3 мм, вес – 22.5-38 г.

Сходства – отличия: самцы, по сравнению с другими сорокопутьями отличаются сочетанием пепельно-серого верха головы, шеи, поясницы и отчетливой рыже-коричневой спиной, черными крыльями и черно-белым хвостом. Главное отличие самок и молодых – наличие на хвосте хоть немного белого цвета

Распространение: гнездовая часть ареала в Евразии – от Англии на восток до Енисея, Средняя Азия. В Туркменистане может быть встречен в различных частях страны. Зимует в Центральной и Южной Африке.

Образ жизни: в Туркменистане пролетная птица. Весенняя миграция – в мае, осенняя – в августе-сентябре. Встречается повсеместно – в предгорьях и долинах рек, тяготеет к открытым местонаблюдениям. Питается, главным образом, различными насекомыми, так же мелкими позвоночными животными.

Статус: немногочисленный, слабо изученный у нас вид.

Полевые признаки: некрупный, легкого сложения сорокопуть. **Характерно сочетание черного**

Maňlaýy, gözüniň üstündäki inli zolak, bokurdagy, egnileri, ganatyndaky ak tegmil-arassa-ak. **Bedeniniň üstki tarapynyň ýeleklerinde we gözüniň aşagyndaky zolakda gök öwüşginli gara reňk agdyklyk edýär.** Aşaky tarapy ak, döşi çupargülgüne öwüşginli. Bedeniniň gapdallary goňurrak-posrenkli. Mäkiýan gu-şuň kellesi goňurrak-gara, ganatlary we guýrugy goňur. Ýaş guşlaryň üsti goňurrak-çal, tegelenen agymtyl tegmilli. Bedeniň aşaky tarapy goňur teňňesypat nagyşly. Gözüniň yzynyndaky zolak goňur. Horazyň çüňki we aýaklary garamtyl, mäkiýan gu-şuňky – goňurrak. Ganaty – 86-95, guýrugy – 82-91.2, söbügi – 20-23, çüňki – 11.5-13.5 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: gara we ak reňkleriň utgaşma aýratynlygy bilen beýleki toganlardan tapawutlanýar. Goňrasrak-çupar reňki kellesinde bolmaýar.

Ýaýran ýerleri: Gündogar Ortaýer deňzi, Balkan ý/a gündogar bölegi, Kiçi Aziýa, Eýranyň günorta-günbatar bölegi we Ýakyn Gündogar. Türkmenistanda Amyderýa, Murgap jülgelerinde we Bathyzda duş gelmegi mümkin. Ýrakda, Arabystanyň günortasynda we Demirgazyk-Gündogar Afrikada gyslaýar.

Ýaşayşy: käte höwürtlemege hem mümkin. Ýazyna aprel-maý aýlarynda duşýar. Dürli agaç ösüm-kili ýerlerde, gyrymsyly jeňneliklerde, derýalaryň jülgelerindäki miweli-saýaly baglarda, pisseliklerde ýaşayar. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: örän seýrek, öwrenilmedik diýen ýaly, çakli ýaýran görnüş.

и белого цвета. Лоб, широкая полоса над глазом, горло, плечи, белое пятно на крыле – чисто-белые. **Преобладающая окраска верхней стороны тела и полоса под глазом черные, с синим отливом.** Нижняя сторона белая, грудь с рыжевато-розовым налетом. Бока тела коричневато-ржавые. У самки голова буровато-черная, крылья и хвост бурые. Молодые сверху буровато-серые, с округлыми беловатыми пятнами. Нижняя сторона тела с бурым чешуйчатым рисунком. Полоса за глазом бурая. Клюв и ноги черноватые у самца, буроватые у самок. Крыло – 86-95, хвост – 82-91.2, цевка – 20-23, клюв – 11.5-13.5 мм.

Сходства – отличия: от других сорокопутов отличается характерным сочетанием черного и белого цвета. На голове нет каштаново-рыжей окраски.

Распространение: Восточное Средиземноморье, восточная часть Балканского полуострова, Малая Азия, юго-западная часть Ирана и Ближний Восток. В Туркменистане возможны встречи в долинах Амударьи, Мургаба, в Бадхызе и других местах. Зимует в Ираке, на юге Аравии и в Северо-Восточной Африке.

Образ жизни: возможно спорадическое гнездование. Весной можно встретить в апреле-мае. Обитает в разнообразных насаждениях, кустарниковых зарослях и садах по долинам рек, в фисташниках. Питается насекомыми.

Статус: очень редкий, почти не изученный вид с ограниченным распространением.

263. Uzynguýruk togan – *Lanius schach* – Длиннохвостый сорокопут

Meýdan alamatlary: **basgançakly guýrugy uzyn** we arkasynyň yzky bölegi çupar reňkli **uly togan.** Kellesiniň üsti we boýny çal reňkli. Kellesiniň gapdallary inli zolakly, ganatlary we guýrugy goýu-goňur. Bedeniniň aşak tarapy ak, gapdallary we guýrugynyň aşagy çupar öwüşginli. Çüňki we aýaklary gara. Sesi pert we özboluşly gykylyk, saýraýşy güýçli, köplenç beýleki guşlara sesli öýkünmeler. Uzynlygy – 230, ganaty – 90-99, guýrugy – 117.7-109.8, söbügi – 25-30, çüňki – 18-22 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: uly ölçegli diýgi, özgelere garanyňda guýrugynyň uzyn we basgançaklydygy bilen beýleki toganlardan tapawutlanýar. Guýrugynyň çetki ýelekleri açyk-goňur, ortakylary goňur. Bedeniniň arka tarapynyň çupar reňki bilen ala togan we garamaňlaý toganlardan we ganatlarynda ak tegmiliň ýokdygy hem guýrugynyň uzyndygy bilen hindi guzyly toganýndan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Orta, Merkezi, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýa. Türkmenistanda Köýtendag, Köpetdag we onuň etekleri, Amyderýa jülgeleriniň, Murgap, Tejen, Etrek derýalarynyň şäher Türkmenbaşy çenli. Günorta Aziýada gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup gelýän we höwürtlemege ýaly guş. Ýazky migrasiýasy aprelde, güýzkisi awgust - sentýabrda. Mekany jülgelerdäki we oazislardäki gyrymsy agaçlaryň ösýän ýerleri. Agaçlaryň üstinde höwürtleýär. 4-6, seýrek 7 sany kütek uýynda goýalýan, ýaşylymtyl-goňurrak, goňur ýa-da garamtylrak we çal

Полевые признаки: **крупный сорокопут, с длинным ступенчатым хвостом** и рыжей задней частью спины. Голова сверху и шея серого цвета. Широкие полосы по бокам головы, крылья и хвост – темно-бурые. Низ тела белый, с рыжим оттенком на боках и подхвостье. Клюв и ноги черные. Голос – резкий и своеобразный крик, пение громкое, в значительной степени из звукоподражания другим птицам. Длина – 230, крыло – 90-99, хвост – 117.7-109.8, цевка – 25-30, клюв – 18-22 мм.

Сходства – отличия: от других сорокопутов отличается более крупными размерами и относительно длинным, ступенчатым хвостом. Крайние перья хвоста светло-бурые, средние – бурые. От серого и чернолоблого сорокопутов отличается, главным образом, рыжеватой окраской на спинной стороне тела. От индийского жулана – отсутствием белых пятен на крыльях и длинным хвостом.

Распространение: в Средней, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. В Туркменистане – в Койтендаге, Копетдаге и его предгорьях, в Прикаспии (местами) по долинам, Амударьи, Мургаба, Теджена, Этрека и до города Туркменбаши. Зимует в Южной Азии.

Образ жизни: прилетная и гнездящаяся птица. Весенняя миграция – в апреле, осенняя – в августе - сентябре. Местообитания – участки древесно-кустарниковых насаждений в долинах и оазисах. Гнездятся на деревьях. В кладке 4-6, изредка

bellikli ýaşylymytyl-goňur öwüşginli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 23.7 x 17.8 mm. Ýitiren ýumurtgalaryna derek ikilenji gezek ýumurtga goýmaklary mümkin. Iýunda jüýjeleýär. Esasan, mör-möjekler, maýda guşlaryň ýumurtgalary we jüýjeleri, şeýle-de maýdarak suwulganlar bilen iýmitleňýär.

Statusy: az anly, bölekleyin ýaýran guş.

264. Gara maňlaýly togan – *Lanius minor* – Чернолобый сорокопут

Meýdan alamatlary: ala togany ýatladýan, ýöne maýda ölçegli guş. **Maňlaýy, kellesiniň gapdallaryndaky inli zolaklar, ganatlary we guýrugy gara.** Arkasy agymtyl-gögümtil-çal reňkli. Ganatlarynda kiçiräk ak tegmiller bolýar. Bedeniniň aşak tarapy ak, döşi we böwürleri çalymytyk ýokundyly. Horazlary mäkiýanlaryna garanyňda, ähli reňki has doýgun. Ýaş guşlaryň üsti çalymytyl-melemtil reňkli, damjalaýyn inçejik çyzykly we bedeniniň böwürleri çalymytyl ýarymaýşekilli zolak yzly. Gözüniň üstünden insiz goňur zolak geçýär, ýöne maňlaýy gara zolaksyz. Aşagy ak, petekesi, döşi we böwürleri agymtyl-çypar ýokundyly. Sesi pert “çok-çok” ýa-da “çueek-çok”. Saýraýsy ikgildi owazlanma meňzeş. Tolkunşekilli uçýar, howada doňan ýaly saklanýar. Çünki we aýaklary gara. Ganaty – 110.9-123.2, guýrugy – 82.4-97.7, söbügi – 24.7-26.5, çüňki – 12.2-15.2 mm, agramy – 60-65 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: maňlaýynyň we depesiniň ön

7 яиц. Основной фон окраски зеленовато-бурый, с зеленовато-буроватыми, бурыми или черноватыми и серыми отметинами, сгущающимися на тупом конце. Размеры 23.7 x 17.8 мм. Возможно наличие вторых кладок взамен утраченных. Птенцы – в июне. Питаются, в основном, насекомыми, реже яйцами и птенцами мелких птиц, также небольшими ящерицами.

Статус: немногочисленная, с очень неравномерным распределением птица.

Полевые признаки: напоминает серого сорокута, но меньше по размеру. **Лоб и широкая полоса по бокам головы, крылья и хвост – черные.** Спина бледно-голубовато-серого цвета. На крыле небольшое белое пятно. Нижняя сторона тела белая, с сероватым налетом на груди и боках. У самцов, по сравнению с самками, все цвета более насыщенные. Молодые сверху серовато-кремового цвета, с тонкими струйчатыми серыми линиями и со следами сероватых дугообразных полос на боках тела. Через глаз проходит узкая бурая полоска, но черной полосы на лбу нет. Низ белый с бледно-рыжеватым оттенком на зобе, груди и боках. Голос – резкое «чок-чок» или «чуээк-чок». Пение щебечущее. Полет волнообразный, нередко «трясется», как бы замирая в воздухе. Клюв и ноги черные. Крыло – 110.9-123.2, хвост – 82.4-97.7, цевка – 24.7-26.5, клюв – 12.2-15.2 мм, вес – 60-65 г.

tarapynyň garadygy, guýrugynyň gysgadygy bilen beýleki toganlardan tapawutlanýar. Guýrugyndan ganatlary uzynrak.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän ýerleri – Günorta - Gündogar Ýewropa, Orta we Kiçi Aziýa, Eýranyň we Owganystanyň demirgazyk bölegi. Türkmenistanda Köpetdag we onuň etekleri, Günbatar Bathyz, Köýtendag, Amyderýanyň jülgeleri, Murgap, Tejen, Etrek derýalarynyň we deňiz kenarynda. Afrikanyň günorta böleginde gyşlaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän we höwürtegeleýän guş. Ýazky migrasiýasy – aprel-maýda, güýzkisi awgust-sentyabrda. Derýa ýakalaryndaky seýrek ösen toraňnylyklarda, piseliklerde, miweli we saýaly baglyk ýerlerde, seýilgählerde, dagda, derýajyklaryň jülgelerinde, 1100-1500 m çenli dag guşaklyklarynda ýaşaýar. Maý-iyun aýlarynda höwürtegeleýär. Ýitiren ýumurtgalarynyň öwezini dolmak üçin ikinji gezek ýumurtga goýmaklary mümkin. Agaçlaryň üstünde, beýik ösen gyrymsylarda höwürte gurýar. 3-8 sany kütek ujynda gül täjini döredeýän, çalymytyl-ýaşylyrak-goňur we syýa meneklije ýaşylymytyl ýa-da toýunsypat, ak reňkli ýumurtgalary goýýar, ölegleri - 25.7 x 18.4 mm. Maýyň soňunda jüýjeleýär. Aglaba, mör-möjekler, käte maýda oňurgaly haýwanlar, ir-iýmişler bilen iýmitleňýär.

Statusy: az sanly, daglyk ýerlerde howwürtegeleýän döwründe adaty görünüş.

265. Ala togan – *Lanius excubitor* – Серый сорокопут

Meýdan alamatlary: sar ölçegli, bizdäki toganlaryň arasynda iň

Сходства – отличия: по сравнению с другими сорокопутами лоб и передняя часть темени черные, хвост относительно короткий. Крыло длиннее хвоста.

Распространение: область гнездования – Юго-Восточная Европа, Средняя и Малая Азия, северные части Ирана и Афганистана. В Туркменистане – Копетдаг и его предгорья, Западный Бадхыз, Койтендаг, долины Амударьи, Мургаба, Теджена, Этрека и морское побережье. Зимует в южной половине Африки.

Образ жизни: гнездящаяся птица. Весенняя миграция – с середины апреля и в мае, осенняя – в августе-сентябре. Обитает в приречных разреженных тугаях, в фиштакковых рощах, садах, парках, в горах – по долинам речек, в горы распространяется до 1100-1500 м. Гнездится – в мае-июне. Возможно наличие вторых кладок взамен утраченных. Гнезда – на деревьях, реже – на больших кустах. В кладке 3-8 яиц, зеленоватого или глинисто-белого цвета, с серо-зеленовато-бурыми и фиолетовыми пятнышками, образующими венчик на тупом конце. Размеры яиц – 25.7 x 18.4 мм. Птенцы – в конце мая. Питание – преимущественно насекомые, изредка мелкие позвоночные животные, редко ягоды и плоды.

Статус: немногочисленный вид, в гнездовой период более обычен в горных районах.

Полевые признаки: самый крупный из наших сорокопутов,

ulusy. **Üstki tarapy, kellesindäki "telpejigi" hem goşanynda, kül-reňk-çal. Çünkünden başlap, gözünüň üstünden inli gara zolak geçýär. Guýrugy uzyn we basgançakly. Ganatlary we guýrugy gara reňkli.** Bedeniniň aşaky bölegi ak. Çünki daýaw we gaňurçagrak uçly. Horazynyň reňki mäkiýanyna meňzeş. Sesi gödek – "çek-çek". Ganaty – 112.7-114, guýrugy – 105-120, çünki – 15-18, söbügi – 25-30 mm, agramy – 65-75 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: uly togan. **Arka tarapynyň reňkiniň tutuşlygyna çaldygy we garnynyň ak ýa-da agymtyldygy** bilen gyzyly we çyparguýruk toganlardan tapawutlanýar. Ganatlarynyň tegelesen gysgadygy we ak gyraly gara guýrugynyň uzynlygy bilen gara maňlaý togandan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: giň. Demirgazyk Amerikanyň taýga zolagy, Demirgazyk Afrika we tutuş Ýewraziýa, demirgazyk we günorta-gündogar welaýatларыndan başгаларында. Türkmenistanda Hazaryň kenarýakasından, Günbataryň Uzboýdan we Günbataryň Köpetdagadan Amyderýa, Üstýurda, Bathyza we Köýtendaga çenli, hemme ýerlerde.

Ýaşayşy: uçup geçýän, höwürtegeleýän, ýek-tük guşlaýan guş. Ýazynda martda, güýze - sentýabr - oktyabrda uçup geçýär. Dürli landşaftlarda, dagda, şeýle-de çölde ýaşayar. Mart - aprel aýларында agaçларыň ýa-da gyrymsylaryň üstünde höwürtege gurýar. 4-7 sany ýumurtga goýýar. Ýitiren ýumurtгаларыныň öwezini dolmak üçin ikilenji gezek 5-6 sany çalymtыл-гök we ýaşыlytyl-goňur meneklije, ýaşыlymtыл-ak reňkli ýumurtгалары

размером со скворца. **Верхняя сторона, включая "шапочку" на голове, пепельно-серого цвета. От клюва через глаз – широкая черная полоса. Хвост длинный и ступенчатый. Крылья и хвост, в основном, черные.** Нижняя часть тела – белая. Клюв крепкий и крючковатый. Окраска самцов и самок схожа. Голос грубый – «чэк-чэк». Крыло – 112.7-114, хвост – 105-120, клюв – 15-18, цевка – 25-30 мм, вес – 65-75 г.

Сходства – отличия: наиболее крупный сорокопут. **Сплошной серый цвет на спинной стороне тела и белый или беловатый на брюшной,** что отличает от обыкновенного и кашгарского жуланов. Короткие закругленные крылья и относительно длинный хвост, черный с белыми краями, в отличие от чернолоблого сорокопуга, у которого полос на хвосте нет.

Распространение: широкое – таежная полоса Северной Америки, Северная Африка и вся Евразия, за исключением северных и юго-восточных областей. В Туркменистане – повсеместно от Каспийского побережья, Западного Узбоя и Западного Копетдага до Амударьи, Устюрта, Бадхыза и Койтендага.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся, частично зимующая птица. Весенний пролет – в марте, осенний – в сентябре - октябре. Обитает в различных ландшафтах, как в горах, так и в пустыне. Гнезда – в марте-апреле, на деревьях или кустарниках. В кладке 4-7 яиц. Повторная кладка, взамен утраченной, из 5-6 яиц, рыжеватой или зеленоватой-белого цвета, с серо-фиолетовыми и зелено-бурыми пятнышками, размеры 25.7 x 19.1

mm. Птенцы – в первой половине июня. Питаются мелкими позвоночными – ящерицами, грызунами, птицами, и насекомыми – жуками, перепончатокрылыми, прямокрылыми.

Статус: beýleki togalara gara-nynda, has giň ýaýran, az sanly, uçup geçýän wagty käbir ýerlerde adaty görnüş.

266. Hindi gyzyly toganý – *Lanius vittatus* – Индийский жулан

Meýdan alamatlary: çyparguýruk togan ýaly, yöne maýda. Maňlaýy we kellesiniň gapdallaryndaky inli zolagy gara. Depesi, ýeňsesi, boýnunyň üstki tarapy we guýrugynyň üstki maňlaýna tarap ýagtylyan açyk-külreňk-çal reňkli. Arkasynyň öňki böleginiň çal örtügi sodalyk bilen egniniň we arkasynyň ortasynda goýy ýa-da çyparrak-goňras reňke geçýär. Ganatlary ýokarsyndan gara, kiçiräk ak tegmilli. Guýrugy gara, gyralary ak. Bedeniniň aşak tarapy ak, döşi gülgüne ýa-da mämishi ýokundyly. Böwürleri açyk-çypar reňkli. Mäkiýanlary horazларына meňzeş, yöne reňki has öçügsi. Ýaş guşларыň üstki açyk çal, çypar ýokundyly we açyk-goňur tolkun şekilli kese geçýän inçe zolakly. Sesi "çir-çir" owaza çalymlary edýär, saýraýşy beýleki guşларыň seslerini goşmak bilen, köp halatda öýkünme. Çünki we aýakлары gara. Ganaty – 81-88.5, guýrugy – 75-94, söbügi – 22-25, çünki – 9.5-12 mm, agramy – 21-27 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: özgelere garanynda, guýrugynyň uzyn basgançakly bolmagy, böwürleriniň inli ak zolakлары we ganatlaryndaky ak tegmilleriň mese-mälimdigi olary gyzyly togandan tapawutlandyryýar.

Ýaýran ýerleri: Hindistan,

mm. Птенцы – в первой половине июня. Питаются мелкими позвоночными – ящерицами, грызунами, птицами, и насекомыми – жуками, перепончатокрылыми, прямокрылыми.

Статус: по сравнению с другими сорокопугами распространен более широко, немногочисленный, на пролете местами обычный вид.

Полевые признаки: напоминает кашгарского жулана, но мельче. **Лоб и широкая полоса по бокам головы – черные.** Темя, затылок, верхняя сторона шеи и надхвостье светло-пепельно-серые, светлее ко лбу. Серый цвет передней части спины плавно переходит в темно или рыже-каштановый на плечах и середине спины. **Крылья сверху черные с небольшим белом пятном. Хвост черный с белыми краями.** Нижняя сторона тела белая с розовым или оранжевым налетом на груди. Бока ярко-рыжие. Самки сходны с самцами, но более тусклы. Молодые сверху светло серые, с рыжеватым налетом и узкими волнистыми поперечными светло-бурыми полосками. Голос похож на «чир-чир», пение в значительной мере раздражительное, с включением голосов других птиц. Клюв и ноги черные. Крыло – 81-88.5, хвост – 75-94, цевка – 22-25, клюв – 9.5-12 мм, вес – 21-27 г.

Сходства – отличия: похож на обыкновенного жулана, но отличается относительно длинным ступенчатым хвостом с широкими белыми полосами по бокам и более заметным белым пятном на крыльях.

Pakistan, Owganystan. Türkmenistanda diňe günortada (Köýtendagda Bathyzda, Gündogar Köpetdagda), guşyna arealynyň günorta bölegine uçup gidýär.

Ýaşayşy: höwürtegeleýän guş. Ýazky migrasiýasy aprel, güýzkisi awgust-sentyabrda. Selçeň pisse tokaýlyklarynda gabat gelýär. Pisse ýa-da arça agajynda höwürte gurýar. 4-5 sany (ikinji gezek köpelende 3-4 ýumurtga) çyparrak-goňur meneklije agymtyl ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 21 x 16.2 mm. Iýul aýynda jüýjeleýär. Esasan, mör-möjekler, käte maýda oňurgalylar bilen iýmitlenýär.

Statusy: çäkli ýaýran seýrek görnüş.

267. Bellik: tötäden uçup gelen, kellesiniň üstüniň gyzylymtyl-goňur we gara arkasy bilen beýleki toganlardan tapawutlanýan **gyzylbaşly togana – *Lanius senator***, Kurendagda (1980 ý.), Gündogar Hazarda, Soýmonow külteminde (2007 ý.) bir gezek duşuldy.

Sargyldaklar – Oriolidae – Иволговые

Beden gurluşy we ölçegi boýunça jokjoky möçberli, orta ululykdaky guşlar maşgalasy. Olaryň esasy tapawutlandyryjy alamaty ganatlarynyň gara ýa-da goňurak, guýrugynyň garamtyl we kellesiniň gara tegmillidigi, açyk ýaşylymtyl-sary reňkiniň bolmagydyr. Gündogar ýarymşaryň tropik we subtropik zolaklarynda ýaýran. Dünyäde 38 görnüş, olardan Türkmenistanda – 1 görnüş.

Распространение: Индия, Пакистан, Афганистан. В Туркменистане – только южные части (Бадхыз, Восточный Копетдаг), на зиму отлетает в южные части ареала.

Образ жизни: гнездящаяся птица. Весенняя миграция – в апреле, осенняя – августе-сентябре. Встречается в редколесьях. Гнезда – на деревьях фисташки арчи и др. деревьев. Кладка из 4-5 яиц (вторые кладки содержат 3-4 яйца, беловатые с рыже-бурыми пятнами. Размеры – 21 x 16.2 мм. Птенцы – в июле. Питается, в основном, насекомыми, изредка мелкими позвоночными.

Статус: редкий вид с ограниченным распространением.

267. Примечание: дважды - в Курендаге (1980 г.) и на Восточном Каспии, у бухты Соймонова (2007 г.), встречены залетные **красноголовые сорокопуть – *Lanius senator***, отличающиеся от других сорокопутьов красно-коричневым верхом головы и черной спиной.

Семейство птиц средней величины, по размерам и телосложению несколько схожие с дроздами. Характерный признак – яркая зеленовато-желтая окраска с черными или буроватыми крыльями, темным хвостом и черными пятнами на голове. Распространены в тропических и субтропических зонах восточного полушария. В мире 38 видов, из которых в Туркменистане – 1 вид.

268. Sargyldak – Oriolus oriolus – Обыкновенная иволга

Meýdan alamatlary: horazyň arkasy we garyn tarapy sary. Ganatlary gara, ýelekleri insiz agymtyl gaýmaly. Gara guýrugynyň ujy sary gyraly. Çünkünden gözüne tarap gara zolak geçýär. **Mäkiýan guşuň arka tarapy ýaşylymtyl-çalymtyl**, ganatlary we guýrugy goňurak, döşi çal öwüşginli we dik menekli, garyn tarapy agymtyl, seýrek sarymtyl. Ýaş guşlar mäkiýanlaryna meňzeş. Sesi boýunça aňsat tanasa bolýar-pert “wžyáaa” we owadan tüýdik sykylygy – “fuyú-tiu-liu”. Uzynlygy – 240 golaý, ganaty – 139-149, ganatlarynyň gerimi – 440, söbügi – 24-26 mm, agramy – 70-83 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: bizde meňzeş görnüşleri ýok.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän ýerleri Orta we Günorta Ýewropa, Demirgazyk-Günbatar Afrika, Kiçi, Alynky, Orta Aziýa we Merkezi Aziýanyň gunbatory, Hindistan ý/a. Orta Aziýada, esasan, derýalaryň jülgelerinde we oazislerde. Türkmenistanda Amyderýa, Garagum, Murgar, Tejen, Etrek derýalarynyň jülgeleri, Hazarýakasynyň käbir ýerleri, Uly Balkan, Köpetdag we onuň etekleri, Bathyz, Köýtendag. Hindistanda we Günorta Afrikada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtegeleýän guş, ýazyna aprel-maýda, güýzde awgustda uçup geçýär. Beýik sütünlü agaçlyklarda toraňnylyklarda, miweli we saýaly baglarda, seýilgählerde, jeňňelli dag jülgelerinde duşýar. Agaç çybyklarynyň arasynda asylyp duran kiçiräk okara şekilli höwürte gurýar. 3-4 sany gara menekli ak ýumurtgalary goýýar, ölçeg-

Полевые признаки: у самца спина и брюшная сторона желтые. Крылья черные с узкими светлыми каемками перьев. Хвост черный с желтым краем на конце. Полоска от клюва к глазу – черная. У самки спинная сторона серо-зеленоватая, буроватая на крыльях и хвосте, грудь с серым оттенком и продольными пестринами, а брюшная сторона – беловатая, реже желтоватая. Молодые сходны с самкой. Легко обнаруживается по голосу – резкое «вжя-яаа» и красивый флейтовый свист «фиу-тиу-лиу». Длина – около 240, крыло – 139-149, размах крыльев – 440, цевка – 24-26 мм, вес 70-83 г.

Сходства – отличия: у нас сходных видов нет.

Распространение: область гнездования – Средняя и Южная Европа, Северо-Западная Африка, Малая, Передняя, Средняя и запад Центральной Азии, Индостан. В Средней Азии, в основном, по долинам рек и оазисам. В Туркменистане – долины Амударьи, Каракумдарьи, Мургаба, Теджена, Этрека, местами в Прикаспии, Больших Балханах, Копетдаге и их предгорьях, Бадхызе, Койтендаге. Зимует в Индостане и в Южной Африке.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица, весенний пролет – в апреле-мае, осенний – в августе. Населяет участки с высокоствольной древесной растительностью – тугаи, сады, парки, заросшие горные ущелья. Гнездо устраивает на деревьях в виде небольшой чаши, свисающей между ветвями.

leri - 20 x 30 mm. Iýunyň ortasynda jüýjeleýär we iýulda jüýjeleri uçurym bolýar. Esasan, dürli mör-möjekler we olaryň içinlalary bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde seýrek, bölekleyin ýaýran.

Sarlar – *Sturnidae* – Скворцовые

Aglaba açyk meýdan giňişliklerinde ýaşayn guşlar maşgalasy. Dykyz beden gurluşly, jokjoky möçberli guşlar. Çünki göni, uzyn, inçelen uýy çowly gutarýar. Çünküniň uçjagazy aşaklygyna sähelçe egmek. Ganatlary orta uzynlykda, ýiti uçly. Ýygnalan ganatlary guýrugynyň ujuna ýetmeýär. Aýaklary berdaşly, orta uzynlykda. Dyrnaklary gaňyrçagrak, sarlaryň köplenç ýeriň üstünde gezýändigine seretmezden, uçlary ýiti. Guýrukly dürlü görnüşde we uzynlykda. Ýelek örtügi gür, bedenine dykyz ýapylýar. Kellesinde käte hüpügi bolýar. Reňki, aglaba, gara, gyzlymytyl, gök we ýaşyl boýag garyndyly, güýçli metal öwüşginli. Görnüşleriň köpüsi üçin reňki jyns tapawudyny görkezýär. Ýaş guşlar metal öwüşginsiz, çal ýa-da goňur, köp bölegi menekli. Ýygy-ýygydan sürä toplanýarlar. Ganatlaryny ýaý-many aralaşdyryp, göni we çalt uçýarlar. Agaçlaryň köweklerinde, hinlerde, gaýalarynyň jaýryklarynda we gum gaýalaryň köwülen ýerlerinde höwürtegeýärler. Dünýäde 100-den gowrak görnüş, olardan 4-si Türkmenistanda.

В кладке 3-4 белых с черными крапинками яйца, размеры – 20 x 30 мм. Птенцы – в середине июня, а слетки в июле. Питаются, главным образом, различными насекомыми и их гусеницами.

Статус: обычная, местами редкая птица, с неравномерным распространением.

Семейство птиц обитающих, преимущественно, в открытых ландшафтах. Телосложение плотное. Размером с дрозда. Клюв прямой и довольно длинный, относительно тонкий, в конце заостренный. Кончик клюва слабо загибается вниз. Крылья умеренной длины, острые. Концы сложенных крыльев не достигают конца хвоста. Ноги сильные, умеренной длины. Когти крючковатые, но не притупленные, несмотря на то, что скворцы, в основном, ходят по земле. Хвост различной формы и длины. Оперение густое, плотно прилегающее к телу. На голове иногда бывает хохол. Окраска часто черная с сильным металлическим пурпуровым, синим и зеленым отливом. Для многих видов характерны половые различия в окраске. Молодые лишены металлического блеска, серые или бурые, по большей части с пестринками. Часто собираются в стаи. Полет прямой, быстрый, в чередовании с планированием. Гнездится в дуплах деревьев, норах, расщелинах скал и углублениях обрывов. В мире более 100 видов, из которых 4 в Туркменистане.

269. Dag meýnesi, ýa-da Bramin sary – *Sturnus pagodarum* – Горная майна

Meýdan alamatlary: **kellesi uzyn hüpüki.** Çünki gysga we güberçek. Guýrugy sähelçe basgançaklanan. Depesi, hüpügi we ganatlarynyň uçlary gara. **Arkasy, guýrugynyň we ganatlarynyň üsti goňurak-çal. Ganatlarynyň aşaky tarapy ak. Duluklary, boýny, döşi we garyn tarapy çuparrak. Guýrugynyň aşagy çuparrak-agymtyl.** Çünki sary ýaşlymytyl-mawy, gözleriniň göreji ak. Aýaklary sary. Ýaş guşlar açygoňurak, garamtyl telpejikli, ganatlary we guýrugy goýu-goňur reňkli. Ganaty – 102-109, guýrugy – 70 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: umumy reňki goňurak-çal, gara hüpügi we ýelek örtüginde gyzgylt reňkiň yoklugy bilen beýleki sarlardan tapawutlanýar.

Ýaýran yerleri: Günorta Aziýa, Seylon we Hindistandan demirgazyga Günorta Gimalay daglaryna çenli we Gündogar Owganistan. Orta Aziýada we Türkmenistanda Köýtendag we onuň etekleri.

Ýaşayşy: tötänden uçup gelyän guş (Köýtendag, 1963 ý). Dagda 1200-1500 m beýiklige çeni ýaşayar, ýöne ol dag eteklerinde has adaty, onuň ekerançylyk ýerlerde duşmagy hem mümkin.

Statusy: örän seýrek, az öwrenilen görmüş.

270. Garasar – *Sturnus vulgaris* – Обыкновенный скворец

Meýdan alamatlary: kellesi hüpüksiz, orta ululykdaky sar. Guýrugynyň uýy göni. **Ýelek örtügi ýazyna gara ýiti metal öwüşginli, garyn aşagy çala saýgardýan**

Полевые признаки: **на голове черный хохол.** Клюв короткий и выпуклый. Хвост слегка ступенчатый. Темя, хохол и концы крыльев черные. **Спина, надхвостье и крылья сверху буровато-серые. Нижняя сторона крыла белая. Щеки, шея, грудь и брюшная сторона – рыжеватые. Подхвостье – рыжегато-белое.** Клюв желтый с зеленовато-голубым основанием, радужка глаз белая. Ноги желтые. Молодые светло-бурые, с темной шапочкой, темно-бурыми крыльями и хвостом. Крыло – 102-109, хвост – 70 мм.

Сходства – отличия: от других скворцов отличается черным хохлом при общей буровато-серой окраске и отсутствием розового цвета в оперении.

Распространение: Южная Азия, Цейлон и Индостан к северу до Южных Гималаев и Восточного Афганистана. В Средней Азии и Туркменистане – Койтендаг и его предгорья.

Образ жизни: залетная птица (Койтендагда, 1963 г.). Обитает в горах до высот 1200-1500 м, но более обычен в предгорьях, можно встретить и в сельскохозяйственном ландшафте.

Статус: очень редкий, мало изученный вид.

agymtyl menekli, guýrugy ak tegmilsiz. Kellesi, boýny we bokurdagy ýaldyrawuk ýaşyl. Arkasy, bili, petekesindeki zolak ýaşylymtyl, garny ýaşylymtyl-gögümtil. **Gýş döwründe gara reňkiň deregine ak reňkli menekler peýda bolýar.** Çünki (jübütleşýän döwründe) sary reňkli. Aýaklary gyzylymtyl-goňur. Mäkiýan guşlar öçügsi reňkli. Ýaş guşlary agymtyl-goňur, bokurdagy we garnynyň ortasy agymtyl öwüşginli. Sesi pert, gyjyrdyly. Saýraýşy dürli, beýleki guşlaryň ses bogunlary we keseki sesleriň goşulmagy. Ýazyna jübüt, galan wagty, aýratyn-da, gyş aýlary süri bolup gezyýär. Ganaty – 120-135, guýrugy – 59-70, söbügi – 24.2-32.1, çünki – 22-28.7 mm, agramy – 70.8-94 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: metal öwüşginliliginiň ýitidigi we guýrugynyň gysgadygy bilen gara jokjokydan tapawutlanýar. Ýaş guşlaryň agymtyl-sary reňkiniň öçüksidigi we biliniň agymtyl ýokundysynyň aýdyň dældigi bilen ýaş alaslardan tapawutlanýar.

Yaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi giň. Ýewropa we Aziýadan gündogara Baýkal kölüne çenli. Türkmenistanda höwürtleýär Amyderýada, Garagum, Murgap, Guşgy, Tejen derýalarynda, Günbatar Uzboýda, Etrekde, Hazarýakasynda, Köpetdagda, Köýtendagda we olaryň eteklerinde. Günorta - Günbatar Ýewropadan we Ortaýer deňzinden Päkistana we Demirgazyk - Günbatar Hindistana çenli gyşlaýar

Yaşaýşy: uçup geçýän, höwürtleýän we gyşlaýan guş, bir bölegi oturymly. Ýazky migrasiýasy – marta, güýzkisi sentýabr noýabr aralykda. Derýalaryň jülgeleriniň kenary-

метными светлыми пестринами на брюшке, без белых пятен на хвосте. Голова, шея и горло с фиолетовым блеском. Спина, поясница, полоса на зобе зеленоватого отлива, брюшко фиолетово-синее. **В зимнее время вместо черного цвета появляются частые белые пестрины.** Клюв (в брачный период) желтого цвета. Ноги красно-бурые. Самка окрашена тусклее. Молодые светло-бурые, с беловатым оттенком горла и центральной части брюшка. Голос резкий, скрипящий. Пение разнообразное, с элементами песен других птиц и сторонних звуков. Держатся весной парами, в остальное время в стаях, особенно зимой. Крыло – 120-135, хвост – 59-70, цевка – 24.2-32.1, клюв – 22-28.7 мм, вес – 70.8-94 г.

Сходства – отличия: от черного дрозда отличается ярким металлическим блеском и укороченным хвостом. Молодые птицы отличаются от молодых розовых скворцов менее яркой светло-желтой окраской и плохо выраженным светлым оттенком поясницы.

Распространение: гнездовая часть ареала широкая – Европа и Азия на восток до Байкала. В Туркменистане гнездится по Амударье, Каракумдарье, Мургабу, Кушке, Теджену, Западному Узбою и Этреку; в Прикаспии, в Копетдаге, Койтендаге и их предгорьях. Зимовки от Юго-Западной Европы и Средиземноморья до Пакистана и Северо-Западной Индии.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся и зимующая птица, часть особей оседла. Весенняя миграция – в марте, осенняя – с сентября

ndaky uçutlarda, dag derýajyklarynyň gaýaly ýerlerinde, pisseliklerde (Bathyzda) we oazisleriň ilatly nokatlarynda, çölde seýrek höwürtleýär. Mart aýynda jübütleşýär we köweklerde ýa-da ýapyk, amatly bolan ýerlerde höwürtleýär. Ýylda iki gezek, adatça 5-6 sany meneksiz, mawumtyl-ýaşyl ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 20 x 31 mm. Aprel aýynda jüýjeleýär. Uly sürülere toplanyp, düzlük meýdan giňişliklerinde, oazislerde, ýollaryň ýakalarynda, ýaşalýan obalarda gyşlaýar. Mör-möjekler, olaryň liçinkalary we beýleki oňurgasyz haýwanlar, şeýle-de ösümlükler bilen iýmitlenýärler.

Statusy: adaty, güýz-gyş döwründe köpsanly, oňat tanalýan guş.

271. Ala sar – *Sturnus roseus* – Розовый скворец

Meýdan alamatlary: orta ölçeglerdäki sar. **Ýaşı ýeten guşlaryň kellesi uzyn hüpükli.** Boýny, petekesi, ganatlary, guýrugy gara, gögümtil metal öwüşginli. **Arkasy, eginleri, döşi, garny, böwürleri we çünki gyzgylt, kellesi we boýny goýy gyzyl örtükli, galan ýelek örtügi gara.** Mäkiýany tutuk reňkli, ýelekleriniň gyzgylt bölegi kirliräk ýokundyly, gara-goňurrak reňk bilen çalşyrylan, hüpügi has gysga. Ýaş guşlar goňurrak ýa-da çalymtyl-ýaşyl reňkde, kellesi goňurrak tegmilli. Çünki gyzgylt, aýaklary kirliräk-sary, gözleri goňur. Sesi pert, byzyrdyly gyjyrdy. Süri bolup gezyýär. Ganaty – 120-135, guýrugy – 62-73.5, söbügi – 30-34, çünki – 17.3-20.5 mm, agramy – 64.4-74 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: arkasynyň we garnynyň gyzgyltdygy bilen beýleki sarlardan tapawutlanýar. Kellesinde hüpügi anyk görünýär.

по ноябрь. Гнездится в береговых обрывах речных долин, по обрывистым участкам горных речек, в фисташниках (Бадхыз) и в оазисах, включая населенные пункты, очень редко в пустыне. Гнездование в марте. Гнезда строит в дуплах или других закрытых местах. Две кладки в году, обычно 5-6 яиц голубовато-зеленого цвета без пятен, размеры – 20 x 31 мм. Птенцы – в апреле. Зимуют в стаях, большей частью на равнинах, в оазисах, вдоль дорог, у поселков. Питаются насекомыми, их личинками, червями и другими беспозвоночными животными, а также растительным кормом.

Статус: обычная, в осенне-зимнее время многочисленная, хорошо узнаваемая птица.

Полевые признаки: средних размеров скворец. **У взрослых на голове длинный хохол.** Шея, зоб, крылья, хвост – черные, с синеватым металлическим отливом. **Спина, плечи, грудь, брюшко, бока и клюв – розовые, на голове и шее с пурпурным** отливом, а остальное оперение черное. Самка окрашена менее ярко, розовые части оперения более грязного тона, а черные заменены буроватыми, хохол значительно короче. Молодые окрашены в бурые или серо-зеленоватые тона, с буроватыми пятнышками на голове. Клюв розовый, ноги грязно-желтые, глаза коричневые. Голос – резкий, скрипучее верещание. Держатся в стаях. Крыло – 120-135, хвост – 62-73.5, цевка – 30-34, клюв – 17.3-20.5 мм, вес – 64.4-74 г.

Сходства – отличия: в отличие

Ýaýran ýerleri: Günorta-Gündogar Ýewropa, Kiçi we Orta Aziýa, Gazagystan. Türkmenistanda daglarda we dag eteklerinde, Uly we Kiçi Balkanda, Köpetdagda, Bathyzda, Garabilde, Köýtendagda, düzlüklerde, Amyderýanyň, Garagum, Murgap, Tejen, Sumbar, Etrek derýalarynyň jülgelelerinde, Günbatar Uzboýda. Alynky Aziýada we Hindistanda gyslaşar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, höwürtleýän we göçüp-gonýan guş. Ýazky migrasiýasy apreliň soňunda-maýyň başynda, güýzkisi awgustda. Dürli landşaftlarda ýaşayar. Maý aýynda topar bolup höwürtleýär. Gaýa-laryň ýarçyklarynda, gum gaýalardaky hilerde, agaçlaryň köweklerinde seýrek okaraşekilli höwürtleýär. Ýylda iki gezek köpelyär. 5-6 sany solgun-gögümtil reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 28.4 x 20.2 mm. Maý-ijynda jüýjeleýär. Mör-möjekler, esasan, çekirtgeler, garynjalar, jykjyklar, tomzaklar, eşekýassyklar bilen iýmitleýär. Göçüp-gonýan sürüleriň üzümçilik we miweli bagly ýerlerde toplanmagy mümkin.

Statusy: adaty, uçup geçýän wagty köpsanly, käbir ýerlerde örän köpsanly guş.

272. Meýne – *Acridotheres tristis* – Майна

Meýdan alamatlary: dykyz beden gurluşly **uly sar. Maňlaýynda ýelekleriniň sähelçe peşseren görnüşindäki hüpük.** Çünki gysga we berdaşly. Kellesi, boýny, guýrugy gara. Ganatlary, döşi we garny goňurrak-gyzgylt. Ganatlaryndaky we guýrugynyň uýyndaky zolaklar ak. **Gözüniň yzy tegmilli, çünki we**

от других скворцов спина и брюшко розовые. На голове хорошо заметный хохол.

Распространение: Юго-Восточная Европа, Малая и Средняя Азия и Казахстан. В Туркменистане – в горах и предгорьях – Больших и Малых Балханах, Копетдаге, Бадхызе, Карабиле, Койтендаге; на равнинах по долинам Амударьи, Каракумдарьи, Мургаба, Теджена, Сумбара, Этрека, Западного Узбоя. Зимует в Передней Азии и Индостане.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся и кочующая птица. Весенняя миграция – в конце апреля-начале мая, осенняя – в августе. Обитают в различных ландшафтах. Гнездится в расщелинах скал, в норах обрывов, реже в дуплах деревьев. Две кладки в году. В кладке 5-6 бледно-голубоватого цвета яиц, размеры – 28.4 x 20.2 мм. Птенцы – в мае-июне. Питаются насекомыми, в основном, саранчовыми, меньше муравьями, чернотелками, жуками, мокрицами. Кочующие стаи могут собираться на виноградниках и в садах.

Статус: обычная во время пролета птица.

Полевые признаки: крупный скворец плотного телосложения. На лбу хохолок в виде слегка приподнятых перьев. Клюв короткий и сильный. Голова, шея, хвост – черные. Крылья, грудь и брюшко – буровато-розовые. **Полосы на крыльях и концах хвоста белые. Пятно за глазом, клюв и ноги**

аýaklary sary. Ýöreýşi guýruksyz maýda alahekegi ýatladýar, ýöne towusmaýar. Çalt, gysga we bir ugra uçýar. Hemmä äşgär, örän gykylykçy guş. Adatça, topar, aýratyn-da, gijelerine süri bolup toplanýar. Saýraýşy gyjyrdyly, inçe boguk sesli sykylyklar. Ganaty – 135-146, guýrugy – 76-92, söbügi – 40-43, çünki – 18-22 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: beýleki sarlardan ululrak, gözüne ýanaşyk sary reňkli näbelli boşluk bolýar. Ganatlaryndaky ak tegmiller uçan mahaly anyk görünýär.

Ýaýran ýerleri: Günorta-Gündogar, Günorta, Orta Aziýa we Günorta Gazagystan. Türkmenistanda Amyderýanyň, Garagum, Murgap, Guşgy, Tejen derýalarynyň jülgelelerinde, Köýtendagda, Köpetdagda we olaryň eteklerinde, Garabilde, Bathyzda. Hazar deňzine tarap öz arealyny giňeldýär.

Ýaşayşy: oturymly guş, hakyky sinantrop, antropogen landşaftlarda ýa-da olaryň täsiri bolan ýerlerde ýaşayar. Mart-aprelde höwürtleýär. Höwürtgеси köwekde, amatly bolan tekjelerde, jaýrylan diwarlarda, adamyň guran desgalarynda ýerleşýär. Ýylda iki-üç gezek köpelyär. 4-6 sany agymtyl-mawy reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 29.6 x 21.2 mm. Maý aýynda jüýjeleýär. Mör-möjekler – göniganatlylar we tomzaklar, şeýle-de ösümlükler bilen iýmitleýär. Zyýankeş mör-möjekleri, aýratyn-da, çekirtgeleri gymakda peýda getirýär, ýöne, käte miweli baglara we üzümçilige zyýan ýetirmekleri mümkin.

Statusy: adaty, jülgelelerde we oazislerde köpsanly, Amyderýanyň jülgesinde örän köpsanly görnüş.

желтые. По походке напоминает мелкую сороку без хвоста, но не прыгает. Полет быстрый, относительно короткий и прямолинейный. Очень заметная крикливая птица. Держится обычно группами и стаями, особенно на ночевках. Пение скрипучее, хриплое с низкими свистами. Крыло – 135-146, хвост – 76-92, цевка – 40-43, клюв – 18-22 мм.

Сходства – отличия: крупнее других скворцов, около глаза имеется неоперенный участок желтого цвета. На крыльях в полете хорошо видны белые пятна.

Распространение: Юго-Восточная, Южная, Средняя Азия и Южный Казахстан. В Туркменистане – долины Амударьи, Каракумдарьи, Мургаба, Кушки, Теджена, в предгорьях и горах Койтендага, Копетдага, в Карабиле и Бадхызе. Расширяет свой ареал в направлении Каспийского моря.

Образ жизни: оседлая птица, типичный синантроп, придерживается антропогенных ландшафтов или их элементов. Гнездится в марте-апреле. Гнездо в дуплах, всевозможных нишах, щелях, в постройках человека. Две-три кладки в году. В кладке 4-6 яиц ярко-голубого цвета, размеры – 29.6 x 21.2 мм. Птенцы – в мае. Держатся в стаях, особенно большие стаи образуют на ночлегах в садах или парках. Питаются насекомыми – прямокрыльями и жуками, а также растительным кормом. Истреблением вредных насекомых, особенно саранчовых, приносит пользу, но местами может наносить вред садам и виноградникам.

Oňat tanalýan, gykylykçy, adamlaryň golaýynda ýaşamaga uýgunlaşan guş.

Gargalar – Corvidae – Врановые

Konusşekilli gapdalyndan gysylan, uly çüňkli, daýaw we orta ölçeglerdäki guşlar maşgalasy. Beden gurluşy sagdyn, aýaklary güýçli, dynaklary egmek. Burun deşikleri gaty gyllar bilen ýapylan (ekinçi gargadan başgalary). Ýelek örtügi gaty, ýa-da ýumşak we gowşak, göwresini dykyz ýapýar, ýygy-ýygydan metal ýalpyldy berýär. Horazlarynyň we mäkiýanlarynyň arasynda ýelek örtügininiň reňkinde tapawudy ýok, ýöne horazlary mäkiýanlaryndan ulurak. Ganatlary tegelenen we ýiti uçly. Görnüşleriniň käbiri oturymly, köpüsi göçüp-gonýar we az sanlysy uçup geçýär. Gyslaýan ýeri, adaç, höwürtleýän meýdanlarynda ýerleşýär. Olaryň ýaşayan ýeri örän dürli: dagda, çöllükde, derýalaryň jülgerinde, oba hojalyk landşaftlarynda. Aýratyn jübüt we topar bolup, agaçlaryň üstünde, dag gaýalaryndaky jaýryklarda, agaçlaryň köweklerinde we adamlaryň guran desgalarynda höwürtleýär. Höwürtgeleri uly. Zyýankeş gemrijileri we mör-möjekleri gymakda oba hojalygyna peýda getirýärler, ýöne käte, käbir görnüşleri belli bir şertde ösümlükleriň dänelerini ýada guşlaryň ýumurtgalaryny iýip, zyýan ýetirmekli mümkin. Gargalar kontinentleriň hemmesinde, Antraktidadan, Täze Zelandiýadan we käbir

Статус: обычный, по долинам и в оазисах многочисленный, а в долине Амударьи очень многочисленный вид. Хорошо заметная, шумная, птица, хорошо приспособленная к жизни рядом с человеком.

Семейство птиц крупных и средних размеров, с большим, сжатым с боков, конической формы клювом. Телосложение крепкое, ноги сильные, когти изогнутые. Ноздри прикрыты жесткими щетинками (кроме грача). Оперение или жесткое, плотно прилегающее к телу, или мягкое и рыхлое, часто с металлическим блеском. Различий в окраске оперения между самцами и самками нет, но самцы крупнее самок. Крылья округлые и острые. Некоторые виды оседлые, большинство кочующие, и немногие – перелетные. Обычно места зимовок расположены в области их гнездовых территорий. Местообитания весьма разнообразны: горы, пустыни, долины рек, сельскохозяйственный ландшафт. Гнездятся отдельными парами и колониями на деревьях, скалах, в щелях, в дуплах деревьев и постройках человека. Гнезда массивные. Приносят пользу сельскому хозяйству, уничтожая вредных грызунов и насекомых, но местами при определенных условиях некоторые виды могут играть отрицательную роль поедая семена или яйца птиц. Врановые птицы широко распространены на всех континентах, за исключением Антарктики, Новой Зеландии и ряда океанских остро-

umman adalaryndan başgalarynda, giň ýaýrandyr. Jemi 104 görnüş, olaryň 10-sy Türkmenistanda.

вов. Всего 104 вида, из которых в Туркменистане – 10.

273. Çürçüri – Podoces panderi – Саксаульная сойка

Meýdan alamatlary: gargadan has kiçi, jokjoky ölçeginde. Özgele-re garanynda çüňki uzyn we uýy egmek häsiýetli, ganatlary gysga we tegelenip gutaryar, aýaklary güýçli söbügi uzyn we gysga barmaklary çägäniň üstünde hereket etmek üçin uýgunlaşandyr. **Arkasynyň we kellesiniň üsti aýak-çal reňkli,** ganatlary, guýrugy, çüňkinden gözüne tarap geçýän zolak we **petekesindäki tegmil gara.** Sesi jaňnyrdyly – “se-se-se ...”. Howada uçanyndan, aýaklary bilen ýerde ylgap gezenini halaýar. Ganatlarynyň gysga kakuwy ylganynda kömek edýar. Gyrađeň we gysga aralyga uçýar. Jübüt bolup gezýar. Ganyat – 11.2-12.3 sm, agramy 86-96 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: **bizdäki gargalaryň iň maýda wekili.** Uçan mahaly ganatlaryndaky häsiýetli gara we ak reňkleriň mese-mälim görünýändigini bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Orta Aziýa we Gazagystanyň günorta-gündogary. Türkmenistanda Garagum, Çilmämetgum, Üçtagangum çöllerinde.

Ýaşayşy: oturymly, çöl guşy. Ýarymberkän, şeýle-de berkän çägeliklerde, seýrek çägeliktakylyk meýdanlarda ýaşayar. Olar höwürtleýän ýerlerinden uzaga gitmän gezýar. Aprelde höwürtleýär. Gyrymsy agaçlaryň şahalarynyň arasynda höwürtge gurýar we guran höwürtgeleriniň üstüni basyýar (alahekegiň höwürtgese-

Полевые признаки: намного мельче вороны, размером с дрозда. Характерны относительно длинный и изогнутый к концу клюв, короткие и округленно заканчивающиеся крылья и сильные ноги с длинной цевкой и короткими пальцами, приспособленными для передвижения по песку. **Спина и голова сверху светло-серого цвета,** а крылья, хвост, полоса от клюва к глазу и **пятно на зобе – черного.** Голос – звенящее «це-це-це...». Предпочитает больше передвигаться на ногах по земле, чем летать. При беге помогает короткими взмахами крыльев. Полет ровный и на короткие расстояния. Держатся парами. Крыло – 11.2-12.3 см, вес 86-96 г.

Сходства – отличия: **самый мелкий представитель из наших врановых. Отличается характерной окраской,** на крыльях в полете бросаются в глаза черный и белый цвета.

Распространение: только в Средней Азии и на юго-востоке Казахстана. В Туркменистане – пустыни Каракумы, Чильмаммедкумы, Учтаганкумы.

Образ жизни: оседлая. Пустынная птица, обитает в полузаросших, а так же в заросших песках, редко на песчано-глинистых участках. Строго придерживается гнездовых участков. Гнездятся в апреле. Строят гнезда на кустарниках среди

ne çalymdaş). 3-5 sany iri ýaşylymtyl-goňur tegmilli ak ýumurtgalary goýýar. Maý aýynda jüýjeleýär. Ilkinji goýan ýumurtgalary şowsuzlyga uç-rasa, goşmaça ýumurtga goýmaklary mümkin. Dürli mör-möjekler, maýda suwulganlar we çöl ösülikleriniň tohumlary bilen iýmitlenýär.

Statusy: Orta Aziýanyň çöllerinde ýaşaýar (endemik), "Garagumuň ornitologik nyşany" diýip atlandyrmaga mynasyp, az sanly, käbir ýerlerde adaty guş.

274. Alahekek – *Pica pica* – Сорока

Meýdan alamatlary: gargadan biraz maýda. **Oňat tanalýan, uzyn guýrukly gara-ak reňkli guş. Kellesi, boýny we arkasy gara, garny, guýrugynyň üsti, eginlerindäki we ganatlaryndaky inli zolaklar ak.** Ganatlary metal ýalpyldyly, ýaşylymtyl-gөгүmtil ýa-da ýaşylymtyl - gök. Guýrugynyň aşagy gara, üsti – ýaşylymtyl, göгүmtil we gyzlymtyl-metalsypat öwüşginli. Ýaş guşlaryň ýelek örtügi has ýumşak, goňurrak ýokundyly we metal ýalpyldysyz. Sesi pert jakyrdama. Gysga ganatlaryny ýygy-ýygydan kakyp, tolkunsypatda, agyrylyk bilen uçýar. Ganaty – 17.5-23.0, guýrugy – 22.9-26.6 sm, agramy – 165-261 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: basgançakly uzyn guýrugy we gara-ak reňki bilen beýleki gargalardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropanyň hemme ýeri, Günorta-Günbatar, Günorta-Gündogar, Merkezi we Orta Aziýa, Demirgazyk Amerikanyň günbatary. Türkmenistanda Köýtendag, Baþhyz,

ветвей, при постройке делают над гнездом легкую крышу (похоже на гнездо сороки). В кладке 3-5 яиц. Окраска беловатая с крупными зеленовато-бурыми пятнами. Птенцы – в мае. В случае гибели кладки бывает дополнительная. Питаются различными насекомыми, мелкими ящерицами и семенами пустынных растений.

Статус: эндемик пустынь Средней Азии, можно назвать «орнитологическим символом Каракумов», является немногочисленной, местами обычной птицей.

Полевые признаки: намного мельче вороны. **Хорошо заметная, черно-белая с длинным хвостом птица. Голова, шея и спина – черные, брюхо, надхвостье и широкие полосы на плечах и крыльях – белые.** Крылья с зеленовато-фиолетовым или зеленовато-синим металлическим блеском. Хвост снизу черный, сверху с зеленоватым, синеватым и пурпурно-металлическим отливом. У молодой птицы оперение более рыхлое с буроватым налетом и без металлического блеска. Голос – резкое стрекотание. Полет тяжелый, волнистый, с частыми взмахами коротких крыльев. Крыло – 17.5-23.0, хвост – 22.9-26.6 см, вес 165-261 г.

Сходства – отличия: от других врановых отличается длинным ступенчатым хвостом и характерной черно-белой окраской.

Распространение: вся Европа, Юго-Западная, Юго-Восточная, Центральная и Средняя Азия и запад Северной Америки. В Туркменистане – Койтендаг, Бадхыз, Сарыкамыш и

Sarygamyş, Köpetdag, derýalaryň jül-geleri, we Hazaryň kenarynda Günbatar Uzboý.

Ýaşaýşy: oturymly guş. Dürli landşaftlarda ýaşaýar, derýalaryň joşup giňän ýerlerinde, ekerançylyk, miweli we saýaly baglyk, bakjaçylyk meýdanlarda, ilatly nokatlarda ýaşamany halaýar. Aprelde höwürtgeler. Höwürtgeleri özbo-luşly. Ýokarysy ýapyk, gapakly, beýik agaçlarda, seýrek gyrymsylarda seýrek gurýar. 4-6 sany goňur m-nekli mawumtyl-ýaşyl ýumurtgalary goýýar. Aprel-maýda jüýjeleýär. Dürli mör-möjekler ädiktikerler, wyžžyldawuklar, jykyklar, çarlaklar, çekirtgeler, şeýle-de gurçuklar, maýda oňurgaly haýwanlar we ösümlikleriň miweleri, tohumlary bilen iýmitlenýär. Tebigatda 20, emeli şertlerde 15 ýyla çenli ýaşaýar.

Statusy: oňat tanalýan, adaty, bölekleyin ýaýran guş.

275. Gara zag – *Pyrrohorax pyrrhorax* – Клушица

Meýdan alamatlary: gargadan kiçi. **Çünki uzalan, gyzlymtyl-gülgüne-gyzyl, uju egmek.** Ýelek örtügi gara, ganatlary we guýrugy ýaşylymtyl öwüşginli. Ýaşlarynyň umumy reňk öwüşginli ýalpyldysyz goňurrak-gara, çünki we aýaklary goňurrak-mämişi. Ýeňil we çalt uçýar. Sesi gaty we labyzly. Ýerde ädimläp we towsup hereket edýär. Ganaty – 300-330, çünki 37-48 mm, agramy – 277-375 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: gyzylymtyl - gülgüne - gyzyl, uzalan egmek çünki bilen beýleki gargalardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewraziýanyň daglyk ýerleri. Türkmenistanda

побережье Каспия, Копетдаг, долины всех рек, Западный Узбой, места прикаспий.

Образ жизни: оседлая птица. Обитает в различных ландшафтах, тяготеет к речным поймам, полям, садам и огородам, в населенных пунктах. Гнездится в апреле. Гнезда своеобразные – с крышей, чаще на деревьях, чем на кустарниках. В кладке 4-6 яиц. Окраска их голубовато-зеленая с бурыми крапинами. Птенцы – в апреле-мае. Питаются различными насекомыми – долгоносики, жужулицы, чернотелки, сверчки, саранчовые, а также червями, мелкими позвоночными животными и растительным кормом – плодами, ягодами, семенами. На воле живет до 20, в неволе – до 15 лет.

Статус: хорошо узнаваемая, обычная птица с неравномерным распространением.

Полевые признаки: меньше вороны. **Клюв кораллово-красный, изогнутый, удлиненный.** Оперение черное с зеленоватым отливом на крыльях и хвосте. У молодых птиц общий тон окраски буровато-черный, без блеска, а клюв и ноги буровато-оранжевые. Полет легкий и быстрый. Голос – звонкий и мелодичный. Двигается по земле шагами и прыжками. Крыло – 300-330, клюв 37-48 мм, вес – 277-375 г.

Сходства – отличия: от других врановых отличается кораллово-красным изогнутым длинным клювом.

Распространение: горные области Евразии. В Туркменистане – в

daglyk we dageteklerinde, Bathyzyň we Garabiliň käbir ýerlerinde.

Ýaşaýşy: oturymly guş. Daglaryň gaýaly we uçut eňňitli ýerlerinde ýaşaýar, ýanaşyk düzlüklere aralaşmagy mümkin. Adatça, süri bolup gezýär, yöne ýekelikde we jübüt bolup hem gabat gelyär. Höwürtegeleýän ýeri durnukly. Gaýalaryň ýarçyklarynda we köweklerinde toplum ýa-da aýratyn jübüt bolup höwürtegeleýär. 3-6 sany goňur we ýaşylymtyl-çal menekli, agymtyl-ýaşyl ýumurtgaly goýýar. Mör - möjekler, gurçuklar we ösümlikleriň tohumlary bilen iýmitlenýär.

Statusy: umuman az sanly, daglaryň käbir ýerlerinde adaty guş.

276. Bellik. Merkezi Köpetdagda dürli döwürlerde tötänden uçup gelyän **alp zakyja gargasy - Pyrrhonorax graculus** (1884, 1892, 1986 ýý.) hasaba alyndy. Bu guş gara zaga meňzeş bolup, yöne ondan guýrugynyň uzynlygy we çüňküniň sarylygy bilen tapawutlanýar.

277. Zakyja garga – *Corvus monedula* – Галка

Meýdan alamatlary: gargadan kiçi. Maňlaý bölegi, çüňküniň düýbi, bokurdagy, ganatlary we guýrugy gögümtil-gyzgylt öwüşginli gara reňkli. Kellesiniň üsti we boýnunyň gapdallary çal. **Boýnunyň gapdallaryndaky agymtyl tegmiller goşuluşyp, “ýarymboýnbağ” emele getirýär. Döşi we garyn tarapy goňur öwüşginli çal.** Çüňki we aýaklary gara, gözi **mawumtyl-ak.** Ýaş guşlar edil ýaşu ýeten guşlar ýaly reňkde, yöne goňurrak öwüşginli. Sesi

горных и предгорных районах, местами в Бадхызе и Карабиле.

Образ жизни: оседлая птица. Придерживается скалистых участков гор и обрывов, может вылетать и на прилежащие равнины. Обычно собираются в стаи, но встречаются одиночные птицы и пары. Места гнездования постоянны. Гнездятся колониями или отдельными парами в расщелинах и выбоинах скал. В кладке 3-6 яиц. Окраска яиц беловато-зеленая с многочисленными пятнами бурого и фиолетово-серого цвета. Питаются насекомыми, червями и семенами.

Статус: в целом немногочисленная, местами в горах обычная птица.

276. Примечание: В Центральном Копетдаге может спорадически встречаться **альпийская галка - Pyrrhonorax graculus** залеты которой отмечались в 1884 г., 1892 г. и 1986 г. Похожа на клушицу, но отличается более длинным хвостом и желтым клювом.

Полевые признаки: мельче вороны. Лобная часть, основание клюва, горло, крылья и хвост черные с синевато-пурпурным отливом. Верх головы и бока шеи серые. **На боках шеи беловатые пятна почти слиты и образуют «полуошейник».** Грудь и брюшная сторона серая с буроватым оттенком. Клюв и ноги черные, **глаза – голубовато-белые.** Молодые птицы окрашены как взрослые, но

– “ke-ke-ke” ýa-da “kýak-kýak”. Ganaty – 210-250 mm, agramy - 200-225 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçeğleriniň maýdadagy we gözleriniň agymtyldygy bilen tapawutlanýar. Boýnunyň gapdallary we ýeňsesi çal.

Ýayraýn ýerleri: Ýewraziýanyň, demirgazyk we günorta çetki welaýatlaryndan başgalarynda. Türkmenistanyň hemme ýerinde, yöne daglyklara ýakyn çekilýär. Uly we Kiçi Balkan, Köpetdag, Bathyz, Garabil, Köýtendag, şeýle-de Amyderýanyň, Murgap, Guşgy, Tejen, Sumbar, Çendir, Etrek derýalarynyň jülgelerinde, Günbatar Uzboýda duşýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän, höwürtegeleýän guş, bir bölegi oturymly ýaşaýar. Daglaryň uçutly we gum gaýaly ýerlerinde, derýalaryň jülgelerinde we oazislerde ýaşaýar. Ekinçi we gara gargalar bilen bilelikde guşyna göçüp-gonma hereketlerine gatnaşmaklary mümkin. Aprelde höwürtegeleýär. Köp ýaşan agaçlaryň köweklerinde, gum gaýaly kenarlarda, dag derelerinde topar bolup höwürtegeleýär. 5-6 sany ýaşylymtyl-goňur mawumtyl-çal nokatlanan we menekli ýaşylymtyl-gök ýumurtgaly goýýar. Aprelde jüýjeleýär. Mör-möjekler – garynjalar, aýryhatjalar, ädiktikerler, çekirtgeler, jyzlanlar bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde adaty, bölekleyin ýaýran guş.

278. Ekinçi garga – *Corvus frugilegus* – Грач

Meýdan alamatlary: garga ölçeğde, bedeni gelşikli. **Çüňki süýnmek, gönolip inçelen çowly uçly. Tege-lenen guýrukly.** Ýelek örtügi dykuz, ganatlary we guýrugy ýaşylymtylrak,

с буроватым налетом. Голос – «кэ-кэ-кэ» или «кьяк-кьяк». Крыло – 210-250 мм, вес – 200-225 г.

Сходства – отличия: отличается мелкими размерами и светлыми глазами. Бока и задняя сторона шеи серые.

Распространение: вся Евразия, кроме крайних областей севера и юга. В Туркменистане повсеместно, но тяготеет к горным районам – Большим и Малым Балханам, Копетдагу, Бадхызу, Карабилу, Койтандагу, а также встречается по долинам Амударьи, Мургаба, Кушки, Теджена, Сумбара, Чендыра, Этрека, на Западном Узбое.

Образ жизни: гнездящаяся птица, часть особей оседла. Обитает на скалистых и лессовых обрывах в горах, речных долинах и оазисах. Зимой могут предпринимать кочевки вместе с грачами и воронами. Гнездятся в апреле. Гнездование колониями в дуплах старых деревьев, в береговых обрывах, по горным ущельям. Кладка 5-6 яиц, зеленовато-голубого цвета с зеленовато-бурными и лилово-серыми точками и пятнами. Птенцы – в апреле. Питаются насекомыми – муравьями, ухвертками, долгоносиками, саранчовыми, цикадами.

Статус: немногочисленная, местами обычная, неравномерно распространенная птица.

bedeniniň galan bölegi gögümtil, metal ýalpyldyly gara. **Ýaşy ýeten guşlaryň çüňküniň düýbi, kellesiniň öňki bölegi we alkymasty ýalaňaç.** Çüňki we aýaklary gara. Ýaş guşlaryň metal öwüşgini öçügsi, ýelekleri ýumşak we kellesi tutuşlygyna ýelek örtükli. Sesi boguk – “kraa”. Ganaty – 287-350 mm, agramy – 313-490 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: beden gurluşynyň has gelişlikdigi bilen beýleki gargalardan tapawutlanýar. Çüňküniň töwereginiň derisi ýaşy ýeten guşlarda ýalaňaç, kirliräk-ak reňkli.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi giň we tutuş Ýewropanyň, günorta - günbatar we demirgazyk çäklerinden başga ýerlerini, Aziýanyň, günorta we demirgazyk - gündogar böleginden galanlaryny öz içine alýar. Türkmenistanda oazisleriň hemme ýerlerinde we derýalaryň jülgelerinde, Köpetdagyň eteklerinde, uçup geçýän döwründe çölde hem gabat gelýär. Günbatar we Günorta Ýewropada, Kiçi, Alynky, Orta we Günorta - Gündogar Aziýada guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän, guşlaýan, Amyderýanyň aşaky akymynda oturymly ýaşayan guş. Ýazky migrasiýasy – martda, güýzkisi – oktýabrda. Türkmenistanyň hemme ýerlerinde guşlaýar we üstünden uçup geçýär, ýöne yurduň diňe demirgazyk-gündogarynda höwürtleýär. Süri bolup gezýär. Aprelde baglarda we tokaý-gorag zolaklarynda topar bolup höwürtleýär. 5-6 sany goňur menekli, ýaşylymtly-mawy reňkli ýumurtgalary goýýar. Maýda

чеким блеском, зеленоватое на крыльях и хвосте, фиолетовое на остальных частях тела. **У взрослых птиц основание клюва, передняя часть головы и подбородок голые.** Клюв и ноги черные. У молодых птиц оперение рыхлое, металлический отлив слабее и вся голова оперена. Голос – хрипкое «краа». Крыло – 287-350 мм, вес – 313-490 г.

Сходства – отличия: от других врановых отличается более стройным телосложением. У взрослых птиц вокруг клюва голая кожа грязно-белого цвета.

Распространение: гнездовая часть ареала широка и охватывает Европу, кроме юго-запада и севера, и Азию, кроме южных и северо-восточных ее частей. В Туркменистане – всюду в оазисах и по долинам рек, в предгорьях Копетдага, на пролете попадает и в пустыне. Зимовки в Западной и Южной Европе, Малой, Передней, Средней и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: пролетная, зимующая, в низовьях Амударьи оседлая птица. Весенняя миграция – в марте, осенняя – в октябре. Пролетает и зимует по всему Туркменистану, но гнездится только на северо-востоке страны. Стайная птица. Гнездится в апреле, колониями, в садах и полезащитных полосах. В кладке 5-6 яиц зеленовато-голубого цвета с бурыми крапинами. Птенцы – в мае. На пролетах и зимовках могут собираться в многотысячные стаи, обычно на полях и в окрестностях населенных пунктов, в том числе на местах ночевки в

jüýjeleýär. Uçup geçende we guşlandamüňläp sürä toplanmagy mümkin, adaçça, ekerançylykda we obalaryň töwereginde, şeýle-de seýilgählerde gijesine ýatmaga toplanýarlar. Mörmöjekler (çekirtge, ädiktikenler, maý tomzagy, tomzak, buzaw), syçanşekilli gemrijiler we beýleki maýda oňurgalyar, şeýle-de ýabany ösümlikleriň we oba-hojalyk däneli ekileriň ýere gaçan tohumlary bilen iýmitlenýär.

Statusy: güýz-guş döwründe köpsanly, käbir ýerlerde örän köpsanly, höwürtleýän (Amyderýanyň aşaky akymy) adaty guş.

279. Gara garga – *Corvus corone* – Чёрная ворона

Meýdan alamatlary: ala garga ölçeginde. **Ýelek örtügi tutuşlygyna gara, kellesi, boýny, arkasy, böwürleri, ganatlary we guýrugy gowşak gögümtil - ýaşyl - gök öwüşginli.** Çüňki we aýaklary gara. Ýaş guşlar ýalpyldysyz, tutuk-gara reňkli. Sesi basygrak – “karr-karr”. Ganaty – 310-375, çüňki – 37-45 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: Kellesi we boýny ýaşy ýeten guşlaryň ýaşylymtly öwüşginli. Ölçeginiň maýdadagy we çüňküniň inçedigi bilen çöl, aýratyn-da, uly gara gargadan tapawutlanýar. Uzak aralykdan ýaş ekinçi gargadan tapawutlandyrmak kyn.

Ýaýran ýerleri: arealy bölekleýin Günbatar, Günorta-Günbatar Ýewropa we Aziýa, Aral deňzinden gündogara Kamçatka çenli. Türkmenistanda uly derýalaryň jülgelerinde we Köýtendagda.

Ýaşayşy: oturymly we göçüp-go-

парках и скверах. Питаются насекомыми (саранчовыми, долгоносиками, хрущами, жуками, медведками), мышевидными грызунами и другими мелкими позвоночными, а также семенами диких растений и опавшими зернами сельскохозяйственных культур.

Статус: в осенне-зимний период многочисленная, местами очень многочисленная птица, на гнездовье (в низовьях Амударьи) обычная.

Полевые признаки: размером с серую ворону. **Все оперение черное со слабым сине-фиолетовым отливом на голове, шее, спине, боках, крыльях и хвосте.** Клюв и ноги черные. Молодые птицы матово-черного оттенка, без блеска. Голос – хрипкое «кarr-кarr». Крыло – 310-375, клюв – 37-45 мм.

Сходства – отличия: у взрослых птиц голова и шея с фиолетовым отливом. От молодого грача на расстоянии почти неотличима. От пустынного и, тем более, европейского ворона отличается мелким размером и менее массивным клювом.

Распространение: ареал разорван – в Западной, Юго-Западной Европе и в Азии – от Аральского моря на восток до Камчатки. В Туркменистане – по долинам крупных рек и в Койтентаге.

Образ жизни: оседлая и ко-

nup gezyän guş. Jeñňelliklerde we oba hojalyk landşaftlarynda ýaşaýar. Ýekelikde, jübüt we süri bolup gezyär. Aprelde höwürtegeleýär. Agaçlaryň, seýrek jeñňel gyrymsylarynyň, gyrymsy agaçlaryň üstünde höwürtege gurýar. 5-e çenly goňur menejiklije, mawymtyl-ýaşyl reňkli ýumurtgalary goýýar. Maý aýynda – jüýjeleýär. Dürli mör-möjekler, maýda gemrijiler we ösümlikleriň tohumlary bilen iýmitlenýär.

Statusy: bizde az sanly, çäkli ýaýran, guş.

280. Ala garga – *Corvus cornix* – Серая ворона

Meýdan alamatlary: ekinçi gargadan ulurak, uly gara gargadan kiçi. **Kellesi, bokurdagy, petekesiniň ýokarky bölegi, ganatlary we guýrugy gara, ýelek örtüginini galany külreňk-çal.** Ganatlary we guýrugy yaşyl öwüşginli. Çünki we aýaklary gara. Ýaş guşlaryň reňki ýalpyldysyz, tutuk-gara. Sesi basyk – “karr-karr”. Ganaty – 292-340, çünki – 31-37 mm, agramy – 460-580 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: arkasynyň, döşüniň we garnynyň çaldygy bilen gara gargadan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: tutuş Ýewropanyň, günorta - günbatar böleginden başgalarynda we Aziýanyň, günorta we günorta - gündogar böleginden başgalarynda. Türkmenistanyň hemme ýerinde, ýöne dagöňüne we derýalaryň jülgelerine ýakyn çekilýär.

Ýaşaýyşy: bizde uçup geçýän-guşlaýan, az-owlak oturymly ýaşaýan guş. Ýazky migrasiýasy – marta, güýzkisi – oktýabrda. Dagda, oturymly ýaşaýan ýerinde, dag eteklerinde we derýalaryň jülgelerinde höwürtegeleýär. Şäher we

чующая птица. Обитает в тугаях и сельскохозяйственном ландшафте. Держится в одиночку, парами и стаями. Гнездится в апреле. Гнезда на деревьях, реже в тугайных зарослях и кустарниках. В кладке до 5 яиц, голубовато-зеленого цвета с бурыми пятнышками. Птенцы – в мае. Питаются различными насекомыми, мелкими грызунами и семенами.

Статус: у нас немногочисленная птица с ограниченным распространением.

Полевые признаки: чуть крупнее грача, но мельче ворона. **Голова, горло, верхняя часть зоба, крылья и хвост – черные, остальное оперение пепельно-серое.** Крылья и хвост с фиолетовым отливом. Клюв и ноги черные. У молодых птиц окраска матово-черная, без блеска. Голос – всем знаком – хриплое «карр-карр». Крыло – 292-340, клюв – 31-37 мм, вес – 460-580 г.

Сходства – отличия: в отличие от черной вороны спина, грудь и брюхо серые.

Распространение: вся Европа, кроме юго-западных частей, и вся Азия, кроме южных и юго-восточных частей. В Туркменистане – повсеместно, но тяготеет к предгорьям и речным долинам.

Образ жизни: у нас пролетная, зимующая, частично оседлая птица. Весенняя миграция – в марте, осенняя – в октябре. Гнездится в горах, где оседла, и предгорьях, и речных долинах. Охотно селится в городах и других населенных пунктах. В гнездовой сезон держатся

beýleki ilatly ýerlerde mekan tutýar. Höwürtegeleýän döwründe jübüt, galan wagty süri bolup gezyär. Aprelde, beýik ösen agaçlaryň üstünde höwürtegeleýär. 5 sany goňur meneklije, mawymtyl-ýaşyl reňkli ýumurtgalary goýýar. Maý aýynda jüýjeleýär. Iýmite dannowsyz, ýöne haýwan iýmitini halaýar, dürli mör-möjekleri, yabany we öý guşlarynyň (kepderileriň) ýumurtgalaryny, jüýjelerini, maslyklary çokýar. Gumrylaryň we beýleki açyk höwürtegeleýän guşlaryň ýumurtgalaryny talamagy mümkin.

Statusy: höwürtegeleýän döwründe az sanly, dag eteklerinde käbir ýerlerinde, güýz-guş döwründe adaty guş, ýöne sany boýunça ekinçi gargagan has az. Tanalýan we adamyň töwereginde ýaşamaga oňat uýgunlaşan guş.

281. Çöl gargasy – *Corvus ruficollis* – Пустынный ворон

Meýdan alamatlary: uly garga çalymdaş, ýöne mese-mälim kiçi. Ganatlary uzyn we başgalara garanynda çowly uçly, ýelek örtügi gaty we dýkyz. Guýrugy pahnäşekilli. **Bedeni polat öwüşginli we melemtil-goňur, gara reňkli.** Çünki we aýaklary gara. Ýaş guşlaryň reňki goňurrak-gara. Sesi basyk – “kruk-kruk” we gagyldyly “karr”. Uçuşy gyrađeň we göni. Ganaty – 385-435, çünki – 39-46 mm, agramy – 440-600 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: **kellesiniň, boýununyň, petekesiniň we bedeniniň aşaky tarapynyň ýelek örtüginine melemtil-goňur öwüşginli gara reňk häsiýetli.** Pahnäşekilli guýrugy edil uly garganyňky ýaly, ýöne ondan ölçegleri maýda.

Ýaýran ýerleri: Palearktikanuň

парами, в остальное время стаями. Гнезда – в апреле, на высоких деревьях. В кладке обычно 5 яиц. Окраска голубовато-зеленая с бурыми пятнами. Птенцы – в мае. Всеядны, однако, предпочитают животную пищу – различных насекомых, яйца и птенцов диких и домашних птиц (голубей), реже падаль. Может разорять гнезда горлиц и других открыто гнездящихся птиц.

Статус: в гнездовое время немногочисленный, местами в предгорьях обычный вид; в осенне-зимнее время обычная птица, сильно уступающая по численности грачу. Заметная птица, хорошо приспособляется к жизни рядом с человеком.

Полевые признаки: похож на европейского ворона, но заметно мельче. Крылья длинные и относительно острые, оперение жесткое и плотное. **Хвост клиновидный. Окраска черная со стальным отливом и шоколадным оттенком.** Клюв и ноги черные. У молодых птиц окраска буровато-черная. Голос – глухое «крук-крук» и каркающее «каарр». Полет ровный и прямой. Крыло – 385-435, клюв – 39-46 мм, вес – 440-600 г.

Сходства – отличия: характерный шоколадно-коричневый оттенок черного оперения на голове, шее, зобе и нижней стороне тела. Хвост клиновидный как и у европейского ворона, но размеры мельче.

günbatar ýarymy we çöllük-sähra guşaklygynyň merkezi bölegi, Sahara we Arabystan, Gündogar Eýran, Owganystan. Türkmenistanda düzlüklerde, Hazaryakasynda, Garagumda, Sarygamyş çöketliginde, Bathyzda, Garabilde, Amyderýanyň we Garagum derýasynyň jülgeleriniň käbir ýerlerinde.

Ýaşayşy: oturymly guş. Selçeň gyrymysly, şeýle-de sazак tokaýly çöllüklerde ýaşaýar. Aprel-maýda höwürтgeleýär. Höwürтgesini gara sazagyň şahasynyň ýabalanan ýerinde ýa-da depesinde, uly gyrymyslarda, käte tok simleriň agaç sütünleriniň üstinde gurýar. 3-6 sany goňur meneklije, mawumtyl-ýaşyl reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 38.5-49.2 x 29-32 mm. Maý-iyunda jüýjeleýär. Tomazaklar, çekirtgeler, gemrijiler – sýçanlar, ýalmanlar, alakalar, seýrek hažžyklar we maslyk, şeýle-de ösümlük galyndylary bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, bölekleýin, ýöne giň ýaýran görnüş.

282. Uly garga – *Corvus corax* – Обыкновенный ворон

Meýdan alamatlary: gara gargadan has uly. **Uzyn ganatly we äpet çüňkli uly guş.** Bedeniniň üstki tarapy gögümtil, aşak tarapy ýaşylymtyl metal öwüşginli, **gara ýelek örtüкли.** **Boýnunyň ýeňsesi goňurrak.** Çüňki we aýaklary gara. Ýaş guşlar metal ýalpyldysyz, tutuk-gara reňkli. **Pahnaşekilli guýrugynyň uzyndygy** uçýan mahaly gowy görünýär. Sesi güýçli – “krukk-krukk” ýa-da basyk “kro-kro”. Ýerde egnine basyp çaykanyp ýöreýär, gyrađen, göni,

Распространение: западная половина и центральная часть пустынно-степного пояса Палеарктики, Сахара и Аравия, Восточный Иран, Афганистан. В Туркменистане – широко на равнинах – в Прикаспии, Каракумах, Сарыкамышской впадине, Бадхызе, Карабиле, местами по долинам Амударьи и Каракумдарьи.

Образ жизни: оседлая птица. Обитает в открытых участках пустынь с разреженной растительностью, а также в саксаульниках. Гнездится в апреле-мае. Гнездо на развилке или на вершине черного саксаула и крупных кустарников, иногда и на столбах. В кладке 3-6 яиц. Окраска голубовато-зеленого цвета с бурыми крапинами. Размеры яиц – 38.5-49.2 x 29-32 мм. Птенцы – в мае-июне. Питаются жуками, саранчой, грызунами – песчанками, тушканчиками, сусликами, режеещерицами и падалью, а также растительным кормом.

Статус: немногочисленный вид, распространен широко, но неравномерно.

Полевые признаки: значительно больше вороны. **Крупная птица с длинными крыльями и крупным клювом. Оперение черное с металлическим блеском** – фиолетовым на верхней стороне тела, зеленоватым на нижней стороне. **Задняя сторона шеи буроватая.** Клюв и ноги черные. Молодые матово-черные, без металлического блеска. В полете заметен **длинный клиновидный хвост.** Голос – громкое «крук-крук» или глухое «кро-

уғу-уғуыдан гауыр, tegelek aýlaw edip uçýar. Ganaty – 375-515 mm, agramy – 500-650 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň we uzyn ganatlarunyň uludygy, çüňküniň daýawdygy we mese-mälim **“sakgaly”** bilen tapawutlanýar. Guýrugy pahnashkilli.

Ýaýran ýerleri: giň. Tutuş Ýewraziýanyň, çöllük, günorta we günorta-gündogar çäklerinden başgalarynda, Demirgazyk Afrika we Demirgazyk Amerika. Türkmenistanda – hemme daglyk ýerlerde, şeýle-de Bathyzda, Garabilde.

Ýaşayşy: oturymly we göçüp-gonup ýaşaýan guş. Dag landşaftynyda we dag eteklerinde ýaşaýar. Ýekelikde, jübüt, seýrek uly bolmadyk topar bolup gezýär. Mart-aprelde höwürтgeleýär. Höwürтgesi dag we gum gaýalarynda, agaçlaryň üstünde. 4-6 sany goňur meneklenen, ýaşylymtyl-mawy reňkli ýumurtgalary goýýar. Maý aýynda jüýjeleýär. Iýmite parhsyz. Iýmitinde esasy orny gemrijiler – polýowkalar, meýdan sýçanlary, köralakalar, sýçanlar, kirpiler, şeýle-de maýda guşlary tutýar, maslyk, zir-zibiller, ösümlük bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, oňat tanalýan guş.

Sykylykçylar – *Bombycillidae* – Свиристелевые

Sar ölçegindäki, has dykyz beden gurluşly, kiçiräk guşlar. Ýelek örtügi güр, ýumşakdan ýupeksypat, kellesinde hüpügi bolýar. Kiçiräk, ýöne güýçli çüňkli we başgalara garanyňda, uly agyz kesimi inli, uju biraz egmek bolup, üstki çüňküniň uju kiçiräk dişlije. Ganatlary gysga, ýöne çowly uçly.

кро». Ходит переваливаясь, полет ровный, прямой, часто парит, описывая круги. Крыло – 375-515 мм, вес – 500-650 г.

Сходства – отличия: отличается размерами и большими длинными крыльями, мощным клювом и заметной **«бородой»**. Хвост – клиновидный.

Распространение: широкое – почти вся Евразия, за исключением пустынь, южных и юго-восточных областей, Северная Африка и Северная Америка. В Туркменистане – все горные районы, а также Бадхыз и Карабиль.

Образ жизни: оседлая и кочующая птица. Обитает в горном ландшафте и на предгорных равнинах. Держится в одиночку, парами, небольшими группами. Гнездится в марте-апреле. Гнезда – на скалах, земляных обрывах, на деревьях. В кладке 4-6 яиц. Окраска зеленоватоголубая с бурыми крапинами. Птенцы – в мае. Ворон – всеядная птица. Важное место в питании занимают грызуны – полевки, песчанки, слепушонки, мыши, ежи, а также мелкие птицы, падаль, отбросы человека, растительные корма.

Статус: хорошо заметная, но многочисленная птица.

Aýaklary gysga, berdaşly. Höwürtgisini agaçlarda ýa-da gýrmysylarda gurýar. Ýimiti ösümlikleriň şireli miweleri we ýumşak tohumlary, şeýle-de mör-möjekler, guşlar edil siňekçiler ýaly, guran şahadan ýa-da agajyň depesinden uçup, olary tutýarlar. Höwürtegelemeýän döwründe süri bolup gezýär. Dünýäde 4 görnüş, şolardan Türkmenistanda 2-sykylykçy we toganpisint sykylykçy gabat gelýär. Sykylykçynyň guýrugy göni kesilen we gysga, ganatlary insiz, toganpisintli sykylykçynyňky uçanda bedeni süýnmek bolup, guýrugynyň uzynlygy sebäpli, ganatlary bedeni-ne sazlaşyksyz ýaly bolup görünýär.

283. Sykylykçy – *Bombycilla garrulus* – Свиристель

Meýdan alamatlary: sar ölçeginde. Oklaw görnüşli, dykyz bedenli, gysga guýrukly, ganatlary başgalara görä, uzyn hem insiz. **Kellesinde uly hüpügi bolýar.** Umumy reňki gülgüne-çal, **ganatlary ak we sary kese zolakly, goýy goňur. Bokurdagy we gözünden geçýän zolak gara,** guýrugynyň aşagy we maňlaýy goňurrak. **Guýrugynyň uju sary kese zolakly.** Mäkiýanlary hüpüginini kiçi ölçeği bilen tapawutlanýar. Çünki gara, başgalara garanda, gysga we inli. Aýaklary gara, berdaşly we dyrnaklary egmek. Sesi ýakymly owazly, pessaýja sykylyklanma – “swiriri-swiriri”. Ganaty – 107-119 mm, agramy – 60 g golaý.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: oklawşekilli bedeniniň has dykyzdygy, guýrugynyň gysga we onuň ujyndaky sary zolagy bilen toganpisintli, sykylykçydan tarawutlanýar.

вершины надклювья. Крылья относительно короткие, но острые. Ноги короткие, крепкие. Гнезда строят на деревьях или кустарниках. Пища – всевозможные ягоды и мягкие мелкие плоды, а также насекомые, которых ловят, как мухоловки, взлетая с сухой ветви или вершины дерева. Вне времени гнездования держатся стаями. В мире 4 вида, из которых в Туркменистане встречается 2 – свиристель и свиристелевый сорокопуд. У свиристеля хвост прямо срезанный, короткий, крылья узкие. У свиристелевого сорокопуда вытянутое при полете тело, причем крылья кажутся непропорционально маленькими из-за длинного хвоста.

Полевые признаки: размером со скворца. Тело плотное, вальковатое, хвост короткий, а крылья сравнительно длинные и узкие. **На голове большой хохол.** Общий тон окраски розово-серый, **крылья темно-бурые с поперечными белыми и желтыми полосками. Горло и полоска через глаз – черные,** подхвостье и лоб – коричневые. **На конце хвоста – поперечная желтая полоса.** Самки отличаются маленькими размерами хохла. Клюв черный, сравнительно короткий, широкий. Ноги черные, сильные, с загнутыми когтями. Голос – негромкое свиристение, приятная трель – «свирири-свирири». Крыло – 107-119 мм, вес – около 60 г.

Сходства – отличия: от свиристелевого сорокопуда отличается более плотным вальковатым телом, коротким хвостом и желтой поло-

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeleýän bölegi, Ýewraziýanyň we Demirgazyk Amerikanyň taýga zolagy. Demirgazyk Amerikanyň günorta çäklerinde, Merkezi we Gündogar Ýewropada, Gazagystanda, Orta we Merkezi Aziýada gyşlaýar. Türkmenistanda güýz-gyş göçüp-gonýan döwründe hemme ýerlerde, ýöne köplenç jülgelerde we oazislerde duşýar.

Ýaşaýyşy: göçüp-gonýan we gyşlaýan guş. Adatça, noýabryň soňunda, dekabrdä bize uçup gelýär we olaryň aprele, hatda maýyň ortasyna çenli galmaklary mümkin. Göçüp-gonýan dowründe süri bolup gezýär. Esasy ýimiti – ösümlikleriň miweleri we tohumlary.

Statusy: ol ýa-da beýeki ýerlerde miweli baglaryň hasyllylygy guşlaryň göçüp-gonma ýagdaýny kesgitleýär, şonuň üçin olar bir ýyl bizde az sanly, hatda seýrek, beýleki ýyllarda adaty bolmagy mümkin.

284. Toganpisintli sykylykçy – *Hypocolius ampelinus* – Сорокопутовый свиристель

Meýdan alamatlary: bedeni süýnmek şekilli bolup, guýrugynyň uzynlygy sebäpli, ganatlary bedeni-ne sazlaşyksyz kiçi ýaly bolup görünýär. Üstki tarapyň reňki goňurrak-çal, aşagy gülgüne-çyparak, **guýrugynyň uju gara,** ýaşy ýeten guşlaryň ganatlarynyň uju ak. Horazynda **çüňkünden başlap, gözünüň üstünden ýeňsesine geçýän inli gara zolak kellesini gurşaýar.** Guşlar kellesindäki hüpük görnüşli ýeleklerini ýygýgydan galdyýarlar. Horazlarynyň guýrugyndaky gara zolak we ganatlarynyň ujundaky ýagty ak teg-

сой на конце хвоста.

Распространение: гнездовая часть ареала – таежная зона Евразии и Северной Америки. Зимуют в южных областях Северной Америки, Центральной и Восточной Европе, Казахстане, Средней и Центральной Азии. В Туркменистане повсеместно на осенне-зимних кочевках, но больше в долинах и оазисах.

Образ жизни: кочующая и зимующая птица. У нас обычно появляются в конце ноября, в декабре и могут оставаться до апреля, даже до середины мая. Во время кочевков держатся стаями. Основной корм – ягоды и плоды.

Статус: размах кочевков зависит от урожая ягод в тех или иных областях, поэтому в одни годы он может быть у нас немногочисленным и даже редким видом, в другие – обычным.

Полевые признаки: форма тела вытянутая, причем крылья кажутся непропорционально маленькими из-за длинного хвоста. Окраска верха буровато-серая, низ розовато-палевый, **конец хвоста черный,** у взрослых птиц концы крыльев белые. У самца **от клюва через глаз и затылок – опоясывающая голову черная широкая полоса.** Птица часто поднимает оперение на голове в виде хохла. При взлете хорошо заметна черная полоса на хвосте, яркие белые пятна на концах крыльев у самцов.

Сходства – отличия: внешним

milleri uçýan mahaly anyk görünyär.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: daşky keşbi boýunça gara maňlaýly togany ýatladýar, uzyn guýrugynyň ujundaky gara zolagy bilen sykylykçydan tarawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Arabystan, Alynky Aziýa we Orta Aziýanyň gü-norta çetleri. Türkmenistanda Tejen (Gaňňalydan ýokarda), Guşgy we Murgap (Saryýazydan ýokarda) derýalaryň jülgeleri.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtlegeleýän guş. Derýa yakasyndaky jeňňelligi (ýylgyn, gamyş, gyrgan) halaýar. Höwürtlegeleýän döwri maýyň birinji ongünlüginde iýunyň aýagyna çenli. Höwürtlegesi okaraşekilli. 5 sany arassa agymtyl-goňurrak-çal reňkli maýdajyk menekli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 23.0-27.5 x 17.7-19.7 mm. Miweler (esasan gyzyganyň) az mukdarda – mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek, çäkli ýaýran, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen guş.

Olýapkalar – *Cinclidae* – Оляпковые

Uly bolmadyk maşgala degişli sar ölçegli, güр we dykyz ýelekli guş (bary 5 görnüş). Guýrugy kelte we ganatlary gysga tegelenen. Dag derýajyklarynyň dury suwly, düýbi daşly ýerlerinde duş gelyär. Oňurgasyzlary gös-göni suwdan ýa-da onuň gýralaryndan tutup iýmitlenýär.

Biziň awifaunamyzda bir görnüş – **adaty olýapka – *Cinclus cinclus*** (ser. sur. 285) duş gelyär. Ol ak bokurdagy, petekesi, döşi bilen aňsat tanalýar. Galan ýelek örtügi goňur (boz). Dag derýajyklarynyň kenarlarynda görmek bolýar. Ol özüni alyp baryş häsiýetleri

обликом напоминает чернолобого сорокопуга, а от свиристеля отличаются длинным хвостом с черной полосой на конце.

Распространение: Аравия, Передняя и крайний юг Средней Азии. В Туркменистане – в долинах Теджена (выше Ганналы), Кушки и Мургаба (выше Сарыязы).

Образ жизни: прилетает, гнездится птица. Предпочитает приречные тугайные заросли (тамарикс, тростник, дереза). Гнездовой период – с первой декады мая до конца июня. Гнездо чашеобразной формы. В полной кладке 5 яиц окраски от чисто белой до пятнистой с мелкими бледно-буровато-серыми крапинками. Размеры яиц – 23-27.5 x 17.7-19.7 мм. Питаются ягодами (в основном дерезы), в меньшей степени насекомыми.

Статус: редкая птица с ограниченным распространением, внесена в Красную книгу Туркменистана.

Небольшое семейство птиц (всего 5 видов) размером со скворца, с плотным телосложением и густым оперением. Короткий хвост и укороченные округлые крылья. Горные птицы, живут по мелким речкам на участках с прозрачной водой и каменистым дном. Питаются мелкими беспозвоночными, которых ловят непосредственно в воде или у кромки берега.

В нашей фауне один вид – **обыкновенная оляпка – *Cinclus cinclus*** (см. рис. 285). Легко

bilen tapawutlanýar: suwda gowy çümüp, düýbinde yöreyär. Bizde tötänden uçup gelyän görnüş hökmünde Merkezi Köpetdagda ýekeje gezek görüldi (1986 ý., dekabr).

узнается по белому горлу, зобу и груди остальное оперение белое. Может встретиться только на берегу горной речки, хорошо ныряет и ходит по дну, целиком погружаясь в воду. У нас – залетный вид, известен единственный случай (декабрь 1986 г.) встречи в Центральном Копетдаге.

Çitçitiler – *Troglodytidae* – Крапивники

Maýda guşlar maşgalasy. Ýelek örtügi güр we ýumşak. Ganatlary inli we tegelenen. Guýrugy gysga. Çünki inçe we göni. Çitçitileriň aýaklary ýaşamaga amatly bolan ýerlere – gyrymsylara we ýel ýukan agaçlara dyrmaşmaklary üçin uýgunlaşandyр. Bolşuna görä çalt, yöne duňe göni ugra, adatça, ýere ýakyn, gysga aralyga uçýar. Tokaý gyrymsylarynyň, ýel ýukan agaçlarda, käte seýrek gyrymsyly dag gaýalarynyň aralarynda ýaşamaklary üçin uýgunlaşandyр. Höwürtgeleri ýapyk ýerde, uly, girelgesi gapdalýnda. Guşlar oturymly we göçüp-gonup ýaşaýarlar. Möр-möjekler, möýler, käte ösümlikleriň däneleri bilen iýmitlenýärler. Dünýäde 60-dan gowrak, Türkmenistanda 1 görnüş.

Семейство мелких птиц. Оперение мягкое, густое. Крылья широкие, закругленные. Хвост короткий. Клюв тонкий, прямой. Ноги приспособлены для лазания в кустах и буреломе – характерных местах обитания крапивников. Летают довольно быстро, но только по прямой и на короткие расстояния, обычно низко над землей. Живут в подлеске, среди бурелома, иногда в горах среди скал с редким кустарником. Гнезда большие, закрытые, с боковым входом. Оседлые и кочующие птицы. Питаются насекомыми, пауками, иногда семенами. В мире более 60 видов, в Туркменистане – 1.

286. Çitçiti guşy – *Troglodytes troglodytes* – Крапивник

Meýdan alamatlary: serçeden has kiçi. Çakgan hereketli gysgajyk guýrugy ýokaryk galyp duran maýda guşjagaz. Gözüniň üsti ýagty gaşly, duluklary agymtyl menekli. Çünki göni, inçe we keltejik ganatlary tegelenen. Bedeniniň üstki tarapynyň, ganatlarynyň we guýrugynyň reňki garamtyl kese nagyşlanan goňras-goňur. Aşaky tarapy edil şonuň ýaly, yöne nepis nagyşly çyрarrak

Полевые признаки: значительно меньше воробья. **Очень мелкая подвижная птичка с коротким вздернутым вверх хвостом.** Над глазом светлая бровь, на щеках беловатые пестрины. Клюв прямой, тонкий, крылья короткие, округлые. Окраска верхней стороны тела, крылья и хвост – каштаново-бурые с поперечным темным рисунком. Нижняя сторона рыже-

çal. Ýaş guşlar ulularyndan aşak tarapyň gyradeň alabederdigi bilen tapawutlanýar. Aýaklary goňur. Sesi güýçli – “çerr-çerr”. Saýraýy sesli owazlardan durýar. Bedeni – 95-120, ganaty – 45-56, ganatlarynyň gerimi – 115-170 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ýokaryk galyp duran guýrugy gysga. Meňzeş görnüşleri ýok.

Ýaýran ýerleri: Günbatar Ýewropa, Demirgazyk-Günbatar Afrika, Kiçi we Alynky Aziýa, Demirgazyk Amerika. Orta Aziýada – daglyk ýerlerde. Türkmenistanda Uly Balkanda, Köpetdagda, Köýtendagda.

Ýaşayşy: oturymly we göçüp-gonup ýaşayan guş, dag derelerindäki gyrymsy agaçlyklarda saklanýar, suw basan çygly ýerlerde we güreňlikleri halaýar. Ýekelikde ýa-da jübüt bolup, ýerde ýa-da gyrymsylyarda gezýär. Höwürtgesi şarşekilli, gapdal girelgeli, adatyça agaç kökleriniň ýa-da daş üýşmekleriniň aşagynda ýerleşýär. Maý-iyun aýlarynda 4-8 sany goňurak-gyzyl meneklije, ak ýumurtgalary goýýar. Maýda oňurgasyzlar bilen iýmitleňýär.

Statusy: seýrek, käbir ýerlerde adaty guş.

Owazçylar – *Prunellidae* – Завирушковые

Daşyndan maýda jokjoky guşlara meňzeş, kiçiräk saýrak guşlar maşgalasy. Tundra tokaýlygynyň, tokaýlaryň we beýik daglyklaryň ýaşajylary. Ýelek örtügi güreňlik we gaty, reňki goňur reňkiň agdyklygynda öçügsi, käte çypar öwüşgin garyndyly. Adatyça, mäkiýanlarynyň reňki horazlaryna meňzeş, ýaş guşlar alabeder bolýar. Ganatlary tegelenen, guýrugy göni

вато-серая, с таким же, но более тонким рисунком. Молодые отличаются от взрослых равномерно испещренным низом. Ноги бурые. Голос – звонкое «чerr-чerr». Песня состоит из громких трелей. Тело – 95-120, крыло – 45-56, размах крыльев – 115-170 мм.

Сходства – отличия: короткий вздернутый вверх хвост. Сходных видов нет. Распространение: Западная Европа, Северо-Западная Африка, Малая и Передняя Азия, Северная Америка. В Средней Азии – горные районы. В Туркменистане – Большие Балханы, Копетдаг, Койтандаг.

Образ жизни: оседлая и кочующая птица, придерживается горных ущелий, предпочитает сырые промоины и поймы речек с густыми зарослями. Держатся в одиночку или парами на земле или кустах. Гнездо – шарообразное с боковым входом, помещается обычно под корнями или в кучах валежника. Кладка из 4-8 белых с буро-красными крапинками яиц, в мае-июне. Питается мелкими беспозвоночными

Статус: редкая, местами обычная птица.

Семейство не крупных певчих птиц, внешне сходны с мелкими дроздами. Обитатели лесотундры, лесов и высокогорий. Оперение густое и жесткое, окраска неяркая, с преобладанием бурых, иногда примесью рыжих тонов. Самки и самцы обычно окрашены сходно, молодые птицы пестрые. Крылья закругленные, хвост прямой или

ýa-da sähelçe oýuk. Çüňküniň düýbi giňelen, çüňküstiň gerşi göni, birneme dykzlaşan we tegelenen, ýiti дәl. Olar köplenç ýerde ýa-da gyrymsylyarda gezýändigine sebäpli, az göze ilýär. Höwürtgisini gyrymsylyarda, käte beýik bolmadyk agaçlarda, hat-da ýerde we daşlaryň aşagynda (dagda) gurýar. 4-5 sany ýumurtga goýýar we iki hepde golaý basyp oturýar; şonça wagtda höwürtgede jüyjeleri ösüp ýetişýär. Görnüşleriň köpüsi ýylda iki gezek ýumurtga basyp, jüyje çykarýarlar. Dürli oňurgasyzlar we ösümlükleriň tohumlaryny iýýärler, güzüne bolsa miweleri çokýarlar. Demirgazyk çäklerde ýaşayan görnüşleri uçup geçýär, günortada-daglarda ýaşayanlary dikligine yzygiderli göçüp-gonmak hereketinde bolýar. Ýewropanyň we Aziýanyň, şeýle-de Demirgazyk Afrikanyň aram zolagynda jemi 12 görnüş ýaýran. Türkmenistanda 5 görnüş.

287. Tokaý owazçysy – *Prunella modularis* – Лесная завирушка

Meýdan alamatlary: serçeden sähelçe maýda. Çalymytl we goňurak öçügsi reňkli. Kellesiniň üsti we boýnunyň ýeňsesi garamtyl, dik tegmilli goýy çal reňkli. **Arkasy dikligine gara çyzykly, çyparak-goňur,** bili we guýrugynyň üsti ýaşylymytl-goňur. **Bokurdagy, petekesi we döşi goýy çal, garnynyň ortasy we guýrugynyň aşagy kirliräk-ak.** Ganatlarynyň ýelekleri çyparak inli jähekli, goýu-goňur reňkli. Ganatlarynda iki sany insiz kese ak zolagy bolýar. Çüňki garamtyl, inçe (tinňillewüjekleriňki ýaly). Aýaklary kirliräk sary, dyrnaklary ачык gögümtil reňkli. Horazy saýraýan döwründe

слегка вырезанный. Конец надклювья несколько уплощен и закруглен, резкого гребня нет, вершина надклювья прямая, основание клюва расширено. Малозаметные птицы, которые держатся, преимущественно, на земле или в кустарниках. Гнезда устраивают в кустах, иногда невысоко на деревьях, а также на земле или под камнями (в горах). В кладке 4-5 яиц, насиживание около двух недель; примерно столько же времени птенцы находятся в гнезде. У многих видов две кладки в году. Питаются различными беспозвоночными и семенами растений, осенью охотно поедают ягоды. Виды, обитающие в северных районах, перелетные, тогда как обитающие на юге в горах совершают регулярные вертикальные кочевки. Всего 12 видов, распространенных в умеренной полосе Европы и Азии, а также Северной Африке. В Туркменистане – 4 вида.

Полевые признаки: размером чуть меньше воробья. Окрашена в тусклые сероватые и буроватые тона. Верх головы и шея сзади – темно-серые с черноватыми продольными пятнами. **Спина рыжевато-бурая с черными продольными штрихами,** поясница и надхвостье – зеленовато-бурые. **Горло, зоб и грудь темно-серые, а середина брюшка и подхвостье грязно-белые.** Крылья темно-бурые с широкими рыжеватыми окаймлениями перьев. На крыле две узкие поперечные белые полосы. Клюв тонкий (как у пеночек), темный. Ноги грязно-желтые, когти

ýygy-ýygydan gyrymsylaryň ýa-da agaçlaryň depesine çykyar. Ýerde towsup-towsup hereket edýär. Oturanda ganatlaryny çekişdirýär. Ganaty – 65-70, guýrugy – 55-61, söbügi – 19.4-21.4, çüňki – 7.2-8.6 mm, agramy – 19.5-25.1 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ýelek örtügininiň reňkiniň has ýagty, çalymtyl-goňur öwüşginini bilen beýleki owazçylardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi, Ýewropanyň, Kawkazyň, Kiçi, Alynky we Demirgazyk-Günbatary Aziýanyň tokaýly ýerleri. Günbatary we Günorta Ýewropada, Zakawkazýede, Kiçi Aziýada we Alynky Aziýanyň käbir ýerlerinde we Ýakyn Gündogarda gyslaýar. Türkmenistanyň diňe günorta-günbatarynda duşýar.

Ýaşayşy: ýek-tük gyslaýan guş, Sumbar we Etrek derýalarynyň jülgelerinde gabat gelmegi mümkin. Ýekelikde ýa-da kiçiräk süri bolup gezýär. Otjumak ösümlükleriň tohumlary we mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek, bizde gowşak öwrenilen guş.

288. Menekli owazçy – *Prunella ocularis* – Персидская завирушка

Meýdan alamatlary: serçeden sähelçe kiçi. **Garamtyl “telpejigi” we inli ak gaşy aýdyň görünýär.** Bokurdagynyň gapdallary oňat saýgardýan gara menekli, arkasy gara dik geçýän tegmilli. Sesi mylaýym – “ti-ti-ti”. Ganaty – 72-77 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: bokurdagynyň agymtyldygy bilen garadamak owazçydan tapawutlanýar, solgun owazçydan tapawudy ýok diýen ýaly, ýöne olar bir ýerde bile

светло-сизого цвета. Во время пения самец часто сидит на вершине куста или дерева. По земле передвигаются мелкими прыжками. Сидя передергивает крыльями. Крыло – 65-70, хвост – 55-61, цевка – 19.4-21.4, клюв – 7.2-8.6 мм, вес – 19.5-25.1 г.

Сходства – отличия: в отличие от других завирушек окраска оперения более светлая, серовато-буроватого тона.

Распространение: гнездовая часть ареала – лесные области Европы, Кавказа, Малой, Передней и Северо-Западной Азии. Зимует в Западной и Южной Европе, Закавказье, Малой и местами Передней Азии и на Ближнем Востоке. В Туркменистане только на юго-западе.

Образ жизни: зимующая птица, которая может быть встречена по долинам Сумбара и Этрека. Держится одиночно или небольшими стайками. Питается семенами трав и насекомыми.

Статус: редкая, у нас слабо изученная птица.

Полевые признаки: размером чуть меньше воробья. **Четко выražены темная “шапочка” и широкая белая бровь.** По бокам горла – хорошо заметные черные пестринки, на спине продольные черные пятна. Голос – нежное «ти-ти-ти». Крыло – 72-77 мм.

Сходства – отличия: от черногорлой завирушки отличается бледным горлом, от бледной завирушки почти неотличима, но совместно

ýaşamaýarlar.

Ýaýran ýerleri: Arabystanyň günorta-günbatary çetleri, Zakawkazýe, Türkiýäniň demirgazyk - gündogary we Eýranyň demirgazyk-günbatary. Orta Aziýada diňe Türkmenistanda, Merkezi Köpetdagda bellendi.

Ýaşayşy: höwürtleýän görnüş, daglaryň gurak eňňitlerindäki gyrymsyly ýerleri eýeleýär. Gyrymsylarda ýa-da gaýalaryň kölgesinde gezýär. Mör-möjekler we ösümlükleriň tohumlary bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek, az öwrenilen guş, Köpetdag goraghanasynyň guşlarynyň täsin wekilleriniň biri.

289. Garadamak owazçy – *Prunella atrogularis* – Черногорлая завирушка

Meýdan alamatlary: serçe ölçepli kiçiräk guş. **Ol bokurdagynyň, duluklarynyň we kellesiniň üstüniň gara ýa-da garamtyl reňki bilen aňsat tanalýar.** Gaşy, petekesi we döşi agymtyl-çypar reňkli. Arkasy garamtyl inli dik menekli goňurrak-çypar, guýrugynyň üsti çalymtyl-goýu-ýaşyl. Bedeniniň aşagy açyk-çyparrak reňkli. Sesi – “ti-ti-ti”. Ganaty – 70.5-79.0, çüňki – 7.5 mm, agramy – 17.5-21 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: bokurdagynyň garadygy bilen owazçylaryň ählisinden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän yeri aýry-aýrylykda – Uralda, Altaýda, Týan-Şan daglarynda we Orta Aziýanyň daglarynda. Orta Aziýanyň günorta çäklerinde, şeýle-de Alynky Aziýada we Hindistanyň demirgazyk-günbatarynda gyslaýar. Türkmenistanda dag etekleriniň we düzlükleriň käbir ýerlerinde.

они не обитают.

Распространение: крайний юго-запад Аравии, Закавказье, северо-восток Турции и северо-запад Ирана. В Средней Азии отмечалась только в Туркменистане, в частности в Центральном Копетдаге.

Образ жизни: гнездящийся вид, населяет кустарниковые участки на сухих склонах гор. Держится в кустах или в тени скал. Питается насекомыми и семенами различных растений.

Статус: редкая, слабо изученная птица, один из интересных представителей птиц Копетдагского заповедника.

Полевые признаки: небольшая, размером с воробья, птица. **Ее можно узнать по черной или черноватой окраске горла, щек и верха головы.** Бровь, зоб и грудь беловато-рыжеватые. Спина буровато-рыжеватая с широкими темными продольными пестринами, надхвостье серо-темно-зеленое. Низ тела светло-рыжеватый. Голос – «ти-ти-ти». Крыло – 70.5-79, клюв – 7.5 мм, вес – 17.5-21 г.

Сходства – отличия: от всех завирушек отличается черным горлом.

Распространение: на гнездовье – изолированно на Урале, Алтае, Тянь-Шане и горах Средней Азии. Зимует в южных районах Средней, а также в Передней Азии и на северо-западе Индостана. В Туркменистане – местами в предгорьях и равнинных районах.

Образ жизни: пролетный и ко-

Ýaşayşy: uçup geçýän we göçüp-gonýan-gyşlaýan görnüş. Ýerde ýa-da gyrymsylaryň aşaky böleklerinde ýekelikde, jübut ýa-da topar bolup, gizlin gezýär. Uçup geçende oazislerdäki dürli gyrymsylaryň ösen ýerlerinde, baglarda (hatda gowaça meýdanlarynda), toraňny jeňňelliginde, çöldäki seýrek sazaklyklarda saklanýar. Ösümlikleriň tohumlary, maýda miweler we mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly we bizde ýeterlik öwrenilmedik guş.

290. Alp dag zologowazçysy – *Prunella collaris* – Альпийская завирушка

Meýdan alamatlary: serçeden we beýleki owazçylardan ulurak. Kellesi we arkasynyň üstki bölegi çalymtyl-goňur. Ýaşy ýeten guşlaryň döşündäki ýelekleri çal, bokurdagy garamtyl kese zolakly agymtyl. **Böwürleri çupar ýa-da goňur. Ganatlarynda kese iki sany ak zolak** (tokaý owazçynyňka görä inli), **şol zolaklar bilen jäheklenen iki ganatyndaky garamtyl kese zolak uçýan mahaly oňat görünýär.** Çünki sary esasly garamtyl-goňur, aýaklary gyzylmytyl-goňur. Daşdan daşa uçup geçende, çeкеýik ýaly guýrugyny galgadýar. Ýerde kçiräk towsup-towsup hereket edýär. Sesi – sesli owazlaryň toplumu. Çagyryş sesi pessaýja – “çirk-çirk”. Ganaty – 91.0-102.7 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: göwresiniň uludygy (ganaty – 85 mm ýokary) we böwürleriniň çuparrak reňki bilen beýleki owazçylardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta Ýewropanyň, Kawkazyň, Kiçi, Alynky, Oтра, Merkezi we Gündogary Aziýanyň daglyk ýerleri, şeýle-de Gimalay daglary. Türkmenistanda Köpetdagda we Köýtendagda.

чующе-зимующий вид. Держится скрытно на земле или в нижней части кустов одиночно, парами или небольшими стайками. На пролете придерживается разнообразных кустарниковых зарослей в оазисах, садах (даже полях хлопчатника), тугаев, реже саксаульников в пустыне. Питается семенами, мелкими плодами и насекомыми.

Statusy: немногочисленная и недостаточна изученная у нас птица.

Полевые признаки: крупнее воробья и других завирушек. Голова и верхняя часть спины серовато-бурые. У взрослых на груди перья серые, горло светлое с темными поперечными полосками. **Бока рыжие или коричневые. На крыле две белые поперечные полосы** (шире, чем у лесной завирушки), **и в полете хорошо заметна темная полоса поперек обоих крыльев, окаймленная этими полосками.** Клюв черновато-бурый с желтым основанием, ноги красно-бурые. Перелетая с камня на камень, подергивает хвостом, подобно каменкам. По земле передвигается небольшими прыжками. Песня – набор звонких трелей. Позывка – негромкое «чирк-чирк». Крыло – 91-102.7 мм.

Сходства – отличия: от других завирушек отличается большей величиной (крыло – более 85 мм), рыжеватыми боками.

Распространение: горные области Южной Европы, Кавказа, Малой, Передней, Средней, Центральной и Восточной Азии, а также Гималаи. В Туркменистане – Ко-

Ýaşayşy: oturymly görnüş, dag çemenliklerinde, gaýalarda we çagyl üşmekli yerlerde ýaşayar. Iýun-iyulda 4-5 sany mawumtyl ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler, ösümlikleriň tohumlary we miweleri bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, käbir yerlerde adaty, gowşak öwrenilen guş, Köpetdag we Köýtendag goraghanalarynyň guşlarynyň täsin wekilleriniň biri.

Çürlentgiler – *Sylviidae* – Славковые

Bedeni boýuna göre biraz süýnmegräk, maýda we örän maýda guşlar maşgalasy. Ýelek örtügi yumşak hem mymyk. Üstki tarapynyň reňki birmeňzeş. Guýrugy tegelesen, göni ýa-da sähelçe oýuk. Çünki inçe, agyz dilkawy gönelen bizşekilli. Çünkünüň gyalarynda köplenç gaty gyllary bolýar. Aýaklary gysga ýa-da söbüginiň oň tarapyny ýarýan aýry-aýry teňňeli orta uzynlykda. Horazlarynyň we mäkiýanlarynyň arasyndaky tapawut görnüşleriň käbirinde aýdyň görünýär, yöne mäkiýanlarynyň aglabasy horazlaryna meňzeş, diňe ölçegleriniň sähelçe kiçidigi bilen tapawutlanýar. Esasy iýmiti mör-möjekler, görnüşleriň käbiri miweler bilen iýmitlenýärler. Ýerde, gyrymsylaryň, agaçlaryň üstünde höwürtegeleýärler. Çürlentgiler we gamyşguşlary 4-6, aldawaçlar 4-8 sany ýumurtga goýýar. Ýylda bir gezek ýumurtga goýýarlar. Dünýäde 400-den gowrak, Türkmenistanda 32 görnüş.

291. Ýaýbaňguýruk gamyşguşy – *Cettia cetti* – Широкохвостка

Meýdan alamatlary: serçeden biraz kiçi. Bedeniniň üstki tarapy poslyrak-goňur. Ganatlary we guýrugy

петдаг и Койтендаг.

Образ жизни: оседлый вид, населяет горные луга, скалы и осыпи. Гнездо помещается в трещине скалы или под камнем. Кладка из 4-5 голубых яиц, в июне-июле. Питается насекомыми, семенами и ягодами.

Statusy: немногочисленная, местами обычная, слабо изученная птица, один из интересных представителей птиц Копетдагского и Койтендагского заповедников.

Семейство мелких и очень мелких птиц, с несколько вытянутым в длину телом. Оперение мягкое, пушистое. Окраска верхней стороны однотонная. Хвост закругленный, прямой или слегка выемчатый. Клюв тонкий, шиловидный с прямым разрезом рта. По краям клюва часто имеются щетинки. Ноги короткие или средней длины с отдельными щитками, покрывающими переднюю поверхность цевки. Различия между самцами и самками хорошо выражены у одних видов, но у большинства самки по окраске схожи с самцами, но отличаются чуть меньшими размерами. Основной пищей являются насекомые, у некоторых видов ягоды. Гнезда на земле, на кустарниках, на деревьях. Число яиц в кладке у славков и камышевок 4-6, у пеночек 4-8. Одна кладка в году. В мире более 400 видов, в Туркменистане – 32.

Полевые признаки: несколько меньше воробья. Верхняя сторона тела ржавчато-бурая. Крылья и

goňur. Gaşy agymtyl. **Guýrugy tegelenen, ýaýbaň.** Bedeniniň aşagy kirliräk-ak, böwürleri çalymtylrak-tüsse öwüşginli. Döşi ak. Çünki goýu goňur, aýaklary sarymtylrak-goňur. Ýaşlary ulularyna çalymdaş, ýöne reňki has öçügsi. Saýraýşy pert sesli “set-sit-swit” görnüşinde şowhunly sesleriň sykylykly toplumu. Howsalaly gykylygy pes-saýja – “twis-si-si-si”. Ganatynyň uzyn-lygy – 54-73 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: reňki, sesi we tegelenen ýaýbaň guýrugy bilen beýleki gamyşguşlaryndan we çyrlaklardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta Ýewropa, Kawkaz, Demirgazyk-Günbatar Afrika, Kiçi, Alynky we Merkezi Aziýanyň günbatar taraplary. Orta Aziýada – daglyk we düzlük ýerlerde. Türkmenistanda – Köpetdagda, Tejen, Murgap, Amyderýa jülgelerinde. Günorta Ýewropada we Günorta-Günbatar Aziýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: höwürtegeleýän guş. Endigan ýaýran dälidir. Derýajyklaryň we kanallaryň jeňňelli kenarlarynda gabat gelyär. Örän gizlin gezyär, ýöne horazlary saýraýan sesleri bilen özlerini aýan edýärler. Gür şahalanan gyrymsylarda höwürtege gurýar. Aprel-iýunda 4-5 sany ýaldyrawuk goňurgyzylyt reňkli ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: amatly bolan ýerlerde adaty görnüş.

292. Adaty çyrlak guş – *Locustella naevia* – Обыкновенный сверчок

Meýdan alamatlary: serçeden mese - mälim kiçi. Bedeniniň üstki tarapy gara-goňur tegmilli, çalymtyl-ýaşylymtyl-goňur. Gaşy çala

хвост бурые. Бровь светлая. **Хвост широкий, округлый.** Низ грязно-белый, бока с серовато-дымчатым налетом. Грудь белая. Клюв темно-бурый, ноги желтовато-бурые. Молодые похожи на взрослых, но более тусклые. Песня резкая громкая – свистовой набор трескучих звуков типа «цеть-цить-цвить». Тревожные крики – негромкое – «твиц-ци-ци-ци». Длина крыла – 54-73 мм.

Сходства – отличия: от других камышевок и сверчков отличается окраской, голосом и широким округлым хвостом.

Распространение: Южная Европа, Кавказ, Северо-Западная Африка, Малая, Передняя и западные районы Центральной Азии. В Средней Азии – в горах и равнинах. В Туркменистане – Копетдаг, долины Теджена, Мургаба, Амударьи. Зимует – в Южной Европе и Юго-Западной Азии.

Образ жизни: гнездящаяся птица. Распределение очень неравномерное. Встречается по заросшим берегам речек и каналов. Очень скрытны, но самцы выдают себя громкой песней. Гнездо строят в густых кустах. Кладка из 4-5 буровато-красного цвета блестящих яиц, в апреле-июне. Питаются насекомыми.

Statusy: в подходящих местах обитания обычный вид.

Полевые признаки: заметно меньше воробья. Верхняя сторона тела серо-зеленовато-бурая с черно-бурыми пятнами. Бровь слабо

saýgardýar. Ganatlary goňur bolup, ýelekleri insiz çalymtyl-ýaşylymtyl jähekli. **Bedeniniň aşagy akjymak-goňurrak, bokurdagy we garny ak.** Aýaklary sarymtyl-çal. Ýaş guşlaryň aşagy sarymtylrak we bokurdagynda, boýnynda we böwürlerinde göze görüňän çyzyklary bolýar. Saýraýşy örän uzyn bolup, ýaşyl çekirtgäniň jyrtyldysyna çalymdaş–“zi-zi-zizizizi”. Ganatynyň uzynlygy – 60-70 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: arkasynyň goýu-goňur tegmilli çalymtyl-ýaşylymtyl-goňurdygy we döşünde menekleriň ýokdygy bilen beýleki çyrlak guşlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän ýerleri – Ýewropanyň günbatar böleginiň aralyk giňliginden Merkezi Aziýanyň günbatarýna çenli. Orta Aziýada we Türkmenistanda derýalaryň jülgelerinde, çemenliklerde, gyrymsyly gamyşlyk ösgün otluk ýerlerde. Günorta Ýewropada, Demirgazyk Afrikada we Günorta Aziýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: bizde uçup geçýän guş. Ýazyna aprel-maýda uçup geçýär. Örän gizlin gezyär, derýalaryň, köleriň, howdanlaryň we beýleki suw ýataklaryň jeňňelli kenarlarynda duş gelmegi mümkin. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde adaty görnüş.

293. Derýa çyrlak guş – *Locustella fluviatilis* – Речной сверчок

Meýdan alamatlary: serçeden biraz kiçi. Bedeniniň üstki tarapy goýu çal-ýaşylymtyl-goňur. Pelpelleýji ýelekleri örän insiz agymtyl-çalymtyl-ýaşylymtyl jähekli. Guýrugynyň aşagy kese ala zolakly. Boýny, petekesi we döşi garamtyl dik

выражена. Крылья бурые с узкими серо-зеленоватыми окаймлениями на перьях. **Низ тела светло-буроватый, горло и брюшко светлые.** Ноги желтовато-серые. У молодых птиц низ желтоватый и на горле, шее и боках заметные штрихи. Песня очень длинная и похожа на стрекотание кузнечика – «зи-зи-зизизизи». Длина крыла – 60-70 мм.

Сходства – отличия: от других сверчков отличается серо-зеленовато бурой с черно-бурыми пятнами спиной и отсутствием пестрин на груди.

Распространение: область гнездования – умеренные широты от западных частей Европы до западных в Центральной Азии. В Средней Азии и в Туркменистане – речные долины, луга, сырые поляны с высокой травой кустарниками и тростником. Зимует в Южной Европе, Северной Африке и Южной Азии.

Образ жизни: у нас пролетная птица. Весенний пролет в апреле-мае. Очень скрытная, может встречаться по заросшим берегам речек, озер, водохранилищ и других водоемов. Питается насекомыми.

Statusy: немногочисленный, местами обычный вид.

Полевые признаки: несколько меньше воробья. Верхняя сторона тела темная серо-зеленовато-бурая. На маховых перьях очень узкие светло-серо-зеленоватые окаймления. На хвосте снизу – поперечная полосатость. На шее, зобе и груди

menekli. Aşaky tarapy goňurrak-ak. Aýaklary goňurrak-çal. Ýaş guşlaryň garyn tarapy gowşak ýaşylymytlary ýokundyly. Saýraýşy uzyn, ýaşyl çekirtgäniň sesine meňzeş jyrryldy – “zer-zer-zer-zer...”. Ganatynyň uzynlygy – 75-80 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: uçup geçende bizde duşýan beýleki çyrlak guşlardan reňkiniň garamtyldygy, **guýrugynyň aşagynyň aladygy, petekesiniň we döşüniň dik meneklidigi bilen tapawutlanýar.**

Ýaýran ýerleri: Merkezi we Gün-dogar Ýewropa, Günbatar Sibiriň günorta bölegi. Giňişleýin uçup geçýär. Orta Aziýada we Türkmenistanda – derýalaryň jülgelerinde, kölleriň we beýleki suwly ýerleriň gamyş-jeňňelli kenarlarynda. Gün-dogar Afrikada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçyän guş. Ýazyna martyň soňunda-apreliň başynda uçup geçýär. Jülgelerde we oazisleriň otluk we gyrymsylyk, aýratyn-da, suw ýatakly ýerlerde gabat gelýär. Örän gizlin gezyär. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde adaty görnüş.

294. Bilbil çyrlak guş – *Locustella luscinioides* – Соловьиный сверчок

Meýdan alamatlary: serçe ululyk-da. Bedeniniň üstki tarapy birmeňzeş çuparrak-goňur bolup, ganatlary we guýrugy has garamtyl öwüşginde. Gaşynyň üstündäki agymtyl zolak gowşak saýgardýar. **Aşaky tarapy çuparrak-agymtyl bolup, bokurdagy we garnynyň ortasy has ýagty reňkli.** Aýaklary sarymytl-goňur. Ýaş guşlaryň reňki çypar öwüşginli goýu ýaşylymytl-goňur, aşak tarapy

темные продольные пестрины. Низ буровато-белый. Ноги буровато-серые. У молодых птиц на брюшной стороне слабый зеленовато-желтый налет. Песня длинная, однообразная как стрекотание кузнечика – «зер-зер-зер-зер...». Длина крыла – 75-80 мм.

Сходства – отличия: от других встречающихся у нас на пролете сверчков отличается темной окраской, **полосатостью хвоста снизу и продольными пестринами на зобу и груди.**

Распространение: Центральная и Восточная Европа и южная часть Западной Сибири. На пролете шире. В Средней Азии и Туркменистане – долины рек, берега озер и других водоемов с зарослями мелких кустарников и тростника. Зимует в Восточной Африке.

Образ жизни: пролетная птица. Весенний пролет в конце марта в начале апреля. Встречается по долинам и оазисам на участках с зарослями трав и кустарников, особенно у водоемов. Держится очень скрытно. Питается насекомыми.

Статус: немногочисленный, местами обычный вид.

Полевые признаки: размером с воробья. Верхняя сторона тела однотонно рыжевато-бурая с более темными тонами на крыльях и хвосте. Надбровные светлые полосы выделяются слабо. **Низ рыжевато-беловатый с более светлым горлом и серединой брюшка.** Ноги желтовато-бурые. Молодые птицы темно-зеленовато-бурые с рыжеватым оттенком, низ у них значи-

has goňurrak. Saýraýşy batlanýan durnukly sesler – “zirrrrr...”, soňra jyrryldyly owazlara geçýär. Sesi pert – “çk-çk-çk-çk” Ganatynyň uzynlygy – 64-83 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: özüni erkin alyp barmak endikleri bilen gamyşguşlardan tapawutlanýar. Arkasynyň reňkiniň birmeňzeş çuparrakdygy beýleki çyrlak guşlardan we basgançakly guýrugy, bilbil guşlardan tapawutlandyryar.

Ýaýran ýerleri: Merkezi we Günorta Ýewropa, Afrikanyň demirgazyk-günbatar çetleri, Günbatar Sibiriň günortasy. Orta Aziýada derýalaryň jülgelerinde. Türkmenistanda Etrek, Murgap, Tejen derýalarynyň we Amyderýanyň jülgelerinde. Afrikanyň merkezi welaýatlarynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçyän-höwürtlegeýän guş. Apreliň ilkinji günleri uçup gelýär we suw ýataklaryň ösgün otluk, gyrymsyly we gamyşly jeňňellikli kenaryakalany eýeleýär. Ýaşyryn gezyär we saýraýşy bilen özüniň gür ösen otlaryň ýada gyrymsylaryň arasynda bardygyny aýan edýär. Gür ösen gyrymsylarda höwürtlege gurýar. Maý-ijunda 4-5 sany goňur meneklije, ak ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly görnüş.

295. Inçeçüňk gamyşguş – *Acrocephalus melanopogon* – Тонкоклювая камышевка

Meýdan alamatlary: serçeden has kiçi. Bedeniniň üstki tarapy dikligine garamtyl menekli ачык ýaşylymytl-goňur. Kellesi **dikligine goňur tegmilli we inli ak gaşynyň üsti garamtyl zolakly** sarymytl-çal. Guýrugy basgançakly. Aşaky tarapy çuparrak-

тельно бурее. Песня – постоянно нарастающие звуки «zirrrrrr...», переходящие в стрекочущую трель. Голос – резкое «чк-чк-чк-чк». Длина крыла – 64-83 мм.

Сходства – отличия: от камышевок отличается манерой держаться не очень скрытно. От других сверчков однотонной рыжеватой окраской верха. От соловья – ступенчатым хвостом.

Распространение: Центральная и Южная Европа, крайний северо-запад Африки, на юге Западной Сибири. В Средней Азии – речные долины. В Туркменистане – долины Этрека, Мургаба, Теджена и Амударьи. Зимует в центральных областях Африки.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся вид. Прилетают в первых числах апреля и населяют прибрежные участки водоемов с зарослями высоких трав, кустов и тростника. Скрытная птица, держится в гуще травы или кустов, выдавая себя песней. Гнезда устраивает в густых зарослях. Кладка из 4-5 белых с бурыми пятнышками яиц, в мае-июне. Питается насекомыми.

Статус: немногочисленный вид.

Полевые признаки: значительно меньше воробья. **Верхняя сторона тела светло-зеленовато-бурая с темными продольными пестринами.** Голова желтовато-серая с продольными бурыми пятнами и темными полосами над **белой**

ak, döşüniň öňki, garnynyň yzky bölegi we guýrugynyň aşagy çuparrak-goňur. Aýaklary goýu goňur. Ýaş guşlaryň kellesi garamtylrak bolup, ýelekleriniň uçlary sarymtyl-agymtyl, arkasynyňky çalymtyl-çuparrak. Saýraýşy güýçli sykylyklardan we jür-rüldili sesleriň toplumyndan durýar. Çagyryş sesi pessaýja – “çýurr-çýurr”. Ganatynyň uzynlygy – 54-62.8 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: garamtyl aýaklary, gaşlarynyň ak, inlidigi we onuň üstündäki garamtyl zolak bilen beýleki gamyşguşlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtgeleýän ýerleri – bölekleýin – Günorta Ýewropada, Kawkazda, Alynyk (Päkis-tana çenli) we Orta Aziýada. Türkmenistanda daglyk ýerlerde we derýalaryň jülgelerinde. Eýranda, Päkistanda, Günbatar Hindistanda gyşlaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän we höwürtgeleýän guş. Ýazyna mart–aprelde uçup geçýär. Derýalaryň, kanallaryň, kölleriň kenaryakalaryndaky gamyşly we gyrymsyly jeňňellikleri eýeleýär. Jeňňellikleriň aşaky böleklerinde gezmegi halaýar. Gür ösen gamyşlyklarda höwürtge gurýar. Maý-iyunda 4-5 sany ýalpyldawuk goňurak-gyzyl reňkli ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde seýrek görnüş.

296. Torsujak gamyşguşy – *Acrocephalus schoenobaenus* – Камышевка-барсучок

Meýdan alamatlary: serçeden sähelçe kiçi. Bedeniniň üstki tarapy çuparrak-goňur. **Kellesinde,** arkasynda **dikligine gara we goňur menekleri bolýar** we ol **ony ala-**

широкой бровью. Хвост ступенчатый. Низ рыже-белый, передняя часть груди, задняя часть брюха и подхвостье рыжевато-бурые. Ноги темно-бурые. У молодых птиц голова черноватая с желтовато-беловатыми концами перьев, а спина серовато-рыжеватая. Песня состоит из громких свистов и набора трескучих звуков. Позывка – негромкое «чюрр-чюрр». Длина крыла – 54-62.8 мм.

Сходства – отличия: от других камышевок отличается темными ногами, белой широкой бровью и темными полосами над ней.

Распространение: в областях гнездования – неравномерно – в Южной Европе, на Кавказе, в Передней (до Пакистана) и Средней Азии. В Туркменистане – в горных и речных долинах. Зимует в Иране, Пакистане, Западной Индии.

Образ жизни: пролетная и гнездящаяся птица. Весенний пролет в марте-апреле. Населяет прибрежные заросли тростников и кустарников по берегам рек, каналов, озер. Предпочитают держаться в нижних частях зарослей. Гнездо строят в густых камышах. Кладка из 4-5 буровато-красного цвета блестящих яиц, в мае-июне. Питается насекомыми.

Статус: обычный, местами редкий вид.

Полевые признаки: несколько меньше воробья. Верхняя сторона тела рыжевато-бурая. **На голове и спине черные и бурые продольные пестрины, выглядит как по-**

beder görkezýär. Gözüniň üstünden agymtyl-çuparrak gaş geçýär. Ganatlary we guýrugy goňur. Aşagy böwürleriniň çuparrak ýokundysynda agymtyl. Aýaklary gara däl-de, çal reňkli. Ýaş guşlaryň petekesini ownuk gara meneklerden durýan “gülyaka” bezeýär. Sesi pessaýja – “çýurr-çerrr”. Saýraýşy – şowhunly ses owazlaryň we jikgildileriň toplumy. Ganatynyň uzynlygy – 62-71 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: gaşynyň inli çupardygy, arkasynyň we kellesiniň garamtyl meneklidigi bilen hindi, agymtyl aýaklary we kellesiniň üstüniň meneklidigi bilen inçeçüňk gamyşguşdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropanyň hemme ýerlerinde diýen ýaly, Gazagystanda we Sibirde Ýenesey derýasyna çenli höwürtgeleýär. Orta Aziýada we Türkmenistanda, esasan, derýalaryň jülgelerinde oazislerde we deňiz Kenarynda. Afrikada, onuň merkezi we günorta böleklerinde gyşlaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän guş. Ýazyna aprel-maýda uçup geçýär. Bölekleýin ýaýraýar. Dürli suw ýataklaryň kenaryakasyndaky ösümlikleriň gür ösen ýerlerinde gabat gelýär. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde adaty görnüş.

297. Hindi gamyşguşy – *Acrocephalus agricola* – Индийская камышевка

Meýdan alamatlary: serçeden sähelçe kiçi. Bedeniniň üstki tarapy kellesiniň has garamtyl we guýrugüstüniň has agymtyl bolmagynda çuparrak-goňur. **Gözüniň üsti uzyn agymtyl gaşly.** Ganatlarynyň ýelekleri çuparrak-çal jähekli goňur. Bedeniniň aşagy

лосатость. Над глазом проходит светло-рыжеватая бровь. Крылья и хвост бурые. Низ беловатый с рыжеватым налетом на боках. Ноги серые, не темные. У молодых птиц на зубу «ожерелье» из мелких темных пестрин. Голос – негромкое «чюррр-чerrrr». Песня – набор трескучих трелей и щebetаний. Длина крыла – 62-71 мм.

Сходства – отличия: от индийской камышевки отличается широкой рыжей бровью и темными пестринами на спине и голове, от тонкоклювой – светлыми ногами и пестрым верхом головы.

Распространение: гнездится почти по всей Европе, в Казахстане и Сибири до Енисея. В Средней Азии и Туркменистане, в основном, по речным долинам, оазисам и морскому побережью. Зимуют в Африке – в центральных и южных ее областях.

Образ жизни: пролетная птица. Весенний пролет в апреле-мае. Распределение неравномерное. Встречается на участках густой прибрежной растительности по различным водоемам. Питается насекомыми.

Статус: не многочисленный, местами обычный вид.

Полевые признаки: несколько меньше воробья. Верхняя сторона тела рыжевато-бурая с более темной головой и более светлым надхвостьем. **Над глазом – светлая длинная бровь.** Перья крыльев бурые с рыжевато-серыми каемками. Низ тела белый с рыжеватым

çypparrak ýokundyda ak, böwürleri açyk-goňur. Aýaklary agymtyl-goňur. Ýaş guşlar mese-mälim açyk reňkli, üstki tarapy çypparrak we tutuş aşak ýüzi çyppar ýokundyly. Sesi pert – “çek-çek-çek”. Saýraýşy dürli, beýleki gamyşguşlaryňky ýaly gaty şowhunly däl-de, beýleki guşlaryň seslerine öýkünme has mylaýym. Ganatynyň uzynlygy – 55-61 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: anyk görüňän, ýöne inli däl, agymtyl gaşy bilen gamyş we bag gamyş-guşlaryndan tapawutlanýar. Düzgün boýunça, diňe suw ýakasynda duşýandygy bilen aldawaçlardan we şygşygy guşlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän ýerleri tegmilleýin – “pytraňny”. Günorta-Gündogar Ýewropada, Günbatar Sibiriň günortasynda, Gazagystanda, Orta we Merkezi Aziýada. Türkmenistanda Tejen, Murgap, Garagum derýalarynyň we Amyderýanyň jülgeleri. Hindistanda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtegeleýän guş. Ýazyna aprel-maýda we güýzine – awgust-sentyabrda uçup geçýär. Dürli suw ýataklaryň gamyşly we ösgün otly kenaryakalaryny pesliklerden tä dag eteklerine çenli eýeleýär. Gamyş baldaklarynyň arasynda höwürtege gurýar. Maý-iyunda 4-5 sany goňur meneklije, açyk çalymtyl-ýaşylymytyl ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde köpsanly görnüş.

298. Bag gamyşguşy – *Acrocephalus dumetorum* – Садовая камышевка

Meýdan alamatlary: serçeden sähelçe kiçi. Bedeniniň üstki tarapy **çalymtyl - ýaşylymytyl goňur**

налетом, бока светло-буроватые. Ноги светло-бурые. Молодые птицы заметно ярче и рыжее сверху, весь низ – с рыжеватым налетом. Голос – резкое «чек-чек-чек». Песня разнообразная и не столь трескучая как у других камышевок, более мягкая, с подражаниями голосам других птиц. Длина крыла – 55-61 мм.

Сходства – отличия: от тростниковой и садовой камышевок отличается хорошо заметной светлой, но не широкой бровью. В отличие от пеничек и бормотушек встречается, как правило, только у водоемов.

Распространение: область гнездования пятнистая, места «разбросаны» в Юго-Восточной Европе, на юге Западной Сибири, в Казахстане, Средней и Центральной Азии. В Туркменистане – долины Теджена, Мургаба, Каракумдарьи и Амударьи. Зимует в Индии.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весенний пролет в апреле-мае, осенью – августе-сентябре. Населяет берега различных водоемов, поросшие тростником, высокотравьем, от низин до предгорий. Гнездо между стеблями тростника. Кладка из 4-5 светло-серо-зеленоватых с бурыми пятнышками яиц, в мае-июне. Питается насекомыми.

Статус: обычный, местами даже многочисленный вид.

Полевые признаки: несколько меньше воробья. Верхняя сторона **тела бурая с серо-зеленова-**

öwüşginli, guýrugynyň üsti çyppar ýokundyly has açyk reňkli. Agymtyl gaşy gözünüň yzyna uzaýar. Ganatlary çalymtyl-ýaşylymytyl jäheklenen ýelekli goňur. Guýrugy ganatlaryndan biraz ýagtyrak. Böwürleri açyk-goňur. Bokurdagy agymtyl, döşi we garny açyk reňkli. Aýaklary goňurrak-çal. Ýaş guşlaryň üstki tarapy ulularyna garanyňda, has çypparrak, garny goňurrak. Saýraýşy dürli we çylşyrymly, şowhunly sesleri az, saýraýşy köplenç beýleki guşlardan alnan seslerden durýar we ol pert “çek-çek” sesler bilen gezekleşýär. Şeýle çagyryş sesde, aýratynlykda saýramaklary mümkin. Ganatynyň uzynlygy – 60-67 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: gözünüň yzyna geçýän gaşynyň agymtyldygy, böwürlerinde çyppar ýokundyň ýokdygy bilen gamyşguşdan we bilinde çyppar reňkiň ýokdygy, gaşynyň anyk dældigi bilen hindi gamyşguşdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän ýerleri – Gündogar Ýewropa, Günorta Sibir (Baýkal kölüne çenli), Gazagystan, Orta Aziýanyň günortasy, Alynky, Günorta (Hindistan) Aziýa. Türkmenistanda – Köpetdag we onuň etekleri, diňe bir derýalaryň jülgelelerinde däl-de, hem deňiz kenarynda ýaýraň uçup geçýär. Hindistanda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän we höwürtegeleýän guş. Ýazyna apreliň soňunda we maýda, güýzine – awgustyň aýagynda we sentýabrda uçup geçýär. Daglaryň agaçly-gyrymsyly jülgelelerinde we oazislere saklanýar. Baglardaky, seýilgählerdäki we kenaryaka jeňňelliklerdäki gyrymsylarda gezýär. Adatça, gyrymsy agaçlar-

тым оттенком, надхвостье более светлое с рыжеватым налетом. Светлая бровь заходит за глаз. Крылья бурые с серо-зеленоватыми каймами перьев. Хвост несколько светлее крыльев. Бока светло-бурые. Горло беловатое, грудь и брюхо светлое. Ноги буровато-серые. Молодые сверху более рыжеватые, брюшко бурее, чем у взрослых. Поет разнообразно и сложно, трескучести очень мало, песня часто состоит из заимствований у других птиц и чередуется с резким голосом «чек-чек». Такие же позывки могут звучать отдельно от песни. Длина крыла – 60-67 мм.

Сходства – отличия: от тростниковой камышевки отличается светлой бровью, заходящей за глаз, отсутствием рыжеватого налета на боках; от индийской – отсутствием рыжеватого цвета на поясице и менее выраженной бровью.

Распространение: область гнездования – Восточная Европа, Южная Сибирь (до Байкала), Казахстан, юг Средней, Передняя и Южная (Индостан) Азия. В Туркменистане – Копетдаг и его предгорья, на пролете шире, по долинам рек, Зимуют в Индии.

Образ жизни: пролетная и гнездящаяся птица. Весенний пролет с конца апреля и в мае, осенний – с конца августа и в сентябре. Населяет древесно-кустарниковые заросли в горах, долинах и оазисах, включая города. Держится по кустам и зарослям в садах и парках, прибрежных зарослях. Гнезда обычно в кустарниках. Кладка из 4-6 розоватых с бурыми пятнами яиц, в мае – июне. Питается насе-

da höwürtegeleýär. Maý-iyunda 4-6 sany goňur meneklije, gülgüne ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler bilen ýmitlenýär.

Statusy: adaty, käyerlerde köpsanly.

299. Gamyşguşy – *Acrocephalus scirpaceus* – Тростниковая камышевка

Meýdan alamatlary: serçeden biraz kiçi. Bedeniniň üstki tarapy açyk-goňur. Kellesiniň üsti garamtyl meneksiz we zolaksyz. **Guýrugynyň üsti we ganatlarunyň ýokarsyny ýarýan ýeleklere çyparrak.** Ganatlaryndaky ýeleklere agymtyl uçly we ýaşylymtyl-goňur jähekli. Bokurdagy we garnynyň ortasy agymtyl. Bedeniniň böwürleri çyparrak reňkli. Aýaklary sarymtyl-goňur. Ýaş guşlarynyň üsti çyparrak-goňur. Saýraýşy köplenç halatda bag gamyşguşunyňky ýaly, ýöne owazynda diňe “çek-çek”. Gykylygy pert – “çerr-çerr”. Ganatynyň uzynlygy – 60-74 mm.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: agymtyl gaşynyň gözünüň yzyna ýetmeýändigini, şeýle-de guýrugynyň üstünüň çyparrakdygy bilen hindi we bag gamyşguşlaryndan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän ýerleri – Demirgazyk-Günbatar Afrika, Günbatar, Merkezi we Gündogar Ýewropa, Kawkaz, Kiçi, Alynky we Orta Aziýa (Altaý daglaryna çenli). Orta Aziýada we Türkmenistanda uly derýalaryň jülgelerinde, oazislere we deňiz kenarynda. Afrikada guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän we höwürtegeleýän guş. Ýazna aprel-maýda uçup geçýär. Beýleki gamyşguşlary bilen deňeşdireninde, ol has gizlin gezýär. Derýa jülgeleriniň gamyşly-gyrumysly jeñňeliklerini eýeleýär.

комыми.

Статус: обычный, местами многочисленный вид.

Полевые признаки: несколько меньше воробья. Верхняя сторона тела светло-бурая. Верх головы без темных пестрин и полос. **Надхвосте и верхние кроющие крыла рыжеватые.** Перья крыльев со светлыми концами и зеленовато-бурыми каемками. Горло и середина брюшка светлые. Бока тела рыжеватые. Ноги желтовато-бурые. У молодых верх рыжеватобурый. Песня во многом как у садовой камышевки, но без вставок «чек-чек». Крик – резкое «черр-черр». Длина крыла – 60-74 мм.

Сходства – отличия: от индийской и садовой камышевок отличается тем, что светлая бровь не заходит за глаз, а также рыжеватым надхвостом.

Распространение: область гнездования – Северо-Западная Африка, Западная, Центральная и Южная Европа, Кавказ, Малая, Передняя и Средняя Азия (до Алтая). В Средней Азии и Туркменистане – по долинам крупных рек, в оазисах и морскому побережью. Зимует в Африке.

Образ жизни: пролетная и гнездящаяся птица. Весенний пролет в апреле-мае. По сравнению с другими камышевками более скрытна. Населяет тростниково-кустарниковые заросли речных долин. Гнездо устраивают в густых зарослях. Кладка из 3-6 зеленовато-белых с

Jeñňelligiň gür ýerlerinde höwürtege gurýar. Maý-iyunda 3-6 sany goňur we çal meneklije, ýaşylymtyl-ak ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler bilen ýmitlenýär.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde köpsanly görnüş.

300. Batga gamyşguşy – *Acrocephalus palustris* – Болотная камышевка

Meýdan alamatlary: serçeden biraz kiçi. Bedeniniň üstki tarapy ýaşylymtyl-çal, guýrugynyň üsti agymtyl-goňur. **Ganatlarunyň ýeleklere agymtyl-çypar gaýmaly goňur.** Bokurdagy we döşünüň ortasy agymtyl. Bedeniniň aşaky tarapy çyparrak öwüşginli, böwürleri goňurrak-çypar. Aýaklary agymtyl-sarymtyl-goňur. Ýaşlarynda çypar reňk has köp ösen. Saýraýşy sesli sykylyklaryň, şowhunly sesleriň toplumyndan durýar we beýleki gamyşguşlaryňka garanynda, has owadan. Ol uçup geçýän mahaly ümsüm gezýär. Gykylygy pert we şowhunly “çek-çek-çer”. Ganatynyň uzynlygy – 63-72 mm.

Meñzeşligi-tapawudy: gözünüň töwergindäki insiz agymtyl halkanyň has anykdygy, arkasynyň birmeñzeş öwüşginlidigi we eginleriniň gara meneksiz hem zolaksyzdygy, şeýle-de ganatlaryň goňur ýeleklere agymtyl-çypar jähegiň anykdygy bilen gamyş, bag we hindi gamyşguşlaryndan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän ýerleri – Merkezi we Günorta-Gündogar Ýewropa, Kawkaz, Günbatar we Orta Sibir. Uçup geçişi ýaýraň. Orta Aziýada we Türkmenistanda derýalaryň jülgelerinde we oazislere saklanýar. Afrikanýň merkezi we günorta çäklerinde guşlaýar.

бурыми и серыми пятнами яиц, в мае-июле. Питается насекомыми.

Статус: обычный, местами даже многочисленный вид.

Полевые признаки: несколько меньше воробья. Верх зеленовато-серый, надхвосте светло-бурое. **Перья крыльев бурые со светлорыжими каемками.** Горло и середина брюшка светлые. Низ тела беловатый с рыжеватым оттенком, бока буровато-рыжеватые. Ноги бледно-желтовато-бурые. У молодых птиц значительно развиты рыжие тона. Песня состоит из громких свистов и набора трескучих звуков и более красива, чем у других камышевок. На пролете она более молчалива. Крик – резкое и трескучее «чек-чек-чер». Длина крыла – 63-72 мм.

Сходства – отличия: от тростниковой, садовой и индийской камышевок отличается более четким светлым узким кольцом вокруг глаза, однотонной спиной и плечами без темных пестринок и полос, а также четкими светло-рыжими каемками на бурых перьях крыла.

Распространение: область гнездования – Центральная и Юго-Восточная Европа, Кавказ, Западная и Средняя Сибирь. На пролете шире. В Средней Азии и Туркменистане, в основном, по речным долинам и оазисам. Зимует – в центральных и южных областях Африки.

Образ жизни: пролетная птица. Весенний пролет – апрель-май,

Ýaşayşy: uçup geçýän guş. Ýazyna aprel-maýda, güýzine-sentyabrda we oktýabryň başynda uçup geçýär. Suw ýataklarynyň kenarlaryndaky jeňňelliklerde, daglaryň we derýajyklaryň jülgelerinde we oazislerde saklanýar. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde seýrek duşýan görnüş.

301. Jokjoky sypatly gamyşguşy – *Acrocephalus arundinaceus* – Дроздовидная камышевка

Meýdan alamatlary: sar ululykda. **Bedeniniň üstki tarapy çalymtyl-goňur. Ganatlary we guýrugy goňurrak,** ýelekleri agymtyl jähekli. Gaşynyň üstündäki zolak agymtyl-çypar reňkli. Bedeniniň aşaky tarapy gowşak çypar ýokundyly. Döşi dikligine uzaýan garamtyl menekli. Aýaklary çal. Ýaşlary uly guşlara çalymdaş, ýöne üstki tarapy we garny çypar öwüşginli. Saýraýşy “dlin-dlin-kar-r-ra-kar-ra-beç-beç-wak-wak” we gykylygy pert – “çok-çok”. Ganatynyň uzynlygy – 75-103 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçe-giniň has uludygy bilen beýleki gamyşguşlardan, ganatlarynyň çalymtyl-çypardygy, garnynyň agymtyldygy we gözüniň üstüniň ak zolaklydygy bilen türküstan gamyşguşyndan ta-pawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeýän ýerleri giň. Demirgazyk-Günbatar Afrika, Ýewraziýa, oňa Kiçi, Orta we Merkezi Aziýa hem goşulýar. Türkmenistanda derýalaryň jülgelerinde, kölleriň, howdanlaryň we maýda suw ýataklarynyň gamyşly kenarýakalarynda.

Ýaşayşy: uçup geçýän gornüş. Suw ýataklarynyň we derýalaryň

осенний – сентябрь и начало октября. Придерживается кустарниковых зарослей по берегам водоемов, по горным и речным долинам и оазисам. Питается насекомыми.

Статус: обычный и местами редкий вид.

Полевые признаки: величиной со скворца. **Верхняя сторона серо-коричневая, крылья и хвост бурые со светлыми каймами перьев.** Надбровная полоска бледно-рыжеватая. Низ тела беловатый со слабым рыжеватым налетом. На груди темные продольные пестрины. Ноги серые. Молодые похожи на взрослых, но верх и брюшко с рыжеватым оттенком. Песня – «длин-длин-кар-р-ра-кар-ра-беч-беч-вак-вак», и крик – резкое «чок-чок». Длина крыла – 75-103 мм.

Сходства – отличия: от других камышевок отличается заметно большим размером, а от туркестанской камышевки серовато-рыжими крыльями, светлым брюхом и белой полоской над глазом.

Распространение: область гнездования широкая – Северо-Западная Африка, Евразия, включая Малую, Среднюю и Центральную Азию. В Туркменистане – по речным долинам, берегам озер, водохранилищ и мелких водоемов с тростниковыми зарослями.

Образ жизни: пролетный вид. Населяет заросли тростников по берегам водоемов и рек. Держится

gamyş jeňňelli kenarlaryny eýeleýär. Ýylgynlyk we gamyşlyk ýerlerde gizlenip gezipär. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: uçup geçende adaty görnüş.

302. Türküstan gamyşguşy – *Acrocephalus stentoreus* – Туркестанская камышевка

Meýdan alamatlary: serçeden has uly. **Bedeniniň üstki tarapy we guýrugy çalymtyl - ýaşlymtyl - goňur.** Ganatlarynyň ýelekleri agymtyl jähekli. Çünki bilen gözüniň aralygy agymtyl zolakly. Aýaklary goýy çal reňkli. Ýaşlary uly guşlara meňzeş, ýöne böwürleri çypar ýokundyly. Saýraýşy köplenç jokjoky sesli gamyşguşyna çalymdaş, Gykylygy pert – “çek-çek”. Ganatynyň uzynlygy – 78-95 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: arkasynyň reňkiniň çalymtyl - ýaşlymtyl - goňurdygy, ak gaşynyň ýokdygy we ölçe-giniň sähelçe maýdadygy bilen jokjoky sypatly gamyşguşyndan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Alynky we Orta Aziýa, Gazagystan, gündogara Gimalaý daglaryna çenli, Aziýanyň günorta bölegi. Orta Aziýanyň hemme ýerlerinde, Türkmenistanda gamyş jeňňelli derýalaryň jülgelerinde.

Ýaşayşy: uçup geçýän we höwürtegeýän guş. Ýazyna aprelden maý, güýzine – awgustdan oktýabr aralygynda uçup gezipär. Adatça gamyşly jeňňelliklerde gizlenip gezipär. Gamyşlaryň baldagynda höwürtege gurýar. Maý-iyulda 3-5 sany goňur meneklije, ýaşlymtyl-ak ýumurtgalary goýýar, ölçe-gleri - 15.4-16.0 x 21.0-22.0 mm. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

скрытно в гребенщиках и тростниках. Питается насекомыми.

Статус: обычный на пролете вид.

Полевые признаки: величиной больше воробья. **Верхняя сторона и хвост серо-зеленовато-бурые.** Перья крыльев со светлыми каймами. Светлая отметина между клювом и глазом. Ноги темно-серые. Молодые птицы похожи на взрослых, но на боках рыжеватый налет. Песня во многом схожа с дроздовидной камышевкой. Крик – резкое «чек-чек». Длина крыла – 78-95 мм.

Сходства – отличия: от дроздовидной камышевки отличается чуть меньшим размером, серо-зеленовато-бурой окраской спины и отсутствием белой брови.

Распространение: Передняя и Средняя Азия, Казахстан, на восток – до Гималаев, южная часть Азии. В Средней Азии повсеместно, в Туркменистане – по крупным и мелким речным долинам с зарослями тростника.

Образ жизни: пролетная и гнездящаяся птица. Весенний пролет с апреля по май, осенний – с августа по октябрь. Держатся, обычно, скрытно в зарослях тростников. Гнездо на стеблях тростника. Кладка из 3-5 зеленовато-белых с бурыми крапинками яиц, в мае - июле. Размеры – 15.4-16.0 x 21.0-22.0 мм. Питается насекомыми.

Statusy: adaty, höwürtegeleýän döwüründe käbir ýerlerde köpsanly görnüş.

303. Çekçeki – *Hippolais caligata* – Северная, или малая бормотушка

Meýdan alamatlary: serçeden kiçi ölçegli. **Bedeniniň üstki tarapy çalymtyl-goňur, ganatlary we guýrugy biraz garamtyl.** Gözüniň üstündäki gaşy agymtyl, sarymtyl -ak. Bedeniniň aşagy agymtyl, döşi we böwürleri goňur öwüşginli. **Çünki goýu goňur.** Aýaklary goňurak-sarymtyl. Ýaş guşlaryň arka tarapy çupar öwüşginli, garny – çupar-sarymtyl ýokundyly. Böwürleri goňurak. Gykylygy pert – “çrek-çrek”. Ganatynyň uzynlygy – 55-64.5 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçeginiň sähelçe uludygy we arkasynyň çalymtyl-goňur reňkilidigi bilen kiçi çekçekiden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeleýän bölegi Ýewropanyň gündogar çäkleri we Günbatar Sibiriň günortasyny öz içine alýar. Orta Aziýada – düzlük we dagetek giňişlikleri. Türkmenistanda – demirgazyk we gündogar etraplar. Päkistanda, Hindistanda we Seylonda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän guş. Ýazyna aprelden maý, güýzine – awgustdan oktýabr aralygynda uçup geçýär. Ýylgynlyk, sazakyk ýerleri eýeleýär. Gyrymsylaryň şahalarynyň arasynda gizlenip gezyär. Höwürtesini gyrymsyda gurýar. Aprel-maý aýlarynda 4-6 sany gyzylymtyl-goňur menekli, gülgüne ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 12.2-13.3 x 14.7-16.4 mm. Mör-möjekler, olaryň liçinkalary we möýler bilen iýmitleýär.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde köpsanly görnüş.

Статус: обычный, местами на гнездовые многочисленный вид.

Полевые признаки: размером меньше воробья. **Верх тела серовато-буроватый, крылья и хвост несколько темнее.** Над глазом светлая, сливочно-белая бровь. Низ тела беловатый, грудь и бока с буроватым оттенком. **Клюв темно-бурый.** Ноги буровато-желтоватые. У молодых птиц спинная сторона с рыжим оттенком, брюшная – с рыжеватого-желтоватым налетом. Бока буроватые. Крик – резкое «чрэк-чрэк». Длина крыла – 55-64.5 мм.

Сходства – отличия: от южной бормотушки отличается чуть большим размером и серовато-бурой окраской спины.

Распространение: гнездовая часть ареала охватывает восточные области Европы и южные районы Западной Сибири. В Средней Азии – равнины и предгорья. В Туркменистане – северные и восточные районы. Зимуют в Пакистане, Индии и на Цейлоне.

Образ жизни: пролетная птица. Весенний пролет с апреля по май, осенний – с августа по октябрь. Населяет гребенщикообразные заросли, саксаульники. Держится скрытно в кронах кустарников. Гнездо на кустах. Кладка из 4-6 розоватых с красно-коричневыми пятнами яиц, в апреле-мае. Размеры – 12.2-13.3 x 14.7-16.4 мм. Питается насекомыми и их личинками, пауками.

Статус: обычный, местами многочисленный вид.

304. Kiçi çekçeki – *Hippolais rama* – Южная бормотушка

Meýdan alamatlary: serçeden has maýda. **Bedeniniň üstki tarapy birmeňzeş aýyk - goňur.** Gaşy edil çekçekiniňki ýaly melemtil-sarymtylak, ýagty. Bokurdagy we garny agymtyl, döşi we böwürleri goňurak öwüşginli. Çünki goňurak. Aýaklary goňurak-sarymtyl. Ýaş guşlaryň arka tarapy çupar öwüşginli, garny – çupar-sarymtyl ýokundyly. Sesi pert – “çrek-çrek”. Ganatynyň uzynlygy – 55-64.5 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçeginiň sähelçe maýdadygy we **arkasynyň birmeňzeş aýyk-goňur reňklidigi bilen çekçekiden tapawutlanýar.**

Ýaýran ýerleri: Gazagystanda we Orta Aziýada, şeýle-de Türkmenistanda höwürtegeleýär. Hindistanda, Päkistanda we Arabystanyň günortagünbatarynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtegeleýän guş. Ýazyna aprel-maýda, güýzine – awgust-oktýabrda uçup geçýär. Deryalaryň jülgelerini we oaziseri, miweli we saýaly baglary, seýilgähleri eýeleýär. Jeňnelliklerde gizlenip gezyär. Gyrymsylarda höwürtegeleýär. 4-6 sany gyzylymtyl-goňur meneklije, gülgüne ýumurtgalary goýýar. Mör - möjekler bilen iýmitleýär.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde örän köpsanly görnüş.

Полевые признаки: значительно меньше воробья. **Верхняя сторона тела однотонно светло-буроватая.** Над глазом светлая, сливочно-белая бровь, как у северной бормотушки. Горло и брюшко беловатые, грудь и бока тела с буроватым оттенком. Клюв буроватый. Ноги буровато-желтоватые. У молодых птиц спинная сторона с рыжим оттенком, брюшная – с рыжеватого-желтоватым налетом. Голос – резкое «чрэк-чрэк». Длина крыла – 55-64.5 мм.

Сходства – отличия: от северной бормотушки отличается чуть меньшим размером и **светло-бурой однотонной окраской спины.**

Распространение: гнездятся в Казахстане и Средней Азии, включая Туркменистан. Зимуют в Индии, Пакистане и на юго-западе Аравии.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица. Весенний пролет с апреля по май, осенний – с августа по октябрь. Населяет речные долины и оазисы, сады и парки. Держится скрытно в зарослях. Гнезда в кустах. Кладка из 4-6 розоватых с красно-коричневыми пятнами яиц. Питается насекомыми.

Статус: обычный, местами очень многочисленный вид.

305. Ýaşyl şygşygy – *Hippolais icterina* – Зеленая пересмешка

Meýdan alamatlary: serçeden kiçi ölçegli. **Bedeniniň üstki tarapy we kellesi çalymtyl-ýaşylymtyl.**

Полевые признаки: размером меньше воробья. **Верхняя сторона тела и головы серовато-зелено-**

Ganatlary goňur, ýelekleri çalymytyl-ýaşylymytyl jähekli, guýrugy insiz agymtyl jähekli çalymytyl-goňur. **Gaşy ýaşylymytyl-sary reňkli.** Aşak tarapy, bokurdagy, döşi we garny açyk ýaşylymytyl-sary. Aýaklary goýu goňur. Ýaş guşlaryň arkasy ýaşylymytyl-çal, garny-agymtyl-sarymytyl. Sesi batly – “wet-wet-wet”, hüşgär wagty – “tse-tse-dedewin”.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: alda-waçlara çalymdaş, yöne ölçegleriniň has uludygy bilen olardan tapawutlanýar; reňkiniň ýaşylymytyl we sarymytyl öwüşgini bilen çekçekilerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeleýän bölegi Ýewropanyň merkezi we gündogar çäklerini, Ural daglarynyň we Günbatar Sibiriň günorta böleklerini öz içine alýar, Eýranyň demirgazygynda gatysyk tokaýlarda we Orta Aziýanyň günortasynda; uçup geçende, Türkmenistanda duşýar. Afrikada gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän görnüş. Ýazyna aprel-maýda, güýzine – awgust-sentyabrda uçup geçýär. Uly derýalaryň agaçly we gyrymsyly jeňňelliklerinde, miweli we saýaly baglarda, seýilgählerde mekan tutýar. Agaçlaryň şahalarynyň arasynda gezýär. Mör-möjekler we möýler bilen iýmitleňýär.

Statusy: amatly şertli ýerlerde adaty görnüş.

306. Solgun şygşygy – *Hippolais pallida* – Бледная пересмешка

Meýdan alamatlary: serçeden maýda. Arka tarapy açyk çalymytyl-goňur. **Gaşy çyparrak-agymtyl. Ganatlary we guýrugy goňurak reňkli.** Bedeniniň aşagy kirliräk-ak, böwürleri çyparrak ýokundyly.

ватые. Крылья бурые с серовато-зеленоватыми каемками перьев, а хвост серовато-бурый со светлыми узкими каемками. **Над глазом зеленовато-желтая бровь.** Нижняя сторона – горло, грудь и брюшко светло-зеленовато-желтые. Ноги темно-бурые. У молодых спина зеленовато-серая, а брюшко – беловато-желтоватое. Голос – обычно громкое «вет-вет-вет», при настроженности – «тце-тце-дедевин».

Сходства – отличия: похожа на пеночек, но от них отличается более крупными размерами, от бормотушек – зеленоватыми и желтоватыми тонами окраски.

Распространение: гнездовая часть ареала охватывает центральные и восточные области Европы, южные районы Урала и Западной Сибири, изолированно – в смешанных лесах на севере Ирана и юге Средней Азии, в Туркменистане на пролете. Зимуют в Африке.

Образ жизни: пролетный вид. Весенний пролет с апреля по май, и осенний – с августа по сентябрь. Населяет древесные насаждения и кустарниковые заросли крупных рек, садов и парков. Держатся в кронах деревьев. Питается насекомыми и пауками.

Statusy: в подходящих местобитаниях обычный вид.

Полевые признаки: размером меньше воробья. Спинная сторона светло-серовато-бурая. **Бровь рыжевато-беловатая. Крылья и хвост буроватые.** Низ тела грязно-беловатый с рыжеватым налетом

Çüňküniň düýbi ýaşyl, goňur reňkli. Aýaklary çal. Ýaş guşlaryň bedeninde sarymytyl öwüşgin agdyklyk edýär. Saýraýşy şowhunly birmeňzeş sesleriň toplumu. Çagyryş sesi pert – “çek-çek”. Ganaty – 64-69 mm, agramy – 10-11 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçeginiň kiçidigi we bedeniniň reňkiniň birmeňzeş agymtyldygy bilen uly şygşygydan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän ýerleri üzňe – Günbatar Ýewropanyň gunorta taraplary, Günorta-Günbatar Aziýa, Orta Aziýa we Türkmenistan hem goşulanda, Demirgazyk Afrika. Afrikada, Arabystanda we Päkistanyň günort-günbatar böleginde gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän we höwürtegeleýän guş. Aprel-maýda uçup geçýär, sentýabr-oktyabrda uçup gidýär. Derýalaryň jülgelerinde gyrymsyly jeňňellikleri, miweli we saýaly baglyklary, seýilgähleri, dag eňňitlerini eýeleýär, çöllüklerden hem gaçadyrmaýar. Gyrymsy agaçlarda höwürte gurýar. 4-5 sany çalymyl we gyzyly meneklije, agymtyl-gülgüne ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 11.8-13.3 x 15.7-17.3 mm. Mör-möjekler we beýleki maýda oňurgasyzlar bilen iýmitleňýär.

Statusy: adaty, bizde doly öwrenilmedik diýen ýaly.

307. Uly şygşygy – *Hippolais languida* – Большая бормотушка

Meýdan alamatlary: serçe ölçeginde. **Bedeniniň arka tarapy melemtil - agymtyl - çal, kellesi-niň we boýnunyň gapdallary** ganatlary we guýrugy çalymytyl-goňur, ýelekleri agymtyl jähekli. **Guýrugunyň gapdal ýelekleriniň uçlary inli ak**

на боках. Основание клюва широкое, бурой окраски. Ноги серые. У молодых птиц на теле преобладает желтый оттенок. Песня – набор однообразных трескучих звуков. Позывка – резкое «чек-чек». Крыло – 64-69 мм, вес – 10-11 г.

Сходства – отличия: от большой бормотушки отличается меньшим размером и бледной однотонной окраской тела.

Распространение: область гнездования разобцена – южные районы Западной Европы, обширный регион Юго-Западной Азии, включая Среднюю Азию и Туркменистан, Северная Африка. Зимует в Африке, Аравии и в юго-западных районах Пакистана.

Образ жизни: пролетная и гнездящаяся птица. Пролет – в апреле-мае, отлет – в сентябре-октябре. Населяет кустарниковые заросли речных долин, в садах и парках, на горных склонах, не избегает пустынь. Гнездо устраивает на кусте. Кладка из 4-5 беловато-розоватых с серыми и красными пятнышками яиц. Размеры 11.8-13.3 x 15.7-17.3 мм. Питается насекомыми и другими мелкими беспозвоночными.

Statusy: обычная, у нас мало изученная птица.

Полевые признаки: размером с воробья. **Верхняя сторона тела песочно-серая, бока головы и шеи серовато-бурые.** Крылья и хвост серовато-бурые со светлыми каймами перьев. **Боковые хвостовые перья с широкими белыми**

jähekli. Gaş üsti zolagy agymtyl we gysga. Aşaky tarapy ak, döşi goňşak goňurak-çupar öwüşginli. Bedeniniň böwürleri, Çünki goňurak, aýaklary goňur reňkli. Ýaş guşlaryň arka tarapy çuparrak-çal, garny-çuparrak - ak. Saýraýşy birmeňzeş gaýtalanma –“tirwu-li-piwi”, aglaba, beýleki guşlaryň seslerine öýkünmeler. Çagyryş sesi – pessajya. Ganaty – 72.4-78.0 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň has uludygy bilen beýleki ygşygylardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Alynky we Orta Aziýada höwürtgeleýär. Türkmenistanda düzlük ýerlerde, şol sanda, uly derýalaryň jülgelerinde. Gündogar Afrikada we Arabystanyň günortasynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän we höwürtgeleýän guş. Apreliň ikinji ýarymynda, güýzine – awgust-sentyabrda uçup geçýär. Sazaklyk, ýylgynlyk ýerlerde, ýek-tük pisse tokaýlarynda mekan tutýar. Ýekelikde ýa-da jübüt bolup, agaçlaryň we gyrymsylaryň üstünde gezýär. Gyrymsylarda ýa-da agaçlaryň üstünde höwürtge gurýar. Maý-iyunda 3-5 sany çalymtyl we garamtyl meneklije, gülgüne ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 12.8-14.0 x 17.3-18.9 mm. Mör - möjekler, olaryň ýumurtgalary we liçinkalary bilen ýymitlenýär.

Statusy: amatly şertli ýerlerde adaty görnüş.

308. Gyrgypisintli çürlentgi – *Sylvia nisoria* – Ястребиная славка

Meýdan alamatlary: serçe-den sähelçe kiçi. **Bedeniniň üsti külreňk-çal. Ganatlary we guýrugy goňurak-çal, ýelekleriniň uç-**

каемками на концах. Надбровные полоски беловатые, короткие. Низ белый со слабым буровато-рыжеватым оттенком на груди. Бока тела буроватые. Клюв буроватый, ноги бурые. У молодых спинная сторона рыжевато-серая, а брюшная – рыжевато-беловатая. Песня – однообразное повторение «тирвули-пиви», часто подражает голосам других птиц. Позывка – негромкое потрескивание. Крыло – 72.4-78 мм.

Сходства – отличия: от других бормотушек отличается более крупными размерами.

Распространение: гнездится в Передней и Средней Азии. В Туркменистане – равнинные районы, включая долины крупных рек. Зимует в Восточной Африке и на юге Аравии.

Образ жизни: пролетная и гнездящаяся птица. Пролет во второй половине апреля, осенью – в августе-сентябре. Населяет саксаульники, гребенщиковые заросли, частично фисташковые рощи. Держится в одиночку или парами в кронах деревьев и кустарников. Гнездо устраивает на кусте или дереве. Кладка из 3-5 розоватых с серыми и черноватыми пятнышками яиц, в мае-июне, размеры – 12.8-14 x 17.3-18.9 мм. Питается насекомыми, их яйцами и личинками.

Статус: в подходящих местобитаниях обычный вид.

Полевые признаки: несколько меньше воробья. **Верхняя сторона пепельно-серая. Крылья и хвост буровато-серые, на концах с бе-**

lary ak gaýmaly. Aşaky tarapy ak, ýelekleriniň agymtyl we garamtyl uçlaryndan emele gelen kese nagyşly. Mäkiýanlary we ýaş guşlar açyk reňkli – çalymtyl-goňur, diňe bedeniniň böwürleri çalymtyl kese nagyşly. Gözleri sary. Aýaklary çalymtyl-ak. Ýekelikde agaçlaryň ýa-da gür şahalan gyrymsylaryň üstünde gezýär. Saýraýşy sesli sykylyklaryň toplumu. Gykylygy pert – “çek-çek”. Ganaty – 80-90 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: bedeniniň aşaky tarapynyň kese-aladygy bilen beýleki çürlentgilerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtgeleýän ýerleri – Günbatar Ýewropa, Eýran, Owganystan, Günbatar Hy-taý we Mongoliýa, Orta Aziýa we Gazagystanyň günortasy. Türkmenistanda uçup geçende daglyk, şeýlede düzlüklere, jülgelere we oazislere çekilýär. Arabystanyň we Afrikanyň gündogar taraplarynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän görnüş, ýazyna aprelde, güýzine – awgust we sentýabrda uçup geçýär. Migrasiýa döwründe çöllükleriň, derýalaryň jülgeleriniň, dag eteginiň gyrymsylyklarynda saklanýar. Mör-möjekler, seýrek ösümlikleriň tohumlary we miweleri bilen ýymitlenýär.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde adaty guş.

309. Saýrak çürlentgi – *Sylvia hortensis* – Певчая славка

Meýdan alamatlary: serçe ululykda. Horazynyň üstki tarapy külreňk-çal, “telpejigi” we kellesiniň gapdal-lary tutuk gara. Ganatlary çalymtyl-garamtyl, ýelekleri agymtyl jähekli. Guýrugynyň ortasyndaky ýelekleri garamtyl, gyralaryndaky – ak. Aşaky

лыми каемками перьев. Низ белый с поперечным рисунком, образованным светлыми и темными концами перьев. Самки и молодые птицы светлее – серовато-бурые, поперечный серый рисунок только на боках тела. **Глаза желтые.** Ноги серовато-белые. Держится в одиночку в кронах деревьев или в густой части кустарников. Песня – набор громких свистов. Крик – резкое «чек-чек». Крыло – 80-90 мм.

Сходства – отличия: от других славков отличается поперечно-полосатой нижней стороной тела.

Распространение: область гнездования – Западная Европа, Иран, Афганистан, Западный Китай и Монголия, Средняя Азия и юг Казахстана. В Туркменистане на пролете как в горах, так и на равнинах, тяготеет к долинам и оазисам. Зимуют в Аравии и восточных районах Африки.

Образ жизни: пролетный вид, весенний пролет в апреле, осенний – августе и сентябре. В период миграции в пустынях придерживается кустарниковых зарослей в речных долинах, предгорьях. Питается, в основном, насекомыми, редко поедает семена и плоды.

Статус: немногочисленная, местами обычная птица.

Полевые признаки: размером с воробья. Клюв крупный. У самца верхняя сторона пепельно-серая, “шапочка” и бока головы **матово-черные.** Крылья серо-черноватые со светлыми каемками перьев. Средние перья на хвосте черно-

tarapy agymtyl. Döşi we böwürleri ýeňiljek çyparrak ýokundyly çalymtyl. Mäkiýanynyň bedeniniň üstki tarapy kellesiniň reňki bilen birmeňzeş. Ýaşlary mäkiýan guşlara meňzeş, ýöne olaryň üstki tarapy goňurak, guýrugy çalymtylrak. Ýaşı ýeten guşlaryň gözleri agymtyl, ýaşlaryňky garamtyl. Aýaklary garamtylrak. Saýraýşy sazlaşykly sykylyklaryň toplумы. Çagyryş sesi pert – “çer-çer”. Ganaty – 75-84 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: kellesiniň gapdallarynyň garadygy we guýrugyndaky ak zolaklary, şeýle-de ölçeginiň mese-mälim uludygy bilen beýleki çürlentgilerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi Günorta Ýewropany, Ortaýer deňzini, Zakawkaziýany, Alynky Aziýany we Orta Aziýanyň günorta çäklerini, şol sanda Türkmenistanda Köpetdagy, Bathzyň daglyk bölegini, Köýtendagy öz içine alýar. Merkezi Afrikada, Arabystanda we Hindistanda guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän we höwürtleýän guş. Ýazyna aprel-maýda, güýzine – sentýabr-oktyabrda uçup geçýär. Daglardaky deryalaryň we dereleriň gyrymsyly ýerlerini eýeleýär. Agaçlaryň we gyrymsylaryň üstinde örän çakganlyk bilen geçýär. Gyrymsylarda höwürtleýän gurýar. 4-6 sany çalymtyl meneklije, ýaşylymtyl-ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 14.6-16.7 x 19.1-23.4 mm. Mör-möjekler we olaryň liçinkalary bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde adaty guş.

310. Owazçy çürlentgi – *Sylvia curruca* – Славка-завирушка

Meýdan alamatlary: serçeden biraz maýda ölçegli. **Bedeniniň üstki**

ватые, а крайние – белые. Низ светлый. Грудь и бока сероватые с легким рыжеватым налетом. У самки цвет головы одинаков с цветом верха тела. Молодые похожи на самок, но верх у них бурее, хвост серее. Глаза у взрослых светлые, у молодых – темные. Ноги черноватые. Песня – набор звучных свистов. Позывка – резкое «чер-чер». Крыло – 75-84 мм.

Сходства – отличия: от других славков отличается черными боками головы и белыми полосками на хвосте, а также заметно крупным размером.

Распространение: гнездовая часть ареала охватывает Южную Европу, Средиземноморье, Закавказье, Переднюю и южные районы Средней Азии, в том числе Туркменистан, где обитает в горах Балханы, Копетдаг, горной части Бадхыза, Койтендаге. Зимует в Центральной Африке, Аравии и Индостане.

Образ жизни: пролетная и гнездящаяся птица. Весенний пролет в апреле-мае, осенний – сентябрь-октябре. Населяет кустарниковые заросли горных речек и ущелий. Держится на деревьях и кустах, подвижная птичка. Гнездо помещается на кусте. Кладка из 4-6 зеленовато-белых с серыми пятнами яиц, размеры – 14.6-16.7 x 19.1-23.4 мм. Питается насекомыми и их личинками.

Статус: немногочисленная, местами обычная птица.

Полевые признаки: размером несколько мельче воробья. **Верх-**

tarapy çalymtyl-goňur, ýöne kellesi açyk çal, gulaklarynyň töweregi goýy çal. Bokurdagy ak. Aşak tarapy agymtyl, böwürleri agymtyl-goňur. Aýaklary goýy çal. Mäkiýanlary horazlaryna meňzeş, ýöne garyn tarapy has çalymtyl. Saýraýşy jikgildileriň toplумы – “kle-kle-kle-kle”. Çagyryş sesi pert – “çek-çek”. Ganaty – 58-69 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çal çürlentgä çalymdaş, ýöne guýrugynyň has gysgadygy, ölçegleriniň maýdadygy, aýaklarynyň garamtyldygy we ganatlarynda çupar reňkiň ýokdygy bilen ondan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi Günbatar we Gündogar Ýewropa, Kiçi, Alynky, Ortaky we Merkezi Aziýa, Gazagystan we Sibir (onuň demirgazyk welaýatларыndan başgalarynda). Orta Aziýada we Türkmenistanda daglyk ýerlerde ýaýran, ýöne aglaba düzlüklerde duşýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtleýän, günortada ýek-täk guşlaýan görnüş. Ýazyna martyň soňunda, güýzine – awgustyň ortasynda uçup geçýär. Deryalaryň jülgelerindäki, suw ýataklarynyň ýakalaryndaky sazakylyk, ýylgynlyk tokaýlarda ýaşayar. Gyrymsylaryň ýa-da agaçlaryň şahalarynyň arasynda çakganlyk bilen geçýär. Gyrymsylarda höwürtleýän gurýar. Maý-ijunda 4-6 sany garamtyl meneklije, çalymtyl-ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 11.4-12.8 x 14.9-27 mm. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty guş.

311. Çal çürlentgi – *Sylvia communis* – Серая славка

Meýdan alamatlary: serçeden sähelçe kiçi. Horazynyň **arkasy,**

няя сторона серовато-бурая, но голова светло-серая, а область уха – темно-серая. Горло белое. Низ беловатый, бока бледно-буроватые. Ноги темно-серые. Самка сходна с самцом, но нижняя сторона более серая. Песня – набор щебетаний, вроде «кле-кле-кле-кле». Позывка – резкое «чек-чек». Крыло – 58-69 мм.

Сходства – отличия: похожа на серую славку, но отличается более коротким хвостом, мелкими размерами, темными ногами и отсутствием рыжего цвета на крыльях.

Распространение: гнездовая часть ареала – Западная и Восточная Европа, Малая, Передняя, Средняя и Центральная Азия, Казахстан и Сибирь (кроме северных ее областей). В Средней Азии и Туркменистане широко, в горах, но больше на равнинах. Зимует в Индии, Центральной и Восточной Африке.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся вид, некоторые особи зимуют не юге страны. Весенний пролет с конца марта, осенний – с середины августа. Населяет кустарниковые саксауловые заросли, гребенщики по речным долинам и водоемам. Подвижная птица, держится в кустарниках или кронах деревьев. Гнездо строит на кусте. Кладка из 4-6 серовато-белых с темными пятнами яиц, в мае – июне. Размеры яиц – 11.4-12.8 x 14.9-17 мм. Питается насекомыми.

Статус: обычная птица.

Полевые признаки: размером чуть мельче воробья. У самца **спи-**

eginleri we guýrugy goýy goňur, kellesiniň üsti we gapdallary agymtyl-çal. Ganatlary çupar, ýelekleriniň ortasy garamtyl. Ganat ýelekleriniň jähekleri çupar we inli. Aşaky tarapy agymtyl, döşi we böwürleri gowşak gülgüne-çuparrak öwüşginli. Aýaklary goňurrak. Mäkiýanlary horazlaryna meňzeş, ýöne üstki tarapy tutuşlaýyn birmeňzeş goňur. Ýaş guşlaryň üstki tarapy çuparrak-goňur. Saýraýşy jikgildileriň toplумы, “tirliýewitýurli-çet-çet-titirli”. Çagyryş sesi batly – “çek-çek”. Ganaty – 65-78 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: goňurrak-çupar ganatlary bilen owazçy çürlentgiden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeleýän bölegi Ýewropany, demirgazyk oblastlaryndan başgalaryny, Kiçi, Alynky we Orta Aziýany, Gazagystany, Günbatar we Orta Sibiri öz içine alýar. Orta Aziýada we Türkmenistanda – düzlüklerde we daglarda giňişleýin gabat gelyär.

Ýaşaýşy: uçup geçýän we höwürtlegeleýän görnüş. Ýazyna apreliň ortasyndan, güýzine – awgystyň ortasyndan sentýabrda uçup geçýär. Gyrymsylaryň güripugdaklarynyň arasynda gezýär. Uçup geçende derýalaryň jülgelerine, dag eteklerine we derelerine çekilýär. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty guş

312. Bag çürlentgisi – *Sylvia borin* – Садовая славка

Meýdan alamatlary: serçeden biraz kiçi ölçegli. **Бедениниň üstki tarapy, ganatlary we guýrugy ýaşylymyl-çal öwüşginli çалымтыл-goňur.** Ganatlaryndaky ýelekleriniň uçлары agymtyl insiz jähekli. **Boýnunyň**

на, плечи и хвост темно-бурые, голова сверху и по бокам бледно-серая. Крылья рыжие с темными центрами перьев. Окаймления перьев крыла рыжие и широкие. Низ беловатый, на груди и боках слабый розовато-рыжеватый оттенок. Ноги буроватые. Самки сходны с самцами, но весь верх однотонно бурый. У молодых птиц верхняя сторона рыжегато-бурая. Песня – набор щebetаний, слышится как «тирлие-витюрли-чет-чет-титирли». Позывка – громкое «чек-чек». Крыло – 65-78 mm.

Сходства – отличия: от славки-завирушки отличается буро-рыжими крыльями.

Распространение: гнездовая часть ареала охватывает Европу, кроме северных областей, Малую, Переднюю и Среднюю Азию, Казахстан, Западную и Среднюю Сибирь. В Средней Азии и Туркменистане встречается широко – на равнинах и в горах.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся вид. Весенний пролет с середины апреля, осенний – с середины августа по сентябрь. Держится в гуще кустов. На пролете тяготеет к долинам рек, предгорьям и горным ущельям, на гнездовье – в горах. Питается насекомыми.

Status: обычная птица.

Полевые признаки: размер несколько мельче воробья. **Верхняя сторона тела, крылья и хвост серовато-бурые с зеленовато-серым оттенком.** Перья крыльев с узкими светлыми каймами на кон-

gapdallary külrek-çal tegmilli. Aşaky tarapy çалымтыл-ак, döşi we böwürleri çалымтыл-çupar ýokundyly. Aýaklary çал, çünki goýy goňur. Mäkiýanlary horazlaryna meňzeş, ýöne ачык reňkli. Ýaşlary uly guşlary ýatladýar, ýöne olaryň böwürleri çuparrak. Saýraýşy jyrlydama sesleriň toplумы. Gykylygy pert – “çek-çek”. Ganatynyň uzynlygy – 75-85 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: birmeňzeş çалымтыл - goňur reňki we boýnydaky külreňk-çal tegmilleri bilen beýleki çürlentgilerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeleýän bölegi Ýewropany we Aziýany öz içine alýar. Orta Aziýada we Türkmenistanda dürli landşaftlarda gabat gelyär. Afrikanyň günorta böleginde gyşlaýr.

Ýaşaýşy: uçup geçýän görnüş. Ýazyna aprelda, güýzine – awgystyň soňunda we sentýabrda uçup geçýär. Düzlükleriň, daglyklaryň we oazislerniň gyrymsy tokaýlarynda saklanýar. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek, bizde gowşak öwrenilen guş.

313. Garabaşly çürlentgi – *Sylvia atricapilla* – Черноголовая славка

Meýdan alamatlary: serçeden biraz kiçi ölçegli. Bedeniniň üstki tarapy we ganatlary goýy ýaşylymyl-çal. **Maňlaýy we depesi gara (“telpejik”), ýeňsesi we boýny külrek-çal.** Ganatlary we guýrugy goňur. Aşaky tarapy külreňk-çal, bokurdagy we garny agymtyl. Aýaklary çал, çünki goýy çал. **Mäkiýan guşuň “telpejigi” çupar reňkli.** Ýaşlary mäkiýanlaryna çалымдаş, ýöne “telpejigi” has çupar. Saýraýşy tüýdiginiň sygyrma sesleriniň toplумы. Gykylygy pert – “çek-çek”.

цах. **По бокам шеи пепельно-серые пятна.** Низ серовато-белый, на груди и боках серовато-рыжеватый налет. Ноги серые, **клюв темно-бурый.** Самки похожи на самцов, но светлее. Молодые птицы напоминают взрослых, но с рыжеватыми боками. Песня – набор журчащих трелей. Крик – резкое «чек-чек». Длина крыла – 75-85 мм.

Сходства – отличия: от других славок отличается однотонной серовато-бурой окраской и пепельно-серыми пятнами на шее.

Распространение: гнездовая часть ареала охватывает Европу и Азию. В Средней Азии и Туркменистане встречается в различных ландшафтах. Зимует в южной половине Африки.

Образ жизни: пролетный вид. Весенний пролет в апреле, осенний – с конца августа и в сентябре. Придерживаются зарослей кустарников на равнинах, в горах и оазисах. Питаются насекомыми.

Status: редкая, слабо изученная у нас птица.

Полевые признаки: размером несколько мельче воробья. Верхняя сторона и крылья темно-зеленовато-серые. **Лоб и темя черное («шапочка»), затылок и шея пепельно-серые.** Крылья и хвост бурые. Низ пепельно-серый, горло и брюшко светлее. Ноги серые, клюв темно-серый. **У самки “шапочка” рыжеватая.** Молодые похожи на самку, но шапочка более рыжая. Песня – набор звучных флейтовых свистов. Крик – резкое «чек-чек”.

Ganatynyň uzynlygy – 70-76 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: “tel-pejiginiň” garadygy we kellesiniň gapdallarynyň çaldygy bilen saýrak çürlentgiden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropadan Günorta - Gündoogar Aziýada çenli. Orta Aziýada we Türkmenistanda dürli landşaftlarda gabat gelýär.

Ýaşayşy: uçup geçýän guş. Ýazyna aprelda – maýyň başynda, güýzine – awgustyň aýagyndan-sentyabrda uçup geçýär. Dag eteklerinde, agaçly we gyrymsyly dag derelerinde we oazislerde gabat gelýär. Gyrymsylaryň we agaçlaryň pudaklarynyň arasynda gezýär. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek, bizde gowşak öwrenilen guş.

314. Dag çürlentgisi – *Sylvia althaea* – Горная славка

Meýdan alamatlary: serçeden biraz kiçi ölçegli. **Бедениниň üstki tarapy we kellesi** ýeňiljek goňur öwüşginli **goýy çal**. Ganatlary çalymtyl-goňur, ýelekleri agymtyl jähekli. **Guýrugynyň çetki ýelekleri ak**. Aşaky tarapy ak, böwürleri goňurrak-çal ýokundyly. Aýaklary goýy çal. Mäkiýany horazlaryna çalymdaş, yöne birneme ачык reňkli. Ýaşlary uly guşlary ýatladýar, yöne goňurrak. Saýraýşy jyrýldama sesleriň toplumu. Gykylygy pert – “çek-çek”. Ganatynyň uzynlygy – 64-71 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: bir-meňzeş çal reňki bilen beýleki çürlentgilerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Orta Aziýanyň, Türkmenistany hem goşulanda gü-norta böleginiň daglary.

Ýaşayşy: uçup geçýän guş, onuň höwürtleýän bolmagy hem müm-

Длина крыла – 70-76 мм.

Сходства – отличия: от певчей славки отличается черной “шапочкой” и серыми боками головы.

Распространение: от Европы до Юго-Восточной Азии. В Средней Азии и Туркменистане встречается в различных ландшафтах.

Образ жизни: пролетная птица. Весенний пролет в апреле-начале мае, осенний – с конца августа и в сентябре. Встречаются в предгорьях, горных ущельях с зарослями деревьев и кустарников, оазисах. Держатся среди листвы кустарников и деревьев. Насекомоядная птица.

Статус: редкий, слабо изученный у нас вид.

Полевые признаки: размером несколько мельче воробья. **Верхняя сторона тела и головы темно-серые** с легким буроватым оттенком. Крылья серовато-бурые со светлыми каемками перьев. **Крайние перья хвоста белые**. Низ белый с буровато-серым налетом на боках. Ноги темно-серые. Самка похожа на самцов, но несколько светлее. Молодые напоминают взрослых, но бурее. Песня – набор журчащих трелей. Крик – резкое «чек-чек». Длина крыла – 64-71 мм.

Сходства – отличия: от других славок отличается однотонной серой окраской верха.

Распространение: горы южных частей Средней Азии, включая Туркменистан.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся (Большие Балханы, Копет-

kin (Uly Balkan, Köpetdag). Ýazyna aprelda, güýzine – sentýabrda uçup geçýär. Jülgeleriň gür ösen gyrymsy ösümlikli jeňňelli yerlerinde mekan tutýar. Ýekelikde, käte jübüt bolup gezýär. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek we bizde ýeterlik öwreniledik guş.

315. Akmurtly çürlentgi – *Sylvia mystacea* – Белоусая славка

Meýdan alamatlary: serçeden biraz kiçi ölçegli. Bedeniniň üstki tarapy, ganatlary we guýrugy çal. **Horazynyň kellesi, duluklary we gulagyna ýanaşyk ýerleri çalymtyl-gara**. Ganatlarynyň we guýrugynyň ýelekleri insiz ýagty jähekli. **Agyz kesiminiň burçundan başlap, boýunyň gapdalyndan ak zolak gidýär – “murty”**. Aşaky tarapy agymtyl, döşi we bedeniniň böwürleri gülgüne-çypar. Aýaklary ачык goňur. Mäkiýanlarynyň we ýaşlarynyň üstki taraplary birmeňzeş goňurrak-çal, аşagy – agymtyl. Guýrugyny saga-sola ýygy-ýygydan çaykamak endigikli. Saýraýşy gysga jikgildili owazlar. Gykylyk sesli güýçli – “çerrr”. Ganatynyň uzynlygy – 56-63 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ak “murty” bilen beýleki çürlentgilerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ortaýer deňzi, Alynky Aziýa. Orta Aziýada we Türkmenistanda dürli şertlerde duşýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtleýän görnüş. Ýazyna martyň ortasyndan, güýzine – awgustdan sentýabryň ortasyna çenli uçup geçýär. Daglaryň аşaky guşaklygynda, dag eteklerinde, oazislerde, derýalaryň jülgelerinde ýaşауar,

даг, Койтендаг) птица. Весенний пролет в апреле, осенний – в сентябре. Населяют густо заросшие ущелья с кустарниковой растительностью. Держатся в одиночку, иногда парами. Питается насекомыми.

Статус: редкая и недостаточно изученная у нас птица.

Полевые признаки: размером несколько мельче воробья. Верхняя сторона тела, крылья и хвост серые. **У самца голова, щеки и область уха серовато-черные**. Крылья и хвост с узкими светлыми каемками перьев. **От углов рта по бокам шеи идут белые полосы – «усы»**. Низ беловатый, **грудь и бока тела розовато-рыжеватые**. Ноги светло-буроватые. У самок и молодых верх однообразно буровато-серый, низ беловатый. Характерно частое покачивание хвостом из стороны в сторону. Песня – короткая щебечущая трель. Крик – громкое «чerrr». Длина крыла – 56-63 мм.

Сходства – отличия: от других славок отличается белыми «усами».

Распространение: Средиземноморье, Передняя Азия. В Средней Азии и Туркменистане встречается широко в различных местообитаниях.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся вид. Весенний пролет с середины марта, осенний – с августа до середины сентября. Обитает в нижнем поясе гор, предгорьях, оазисах, речных долинах, не избегает пустынь, особенно черносаксаульников. Всюду придерживаются дре-

çöllüklerde, aýratyn-da gara saklyklarda hem duşýar. Hemme ýerde agaç-gyrymsy agaçly ýerlerde saklanýar we hem höwürtegeýär. Maý-iyunda 4-5 sany gülgüne öwüşginli we garamtyl meneklije ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 12.8-14.0 x 15.3-17.4 mm. Mör-möjekler bilen iýmitleýär.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde adaty guş.

316. Çöl çürlentgisi – *Sylvia nana* – Пустынная славка

Meýdan alamatlary: serçeden biraz kiçi ölçegli. **Bedeniniň üstki tarapy birmeňzeş melemtil-agymtyl - goňurrak, guýrugunyň üsti çuparrak.** Çupar guýrugunyň çetki ýelekleri ak. Ganatlarynyň ýeleklerinde insiz agymtyl jähekleri bolýar. Bedeniniň aşagy agymtyl, böwürleri çuparrak reňkde. Aýaklary açyk goňur. Çünki sarymtyl-çal. Ýaşlary ulularyna meňzeş, ýöne has çuparrak, bokurdagy we garnynyň ortasy agymtyl. Gözleri açyk reňkli. Saýraýşy jüňnyrdawukly – “tiri-titýu-týu-týu-týu”. Gykylygy – pessaýja jyryldy. Ganatynyň uzynlygy – 55-61 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: üstki tarapynyň birmeňzeş çägesypat reňki bilen beýleki çürlentgilerden tapawatlanýar.

Ýaýran ýerleri: Demirgazyk Afrika, Merkezi we Orta Aziýanyň, şol sanda Türkmenistanyň çölleri.

Ýaşaýaşı: uçup geçýän we höwürtegeýän guş. Ýazyna martyň soňunda uçup gelýär, oktyabr aýynda uçup gidýär. Çöllükleriň sakly we beýleki gyrymsy agaçly ýerlerinde ýaşaýar. Gyrymsylaryň üstünde çakganlyk bilen gezýär, şol ýerde hem höwürtegeýär. Aprel-

весно-кустарниковых участков, где и гнездятся. Кладка из 4-5 белых с розоватым оттенком и темными пятнышками яиц, в мае-июне, размеры – 12.8-14 x 15.3-17.4 mm. Питается насекомыми.

Статус: немногочисленная, местами обычная птица.

Полевые признаки: размером несколько мельче воробья. **Верхняя сторона однотонно песочно-буроватая с рыжеватым надхвостом. Крайние перья рыжего хвоста белые.** Крылья имеют узкие светлые каймы на перьях. Низ беловатый с рыжеватыми боками тела. Ноги светло-буроватые. Клюв желтовато-серый. Молодые похожи на взрослых птиц, но более рыжие, горло и середина брюшка заметно блее. Глаза светлые. Песня – звенящее «тири-титю-тю-тю-тю». Крик – негромкий, трещание. Длина крыла – 55-61 mm.

Сходства – отличия: от других славков отличается однотонной пестрой окраской верха.

Распространение: пустыни Северной Африки, Центральной и Средней Азии, в том числе и Туркменистана.

Образ жизни: пролетная и гнездящаяся птица. Весенний пролет в конце марта, отлетает – в октябре. Населяют саксаульники и другие подходящие участки кустарниковой пустыни. Держатся на различных кустах, очень подвижная птичка, гнездится также на кустах.

maýda 4-6 sany goňurrak meneklije ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 11.1-12.8 x 14.6-17.9 mm. Mör-möjekler bilen iýmitleýär.

Statusy: az sanly, uçup geçende adaty guş.

317. Ýaşyl aldawaç – *Phylloscopus trochiloides* – Зеленая пеночка

Meýdan alamatlary: serçeden ölçegi has kiçi. Bedeniniň üstki tarapy çalymtyl ýaşyl. **Ganatynda kese ak zolak aýdyň görünýär. Ganatlary we guýrugy goňur, ýelekleri ýaşylymtyl jähekli. Gaşy ýaşylymtyl öwüşginli agymtyl.** Aşagy tarapy sarymtyl menekli agymtyl. Aýaklary açyk goňur we çünki göýü goňur reňkli. Ýaş guşlaryň gaşy ýaşylymtyl-ak, aşak tarapy – ýaşylymtyl-çuparrak. Saýraýşy batly – “ti-psitýu-psitýu-psi-ti-ti-psi”. Gykylygy – “pii” ýa-da “psýuýl” pessaýja sykylyk. Ganatynyň uzynlygy – 54-68 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ganatyndaky bir ýagty zolagy bilen beýleki aldawaçlardan tapawatlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropa we Aziýa. Orta Aziýanyň daglarynda we Türkmenistanda duşýar.

Ýaşaýaşı: uçup geçýän görnüş. Ýazyna aprelda, sentýabrda-oktyabrda uçup geçýär. Gyrymsy çöllükde, derýalaryň jülgelerinde, oazislerde (baglyklarda we seýilgählerde) duşýar. Adatça ýekelikde agaçlaryň we gyrymsylaryň şahalarynyň arasynda gezýär. Mör-möjekler bilen iýmitleýär.

Statusy: seýrek, käbir ýerlerde adaty guş.

318. Şapak aldawajy – *Phylloscopus inornatus* – Пеночка-зарничка

Meýdan alamatlary: serçeden has maýda ölçegli. Üstki tarapy

Кладка из 4-6 белых с буроватыми крапинками яиц, в апреле-мае, размеры – 11.1-12.8 x 14.6-17.9 mm. Питается насекомыми.

Статус: немногочисленная, на пролете обычная птица.

Полевые признаки: размером значительно мельче воробья. Верхняя сторона серовато-зеленая. **Поперек крыла белая выделяющаяся полоска. Крылья и хвост бурые с зелеными каймами перьев. Бровь беловатая с зеленым оттенком.** Низ беловатый с желтоватыми пестринами. Ноги светло-буроватые, клюв темно-бурый. У молодых птиц бровь зеленовато-белая, а низ зеленовато-рыжеватый. Песня – громкая «ти-пситю-пситю-пси-ти-ти-ти-пси». Крик – негромкий свист «пии» или «псьюль» Длина крыла – 54-68 mm.

Сходства – отличия: от других пеночек отличается одной светлой полоской на крыле.

Распространение: Европа и Азия. В горах Средней Азии, в Туркменистане встречается широко в различных местообитаниях.

Образ жизни: пролетный вид. Весенний пролет в апреле, осенний – в сентябре-октябре. Попадает в кустарниковой пустыне, речных долинах, оазисах (в садах и парках). Держатся обычно в одиночку в кронах деревьев и кустарников. Питаются насекомыми.

Статус: редкая, местами обычная птица.

çalyml-tylrak, çalymtyl - ýaşylymtyl - goňur öwüşginli. **Ganatlary kese iki sany inli ýagty zolakly. Gaşy anyk görüňan ýagty-sary. Gözüniň üsti insiz gara zolakly.** Aşaky tarapy sarymtyl çuparrak ýokundyly. Aýaklary açyk-goňur, çünki goňur. Saýraýşy sesli "ti-psitýu- psitýu-psi-ti-ti-psi". Gykylygy – pessaýja sykylyk "pii" ýa-da "psýuýl". Ganatlynyň uzynlygy - 51-61 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ganatlaryndaky iki sany inli ýagty zolagy bilen beýleki aldawaçlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Sibir, Gimalaý daglarynyň günortasyna çenli we Günorta Hytaý. Orta Aziýanyň daglyk ýerleri, Türkmenistanda esasan gündogar etraplarynda gabat gelýär. (Amyderýa).

Ýaşayyşy: uçup geçýän görnüş. Ýazyna martda, güýzine – oktyabrda uçup geçýär. Derýalaryň jülgelerinde, saýaly baglyklarda, tokay-seýilgäh zolaklarynda, beýleki ýerlerde saklanmagy mümkin. Mör-möjekler bilen iýmitleňýär.

Statusy: seýrek duşýan guş.

319. Bellik: Köýtendagda we Amyderýanyň ýokarky akumynyň käbir ýerlerinden uçup geçýän döwründe **dag şapakçysynyň – Phylloscopus humei** duşmagy ahmal, ol şapakçy aldawaja örän meňzeş, emma onuň üsti goňurak, aýratyn-da kellesi, ýelek örtügi tutuşlygyna, aýratyn-da ganatlaryndaky zolaklary has öçügsi.

320. Hindi aldawajy – Phylloscopus griseolus – Индийская пеночка

Meýdan alamatlary: serçeden ölçegi has maýda. Bedeniniň üstki tarapy çalymtyl-ýaşylymtyl öwüş-

ня сторона сероватая с серо-зеленовато-бурым оттенком. **Поперек крыла две широкие светлые полосы. Бровь светло-желтая, хорошо заметная. Через глаз узкая черная полоска.** Низ беловатый с желтовато-рыжим налетом. Ноги светло-бурые, клюв бурый. Песня – громкая «ти-пситю-пситю-пси-ти-ти-пси». Крик – негромкий свист «пии» или «псюль». Длина крыла – 51-61 мм.

Сходства – отличия: от других пеночек отличается двумя светлыми широкими полосками на крыле.

Распространение: Сибирь, к югу до Гималаев и Южного Китая. Горные области Средней Азии, в Туркменистане, в основном, в восточных районах (Амударья).

Образ жизни: пролетный вид. Весенний пролет в марте, осенний – в октябре. Населяют речные долины, сады, лесопосадки, может встречаться и в других местах. Питаются насекомыми.

Статус: редкая птица.

319. Примечание: не исключено, что в Койтендаге и местами по верхней Амударье на пролетах может попадаться **горная или тусклая зарничка – Phylloscopus humei**, которая очень схожа с пеночкой-зарничкой, но верх буроватый, особенно на голове, оперение в целом и особенно полоски на крыльях более тусклые.

Полевые признаки: размером значительно мельче воробья. Верхняя сторона серовато-бурая с

ginli çalymtyl-goňur. **Ganatlary we guýrugy birmeňzeş goňur. Gaşy limonpisint sary.** Bedeniniň aşagy goňurak-sary. Petekesiniň gapdallary we döşi goňurak. Aýaklary goňurak sary. Ýaş guşlaryň üstki tarapy goňur, guýrugynyň üsti çuparrak, aşagy – sary ýokundyly çalymtyl ak. Saýraýşy gysgajyk, sesi owazy. Gykylygy gysga "trr-trr" ýa-da "çili". Ganatlynyň uzynlygy – 55-70 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: gaşynyň limonpisint sarydygy we kellesiniň çalymtyl-goňurakdygy bilen beýleki aldawaçlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Gazagystan, Orta we Merkezi Aziýa. Türkmenistanda – Köýtendagda.

Ýaşayyşy: höwürtegeýän guş. Ýekelikde ýa-da jübüt bolup, daglaryň seýrek ösümlikli daşly eňňitlerde, adatça arçalyk zolakda gezyär. Gür şahlanan gyrymsy agaçlarda höwürtege gurýar. Maý-iyunda 4-5 sany poslurakgyzyl meneklije ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri - 14-17.4 x 12-12.9 mm. Mör-möjekler bilen iýmitleňýär.

Statusy: seýrek, çäkly ýaýran görnüş.

321. Tiňnillewüjik aldawaç – Phylloscopus collybita – Пеночка-теньковка

Meýdan alamatlary: serçeden maýda ölçegli. Bedeniniň üstki tarapy çalymtyl - ýaşylymtyl öwüşginli, çalymtyl - goňur. Ganatlary we oýuk guýrugy goňurak-şah reňkli, ýeleklere ýaşylymtyl jähekli. **Gaşy agymtyl-çuparrak.** Aşagy agymtyl, bedeniniň böwürleri çuparrak-goňur ýokundyly. **Aýaklary gara,** çünki goýu goňur. Ýaşlary uly guşlara meňzeş, ýöne has açyk reňkli. Saýraýşy "ten-tin-týan-

серо-зеленоватым оттенком. **Крылья и хвост однотонно бурые. Бровь лимонно-желтая.** Низ тела буровато-желтый. Бока зоба и груди буроватые. Ноги буровато-желтые. Молодые птицы сверху бурые, надхвостье рыжеватое, низ серовато-белый с желтым налетом. Песня – короткая трель. Крик – короткое «трр-трр» или «чильи». Длина крыла – 55-70 мм.

Сходства – отличия: от других пеночек отличается лимонно-желтой бровью и серовато-буровой головой.

Распространение: Казахстан, Средняя и Центральная Азия. В Туркменистане – Койтендаг.

Образ жизни: прилетная, гнездящаяся птица. Держится в одиночку или парами на каменистых склонах гор с редкой растительностью, обычно в арчевой зоне. Гнездо строит в густых кустарниках. Кладка из 4-5 белых с ржаво-красными крапинками яиц, в мае – июне, размеры – 14-17.4 x 12-12.9 мм. Насекомоядная птица.

Статус: редкий вид с ограниченным распространением.

Полевые признаки: размером мельче воробья. Верхняя сторона серовато-бурая с серо-зеленоватым оттенком. Крылья и выемчатый хвост буро-рогового цвета с зеленоватыми каемками на перьях. **Бровь беловато-рыжеватая.** Низ тела беловатый, бока тела с рыжеватобурым налетом. **Ноги черные,** клюв темно-бурый. Молодые птицы сходны со взрослыми, но

týun...tr...ten-tin" – jürrüdüli sesler. Gykylygy "fýuit" ýa-da "çilii" – gysga sykylyklar. Ganatynyň uzynlygy – 48-68 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **aýaklarynyň gara ýa-da goýu goňurdygy bilen** beýleki aldawaçlardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropa we Aziýa. Höwürtgelände Orta Aziýanyň daglarynda, Türkmenistanda – Köpetdagda, ýaşaýar we uçup geçende düzlüklerde duş gelyär.

Ýaşaýşy: uçup geçýän-höwürtlegeýän görnüş. Ýazyna apreliň soňunda uçup gelyär. Daglaryň derelerini we derýalaryň jülgelerini eýeleýär. Uçup geçen mahaly – uly derýalaryň jülgelerinde we oazislerde saklanýar. Agaçlaryň we gyrymsylaryň ýokarky böleginde gezyär. Ýerden beýik bolmadyk gyrymsylaryň üstünde höwürte gurýar. Maý-iyunda 5-7 sany gyzlymtyl-goňur meneklije ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 11.7-12.4 x 14.8-16.4 mm. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: uçup geçende adaty, höwürtlegeýän döwründe az sanly guş.

322. Ýazçy aldawaç – *Phylloscopus trochilus* – Пеночка-весничка

Meýdan alamatlary: serçeden maýda ölçegli. Bedeniniň üstki tarapy goýu ýaşylymtyl öwüşginli goňurrakçal. Ganatlary we guýrugy çalylymtyl-goňur, ýelekleri ýaşylymtyl jähekli. Gaşy agymtyl-rak-sarygylt. Aşagy ak, döşi çalylymtyl-ýaşylylymtyl, bedeniniň böwürleri sarymtyl ýokundyly (ýaşylymtyl öwüşgini güýz-guş möwsümde has köpüräk). **Aýaklary açyk sarymtyl-goňur**, çünki goýu goňur. Ýaşlarynyň arkasynyň reňki uly guş-

ярче. Песня – звонкие звуки «тень-тень-тянь-тюнь... тр... тень-тень». Крик – короткий свист «фюить» или «чильи». Длина крыла – 48-68 мм.

Сходства – отличия: от других пеночек отличается **черными или темно-коричневыми ногами.**

Распространение: Европа и Азия. На гнездовье в горах Средней Азии, в Туркменистане – в Копетдаге, на пролете шире – на равнинах.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся вид, часть особей зимует. Весной появляется с конца апреля. Населяют горные ущелья и долины речек. На пролете – по долинам крупных рек и оазисам. Держатся обычно в верхних частях деревьев и кустарников. Гнездо строится на кусте невысоко над землей. Кладка из 5-7 белых с красно-бурыми крапинками яиц в мае-июне, размеры – 11.7-12.4 x 14.8-16.4 мм. Питается насекомыми.

Статус: обычная на пролете, немногочисленная на гнездовье птица.

Полевые признаки: размером мельче воробья. Верхняя сторона буровато-серая с темно-зеленоватым оттенком. Крылья и хвост серовато-бурые с зеленоватыми каймами перьев. **Бровь светло-желтоватая.** Низ белый, грудь серо-зеленоватая, бока тела с желтоватым налетом (в осенне-зимний период больше зеленоватых тонов). **Ноги светлые, желтовато-бурые**, клюв темно-бурый. У моло-

lara garanda has ýagty. Saýraýşy – owazly görnüşindäki arassa sykylyklaryň toplumu bar. Gykylygy "fýuit" – gysga sykylyk. Ganatynyň uzynlygy – 61-74 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: aýaklarynyň agymtyl reňki bilen tiňnildewik aldawaçdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropa we Aziýa. Orta Aziýada, şol sanda Türkmenistanda – diňe uçup geçende duşýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän görnüş. Ýazyna mart - aprelda, güýzine – oktyabrda duş gelyär. Dag eteklerinde, derýalaryň jülgelerinde, daglaryň derelerinde we beýleki amatly ýerlerde duşýar. Agaçlaryň, gyrymsylaryň şahalarynyň arasynda we gamyşly jeňňelliklerde gezyär. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek, bizde az öwrenilen guş.

323. Eýran aldawajy – *Phylloscopus neglectus* – Иранская пеночка

Meýdan alamatlary: serçeden has maýda ölçegli. **Bedeniniň üstki tarapy, ganatlary we guýrugy çalylymtyl-goňur. Gaşy gowşak sarymtyl öwüşginli agymtyl.** Bedeniniň aşagy agymtyl, böwürleri çuparrak-goňur ýokundyly. Aýaklary garamtyl-goňur, çünki goýu goňur. Ýaş guşlaryň arkasy has garamtyl, gaşy agymtyl-sary. Gykylygy "gýurrr" – pert jürküldeme. Ganatynyň uzynlygy – 47-55 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: garamtyl kellesindäki ýagty sary gaşlary bilen beýleki aldawaçlardan tapawutlanýar.

Ýaýraýn ýerleri: Päkistan, Owganystan, Eýran. Orta Aziýada – Täjigistanyň daglyklarynyň çäklerinde,

дых птиц окраска спины ярче, чем у взрослых. Песня – набор чистых посвистов в виде трели. Крик – короткий свист «фюить». Длина крыла – 61-74 мм.

Сходства – отличия: от пеночки-теньковки отличается светлыми ногами.

Распространение: Европа и Азия. В Средней Азии, в том числе Туркменистане, встречается только на пролете.

Образ жизни: Пролетный вид. Весной появляется в марте – апреле, осенью – в октябре. Встречается предгорьях, речных и горных долинах и других местообитаниях. Держится в кронах деревьев, зарослях кустарников и тростников. Питается насекомыми.

Статус: редкая, мало изученная у нас птица.

Полевые признаки: размером значительно мельче воробья. **Верхняя сторона, крылья и хвост серовато-бурые. Бровь беловатая со слабым желтым оттенком.** Низ тела беловатый со слабым рыжеватобурым налетом на боках. Ноги черно-бурые, клюв темно-бурый. У молодых птиц спинная сторона темнее, бровь беловато-желтая. Крик – резкое чириканье «гюррр». Длина крыла – 47-55 мм.

Сходства – отличия: от других пеночек отличается яркой желтой бровью на темной голове.

Распространение: Пакистан, Афганистан, Иран. В Средней Азии – горные районы в пределах Таджикистана, а также Туркменистана

şeyle-de Türkmenistanda (Köpetdag-da we Köýtendagda) duş gelýär.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtegeleýän guş. Ýazyna apreliň soňunda uçup gelýär. Daglaryň derelerini, derýalaryň jülgelerini eýeleýär. Agaçlaryň ýokarky şahalarynyň arasynda gezyär. Dagdaky gyrymsylaryň gür şahalanan düýplerinde höwürtege gurýar. Maý-iyunda 5-7 sany gyzylymtyl-goňur meneklje ak ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek, çäkli ýaýrawly az öwrenilen guş.

324. Şalkyguýruk çürlentgi – *Scotocerca inquieta* – Скотоцерка, или вертлявая славка

Meýdan alamatlary: serçeden kiçi ölçegli. Bedeniniň üstki tarapy çal öwüşginli agymtyl-goňur. Ganatlary goňur. **Guýrugy uzyn gara-goňur reňkli, ýelekleri insiz ýagty jähekli. Kellesinde, boýnynda we arkasynda dik garamtyl çyzyklary bolýar.** Gaşy agymtyl. Bedeniniň aşaky tarapy agymtyl, petekesi we döşi dik geçýän çyzykly. Aýaklary goňurrak. Horazynyň reňki mäkiýanyna meňzeş. Ýaşlary ulularyny ýatladýar, yöne açyk reňkli. Guşjagaz haçanda oturanda ýa-da gyrymsylaryň arasynda hereket edende çakganlyk bilen guýrugyny dik galdyrýar. Sesi ýumşak sozulan sykylyk bolup, özboluşly ýakymly jyrlydama döredýär. Ganatynyň uzynlygy – 44-50 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: guýrugynyň beýlekilere garanynda has uzynlygy, kellesindäki we döşündäki dik geçýän çyzyklarynyň barlygy bilen çöl çürlentgiden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Eýran, Owganystan, Demirgazyk Afrika. Orta Aziýada

(Копетдаг и Койтендаг).

Образ жизни: гнездящаяся птица, весной – с конца марта, осенью отлетает в октябре. Населяет горные ущелья, речные долины. Держится в верхних ветвях деревьев. Гнездо – в густых ветвях горных кустарников. Кладка из 5-7 белых с красно-бурыми крапинками яиц, в мае-июне. Питается насекомыми.

Статус: редкая, слабоизученная птица с ограниченным распространением.

Полевые признаки: размером мельче воробья. Верхняя сторона бледно-бурого цвета с серым оттенком. Крылья бурые. **Хвост удлинён, черно-бурого цвета с узкими светлыми каймами перьев. На голове, шее и на спине темноватые продольные штрихи.** Бровь беловатая. Низ тела также беловатый с продольными штрихами на зобе и груди. Ноги буроватые. Самцы и самки сходны по окраске. Молодые птицы напоминают взрослых, но ярче. Подвижные птички, обращает на себя внимание вертикальное положение хвоста, когда птица сидит или передвигается среди кустов. Голос – протяжный мягкий свист, переходящий в своеобразное мягкое трещание. Длина крыла – 44-50 мм.

Сходства – отличия: от пустынной славки отличается сравнительно длинным хвостом и продольными пестринами на голове и груди.

Распространение: Иран, Афга-

не Gazagystanyň günorta we günbatar sebitleri. Türkmenistanda – düzlükleriň, çöllükleriň we olara ýanaşyk dag etekleriniň giňişlikleri.

Ýaşayşy: oturymly we göçüpgonýan guş. Sazaklyklarda, dag etek gurak düzlükleri eýeleýär. Ýekelikde, jübüt, seýrek topar bolup gezyär. Gyrymsylarda höwürtegeleýär. Mart-iyunda 5-8 goňurrak-gyzylymtyl meneklje gülgüne-ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 11-12 x 15-16 mm. Mör-möjekler, olaryň gurçuklary we möýler bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty, käbir amatly ýerlerde köpsanly guş.

Hurmaýjyklar – *Regulidae* – Корольковые

Гоушак we ýumşak ýelek örtükli maýda guşlar maşgalasy. Reňki ýaşylymtyl, ýaşı ýeten guşlaryň depesi mämişi, gyzylymtyl ýa-da sary. Çünki inçe we gysga. Burun ýarçyklarynyň üsti deri pisint ýygirt (nagşly jikjikeriň wekillernide) ýa-da ýelek sütüni uzalan ýelejikler bilen örtülen (hurmaýjyklar). Ganatlary kütek, guýrugy tegelenen (nagşly jikjiker) ýa-da oýulan (hurmaýjyklar). Güzüne we gysyna kiçirak süri bolup göçüpgonýarlar. Oňurgasyzlar bilen iýmitlenýärler. Dünyäde – 5, Türkmenistanda – 1 görnüşi bar.

325. Sarybaş hurmaýjyk – *Regulus regulus* – Желтоголовый королек

Meýdan alamatlary: serçeden has kiçi ölçegli. Bizde duşýan guşlaryň iň maýdasy. Bedeniniň üsti açyçalymtyl-ýaşylymtyl, aşagy – açyk agymtyl. **Kellesiniň üsti limonpisint sary, gapdal gyralary bilen, adat-**

нистан, Северная Африка. В Средней Азии, в южных и западных районах Казахстана. В Туркменистане – пустынные участки равнин, предгорий и гор.

Образ жизни: оседлая, кочующая птица. Населяет саксаульники, сухие предгорные равнины. Держится одиночно, парами, реже группами. Гнездо строит на кусте. Кладка из 5-8 розовато-белых с коричневатокрасными крапинками яиц, в марте-июне, размеры – 11-12 x 15-16 мм. Питается насекомыми и их личинками, пауками.

Статус: обычная, местами в подходящих условиях многочисленная птица.

Семейство мелких птичек с рыхлым и мягким оперением. Окраска зеленоватая, у взрослых темя оранжевое, красноватое или желтое. Клюв тонкий и короткий. Ноздри сверху прикрыты кожистой складкой (у представителей расписных синичек) или перышком, у которого стержень удлинён в виде щетинки (корольки). Крыло тупое, хвост закруглённый (расписные синички) или выемчатый (корольки). Осенью и зимой кочуют небольшими стайками. Питаются беспозвоночными. В мире 5 видов, в Туркменистане – 1.

Полевые признаки: величиной значительно меньше воробья. Самая маленькая из наших птиц. Верх тела светло-серо-зеленоватый, низ светлый, беловатый. **Верх головы лимонно-желтый, обыч-**

ça maňlaýynda birleşmeýän inli gara zolak geçýär. Ganatlary kütek we inli. Guýrugy sähelçe oýuk. Çüňki gara, aýaklary goňur. Mäkiýanyň depesindäki sary tegmili has öçügsi, ol ýaş guşlarda bolmaýar. Sesi pessaýja – “si-si-si”. Saýraýşy “si-fl-i-hin, si-fl-i-hin”. Bedeniniň uzynlygy – 90-115, ganaty – 50-58, ganatlarynyň gerimi – 150-170 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçeği boýunça aldawaçlara çalymdaş, maňlaýyndaky gara we sary zolaklary bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günbatar Ýewropa, Kiçi Aziýa, Demirgazyk Eýran, Hytaý, Gimalaý daglary. Orta Aziýada – daglaryň pürli tokaýlyklarynda. Türkmenistanda – giň ýaýran, guş döwründe bolsa daglarda, dag eteklerinde, şeýle hem çölde seýregräk duşýar.

Ýaşaýşy: göçüp - gonýan we guşlaýan guş. Daglaryň pürli we beýleki agaçly ýerlerini eýeleýär, dag eteklerinde düşýär, miweli baglyk ýerlerinde, seýilgählerde, hat-da çölün jümmüşindäki sazakyklarda duşmagy mümkin. Kiçiräk süri bolup gezyär. Mör-nöjekler, olaryň liçinkalary bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, bizde gowşak öwrenilen görnüş.

Siňekçiler – Muscicapide – Мухоловковые

Daşky sypatyndan jok-jokylary ýatladýar. Olar bilen kowumdaş bolan, saýrak guşlaryň uly toparyna degişli (30 g çenli agramda). Özelere garanyňda inli çüňkleri we agzynyň gyralary oňat ösen gaty gylly bolýar. Aýaklary beýlekilere garanyňda gowşagrak bolup, söbügi

но окаймленный по бокам черными широкими полосами, не соединяющимися на лбу. Крыло тупое и широкое. Хвост слегка выемчатый. Клюв черный, ноги бурые. У самки желтое пятно на темени очень бледное, у молодых оно отсутствует. Голос тихое «ци-ци-ци». Песня – «ци-фли-хин, ци-фли-хин». Длина – 90-115, крыло – 50-58, размах крыльев – 150-170 мм.

Сходства – отличия: от мелких по размерам пеночек отличается черной и желтой полосой на лбу.

Распространение: Западная Европа, Малая Азия, Северный Иран, Китай, Гималаи. В Средней Азии – в лесах горных областей. В Туркменистане относительно широко, в зимний период – в горах, предгорьях, реже пустыне.

Образ жизни: кочующе-зимующая птица. Предпочитает держаться в горах на участках хвойных и иных древесных пород, спускается в предгорья, зимой может попадаться в садах и парках и даже в саксаульниках глубоко в пустыне. Держится небольшими стайками. Питается насекомыми и их личинками.

Статус: немногочисленный и слабоизученный у нас вид.

Большая группа певчих птиц (с массой до 30 г), внешне напоминающих дроздовых, с которыми они родственны. Имеют относительно широкий клюв с хорошо развитыми щетинками в основании и по краям рта. Ноги сравнительно слабые, с относительно короткой

gysga. Ganatlary uzyn we insizräk. Reňkleri dürlü: görnüşleriniň biriniň ýelek örtügi goňurrak-çal we gysga guýrukly, beýlekileri (görnüşleriň tropik ýurtlarda ýaşaýanlary) örän açyk reňkli we aglaba uzyn guýrukly bolýar. Giň ýaýrandyrlar. Agaçlyklarda, gyrymşy agaçly ýerlerde jübüt bolup ýaşaýarlar. Esasan uçýan mörmöjekler, güýzine we guşyna miweler we ösümlikleriň tohumlary bilen iýmitlenýärler. Dünýäde 390-dan gowrak görnüşü, bolup olardan 5-si Türkmenistanda, ýaşaýar.

326. Jennet uzunguýruk siňekçi – Terpsiphone paradisi – Райская мухоловка

Meýdan alamatlary: serçeden ulurak. **Guýrugy uzyn we hüpüginini çowlanandygy oňat görünüňäniň uly siňekçi. Kellesi we bokurdagy tutuşlygyna açyk metal ýalpyldyly garamtyl-gök.** Arkasy, guýrugynyň üsti we guýrugy ýiti çypar reňkli; guýrugynyň ortaky ýelekleri has uzalan (50 sm çenli), mäkiýany we ýaş guşlar gysga guýrukly. Ganatlary goýu çal reňkli. Garny ak, ganatlarynyň aşagy agymtyl-çyparrak, bedeniniň aşagy çal. Çüňki inli, güýçli, garamtyl çüňküstüniň ýokarsy has gaňragrak, mawumtyl-çal reňkli. Aýaklary mawumtyl-çal. Gözleriniň töweregi – gögümtil reňkli ýalaňaç halka. Uçup barýarka üzlem-saplam gödek sesli gykylyk edýär – “çi-çip” ýa-da “çirp-çirp”, “çirr-şerr”, “çetr-çetr” ýa-da “çet-çet”. Çagyryş gykykygy assaja sokdurylan “y” bilen – “tereüä, tereüä”, käte gorkan halatynda jzyrды sesli – “ççah” ýa-da “şşah”. Saýraýşy assaja we mylaýym – “ti-ti-ti-ru-li”, sarkyldagyň saýraýşyny ýatladýar. Horazlarynyň ganaty – 89-100, mäkiýanlarynyňky

цевкой. Крыло длинное и не широкое. Окраска различна: одни виды имеют скромную буровато-серую окраску оперения и короткий хвост, другие (тропические виды) окрашены очень ярко и нередко имеют длинный хвост. Распространены широко. Обитатели древесно-кустарниковых участков. Живут парами. Питаются насекомыми, в основном, летающими, осенью и зимой – также ягодами и семенами. В мире более 390 видов, из которых в Туркменистане – 5.

Полевые признаки: крупная (крупнее воробья) **мухоловка с длинным хвостом и хорошо заметным заостренным хохлом. Вся голова и горло черновато синие с ярким, металлическим блеском.** Спина, надхвостье и хвост ярко рыжие; средние перья хвоста значительно удлинены (до 50 см), у самок и молодых хвост короче. Крылья темно-серого цвета. Брюшко белое, подкрылья бледно-рыжеватые, низ тела серый. Клюв широкий мощный голубовато-серого цвета, с более темным крючком на надклювье. Ноги голубовато-серые. Вокруг глаза – голое кольцо голубого цвета. На лету издает грубые отрывистые крики – «чи-чир» или «чирп-чирп», «чирп-шерп», «четр-четр» или «чет-чет». Призывный крик – тихое «тереуэ, тереуэ» с протяжным «у», а при испуге иногда – шипящее «ччах» или «шшах». Песня тихая и мелодичная – короткое «ти-ти-ти-ру-ли», напоминающее песню иволги. Крыло самцов –

– 88-98, horazlarynyň guýrugy – 107-320, mäkiýanlarynyňky – 103-135; söbügi – 16.0-18.5, çüňki – 12-14 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: Türkmenistanda meňzeş görnüşleri ýok.

Ýaşan ýerleri: Günorta, Günorta-Gündogar we Gündogar Aziýada. Türkmenistanda – Köýtendagda. Hindistanda, Päkistanda we Owganystanyň günortasynda guşlaýar.

Ýaşayşy: höwürtegeýän görnüş. Suwdan daş bolmadyk (çeşme, derýajyk, dag derýajygy) agaç - gyrymsy agaçly ösümlikleriň (hoz, toraňny, üzüm we ş.m.) gür ösen jeňňelli jülgelerde gabat gelyär. Apreliň soňunda uçup gelyär, awgustyň ortasyndan-sentyabryň ortasynda çenli uçup gidýär. Jübütleşýän guşlar maýyň ortasynda gabat gelyär, maýyň soňunda we iýunyň başynda höwürtegeýär. Höwürtegesi ykjam, onuň gýralaryny tal agajynyň salanyp duran çybyklaryna berkidýär. Höwürtegäniň daş ýüzüne möýleriň ýelimli kereplerini çekýär. 4-5, seýrek 3 sany gowşak gülgüne öwüşginli we gyzylymtyl-goňur meneklije ýylmanak ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 20.0-21.6 x 14.9-16.8 mm. Dürli mör-möjekler, olaryň liçinkalary, garynjalar we möýler bilen iýmitlenýär.

Statusy: Türkmenistanyň Gyzylymtyl kitabyna girizilen, Köýtendag goraghanasynyň guşlarynyň iň täsin wekilleriniň biri.

327. Çal siňekçi – *Muscicapa striata* – Серая мухоловка

Meýdan alamatlary: burun deşikleri oňat ösen gaty gyllar bilen ýapylan, düýbine tarap ýasalyp gidýän çüňkli, beýlekilere garanyňda maýda

89-100, самок – 88-98, хвост самцов – 107-320, самок – 103-135; цевка – 16-18.5, клюв – 12-14 мм.

Сходства – отличия: в Туркменистане сходных видов нет.

Распространение: Южная, Юго-Восточная и Восточная Азия. В Туркменистане – Койтендаг. Зимует в Индии, Пакистане и южном Афганистане.

Образ жизни: гнездящийся вид. Встречается в ущельях с густыми зарослями древесно-кустарниковой растительности (грецкий орех, тополь, виноград и др.), недалеко от воды (родник, ручей, горная речка). Прилетает в конце апреля, отлетает с середины августа до середины сентября. В середине мая встречаются пары, а в конце мая и начале июня – гнезда. Гнездо аккуратное, бортами прикреплено к свисающим (плакучим) ветвям. Наружная поверхность гнезда обтянута прядями липкой паутины. Число яиц от 4 до 5, в редких случаях 3. Поверхность белых яиц гладкая блестящая, со слабым розовым оттенком и красновато-коричневыми крапинками. Размер яиц – 20-21.6 x 14.9-16.8 мм. Питается различными насекомыми и их гусеницами, муравьями, пауками.

Статус: внесен в Красную книгу Туркменистана, один из интересных представителей птиц Койтендагского заповедника.

Полевые признаки: сравнительно мелкая птица, клюв расширяющийся к основанию с хорошо развитыми щетинками, прикрыва-

ющий. **Ýelek örtügi birmeňzeş, üstki tarapy çalymtyl - goňurrak, aşagy – agymtyl, döşi we bokurdagy dik garamtylrak - goňur menekli.** Maňlaýy we kellesiniň üsti dik insiz garamtyl menekli. Çüňki agymtyl çüňkastynyň düýbi goňur; aýaklary gara dyrnakly goýy goňur. Horazlarynyň reňki mäkiýanlaryna meňzeş. Adatça, beýik bolmadyk gurap döwülen şahada ýa-da agaç sütüninde oturyp, uçup barýan mör-möjekleri tutmak üçin aram-aram uçýar. **Ganatyjyklaryny zygiderli silkeleýär.** Sesi birmeňzeş assaja – “st-st”. Kesgitli wagt aralygynda we zygyderli gaýtalanyp çykýan bu sesler saýrama owazy bolup hyzmat edýär, käte ol gysga saýrama bilen tamamlanýar. Ganaty – 81-91, guýrugy – 60-68, söbügi – 13-18, çüňki – 8-11 mm, agramy – 12-18 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: maňlaýynyň aladygy bilen beýleki siňekçilerden tapawutlanýar. Türkmenistanda bilelikde ýaşayan meňzeş görnüşleri ýok.

Ýaşan ýerleri: Ýewropa, demirgazyk-gündogar böleginden başgalarynda we Aziýa – gündogara Baýkal kölüne çenli. Türkmenistanda – daglarda, dag eteklerinde we derýalaryň jülgelerinde höwürtegeýär. Uçup geçende giňişleýin duşýar. Alynky Aziýada, Hindistanyň demirgazygynda, Merkezi we Günorta Afrikada guşlaýar.

Ýaşayşy: höwürtegeýän, uçup geçýän guş. Ýekelikde, jeňňelliklerde, baglyklarda, jülgelerdäki we dag derelerindäki gyrymsylyklarda we otluklarda, şeýle-de kenary agaçly suw akýan ýaplarda ýa-da uly bolmadyk ýylgynlyklarda gezýär. Ýazyna aprelde, güýzine – awgust-sentyabrda uçup

ющими ноздри. **Оперение однотонное, сверху серо-буроватое, снизу – беловатое, на груди и горле продольные черновато-бурые пестрины.** Лоб и верх головы с узкими темными продольными пестринками. Клюв бурый, со светлым основанием подклювья; ноги темно-бурые, с черными когтями. Самцы и самки окрашены сходно. Сидит обычно невысоко на сучке или ветке, откуда время от времени слетает, чтобы схватить пролетающее насекомое. **Периодически встряхивает крылышками.** Голос – тихое однообразное «цт-цт». Эти же звуки, издаваемые с определенным ритмом и последовательностью, служат песней, которая иногда заканчивается короткой трелью. Крыло – 81-91, хвост – 60-68, цевка – 13-18, клюв – 8-11 мм, вес – 12-18 г.

Сходства – отличия: от других мухоловок отличается пестринами на лбу. В Туркменистане нет совместно обитающих схожих видов.

Распространение: Европа, включая северо-восточную часть, и Азия – на восток до Забайкалья. В Туркменистане гнездится в горах и предгорьях, долинах рек. На пролете встречается шире. Зимуют в Передней Азии, на севере Индостана, в Центральной и Южной Африке.

Образ жизни: гнездящаяся, пролетная птица. Держатся одиночками в тугаях, садах, кустарниковых и зеленых участках в долинах и ущельях гор, а также у оросительной сети с деревьями или небольшими участками гребенщика. Весной пролетают в апреле, осенью – в августе-сентябре.

geçýär. Adatça höwürtgisini açaş sütülerindäki ýa-da uly bolmadyk köweklerde, jaýryklarda ýerleşdirýär. Maý aýynda 4-6 sany poslurak-goňur menekler bilen örtülen kirliräk-yaşyl ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 17.3-22.6 x 13.4-14.8 mm. Iýmiti – siňekler, gök siňekler, gündizki kebelekler, te-neçirler, kebelekleriň liçinkalary, tom-zaklar, möýler.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde az sanly guş.

Гнезда обычно располагают у стволов деревьев или мелких дуплах, в расщелинах. Кладка в мае из 4-6 грязно-зеленоватых яиц, покрытых ржавчато-бурыми пятнышками. Размеры яиц – 17.3-22.6 x 13.4-14.8 мм. В составе кормов мухи, слепни, дневные бабочки, стрекозы, гусеницы бабочек, личинки пилильщиков, жуков и пауков.

Статус: обычная, местами не многочисленная птица.

328. Çyparguýruk siňekçi – *Muscicapa ruficauda* – Рыжехвостая мухоловка

Meýdan alamatlary: serçe ölçegli. **Guýrugy we guýruküsti çypar, bokurdagy we garny ak, döşi we böwürleri goýy çal reňkli.** Gözüniň ýanynda ak tegmili bolýar. Aýaklary we çüňküsti goňur. **Agajyň şahasyn-da oturanda ganatlaryny şähelçe aşak göýberip we guýrugyny ýokary galdyryp oturýar.** Saýraýşy batly – “pi-tii-tii-tii” sesler. Ganaty – 71-84, guýrugy – 55-64, söbügi – 15-16, çüňki – 11-12 mm.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: guýrugynyň çypardygy, ýakyn aralykdan çüňküniň düýbüniň ýasylygy bilen beýleki siňekçilerden tarawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Orta Aziýanyň, Owganystanyň we Demirgazyk Hindistanyň günortasyndaky (Gimalaý dagy) daglyk raýonlary. Türkmenistanda – Köýtendag gerşiniň arça tokaýlarynda gabat gelmegi mümkin. Hindistanda gyşlaýar.

Ýaşaýşy: höwürtgelyän görnüş. Arça tokaýlyklarynda mekan tutýar (2000-2500 m deňiz derejesiniň beýikligine çenli). Gowy gizlenen höwürtgisini ýerden 2-6 m beýiklikde

Полевые признаки: размером с воробья. **В общем облике заметны рыжие надхвостье и хвост, белые горло и брюхо и темно-серые грудь и бока.** Пятно у глаза белое. Ноги и надклювье бурые. **Чаще заметна сидящей на ветке, с полураспущенными крыльями и приподнятым хвостом.** Песня – звонкая трель «пи-тии-тии-тии». Крыло – 71-84, хвост – 55-64, цевка – 15-16, клюв – 11-12 мм.

Сходства – отличия: от других мухоловок отличается рыжим хвостом, в непосредственной близости хорошо заметен широкий у основания клюв.

Распространение: горные районы юга Средней Азии, Афганистана и Северного Индостана (Гималаи). В Туркменистане может встречаться в арчевых лесах хребта Койтендаг. Зимует в Индии.

Образ жизни: гнездящийся вид. Населяет арчевые леса (до 2000-2500 м н.у.м). Гнезда хорошо замаскированы, помещаются обычно на ветках арчи на высоте от 2 до 6

arça şahalarynyň arasynda gurýar. Maýyň ortasynda 3-4 sany ýaşylymtyl-gök tutuk reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 15.6-19.1 x 12.1-13.6 mm. Dürli mör-möjekler (ýasmyklar, gaty-ganatlylar, kebelekleriň liçinkalary, perdeganat-lylar, garynjalar) bilen iýmitlenýär.

Statusy: seýrek, çäkli ýaýran görnüş, Köýtendag döwlet goraghanasynyň guşlarynyň iň täsin wekilleriniň biri.

329. Kiçi siňekçi – *Ficedula parva* – Малая мухоловка

Meýdan alamatlary: biziň faunamyzda iň maýda siňekçi. **Horazynyň üsti we kellesiniň gapdallary, boýny, petekesiniň çetleri we döşi külreňk-çal.** Arkasy we guýrugynyň üsti goňurak-çal, ganatlary we guýrugy goňur. **Bokurdagy we petekesiniň ýokarsy çypar.** Döşi, garny we guýrugynyň gapdallary inli ak zolakly. **Mäkiýanyň we ýaş guşlaryň bokurdagy çypar reňksiz, külreňk-çal öwüşgini goňur-çal reňk bilen çalyşýar.** Çüňki goňur, düýbi has açyk reňkli, gözleri agymtyl-mele, aýaklary we dyrnagy garamtyl-goňur. Çüňki goňurrak-sary, aýaklary goýy goňur. Guýrugyny we ganatlaryny bir wagtda silkemek endigi bolýar. Sesi – bölekleyin guraksy şowhun. Saýramaýan guşlar, aýratyn-da güýzine, ýygy-ýygydan iki goşulmaly “hii-li...hii-li” çagyryş owazyny edýär. Ganaty – 64-71, guýrugy – 48-57, söbügi – 16-18, çüňki – 6-7 mm, agramy – 8.5-12 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: **döşüniň çypar - gyzgyldygy** (horazy) bilen şapakça çalymdaşlyk edýär, yöne ondan özüni alyp barşy we

м от земли. Полные кладки из 3-4 яиц, обычно в середине мая. Яйца мутного зеленовато-голубоватого цвета, размеры – 15.6-19.1 x 12.1-13.6 мм. Питаются различными насекомыми (полужесткокрылые, жесткокрылые, гусеницы, перепончатокрылые, муравьи).

Статус: редкий вид с ограниченным распространением, один из интересных представителей птиц Койтендагского заповедника.

Полевые признаки: самая мелкая мухоловка нашей фауны. **У самца верх и бока головы, шеи, края зоба и груди пепельно-серые. Спина и надхвостье буровато-серые,** крылья и хвост бурые. **Горло и верх зоба рыжие.** Грудь, брюшко и широкие полосы по бокам хвоста белые. **У самки и молодых нет рыжего цвета на горле, а пепельно-серый цвет заменен буро-серым.** Клюв бурый, с более светлым основанием, глаза – бежевые, ноги и когти черно-бурые. Клюв буровато-желтый, ноги темно-бурые. Характерно одновременное подергивание хвоста и крыльев. Голос – сухой отрывистый треск. Не поющие птицы, особенно осенью, часто издают характерную двухсложную позывку «хии-ли... хии-ли». Крыло – 64-71, хвост – 48-57, цевка – 16-18, клюв – 6-7 мм, вес 8.5-12 г.

Сходства – отличия: узнается по **рыже-красной груди** (самец), похожа на зарянку, но легко отличается от нее поведением и **наличием белых пятен по бокам хвоста.**

guýrugynyň gapdallaryndaky ak tegmilleri bilen aňsat tanalýar.

Ýayran ýerleri: arealynda höwürtleýän ýerleri – Ýewraziýanyň Günbatar Ýewropadan Kamçatka çenli tokaý zology. Türkmenistanda – ýazyna we güýzine uçup geçende hemme ýerlerde duşýar. Hindistanda we Günorta-Gündogar Aziýada gyslaşýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän görnüş. Köpetdagda höwürtleýän bolmagy hem mümkin. Ýazyna martyň soňundan-aprelň ahyryna çenli, güýzine – awgustyň soňundan-noýabryň başyna çenli uçup geçýär. Mör-möjekler: maýda tomzaklar (ädikikenler, ýaprakijijiler), ikiganatlylar (maýda siňekler), seýrek kebelekler, olaryň içinkalary, perdeganatlylar (ýol arylary we byçgylaýjylar), möýler we ýasmyklar bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde köpsanly görnüş.

330, 331. Bellik: Günorta-Günbatar Türkmenistanda uçup geçýän guşlaryň arasynda **käte alaja – *Ficedula hypoleuca*** we **akboýun siňekçileriň – *Ficedula albicollis*** duşmaklary mümkin. Bu görnüşler bizdäki siňekçilerden horazlarynyň garşylykly garamtyl hem ak reňkleri bilen tapawutlanýarlar: aşagy ak, arkasy - gara ýalpyldyly reňkli, uçup barýarka ganatyndaky ak zolak we maňlaýyndaky ak tegmil anyk görünýär. Emma, akboýun siňekçiniň horazynyň ak boýunbagy we biliniň ak reňki eňsedinde birleşip tutuş ulgamy döredýär. Görnüşleriň mäkiýanleriniň ikisiniň hem aşagy agymtyl-çuparrak, arkasy - çalymtyl-goňňurak reňkli.

Распространение: гнездовая часть ареала – лесная зона Евразии от Западной Европы до Камчатки. В Туркменистане во время весеннего и осеннего перелетов встречаются повсеместно. Зимуют в Индии и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: Пролетный вид. Не исключено гнездование в Копетдаге. Весенний пролет с конца марта до конца апреля, а осенью – с конца августа до начала ноября. Насекомоядная птица, поедает мелких жуков (долгоносиков и листоедов), двукрылых (мелких мух), гусениц и реже бабочек, перепончатокрылых (наездников и пилильщиков), пауков и клопов.

Статус: обычная, местами многочисленная птица.

330, 331. Примечание: не исключено, что на пролетах спорадично может попадаться **мухоловка-пеструшка – *Ficedula hypoleuca***; в Юго-Западный Туркменистан иногда может залетать **мухоловка – белшейка – *Ficedula albicollis***. Эти виды отличаются от других наших мухоловок контрастной темно-белой окраской самцов: низ белый, а верх блестяще-черного цвета, обращает на себя внимание белый участок на крыле, хорошо заметный в полете, и белое пятнышко на лбу. Но у самцов мухоловки-белшейки имеется цельный, сходящийся на затылке, белый ошейник и белая поясница. У самок обоих видов низ беловато-рыжеватый, а верх серобурого цвета.

Jokjokylar – *Turdidae* - Дроздовые

Saýrak guşlar maşgalasy (agramy 150 g çenli). Dünýäniň polýar sebitlerinden başga hemme ýerlerinde ýayran. Guşlaryň köpüsi daýaw aýakly. Olar diňe bir tokaýlarda däl, eýsem beýleki agaç-gyrymsy agaçly we daşlyk ýerlerde hem gabat gelyärler. Agaçlaryň üstünde, köweklerde, ýerde, hinlerde, gaýalaryň jaýryklaryndan höwürtleýärler. Adatça, 2-6 sany ýumurtga goýýarlar. Esasan, mör-möjekler bilen iýmitlenýärler, güýz-gyş döwründe miweleri hem çokýarlar. Dünýäde 300-e golaý görnüş bar. Olardan 30-sy Türkmenistanda ýaşýar.

Семейство певчих птиц (масса до 150 г). Распространены по всему миру, кроме полярных областей. Ноги у большинства сильные. Встречаются не только в лесных, но и других – древесно-кустарниковых и каменистых местообитаниях. Гнездятся на деревьях, в дуплах, на земле, в норах, расщелинах скал. В кладке, обычно, 2-6 яиц. В основном – насекомоядные, в осенне-зимний период поедают и ягоды. В мире около 300 видов, из которых в Туркменистане – 30.

332. Şapakçy – *Erithacus rubecula* – Зарянка

Meýdan alamatlary: daşyndan uly ýaly görünýän gara gözli, togalagrak görnüşli, maýda (serçeden ep-esli kiçi) guş. **Mämişi-gyzylyt tegmil döşüni, bokurdagyny we duluklaryny gabaýar we ol maňlaýyna we gözüne çenli barýar.** Garny ak, bedeniniň üsti – çalymtyl-ýaşyl. Horazlary we mäkiýanlary reňkleri boýunça tapawutlanmaýarlar, yöne ýaş guşlar – mämişi-gyzylyt tegmilsiz ala reňkli. Aýaklary açyk goňur, çünki – goýu goňur. Gykylygy pert-pert pessaýja “tek...tek...”, käwagt ol pert-pert “sik...sik...” ýaly bolup eşidilýär. Ganaty – 66.5-75.0, guýrugy – 54.0-62.2, söbügi – 23.4-26.0, çünki – 8.7-11.8 mm, agramy – 14.2-16.0 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: döşüniň mämişi-çupar we arkasynyň çalymtyl-goňur reňki boýunça ýaşy yeten guşlary aňsat kesgitläp bolýar.

Полевые признаки: мелкая (несколько меньше воробья), круглой формы, изящная птица, с темными глазами, кажущимися большими. **Грудь, горло и щеки охватывает характерное оранжево-красное пятно, которое доходит до лба и глаз.** Брюшко белое, верх тела – серо-зеленый. Самцы и самки по окраске не отличаются, но молодые – пестрые без оранжево-красного пятна. Ноги светло-бурые, клюв темно-бурый. Издает тихий отрывистый крик «тек...тек...», иногда слышится отрывистое «цик...цик...». Крыло – 66.5-75, хвост – 54-62.2, цевка – 23.4-26, клюв – 8.7-11.8 мм, вес – 14.2-16 г.

Сходства – отличия: взрослые хорошо определяются по оранжево-рыжей окраске груди и серо-бурой спине. Схожи с самцами малой

Kiçi siňekçiniň horazlaryna meňzeş, ýöne tegmili bokurdagynda we petesi çypar däl-de, mämişiräk-gyzgylt, ol maňlaýyna we gözüne çenli barýar, guýrugynyň gapdallary bolsa ak me-neksiz.

Ýaşan ýerleri: höwürtegeleýän menzilleri Ýewropany tutuşlaýyn, demirgazyk çetlerinden galanlarynda, Ural daglaryny we Günbatar Sibiri bölekleyin öz içine alýar. Türkmenistanda – uçup geçende dürli ýerlerde duşmaklary mümkin.

Ýaşayşy: uçup geçýän, bölekleyin gyşlaýan görnüş. Ýazky migrasiýasy martyň soňunda-aprelde, güýzkisi – oktýabrda-noýabrda. Aglaba daglaryň jülgelerinde, baglyk ýerlerde, seýilgählerde we ýaşyl zolakly meýdanlarda saklanýar. Ýekelikde we jübüt bolup, ýerde, gyrymsylaryň we agaçlaryň üstünde gezyär. Adatça, ýerde towsup-gonup, agaçlaryň we gyrymsylaryň aşaklaryndan iýmit çöpleýär. Iýmiti – tomzaklardan, kebelekleriň we byçgylaryň liçinkalaryndan, ýasmyklardan, ikiganatylardan we beýleki mörmöjeklerden, şeýle-de möýlerden, kyrkaýaklardan durýar, güýzine we guşyna – ösümlikleriň miwelerini we tohumlaryny çokýar.

Statusy: az sanly guş.

333. Günorta bilbili – *Luscinia megarhynchos* – Южный соловей

Meýdan alamatlary: serçe ölçegli, gelişli guş. **Bedeniniň üstki tarapy** gowşak çalymtyl-ýaşylmytyl, has anyk guýrugynyň düýbinde ýüze çykýan öwüşginli, **birmeňzeş çypparak-goňur reňkli. Guýrugy çypar. Bedeniniň aşaky tarapy birmeňzeş kirliräk-melemtil - sarymtyl - ak,**

мухоловки, но пятно на горле и зобе оранжево-красное, а не рыжее и доходит до лба и глаз, а по бокам хвоста отсутствуют белые пятна.

Распространение: гнездовая область охватывает всю Европу, за исключением крайнего севера, Урал и частично Западную Сибирь. В Туркменистане может попадаться в разных частях во время пролета.

Образ жизни: пролетный, частично зимующий вид. Весенняя миграция с конца марта, в апреле, осенняя – в октябре-ноябре. Встречается чаще в горных ущельях, садах, скверах и парках. Держится в одиночку и парами на земле, кустах и деревьях. Пищу собирает в нижнем ярусе деревьев и кустарников, передвигаясь обычно по земле прыжками. Корм состоит из жуков, гусениц бабочек и личинок пилильщиков, клопов, двукрылых и других насекомых, а также пауков, многоножек, осенью и зимой охотно поедают ягоды и семена.

Статус: немногочисленная птица.

Полевые признаки: размером с воробья, но стройнее, **окраска сверху** однотонная, **рыжевато-бурая**, со слабым серо-зеленоватым оттенком, более выраженным в основании хвоста. **Хвост рыжий. Нижняя сторона тела однотонная, грязно-сливочно-белая,**

petekesi we döşi birneme gara we bokurdagy we garnynyň yzky bölegi has agarýar. Aýaklary goýy goňur, gözleri – aýyk goňur. Saýraýşy uzakdan eşidilýär. Sesi güýçli, owazly, dürli-dürli. Çagyryş sesi – pessaýja “fiuit-trr”. Ganaty – 85-95, guýrugy – 85.5-90.0, sobügi – 25-29, çüňki – 11.5-13.5 mm, agramy – 21.7-29.6 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: adaty bilbile çalymdaş, ýöne ondan ulurak we gelişlikleräk, reňkiniň has açykdygy we guýrugynyň uzyndygy bilen tapawutlanýar.

Ýaşan ýerleri: arealynda höwürtegeleýän bölegi – Günbatar we Günorta Ýewropa, Ortaýer deňzi, Kiçi, Alynky, Orta Aziýa we Gazagystan. Türkmenistanda – daglyklaryň we derýalaryň jülgeleri we oazisler, uçup geçende çöllüklerde duşmaklary mümkin. Merkezi Afrikada we Günorta Arabystanda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän höwürtegeleýän görnüş. Ýazyna apreliň başynda uçup gelýär, güýzine – awgust-sentyabrda uçup gidýär. Jeňňelliklerde, gürr tokajyklarda, dynç alyş baglyklarda, seýilgählerde, derýajyklaryň boýlaryndaky ekilen agaçlarda ýaşayar. Aprelde horazlary, adatça agaçlaryň üstüne çykur, ertirine, agşamyna we бүтін gijäniň dowamynda hyjuwly saýraýar. Mäkiýan guş ýerdäki çukurjykda ýada gyrymsylaryň aşaky böleginde höwürtege gurýar. Aprel-maýda 4-6 sany goňurrak-çalymtyl-ýaşyl reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 18.4-22.1 x 14.8-16.2 mm. Ýylda bir gezek köpelyär. Ýaş guşlar maýyň soňunda uçurym bolup, gyzlin gezyärler. Ýerden, otlaryň we topragyň üstünden mörmöjekleri çöpleýär: tom-

несколько более темная на зобе и груди, и почти белая на горле и задней части брюшка. Ноги темно-бурые, глаза светло-коричневые. Легко обнаруживается по пению. Песня громкая, звучная, разнообразная. Позывка – низкое «фиуит-трр». Крыло – 85-95, хвост – 85.5-90, цевка – 25-29, клюв – 11.5-13.5 мм, вес – 21.7-29.6 г.

Сходства и отличия: похож на обыкновенного соловья, но крупнее и стройнее, отличается более светлой окраской и длинным хвостом.

Распространение: гнездовая часть ареала – Западная и Южная Европа, Средиземноморье, Малая, Передняя, Средняя Азия и Казахстан. В Туркменистане – горные и речные долины и оазисы, на пролете может встречаться и в пустыне. Зимует в Центральной Африке и Южной Аравии.

Образ жизни: Пролетно-гнездящийся вид. Весной прилетает в начале апреля, отлетает осенью в августе-сентябре. Обитает в тугаях, густых рощах, парках, садах, древесно-кустарниковых насаждениях вдоль речек. Самцы в апреле интенсивно поют, обычно в кронах деревьев, по утрам, вечерам и в течении всей ночи. Гнездо строит самка на земле или в нижней части кустарников. Кладка из 4-6 буро-зеленоватых яиц, в апреле-мае, размеры – 18.4-22.1 x 14.8-16.2 мм. Обычно одна кладка в году. Молодые – с конца мая, держатся скрытно. Кормятся на земле, собирая пищу с травы и почвы, это различные насекомые – жуки, муравьи, гусеницы бабочек, клопы; могут по-

zaklary, garynjalary, kebelekleriň liçinkalaryny, ýasmyklary; ösümlikleriň miwelerini, aýratyn-da tudanany iýýärler.

Statusy: amatly şertli ýerlerde adaty, baglyklaryň we seýilgähleriň bezegi, guşlaryň arasynda owazy bilen saýlanýan saýrak guş. Emeli ýagdaýda saklanýan guş bolup biler, ýöne ol kapasada saýramaýar.

334. Adaty bilbil – *Luscinia luscinia* – Обыкновенный соловей

Meýdan alamatlary: serçäniň ölçeginde. **Üstki tarapy** çalymtyl-ýaşyl öwüşginli, guýrugynyň üstünde anyk bildirýän, **birmeňzeş goňurrak-melemtil reňkli. Guýrugu çyparrak-goňur. Petekesi, döşi, bedeniniň böwürleri kirliräk-çal, anyk saýlanyp duran insiz garamtyl dik çyzykly.** Garnynyň ortasy we bokurdagy agymtyl – kirliräk-ak. Aýaklary açyk goňur. Saýraýşy – dürli owazlaryň köp üýtgeýän we özbaşdak aýratynlygy bolan dürli sesleriň utgaşmalaryndan durýar. Çagyryş sesi edil günorta bilbilniňki ýaly. Ganaty – 79-91, guýrugu – 65.5-77.0, söbügi – 25-28, çüňki – 10.5-13.0 mm, agramy – 20.2-31.1 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: günorta bilbilinden meýdanda tapawutlandyrmak kyn, ýöne onuň **aşaky tarapy açyk-çypar däl-de kirliräk-çal we gysgalan guýrugynyň goňur reňki bolýar.**

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeýän bölegi – Günorta Ýewropanyň, Kawkazy we Sibiri hem öz içine alýar. Türkmenistanda – uçup geçende ýaýraň duşmagy mümkin, ýöne daglyklara tarap çekilýär. Günorta-Gündogar Afrikanyň tropik se-

едать ягоды, в частности тутовник.

Статус: в подходящих местах обычная птица, является украшением садов и парков, ценится как непревзойденный певец среди наших птиц. Может служить объектом клеточного содержания, но в неволе не поет.

Полевые признаки: размером с воробья. **Окраска сверху однотонно коричневато-бурая**, с серо-зеленоватым оттенком, отчетливее заметным на надхвостье. **Хвост рыжевато-коричневый. Зоб, грудь, бока тела грязно-серые, с тонкими отчетливо выраженными темными продольными штрихами.** Середина брюшка и горла светлее – грязно-белые. Ноги светло-бурые. Песня состоит из сочетания различных трелей, имеющих много различных вариаций и индивидуальных различий. Позывка как у южного соловья. Крыло – 79-91, хвост – 65.5-77, цевка – 25-28, клюв – 10.5-13 мм, вес – 20.2-31.1 г.

Сходства – отличия: в природе почти не отличим от южного соловья, однако, имеет **грязно-серую окраску низа и укороченный хвост коричневого, а не светло-рыжего цвета.**

Распространение: гнездовая часть ареала – умеренные широты Восточной Европы, включая Кавказ, и Сибири. В Туркменистане на пролетах может встречаться широко, но тяготеет к горным районам. Зимует в тропических областях

bitlerinde gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän görnüş, ýazyna apreliň soňunda we maýyň başynda, güýzine – awgustda we sentýabrda uçup geçýär. Ağaçdyr gyrymsy ağaçly, tokaý ağaçlarynyň gür ösen ýerlerinde, baglyklarda we seýilgählerde saklanýar. Dürli mörmöjekleri, ösümlikleriň miwelerini iýýär.

Statusy: bizde az sanly, käbir ýerlerde adaty guş, ýöne uçup geçen mahaly saýramaýany üçin, käbir göze ilmeýär.

335. Gökdamak bilbil – *Luscinia svecica* – Варакушка

Meýdan alamatlary: serçäniň ölçeginde, ýöne ykjam guş. **Horazynyň üsti çalymtyl-ýaşylymtyl öwüşginli birmeňzeş goňur, kellesinde düşnüksiz dik tegmilleri bolýar.** Gözüniň üsti agymtyl zolakly. **Bo-kurdagy we döşi tutuşlygyna açyk mawy, käjarym gök reňke boýalan ýaly**, onuň ortasynda ýyldyz görnüşli poslyrak-goňur ýa-da arassa ak tegmili ýerleşýär. **Döşüniň** aşaky gyrasy **gara we çypar zolaklar bilen jähekli.** Bedeniniň böwürleri çyparrak, ganatlary goňur, guýrugynyň düýbi çyparrak. **Mäkiýany garamtyl zolakly we döşli agymtyl menekli** we gowşak mawymtyl-çypar öwüşginli. Aýaklary agymtyl-gülgüneden gara çenli reňkli, çüňki garamtyl. Saýranda guşlar kellesini we guýrugyny ýokaryk galdyryýarlar. Saýraýşy owazly, dürli saýrak guşlaryň sesine öýkünmesi güýçli ösen. Gykylygy sesli “çак-çак”. Ganaty – 60.0-75.5, guýrugu – 50.2-68.8, söbügi – 23.2-29.0, çüňki – 9.2-13.0 mm.

Юго-Восточной Африки.

Образ жизни: пролетный вид, весной – в конце апреля и начале мая, осенью – в августе и сентябре. Придерживается различных древесно-кустарниковых участков, густых рощ, садов, парков. Кормится разнообразными насекомыми, поедает и ягоды.

Статус: у нас немногочисленная, местами обычная, но незаметная птица, поскольку на пролетах почти не поет.

Полевые признаки: размером с воробья, но стройнее. **Самец сверху однотонно-бурый, с серо-зеленоватым оттенком, на голове неясные продольные пестрины.** Полоска над глазом беловатая. **На всем горле и груди – ярко голубое, иногда почти синее поле**, в центре которого располагается ржаво-коричневое или чисто белое пятно в виде звездочки. С нижнего края **грудь оторочена черной и рыжей полосками.** Бока тела рыжеватые, крылья бурые, хвост рыжеватый у основания. **Самка имеет беловатую грудь с темной полосой и пестринами** и легким голубовато-рыжим оттенком. Ноги от бледно-розового до почти черного цвета, клюв черноватый. Во время пения птица высоко поднимает голову и хвост. Песня звучная, сильно развито звукоподражание многим певчим птицам. Крик – довольно громкое «чак-чак». Крыло – 60-75.5, хвост – 50.2-68.8, цевка – 23.2-29, клюв – 9.2-13 мм.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: horazlary açyk mawy reňkli, bokurdagy we döşi hem-de petekesi çypar tegmillidigi bilen bilbillerden tapawutlanýar. Mäkiýanlary öçügsi reňkli, guýrugynyň reňkiniň açyk çypar düýplidigi we ujynyň garamtyl zolaklydygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: giň, arealynda höwürtleýän bölegi - Ýewraziýanyň hemme ýerleri, gündogar we günorta - gündogar welaýatlaryndan başgalaryny öz içine alýar. Türkmenistanda - uçup geçende hemme ýerlerde görmek bolýar. Afrikanyň demirgazygyn-da, Alyňky, Günorta (Hindistan) we Günorta-Gündogar Aziýada gyslaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän guş, höwürtleýän bolmaklary hem mümkin. Ýazyna martyň ortasyndan-apreliň aýagyna çenli, güýzine - sentýabryň başyndan oktýabryň aýagyna çenli uçup geçýär. Dürli agaç-gyrymsy agaçly jeňňelliklerde ýaşayar, suw ýataklarynyň golaýyndaky çygly ýerlerde saklanýar. Esasan, mör-möjekler bilen ýymitlenýär.

Statusy: az sanly, uçup geçende käbir ýerlerde adaty guş.

336. Ak damak bilbil – *Irania gutturalis* – Соловей-белошейка

Meýdan alamatlary: serçeden sähelçe ulurak, arkasy külreňk-çal. **Boýunyň gapdallary we guýrugy gara, gaşy ak, bokurdagy üçburçak tegmilli.** Döşi we bedeniniň böwürleri açyk-çypar, garny agymtyl reňkli. **Mäkiýan guşlaryň arkasy goňurrak-çal, döşi goňurrak-çalymtyl-ýaşyl ýa-da çypar öwüşginli we düşnüksiz kese gara tegmilli.** Çünki we aýaklary gara. Guýrugyny oturanda sallamly ýaýkap, ony ýugnaýar we ýaýradýar. Saýraýşy – sesli owazlaryň toplumu. Gykylygy

Сходства – отличия: от соловьев самцы отличаются ярко-голубым горлом и грудью и рыжему пятну на зобе. Тускло окрашенные самки отличаются окраской хвоста – ярко-рыжее основание и темная полоса на конце.

Распространение: широкое, гнездовая часть ареала охватывает почти всю Евразию, за исключением восточных и юго-восточных областей. В Туркменистане на пролетах повсеместно. Зимуют в северной Африке, Передней, Южной (Индия) и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: пролетная птица, не исключено гнездование. Весенний пролет с середины марта до конца апреля, осенью – с начала сентября и до конца октября. Обитает в различных древесно-кустарниковых зарослях, тяготеет к сырым участкам вблизи воды. Питается, в основном, насекомыми.

Статус: немногочисленная, местами обычная на пролете птица.

Полевые признаки: чуть крупнее воробья, спина пепельно-серая. **Шея по бокам и хвост черные, бровь белая, на горле – треугольное белое пятно.** Грудь и бока тела ярко-рыжие, брюшко беловатое. **У самки спина буровато-серая, на груди буровато-серо-зеленый или рыжий налет и неясные поперечные темные пятна.** Клюв и ноги черные. Сидя, птица плавно покачивает хвостом, складывая и распуская его. Песня – набор громких трелей. Крик – негромкий свист,

– batsyzrak sykylyk bolup, güňleş sowhun bilen tamamlanýar. Mäkiýan guşyňky – seýrek, ýöne “basyp çykarma” sesli. Ganaty – 86.4-100.2, guýrugy – 67.4-85.2, sobügi – 23.5-27.2, çünki – 11.0-14.9 mm, agramy – 22.0-24.5 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: Türkmenistanda meňzeş görnüşleri ýok.

Ýaýran ýerleri: Kiçi, Alyňky we Orta Aziýanyň günorta (daglyk) bölegi. Türkmenistanda – Köýtendagda, Günorta Arabystanda we Gündogar Afrikada gyslaýar.

Ýaşayşy: höwürtleýän guş, aprelde uçup gelýär, awgustda – uçup gidýär. Dagyň eňňitlerindäki gyrymsy agaçlykda we arçalykda gezýär. Jübütleşýän döwründe horazlary açyk ýerde oturyp, uzakly gün saýraýarlar. Okara görnüşindäki höwürtleýän ýerden 30-150 sm ýokarda, arçada we beýleki gyrymsylarda ýerleşýar. Maý-iyunda 4-6 sany poslurak-goňur meneklije ýaşylymtly-gök ýumurtgalary goýýar. Dürli mör-möjekleriň (maslykçy tomzaklary, jyk-jyklary, ädiktikenleri, garynjalary) we ösümlikleriň miwelelerini iýýär.

Statusy: az sanly, çäkli ýaýran, amatly ýerlerde adaty guş, Köýtendag goraghanasynyň guşlarynyň iň täsin wekilleriniň biri.

337. Alaganat gyzylyguýruk – *Phoenicurus erythronotus* – Красноспинная горихвостка

Meýdan alamatlary: horazynyň kellesiniň üsti we boýny külreňk-çal, kellesiniň gapdallary inli gara zolakly. **Döşi, bokurdagy, arkasy, guýrugynyň üsti we guýrugy bölekleýin çypar reňkli.** Ganat-

заканчивающийся глухим треском. У самки – редкое, но звонкое «чеканье». Крыло – 86.4-100.2, хвост – 67.4-85.2, цевка – 23.5-27.2, клюв – 11-14.9 мм, вес – 22-24.5 г.

Сходства – отличия: в Туркменистане сходных видов нет.

Распространение: Малая, Передняя и южная (горная) часть Средней Азии. В Туркменистане – Койтендаг. Зимует в Южной Аравии и Восточной Африке.

Образ жизни: гнездящийся вид, прилетает в апреле, отлетает в августе. Древесно-кустарниковая птица, придерживается горных склонов, заросших кустарниками и арчевниками. В брачный период самцы поют почти весь день, сидя открыто. Гнездо в виде глубокой чаши, прикрепляется к веткам арчи и других кустарников на высоте 30-150 см от земли. Кладка из 4-6 зеленовато-голубых с ржаво-бурыми пятнами яиц, в мае-июне. Питаются различными насекомыми (жуки мертвоеды, чернотелки, слоники, муравьи) и ягодами.

Статус: немногочисленная, в подходящих местах обычная птица с ограниченным распространением, один из интересных представителей Койтендагского заповедника.

Полевые признаки: у самца верх головы и шеи пепельно-серые, по бокам головы широкие черные полосы. **Грудь, горло, спина, надхвостье и частично хвост – рыжие.** Крылья бурые с

lary dik ak zolakly goňur. **Mäkiýany** agymtylrak garynly, **goňurrak - çal**, guýrugy edil horazynyňky ýaly çypar. Aýaklary we çüňki gara. Ýerde guýrugyny uzygiderli çaykap, kiçiräk towsup hereket edýär. Sesi – “fýüit” ýiti sykylyk we basyk “trr”. Ganaty – 75.5-90.0, guýrugy – 67-82, söbügi – 21.0-23.5, çüňki – 8.5-12.0 mm, agramy – 18.5-22.1g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: horazy arkasynyň çypar reňklidigi we ölçegleriniň has uludygy bilen beýleki gyzylguýrukdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Orta we Merkezi Aziýanyň daglyk sebitleri. Türkmenistanda – Köýtendagda. Alynky we Günorta (Hindistanda) Aziýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: gyslaýan guş. Daglyklaryň we derýalaryň jülgelelerinde, az-owlak oazislarda agaç - gyrymsy agaçly ýerlerde mekan tutýar. Ýekelikde, jübüt we kiçiräk topar bolup gezýär. Köplenç, mörmöjekler, ýöne güýz-gyş döwründe esasan ösümlikleriň miweleri bilen iýmitlenýär.

Statusy: çäkli seýrek ýaýran, az öwrenilen guş.

338. Garaja gyzylguýruk – *Phoenicurus ochruros* – Горихвостка-чернушка

Meýdan alamatlary: serçe ölçeginde, **çyparrak garny we guýrugy ýelek örtüginin külreňk-gara reňkiden çürt-kesik tapawutlanýar. Horazy garamtylrak, guýrugy mämişiräk-gyzyl reňkli, ýöne bizde böwürleri we garny çypar horazlarynyň gabat**

продольной белой полосой. **Самка буровато-серая** с беловатым брюшком и рыжим, как у самца, хвостом. Ноги и клюв черные. По земле передвигается небольшими прыжками, постоянно подергивая хвостом. Голос – звонкий посвист «фьюить» и глухое «трр». Крыло – 75.5-90, хвост – 67-82, цевка – 21-23.5, клюв – 8.5-12 мм, вес – 18.5-22.1 г.

Сходства – отличия: от других горихвосток самец отличается рыжей спиной и более крупными размерами.

Распространение: горные районы Средней и Центральной Азии. Зимует в Туркменистане – в южной его половине; а также в Передней и Южной (Индостан) Азии.

Образ жизни: зимующая птица. Населяет участки с древесно-кустарниковыми насаждениями в горных и речных долинах, оазисах. Держатся в одиночку, парами и небольшими группами. Преимущественно насекомоядная птица, однако, в ее пище встречаются ягоды и другие растительные корма, которые осенью и зимой становятся основными.

Статус: редкая, малоизученная у нас птица.

Полевые признаки: размером с воробья, пепельно-черное оперение контрастирует с рыжеватым. **Самец с серой «шапочкой», верхняя сторона, горло и грудь – черные, а нижняя часть тела – коричнево-рыжеватая. У самки и молодых рыжеватых то-**

gelmegi hem mümkin. Ýelek örtügi guş döwründe çalymtyl öwüşginini alýar. **Mäkiýany çypar reňksiz, diňe çalymtyl-goňur çypar ýokundyly duşýar.** Çüňki we aýaklary gara. Bu gyzylguýruk hem, edil adaty gyzylguýruk ýaly elmydama guýrugyny galgadyr. Saýraýşy ses owazlaryndan durýar, olaryň arasynda gyjyrdyly sesler we dökülyän ownuk daşlaryň çygşyldysy ýaly özboluşly goh ýygy-ýygydan eşidilýär. Çagyryş sesi güýçli “fýuit-tik-tik”. Ganaty – 75.2-87.5, guýrugy – 56.0-69.8, söbügi – 21.0-25.5, çüňki – 8.6-12.8 mm, agramy – 12.8-18.3 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: maňlaýynyň çal reňklidigi we döşüniň tutuşlygyna garadygy bilen (horazy) adaty gyzylguýrukdan tapawutlanýar. Mäkiýanlary we ýaşlary meñzeş, emma adaty gyzylguýrukdan sähelçe garamtylrak.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtleýän bölegi Günbatar we Günorta Ýewropany, Kawkazy, Kiçi, Alynky, Orta we Merkezi Aziýany öz içine alýar. Türkmenistanda – daglyklarda. Günorta Ýewropada, Demirgazyk Afrikada, Arabystanda, Kiçi Aziýada we Hindistanda gyşlaýar.

Ýaşayşy: höwürtleýän görnüş, martyň ortasynda we aprelede uçup gelýär, sentýabrda uçup gidýär. Daglyklaryň derelerinde we gyrymsyly, arçaly gury eňnitlerde mekan tutýar. Höwürtleýäni adatyça jaýryklarda, ýerde ýa-da daşlaryň arasynda. Iýunda-iýulyň başynda 4-6 sany ak diýen ýaly ýa-da açyk mawumtyl-ýaşylymtyl ýumurtgalary goýýar. Ýumurtgalarynyň ölçegleri - 18.2-20.2 x 13-15.1 mm. Dürli mörmöjekler - tomzaklar, kekeneler, hozozanaklar, çekirtgeler, garynjalar, jyzlanlar bilen iýmitlenýär, jüýjelerini - kebelekleriň içinkalary, göniganat-

нов в оперении заметно меньше. Клюв и ноги черные. Эта горихвостка, также как обыкновенная, постоянно встряхивает хвостом. Песня состоит из трелей, среди которых часто слышатся скрипящие звуки, как бы схожие с шорохом осыпающихся камешков. Позывка – звонкое «фьюить-тик-тик». Крыло – 75.2-87.5, хвост – 56-69.8, цевка – 21-25.5, клюв – 8.6-12.8 мм, вес – 12.8-18.3 г.

Сходства – отличия: от обыкновенной горихвостки отличается серым цветом лба и черным на всей груди (самец). Самки и молодые схожи, но чуть темнее самок обыкновенной горихвостки.

Распространение: гнездовая часть ареала вида охватывает Западную и Южную Европу, Кавказ, Малую, Переднюю, Среднюю и Центральную Азию. В Туркменистане – в горных районах. Зимует в Южной Европе, Северной Африке, в Аравии, Малой Азии и на Индостане.

Образ жизни: гнездящийся вид, появляется с середины марта и в апреле, отлетает в сентябре. Населяют горные ущелья и сухие склоны с кустарниками, арчевники. Гнезда обычно в трещинах, на земле или между камнями. Кладка из 4-6 почти белых или бледно-голубовато-зеленых яиц, в июне-начале июля. Размеры яиц – 18.2-20.2 x 13-15.1 мм. В пище различные насекомые – жуки, божьи коровки, златки, клопы, саранчовые, муравьи, цикады, птенцов выкармливают гусеницами, прямокрылыми, бабочками, слепнями, пауками. В осеннее время поедают и мелкие ягоды.

lylar, kebelekler, gögeýinler we möýler bilen ýमितlendirýärler. Güýz döwründe maýdaja miweleri hem çokýar.

Statusy: az sanly (gizlin gezyän-digi we adaty gyzylyguýruk bilen meñzeşligi sebäpli, köp osoblary görülmän galýar), amatly şertli ýerlerde adaty guş.

339. Adaty gyzylyguýruk – *Phoenicurus phoenicurus* – Обыкновенная горихвостка

Meýdan alamatlary: gelşikli, serçe ölçegli. Çürt-kesik tapawutlanýan reňkli. **Horazynyň arkasy we kellesi külreňk-çal, maňlaýy ak. Ganatlary goňur, käte ak “aýnajykly”. Döşi, garny, böwürleri, ganatynyň aşagy we guýrugy – poslurak-gyzylyreňkli. Bokurdagy we kellesiniň gapdallary – gara. Aýaklary we çüňki – gara.** Mäkiýanynyň goňur reňki köp, guýrugynyň üsti we guýrugy çuparrak-gyzylymytyl. Aýaklary goýu goňur, çüňki – gara. Saýraýşy – pessaýja “fiii-çrr”, çagyryşy sykylykly – “fi-it, fi-it”. Ganaty – 71.0-84.5, guýrugy – 51-66, söbügi – 20.0-24.6, çüňki – 8.3-11.2 mm, agramy – 10.1-17.0 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: horazynyň maňlaýynyň akdygy, olary garaja gyzylyguýrugyň horazyndand tapawutlandyryýar. Mäkiýan guşlary tebigatda biri-birlerinden tapawutlandyrmak kyn.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeleýän bölegi – Ýewropany, Kiçi, Alynky Aziýany we Sibiri (Baýkal kölüne çenli) öz içine alýar. Türkmenistanda – uçup geçende hemme ýerlerde duşýar. Afrikanyň Merkezi sebitlerinde we Arabystanyň günortasynda guşlaýar.

Statusy: немногочисленная (из-за скрытного поведения и схожести с обыкновенной горихвосткой многие особи остаются незамеченными), в подходящих местах обычная птица.

Полевые признаки: размером с воробья, но заметно стройнее. Имеет контрастную окраску. **Спина и голова самца пепельно-серого цвета, лоб белый. Крылья бурые, иногда с белым «зеркальцем». Грудь, брюхо, бока, подкрылья и хвост – ржавчато-красного цвета. Горло и бока головы – черные.** Ноги и клюв черные. Преобладающая окраска самки бурая с рыжеватокрасноватым надхвостьем и хвостом. Ноги темно-бурые, клюв черный. Песня – не громкое «фиии-чрр», позывка – свистовое «фи-ить, фи-ить». Крыло – 71-84.5, хвост – 51-66, цевка – 20-24.6, клюв – 8.3-11.2 мм, вес – 10.1-17 г.

Сходства – отличия: самец отличается от самца горихвостки чернушки белым лбом. Самки в природе почти неразличимы.

Распространение: гнездовая часть ареала охватывает Европу, Малую, Переднюю Азию и Сибирь (до Байкала). В Туркменистане повсеместно на пролете. Зимует в Центральных областях Африки и на юге Аравии.

Образ жизни: пролетный вид, встречается как в горах, так и на равнинах весной – со второй по-

Ýaýraýşy: uçup geçýän görnüş, ýazyna apreliň ikinji ýarymyndan maýuň aýagyna çenli, güýzine – oktýabrda daglyk, şeýle-de düzlüklerde gabat gelýär. Dürli agaçdyr gyrymsy agaçly ýerlerde saklanýar. Ganatly garynjalary, ýasmyklary, ädiktikenleri, beýleki möjekleri awlaýar.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde az sanly guş.

340. Çemen jakjakysy – *Saxicola rubetra* – Луговой чекан

Meýdan alamatlary: serçeden maýda. **Horazynyň arka tarapy goýu-goňur, ýelekleri posluak-çal jähekli. Çüňkiden we gözünüň üstünden akzolak geçýär. Bokurdagy, petekesi we böwürleri garamtylrak-çupar, garny we guýrugynyň aşagy agymtyl-çupar reňkli. Guýrugynyň düýbi ak we ujy garamtylrak-goňur.** Çüňki we aýaklary gara. Mäkiýan guşyň reňki tutuk, ýaş guşlar alarak. Guýrugynyň düýbüniň gyalaryndaky ak tegmil ýerden göterilen wagty oňat görünýär. Guş ýygy-ýygydan gyrymsylaryň depesinde oturýar we wagtal-wagral guýrugyny ýaýkaýar. Sesi – “i-tek-i-tek-tek-tek”. Ganaty – 71-81, guýrugy – 43-50.6, söbügi – 20.5-23.5, çüňki – 8.5-12 mm, agramy – 14.1-18.7 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: agymtyl gaşy bilen garabaş jakjakydan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtlegeleýän bölegi tutuş Ýewropany, onuň günorta-günbatar we demirgazyk-gündogar etraplary, Kawkazy, Günbatar we Orta Sibiri öz içine alýar. Türkmenistanda dürli ýerlerde duşmagy mümkin, ýöne derýalaryň jül-gelerine we suw joşup giňän ýerlere ýakyn bolmagy halaýar. Afrikanyň

ловины апреля до середины мая, осенью – в октябре. Держатся в различных местообитаниях, предпочитают древесно-кустарниковые участки. Питаются крылатыми муравьями, клопами, долгоносиками, щелкунами и другими насекомыми.

Statusy: обычная, местами немногочисленная птица.

Полевые признаки: мельче воробья. У **самца спинная сторона темно-бурая** с ржавчато-серыми окаймлениями перьев. **От клюва и над глазом белая полоса. Горло, зоб и бока темно-рыжие,** брюхо и подхвостье бело-рыжеватые. **Хвост белый у основания и черновато-бурый на конце.** Клюв и ноги черные. Самка окрашена бледнее, молодые пестроватые. При взлете хорошо видны белые пятна по краям основания хвоста. Птицу часто можно видеть сидящей на вершине кустов. Время от времени взмахивает хвостом. Голос – «и-тэк-и-тэк-тэк-тэк». Крыло – 71-81, хвост – 43-50.6, цевка – 20.5-23.5, клюв – 8.5-12 мм, вес – 14.1-18.7 г.

Сходства – отличия: от чернолового чекана отличается светлой бровью.

Распространение: гнездовая часть ареала охватывает почти всю Европу, исключая ее юго-западные и северо-восточные районы, Кавказ, Западную и Среднюю Сибирь. В Туркменистане вид может быть встречен в разных местах, но тяготеет к поймам и долинам рек. Зимует в тропической Африке, в зоне саванн.

tropik ýerlerinde, sawanna zolagynda guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän guş, köplenç gyrymsy çemenliklerde jeňňellerde saklanýar. Ýeke ýa-da jübüt bolup gezýär. Tomzaklar, garynjalar, ýasmyklar, möýler, balykgulaklar, gurçuklar bilen iýmitleňýär.

Statusy: bizde seýrek, gowşak öwrenilen guş.

341. Garabaş jakjaky – *Saxicola torquatus* – Черноголовый чекан

Meýdan alamatlary: ululygy we reňki boýunça çemen jakjakyny ýatladýar, ýöne horazyň **kellesi, arkasy we ganatlary gara, gözünüň üsti ak zolaksyz. Döşi poslurak-çupar ýokundyly, garny we guýrugynyň üsti – ak. Boýunyň gapdallary inli ak zolakly.** Mäkiýanyň gara reňki goňurak-çal bilen çalyşýar. Ýaşlary ýagty dik menekli goňur. Çüňki we aýaklary gara. Saýraýşy – jikgildili owazlar. Ganaty – 62-72, guýrugy – 43.5-55.0, söbügi – 18.5-24.0, çüňki – 8.2-11.0 mm, agramy – 11.1-17.0 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: kellesiniň gara (horazy) ýa-da goňurdygy (mäkiýany) bilen çemen jakjakdan, boýnyndaky ak zolaklary bilen gara jakjakyň horazyndan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: giň, arealynda höwürtgelyän bölegi Ýewropany, onuň merkezi we demirgazyk oblastlaryndan başgalaryny we Aziýany, demirgazyk, günorta we günortagündogar böleginden başgalaryny, şeýle-de Afrikanýň günorta bölegini öz içine alýar. Türkmenistanda – Köpetdagda we onuň eteklerinde. Afrikada, Alynky Aziýada, Hindistanda guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtt-

Образ жизни: пролетный вид, населяет, преимущественно, сырые луга, заросшие кустарниками или высокими травами. Держатся в одиночку и парами. Питаются жуками, муравьями, клопами, пауками, моллюсками, червями.

Статус: у нас редкая, слабо изученная птица.

Полевые признаки: по величине и окраске очень напоминает лугового чекана, но у самца **голова, спина и крылья черные, отсутствует белая полоса над глазом. Грудь с ржаво-рыжим налетом, а брюшко и надхвостье – белые. По бокам шеи широкие белые полосы.** У самки черный цвет заменен буро-серым. Молодые – бурые со светлыми продольными пестринами. Клюв и ноги черные. Песня – щебечущая трель. Крыло – 62-72, хвост – 43.5-55, цевка – 18.5-24, клюв – 8.2-11 мм, вес – 11.1-17 г.

Сходства – отличия: от лугового чекана отличаются черной (самцы) или бурой (самки) головой, от самцов черного чекана – белыми полосами на шее.

Распространение: широкое – гнездовая часть ареала охватывает Европу, исключая ее центральные и северные области, и Азию, кроме северных, южных и юго-восточных частей, а также южную половину Африки. В Туркменистане – горы Копетдаг и его предгорья. Зимует в Африке, Передней Азии, Индии и Индокитае.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица, весенний пролет в

geleýän guş, ýazyna martda we apreliň birinji ýarymynda, güýzine – awgustda we oktyabryň ortasyna çenli uçup geçýär. Çemenliklerde ýa-da suw basan gyrymsylyklarda we ösgün otluklarda, düzlüklerde we daglyklarda ýaşayar. Çöllüklerden, we şorluklardan gaça durýar. Köplenç höwürtgisini ýerde, gyrymsylaryň ýa-da ösgün otlaryň aşagyndaky çukurjykda gurýar. Adatça, apreliň aýagynda we maýyň başynda 5-6 sany poslurak-gyzgylt meneklije kirliräk-ak ýa-da gögümtil öwüşginli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 15.3-18.7 x 12.8-13.7 mm. Mör-möjekler (tomzaklar, ýol arylary, ýasmyklar, garynjalar) we az mukdarda möýler, balykgulaklar bilen iýmitleňýär.

Statusy: az sanly, çäkli ýaýran görnüş.

342. Gara jakjaky – *Saxicola caprata* – Черный чекан

Meýdan alamatlary: serçe ölçeginde, horazlarynyň **ýelek örtüginini esasy reňki ak. Garnyndan, eginlerindäki we guýrugynyň üstündäki ak zolaklardan başga ýerleri gara.** Mäkiýan guşlaryň guýrugynyň üsti poslurak, goýu goňur, garny has açyk reňkli. Aýaklary we çüňki gara. Adatça, gyrymsynyň, daşlaryň depesinde ýa-da simleriň üstünde oturýar. Sesi – pert hökümlü owaz “tzak-tzak”, haçan-da guş bimaşa bolan ýagdaýynda üç bogunly sesleri çykarýar – “hwid-dzak-dzak”. Ganaty – 68.5-78.7 guýrugy – 51-58, söbügi – 21-23, çüňki – 9.9-11 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: gara-ak reňkleriň utgaşygy bilen beýleki jakjaklardan, ölçeginiň kiçi we

марте и первой половине апреля, осенний – с августа и до середины октября. Населяет луговые или пойменные участки с кустарниками и высоким разнотравьем, на равнинах и в горах. В пустынных районах и на солончаках не селится. Гнезда чаще всего устраивают на земле, в ямке, под прикрытием кустика или травы. Кладка из 5-6 грязно-белого или голубоватого оттенка с ржаво-красными пятнами яиц, обычно в конце апреля и мае. Размеры яиц – 15.3-18.7 x 12.8-13.7 мм. Питаются насекомыми (жуками, прямокрыльями, перепончатокрыльями, гусеницами бабочек, наездниками, клопами, муравьями) и в небольшом количестве паукообразными, моллюсками.

Статус: немногочисленный вид с ограниченным распространением.

Полевые признаки: размером с воробья, у самцов **основной цвет оперения черный, кроме белого брюшка, полосы на плечах и надхвостья.** Самка темно-бурая с ржавчатым надхвостьем, брюшко более светлое. Ноги и клюв черные. Обычно сидят на вершине куста, камня, или проводах. Голос – резкий настойчивый звук «тзак-тзак», когда птица возбуждена, издает трехсложный звук «хвид-дзак-дзак». Крыло – 68.5-78.7, хвост – 51-58, цевка – 21-23, клюв – 9.9-11 мм.

Сходства – отличия: от других чеканов отличается контрастной черно-белой окраской, от черной каменки – более мелким размером

eginleriniň ak belligi bilen gara çekeýikden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Alynky, Orta, Günorta, bölekleyin Günorta-Gündogar Aziýa we Hindi-Awstraliýa arhipelagynyň adalary. Türkmenistanda – daglyklarda, ähli derýalaryň jülgelerinde we oazislerde. Arealynyň günorta böleginde gyşlaýar.

Ýaşayşy: höwürtgelyän guş, apreliň soňunda uçup gelýär, awgustda-sentyabrda – uçup gidýär. Oazislardäki suw basan çygly çemenlikleriň we dag eteklerindäki howdanlaryň kenaryakalaryndaky ösgün otluklaryň, adamyň ýaşayan ýerine golaý bolan ýerleriň ýaşayjysy. Ýeke we jübüt bolup gezýär. Höwürtgisini ýerde, gyrymsylary penalaýan çukurjykda, harabalarda, malýataklarda gurýar. Maý-ijunda 4-5 sany yumurtga goýýar, ölçegleri – 15.2-19.2 – 12.9-15.0 mm. Esasan ýerdäki, oturan ýerinden uçup, awlap, yzyna gaýdyp gelip, dürli mör-möjekler – teneçirler, ýasmyklar, garynjalar şirejeler we başgalar bilen ýymitlenýär.

Statusy: adaty görnüş, iň giň ýaýrany bizdäki jakjakylar.

343. Boz çekeýik – *Oenanthe isabellina* – Каменка-плясунья

Meýdan alamatlary: özgelere garanyňda aýaklary uzyn, serçe ölçegli guş. **Arka tarapy çägepisint-goňur, solan ýagty gaşly.** Aşaky tarapy çägepisint-poslurak, petekesi we döşüniň öňki bölegi çägepisint reňkli. Ganatlary goýu goňur, **uç tarapy gara ak guýrukly.** Mäkiýany horazyna garanyňda tutuk reňkli. Çünki we aýaklary gara. Sesi – “çek-çek”. Saýraýşy sesli, aglaba guşlaryň dürli görnüşleriniň ses owazlarynyň

и белой отметиной на плечах.

Распространение: Передняя, Средняя, Южная, частично Юго-Восточная Азия и острова Индо-Австралийского архипелага. В Туркменистане – по горным и всем речным долинам и оазисам. Зимует в южных частях отмеченного ареала.

Образ жизни: гнездящийся вид, появляется в конце апреля, отлетает в августе-сентябре. Обитатель сырых пойменных лугов в оазисах и предгорий по берегам водоемов с высокими злаками, порой близости от человека. Держится в одиночку и парами. Гнезда на земле в основании кустиков, углублениях почвы, в полуразрушенных постройках и даже на скотных дворах. Кладка из 4-5 яиц в мае-июне, размеры – 15.2-19.2 x 12.9-15 мм. Кормятся, главным образом, на земле, слетая с куста и возвращаясь с добычей обратно. В пище различные насекомые – стрекозы, клопы, муравьи, тли и др.

Статус: обычный вид, наиболее распространенный из наших чеканов.

Полевые признаки: птица размером с воробья, с относительно длинными ногами. **Спинная сторона песчано-буроватая, неясно выраженная светлая бровь.** Низ песочно-ржавый, зоб и передняя часть груди песочного цвета. Крылья темно-бурые, **хвост белый, на конце черный.** Самка тусклее самца. Клюв и ноги черные. Голос – «чек-чек». Песня громкая, преимущественно комбинация голосов

toplumy, gemrijileriň hininde ýaşayandygy üçin, olaryň sesine ýygý-ýygýdan öýkünüýärler. Saýraýan horazy guýrugyny ýaýradyp, ýokaryk bir näçe metr göterilýär, az salym howada saklanyp, ýene-de yzyna gaýdyp gelýär. Ýerde çalt-çaltdan ylgaýar. Ganaty – 87.5-103.0, guýrugy – 52-62, söbügi – 28-34, çüňki – 13-16 mm, agramy – 21.9-35.5 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ganatynyň aşagynyň agymtyldygy we aýaklarynyň uzyndygy bilen beýleki çekeýiklerden tapawutlanýar. Ol öçügsi reňki bilen adaty we beýleki çekeýikleriň mäkiýanlaryna çalym edýär.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtgelyän bölegi Günorta-Gündogar Ýewropany, Kiçi, Alynky, Orta we Merkezi Aziýany we Gazagystany öz içine alýar. Türkmenistanyň düzlüklerinde, ýöne derýalaryň jülgelerinden we oazislerden, şeýle-de daglaryň ýokarky kemerlerinden çetde durýar. Demirgazyk-Gündogar we Gündogar Afrikada, Arabystanda, Alynky Aziýada we Hindistanda demirgazyk-gündogarynda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän höwürtgelyän, günorta raýonlarda bölekleyin gyşlaýan guş. Ýazyna fewralyň aýagynda we martda, güýzine – awgustda we oktýabryň soňunda uçup geçýär. Açyk landşaftyň peslik we seýrek ot örtüklü, gyrymsy, sazakly ýerlerini halaýar. Berkän we ýarym berkän çäge-çöllükde, dagöňi düzlüklerde we daglardaky sähra meýdanlarda gabat gelýär. Martyň ortasynda, gemrijileriň hinlerinde, käte gum gaýalaryň jaýryklarynda, daşlaryň arasynda höwürtgeli gurýar (esasan mäkiýany). Höwürtgesi hiniň

других видов птиц, часто подражают голосу грызунов, в поселениях которых эти птицы живут. Поющий самец обычно взлетает с развернутым веером хвостом круто вверх на несколько метров, зависает почти на одном месте, а затем возвращается. По земле бегают быстро. Крыло – 87.5-103, хвост – 52-62, цевка – 28-34, клюв – 13-16 мм, вес 21.9-35.5 г.

Сходства – отличия: от других каменок отличается светлым исподом крыла и более высокой посадкой на ногах, в целом более тусклой окраской, очень схожи с самками обыкновенной и других каменок.

Распространение: гнездовая часть ареала охватывает Юго-Восточную Европу, Малую, Переднюю, Среднюю и Центральную Азию и Казахстан. В Туркменистане распространена широко на равнинах, но речных долин и оазисов избегает, а также в горах до верхнего пояса. Зимует в Северо-Восточной и Восточной Африке, Аравии, Передней Азии и северо-востоке Индостана.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся, частично зимующая в южных районах птица. Весенний пролет с конца февраля и в марте, осенний – в августе и до конца октября. Предпочитают открытые ландшафты с низким и редким травянистым покровом, участки с небольшим количеством кустарников, разреженные саксаульники. Встречаются на закрепленных и полужакрепленных песках, в предгорьях и нагорных степях. Гнезда строят (в основном самки) в середине марта, обычно в норах грызу-

düybüräginde ýerleşýär (çuňlугy 40-310 sm çenli). Ýumurtgalarynyň gabygy gowşak ýalpyldyly ýylmanak, açyk-gөгүmtil reňkli, ölçegleri – 20.2-22.9 x 15.3-17.0 mm. Aprel-maý aýynda jüýjeleýär. Iýmiti ýerden we gemrijileriň hininden çөpleýär - mörmöjekler (garynjalar, tomzaklar, sarygarynjalar, çekirtgeler, ýasmyklar), sakyrtdgalar, eşekýassyklar, möýler, kyrkaýaklar, balykgulaklar, seýrek maýda suwulganlar.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde az sanly, çeкейikleriň arasynda giň ýaýran guş. Böz çeкейиги, şeýle-de çeкейikleriň beýleki görnüşleriniň gemrijileriň hinleri bilen baglanyşklydygy sebäpli, olaryň ýokanç we көрçülikleýin geçýän keselleri ýaýratmakda belli bir gatnaşygy bolýar.

344. Adaty çeкейик – *Oenanthe oenanthe* – Обыкновенная каменка

Meýdan alamatlary: bedeni süýrüräk bolup, **guýrugy gara-ak nagyşly**, serçeden sähelçe kiçi ölçegli guş. Horazynyň **kellesiniň üsti, boýny we arkasy çal**, käte bili çalymtyl-goňur ýokundyly. **Maňlaýy, gaşy we guýrugynyň üsti ak, ganatlary gara ýa-da garamtyl-goňur. Aşaky tarapy ak çyparrak öwşginli, ol döşünde has goýalyr.** Ganatynyň aşagy gara, ýelekleriniň gyrasy ak jähekli. Çünki we aýaklary gara. Mäkiýan we ýaş guşlar solak reňkli – çalymtyl-goňur. Mäkiýan guşlaryň arka tarapy çägepisint-çal, garny – çyparrak reňkli. Guşlar gysga towusmak bilen ýerde çalt hereket edýärler, duran mahaly edil “baş egýän” yaly aýagyny epýär we guýruguny galdyryp düşürýär. Uçanda guýruküsti

нов, иногда и в трещинах обрывов и скал, и между камнями. Гнездо помещается глубоко в норе (от 40 до 310 см). Яйца с гладкой, слабо блестящей скорлупой светло-голубого цвета. Размеры яиц – 20.2-22.9 x 15.3-17.0 мм. Птенцы – в апреле-мае. Корм собирают на земле и в норах грызунов. В пище насекомые (муравьи, жуки, термиты, саранчовые, клопы), клещи, мокрицы, пауки, многоножки, моллюски, реже мелкие ящерицы.

Статус: обычная, местами немногочисленная птица, наиболее распространенная среди каменок. Тесная связь каменки-плясуньи, как и других видов каменок, с поселениями грызунов обуславливает определенное эпизоотическое и эпидемиологическое ее значение.

Полевые признаки: размером чуть меньше воробья, но с удлиненной формой тела и характерным **черно-белым рисунком на хвосте**. У самца **верх головы, шея и спина серые**, поясница иногда с серо-бурым налетом. **Лоб, бровь и надхвостье белые, крылья черные или черно-бурые. Низ белый с рыжеватым оттенком, наиболее развитым на груди.** Испол крыла черный, с белыми каемками перьев. Клюв и ноги также черные. Самки и молодые окрашены тусклее – серо-бурые. У самки спинная сторона песочно-серая, брюшная рыжеватая. По земле передвигаются быстрыми короткими прыжками, остановившись, птица приседает – как бы «кланяется», и

ýelekleriniň akdygy oňat görünýär. Sesi anyk eşidilýän “i-çek-çek”. Ganaty – 86.0-105.0, guýrugy – 50-60, söbügi – 24.5-27.0, çünki – 11.5-15.5 mm, agramy – 20-27 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: horazy arkasynyň çaldygy bilen beýleki çeкейикlerden tapawutlanýar. Mäkiýanlary we ýaş guşlar bozçeкейиге, şeýle-de çeкейikleriň beýleki görnüşlerine örän çalymdaş, diňe döşüniň goýu çypardygy we ganatlarynyň has garamtyldygy bilen tapawutlandyrylýar.

Ýaýran ýerleri: giň – Ýewraziýanyň demirgazyk çetlerinden, gündogar, günorta-gündogar we günorta sebitlerinden başga, hemme ýerlerinde, Demirgazyk Amerikanyň demirgazygynda. Türkmenistanda – uçup geçende hemme ýerlerde, oazisinde azyrak duşýar. Alynky Aziýada, Hindistanyň demirgazyk-günortasynda, Günorta Arabystanda we Merkezi Afrikada, Demirgazyk Amerikanyň gündogar oblastlarynda guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtleýän guş. Ýazynda fewralyň soňunda uçup gelýär, martyň ortasyna çenli uçup geçmegi dowam edýär. Güzine – awgustyň soňundan oktyabryň aýagyna çenli. Açyk we gurak giňişlikleri halaýar, beýikli-pesli düzlüklerde we daglyklarda gezýär. Daglyklarda seýrek gyrymsyly, arçaly dag eňnitlerinde gezýär. Ýerde, gyrymsylaryň, daşlaryň üstünde ýeke we jübüt bolup duşýar. Gemrijileriň hinlerinde, gaýalaryň ýarçyklarynda, daşlaryň arasynda höwürte gurýar. Apreliň soňunda, maýda we iýunyň başynda 4-6 sany gyzylymtyl-goňur meneklije agymtyl - gögүmtilräk reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 19.8-21.2 x 15.2-16.6 mm. Dürli

дергает хвостом. В полете хорошо заметно белое надхвостье. Голос – отчетливое «и-чек-чек». Крыло – 86.0-105, хвост – 50-60, цевка – 24.5-27.0, клюв – 11.5-15.5 мм, вес 20-27 г.

Сходства – отличия: самец от других каменок отличается серой спиной. Самки и молодые очень похожи на каменку плясунью и самок других видов каменок, отличаясь лишь более темной рыжеватой грудью и более темными крыльями.

Распространение: широкое – почти вся Евразия, кроме крайнего севера, восточных, юго-восточных и южных областей, на севере Северной Америки. В Туркменистане на пролете повсеместно, в оазисах заметно меньше. Зимуют в Передней Азии, на северо-западе Индостана, в Южной Аравии и Центральной Африке, в восточных областях Северной Америки.

Образ жизни: пролетно-гнездящаяся птица. Весной появляются в конце февраля, пролет идет до середины марта. Осенью – с конца августа и до конца октября. Населяет открытые, сухие ландшафты на равнинах и в горах, предпочитают участки с пересеченной местностью. В горных районах, преимущественно, по склонам с разреженными кустарниками, арчевниками. Держатся в одиночку и парами на земле, кустах и камнях. Гнездо устраивают в норе, расщелинах скал, между камнями. Кладка из 4-6 бледно-голубых яиц, в конце апреля, мае и начале июня. Размеры яиц – 19.8-21.2 x 15.2-16.6 мм. Основной пищей служат различные насекомые: муравьи, мухи, прямокрылые,

mör-möjekler: garynjalar, siňekler, göniganatlylar, maýda tomzaklar, kebelekler esasy iýmiti bolup hyzmat edýär.

Statusy: az sanly, uçup geçende käbir ýerlerde adaty guş.

345. Sakar çeкейік – *Oenanthe pleschanka* – Каменка-плешанка

Meýdan alamatlary: Horazynyň kellesiniň üsti, boýny, bili we guýrugynyň üsti – ak, arkasy, ganatlary, eginleri, kellesiniň gapdallary, bokurdagy we petekesi – gara. Aşaky tarapy ak, käýarym döşünde çägepisint ýokundyly reňki bolýar. Guýrugynyň ak uçlary gara. Mäkiýanyň we ýaş guşlaryň arkasy we kelesiniň üsti goňurrak-çal, guýrugynyň üsti we gapdallary ak, bedeniniň aşaky tarapy çyparrak, döşi garamtyl. Çünki, aýaklary we dyrnaklary gararak. Horazlary depäniň üstünde oturyp ýa-da howada biraz ýokary göterilip saýraýarlar. Saýraýşy beýleki guşlaryň seslerine öýkünmelerden durýar. Gykylykly sesli “çek-çek”. Ganaty – 83-96, guýrugy – 55-65, söbügi – 22-26, çüňki – 8-10 mm, agramy – 15.5-22 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: horazlary arkasynyň garadygy bilen garaboýun çeкейіgiň horazlaryndan; ölçegleriniň kiçidigi we arkasyndaky gara reňkiniň has güýçli ösendigi bilen gara çeкейіgiň horazlaryndan tapawutlanýarlar; mäkiýanlary beýleki çeкейіkleriň mäkiýanlaryna çalymdaş, ýöne ony kellesiniň, döşüniň, arkasynyň we ganatlarynyň garamtyl-goňrasyrak-goňur öwüşginini tapawutlandyrýar.

Ýayran ýerleri: arealynda höwürtlegeýän bölegi – Günorta-Gündogar Ýewropa, Alynky Orta, Merkezi Aziýa, Günorta Gazagystan we Günorta Sibir. Biziň ýurdumyzyň üstünden

мелкие жуки, бабочки.

Статус: редко в гнездовое время, на пролете местами обычная птица.

Полевые признаки: у самца верх головы и шеи, поясница и надхвостье – белые, а спина, крылья, плечи, бока головы, горло и зоб – черные. Низ белый, на груди иногда налет песчаного цвета. Хвост белый с черным концом. У самки и молодых спина и верх головы буровато-серые, надхвостье и бока хвоста белые, низ тела рыжеватый, черноватый на груди. Клюв, ноги и когти почти черные. Самцы поют, сидя на возвышении или поднимаясь невысоко в воздух. Песня состоит из подражания голосам других птиц. Крик – звонкое «чек-чек». Крыло – 83-96, хвост – 55-65, цевка – 22-26, клюв – 8-10 мм, вес 15.5-22 г.

Сходства – отличия: самцы плешанки отличаются от самцов черношейной каменки черной спиной, а от самцов черной каменки – меньшими размерами и более сильным развитием черного цвета на спине; самки же похожи на самок других каменок, но отличаются темным коричневато-бурым фоном головы, груди, спины и крыльев.

Распространение: гнездовая часть ареала – Юго-Восточная Европа, Передняя, Средняя, Центральная Азия, Южный Казахстан и Южная Сибирь. У нас на пролете широко, на гнездовье тяготеет к южным – горным, а также районам

ýaýraň uçup geçýär, höwürtelände günorta – daglyklara, şeýle-de Türkmenistanyň demirgazyk-günbatar we demirgazyk sebitleriniň beýikli-pesli yerlerine süýşýär. Arabystanda, Merkezi we Gündogar Afrika-da gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän höwürtlegeýän guş, ýazyna martyň ortasyndan, güýzine – awgustda, sentýabrda we oktyabryň ortasyna çenli uçup gidýär. Çöllüklerde, dag eteklerinde we daglyklarda, jarlaryň, suw köwen gorplaryň daşlyrak yerlerinde saklanýar. Çuň yerleşen oýjagazda ýa-da daşlaryň aşagynda, gaýalaryň, jaýryklarynda, hinlerde höwürtle gurýar. Maý-iyunda 4-6 sany gyzylymtyl-goňurja menekli solak-gögümtil ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 17.8-20.7 x 14.3-16.3 mm. Oňurgasyzlary, köplenç, mörmöjekleri (tomzaklary, garynjalary, gije gezyän kebeleğiň liçinkalaryny, siňekleri, ýol arylaryny, göniganatlylary, ýasmyklary), möyleri we käýarym ösümlük miwelerini çokýar.

Statusy: az sanly guş.

346. Ala çeкейік – *Oenanthe hispanica* – Испанская каменка

Meýdan alamatlary: horazynyň ýokarysy we aşagy ak, käte kellesi çal öwüşginli we arkasy çyparrak ýokundyly. Bokurdagy, kellesiniň gapdallary we ganatlary – gara. Ak guýrugynyň uçlary gara. Çünki, aýaklary we dyrnaklary gara. Mäkiýan guşuň üsti goňur, guýrugynyň üsti ak, aşagy çyparrak, ganatlary goýy goňur. Saýraýşy edil adaty çeкейіgiňki ýaly we batsyz sykylyklardan we jikgildilerden durýar. Çagyryş sesi – “çek-çek”. Ganaty – 85-90, guýrugy – 55-59, söbügi – 22.5-24.5 mm, agramy – 16.5-18.5 g.

с пересеченной местностью на северо-западе и севере Туркменистана. Зимует в Аравии, в Центральной и Восточной Африке.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица, весенний пролет с середины марта, осенью – в августе, сентябре и до середины октября. Предпочитает щебнистые участки с оврагами и промоинами в пустыне, предгорьях и горах. Гнезда устраивают на земле в нишах под или между камнями, в трещинах скал, норах. Кладка из 4-6 бледно-голубых с красновато-коричневыми крапинками яиц, в мае-июне, размеры – 17.8-20.7 x 14.3-16.3 мм. Кормятся беспозвоночными, преимущественно, насекомыми (жуки, муравьи, гусеницы пядениц, мухи, наездники, прямокрылые, клопы), пауками, иногда поедают ягоды.

Статус: немногочисленная птица.

Полевые признаки: у самцов верх и низ белый, иногда с серым оттенком на голове и рыжеватым налетом на спине. Горло и бока головы и крылья – черные. Хвост белый с черным концом. Клюв, ноги и когти черные. Самки сверху бурые, надхвостье белое, низ рыжеватый, крылья темно-бурые. Песня как у обыкновенной каменки и состоит из негромких свистов и щебетаний. Позывка – «чек-чек». Крыло – 85-90, хвост – 55-59, цевка – 22.5-24.5 мм, вес – 16.5-18.5 г.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: daşky görnüşi we ölçegler boýunça sakar çekeýige örän çalymdaş, diňe horazlary arkasynyň açyk reňklidigi bilen tapawutlanýarlar; horazlary ganatlarynyň tutuşlygyna, uçan mahaly, oňat görünüň gara reňki bilen garaboýun çekeýigiň horazlaryndan tapawutlanýarlar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeýän oblastlary Ortaýer deňzini, Kawkazy, Kiçi we bölekleyin Öňki Aziýany öz içine alýar. Türkmenistanda – Köpetdagda. Afrikanyň tropik ýerlerinde gyşlaýar.

Ýaşayşy: höwürtegeýän görnüş, gaýalary halaýar. Gaýalaryň ýarçyklarynda we daşlaryň arasynda höwürtege gurýar. Aprel-maýda 4-5 sany solak-gögümtil ýumurtgalary goýýar. Edil beýleki çekeýikler ýaly iýmitlenýär.

Statusy: seýrek, çäkli ýaýran, gowşak öwrenilen guş

347. Gara çekeýik – *Oenanthe picata* – Черная каменка

Meýdan alamatlary: horazynyň guýruynyň düýbi ak bolup, tutuşlygyna gara, edil şonuň ýaly döşünde, garnynda, bölekleýin kellesinde ak reňki bolýar. **Ganatlary goýu-goňur. Guýrugy ak, uçlary goýu-goňur ýada gara.** Mäkiýanlarda we ýaş guşlarda gara reňk goňur bilen çalyşýar. Çünki, aýaklary we dyrnaklary gara. Saýraýşy – ýakymсызrak sesli, ýöne gaty “žr-r-ryk, žr-r-ryk”. Ganaty – 80-98, guýrugy – 58-70, söbügi – 22-26, çüňki – 10-14 mm.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: çekeýikleriň beýleki görnüşlerine meñzeş, ýöne kellesi, arkasy, käte garny gara bolýar, emma, kellesiniň

Сходства – отличия: по внешнему облику и размерам похожа на каменку-плешанку, отличие – светлую спину имеют только самцы; от самцов черношейной каменки отличаются полностью черными крыльями, что хорошо заметно в полете.

Распространение: область гнездования охватывает Средиземноморье, Кавказ, Малую, и частично, Переднюю Азию. В Туркменистане – в Копетдаге. Зимуют в тропической Африке.

Образ жизни: гнездящийся вид, предпочитает каменистые участки с выходами скал. Гнезда устраивает в расщелинах и среди камней. Кладка из 4-5 бледно-голубых яиц, в апреле-мае. Объекты питания как у других каменок.

Статус: редкая, слабо изученная птица с ограниченным распространением.

Полевые признаки: **самец весь черный с белым основанием хвоста или же белый цвет имеется также на груди, брюшке и, частично, на голове.** Крылья темно-бурые. Хвост белый с темно-бурым или черным концом. У самок и молодых черный цвет заменен бурым. Клюв, ноги и когти черные. Пение – невыразительное, но громкое – «жр-р-рык, жр-р-рык». Крыло – 80-98, хвост – 58-70, цевка – 22-26, клюв – 10-14 мм.

Сходства – отличия: схожа с другими видами каменок, но имеет черную голову, спину, иногда и брюхо, однако, встречаются птицы

üsti ak bolan sakar çekeýiklere çalymdaş guşlar hem gabat gelýär, olar ondan ölçegleriniň has uludygyny we arkasyndaky gara reňkiň gabaýan yeriniň köpdügi bilen tapawutlanýar. Mäkiýany beýleki çekeýikleriň mäkiýanyndan goýu goňur reňki bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeýän bölegi – Alynky Aziýanyň demirgazyk we Orta Aziýanyň güňorta oblastlary bilen çäklenýär. Türkmenistanda – daglyklaryň hemme ýerlerinde. Höwürtegeýän arealynyň güňorta çäklerinde – Güňorta Eýranda, Päkistanda we Demirgazyk-Cünbatar Hindistanda gyşlaýar.

Ýaşayşy: höwürtegeýän görnüş, bir bölegi güňortada, pes daglyklarda gyşlaýar. Ýazyna martyň ortasyndan uçup gelýär, güýzine – sentýabr-oktyabrda uçup gidýär. Köplenç beýk bolmadyk daşlyrak, çölleşen, gyrymsy agaçlaryň juda az bolýan gury derelerinde, käte jarlaryň we suw köwen gorply daş-lyrak we toýünsow gaýaly ýerlerinde gezýär. Gaýalaryň insiz ýarçyklarynda, daş üýşmekleriniň hinlerinde höwürtege gurýar, uly gaýa daşdezeniň köne höwürtegelerini eýelemekleri hem mümkin. Ýylda iki nesil ösdürüp ýetişdirýär: birinjisi aprel-maýda, ikinjisi – maýyň soňunda we iýunyň birinji ýarymynda. Çekirtgeleri, tomzaklary, ýasmyklary, garynjalary, taýajyklary, kebelekleriň liçinkalaryny we möýleriň pilelerini çokýar.

Statusy: adaty, ýaşayş üçin amatly ýerlerde köpsanly guş.

348. Garaboýun çekeýik – *Oenanthe finschii* – Черношейная каменка

Meýdan alamatlary: horazynyň kellesi çalymtly öwüşginli **bolup,**

с белым верхом головы, которые похожи на плешанку, но отличаются от нее более крупными размерами и большим охватом черного цвета на спине. Самки отличаются от самок других каменок темно-бурой окраской.

Распространение: гнездовая часть ареала ограничена Передней и южными областями – в Средней Азии. В Туркменистане – во всех горных районах. Зимует у южных пределов гнездового ареала – в Южном Иране, Пакистане и Северо-Западной Индии.

Образ жизни: гнездящийся вид, на юге, в низкогорьях, часть особей зимует. Весенний прилет с середины марта, осенью отлетают в сентябре-октябре. Населяют, преимущественно, каменистые, пустынные, но не очень высокие горы со скудной растительностью, склоны и сухие ущелья, иногда лессовые, чаще каменистые обрывы по впадинам и оврагам. Гнезда устраивают в узких расщелинах скал, в кучах камней, иногда в норах мелких грызунов, могут поселяться в старых гнездах скалистых поползней. Две кладки: первая – в апреле-мае, вторая – в конце мая-первой половине июня. Кормятся саранчевыми, коконами пауков, жуками, клопами, муравьями, палочниками, гусеницами бабочек.

Статус: обычная, в подходящих местообитаниях многочисленная птица.

Полевые признаки: **у самца нижняя сторона тела, спина и**

bedeniniň aşaky we üstki taraplary ak, kellesiniň gapdallary, boýny, bokurdagy we eginleri – gara. Ganatlary garamtyl, guýrugy ak, uçlary gara. Çünki, aýaklary we dyrnaklary garamtyl. **Mäkiýanlaryň we ýaş guşlaryň üstki tarapy çalymtyl-goňur, ganatlary goňur, bokurdagy we petekesi garamtyl-çal, garny we guýrugynyň düýbi – ak.** Saýraýşy – dürli seslere we beýleki guşlaryň saýraýuş owazlaryna öýkünmeler. Çagyryş sesi pert – “çek-çek”. Ganaty – 88-95, guýrugy – 65-70, söbügi – 23-28, çüňki – 17-18 mm, agramy – 20.5-32.3 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: horazlary daşky görnüşi boýunça sakar çekeýikleriň horazlaryny ýatladýar, ol ölçegleriniň has uludygy we arkasynyň akdygy tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Kiçi, Alynky we Orta Aziýa, Günorta-Günbatar Gazagystan, Demirgazyk-Gündogar Afrika, Ýakyn Gündogar we Arabystanyň demirgazygy. Türkmenistanda – daglyk ýerlerde we demirgazykda – Günorta Üstýurtda we Garabogaz ýakasynda, Garagumda-käbir ýerlerinde. Höwürtgelyän arealynyň çäginde we onuň günorta böleklerinde gyşlaýar.

Ýaşaýşy: höwürtgelyän we uçup geçýän guş, ýurdyň günortasynda bölekleyin gyşlaýar. Ýazyna martyň ortasynda uçup gelyär, güýzine – sentýabrda, oktyabryň başynda uçup gidýär. Dagyň gaýaly, tokaýsyz ýerlerinde, dykzlaşan çäge we daşlygrak beýikli-pesli ýerlerinde ýaşaýar. Daşlaryň arasynda, gaýalaryň köweklerinde we gemrijileriň hinlerinde (syçanlaryň) höwürtgelyän gurýar. Höwürtgelyäni bir-

верх головы белые с серым оттенком, а **бока головы, шеи, горло и плечи – черные.** Крылья темные, хвост белый с черным концом. Клюв, ноги и когти темные. **У самок и молодых верх серовато-бурый, крылья бурые, горло и зоб черно-серые, брюшко и основание хвоста – белые.** Песня – подражание различным звукам и голосам других птиц. Позывка – резкое «чек-чек». Крыло – 88-95, хвост – 65-70, цевка – 23-28, клюв – 17-18 мм, вес – 20.5-32.3 г.

Сходства – отличия: самцы внешне напоминают самцов плешанок, но отличаются более крупными размерами и белой спиной.

Распространение: Малая, Передняя и Средняя Азия, Юго-Западный Казахстан, Северо-Восточная Африка, Ближний Восток и север Аравии. В Туркменистане – в горных областях и на севере – Южный Устюрт и Прикарабогазые, локально в Каракумах. Зимует в пределах гнездового ареала – в его южных частях.

Образ жизни: гнездящаяся пролетная птица, на юге страны частично зимует. Прилет весной с середины марта, осенний отлет – в сентябре, начале октября. Населяет скалистые безлесные участки гор, плотнопочвенные пески, щебнистые и другие места с пересеченным рельефом. Гнезда устраивает среди камней, в нишах скал и в норах грызунов (песчанки). Гнезда используют несколько (до трех) лет подряд. У входа в гнездо камешки обычно собирают большое количество мелких плоских камешков. Та-

näçe ýyllap yzygiderli ulanýar (üç ýyla çenli). Ol höwürtgelyäniň girelgesiniň agzunda köpsanly maýdaja daş-jagazlary üýşürýär. Daş üýşmeji höwürtgelyäniň agzyny doly gabaýar. Apreliň soňunda we maý-ýulda 4-6 sany gögümtil ýumurtgalary goýýar. Türkmenistanyň şertinde üç gezek ýumurtga goýmaklary mümkin. Esasan möýler, gijeki kebelekleriň içinkalary, garynjalar, tomzaklar, çekirtgeler bilen iýmitleňýär.

Statusy: adaty, ýaşaýuş üçin amatly ýerlerde köpsanly guş.

349. Çöl çeкеýиги – *Oenanthe deserti* – Пустынная каменка

Meýdan alamatlary: horazynyň kellesiniň üsti we ýeňsesi çalymtyl-çyparrak, guýrugynyň üsti agymtyl-çyparrak, arkasy – çyparrak. Gaşy açyk reňkli. Bokurdagy, boýynyň gapdallary we kellesi gara, bedeniniň aşaky tarapy ak ýa-da çyparrak ýokundyly, döşi has açyk reňkli. Ganatlary gara diýen ýaly, ýeleklери ak jäheкли. **Mäkiýan we ýaş guşlaryň bokurdagy we kellesiniň gapdallary gara reňksiz, ganatlary we guýrugy – goňurak.** Çünki, aýaklary we dyrnagy goňurak. Saýraýşy – beýleki guşlaryň dürli seslerine we owazlaryna öýkünmeler. Çagyryş sesi pert – “çek-çek”. Ganaty – 85-97, guýrugy – 55-67, söbügi – 23-28, çüňki – 11-14.5 mm, agramy – 16.3-22.0 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: horazlary arkasynyň çypardygy bilen beýleki çeкеýикlerden tapawutlanýar. Mäkiýanlar we ýaş guşlar beýleki çeкеýикleriň mäkiýanlaryna çalymdaş, olary diňe has açyk reňkleri tapawutlandyryar.

Ýaýran ýerleri: höwürtgelyäniň

кое заграждение может полностью прикрыть гнездо. В кладке 4-6 голубых яиц, в конце апреля, мае-июле. В условиях Туркменистана – до 3-х кладок. Питаются преимущественно, пауками, гусеницами ночных бабочек, муравьями, жуками, саранчевыми.

Статус: обычный, а в подходящих местообитаниях более чем обычный вид.

Полевые признаки: у самца верх головы и затылок серовато-рыжеватые, надхвостье беловато-рыжеватое, а спина рыжеватая. Бровь светлая. Горло, бока шеи и головы черные, нижняя сторона тела белая или с рыжеватым налетом, более ярким на груди. Крылья почти черные, с белыми окаймлениями перьев. **У самки и молодых отсутствует черный цвет на горле и боках головы, а крылья и хвост буроватые.** Клюв, ноги и когти буроватые. Песня – подражание различным звукам и голосам других птиц. Позывка – резкое «чек-чек». Крыло – 85-97, хвост – 55-67, цевка – 23-28, клюв – 11-14.5 мм, вес – 16.3-22 г.

Сходства – отличия: самцы от других каменок отличаются рыжей спиной. Самки и молодые очень похожи на самок других каменок, отличаясь лишь более светлой окраской.

Распространение: область гнездования охватывает Центральную, Среднюю (включая равнин-

ýerleri Merkezi, Orta (Türkmenistan) we Alyňky Aziýany, Demirgazyk Arabystan we Demirgazyk Afrikany (Sahara) öz içine alýar. Arealynda höwürtegeleýän böleginiň günorta oblastlarynda we oňa ýanaşyk ýerlerde – Gündogar Afrikada, Günüorta Arabystanda, Demirgazyk Hindistanda guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-höwürtegeleýän görnüş, ýazyna martda, güýzine – sentýabryň soňunda we oktýabrda uçup geçýär. Esasan selçen ösen gyrymsyly çägeçöllüklerde we beýikli-pesli ýerlerde (suw akan jarly, källi, köwli, gorplary) gabat gelyär. Aýry-başga jübüt bolup höwürtegeleýär. Gemrijileriň hinlerinde ýel ýukan agaçlaryň kökleriniň, sütünleriniň aşagynda, seýrek sazagyň köweklerinde höwürtege gurýar. Aprel-iyulda 4-6 sany solak-gögümtil ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 18.1-21.2 x 14.2-16.0 mm. Ýerde gezýän mör-möjekleri – göniganatlylary, tomzaklary, ýasmyklary, kebelekleriň liçinkalaryny, garynjalary we teneçirleri tutýar.

Statusy: az sanly, biziň çöllermiziň kábir ýerlerinde adaty guş.

350. Gyzyguýruk çeкеýік – *Oenanthe chrysopygia* – Златогузая каменка

Meýdan alamatlary: guşyň üstki tarapy çalymtyl-goňur, kellesi çalymtyl-rak, bili açyk-çyppak, ganatlary goýu-goňur, ýelekleri çalymtyl-jähekli, bokurdagy we petekesi agymtyl, bedeniniň aşaky bölegi çyppak-goňur. **Guýrugy altynsow-çyppar, uýy gara zolakly.** Çünki we aýaklary gara. Saýranynda çeкеýікleriň köpüsine mahsus bolan, dürli seslere öýkünmeler – uçýan guşlaryň ganatlarynyň şuwuldysy, şemalyň sesi we başgalar. Çagyruş

ный Туркменистан) и Переднюю Азию, Северную Аравию и Северную Африку (Сахара). Зимует в южных областях гнездовой части ареала и за его пределами – в Восточной Африке, Южной Аравии, Северной Индии.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся вид, весной пролет с марта, осенью – с конца сентября и в октябре. Населяет, преимущественно, песчаные пустыни с разреженной растительностью, встречаются и на участках с пересеченным рельефом (овраги, сухие промоины). Гнездятся обособленными парами. Гнезда устраивают в норах грызунов, среди корней и под упавшими стволами, редко в дупле саксаула. Кладка из 4-6 бледно-голубых яиц, в апреле-июле, размеры – 18.1-21.2×14.2-16 мм. Корм добывают на земле, в основном, это насекомые: прямокрылые, жуки, клопы, гусеницы бабочек, муравьи и стрекозы.

Статус: немногочисленная, местами обычная птица наших пустынь.

Полевые признаки: сверху птица серовато-буроватая, голова сероватая, поясница светло-рыжеватая, крылья темно-бурые с сероватыми каймами перьев, горло и зоб беловатые, нижняя часть тела рыжевато-буроватая. **Хвост золотисто-рыжий с черной полосой на конце.** Клюв и ноги черные. Как и многие каменки, в пении подражает различным звукам – свисту крыльев летящей птицы, свисту ве-

sesi batly – “çek-çek”. Ganaty – 90-96, guýrugy – 62-66, çünki – 18-20 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: guýrugynyň düýbinde we bilinde çyppar reňkiň bardygy bilen bizdäki beýleki çeкеýікlerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeleýän bölegi Alyňky Aziýany – Iragyň, Eýranyň, Päkistanyň, Owganystanyň daglyklaryny, Türkiýäniň gündogaryny hem öz içine alýar; Türkmenistanda – Merkezi Köpetdagda. Höwürtegeleýän ýerleriniň günortasynda, şeýle-de Hindistanyň demirgazy-günbatarynda, Arabystanyň demirgazygynda we Afrikanyň günorta-gündogarynda guşlaýar.

Ýaşayşy: höwürtegeleýän görnüş, daglaryň deňiz derejesinden 1200-2500 m ýokarda daşly eňňitleri eýeleýär. Gaýalaryň ýarçyklarynda, daşlaryň arasyndaky boşluklarda höwürtege gurýar. Maý-iyunda 4-5 sany çala görüňän gögümtil garyndyly ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 19.5-21.0 x 15.6-16.3 mm. Iýmiti edil beýleki çeкеýікleriňki ýaly.

Statusy: seýrek görnüş, Köpetdag goraghanasynyň guşlarynyň iň täsin wekilleriniň biri.

351. Tokaý bilibili – *Erythropgia galactotes* – Тугайный соловей

Meýdan alamatlary: ölçegleri serçeden şähelçe ulurak. Guýrugy uzalan we basgançakly. Arka tarapy çyppar öwüşginli çalymtyl-goňur. Ak gaşy oňat görüňär, gözünüň üstünden insiz gara zolak geçýär. Bokurdagy, döşi we garyny agymtyl. **Ýelpewaç ýaly ýaýraýan çyppar guýrugynyň uýyndaky gara-ak zolak uçan mahaly anyk görüňär.** Çünki goňur, aýaklary edil şonuň ýaly,

тра и т.д. Позывка – громкое «чек-чек». Крыло – 90-96, хвост – 62-66, клюв – 18-20 мм.

Сходства – отличия: от других наших каменок отличается присутствием рыжего цвета в основании хвоста и на пояснице.

Распространение: гнездовая часть ареала охватывает Переднюю Азию – горные районы Ирака, Ирана, Пакистана, Афганистана, восток Турции; в Туркменистане Центральный Копетдаг. Зимует на юге гнездовой области, а также на северо-западе Индии, севере Аравии и юго-востоке Африки.

Образ жизни: гнездящийся вид, населяет горные каменистые склоны на высотах 1200-2500 м н.у.м. Гнезда в расщелинах скал, в промежутках между камнями. В кладке 4-5 белых с едва заметной голубоватой примесью яиц, в мае-июне, размеры – 19.5-21×15.6-16.3 мм. Питание, как и у других каменок.

Статус: редкий вид, с ограниченным распространением. Один из интересных представителей птиц Копетдагского государственного заповедника.

Полевые признаки: размером несколько больше воробья. Хвост удлиненный и ступенчатый. Спинная сторона серовато-бурая с рыжеватым оттенком. Хорошо видна белая бровь, а через глаз проходит узкая темная полоска. Горло, грудь и брюшко беловатые. **В полете хорошо заметна черно-белая полоса на конце веерообразно распущенного рыжего хвоста.** Клюв

ýöne gowşak sarymtylrak ýokundyly. Gözleri gyzylymtylrak. Saýraýşy – sykylyklaryň we ses owazlarynyň toplumu. Gykylyk sesi pert – “tsi-tsi”. Ses owazlarynyň düzüminde jýrryldama ýygy-ýygydan bar ýaly eşidilýär. Uzynlygy – 150-160, ganaty – 79-92, ganatlarynyň gerimi – 220-227 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: bilbile çalymdaş, ýöne çypar guýrugyndaky gara we ak zolaklary bilen anyk tapawutlanýar.

Ýaşýan ýerleri: arealynda höwürtgelyän bölegi – Ortaýer deňzi, Kawkaz, Kiçi, Alynky, Orta Aziýa, Günorta Gazagystan. Türkmenistanda giň ýaşraň, ýöne düzlük giňişliklerde, köplenç derýalaryň jülgelerine we oazislere çekilýär. Owganystanda, Päkistanda, Arabystan ýarym adasynyň günortasynda, Gündogar Afrikada gyşlaýar.

Ýaşýşy: höwürtgelyän görnüş. Ýazyna apreliň ortasyndan maýyň ortasyna çenli uçup gelýär, güýzine – awgustyň soňundan sentýabryň ortasyna çenli uçup gidýär. Derýalaryň jülgelerinde mekan tutýar – gür bolmadyk toraňnyly we gyrymsyly, köp ösen ýylgynly jeňňelliklerde, çöllüklerde, sazakyklarda, dag eteginde – seýrek ösen gyrymsylyklarda, oazislerde – selçeň ösen agaç-gyrymsyly agaçly ýerlerde ýaşaýar. Adatça sazак, gandym, ýabany igde, ýylgyn sütünlerinde we beýleki gyrymsylaryň döwlen ýerlerinde harsalrak we ýümşак höwürтge gurýar. Maý-iyunda 3-5 sany goňur meneklije (kütek tarapynda toplanan) solak-ýaşylymytl ýada gögümtil ýumurtгалary goýýar, ölçegleri – 20-22 x 15.3-16.7 mm. Adatça iyunda jüýjeleýär. Iýmitinde maýda tomzaklar (ädiktenler, süýt

бурый, ноги того же цвета, но с легкой желтоватостью. Глаза красноватые. Песня – набор звучных свистов и трелей. Крик – резкое «тци-тци». В голосе нередко слышится что-то вроде трещания. Длина – 150-160, крыло – 79-92, размах крыльев – 220-227 мм.

Сходства – отличия: похож на соловья, но хорошо отличается черной и белой полосками на рыжем хвосте.

Распространение: гнездовая часть ареала – Средиземноморье, Кавказ, Малая, Передняя и Средняя Азия, Южный Казахстан. В Туркменистане – широко, но на равнинах, больше тяготеет к долинам рек и оазисам. Зимует в Афганистане, Пакистане, на юге Аравийского полуострова, в Западной и Восточной Африке.

Образ жизни: гнездящийся вид. Весенний пролет с середины апреля до середины мая, отлет с конца августа до середины сентября. Населяет речные долины – негустые тугайные и кустарниковые, больше гребенщиковые заросли, в кустарниковой пустыне (саксаульнике) также в саксаульниках, в предгорьях – склоны, поросшие разреженным кустарником, в оазисах не сильно заросшие участки древесно-кустарниковой растительности. Гнездо – небрежная и рыхлая постройка, обычно на саксауле, кандыме, джиде, тамариксе и других кустарниках. В кладке 3-5 бледно-зеленых или голубоватых с бурыми крапинками (сконцентрированных в кольцо на тупом конце) яиц, в мае-июне, размеры – 20-22 x 15.3-16.7 мм. Птенцы, обычно, в июне.

tomzaklary, wyžžyldawuklar), kebelekler (köplenç olaryň içinkalary), göniganatlylar, perdeganatlylar (esasan garynjalar) agdyklyk edýär, seýregräk möýler we ýasmyklar duşýar.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde adaty guş.

352. Ala daş jokjokysy – *Monticola saxatilis* – Пестрый каменный дрозд

Meýdan alamatlary: sardan şähelçe kiçi ölçegli, ýelek örtügininiň alareňki boýunça anyk tapawutlanýar, beýleki jokjokylara görä guýrugy gysgalan. **Kellesi, boýny, bokurdagy çalymytl-gök. Biliniň ortasy ak. Guýrugynyň** ortasyndaky goňur ýeleklerinden galany **çypar**. Ganatlary garamtyl-goňur, aşaky tarapy – çypar reňkli. Mäkiýanlarynyň üsti açyk kese menekli çägepisintliçal, aşaky tarapy solak-çypar bolup, ýelekleriniň garamtyl jähekli uçlary teňňe sypatly nagyşlary döredýär. Çünki we dyrnaklary gara, aýaklary – goýy goňur. Guşlar höwürtgeländen soňky döwürde ümsüm, çagyryş sesi – “tak-tak”. Howsala düşende birsyhly gysgajyk “tüýdük” sykylykly. Jübütleşýän döwründe gaýanyň, daşyň, agajyň depesinde oturyp saýraýar. Saýraýşy owazlaryň toplumu, sykylyklar we beýleki guşlaryň seslerine öýkünmeler. Gykylyk sesi pert – “çek-çek” we sykylyk – “fýuit”. Ganaty – 109-127, guýrugy – 54-65, söbügi – 26-30, çünki – 12-15 mm, agramy – 44-65.5 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: horazy anyk utgaşykdkaky çalymytl-gök we çypar reňkleri bilen tapawutlanýar,

Пищу собирает на растениях и на земле, у основания кустарников или деревьев. В питании преобладают мелкие жуки (долгоносики, хрущи, жужелицы), бабочки (больше их гусеницы), прямокрылые, перепончатокрылые (главным образом муравьи), реже пауки и клопы.

Статус: немногочисленная, местами обычная птица.

Полевые признаки: размером чуть мельче скворца, хорошо узнается по пестрой расцветке оперения, хвост по сравнению с другими дроздами укорочен. **Голова, шея, горло серовато-голубые. Середина спины белая. Хвост рыжий**, кроме центральных – бурых перьев. Крылья черно-бурые, снизу рыжие. Самка сверху песочно-серая с поперечными светлыми пестринками, снизу бледно-рыжая с темными каемками на концах перьев, образующими чешуйчатый рисунок. Клюв и когти черные, ноги темно-бурые. Вне периода размножения это молчаливая птица, позывка – «так-так». При тревоге – короткие однотипные «флейтовые» свисты. В брачный период поют сидя на вершине скалы, камня, дерева. Песня – набор трелей, свистов и подражаний голосам других птиц. Крик – резкое «чек-чек», свист – «фьюить». Крыло – 109-127, хвост – 54-65, цевка – 26-30, клюв – 12-15 мм, вес – 44-65.5 г.

Сходства и отличия: самец отличается контрастным сочетанием серо-голубого и рыжего цветов, самка отличается от самки синего

mäkiýanlary açyk ala reňki bilen gök daş jokjokysynyň mäkiýanýndan tapawutlanýar.

Ýaýran ýeri: arealynda höwürtleýän bölegi Günorta Ýewropanyň daglyk ýerlerinde, Kiçi, Alynky we Orta we Merkezi Aziýany öz içine alýar. Türkmenistanda ähli daglyklarda höwürtleýär. Merkezi we Gündogar Afrikada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän höwürtleýän guş, ýazyna martyň ortasynda uçup gelýär, güýzine – awgustyň soňunda we sentýabrda uçup gidýär. Daglyklarda, açyk ýerlerde gaýa çykyndylary bilen gezekleşýän ýerlerinde; daş çykyndylary bolan baýyryklarda, eňňitlerden togalanyp gaýdan äpet daşlaryň ýa-da gaýa uçutlarynyň arasynda gezyär. Höwürtgesi – gaýalaryň we uçutlaryň köweklerinde, ýarçyklarynda, üşmek daşlaryň arasynda. 4-6 sany ýaşlymytyl-gök ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 23.8-28.7 x 17.8-20.0 mm, agramy – 3.95-4.3 g. Olar mör-möjekleri, tomsuň soňunda – dürli miweleri we däneleri çokýar. Ýumurtgalyk – tomzaklar (jykjyklar, wyžyldawuklar, ädiktikenler, gajarlar we ş.m.), ýasmyklar, göniganatlylar, garynjalar, kebelekler, olaryň liçinkalary, ikiganatlylar, möýler, balykgulaklar we maýda suwulganlar duşýar.

Statusy: az sanly dag guşy.

353. Gök daş jokjokysy – *Monticola solitarius* – Синий каменный дрозд

Meýdan alamatlary: süýnmek bedenli orta ölçegdäki jokjoky. **Kellesi, boýny we arkasy mawumtyl-gök**, garyn tarapy biraz ýagtyrak, ganatlarynyň aşagy çalymytyl-gök.

каменного дрозда светлой пестрой окраской.

Распространение: гнездовая часть ареала охватывает горные области Южной Европы, Малой, Передней, Средней и Центральной Азии. В Туркменистане гнездится во всех горных районах. Зимует в Центральной и Восточной Африке.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица, весной появляется с середины марта, отлетает в конце августа и сентябре. Обитает в горных местообитаниях, где выходы скал чередуются с открытыми участками; может селиться и на холмах с выходами камней, среди крупнокаменистых осыпей или же на каменистых обрывах. Гнезда устраивают в нишах и трещинах скал и обрывов, среди камней. Кладка из 4-6 зеленовато-голубых яиц, размеры – 23.8-28.7x17.8-20 мм, вес – 3.95-4.3 г. Взрослые птицы поедают насекомых, в конце лета – разнообразные ягоды и семена. В рационе насекомые – жуки (чернотелки, жужелицы, долгоносики, навозники, щелкуны, нарывники, и др.), клопы, прямокрылые, муравьи, бабочки и их гусеницы, веснянки, двукрылые; пауки, моллюски и мелкие ящерицы.

Статус: немногочисленная горная птица.

Полевые признаки: дрозд среднего размера с вытянутой формой тела. **Голова, шея и спина голубовато-синие**, брюшная сторона несколько светлее, испод крыла

Mäkiýanlarynyň arka tarapy gowşak gök öwüşginli goýy-goňur, garyn tarapy garamtyl teňňe nagyşly çuparrak. Ganatlary, guýrugy, çünki gara, aýaklary goýy-goňur. Gyşky ýelek örtügi has solak, aýratyn-da horazlaryňky. Sesi pert – “çek-çek”. Saýraýşy gaty heňli, owadan sykylykly we beýleki guşlaryň saýraşyna öýkünmeler. Ganaty – 111.3-121.0, guýrugy – 75-84, söbügi – 21.7-30.7, çünki – 12.3-15.7 mm, agramy – 37.5-54.5 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **ýelek örtügininiň tutuş gökdigi** bilen beýleki jokjokylardan tapawutlanýar. Guýrugynyň ep-esli uzyndygy bilen ala daş jokjokýdan, mäkiýanlary, ondan daşary goýy goňur reňklidigi bilen tapawutlanýarlar.

Ýaýran ýerleri: Günorta Ýewropanyň daglyk oblastlary we Afrikanyň, Kiçi, Alynky, Orta we Günorta-Gündogar Aziýanyň demirgazyk-günbatar çetleri. Türkmenistanda – Uly Balkanda, Köpetdagda, Köýtendagda. Ortaýer deňzinde, Gündogar Afrika-da, Günorta Arabystanda, Günorta (Hindistan, Seylon) we Günorta-Gündogar Aziýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: höwürtleýän guş, ýazyna martyň soňunda uçup gelýär, güýzine – sentýabr-oktyabrda uçup gidýär. Esasan gaýalyklary, suw çeşmeli çygly dereleri eýeleýär. Gaýalaryň köweklerinde we ýarçyklarynda, käte ýerastyndan suw çykýan ýeriň golaýynda höwürtleýär gurýar. Maý-ijulda 4-6 sany, käte kütek tarapy goňurrak-gyzyl meneklije gögümti-ýaşyl ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 24.3-29.0 x 18.1-20.1 mm. Ýumurtga, adatyça, dürli mör-möjekler (ädiktikenler, jykjyklar, wyžyldawuklar, ýasmyklar,

серовато-синий. У самки спинная сторона темно-бурая со слабым синеватым оттенком, брюшная рыжеватая с темным чешуйчатым рисунком. Крылья, хвост, клюв черные, ноги темно-бурые. Зимнее оперение более невзрачное, особенно у самца. Голос – резкое «чек-чек». Песня громкая, звучная, с красивыми свистами и подражаниями голосам других птиц. Крыло – 111.3-121, хвост – 75-84, цевка – 27.1-30.7, клюв – 12.3-15.7 мм, вес – 37.5-54.5 г.

Сходства – отличия: отличается от других дроздов **общей синей окраской оперения**. От пестрого каменного дрозда отличается несколько удлинённым хвостом, а самки, кроме того, темно-бурым оперением.

Распространение: горные области Южной Европы и крайнего северо-запада Африки, Малой, Передней, Средней и Юго-Восточной Азии. В Туркменистане – горы Большие Балханы, Копетдаг, Койтендаг. Зимовки в Средиземноморье, Восточной Африке, Южной Аравии, в Южной (Индостан, Цейлон) и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: гнездящаяся птица, весной появляются с конца марта, отлет в сентябре-октябре. Населяют, в основном, скалистые участки, влажные ущелья с водными источниками поблизости. Гнездо помещается в нишах и трещинах скал, иногда рядом с просачивающимися грунтовыми водами. Кладка из 4-6 голубовато-зеленоватых, иногда с буро-красными крапинами у тупого конца яиц, в мае – июле, размеры яиц – 24.3-29 x

hudaýatlylar, göniganatlylar, garynja-lar), möýler, ösümlikleriň miweleri, şeýle-de olaryň käbirleriniň däneleri.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde adaty görnüş.

354. Gara jokjoky – *Turdus merula* – Черный дрозд

Meýdan alamatlary: sardan ulurak. **Ýelek örtüginin gara reňki, çüňkiniň mawymtyl-mämişi we gözünüň töwereginiň (horazlary) insiz sarymtyl halkasy** boýunça aňsat tanalýar, **mäkiýany goýu-goňur**, döşi azyrak çypar gyrawly, ganatlarynyň aşagy gara, çüňki – goýu-goňur. Guýrugy beýlekilere garanynda uzynrak, ganatlary tege-lenen we gysga. Ýerde uly aralyga towsup, adaty ganatlaryny biraz sallap we guýrugyny galdyryp, hereket edýär. Sesi pert – “çek-çek” ýa-da “terre-çok-çok”. Saýraýyşy – gaýgyly tüýdik sykylyklarynyň toplumu. Ganaty – 118-143, guýrugy – 105-137, söbügi – 31-36, çüňki – 19-25 mm, agramy – 72-101.5 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: horazy ýelek örtüginin garadygy we çüňkiniň sarydygy, mäkiýany – tutuşlaýyn goýu-goňur reňklidigi bilen beýleki jokjoklardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropa, demir-gazyk-gündogar böleginden başgalarynda, Afrikanýň demirgazyk-günbatarynda, Kawkazda, Kiçi we Alynky Aziýada, Orta, Merkezi (Gimalaý daglary) we Günorta-Gündogar Aziýanyň daglyk ýerlerinde. Türkmenistanda – Uly Balkanda, Köpetdagda, Köýtendagda we olaryň eteklerinde,

18.1-20.1 мм. В пище, обычно, разнообразны насекомые (долгоносики, чернотелки, жужелицы, клопы, богомолы, прямокрылые, муравьи), пауки, из растительных кормов – ягоды, а также семена некоторых растений.

Статус: немногочисленный, местами обычный вид.

Полевые признаки: крупнее скворца. Легко узнается по **однообразно черному оперению, желто-оранжевому клюву и тонкому желтому кольцу вокруг глаз (самцы), самки темно-бурые** с небольшой рыжеватостью на груди, испод крыла черный, клюв – темно-бурый. Хвост довольно длинный, крылья округлые, короткие. По земле передвигается большими прыжками, обычно немного опустив крылья и приподняв хвост. Голос – резкое «чек-чек» или «терре-чок-чок». Песня – набор флейтовых печальных свистов. Крыло – 118–143, хвост – 105-137, цевка – 31-36, клюв – 19-25 мм, вес 72-101.5 г.

Сходства – отличия: от других дроздов самец отличается черным цветом оперения и желтым клювом, самка – общей темно-бурой окраской.

Распространение: Европа, кроме северо-восточной части, северо-запад Африки, Кавказ, Малая и Передняя Азия, горные районы Средней, Центральной (Гималаи) и Юго-Восточной Азии. В Туркменистане – Большие Балханы, Копетдаг, Койтендаг и их предгорья, по долинам рек. Зимует в пределах своего

derýalaryň jülgelerinde. Öz arealynyň çäginde, onuň günorta bölegine uçup geçip guşlaýar (aýratyn-da Ýewropada).

Ýaşaýyşy: bizde oturymly, böleleýin uçup geçýän guş, gyrymsy jeňňelli dag derelerini, baglyklary we seýilgähleri, kölegeli we gür jeňňelli çygly meýdançalary eýeleýär. Fewralda horazlaryň ilkinji saýraýan sesleri eşidilýär. Gyrymsylaryň gür şahalanan ýerinde, sütün ýabalarynda ýa-da onuň golaýynda höwürte gurýar. Ýylda iki gezek ýumurtgalaýar. Martyň soňunda, aprel-maýda 4-7 sany poslurak-goňur meneklije gögümtil-ýaşyl ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 20.3-23.0 x 28.1-34.1 mm. Jüýjeleri maý-iyunda uçurym bolýar. Iýmitinde – ýagyş gurçuklary, balykgulaklar, tomzaklar, sikadalar. Güýzine we guşyna ösümlikleriň miwelerini çokýar.

Statusy: adaty görnüş (dagda az sanly), şäher şertinde, seýilgählerde we adamlara ýakyn ýerlerde ýaşaýar.

355. Gara petekeli jokjoky – *Turdus ruficollis* – Краснозобый (темнозобый) дрозд

Meýdan alamatlary: orta ölçegli jokjoky. Horazynyň kellesiniň üsti, arkasy we ganatlary çal, guýrugy goňurrak-çypar, **kellesiniň gapdallary, bokurdagy, petekesi gara, döşi we garny açyk reňkli. Mäkiýan we yaş guşlaryň bokurdagy we petekesi dik gara menekli.** Çüňki goňur, çüňküsti has açyk reňkli. Aýaklary goňur, dyrnaklary goýu-goňur. Bimaza bolan guşlaryň sesi ýygy-ýygudan gaýtalanýan “çak-çak-çak”. Ganaty – 124-140, guýrugy – 92-103, söbügi – 31.5-35.0, çüňki – 19.0-19.3 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: bokur-

ареала, отлетая в южные его части (особенно в Европе).

Образ жизни: у нас оседлая, частично перелетная птица, населяет горные ущелья с заросшими кустарниками, сады и парки, тенистые и влажные участки с зарослями густых кустов. Первые песни самцов удается слышать уже в феврале. Гнездо, обычно, в густых кустарниках, развилках ветвей или около ствола. Две кладки в году. Кладка из 4–7 голубовато-зеленых с ржаво-бурыми пятнами яиц, в конце марта, апреле-мае, размеры яиц – 20.3-23 x 28.1-34.1 мм. Летные птенцы в мае-июне. В пищевом рационе дождевые черви, моллюски, жуки, цикады. Осенью и зимой поедают также ягоды.

Статус: обычный вид (в горах немногочислен), живет в непосредственной близости с человеком в городах, парках и садах.

Полевые признаки: среднего размера дрозд. У самца верх головы, спина и крылья серые, хвост буровато-рыжий, **бока головы, горло, зоб черные, грудь и брюхо светлые. У самок и молодых на горле и зобе черные продольные пестрины.** Клюв бурый, с более светлым надклювьем. Ноги бурые, когти темно-бурые. Голос беспокоящейся птицы – часто повторяющиеся «чак-чак-чак». Крыло – 124-140, хвост – 92-103, цевка – 31.5-35, клюв – 19.0-19.3 мм.

Сходства – отличия: от других дроздов отличается черными гор-

dagynyň we petekesiniň garadygy, aşaky tarapynyň we böwürleriniň ýagty reňklidigi bilen beýleki jokjoklardan tapawutlanýar. Gyşyna bizde, örän seýrek ýagdaýda bokurdagy we petekesi gara däl-de goýu-çypar reňkli guşlaryň gabat gelmegi mümkin.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeleýän bölegi – Günbatar Sibir, Altaý, Orta Aziýanyň daglarynyň käbir ýerleri. Türkmenistanda – uçup geçende dagda, derýalaryň jülgelerinde we çöllüklerde duşmaklary mümkin. Orta, şeýle-de Alyňky Aziýanyň günortasynda, Demirgazyk Hindistanda, böllekleýin Arabystanda gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-gyşlaýan guş. Güýzine sentýabryň ortasynda görünýär we ýazynda – martda uçup geçýär. Ýaýraň duşýar, düzlük, şeýle hem daglyk ýerlerdäki derýalaryň jülgelerine ýakynlaşmagy halaýar. Hemme ýerlerde, agaçly-gyrymsy agaçly meýdanlarda saklanýar. Kiçiräk topar, ýekelikde, 30-40 sany we ondanda köp guşdan ybarat süri bolup gezýär. Ýumiti ýerden çöpleýär. Güýzine we gyşyna dürli ösümlikleriň, hat-da olaryň gyşda doňan miweleriniň ýumşak özenini, käte maýda tohumlary çokýar.

Statusy: uçup geçende we gyşlanda adaty, käbir ýerlerde köpsanly, aýratyn ýyllarda örän köpsanly guş.

356. Ryabina jokjokusy – *Turdus pilaris* – Рябинник

Meýdan alamaty: beýlekilere garanynda uly jokjoky. **Kellesiniň üsti, boýunyň zyu we guýrugynyň üsti gögümtil-goňur, arkasy goňras-**

лом и зобом, светлыми низом и боками. У нас очень редко зимой могут попадаться птицы, у которых горло и зоб не черного, а темно-рыжего цвета.

Распространение: гнездовая часть ареала – Западная Сибирь, Алтай, местами в горах Средней Азии. В Туркменистане – в горах, поймах рек и оазисах, на пролетах может попадаться и в пустыне. Зимуют на юге Средней, а также в Передней Азии, Северном Индостане, частично в Аравии.

Образ жизни: пролетно-зимующая птица. Осенью появляется в середине сентября, весенний пролет в марте. Встречается широко, но тяготеет к речным долинам, как на равнинах, так и в горах. Всюду придерживаются участков с древесно-кустарниковыми зарослями. Держатся как небольшими группами и по одиночке, так и стаями по 30–40 и более птиц. Корм собирают, преимущественно, с земли. Осенью и зимой в значительной степени кормятся различными ягодами. Поедают также мягкие плоды, расклеывая их обмороженные части, изредка собирают мелкие семена.

Статус: обычная на пролете и зимовке птица, местами может быть многочисленной, а в отдельные годы очень многочисленной.

Полевые признаки: сравнительно крупный дрозд. Верх **головы, зашеек и надхвостье голубовато-серые, спина кашта-**

goňur, petekesi we döşi çypar ýokundyly, garny ak. Böwürleri kiçiräk üçburç sypatly uly gara menekli. Ganatlary we guýrugy garamtyl-goňur. Gözüniň üsti ýagty gaşly, çünki sary, goýu-goňur uçly. Uçuşy çalt, uçup barýan guşuň ganatlarynyň aşagynyň akdygy görünýär. Örän çakgan, durnuksyz hereketli we gykylykçy guş, elmydama “çak...çak...çak...” we bimaza bolan ýagdaýynda – “ra-ra-ra” jyrlydy häsiýetli gykylyk edýär. Saýraýşy tüýdik sesleriň pert jyrlydylaryň gatýşmasýndan durýar. Ganaty – 136-153, guýrugy – 96-117, söbügi – 31-36, çünki – 15-20 mm, agramy – 92.2-125.0 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: kellesiniň we guýrugynyň üstki tarapynyň mawumtyl-çaldygy bilen beýleki jokjoklardan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtegeleýän bölegi – Merkezi Ýewropa we onuň demirgazyk bölegi, Ural, Günbatar we Gündogar Sibir. Orta Aziýada, şol sanda Türkmenistanda – derýalaryň jülgeleriniň giňän ýerlerinde we oazislerde, daglyk we eteklerindäki derelerde. Ýewropanyň günorta böleginde, Demirgazyk Afrikada, Kiçi we Alyňky Aziýada gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän guş, bir böleginiň, günorta ýurtlarda gyşlamaga galmaklary hem mümkin. Ýazynda mart-aprelde uçup geçýär. Agaçly-gyrymsy agaçly jeňňellikleri halaýar, ýöne suw basan gyрманçaly ýerlerde, howdanlaryň gyrasyndaky gamşylyklaryň we ýylgynlyklaryň arasynda duşmaklary mümkin. Uçup geçmegi we gyşlamagy ýumit gorunyň (miweleriň) üpjünçiligine baglylykda göçüp-gonma.

ново-бурая, зоб и грудь с рыжеватым налетом, брюшко белое. На боках крупные темные пестрины в виде небольших треугольников. Крылья и хвост черновато-бурые. Над глазом светлая бровь, клюв желтый, с темно-бурым концом. Полет быстрый, у летящей птицы можно заметить светлый испод крыла. Очень подвижная, беспокойная и шумливая птица, постоянно издает характерный крик – «чак...чак...чак...», при тревоге сильно трещит – «ра-ра-ра». Пение состоит из флейтовых звуков вперемешку с резким трещанием. Крыло – 136-153, хвост – 96-117, цевка – 31-36, клюв – 15-20 мм, вес – 92.2-125 г.

Сходства – отличия: от других дроздов отличается голубовато-серым верхом головы и надхвостья.

Распространение: гнездовая часть ареала – Центральная Европа и ее северная половина, Урал, Западная и Восточная Сибирь. В Средней Азии, в том числе и Туркменистане, по речным поймам и в оазисах, по предгорьям и горным долинам. Зимует в южной половине Европы, Северной Африке, Малой и Передней Азии.

Образ жизни: пролетная птица, часть особей может оставаться у нас на зимовку в южных районах. Весенний пролет в марте-апреле. Предпочитают участки с древесно-кустарниковыми зарослями, но могут встречаться и на лугах, среди тростников и гребенщиков по берегам водоемов. Пролет и зимовка носит характер кочевков, зависящих от наличия кормов (ягод). Питаются ягодами шиповника, боярышника,

Itburunlaryň, alyçlaryň, guşigdeleriň we başgalaryň miwelerini çöpleýär.

Statusy: umuman az sanly, käbir ýerlerde uçup geçende adaty guş.

357. Saýrak jokjoky – *Turdus philomelos* – Певчий дрозд

Meýdan alamatlary: sardan sähelçe ulurak ölçegli, gysga guýrukly maýda jokjoky, **üstki tarapy çalymtyl-goňur, kellesi çypar-rak**. Ganatlary we guýrugy çalymtyl-ýaşylymtyl-çypar-rak öwüşginli goýu-goňur. **Döşiniň ak, petekesiniň we böwürleriniň sarymtyl reňkinde-tegelenen ýa-da çalaja süýrelen goýu goňur menekleri bolýar. Ganatynyň aşagynyň öňki bölegi uçan mahalynda çypar öwüşginli.** Çünki garamtyl-goňur, aýaklary sarymtyl-goňur. Çagyryş sesi garyljk-sykylyklar – “pi-ip, pi-ip-tak” ýa-da “pi-ip, pi-ip-täk. Rahatlygy bozulanda – “ştiks-ştiks-ştiks”. Saýraýşy sesli sykylyklar – “fýu-fýu... fi-fu”. Ganaty – 109-124, guýrugy – 77-95, söbügi – 30-35, çünki – 17.3-18.2 mm, agramy – 65-90.1 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: ak-gaş jokjoka çalymdaş, ýöne ak gaşynyň we böwürlerinde çypar reňkiň ýokdygy sebäpli tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtgelyän bölegi Ýewropany, Kawkazy, Kiçi we Alynky Aziýany, Günbatar we Orta Sibiriň günortasyny öz içine alýar. Orta Aziýada we Türkmenistanda uçup geçende duşýar. Günbatar Ýewropada, Ortaýer deňzinde we Alynky Aziýanyň günortasynda gyslaşýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän guş, bir böleginiň gyşlamaga galmaklary hem mümkin. Ýazyna mart-aprelde,

джиды и др.

Статус: в целом немногочисленная, местами на пролете обычная птица.

Полевые признаки: мелкий дрозд с коротким хвостом, размером чуть крупнее скворца, **верх серовато-бурый, голова с рыжеватым фоном**. Крылья и хвост темно-бурые, с серо-зелено-рыжеватым оттенком. **По белому на груди и желтоватому на зобе и боках фону – темно-бурые, округлые или слегка удлинненные пестрины. В полете снизу крыльев – на передней их части – рыжий тон.** Клюв черно-бурый, ноги желтовато-бурые. Позывка – сипловато-свистящее – «пи-ип, пи-ип-так», или «пи-ип, пи-ип-тэк». При возбуждении – «штикс-штикс-штикс». Песня – звонкое флейтовое – «фю-фю... фи-фу». Крыло – 109-124, хвост – 77-95, цевка – 30-35, клюв – 13.7-18.2 мм, вес – 65-90.1 г.

Сходства – отличия: похож на белобровика, но отличается отсутствием белой брови и рыжего цвета на боках.

Распространение: гнездовая часть ареала охватывает Европу, Кавказ, Малую и Переднюю Азию, юг Западной и Средней Сибири. В Средней Азии и Туркменистане на пролете. Зимует в Западной Европе, Средиземноморье и юге Передней Азии.

Образ жизни: пролетный вид, часть особей может оставаться на зимовку. Весной пролет в марте-апреле, осенью – в сентябре-ок-

гүйзине – sentýabr-oktýabrda uçup geçýär. Uly bolmadyk süri we topar, köplenç iki-üç bolup gezyär. Iýmiti ýerden çöpleýär, dürli oňurgasyzlary awlaýar we miweleri iýýär.

Statusy: az sanly guş.

358. Akgaş jokjoky – *Turdus iliacus* – Белобровик

Meýdan alamatlary: sardan kiçiräk ölçegli, iň maýda jokjoky. Üstki tarapy çalymtyl-ýaşylymtyl-goňur, maňlaýnyň aladygy gowşak bildirýär. **Gözüniň üstündäki ak inli zolak çünkiden başlanýar.** Woýnynyň gapdallary kiçiräk çypar tegmilli. Açyk reňkli petekesi we döşi dilkaw garamtyl menekli. Garny ak. **Böwürleri we ganatlarynyň aşagy çyparrak-gyzyl öwüşginde, ol aýratyn-da uçan mahalynda oňat görünýär.** Saýraýşy – şowhunly sesleriň toplumu we sesli sykylyk – “i-týu-týu-týu”. Çagyryş sesi – “si-tek-tek”. Gorkan mahaly jyrlydaýar – “şerr” ýa-da “çer”. Ganaty – 110-112, guýrugy – 75-86, söbügi – 27-31, çünki – 14.5-18.5 mm, agramy – 57.6 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: saýrak jokjoka çalymdaş, ýöne, ondan gaşynyň akdygy we böwürleriniň çyparrak-goňurdygy bilen oňat tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealynda höwürtgelyän bölegi Demirgazyk (Islandiýadan başlap) we Gündogar Ýewropany, Sibiri, onuň çetki demirgazyk we gündogar sebitlerinden başgalaryny öz içine alýar. Orta Aziýada, Türkmenistanda uçup geçende gabat gelinýär. Günbatar Ýewropada, Ortaýer deňzinde, Kawkazda, Kiçi we Alynky Aziýada gyslaşýar.

тябре. Встречаются небольшими стайками и группами, чаще держатся по две-три особи. Корм собирают, главным образом, с земли, добывая различных беспозвоночных, поедают и ягоды.

Статус: немногочисленная птица.

Полевые признаки: самый мелкий дрозд, размером не крупнее скворца. Верх серо-зеленовато-бурый, со слабыми пестринками на лбу. **От клюва над глазом – широкая белая полоса.** По бокам шеи небольшие рыжие пятна. На светлом зобу и груди – темные продольные пестрины. Брюхо белое. **По бокам и под крыльями рыже-красный тон, что особенно хорошо заметно в полете.** Песня – набор трескучих звуков и громкий свист – «и-тю-тю-тю». Позывка – «ци-тек-тек». При испуге – трещание «шерр» или «чер». Крыло – 110-112, хвост – 75-86, цевка – 27-31, клюв – 14.5-18.5 мм, вес – 57.6 г.

Сходства – отличия: похож на певчего дрозда, от которого хорошо отличается белой бровью и рыже-коричневыми боками.

Распространение: гнездовая часть ареала охватывает Северную (от Исландии) и Восточную Европу и Сибирь, кроме крайних северных и восточных ее областей. В Средней Азии, включая Туркменистан, встречается на пролетах. Зимует в Западной Европе, Средиземноморье, на Кавказе, в Малой, Передней Азии.

Образ жизни: пролетный вид, часть особей в отдельные годы зи-

Ýaşayşy: uçup geçýän görnüş, aýratyn ýyllarda käbir bölegi gyslaýar. Ýazyna martyň soňunda we aprelde, güýzine – sentýabryň başyndan noýabryň aýagyňa çenli uçup geçýär. Ağaçly-gyrymsy ağaçly ýerlerde, düzlüklerde – ösgin otly meýdanlarda topar we kiçiräk süri bolup gezýär. Esasy iýmiti oňurgasyzlar, miweleri hem iýýär.

Statusy: az sanly, seýrek guş.

359. Ala jokjoky – *Turdus viscivorus* – Деряба

Meýdan alamatlary: has uly jokjoky. **Guşuň tutuş aşagy, bokurdagyndan we ganatlarynyň aşagyndan galan ýeri açyk garamtyl süýrüräk menekli. Üstki tarapy goýy ýaşylymtyl-çal.** Guýrugy goýy goňur, uçlary ak tegmilli. Çünki we dyrnaklary goýy-goňur, aýaklary – açyk goňur. Uçuşy göni, gowşak tolkunşekilli. Ýerde uly towusmalar bilen hereket edýär. Saýraýşy güýçli we owazly, arassa sykylykly gykylyklardan durýar – “te-rio-rio”, dürli özgertmelerde – “ti-re-ti-ri”. Howsalaly sesi – “trrr ýa-da hrrr”. Ganaty – 141-178, guýrugy – 100-137, söbügi – 30-37, çünki – 17-22 mm, agramy – 105-149g.

Meňzeşlikleri–tapawutlary: ölçegleriniň uludygy bilen saýrak jokjokydан tapawutlanýar, üstki tarapynyň birmeňzeş çaldygy bilen rýabina jokjokysyndan tapawut edýär.

Ýayran ýerleri: arealynda höwürtegeýän bölegi Afrikanyň demirgazyk-günbataryny, tutuş Ýewropany, onuň demirgazyk çetki welaýatlary aýrylanda, Günbatar Sibiriň günortasyny, Kiçi, Alynky, Orta we Merkezi Aziýanyň günbatarynyň daglyk

мует. Весной появляется в конце марта и апреле, осенью – с начала сентября до конца ноября. Придерживается древесно-кустарниковых, а в открытой местности высокотравных участков, группами и небольшими стаями. Питается, преимущественно, беспозвоночными, поедает ягоды.

Статус: редкая, с низкой численностью птица.

Полевые признаки: наиболее крупный дрозд. **Снизу птица вся, кроме горла и подкрыльев, светлая с округлыми темными пестринами. Сверху темно-зелено-серая.** Удлиненный темно-бурый хвост, с белыми концевыми пятнами. Клюв и когти темно-бурые, ноги светло-бурые. Полет прямой, слабоволнистый. На земле передвигается крупными прыжками. Песня – громкая и звучная, состоит из чисто свистовых криков – «те-риорио», ти-ре-ти-ри», с различными модификациями. Голос тревоги – «тррр или хррр». Крыло – 141-178, хвост – 100-137, цевка – 30-37, клюв – 17-22 мм, вес – 105-149 г.

Сходства – отличия: от певчего дрозда отличается крупными размерами, от рябинника – однотонным серым верхом.

Распространение: гнездовая часть ареала охватывает северо-запад Африки, всю Европу, исключая крайние северные области, юг Западной Сибири, горные области Малой, Передней, Средней и запада Центральной Азии. В Туркменистане – в Копетдаге, Койтендаге, на пролете в долинах и оазисах, и

welaýatlaryny öz içine alýar. Türkmenistanda – Köpetdagda, Köýtendagda, uçup geçende jülgerlerde, oazislerde, hat-da çöllükde duşýar. Arealynyň günorta raýonlarynda gyslaýar.

Ýaşayşy: düzlüklerde uçup geçýän, dagda – oturymly guş. Ýazda uçup geçmegi ir gutarýar – martyň soňunda, güýzde – noýabrda, soňra ol gyslamaga galýar. Jeňňellikde we derýalaryň boýlaryndaky suw basan tokalyklarda, baglyklarda, gür ösen gyrymsylyklarda gabat gelyär. Dagdaky arçalyklarda höwürtegeýär. Aprel-iýunda 4-5 sany goňur we çal meneklije gülgüne (ýaşylymtyl-gögümtil, gögümtil-çal) ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 27.4-36.5 x 20.7-24.6 mm. Güýzde we gyşda aglabam miweleri, ýaz-tomus döwründe oňurgasyzly (tomzaklary, perdeganatlylary, sikadalary-jyzlanlary, göni-ganatlylary, ýagyş gurçuklaryny, balykgulaklary) çokýar.

Statusy: az sanly guş.

360. Ak petekeli jokjoky – *Turdus torquatus* – Белозобый дрозд

Meýdan alamatlary: **ýaşy ýeten guşlary petekesindeki kese duran ýagty tegmili boýunça aňsat tana-sa bolýar.** Horazynyň umumy reňki goňurrak-gara, ýelekleriniň agymtyl jähekleri oňa teňňeşekilli nagyş sypatyny berýär, açyk dik zolakly bolup, uçanynda ganatlary agymtyl ýaly bolup görünýär. Petekesindeki tegmil ak. Mäkiýany goňurrak-çal, petekesindeki tegmil goňurrak. Ýaş guşlar çalymtyl-goňur, petekesi meneksiz. Çünki gara uçly sarymtyl, aýaklary – goňur, dyrnaklary – garamtyl. Saýraýşy – birmeňzeş heňli tükeniksiz gaýtalama – “žoleng-týi” ýa-da “týuwi-týulud...”. Howsala dü-

даже в пустыне. Зимует в южных районах своего ареала.

Образ жизни: на равнинах пролетно-зимующая, в горах оседлая птица. Весенний пролет заканчивается рано – в конце марта, а осенний – в ноябре, переходящий в зимовку. Встречается в тугайных и пойменных лесах по долинам рек, садах, рощах, зарослях кустарников. Гнездится в горах в арчевниках. Кладка из 4–5 розоватых (зеленовато-голубых, голубовато-серых) с бурыми и серыми пятнами яиц, в апреле-июне, размеры – 27.4-36.5 x 20.7-24.6 мм. Осенью и зимой кормятся, преимущественно, ягодами, в весенне-летний период беспозвоночными (жуками, перепончатокрылыми, цикадами, прямокрылыми, дождевыми червями, моллюсками).

Статус: немногочисленная птица.

Полевые признаки: **взрослые легко узнаются по светлому пятну поперек зоба.** Общая окраска самца буро-черная со светлыми окаймлениями перьев, придающих оперению чешуйчатый рисунок, крылья с продольными светлыми полосками, в полете крылья кажутся светлыми. Пятно на зобе белое. Самка буро-серая, пятно на зобе буроватое. Молодые – серовато-бурые, без пятна на зобе. Клюв желтоватый с темным концом, ноги бурые, когти черноватые. Пение очень монотонное, бесконечно повторяемое – «жоленг-тйи» или «тьюви-тюлид...». При беспокойстве –

şeninde pert – “trek-çek-çek” ýa-da “siii”, gara jokjokyňkydan has gaty. Ganaty – 132-146, guýrugy – 99-117, söbügi – 32-35, çüňki – 17-21 mm, ag-ramy – 92-138 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: agymtyl petekesiniň we ganatlarynyň açyk reňki bilen gara jokjokydan, umumy reňkiniň garamtyldygy bilen galan jokjokylardan tapawutlanýar.

Ýaşan ýerleri: arealynda höwürtgelyän bölegi Günbatar Ýewropany, Skandinawýany hem goşanynda, Kawkazy, Kiçi we Alynyk Aziýanyň daglyk raýonlaryny öz içine alýar. Türkmenistanda – diňe Uly Balkanda we Köpetdagda. Arealynyň günortasynda we Ortaýer deňzine ýanaşyk sebitlerde gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän höwürtgelyän, bir bölegi oturymly ýaşayan dag guşy. Arçalyk zolakda we agaçly-gyrymsy agaçly ýerlerde gezyär. Ýerde, daşlaryň arasynda, arçanyň ýa-da gyrymsylaryň üstünde höwürtg gurýar. Apreliň soňunda, maýda we iýunyň başynda 4-5 sany çypar meneklije gögümtil-ýaşyl ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 28.9-34.0 x 20.3-24.0 mm. Özüniň we jüýjeleriniň iýmiti oňurgasyzlar, bişen miweler.

Statusy: az sanly görnüş.

361. Gök jokjoky – *Myophonus caeruleus* – Синяя птица

Meýdan alamatlary: bizde duşýan jokjokylaryň arasynda has ulusy. Guýrugy beýlekilere garanynda uzyn, ganatlary tegelenen we gysga. **Reňki goýy-gök, arkasy, kellesi we döşi ýaldyrawuk kümüşleç-gögümtil,** ganatlary we guýrugy goýy-gök. Guş uzakdan gara ýaly bolup görünýär. Ga-

резкое «трек-чек-чек» или «циии», более жесткое чем у черного дрозда. Крыло – 132-146, хвост – 99-117, цевка – 32-35, клюв – 17-21 мм, вес – 92-138 г.

Сходства – отличия: от черного дрозда отличается, даже издали, светлыми зобом и крыльями, от остальных дроздов – общей темной окраской.

Распространение: гнездовая часть ареала охватывает Западную Европу (включая Скандинавию), Кавказ и горные районы Малой и Передней Азии. В Туркменистане – только в Больших Балханах и Копетдаге. Зимует на юге своего ареала и в прилежащих районах Средиземноморья.

Образ жизни: прилетно-гнездящаяся горная птица, часть особей оседла. Держатся в зоне арчи и на участках с древесно-кустарниковым зарослями. Гнезда на земле, среди камней, на арче или на кусте. Кладка из 4-5 голубовато-зеленых с рыжеватыми пятнами яиц, в конце апреля, мае и начале июня, размеры яиц – 28.9-34 x 20.3-24 мм. Питаются и выкармливают птенцов беспозвоночными и ягодами после их созревания.

Статус: немногочисленный вид.

Полевые признаки: наиболее крупная среди наших дроздов. Хвост сравнительно длинный, крылья округлые, короткие. **Окраска темно-синяя, с серебристо-фиолетовыми блестками на спине, голове и груди,** крылья и хвост темно-синие. Издали птица

natlaryndaky ak tegmil şeýle öwüşginde anyk saýlanýar, bu tegmil, haçanda guşy gün şöhlesi ýagtylandyran da dury suw damjasyňnyň ýekeklerde saklanyp galan ýaly bolup görünýär. Aýaklary we dyrnaklary goýy-goňur, çüňki sähelçe gaňrak uju sary. Sesi owazly, dürli we örän batly. Saýraýşy – owadan sykylyklaryň ses toplumu, dag akabalarynyň boýunda saýraýar, şeýle şertde beýleki guşlaryň sesi eşdilmeyär. Çagyryş sesi pert – “džži”. Ganaty – 170-197, guýrugy – 134-163, söbügi – 48-54, çüňki – 17-20.5 mm, agramy – 130-195 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: göwresiniň uludygy we goýy-gök reňki bilen beýleki jokjokylardan tapawutlanýar.

Ýaşan ýeri: Gündogar Hytaýyň, Günorta, Merkezi we Orta Aziýanyň beýik dagly ýerleri. Türkmenistanda – diňe Köýtendagda.

Ýaşayşy: oturymly guşy. Dag jülgeleriniň insiz kert gaýaly we äpet daşly uçutly derelerinde, joşup akýan derýajyklaryň agaç we gyrymsy agaçly jeňňellikleriň utgaşykly ýerlerinde ýaşayar. Adatça, suwuň gyrasyndaky, suwa girip çykмага amatly bolan daşlaryň üstünde gabat gelyär. Ol islendik uçut gaýalardan böküp, sallanyp duran gaýalaryň çüňklünde saklanyp durup, gaýanyň depesine suwuň gyrasyndan çalt dyrmaşyp bilýär, käte gyrymsyňnyň depesinde oturýar, az uçýar. Dag şaglawuklaryň aşagyndaky basgançakly daşlaryň arasyndaky tekjede, mart-aprelde höwürtg gurýar. 4-5 sany anyk bolmadyk solak-goňur meneklije kirliräk ak ýa-da gülgüne reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 33-36 x 24-25 mm. Maýda jüýjeleri uçurym bolýar. Oňurgasyzlyry (kebelekleri we olaryň

кажется черной. На таком фоне на крыльях выделяются белые пятна, когда птица освещена солнечными лучами, эти пятна кажутся как бы прозрачными каплями, задержавшимися на перьях. Ноги и когти темно-бурые, клюв желтый с небольшим крючком на конце. Голос звучный, разнообразный и очень громкий. Песня – набор громких красивых свистов, поет у горных потоков, в таких условиях голоса других птиц не слышны. Позывка – резкое «джжи». Крыло – 170-197, хвост – 134-163, цевка – 48-54, клюв – 17-20.5 мм, вес – 130-195 г.

Сходства – отличия: от других дроздов отличается крупной величиной и темно-синей окраской.

Распространение: высокогорные области Восточного Китая, Южной, Центральной и Средней Азии. В Туркменистане – только Койтендаг.

Образ жизни: оседлая птица. Поселяется в ущельях и узких долинах с наличием отвесных скал и каменистых глыб, бурных речных потоков в сочетании с древесно-кустарниковыми зарослями. Обычно встречается на камнях у самой воды, в которую может заходить и купаться. Прыгает по любым отвесным скалам, удерживаясь на выступах и карнизах, быстро добирается от подножия скалы до вершины, иногда садится на кусты, летает немного. Гнездится у горных водопадов. Гнезда в марте-апреле. Кладка из 4-5 грязно-белых или розоватых с неясными бледно-коричневыми пятнышками яиц, в апреле, размеры – 33-36 x 24-25 мм. Летные птенцы встречаются в мае. Питается беспозвоночными (бабочками

liçinkalaryny, gije duşýan kebelekleri, jyzlanlary, byçgylaýjylary, möýleri, çybynlary, wyžžyldawuklary, balykgulaklary), güýzine – itburunyň, tut agajynyň we başgalaryň miwelerini iýýär.

Statusy: seýrek görnüş, Köýtendag goraghanasynyň guşlarynyň iň täsin wekilleriniň biri.

Ala Jikjikiler – Timeliidae – Тимелиевые

Maýda we orta ölçeğlerdäki guşlar maşgalasy. Jikjikileri we çitçitileri, has uly guşlary – jokjokylary, hat-da gargalary ýatladýar. Ýelek örtügi ýumşak, hezzik, güň, adatça tutuk reňkli. Aýaklary gysga, güýçli, güň çybyklaryň arasyndan dyrmaşyp çykmak üçin uýgunlaşan. Ganatlay gysga, tegelenen, guýrugy has uzyn we tegeleklenen. Başgalara garanyňda güýçli çüňkli. Gyrymsyly jeňňelliklerde we tokaýlyklarda ýere ýakyn gezyär. Baglarda birnäçe görnüşleri gabat gelyär. Guşlar monogam, reňki boýunça horazlary mäkiýanlaryndan tapawutlanmaýar. Oturymly ýaşaýar. Ýerden beýik bolmadyk gyrymsylarda aýyk, okaraşekilli höwürttge gurýar. Ýumurtgalary bir öwüşginde – gögümtil ýa-da ýaşylymytyl reňkli, käte menekli. Osümlikleriň danelerini, miwelerini, mör-möjekleri, käbirleri diňe mör-möjekleri iýärler. Gündogar ýarymşaryň tropik we subtropik ýurtlarynda gabat gelyär: Afrikada we Madagaskarda, Günorta Aziýada, Malaý arhipelagynyň adalarynda, Täze Gwineýada we Awstraliýada. Jemi 240 görnüş, olardan Orta Aziýada we Türkmenistanda – 1 görnüş.

362. Gyrymsy jikjikisi – *Garrulax lineatus* – Кустарница

Meýdan alamatlary: sardan sähelçe maýdarak we serçeden ulu-

и их гусеницами, совками, цикадами, пилильщиками, пауками, комами, жужелицами, моллюсками), осенью – ягодами шиповника, шелковицы и др.

Статус: редкий вид, один из наиболее интересных представителей Койтандагского заповедника.

Семейство птиц мелких и средних размеров. Напоминают синиц и крапивников, более крупных птиц – дроздов и даже ворон. Оперение мягкое, рыхлое, густое, обычно неяркой окраски. Ноги короткие, сильные, хорошо приспособленные для лазания по ветвям в густой чаще. Крылья короткие, закругленные, хвост довольно длинный и округлый. Клюв относительно сильный. Населяют кустарниковые заросли и лесные участки, держится близко у земли. Ряд видов встречаются в садах. Моногамные птицы, самцы и самки по окраске не различаются. Ведут оседлый образ жизни. Гнезда – открытые, чашевидные на кустах невысоко над землей. Яйца однотонной голубоватой и зеленоватой окраски, иногда с пятнами. Кормятся семенами, ягодами, насекомыми, некоторые только насекомыми. Встречаются в тропических и субтропических странах Восточного полушария: в Африке и на Мадагаскаре, в Южной Азии, на островах Малайского архипелага, в Новой Гвинее и Австралии. Всего 240 видов, из которых в Средней Азии и Туркменистане – 1 вид.

Полевые признаки: несколько мельче скворца и крупнее воро-

рак. Gür, ýumşak ýelek örtüklü. Ganatlary gysga we azajyk aşaklygyna göýberilip tegelenen. **Guýrugy uzyn, ujy çalymytyl-ak zolakly inli basgançaklanan. Umumy reňki garamtyl, çalymytyl-ýaşyl, ganatlary çyparak.** Döşi we arkasy agymtyl, depesi we boýny garamtyl dik çyzykly. Arkasyna görä bili has çal. Duluklary goňurrak-gyzylymytyl. Bokurdagy, petekesi, döşi çypparak, yelekleri ak sütnüli we inli çal jähekli. Çüňki has aýyk çüňkastly çalymytyl-goňur, aýaklary – aýyk-goňurrak. Ýeriň üstüne golaý agyrylyk bilen uçýar. Ýerde hereket edeninde ýygy-ýygydan ganatlaryny gymyldatýar we guýrugyny göterýär. Agaç şahalara çakgan dyrmaşýar. Sesi – sozulan gaty sykylyk – “týu-ti-ti-wiu” we pessajya “dži-dži”. Ganaty – 78-89 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: Türkmenistanda meňzeş görnüşleri ýok.

Ýaýran ýerleri: Alynky Aziýanyň gündogaryndaky we Orta Aziýanyň günorta-gündogaryndaky daglyk ýerlerde, Gimalaý daglarynda we Tibetiň günorta-gündogar böleginde. Türkmenistanda – Köýtendagda.

Ýaşaýşy: oturymly we göçüp-gonýan guş. Jülgeledäki we dag derelerindäki gyrymsyly jeňňellerde ýaşaýar. Höwürttgeleýän döwründe jübüt, galan wagty – ýerde, gyrymsylaryň aşagynda we olaryň aşaky böleginde kiçiräk süri bolup gezyär. Gyrymsylarda höwürttge gurýar. Maý-iýunda 3-5 sany meneksiz gögümtil-ýaşyl ýumurtgalary goýýar. Ösümlikleriň daneleri, şireli we ownuk miweleri, ýaz-tomus wagty – mör-möjekler we oňurgasyzlar bilen iýmitleýär.

бья. Оперение густое, пушистое. Крылья короткие и округлые, как бы слегка приспущенные. **Хвост удлинённый широкий ступенчатый с серовато-белой полосой на конце. Общая окраска темная, серо-зеленая, крылья рыжеватые.** На груди и спине беловатые, а на темени и шее черноватые продольные штрихи. Поясница более серая, чем спина. Щеки буровато-красноватые. Горло, зоб, грудь рыжеватые с белыми стержнями перьев и широкими серыми каймами. Клюв серо-бурый с более светлым подклювьем, ноги светло-буроватые. Полет тяжелый, невысоко над землей. При передвижении по земле птица часто поводит крыльями и поднимает хвост. Ловко лазает по ветвям. Голос – протяжный высокий свист – «тью-ти-ти-виу» и негромкое «джи-джи». Крыло – 78-89 мм.

Сходства – отличия: в Туркменистане сходных видов нет.

Распространение: горные районы на востоке Передней и юго-востоке Средней Азии, Гималаи и юго-восточная часть Тибета. В Туркменистане – Койтандаг.

Образ жизни: оседлая и кочующая птица. Населяет участки кустарниковых зарослей в ущельях и горных долинах. Держится в гнездовое время парами, в остальное – небольшими стайками на земле, под кустиками и в их нижней части. Гнездо устраивает на кусте. Кладка из 3-5 голубовато-зеленых яиц без пятен, в мае-июне. Питается семенами, ягодами, мелкими плодами, весной и летом также насекомыми и мелкими беспозвоночными.

Statusy: az sanly, bizde ýeterlik öwrenilmedik guş.

Gögümtil jikjikiler – Panuridae – Суторовые

Çüňkiniň düýbi çişigrak we basgançakly uzyn guýrukly, maýda guşlar maşgalasy. Burun deşikleri tegelek üsti deripisintli perdejik ýa-da gylşekilli ýelejikler bilen örtülen. Ýelek örtügi ýumşak we mymyk, ganatlary başgalara garanyňda gysga hem kütek. Mör-möjekler bilen iýmitlenýär. Jemi 18, Türkmenistanda 1 görnüş gabat gelyär.

363. Murtly gögümtil jikjiki – Panurus biarmicus – Усатая синица

Meýdan alamatlary: serçeden kiçi. **Horazynyň kellesiniň üsti we boýny çal, arkasy we guýrugy goňurrak-çypar**, ganatlary ak zolakly garamtyl-goňur. **Bokurdagynyň gapdallaryndaky ösgün ýeleklery gara murt görnüşinde.** Basgançakly uzyn, guýrugynyň ujy çowly. Aşaky tarapy agymtyl, böwürleri gülgüne we guýrugynyň aşagy gara. Mäkiýan guşlaryň kellesiniň çal reňki, gara murty we guýrugynyň aşagynda gara reňki ýok, **yaş guşlaryň arkasy gara**, ganatlarynyň we guýrugynyň gapdallarynyň gara gatyşyklydygy aýdyň görünýär. Çünki sary, aýaklary gara. Sesi batly – “çwin-çwin”. Uzynlygy – 160-180, ganaty – 69-63, ganatlarynyň gerimi – 180-200 mm, agramy – 14-17 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: anyk saýgardýan we boýnunyň uzaboýuna aşaklygyna gönügen gara ýelek desejigi – murty bilen beýleki jikjikilerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günbatar Ýewropa, Günorta-Günbatar we Merkezi Aziýa, Ýaponiýa. Orta Aziýada – düzlük böleginde gabat gelyär. Türkmenistanda

Статус: немногочисленная, недостаточно изученная у нас птица.

Семейство мелких птиц с коротким вздутым у основания клювом и длинным ступенчатым хвостом. Ноздри круглые, прикрытые кожистой перепонкой или волосяными перышками. Оперение мягкое, пушистое, крылья относительно короткие тупые. Питаются насекомыми. Всего 18, в Туркменистане 1 вид.

Полевые признаки: величиной меньше воробья. **У самца верх головы и шея серые, спина и хвост коричневато-рыжие**, крылья черновато-коричневые с белой полосой. **Удлиненные перья по бокам горла в виде черных “усов”.** **Хвост длинный ступенчатый, заостренный на конце.** Низ беловатый с розовыми боками и черным подхвостьем. У самок нет серого цвета на голове, черных “усов” и черного подхвостья, а **у молодых спина черная** с заметной примесью черного на крыльях и боках хвоста. Клюв желтый, ноги черные. Голос – звонкое «чвинь-чвинь». Длина – 160-180, крыло – 60-63, размах крыльев – 180-200 мм, вес – 14-17 г.

Сходства – отличия: от других синиц отличается хорошо заметными и направленными вниз вдоль шеи пучками черных перьев – усамми.

Распространение: Западная Европа, Юго-Западная и Центральная Азия, Япония. В Средней Азии –

– esasan uly we maýda derýalaryň jül-gelerinde ýaýran, we deňiz kenarynda.

Ýaşaýşy: uçup geçýän, höwürtegeleýän we guşlaýan guş. Batgalyklardaky, derýalaryň we kölleriň kenar ýakalaryndaky gamyşly we ýekenli jeňnelliklerde ýaşaýar. Jübüt we süri bolup gezýär. Gyrymsylaryň düýbinde, ýykylan gamyş üşmeklerinde ýa-da suwa sallanýan gyrymsyda höwürtegurýar. Aprel-maýda 5-7 sany garamtyl meneklije ak ýumurtgaly goýýar, ölçegleri – 13.7-14.1 x 16.4-19.6 mm. Esasan, mör-möjekleri we möýleri iýýär.

Statusy: az sanly, amatly ýerlerde adaty guş.

Uzynguýruk jikjikiler – Aegithalidae – Длиннохвостые синицы

Ganatlary kütek uçly gysga, guýrugy uzyn basgançakly maýda guşlar maşgalasy. Ýelek örtügi ýumşak we mymyk. Çünki kiçiräk, gapdallaryndan gysylan. Reňkinde ak, gara we çypar öwüşginler agdyklyk edýär. Ağaç sütünlerine çakgan dyrmaşýar. Boşluk meýdanlaryň tokaýlaryň ýaşaýjysy. Ululary ýaş guşlardan reňki boýunça kesgitli tapawutlanýar. Güz-gyş döwründe süri bolup gezýär. Türkmenistanda 1 görnüş bar.

364. Uzynguýruk gögümtil jikjiki – Aegithalos caudatus – Длиннохвостая синица, или ополовник

Meýdan alamatlary: serçeden kiçi, mymyk ýelekli guşjagaz. Umumy reňki gara, goýu-çal, gülgüne we kirliräk ak reňkleriň utgaşygy. **Arkasy we ganatlary, şeýle-de uzyn guýrugy – gara, guýrugynyň gapdallary ak zolakly.** Kellesiniň üsti goňurrak, böwürleri has garamtylrak zolakly, egni çal, döşi kirliräk aksowut, gary we böwürleri kirliräk-gülgüne öwüşginli. Çünki gara

равнинная часть. В Туркменистане – в основном по долинам крупных и мелких рек, и побережью моря.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся и зимующая птица. Живет в зарослях камыша и тростника на болотах и по берегам рек и озер. Держится парами и стайками. Гнездо помещается у основания кустов, на поваленных стеблях камыша или на кусте над водой. Кладка 5–7 белых с темными крапинками яиц, в апреле-мае, размеры – 13.7-14.1 x 16.4-19.6 мм. Питается, в основном, насекомыми и пауками.

Статус: немногочисленная, в подходящих местах обычная птица.

Семейство мелких птиц с длинным ступенчатым хвостом, с короткими тупыми крыльями. Оперение мягкое и рыхлое. Клюв небольшой, сжатый с боков. В окраске преобладают белый, черный и рыжие тона. Хорошо лазают по деревьям. Обитатели светлых лесов и лесных опушек. Молодые по окраске резко отличаются от взрослых. В гнездовое время держатся стаями. В Туркменистане 1 вид.

Полевые признаки: небольшая пушистая птичка, меньше воробья. Общая окраска – сочетание черных, темно-серых, розоватых и грязно-белых тонов. **Спина и крылья, а также длинный хвост – черные, по бокам хвоста белые полосы.** Верх головы буроватый с более темными полосами по бокам, плечи серые, на груди грязновато-светлый, на брюш-

hem gysga, **gözünüň daşyndaky in-siz ýalaňaç halka sary**, ol diňe ýakyn aralyk-dan görünýär. Aýaklary gara. Ýaş guşlaryň duluklary, ýeňsesi, arkasy we eginleri kirliräk-goňur, aşaky tarapy we gözünüň daşyndaky ýalaňaç halka gyzyly. Sesi batly – “çerrr-çerrr”. Uzynlygy – 148-170, ganaty – 60-70, ganatlarynyň gerimi – 183-200 mm, agramy – 8-10 g.

Meňzeşlikleri–tapawutlary: guýrugynyň örän uzynlygy bilen beýleki jikjikilerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropada we Kiçi Aziýada, Günbatar Eýranda, Demirgazyk Gazagystanda, Mongoliýada, Hytaýda, Koreýada, Ýaponiýada. Orta Aziýada–Türkmenistanyň günortagünbatarynda, ýagny Gunbatar Köpetdagda duş gelýär.

Ýaşaysy: oturymly we göçüp-gonýan guş. Derýaýaka tokaýlyk meýdanlarda, derýalaryň saýaly we miweli jülgelerinde (Sumbary, Çendir) we baglarda ýaşaýar. Höwürtegeýän döwründe jübüt we galan wagty – süri bolup gezyär. Gapdal girelgeli şarşekilli höwürtegesini agaç sütünleriniň ýabalanan ýerinde ýa-da çybyklarynyň arasynda gurýar. Aprel-iyunda 9-12 sany mawytyl-gülgüne meneklije ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 10.4-11.6 x 13.1-15.2 mm. Esasan, mörmöjekleri we möýleri iýýär.

Statusy: az sanly, amatly ýerlerde adaty guş, Sünt-Hasardag goraghanasynyň guşlarynyň iň täsin wekilleriniň biri.

Jikjikiler – Paridae – Синицевые

Maýda saýrak guşlar maşgalasy. Çünki konus şekilli gysga we başgala-

ке и боках грязновато-розовый оттенок. Клюв короткий черный, голое **узкое кольцо вокруг глаза желтое**, что видно лишь на близком расстоянии. Ноги черные. У молодых щеки, затылок, спина и плечи грязно-бурые, низ белый и вокруг глаз красное голое кольцо. Голос – звонкое «чэррр-чэррр». Длина – 148-170, крыло – 60-70, размах крыльев – 183-200 мм, вес – 8-10 г.

Сходства – отличия: от других синиц отличается очень длинным хвостом.

Распространение: Европа и Малая Азия, Западный Иран, Северный Казахстан, Монголия, Китай, Корея, Япония. В Средней Азии – юго-запад Туркменистана, а именно – Западный Копетдаг.

Образ жизни: оседлая и кочующая птица. Населяет участки с древесной пойменной растительностью, речных долин (Сумбар, Чендыр) и сады. Держится в гнездовое время парами, а в остальное – стайками. Гнездо шарообразное с боковым входом, помещается на развилке ствола или куста. Кладка 9–12 белых с фиолетово-розовыми крапинками яиц, в апреле-июне, размеры – 10.4–11.6 x 13.1–15.2 мм. Питается, в основном, насекомыми и пауками.

Статус: немногочисленная, но в подходящих местообитаниях обычная птица, один из интересных представителей птиц Сюнт-Хасардагского государственного заповедника.

Семейство мелких певчих птиц. Клюв короткий конусовидный

ra garanyňda ýiti uçly. Burun deşikleri gyllar bilen ýapylan. Aýaklary başgalara garanyňda güýçli we ýognalan dyrnakli. Yelekleri ýumşak. Ganatlary gysga we tegelenen. Horazynyň reňki mäkiýanyňa meňzeş, özgerişi ýaş tapawudynda hem az. Guşlar agaçly we gyrymsy agaçly ýerlerde ýaşaýarlar. Agaçlaryň köweklerinde, özeni çüýrän sütünleriň, kökleriň ýarçyklarynda we beýleki ýapyk ýerlerde höwürtegeýärler. Güýz-guş döwründe köp göçüp-gonýar. Mörmöjekler we seýrek haşal otlaryň daneleri bilen iýmitlenýärler. Dünýäde 60-a golaý görnüşi bolup, olaryň 10-sy Türkmenistanda ýaşaýar.

365. Züýk – Remiz pendulinus – Обыкновенный ремез

Meýdan alamatlary: serçeden has kiçi. **Kellesi, gözünüň daşyndaky uly gara tegmilden galan ýeri çal. Arkasy we eginleri goňur.** Ganatlary we guýrugy garamtyl, yelekleri agymtyl jähekli. Bedeniniň aşagy çypar ýokundyly agymtyl. Mäkiýany horazyndan solak reňkli we gözünüň daşy kiçiräk tegmilli. Ýaş guşlaryň kellesi tutuşlygyna, arkasy we eginleri çyparrak-çalymytyl, kellesi gara reňksiz. Aýaklary gara. Sesi inçe sykylyk – “tsiii-tsiiii”. Uzynlygy – 105-126, ganaty – 52-60, ganatlarynyň gerimi – 166-183 mm, agramy – 8-10 g.

Meňzeşlikleri–tapawutlary: kellesiniň çaldygy bilen garabaşly züýkden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta we Orta Ýewropada, Kawkazda, Kiçi, Orta we Merkezi Aziýada, Gazagystanda, Hytaýyň günortasynda, Koreýada we Ýaponiýada höwürtegeýär. Orta Aziýada we Türkmenistanda ýaprakly tokaýlary, tokaýjyklary, derýalaryň

и относительно острый. Ноздри прикрыты щетинками. Ноги относительно сильные с утолщенными когтями. Оперение рыхлое. Крылья короткие и закругленные. Самец и самка окрашены одинаково, возрастные изменения незначительны. Птицы, преимущественно, древесно-кустарниковых местообитаний. Гнездятся в дуплах, расщелинах и иных закрытых местах. В гнездовой период многие кочуют. Питаются насекомыми и реже семенами. В мире около 60 видов, из которых 10 в Туркменистане.

Полевые признаки: величинной значительно меньше воробья. **Голова серая, за исключением большого черного пятна вокруг глаз. Спина и плечи коричневые.** Крылья и хвост черноватые со светлыми окаймлениями перьев. Низ тела беловатый с рыжеватым налетом. Самка бледней самца, пятно вокруг глаз небольшое. У молодых вся голова, спина и плечи рыжеватосероватые, черного на голове нет. Ноги черные. Голос – тонкий свист «тсиии-тсиии». Длина – 105-126, крыло – 52-60, размах крыльев – 166-183 мм, вес – 8-10 г.

Сходства – отличия: от черно-голового ремеза отличается серой головой.

Распространение: Южная и Средняя Европа, на Кавказе, в Малой, Средней и Центральной Азии, Казахстане, на юге Китая, Кореи и Японии. В Средней Азии населяет лиственные леса и рощи, в Тур-

kenaryndaky jeňňellikleri eýeleýär, beýleki ýerlerde-de hem gabat gelmekleri mümkin. Öz arealynyň gü-norta böleginde gyslaşýar.

Ýaşayşy: uçup-geçýän we gyslaşýan görnüş, höwürtegeleýän jübütleri hem duşýar (Etrek derýasynyň boýunda). Derýalaryň we kölleriň kenaryndaky gamyşly jeňňelliklerde, agaç we gyrymsy agaçly, toraňnyly tokaýlarda mekan tutýar, uçup geçýän döwründe sazак tokaýlarynda hem gabat gelýär (Gündogar Gara-gumda). Süri bolup gezýär. Iýmiti – mör-möjekler, şeýle-de ösümlikleriň tohumlary.

Statusy: seýrek, emma, amatly ýerlerde adaty guş.

366. Garabaşly züýk – *Remiz coronatus* – Черноголовый ремез

Meýdan alamatlary: serçeden has maýda. **Horazynyň kellesiniň gapdallary we üsti gara, ýöne “tel-pejigi” aчык reňkli.** Galan ýeri adaty züýge meňzeş – arkasy we eginleri goňur, ýöne biraz solagrak. Ganatlary we guýrugy ачык dik zolakly garamty-lrak. Mäkiýany we ýaş guşlar edil adaty züýgiňki ýaly. Аýaklary goýu-goňur. Uzynlygy – 105-126, ganaty – 51-53, ganatlarynyň gerimi – 167-185 mm, agramy – 7-10 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ho-razlarynyň gara reňkiniň kellesiniň gapdallarynda we ýeňsesinde goýydygy bilen adaty züýkden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Gazagystanda we Orta Aziýanyň düzlük we daglyk ýerlerindäki derýalaryň jülgelerinde höwürtegeleýär. Türkmenistan-da – Sarygamyşda, Amyderýada we beýleki uly derýalaryň boýlarynda. Alynky Aziýada we Hindistan ý/a de-

кменистане - тугайные заросли по берегам рек, может попадаться и в других местах. Зимует в южных частях своего ареала.

Образ жизни: пролетный, зимующий вид, но встречается и на гнездовые (Этрек, низовья Теджена и Мургаба). Придерживается древесно-кустарниковых, камышовых зарослей по берегам рек и водоемов, на пролете не избегает саксаульников (в частности, в Восточных Каракумах). Гнезда как у черноголового ремеза. Осенью и зимой держатся стайками. Питание – насекомые, а также семена растений.

Статус: редок, но в подходящих местообитаниях обычен.

Полевые признаки: значительно мельче воробья. **У самца голова по бокам и сверху черная, но “шапочка” светлая.** В остальном сильно схож с обыкновенным ремезом – спина и плечи тоже коричневые, правда, чуть бледнее. Крылья и хвост черноватые со светлыми продольными полосками. Самка и молодые как у обыкновенного ремеза. Ноги темно-бурые. Длина – 105-126, крыло – 51-53, размах крыльев – 167-185 мм, вес – 7-10 г.

Сходства – отличия: от обыкновенного ремеза отличается развитием черного цвета у самцов на боках головы и затылке.

Распространение: Казахстан и Средняя Азия - по долинам равнинных и горных рек; в Туркменистане гнездится – на Сарыкамыше и по Амударье, а зимой по Амударье и долинам других крупных рек. Зимует

mirgazyk-günbatarynda gyslaşýar.

Ýaşayşy: höwürtegeleýär, uçup geçýär we gyslaşýar. Jeňňelliklerde we beýleki agaçly, gyrymsy agaçly ýerlerde mekan tutýar. Höwürtegesi özboluşly – haltajyk ýa-da ýeňlik ýaly bolup, holtumpisintli gysga girelgesi gapdalynda ýerleşýär; guşlar höwürtegesini ösümlikleriň sütük süýmlerinden öryär we ony baldakdan, köplenç suwa sallanyp duran çybykdan asyp goýýar. Maý aýynda 5-6 sany akja ýumurtgalary goýýar. Jübüt, uçup geçende we gyslanda süri bolup gezýär. Ownuk oňurgasyzlar we ösümlikleriň tohumlary bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty züýkden has köpsanly.

367. Gysgaguýruk gögümtil jikjiki – *Parus ater* – Черная синица, или московка

Meýdan alamatlary: serçeden ölegeci biraz maýda. **“Telpejigi” we bokurdagy gara, ak ýañakly. Ýeňsesi ak tegmilli.** Arkasy solak poslurak-goňur. Bili we guýrugynyň üsti çypparak. Petekesi we döşüniň öňki bölegi gara. Аşaky tarapyныň **galan ýeri mesgepisint-ak, böwürleri we gary çypparak-goňur ýokundyly.** Ganatlary goňur iki sany kese zolak görnüşinde ачык bellikli. Guýruk ýelekleri çalymtylrak jäheklenen goňur. Çünki gara, аýaklary goýу-çal. Ýaşlary uly guşlara çalymdaş, ýöne ýelekleri tutuk gara reňkli, ýelekleriniň galany kirliräk ýokundy reňki. Sesi güýçli – “si-pi, si-pi” ýa-a “ti-ti-týuý”. Uzynlygy 103-127, ganaty – 60-70, ganatlarynyň gerimi – 180-207 mm, agramy – 8-11 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: garynynyň ачык reňklidigi bilen çyppar-

ет также южнее - в Передней Азии и на крайнем северо-западе Индостана.

Образ жизни: пролетный, гнездящийся и зимующий вид. Населяет тугайные и другие заросли, участки с густыми древесно-кустарниковыми насаждениями. Характерное гнездо – в виде мешочка или рукавицы с боковым ходом в виде короткой трубки; гнездо птицы вьют из растительного пуха и подвешивают на ветках, нередко над водой. Кладка из 5-6 белых яиц в мае. Держатся парами, на пролете и зимовке стайками. Питание как у обыкновенного ремеза.

Статус: более многочислен, чем обыкновенный ремез.

Полевые признаки: размером несколько мельче воробья. **“Шапочка” и горло черные, контрастирующие с белыми щеками. На затылке белое пятно.** Спина бледная ржаво-бурая. Поясница и надхвостье рыжеватое. Зоб и передняя часть груди черные. Остальной **низ сливочно-белый с рыжеватобурым налетом на боках и брюшке.** Крылья бурые со светлыми отметинами в виде двух поперечных полос. Перья хвоста бурые с сероватыми окаймлениями. Клюв черный, ноги темно-серые. Молодые птицы похожи на взрослых, но черный цвет на перьях тусклый, остальное оперение с цветом грязноватого налета. Голос – звонкое «ци-пи, ци-пи» или «ти-ти-түй». Длина – 103-127, крыло – 60-70, размах крыльев – 180-207 мм, вес 8-11 г.

boýun jikjikiden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günbataryewropa, Demirgazyk-Günbatary Afrika, Demirgazyk-Günbatary Eýran, Hytaý, Demirgazyk Mongoliýa, Koreýa, Ýaponiýa we Gündogar Gimalaý daglary. Orta Aziýada we Gazagystanda – daglardaky pürli tokaýlyklarda. Türkmenistanda – diňe Köpetdagyň çäginde duşýar.

Ýaşaýşy: oturymly guş. Arçalyklarda we beýleki agaç-gyrymsy agaçly ýerlerde mekan tutýar. Güz-guş döwründe az-owlak göçüp-gonup gezip. Merkezi we Gündogar Köpetdagyň, adaty, 1500-1600m, seýregräk has ýokary beýikliklerde ýaşaýar. Günbatary Köpetdagda we 1500 m aşakda höwürtegeleýär. Arçalyklarda köpelmäge girişýär. Adaty, agaçlaryň köweginde höwürtege gurýar. 6-11 sany poslyrak-gyzyly mekeli ak ýumurtgalary goýýar. Esasan, mör-möjekleri iýýär.

Statusy: seýrek, käbir ýerlerde adaty guş, Köpetdag we Sünt-Hasardag goraghanalarynyň iň täsin wekilleriniň biri.

368. Çyparboýun jikjiki – *Parus rufonuchalis* – Рыжешейная синица

Meýdan alamatlary: serçeden ölçegi sähelçe kiçi. Kellesi, bokurdagy we petekesi gara. Ýaňagy we ýeňsesindäki tegmili ak. **Arkasy, döşüniň ýokarsy we garny gögümtil-çal.** Guýrugy we ganatlary goňurrak-çal. **Boýnyndaky tegmil, ganatlarynyň we guýrugynyň aşagy poslyrak-çypar reňkli.** Ganatlary we guýrugy goňur, ýelekleri gögümtil-çal jähekli. Çünki gara, aýaklary garamtyl-çal. Ýaş guşlar

Сходства – отличия: от рыжешейной синицы отличается светлым брюшком.

Распространение: Западная Европа, Северо-Западная Африка, Северо-Западный Иран, Китай, Северная Монголия, Корея, Япония и Восточные Гималаи. В Средней Азии и Казахстане по горным хвойным лесам. В Туркменистане – только в пределах Копетдага.

Образ жизни: оседлая птица. Населяет арчевники и другие участки с древесно-кустарниковой растительностью. В осенне-зимний период совершает небольшие кочевки. В Центральном и Восточном Копетдаге обитает обычно на высоте 1500-1600 м, редко выше. В Западном Копетдаге гнездится и ниже 1500 м. К размножению приступают в апреле. Гнезда обычно в дуплах. В кладке 6-11 белых с ржаво-красными крапинками яиц. Питается, в основном, насекомыми.

Статус: редкая, местами обычная птица, один из наиболее интересных представителей Копетдагского и Сюнт-Хасардагского заповедников.

Полевые признаки: размером чуть меньше воробья. Голова, горло и зоб черные. Щеки и пятно на затылке белые. **Спина, верх груди и брюшко голубовато-серые.** Хвост и крылья буровато-серые. **Пятна на шее, испод крыла и подхвостье ржаво-рыжие.** Крылья и хвост бурые с голубовато-серыми каемками перьев. Клюв черный, ноги черно-серые. Молодые птицы бледнее, чем взрослые, но распре-

делению цветов то же самое. Голос – звонкое «ци-фюююй». Песня – громкая трель. Длина – 127-130, крыло – 70, размах крыльев – 220-230 мм.

Meňzeşlikleri–tapawutlary: boýnynyň we arkasynyň ýokarky böleginiň çyppak öwürgini, ganatlarynyň we guýrukastynyň çyppagy, böwürleriniň çaldygy, şeýle-de ölçeginiň has uludygy bilen gysgaguýruk gögümtil jikjikiden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Merkezi Aziýanyň daglary, Günbatary Hytaý we Gimalaý daglary. Orta Aziýada we Gazagystanda – daglaryň pürli tokaýlary. Türkmenistanda – diňe Köýtendagda.

Ýaşaýşy: oturymly we göçüpgonýan guş. Daglaryň arçalyklarynda mekan tutýar. Höwürtegeleýän döwründe jübüt, galan wagty – süri bolup, beýleki jikjikiler bilen gezip. Köweklerde höwürtegeleýär. Maý-iyunda ýumurtga goýýar. Mör-möjekleri, şol sanda arçalaryň zyýançeslerini çokýar.

Statusy: az sanly guş, Köýtendag goraghanasynyň iň täsin guşlarynyň biri.

369. Asman reňli jikjiki – *Parus caeruleus* – Обыкновенная лазоревка

Meýdan alamatlary: serçeden kiçi. Maňlaýy we gaşlary agymtyl. **Kellesi, depesi we ýeňsesi açyk-gök. Gözüniň üstünden insiz garamtyl zolak geçýär.** Bedeniniň üsti mawumtyl ýokundyly, kellesiniň gapdallary ak. Bokurdagy gara tegmilli. Aşaky tarapy sary, döşünden garnyna tarap agymtylrak gaýmaly mawumtyl-garamtyl zolak gidýär. Ganatlary gara, ýelekleri mawumtyl

деление цветов то же самое. Голос – звонкое «ци-фюююй». Песня – громкая трель. Длина – 127-130, крыло – 70, размах крыльев – 220-230 мм.

Сходства – отличия: от черной синицы отличается рыжеватым оттенком на шее и верхней части спины, рыжеватыми подкрыльями и подхвостьем, серым брюхом, а также более крупным размером.

Распространение: горы Центральной Азии, Западный Китай и Гималаи. В Средней Азии и Казахстане населяет горные хвойные леса. В Туркменистане – только в Койтендаге.

Образ жизни: оседлая и кочующая птица. Населяет горные арчевые леса. В гнездовой период держится парами, в остальное время – стайками, часто с другими синицами. Гнезда обычно в дуплах. Кладка в мае-июне. Питается насекомыми, в том числе и вредителями арчевников.

Статус: немногочисленная птица, один из наиболее интересных представителей Койтендагского заповедника.

Полевые признаки: величиной меньше воробья. Лоб и брови светлые. **Голова, темя и затылок светло-голубые. Через глаз – темная узкая полоска.** Верх тела зеленоватый с легким голубоватым налетом, бока головы белые. На горле черное пятно. Низ желтый, от груди на брюшко идет голубовато-черноватая полоска с беловатым окаймлением. Крылья черные с голубыми

jähekli. Guýrugy mawumtyl jähekli garamtylrak. Çüňki gara, aýaklary açyk-çal. Ýaş guşlaryň reňki öçügsi. Sesi güýçli – “si-sin-sirzzz”. Saýraýşy – üzňeýin gaty sykylyklar. Uzynlygy – 120, ganaty – 62-70, ganatlarynyň gerimi – 220-225 mm, agramy – 10-12 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: kellesindäki gök “telpejigi” bilen beýleki jikjikilerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropa, Demirgazyk çetinden başgalarynda, Kanar adalary, Demirgazyk Afrika, Kiçi Aziýa w Eýran. Orta Aziýada we Gazagystanda daglardaky pürli tokaýlyklarda ýaýran. Türkmenistanda – Günbatar we Merkezi Köpetdagda. Gyş döwründe käte dag eteklerine aralaşýar.

Ýaşayşy: arça tokaýlarynda, saýaly baglarda we seýilgählerde ýaşaýar. Höwürtegeýän döwründe jübüt, galan wagty – süri bolup, ýygy-ýygydan beýleki jikjikiler bilen bile gezýär. Agaçlaryň köweklerinde höwürtegeýär. Aprel-maýda 5-10 sany gyzlymtyl-goňur meneklije ak ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekleri we olaryň ýumurtgalaryny iýýär.

Statusy: az öwrenilen, az sanly, käbir ýerlerde seýrek guş, Köpetdag we Sünt-Hasardag goraghanalarynyň iň täsin wekilleriniň biri.

370. Sary petekeli jikjiki – *Parus flavipectus* – Желтогрудая лазоревка

Meýdan alamatlary: serçeden biraz kiçi. Kellesiniň üsti açyk-çal. Çüňkenden başlanýan gögümtil zolak gözünüň üstünden geçýär. Depesi we bokurdagy garamtylrak. **Arkasy mawumtyl-çal. Kellesiniň gapdallary we bokurdagy kirliräk-çal. Petekesi we döşüniň önki**

каемками перьев. Хвост черноватый с голубыми каймами. Клюв черный, ноги светло-серые. Молодые птицы менее яркой окраски. Голос – звонкое «ци-цинь-циррзз». Песня – громкий прерывистый свист. Длина – 120, крыло – 62-70, размах крыльев – 200-225 мм, вес – 10-12 г.

Сходства – отличия: от других синиц отличается голубой “шапочкой” на голове.

Распространение: Европа, кроме крайнего Севера, Канарские острова, Северная Африка, Малая Азия и Иран. В Средней Азии и Казахстане населяет горные хвойные леса. В Туркменистане – западные и центральные части Копетдага. Зимой изредка в его предгорьях.

Образ жизни: оседлый вид. Населяет арчевые леса, сады и парки. В гнездовой период держится парами, в остальное время – стаями, часто с другими синицами. Гнездо устраивает в дупле. Кладка из 5-10 белых с красно-коричневыми крапинками яиц, в апреле-мае. Питается насекомыми и их яйцами.

Статус: малоизученная, немногочисленная, местами редкая птица, один из интересных представителей Копетдагского и Сюнт-Хасардагского заповедников.

Полевые признаки: несколько меньше воробья. Верх головы светло-серый. От клюва через глаз тянется синеватая полоска. Темя и горло темнее, более голубоватые. Спина голубовато-серая. Бока головы и горло грязновато-сероватые. **Поперек зоба и передней**

bölegi kese sary zolakly, ýöne ol has öçügsi. Aşaky tarapyň galan bölegi agymtylrak. Ganatlary gara, ýeleklere mawumtyl jähekli, olardaky ak tegmiller has ulurak. Guýrugy garamtylrak mawumtyl-gök gaýmaly we ýeleklerinde ak tegmilleri bolýar. Aýaklary we çüňki goýu-çal. Ýaşlary ulylaryna çalyndaş, ýöne kellesi çalymtyl, üstki tarapyň umumy reňki sarymtylrak öwüşginli kirliräk-çalymtyl. Uzynlygy – 120-145, ganaty – 62-70, ganatlarynyň gerimi – 220-225 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: üstki tarapyň gögümtiräk öwüşginini, petekesiniň we döşüniň açyk sary reňki bilen ak asman reňki jikjikiden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Orta Aziýada we Gazagystanda daglyk ýerleri eýeleýär. Türkmenistanda – diňe Köýtendagda.

Ýaşayşy: oturmly we göçürgönýän guş. Jülgelerdäki we saýaly baglardaky (Köýtenderýa jülgesi) köwekli agaçly agaç-gurmysy agaçly meýdanlaryny halaýar. Höwürtesini agaçlaryň köweklerinde, ýukylan agaçlaryň jaýryklarynda, taşlanan jaýlaryň üceginiň aşagynda we gum gaýalaryň köwekli tekjelerinde gurýar. Aprel-maýda 6-9 sany gülgüne öwüşginli ak ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekleri we olaryň gurçuklaryny iýýär.

Statusy: seýrek guş, Köýtendag goraghanasynyň iň täsin wekilleriniň biri.

371. Ak asman reňki jikjiki – *Parus cyanus* – Белая лазоревка

Meýdan alamatlary: serçeden biraz kiçi. **Kellesiniň üsti ak, çüňkenden gözüne tarap mawy zolak geçýär, arkasy çalymtyl-mawy,**

части груди – желтая полоса, но она не яркая. Остальной низ беловатый. Крылья черные с голубыми каемками перьев, белые пятна на них больше. Хвост черноватый с голубовато-синими каемками и белыми пятнами на перьях. Ноги и клюв темно-серые. Молодые во многом похожи на взрослых, но голова сероватая, общий тон верха грязновато-сероватый с желтоватым оттенком. Длина – 120-145, крыло – 62-70, размах крыльев – 200-225 мм.

Сходства – отличия: от белой лазоревки отличается синеватым тоном верха и светло-желтой окраской зоба и груди.

Распространение: в Средней Азии и Казахстане населяет горные местообитания. В Туркменистане – только в горах Койтендаг.

Образ жизни: оседлая и кочующая птица. Предпочитает древесно-кустарниковые участки с наличием дуплистых деревьев, по ущельям и в садах (долины Койтендары). Гнезда устраивают в дуплах деревьев, расщелинах, под крышами пустых построек, поселяются и в нишах глинистых обрывов. Кладка из 6-9 белых с розовым оттенком яиц, в апреле-мае. Питается насекомыми и их гусеницами.

Статус: редкая птица, один из наиболее интересных представителей Койтендагского заповедника.

Полевые признаки: несколько меньше воробья. **Верх головы белый, полоска от клюва к глазу голубая, спина серовато-голубая,**

ganatlary we guýrugy mawy reňkli. Guýrugynyň gapdalaryndaky inli zolaklar, egnindäki zolaklar, garny ak ýa-da çalymtyl, döşi ak ýa-da sary gysga gara zolakly. Ýaşlary ulularyna çalymdaş, yöne kellesi çalymtyl, üstki tarapyň umumy reňki kirliräk-çalymtyl, käte bedeniniň aşaky tarapy sarymtyl öwüşginli. Uzynlygy – 120-145, ganaty – 62-70, ganatlarynyň gerimi – 220-225 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: kellesiniň akdygy, arkasynyň çaldygy, ganatlarynda we guýrugynda ak reňkleriň güýçli ösendigi, şeýle-de aşak tarapyň akdygy bilen asman reňkli jikjikiden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropa, Merkezi Aziýa, Günorta Gazagystan. Orta Aziýa daglyk ýerlere ýaýran. Türkmenistanda – diňe Köýtendagda.

Ýaşaýşy: oturymly we göçüp-gonýän guş. Ekilen tokaýlarda we tebigy agaç-gyrymsy agaçlaryň suw basan ýerlerdäki jeňňelliginde, şol sanda derýa boýlaryndaky köwekli agaç sütünli tokaý zolaklarynda mekän tutýar. Agaçlaryň köweklerinde, jaýrylan sütünlerinde, taşlanan jaýlaryň üceginiň aşagynda höwürte gurýar. Maý-iyunda 6-11 sany gülgüne öwüşginli we çypar meneklije ak ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekleri we olaryň ýumurtgalaryny iýýär.

Statusy: edil sary petekeli jikjikiniňki ýaly.

372. Uly gögümtil jikjiki – *Parus major* – Большая синица

Meýdan alamatlary: serçe ululygynda, çalasyn hereketli guşjagaz. Depesi, ýeňsesi, boýynyň gapdallary, bokurdagy, petekesiniň ýokarky bö-

крылья и хвост голубые. Широкие полосы по бокам хвоста, полоски на плечах, брюшко белое или сероватое, грудь белая или желтая с черной короткой полоской. Молодые похожи на взрослых, но голова сероватая, общий фон верха грязновато-сероватый, на нижней стороне тела иногда желтоватый оттенок. Длина – 120-145, крыло – 62-70, размах крыльев – 200-225 мм.

Сходства – отличия: от обыкновенной лазоревки отличается белой головой, серой спиной, сильным развитием белого цвета на крыльях и хвосте, а также и белым низом.

Распространение: Европа, Центральная Азия, Южный Казахстан. В Средней Азии населяет горные местообитания. В Туркменистане встречается только в горах Койтендаг.

Образ жизни: Оседлая и кочующая птица. Населяет искусственные лесопосадки и естественные пойменные древесно-кустарниковые заросли, в том числе, и по долинам рек с дуплистыми деревьями. Гнезда устраивают в дуплах деревьев, расщелинах, под крышами пустых построек. Кладка из 6-11 белых с розовым оттенком и рыжеватыми крапинками яиц, в мае-июне. Питается насекомыми и их яйцами.

Статус: такой же как у желтогрудой лазоревки.

Полевые признаки: величистой с воробья, бойкая подвижная птичка. Темя, затылок, бока шеи, горла, верхняя часть зоба черные

legi güýçli gök metal ýalpyldyly gara. Ýaňagy ak. **Guýrugy we ganatlary mawumtyl-çal, arkasy ýaşyl.** Döşi we garny sary, böwürleri goňurrak-çal ýokundyly. Petekesiniň aşagyndan başlap, garnynyň gutaryan ýerine çenli gara zolak gidýär. Çünki we aýaklary goýu-çal. Ýaş guşlar garamtyrak-goňur, bokurdagy we kellesi metal ýalpyldysyz. Aşaky tarapy tutuk-goňur, garnynyň aşagy zolakly. Sesi jaňnyrdyly “pin-pin-çeržž”. Saýraýşy – “si-pi-si-pi, in-ça-in-ça” sesli sykylyklar. Uzynlygy – 133-170, ganaty – 70.0-70.4, ganatlarynyň gerimi – 210-260, guýrugy 60.5-67.0 mm; agramy -17-21 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçeginiň uludygy we arkasynyň ýaşyldygy bilen çal jikjikiden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropa, Demirgazyk-Günbatar Afrika we Aziýa. Orta Aziýada – Hazar deňziniň gündogar kenaryndan günorta Ural jülgesine çenli we demirgazyk Gazagystan (51-nji parallele çenli). Türkmenistanda – Köpetdagda.

Ýaşaýşy: oturumly guş. Arçalyk tokaýlarda, dagdaky derýajyklaryň saýaly agaçly jülgelerinde we ilatly ýerleriň baglyklarynda mekän tutýar. Höwürtelän döwri diňe bir tokaý agaçlary bilen çäklenmän, adamlaryň guran desgalaryndan hem peýdalanýar. Ýylda iki gezek höwürteleşýär. Mart-maý aýlarynda 8-10 sany köpsanly gyzylymtyl-goňur meneklije ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 13.0-14.8 x 18.5-19.1 mm. Mör-möjekleri we möýleri, seýrek ösümlikleriň tohumlaryny iýýär.

Statusy: az sanly, daglaryň kabir ýerlerinde adaty görnüş.

с сильным синим металлическим блеском. Щеки белые. **Хвост и крылья голубовато-серые, спина зеленая.** Грудь и брюхо желтые, буровато-серый налет на боках. **Снизу от зоба до конца брюшка идет черная полоска.** Клюв и ноги темно-серые. Молодые птицы черновато-бурые, на горле и голове нет металлического блеска. Низ беловато-бурый, срединной полосы нет. Голос – звонкое «пинь-пинь-чэржж». Песня – «ци-пи-ци-пи, инча-инча», громкие свисты. Длина – 133-170, крыло – 70.0-74.4, размах крыльев – 210-260, хвост – 60.5-67 мм, вес – 17-21 г.

Сходства – отличия: от серой синицы отличается крупным размером и зеленой спиной.

Распространение: Европа, Северо-Западная Африка и Азия. В Средней Азии – от восточного побережья Каспийского моря к югу до долины Урала и северный Казахстан (до 51-й параллели). В Туркменистане – в юго-западном Копетдаге.

Образ жизни: оседлая птица. Населяет арчевые леса, долины горных речек с древесными насаждениями и сады в населенных пунктах. На гнездовье связаны не только с деревьями, но и с постройками человека. Гнездятся два раза в году. Полная кладка 8-10 яиц, в марте-мае. Яйца белые, с многочисленными красно-бурыми пятнышками. Размеры яиц – 13-14.8 x 18.5-19.1 мм. Питается насекомыми, пауками, редко семенами растений.

Статус: немногочисленный, местами обычный в горах вид.

373. Buhara jikjikisi – *Parus bokharensis* – Бухарская синица

Meýdan alamatlary: serçeden kiçi, örän çakgan guşjagaz. Horazynyň kellesi, bokurdagy, petekesi we garnyndaky zolak metal ýalpyldyly gara. Kellesiniň we boýnynyň gapdalary süýririäk üçburç uly ak tegmilli. **Arkasy külreňk-çal**, gara “telpejigi” bilen arkasynyň arasyndan agymtyl tegmil geçýär. Garny we bedeniniň gapdalary ak. Çünki we aýaklary goýu-çal. Ýaş guşlar üstki tarapyňyň goňurrak reňki bilen tapawutlanýar, “telpejigi” we bokurdagy goýu-goňur. Bokurdagyndaky tegmil kiçi. Sesi pessaýja we ýumşak – “pin-pin-çeržž”. Saýraýy has owazly – “si-si-si-pi, in-ça-in-ça”. Ganaty – 66.0-75.0, guýrugy – 74.0-85.0 mm; agramy – 13.2 - 14.7 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çal jikjikä bilen juda meňzeş, ondan arkasynyň külreňk-çaldygy we **bir ýerde bile ýaşamaýandygy bilen tapawutlanýar.**

Ýaýran ýerleri: Orta Aziýa we Gazagystan. Türkmenistanda – Garagumda, Üçtagangumda, Çilmamedgumda, Köpetdagyň eteklerinde, Bathyzda, derýalaryň jülgelerinde (Amyderýa Garagum, Murgap, Tejen derýalary).

Ýaşayşy: oturymly guş. Sazak, ýylgyn, toraňny, pisse agaçlarynyň köweklerinde höwürtleýär, tokaý-seýilgäh zolaklaryny we adamlaryň guran desgaly yerlerinde mekan tutýar. Ýylda iki gezek köpelyär. Martda maýda 8-9 sany köpsanly gyzgylt-goňur meneklije ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri 12.5-13.5 x 16.4-17.5 mm. Mör-möjekleri, olaryň liçinkalaryny, ataýrlary, maýda möýleri we seýrek ösümlük tohumlaryny iýýär.

Полевые признаки: подвижная птичка, размером меньше воробья. У самца голова, горло, зоб и полоса на брюхе черные с металлическим блеском. По бокам головы и шеи – большие белые овально-треугольные пятна. **Спина пепельно-серая**, на границе черной “шапочки” и спины беловатое пятно. Брюшко и бока тела белые. Клюв и ноги темно-серые. Молодые птицы отличаются буроватой окраской верха, шапочка и горло темно-бурые. Пятно на горле маленькое. Голос – тихое и мягкое «пинь-пинь-чэржж». Песня – более мелодичное «ци-ци-пи, ин-ча-ин-ча». Крыло – 66-75, хвост – 74-85 мм, вес – 13.2-14.7 г.

Сходства – отличия: очень схожа с серой синицей, отличается пепельно-серой спиной, **совместно с ней не обитает.**

Распространение: Средняя Азия и Казахстан. В Туркменистане – Каракумы, Уртаганкумы, Чильмамедкумы, предгорные оазисы Копетдага, Батхыз, речные долины (Амударья, Каракумдарья, Мургаб, Теджен).

Образ жизни: оседлая птица. Гнезда строит в дуплах саксаула, тамарикса, туранги, фисташки, охотно поселяются в лесопарковых зонах и постройках человека. Кладка два раза в году. Полная кладка 8-9 яиц, в марте-мае. Яйца белые, с многочисленными красно-бурыми пятнышками. Размеры яиц – 12.5-13.5 x 16.4-17.5 мм. Питается насекомыми и их личинками, мелкими пауками и редко семенами.

Статус: в подходящих местоо-

Statusy: Türkmenistanyň düzlikleriniň amatly yerlerinde adaty görnüş.

битаниях обычный вид на равнинах Туркменистана.

374. Çal jikjiki – *Parus cinereus* – Серая синица

Meýdan alamatlary: serçeden göwresi kiçi. Kellesi, bokurdagy, petekesi we garnyndaky zolak gara metal ýalpyldyly. Kellesiniň gapdalarynda ak uly tegmilleri bolýar. **Arkasy çal**, onuň öňki bölegi ýaşyl ýokundyly. **Arkasynyň we gara “telpejiginiň” arasyndan ak tegmil geçýär. Bedeniniň aşagy ak, böwürleri goňurrak-çal öwüşginli** we petekeden başlaýan gara zolak garnynyň aşagyndan tä onuň yzky bölegine çenli dowam edýär. Çünki we aýaklary goýu-çal. Ýaş guşlar garamtyrak-goňur, bokurdagy we kellesi metal ýalpyldysyz. Aşak tarapy agymtyl-goňur we onuň ortasy zolaksyz. Sesi we saýraýy edil uly gögümtil jikjikiniňki ýaly.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: öleşeginiň kiçidigi, agymtyl garny, arkasynyň ýelek örtüginiň çaldygy bilen uly gögümtil jikjikiden tapawutlanýar. Buhara jikjikisine örän çalymdaş, **ýöne onuň bilen bir ýerde gabat gelmeýär.**

Ýaýran ýerleri: Günorta Aziýa, Hindistan, Hindihytaý. Orta Aziýada – Köpetdagyň, Paropamiziň, Ginduguşyň we Gimalaý daglar. Türkmenistanda – Köpetdagda.

Ýaşayşy: oturymly guş. Dagda adaty görnüş. Dagardaky derelerde, derýalaryň agaçly jülgelerinde, dagdaky obalaryň saýaly baglarynda mekan tutýar. Guşlar hoz agaçly tokaýlarda, ýarçykly gaýa eňňitleriniň badamly, gyrymsyly jeňňeliklerinde, şeýle-de daşdan örülen desgalaryň amatly yerlerinde höwürtleýärler.

Полевые признаки: величиной меньше воробья. Голова, горло, зоб и полоса на брюхе черные с металлическим блеском. По бокам головы большие белые пятна. **Спина серая**, передняя часть ее имеет слабый зеленый налет. **Между спиной и черной “шапочкой” беловатые пятна. Низ тела белый с буровато-серым оттенком на боках** и черной полосой, идущей по середине тела от зоба до задней части брюшка. Клюв и ноги темно-серые. Молодые птицы черновато-бурые, на горле и голове нет металлического блеска. Низ беловато-бурый, срединной полосы нет. Голос и песня как у большой синицы.

Сходства – отличия: от больших синиц отличается меньшим размером, беловатым брюхом и серым оперением спины. Очень похожа на бухарскую синицу, **но совместно с ней обычно не обитает.**

Распространение: Южная Азия, Индостан, Индокитай. В Средней Азии – горные районы Копетдага, Паропамиза, Гиндукуша и Гималаев. В Туркменистане – Копетдаг.

Образ жизни: оседлая птица. Обычно в горах. Населяет горные ущелья, речные долины с древесными насаждениями, сады в селениях в горах. Птицы гнездятся в ореховых лесах, в щелях скал с разреженными рощами миндаля и других кустарников, а также в нишах каменных строений. Гнездятся два раза в году. Полная кладка

Ýylda iki gezek nesil öndürýär. Martda maýda 6-7 sany gyzylymtyl-açyk me-neklje ak ýumurtgalary goýýar. Mör-möjekleri, möýleri we ösümlikleriň tohumlaryny iýýär.

Statusy: az sanly, ýöne biziň dag-larmyzda beýleki jikjikiileriň arasynda adaty görnüş.

Daşdeşenler – Sittidae – Поползневые

Agaçlaryň we gyrumysy agaçlylaryň ösen gaýaly ýerlerinde ýa-da gum gaýalarynda ýaşayan maýda guşlar maşgalasy. Aýaklary kelte we daýaw, uzyn barmaklarynyň dyrnaklary güýçli egmek. Çünki göni, güýçli we beýlekilere gananynda uzyn. Ýelek örtügi gür, mymyk. Guýrugy göni we gysga. Gaýalara ýa-da agaçlaryň sütünlerine çalasyн dyrmaşýarlar, köplenç başaşak hereket edip gezyýärler. Köweklerde ýa-da gaýalaryň ýarçyklarynda we kert gum gaýalarynda höwürtleýärler. Höwürtgäniň girelgesini palçykdan galyň, göwresi girelgä sygar ýaly edip ýapýarlar. Ýymiti ösümlikleriň tohumlary we mör-möjekler. Dünýäde 30, Türkmenistanda 2-i görnüşi bar.

375. Uly gaýa daşdeşeni – *Sitta tephronota* – Большой скалистый поползень

Meýdan alamatlary: serçeden biraz ulurak. Bedeniniň üstki tarapy külreňk-çal. **Çünkinden başlap gözünüň üstünden ýeňsesine garazolak gecýär. Воýнунуň gapdallary, bokurdagy we döşиниň öňki bölegi goňur.** Kellesiniň gapdallary petekesi we döşi mesgepisint-çypparak ýokundyly. Ganatlary we guýrugy agymtyl-poslurak-sary uçly goňurrak-goýu-çal. **Garny we böwürleri açyk, goýu-çypparak reňkli.** Çünki gara, uzyn, aşaky çünkiniň düýbi agymtyl

из 6-7 яиц, в марте-мае. Скорлупа белая и покрыта мелкими красно-вато-светлыми пятнами. Питается насекомыми, пауками и реже семенами растений.

Статус: немногочисленный, но наиболее обычный вид среди других синиц в наших горах.

Семейство мелких птиц, обитающих в древесных насаждениях, скалистых участках или земляных обрывах. Ноги короткие и сильные с длинными пальцами и сильно изогнутыми когтями. Клюв прямой, сильный и довольно длинный. Оперение густое, пушистое. Хвост прямой короткий. Ловко лазают по скалам или стволам деревьев, часто перемещаясь вниз головой. Гнездятся в дуплах или расщелинах скал и обрывов. Вход в гнездо заделывают толстой прочной глиняной крышкой с небольшим летным отверстием. Пища – семена и насекомые. В мире около 30, в Туркменистане – 2 вида.

Полевые признаки: величиной несколько крупнее воробья. Верхняя сторона тела пепельно-серая. **От клюва через глаз к затылку идет черная полоска. Бока шеи, горло и передняя часть груди бурые.** Бока головы, зоб и грудь со сливочно-рыжеватым налетом. Крылья и хвост буровато-темно-серые с бледно-ржавчато-желтыми вершинами. **Брюшко и бока тела светлые, рыжеватые.** Клюв черной длинный прямой со светлым

göni. Aýaklary çal reňkli. Ýaş guşlaryň üstki tarapy goňur ýokundyly, aşagy tutuk reňkli. Sesi güýçli – “prýuýuý-týuý-týuý” ýa-da “sit-sit”. Saýraýşy batly sykylyklaryň toplumu. Uzynlygy – 158-174, ganaty – 80-93.5, ganatlarýnyň gerimi – 263-286 mm, agramy – 38 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: göwresiniň has uludygy we böwürleriniň goýu-çyppar reňki, şeýle-de has ýogyn çünki bilen beýleki daşdeşenlerden tapawutlanýar. Türkmenistanda meňzeş görnüşleri ýok.

Ýaýran ýerleri: Kiçi we Alynký Aziýa, Orta Aziýada – Pamiriň we Jungar Alatauyň gersleri. Türkmenistanda – Uly we Kiçi Balkanyň, Köpetdagyň, Köýtendagyň aşaky we ortaky kemerleri, Bathyzyň we Garabiliň amatly ýerleri.

Ýaşayşy: oturymly guş. Dagyň kert daşlyk we gaýaly eňitlerinde, dag etek toýunsow baýurlyklarynda mekan tutýar. Ýeke we jübüt bolup, daşlaryň üstünden we gaýalardan tow-sup, olara çalasyн dyrmaşýar. Mart-maýda gaýadaky amatly kowejikleriň biriniň agzynyň gyralaryny palçyk bilen suwap, höwürtgäniň agzyny eýlenen palçykdan tamdyrşekilli ösdürip, gapdal girelgeli höwürtle gurýar. 7-9 sany gyzylymtylrak me-neklje ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 21-24 x 14.8-16.2 mm. Mör-möjekleri, olaryň liçinkalaryny we ýumurtgalaryny, möýleri iýýär.

Statusy: aňsat görünüän, az sanly, käbir ýerlerde adaty görnüş.

376. Diwarguş – *Tichodroma muraria* – Стенолаз

Meýdan alamatlary: serçe ululykda. Kellesiniň üsti, arkasynyň, döşиниň we garnynyň reňki külreňk-çal. Ganatlary, guýrugy, ýaz-tomus döwründe

основанием подклювья. Ноги серого цвета. У молодой птицы верх с бурым налетом, низ окрашен тусклее. Голос – громкое «прюуй-туй-туй» или «сит-сит». Песня – набор громких свистов. Длина – 158-174, крыло – 80-93.5, размах крыльев – 263-286 мм, вес – 38 г.

Сходства – отличия: от других поползней отличается большей величиной и темно-рыжеватой окраской боков, а также более толстым клювом. В Туркменистане сходных видов нет.

Распространение: Малая и Передняя Азия, в Средней Азии – горные хребты Памира и Джунгарского Алатау. В Туркменистане – нижний и средний пояс Большого и Малого Балханов, Копетдага, Койтендага, а также в подходящих рельефных участках Бадхыза и Карабиля.

Образ жизни: оседлая птица. Населяет крутые каменистые и обрывистые склоны гор и предгорных глинистых холмистых участков. Держится в одиночку и парами на камнях и скалах, ловко лазая и прыгая по ним. Гнездится в марте-мае в щелях и ход смазывает глиной или лепит гнездо из глины в виде небольшого горшочка с боковым отверстием. Кладка из 7-9 белых с красноватыми крапинками яиц, размеры – 21-24 x 14.8-16.2 мм. Питается насекомыми и их личинками и яйцами, пауками.

Статус: заметный, немногочисленный, местами обычный вид.

Полевые признаки: величиной с воробья. Окраска верха головы, спины, груди и брюшка пепельно-серая. Крылья, хвост, а в весенне-

bokurdagy gara, garny garamtyl-çal. Güzde we gýşda bokurdagy ak. **Ganatlary inli gülgüne-gyzyl zolakly, guýrugynyň we ganatlarynyň uçlary ak tegmilli.** Çünki inçeden uzyn. Ýaş guşlaryň bokurdagy agymtyl, kellesiniň üsti goňurak. Aýaklary we çünki garamtyl. Sesi pessaýja sykylyk – “siiiuuu”. Uzynlygy – 160-176, ganaty – 94-100, ganatlarynyň gerimi – 285-300 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: çünki inçeden uzyn, ganatlary inli gülgüne-gyzyl zolakly.

Ýaýran ýerleri: Günbatar Ýewropanyň daglary, Alynky we Merkezi Aziýa. Orta Aziýada – daglyk ýerlerden gündogara – Jungar Alatawa çenli. Türkmenistanda – Köýtendagyň, Köpetdagynyň we Uly Balkanyň tokaýly we daşly ýerleri.

Ýaşayşy: oturymly we göçüp-gönýän guş. Dagyň ýokarky kemberli gaýalarynda ýaşaýar, gýşyna derýalaryň jülgelerine we dag eteklerine düşýär. Uçuşy haýal we sessiz. Maý-iyunda gaýalaryň ýarçyklarynda höwürte gurýar. 3-5 sany gyzlymtyl-goňur meneklije ak ýumrtgalary goýýar, ölçegleri – 21.3 x 14.3 mm. Mör-möjekleri we olaryň liçinkalaryny iyýär.

Statusy: seýrek, amatly şertli ýerlerde adaty gus.

Jüýgüldekler – Certhiidae – Пищуховые

Diňe agaçlaryň üstünde ýaşaýan, maýda guşlar maşgalasy. Çünki inçe, egmek. Burun deşikleri insiz, deri gasyny bilen örtülen. Aýaklary gysga, yöne barmaklary uzyn, egmek dyrnakly, ganatlary kütek we inli. Guýrugynyň ýelekleri gaty we çeyе, uçlary çowly. Guşlar agaja dyrmaşanlary-

летний период и горло – черные, брюшко черно-серое. Осенью и зимой горло белое. **На крыльях широкая малиново-красная полоса, на концах хвоста и крыльев белые пятна.** Клюв тонкий, длинный. У молодых птиц горло беловатое, верх головы буроватый. Ноги и клюв черноватые. Голос – низкий свист «циииуу». Длина – 160-176, крыло – 94-100, размах крыльев – 285-300 мм.

Сходства – отличия: тонкий длинный клюв, широкая малиново-красная полоска на крыльях.

Распространение: горы Западной Европы, Передней и Центральной Азии. В Средней Азии – горные районы на восток – до Джунгарского Алатау. В Туркменистане – лесные и каменистые участки Койтендага, Копетдага и Большого Балкана.

Образ жизни: оседлая и кочующая птица. Населяет скалы верхнего пояса гор, зимой спускается в долины рек и предгорья. Полет слабый и тихий. Гнездо устраивает в мае-июне в расщелинах скал. Кладка из 3-5 белых с красно-бурыми пятнышками яиц, размеры – 21.3 x 14.3 мм. Питается насекомыми и их личинками.

Статус: редкая, в подходящих местах обычная птица.

Семейство мелких птиц, живущих исключительно на деревьях. Клюв тонкий изогнутый. Ноздри узкие, прикрыты складкой кожи. Ноги короткие, но пальцы длинные, с изогнутыми когтями, крылья тупые и широкие. Хвост жесткий, с заостренными упругими концами

nda guýruk ýeleklerine daýanýarlar. Ýelekleri ýumşak. Gaýalaryň diwarlaryna ýa-da agaç sütünlerine aňsatlyk bilen dyrmaşýar. Gaýalaryň ýarçyklaryndan we agaçlaryň gabygynyň aşagyndan mör-möjekleri çöpläp iýmitlenýärler. Dünýäde 16 görnüş, olardan 1-i Türkmenistanda.

377. Gimalaý jüýgüldewügi – Certhia himalayana – Гималайская пищуха

Meýdan alamatlary: serçeden kiçi. **Bedeniniň üstki tarapy garamtyl we ýagty menekli çal. Arkasynyň we eginleriniň ýelekleri ýarymaýsekili kese garamtyl-goňur bellikli.** Ganatlarynyň we guýrugynyň ýelekleri goňurak kese agymtyl zolakly. Bedeniniň aşaky tarapy we gaşy agymtyl. **Çünki uzyn, aşaklygyna egmek.** Aýaklary goňurak. Ýaş guşlaryň bedeniniň aşaky tarapy kirliräk-ak reňkli we bedeniniň üsti has alarak. Çünki gysga we egmegi az. Sesi inçe – “tsii-tsii”. Saýraýşy – gysga sesli owazlar. Ganaty – 64.5–74.2, çünki – 16-17 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: beýle-kilere garanyňda göwresiniň uludygy çünküniň has uzynlygy bilen beýleki jüýgüldewüklerden tapawutlanýar. Görnüşleriň arasynda meňzeşi Türkmenistanda ýok.

Ýaýran ýerleri: Hytaýyň we Mýanmanyň, Gimalaý daglarynyň daglyk ýerleri. Orta Aziýada – dag tokaýlarynda. Türkmenistanda – diňe Köýtendagda.

Ýaşayşy: uçup geçýän, höwürtegeleýän we guşlaýan guş. Daglardaky arça tokaýlygynda ýaşaýar. Ýeke we jübut bolup gezýär. Agaçlaryň köweklerinde ýa-da özeni çüýrär ýykylan agaçlaryň ýarçyklarynda

перьев, на которые пищухи опираются при лазании. Оперение рыхлое. Хорошо лазают по стенам скал или по стволам деревьев. Питаются насекомыми, доставая их из трещин скал и коры. В мире 16 видов, из которых в Туркменистане – 1.

Полевые признаки: величинной меньше воробья. **Верхняя сторона тела серая с темными и светлыми крапинками.** На спине и плечевых перьях поперечные темно-бурые полулунные отметины. Крылья и хвостовые перья буроватые с поперечными светлыми полосами. Нижняя сторона тела и бровь беловатые. **Клюв длинный, изогнутый вниз.** Ноги буроватые. У молодых птиц низ тела грязно-белого цвета, и верхняя сторона тела более пестрая. Клюв короче и менее загнут. Голос – тонкое «тсии-тсии». Песня – звонкая, короткая трель. Крыло – 64.5-74.2, клюв – 16-17 мм.

Сходства – отличия: от других пищух отличается относительно крупным размером и более длинным клювом. В Туркменистане сходных видов нет.

Распространение: горные районы Китая и Мьянмы, Гималаи. В Средней Азии – в горных лесах. В Туркменистане – только Койтендаг.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся и зимующая птица. Населяет горные арчевые леса. Держится в одиночку и парами. Гнездится в дуплах или трещинах деревьев. Кладка 4-6 белых с красновато-

höwürtgeleýär. Maý-ýyunda 4-6 sany gyzylymytyl-goňurak meneklije ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 15.2 x 11.5 mm. Esasan, mörmöjekleri, olaryň liçinkalaryny we ýumurtgalaryny, möýleri iýýär.

Statusy: seýrek, käbir ýerlerde adaty, az öwrenilen guş, Köýtendag goraghanasynyň guşlarynyň arasyn-da iň täsin wekilleriniň biri.

Serçeler – Passeridae – Воробьиные

Maýda ölçegli guşlar maşgalasy. Çünki pahnaşekilli we şähelçe uzalan, ýognasyrak, mysal üçin, serçelerde we daş serçelerinde biraz ýasyrak. Ganatlary gysga, tegelesen. Guýrugy beýlekilere garanynda uzyn, göni ýa-da azajyk tegelenen, kähalatlarda kiçiräk oýuk. Aýaklary orta ölçeglerde, dyrnaklary sähelçe egmek. Ýelek örtügininiň reňki köplenç goňurak ýa-da çal. Görnüşleriniň horazlary mäkiýanlaryndan açyk reňkli. Uçuşy gowşak, diňe gysga aralyga. Ýerde towsup hereket edýär. Düzlik ýerlerde, daglarda, çöllerde we antropogen landşaftlarda ýaşaýarlar. Görnüşleriniň köpüsi hakyky sinantrop – adamlaryň ýaşaýan ýerlerinde mekan tutýarlar. Höwürtgeleri buky ýerde, agaçlaryň, gyrymsylaryň üstünde, köweklerde we dürli desgalaryň üçekleriniň aşagynda. Süri we jübut bolup höwürtgeleýärler. Aglabasy oturymly ýaşaýar. Uzak bolmadyk aralyga we göçüp-goni uçup gezýärler. Köpelyän döwründen soň süri bolup gezýärler. Köplenç ösümlikleriň tohumlary, miweleri, ýazyna mörmöjekleri iýýärler. Türkmenistanda serçeler urugyndan (*Passer*) 8 görnüş.

коричневыми пятнышками яиц, в мае-июне, размеры – 15.2 x 11.5 мм. Питается, в основном, насекомыми и их личинками и яйцами, пауками.

Статус: редкая, местами обычная, слабоизученная птица, один из интересных представителей птиц Койтентадгского заповедника.

Семейство птиц мелких размеров. Клюв конической формы и немного удлинённый, вздутый, к примеру, у воробьев, и немного приплюснутый у каменных воробьев. Крылья короткие, закруглённые. Хвост относительно длинный, прямой или слегка закруглённый, нередко с небольшой выемкой. Ноги средних размеров, когти слабо изогнутые. Окраска оперения чаще буроватая или серая. У большинства видов самцы окрашены ярче самок. Летают плохо, на короткие расстояния. По земле передвигаются прыжками. Населяют равнины, горы, пустыни и сельскохозяйственные ландшафты. Многие виды являются типичными синантропами. Гнезда в укрытиях, на деревьях, кустарниках, в дуплах и под крышами домов. Гнездятся колониями и парами. Большинство оседлы. Совершают небольшие перелеты и кочевки. После периода размножения держатся стаями. Питаются, преимущественно, растительной пищей, весной насекомыми. В Туркменистане – 8 видов из рода воробьев (*Passer*).

378. Öý serçesi – Passer domesticus – Домовый воробей

Meýdan alamatlary: edil beýleki serçeler ýaly, guýrugy we ganatlary gysga, beden gurluşy dykyz. Hindi serçesinden biraz ulurak ölçegli, çünki azajyk deşliräk, emma ýelek örtüginini umumy reňki has öçügsi. **Horazynyň “telpejigi”, ýañaklary we boýunyň gapdallary çal.** Bokurdagy we petekesi teňňe nagyşly gara. Bedeniniň üstki tarapy gara bellikli goňur, **garny – çalymytylak, böwürleri garamtylrak. Bili we guýrugynyň üsti goňurak-çal.** Mäkiýany yönekey, ýelek örtügi **birmeňzeş goňurak-çalymytyl reňkli.** Çünki gysyna goňurak-gara we ýazyna benewşeräk-gara. Aýaklary goňur. Sesi gaty “džiw-džiw”. Saýraýşy – jürküldeme. Ganaty – 69-83, guýrugy 53-65, söbügi – 18.5-20, çünki – 9.4-12 mm, agramy – 28-37 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **horazlary ýañaklarynyň açyk reňki bilen** hindi we garadöş serçeleriň horazlaryna **meňzeş**, emma öý serçesiniň hindi we garadöş serçeleriňki ýaly **ýañaklarynyň reňki öçügsi we arassa ak däl**, ondan daşary garadöş serçesiniň “telpejigi” çal däl-de goňur, ýaz-tomus döwründe olaryň döşünde gara menekler peýda bolýar. Meýdanda bu üç görnüşiniň mäkiýanlary birmeňzeş, olary biri-birlerinden tapawutlandyrmak juda kyn. Hazarýakalarynda, aýratyn-da ýaz-tomus döwründe öý serçesini hindi serçesi bilen çalyşdyrmak mümkin.

Ýaýran ýerleri: giň – Ýewraziýanyň demirgazyk-gundogar we günorta-gündogar çäklerinden beýleki ýerlerinde, Demirgazyk Afrika, Amerikada, Awstraliýada we Günorta

Полевые признаки: как и другие воробьи плотного телосложения со сравнительно коротким хвостом и крыльями. Размером несколько крупнее индийского воробья, клюв чуть массивнее, но общая тональность окраски оперения более тусклая. **У самца «шапочка», щеки и бока шеи серые.** Горло и зоб черные с чешуйчатым рисунком. Верхняя сторона тела коричневая с черными отметинами, **брюшная – серовато-белая, темнеющая на боках. Поясница и надхвостье буровато-серые.** Самки окрашены проще и имеют **однородное буро-сероватое оперение.** Клюв буровато-черный зимой и сиренево-черный весной. Ноги бурые. Голос – громкое «джив-джив». Песня – чириканье. Крыло – 69-83, хвост – 53-65, цевка – 18.5-20, клюв – 9.4-12 мм, вес 28-37 г.

Сходства – отличия: **самцы схожи** своими **светлыми щеками** с самцами испанского и индийского воробьев, но у домового **щеки менее яркие и не чисто белые** как у индийского и у испанского, у последнего, к тому же, «шапочка» не серая, а коричневая, а в весенне-летний период добавляются еще черные пестрины на груди. Еще больше схожи и почти не различимы в природе самки этих трех видов. В прикаспийских районах, особенно в весенне-летнее время, домового воробья можно спутать с индийским.

Распространение: широкое – Евразия, за исключением северо-восточных и юго-восточных об-

Afrikada uýgunlaşdyrylan - akklimatizirlenen. Türkmenistanda – günorta-günbatar we günbatar etraplary.

Ýaşayşy: oturymly guş. Adamlaryň özleşdiren ýerlerinde mesgen tutýar, ilatly nokatlara ýakynlaşmagy halaýar. Adatça topar bolup gezyär, güýz-guş döwründe has uly sürülere toplanýar. Adamyň ýaşayan ýerlerinden uzakda bolmadyk ýerlerde kiçiräk koloniýa bolup, ýaşalyan jaýlaryň we beýleki desgalaryň üçeklerinde höwürtegeleýär, ýöne saýaly baglarda we beýleki emeli döredilen seýilgählerde hindi ýa-da garadöş serçeleri bilen bilelikde toparlary döretmekleri hem mümkin. Köpelmäge ir fewralyň soňunda, martda girişýär. 5-6 sany goňur meneklije ak ýada çal reňkli ýumurtgalary goýýar. Maý-iyulda ýaş guşlar ýetişýär. Mör-möjekler we ösümlikleriň tohumlaryny, miwelerini iýýär.

Statusy: oňat tanalýan, sany boýunça adaty, sinantrop görnüş.

379. Hindi serçesi – *Passer indicus* – Индийский воробей

Meýdan alamatlary: öý serçesi-ne örän çalymdaş, ýöne biraz gelşikli. **Horazynyň “telpejigi” çal, emma ýañaklary we boýunyň gapdallary ak.** Bokurdagy we petekesi teňne nagyşly gara. Bedeniniň üstki tarapy gara menekli goňur, garny çalymtyl-ak, böwürleri garamtylrak. **Bili we guýrugynyň üsti goňurrak-çal.** Ýelek örtügininiň reňki öý serçesi bilen deňşdirilende has anyk. Mäkiýanyň öçügsi we ýelek örtügininiň **birmeňzeş goňurrak-çalymtyl reňki** bolýar. Sesi edil öý serçäniňki ýaly. Ganaty – 70-81,

ластей, Северная Африка, акклиматизирован в Америке, Австралии и Южной Африке. В Туркменистане – юго-западные и западные районы.

Образ жизни: оседлая птица. Населяет антропогенные местообитания, тяготеет к населенным пунктам. Держатся обычно в группах, в осенне-зимнее время собираются в более крупные стаи. Гнездятся небольшими колониями неподалеку от человеческого жилья, как правило, под крышами жилых и иных строений, однако, могут устраивать колонии совместно с индийскими или испанскими воробьями в садах и других участках искусственных насаждений. К размножению приступают рано – с конца февраля, в марте. Кладка из 5-6 яиц белого или сероватого цвета с бурыми пятнами. Молодые – в мае-июле. Питаются насекомыми и растительной пищей.

Статус: хорошо известный, обычный по численности, синантропный вид.

Полевые признаки: очень похож на домового воробья, но чуть стройнее. **У самца также серая «шапочка», но щеки и бока шеи белые.** Горло и зоб черные с чешуйчатым рисунком. Верхняя сторона коричневая с черными отметинами, брюшная – серовато-белая, темнеющая на боках. **Поясница и надхвостье буровато-серые.** По сравнению с домовым воробьем окраска оперения более четкая. Самки тусклее и имеют **однородное буро-сероватое оперение.** Голос – как у домового воробья.

guýrugy – 51-62, söbügi – 18-19, çünki – 9-11 mm, agramy - 23-26 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **horazlary ýañaklarynyň aýyk reňki bilen,** garadöş we öý serçeleriň horazlaryna **meňzeş,** ýöne hindi serçäniň **ýañagy – aýyk we ýagty,** edil garadöş serçäniňki ýaly, onuň öz gezeginde kellesiniň üsti çal däl-de goňur; şeýle hem ýaz-tomus döwründe döşi gara menekler bilen örtülýär. Bu birmeňzeşlik, tebigatda üç görnüşiniň mäkiýanlarynyň tapawudyny bulaşdyrýar. Günorta-günbatar we günbatar hazaryaka raýonlarda, aýratyn-da ýaz-tomus wagtlary, hindi seçesini öý serçesi bilen çalşyrmak mümkin.

Ýaýran ýerleri: tutuş Hindistan, Seýlon, Alynky we Orta Aziýa, Günorta Gazagystan. Türkmenistanda ýaz we tomus aýlary hemme ýerlerde gabat gelýär. Gyşlaýan ýerleri – Alynky Aziýa we Demirgazyk-Günbatar Hindistan.

Ýaşayşy: uçup geçýän, höwürtegeleýän guş, Türkmenistanyň günortasynda az sanda gyşlaýar. Ýazky migrasiýasy mart-aprelde, güýzkisi – awgust-sentyabrda. Dürli landşaftlary eýeleýär, ýöne ýaşalyan ilatly nokatlardan gaça saklanyp, antropogen landşaftlara golaý durýar. Süri bolup gezyär. Aprel-maýda köpeliýär. Kiçiräk koloniýa, seýrek jübüt bolup, käte garadöş serçeleri bilen bile höwürtegeleýär. Höwürtegesi ýarymşar we süýri görnüşde, tokaý zolagyny, saýaly baglarda, agaçlarda, gum gaýalarynyň jaýryklarynda, taşlanan gurluşyk desgalarynda, derýalaryň kert kenaryndaky hinlerde, guýularyň diwarlarynda we ýurtyju guşlaryň höwürtegesiniň aşagynda höwürtegelerini gurýarlar. 5-6, seýrek 8 sany

Крыло – 70-81, хвост – 51-62, цевка – 18-19, клюв – 9-11 мм, вес – 23-26 г.

Сходства – отличия: **самцы схожи** своими **светлыми щеками** с самцами испанского и домового воробья, но у индийского **щеки – светлые и яркие,** как у испанского, у которого, в свою очередь, голова сверху не серая, а коричневая, а в весенне-летний период у него добавляются еще и черные пестрины на груди. Еще более схожи и в природе почти не различимы самки этих трех видов. В юго-западных и западных прикаспийских районах, особенно в весенне-летнее время, индийский воробей может быть спутан с домовым.

Распространение: весь Индостан, Цейлон, Передняя и Средняя Азия, Южный Казахстан. В Туркменистане весной и летом встречается повсеместно. Область зимовки – Передняя Азия и Северо-Западный Индостан.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся птица, на юге Туркменистана в небольшом числе зимует. Весенняя миграция в марте-апреле, осенняя – в августе-сентябре. Населяет различные ландшафты, но тяготеет к антропогенным, избегая при этом населенные пункты. Держатся стайками. Размножение в апреле-мае. Гнездятся небольшими колониями, редко парами, порой совместно с испанскими воробьями. Гнезда полушаровидной и овальной формы, устраивают на деревьях в лесополосах и садах, в расщелинах обрывов, брошенных строениях, в норах береговых обрывов, в стенках колодцев и гнезда хищных птиц. В кладке 5-6, редко

goňur meneklije tutuk-ak ýa-da çalymtyl-mawy ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 21.2 x 14.8 mm. Ýylda iki gezek ýumurtgalaýar. Maý-iyunda jüýjeleri çykyar. Medeni ösümlükleriň dänelerini, bakja ekinleriň we haşal otlaryň tohumlaryny iýýar, jüýjelerini, esasan, mör-möjekler bilen iýmitlendirýär.

Statusy: oňat tanalýan, adaty, käbir ýerlerde köpsanly ýa-da bölekleýin ýaýran örän köpsanly guş.

380. Garadöş serçe – *Passer hispaniolensis* – Испанский воробей

Meýdan alamatlary: öý seçesiniň ölçeginde, çünki uzalan, ganatlary gysga. Guýrugy sähelçe oýuk. Gaşy, ýaňaklary we gulak örtügi ak. **Horazynyň kellesiniň üsti we boýynyň yzky bölegi goňrasyrak-goňur. Arkasy ýagty insiz jähekli gara. Bili we guýrugynyň üsti goňur.** Ganatlary ak kese zolakly goýy-goňur. Guýrugynyň ýelekleri insiz ýagty jähekli goýy-goňur. **Bedeniniň böwürleri dik uly menekli. Petekesi, bokurdagy we döşi, aýratyn-da ýaz-tomus döwürleri gara.** Mäkiýany garamtyl menekli çalymtyl-goňurak reňkde. Onuň garyn tarapy goňur menekli kirliräk-agymtyl-çyparrak reňkli. Ýaşlary mäkiýanyna meňzeş, ýöne has kirliräk-goňur öwüşginde. Çünki gara, aýaklary goýy-goňur. Sesi pert – “džiw-džiw”. Saýraşy – jürküldeme. Ganaty – 72-83, guýrugy – 53-61, söbügi – 19-20, çünki – 11-12 mm, agramy – 27-29 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **horazynyň bokurdagyndaky gara**

до 8, матово-белых или серовато-голубых с бурыми крапинками яиц, размеры – 21.2 x 14.8 мм. В году две кладки. Птенцы – в мае-июне. Питаются растительным кормом – зерновыми, огородными культурами и семенами сорняков, а птенцы выкармливаются, в основном, насекомыми.

Статус: хорошо известная, обычная, а местами многочисленная или очень многочисленная птица с неравномерным распространением.

Полевые признаки: размером с домового воробья, клюв удлиненный, крылья короткие. Хвост слегка выемчатый. Брови, щеки и кроющие уха белые. **У самца верх головы и задняя часть шеи каштаново-коричневые. Спина черная с узкими светлыми окаймлениями. Поясница и надхвостье бурые.** Крылья темно-бурые с белой поперечной полосой. Перья хвоста темно-бурые с узкими светлыми каймами. **По бокам тела крупные продольные пестрины. Зоб, горло и грудь черные, особенно в весенне-летний период.** Самка окрашена в серо-буроватый цвет с темными пестринами. Брюшная сторона у нее грязно-беловато-рыжеватого цвета с буроватыми пестринами. Молодые похожи на самку, но более грязновато-бурого тона. Клюв черный, ноги темно-бурые. Голос – резкое «джив-джив». Песня – чирикание. Крыло – 72-83, хвост – 53-61, цевка – 19-20, клюв – 11-12 мм, вес 27-29 г.

tegmiliň döşine we böwürlerine tarap, aýratyn-da ýaz-tomus döwüründe giňeyändigi bilen beýleki seçelerden tapawutlanýar. **Arkasy ýagty jäheklenen gara.** Ýaňaklary edil hindi serçäniňki ýaly ak we öý serçäniňkiden has açyk reňkli. Arkasy we döşi bu iki görnüşden tapawutlylykda gara, “telpejigi” boýnyakasy bilen goňur. Meýdan serçesinden goňur telpejiginiň bardygy, ak ýaňagynda garamtyl tegmiliň ýokdygy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta-Gündagar Ýewropa, Kiçi, Alynky we Orta Aziýa. Türkmenistanda – Eregiň aşaky akymy, Günbatar Uzboý, Köpetdaguň etekleri, Tejen, Murgap, Garagum derýalarynyň we Amyderýanyň jülgeleri, Garagumda uçup geçýän wagty duşmagy mümkin. Gyşlaýan ýerleri – Ýewropanyň günorta-günbatar we Afrikanyň demirgazyk-gündogar çetleri, Ýakyn Gündogar, Alynky Aziýa we Orta Aziýanyň günorta-günbatary hem-de Hinistan demitgazyk-günbatary.

Ýaşayşy: uçup geçýän, höwürtleýän we gyşlaýan guş. Süri, käte has uly süri bolup gezýärler. Esasan oazislarda we derýalaryň jülgelerinde, kölleriň, howdanlaryň we kanallaryň kenaryndaky gamyşlyk jeňňelliklerde mesgen tutýar. Topar bolup, käte meýdan goragy üçin ekilen saýaly baglarda, ýol ýaka zolaklarda we ýylgyňly jeňňelliklerde hindi serçesi bilen bilelikde höwürtleýe gurýar. Höwürtgese togolak şar şekilli, edil hindi serçäniňki ýaly. Maý-iyulda 6-8 sany çalymtyl meneklije agymtyl-mawy ýumurtgalary goýýar. Iýun-iyulda jüýjeleýär. Ösümlükleriň dänelerini we miwelerini, şeýle-de

Сходства – отличия: в отличие от других воробьев у самца **черное пятно на горле расширяется на грудь и бока**, особенно в весенне-летнее время. **Спина черная со светлыми окаймлениями.** Щеки почти белые, как у индийского воробья, и более светлые, чем у домового. В отличие от этих двух видов спина и грудь черные, а шапочка с зашейком коричневые. В отличие от полевого воробья, имеющего также коричневую шапочку, на белых щеках отсутствует темное пятно.

Распространение: Юго-Восточная Европа, Малая, Передняя и Средняя Азия. В Туркменистане – низовья Этрека, Западный Узбой, предгорья Копетдага, долины Теджена, Мургаба, Каракумдарьи и Амударьи, на пролете может быть встречен и в Каракумах. Область зимовки – на крайнем юго-западе Европы и северо-востоке Африки, на Ближнем Востоке, в Передней и на юго-западе Средней Азии и северо-западе Индостана.

Образ жизни: пролетная, гнездящаяся и зимующая птица. Держится стаями, порой большими. Населяет, в основном, оазисы и речные долины, камышовые заросли по берегам озер, водохранилищ и каналов. Гнездятся плотными колониями, устраивая гнезда иногда совместно с индийскими воробьями в ползащитных и придорожных полосах, зарослях гребенщика. Гнезда, как у индийских воробьев, шаровидной формы. Кладка до 6-8 бело-голубых с серыми пятнами яиц, в мае-июле. Птенцы – в июне-июле. Питаются семенами и ягода-

mör-möjekleri iýýär.

Statusy: bölekleyin ýaýrawly, az sanly, ýaz-tomus aýlary käbir ýerlerde adaty, ýöne güýz-guş döwründe köp sanly guş.

381. Sazak serçesi – *Passer ammodendri* – Саксаульный воробей

Meýdan alamatlary: garadöş serçäniň ölçeginde. Çünki uzalan, ganatlary gysga. **Kellesiniň üsti, boýunyň yzky tarapy we gözünüň üstünden geçýän zolak gara. Kellesiniň gapdallary inli çyparrak-gonur zolakly.** Ýañaklary ýukajyk çypar ýokundyly açyk-çal reňkli. **Arkasy we bili çyparrak dik gara menekli.** Ganatlary we guýrugy has ýagty insiz jähekli goňur. **Bokurdagynda we petekesinde anyk gara tegmili bolýar.** Garyn tarapy goňur ýokundyly ak, böwürleri biraz garamtylrak. Mäkiýanyň reňki çagepisint-çal, arkasy garamtyl menekli. Gaşlary we garyn tarapy agymtyl-çyparrak. Kellesi we boýny gara reňksiz, bokurdagy ýuka gara ýokundyly. Ýaş guşlar mäkiýana çalymdaş, emma gara menekleri aýdyň tapawutlanmaýar. Çünki tomsuna gara, guşyna goňur. Aýaklary goňur. Ganaty – 70-81, guýrugy – 60-71, söbügi – 18-20, çünki – 8-10 mm, agramy – 25-28 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **kellesiniň üstüniň garadygy, böwürlerinde çyparrak-goňurrak zolagyň çäklidigi** bilen beýleki serçelerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Orta we Merkezi Aziýanyň çölleri. Türkmenistanda – Merkezi Garagum pesliginde we Gündogar Garagumda.

Ýaýaýsy: oturymly guş, guş

ми, а также насекомыми.

Статус: птица с неравномерным распространением, немногочисленная, местами обычная в весенне-летнее, но многочисленная в осенне-зимнее время.

Полевые признаки: размером с испанского воробья. Клюв удлиненный, крылья короткие. **Голова сверху, задняя сторона шеи и лоса, идущая через глаз, черные. По бокам головы широкие рыжевато-коричневые полосы.** Щеки светло-серые с легким рыжеватым налетом. **Спина и поясница рыжеватые с черными продольными пестринами.** Крылья и хвост бурые с более светлыми узкими окаймлениями. **На горле и зобе четкое черное пятно.** Брюшная сторона белая с бурым налетом, несколько темнее на боках. У самки окраска песочно-серая с темными пестринами на спине. Брови и брюшная сторона беловато-рыжеватые. На голове и на шее черный цвет отсутствует, а на горле легкий черный налет. Молодые похожи на самку, но темные пестрины выражены слабее. Клюв черный летом, бурый зимой. Ноги бурые. Крыло – 70-81, хвост – 60-71, цевка – 18-20, клюв – 8-10 мм, вес – 25-28 г.

Сходства – отличия: в отличие от других воробьев **верх головы черный, ограниченный по бокам рыжевато-коричневатой полосой.**

Распространение: пустыни Средней и Центральной Азии. В Туркменистане – в Центральном низменных и Восточных Караку-

döwründe yerli göçüp-gonup uçup geçiryär. Sazaklykda we gyrymys ösümlikleriň oňat ösen çägeliklerinde ýaşaýar. Guşyna käte oazisleriň çetlerine aralaşýar. Köpelyän döwri jübüt, galan wagty bolsa, kiçiräk süri bolup gezyär. Maý aýynda höwürtegeýär. 5-6, seýrek 7 sany goňur meneklije öçügsi-ak ýa-da çalymtyl-mawy ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 19-22 x 13-15 mm. Ýylda iki gezek ýumurtgalayar. Maý-iýunda jüýjeleýär. Esasan, çöl ösümlikleriň tohumlaryny, şeýle-de ýazynda mörmöjekleri – tomzaklary, göniganatlylary, olaryň liçinkalaryny çokýar.

Statusy: adaty, guş döwründe käbir ýerlerde köpsanly guş.

382. Meýdan serçesi – *Passer montanus* – Полевой воробей

Meýdan alamatlary: öý, hindedi we garadöş serçelerden kiçiräk. Çünki çala uzalan, ganatlary gysga. **Kellesiniň üsti we boýunyň yzy öçügsi-goňurrak. Ýañaklary we boýunyň gapdallary gara süýrigilt tegmilli ak. Bokurdagy gara.** Bedeniniň üsti garamtyl menekli goňurrak, döşi we böwürleri agymtyl öwürginli. Mäkiýany horazyna meňzeş, ýaşlarynyňky öçügsi reňkli. Çünki tomsuna gara, guşyna sarymtyl düýpli. Aýaklary açyk-goňur. Ses – “çir-çirr”. Ganaty – 65-74, guýrugy – 48-59, söbügi – 16-18, çünki – 8-11 mm, agramy – 22-29 g

Meňzeşlikleri-tapawutlary: agymtyl **ýañaklaryna gara tegmilleriň häsiyetlidigi** bilen beýleki serçelerden tapawutlanýar.

мах.

Образ жизни: оседлая птица, совершающая местные кочевки в зимнее время. Обитает в саксаульниках и песках с хорошо развитой кустарниковой растительностью. Иногда зимой по окраинам оазисов. В период размножения держится парами, в остальное время в небольших стаях. Гнездится в мае. В кладке 5-6, изредка 7, матово-белых или серовато-голубых с бурными крапинами яиц, размеры – 19-22 x 13-15 мм. В году две кладки. Птенцы – в мае-июне. Питаются, в основном, семенами пустынных растений, весной также насекомыми – жуками, прямокрылыми, гусеницами.

Статус: обычная, местами в зимний период многочисленная птица.

Полевые признаки: мельче домового, индийского и испанского воробьев. Клюв слегка удлиненный, крылья короткие. **Верх головы и зашеек тускло-коричневые. Щеки и бока шеи белые с овальными черными пятнами. Горло черное.** Верх тела буроватый с темными отметинами, грудь и бока с бежевым оттенком. Самка окрашена одинаково с самцом, молодые тусклее. Клюв летом черный, зимой с желтоватым основанием. Ноги светло-бурые. Голос – «чир-чирр». Крыло – 65-74, хвост – 48-59, цевка – 16-18, клюв – 8-11 мм, вес – 22-29 г.

Сходства – отличия: от других воробьев отличается светлыми **щеками с характерными черными**

Ýaýran ýerleri: Ýewropanyň demirgazyk-gündogar we günorta-günbatar sebitlerinden başga hemme ýerlerinde diýen ýaly. Demirgazyk Amerikada we Awstraliýada uýgunlaşdyrylan - akklimatizirlenen. Orta Aziýanyň we Türkmenistanyň ähli ýerlerinde duşýar.

Ýaşayşy: oturymly guş. Oazislerde, antropogen landşaftlarda gabat gelýär, şäherlerde, obalarda adamlaryň ýaşayan ýerlerinde, mal ýataklarynda we hojalyk desgalarynda mekan tutýar. Mart-awgustda jübütleşýär we kiçiräk topar bolup höwürtgelyär. Ýylda 3-4 gezek ýumurtgalaýar. Köplenç ýapyk ýerde, ýaşalyan jaýlaryň üçeginiň aşagynda we beýleki desgalarda, köweklerde höwürtgelyär. Adatça, 5-6 sany garamtyl meneklije tutuk-ak ýa-da çalymtylrak ýumurtgalary goýýar. Esasan, ösümlikleriň ýaşajyk pudajyklaryny we dänelerini, otlaryň, bakja we miweli ösümlikleriň ösüntgilerini, haşal otlaryň tohumlaryny, şeýle-de dürli mör-möjekleri çokýar.

Statusy: adaty, käýerlerde köpsanly, hemmä tanyş, bölekleyin ýaýran, Türkmenistanda sinantrop görnüş.

383. Çöl serçesi – *Passer simplex* – Пустынный воробей

Meýdan alamatlary: çünki biraz uzalan, ganatlary gysga, hindi serçesinden kiçi. **Gözüniň töweregindäki halka, gözüniň zyndaky zolak we bokurdagy gara. Kellesiniň üsti we arkasy açyk-çal.** Guýrugynyň üsti çypar ýokundyly. Ganatlary we guýrugy goňur ýa-da ýagty jähekli garamtyl-goňur. **Ýañaklary,**

пятнами.

Распространение: почти вся Евразия, за исключением северо-восточных и юго-западных областей. Акклиматизирован в Северной Америке и Австралии. В Средней Азии и в Туркменистане распространен очень широко.

Образ жизни: оседлая птица. Обитает в оазисах, антропогенных ландшафтах, всюду тяготеет к городам, поселкам и другим поселениям человека, скотным дворам и хозяйственным постройкам. Гнездится в марте-августе парами и небольшими колониями. В году 3-4 кладки. Гнезда чаще закрытые, под крышами жилых домов, в других сооружениях человека, дуплах. В кладке обычно 5-6 матово-белых или сероватых с темными крапинками яиц. Птенцы – в мае-августе. Питаются растительным кормом – побегами и всходами зерновых, трав, огородно-садовых культур, семенами сорняков, а также различными насекомыми.

Статус: обычная, местами многочисленная, хорошо знакомая всем птица с неравномерным распространением, у нас синантропный вид.

Полевые признаки: мельче индийского воробья, клюв несколько удлиннен, крылья короткие. **Кольцо вокруг глаза, полоса за глазом и горло черные. Верх головы и спина светло-серые.** Надхвостье с легким рыжеватым налетом. Крылья и хвост бурые или черно-бурые со светлыми каймами. **Щеки,**

kellesiniň gapdallary we garyn tarapy ak, döşi çalymtyl ýokundyly. Mäkiýany horazyna çalymdaş, ýöne gözüniň zyndaky zolak we bokurdagyndaky tegmil kiçi ölçeglerde we goňurak öwüşginli. Ýelek örtügi, aýratyn-da döşüniňki we böwürleriniňki ýukajyk çypar öwüşginli. Ýaşlary mäkiýana çalymdaş, ýöne olaryň kirliräk-goňur öwüşginini bolýar. Çünki gara, ayaklary goýu-goňur. Sesi serçeleriň beýleki görnüşlerinden güýçli tapawutlanýar we gysga saýramadan durýar. Ganaty – 62-72, guýrugy – 48-60, söbügi – 16-18, çünki – 8-11 mm, agramy – 22 - 29 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ýelek örtügininiň açyk reňkli bilen beýleki serçelerden tapawutlanýar. **Arkasy birmenzeş reňkli, açyk-çal.**

Ýaýran ýerleri: Demirgazyk we Gündogar Afrika, Alynky Aziýa, Gündogar Eýran, Orta Aziýanyň çöllükleri. Türkmenistanda Gündogar we Merkezi Garagumda.

Ýaşayşy: oturymly guş, güzüne we gysyna göçüp-gonup gezýär. Aklaň çägeli we seýrek gyrymsyly ýarymberkän çägeliklerde ýaşýar. Aprelde höwürtgelyär. Sözen agajynda, gandymda, sazakda, çerkezde, käte çopanlaryň çatmalarynda, - kümelerinde, paçykdan gurlan kepberleriň üçeginde, ýurtyjy guşlaryň ýa-da çöl garganyň höwürtgeleriniň diwarlarynda höwürtgelyär. Höwürtgesi şar ýa-da ýarymşar şekilli görnüşde bolup, onuň aşagragy ýa-da böwüründen süýrelip ep-esli uzaýan girelgeli bolýar. Ýylda iki gezek köpelyär. 3-8 sany melemtilräk-goňur we kütek ujynda toplanan çalymtyl-syýareňk menekli agymtyl-çal ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 19.21 x 13.46 mm.

бока головы и брюшная сторона белые с сероватым налетом на груди. Самка похожа на самца, но полоса за глазом и пятно на горле меньших размеров и буроватого оттенка. В оперении, в особенности на груди и боках, легкий рыжеватый оттенок. Молодые похожи на самку, но имеют грязновато-бурый оттенок. Клюв черный, ноги темно-бурые. Голос сильно отличается от других видов воробьев и напоминает короткую трель. Крыло – 62-72, хвост – 48-60, цевка – 16-18, клюв - 8-11 мм, вес – 22-29 г.

Сходства – отличия: от других воробьев отличается светлой окраской оперения. **Спина одноцветная, светло-серая.**

Распространение: Северная и Восточная Африка, Передняя Азия, Восточный Иран, пустыни Средней Азии. В Туркменистане – Восточные и Центральные Каракумы.

Образ жизни: оседлая птица, совершающая осенние и зимние кочевки. Обитает в барханных и полужакопленных песках с разреженными кустарниками. Гнездится в апреле. Гнезда устраивает на песчаной акации, кандыме, саксауле, черкезе, порой в стенках чабанских шалашов, под крышей глинобитных построек, в стенках гнезд хищных птиц или пустынного ворона. Гнездо шарообразное или полушаровидное с узким входным отверстием внизу или сбоку. Размножается дважды в году. В кладке 3-8 яиц беловато-серых с буровато-коричневыми и серо-фиолетовыми пятнами, сконцентрированными на тупом конце. Размеры яиц – 19.21 x 13.46 мм. Птенцы – в мае. Питаются

Maý aýynda jüýjeleýär. Mör-möjekleri we otjumak ösümlikleriň dänelerini çökýär.

Statusy: seýrek, Türkmenistanyň Gyzyl ktabyna girizilen görnüs, Repetek we Bereketli Garagum goraghanasynyň iň täsin guşlarynyň biri.

384. Daş serçesi – *Petronia petronia* – Каменный воробей

Meýdan alamaty: çünki başgalara garanyňda has daýaw, guýrugy biraz gysgarak hem göniräk, hindi ýa-da öý serçesi ölçegli, yöne ulurak we deşliräk. **Kellesiniň gapdaly - her tarapy inli goňur zolakly.** Depesi, ýeňsesi we gaşlary çalymtyl-goňur. Ýañaklary goňur. Bokurdagy açyk-goňur, **petekesi açyk-sary tegmilli.** Garyn tarapy çuparrak-goňur menekli goňurrak-agymtyl. **Guýrugunyň ujy ak tegmilli.** Ganatlary goýu-goňur, ýaş guşlaryň ýelekleri ýagty jähekli. Ýaşlary ulularyna çalymdaş, yöne petekesi sary meneksiz. Çünki açyk-goňur, aýaklary goňur. Ýerde towsup dälde, ylqap yöreýär. Sesi gysga – “wýui” we çasly – “tii-týurrrr”, şeýle-de mylaýym jürküdemeler. Ganaty – 86-101, guýrugy – 47-59, söbügi – 17-18, çünki – 10-15 mm, agramy – 30-36 g

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **arkasyň we garyn tarapyň gowy saýgardýan gara menekleri, petekesiniň ýagty-sary tegmilleri** bilen beýleki serçelerden tapawutlanýar. Mäkiýanlary öý ýa-da hindi serçesilerine meňzeş, yöne olary kellesindäki gara zolaklary tapawutlandyrýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta Ýewropa, Demirgazyk-Günbatar Afrika, Kiçi, Alynky, Orta we Merkezi Aziýa. Türkmenistanda ähli daglyk ýerlerde, Garabogazyň demirgazyk-günba-

насекомыми и семенами травянистых растений.

Статус: редкий вид, занесен в Красную книгу Туркменистана, один из наиболее интересных представителей Репетекского и Берекетли Каракумского заповедников.

Полевые признаки: чуть крупнее и коренастее индийского или домового воробья. Клюв относительно массивный, хвост чуть короче и почти прямой. **Вдоль головы с каждой стороны по широкой бурой полосе.** Темя, затылок и бровь серовато-бурые. Щеки бурые. Горло светло-бурое, **на зобе ярко-желтое пятно.** Брюшная сторона буровато-беловатая с темными рыжевато-бурыми пестринами. **На конце хвоста белые пятна.** Крылья темно-бурые, у молодых птиц со светлыми окаймлениями перьев. Молодые похожи на взрослых, но без желтого пятна на зобе. Клюв светло-бурый, ноги бурые. По земле бегаёт, не прыгает. Голос – короткое «вюи» и звонкое «тиитюрррр», а также мягкое чирикание. Крыло – 86-101, хвост – 47-59, цевка – 17-18, клюв – 10-15 мм, вес – 30-36 г.

Сходства – отличия: в отличие от других воробьев **спинная и брюшная сторона с хорошо выраженными темными пестринами, на зобе ярко-желтое пятно.** Схожи с самками домового или индийского воробья, но отличаются темными полосами на голове.

Распространение: Южная Европа, Северо-Западная Африка,

taryndan başlap, ýurduň günorta-gündogaryndaky Köýtendagda gutarýar.

Ýaşayşy: oturymly, dikligine göçüp-gonma uçşlary alyp barýar. Daglyk ýerlerde gaýaly, dag etek beýikli-pesliklerde, uçut we çüňkli gaýalarda, beýik depeli baýyryklarda ýaşayar. Jübüt, güýzine süri bolup gezýär. Ýylda iki gezek, aprel-maýda höwürtegeýär. Höwürtegesi şar şekilli. Ony ýekelikde we topar bolup, uçutlaryň, gaýalaryň jaýryklarynda, daşlaryň arasyna giregeli ýerde, daşlaryň köweklerinde we adamyň guran desgalarynda (daşdan örülen haýatlarda, guýularda, sardobalarda, käte hindi serçeleri bilen bilelikde) gurýar. 4-7, köplenç 5-6 sany goňurrak ýa-da goňurrak-çal menekli ak ýa-da ýaşylymtyl-ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 21.5 x 15.3 mm. Maý-iyunda jüýjeleýär. Medeni, şeýle-de ýabany däneli ösümlikleriň tohumlaryny, miwelerini çökýar, jüýjelerini, mör-möjekler, olaryň gurchuklary, möýler bilen iýmitlendirýär.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde adaty guş.

385. Gysgabarmak serçe – *Petronia brachydactyla* – Короткопалый воробей

Meýdan alamatlary: hindi serçesinden sähelçe uly. Çünki gowşak, beýlekilere garanyňda uzalan, ganatlary gysga. Guýrugy sähelçe tegelenen. **Bedeniniň umumy reňki meneksiz, goňurrak-çägepisintli.** Ganatlary goňur açyk insiz jähekli ýelekli. Ganaty kese ýagty bellik-

Малая, Передняя, Средняя и Центральная Азия. В Туркменистане – все гористые районы, начиная от Прикарабогазья на северо-западе и кончая Койтендагом на юго-востоке страны.

Образ жизни: оседлый вид, совершающий вертикальные кочевки. В горах предпочитает скалистые участки, в предгорьях местность с пересеченным рельефом, обрывы, чинки, холмогорья. Держатся парами, осенью – стаями. Гнездятся в апреле-мае дважды в году. Гнезда шаровидной формы, располагаются одиночно и колониями в расщелинах обрывов и скал, выходов камней, дуплах и среди сооружений человека (каменные заборы, колодцы, сардобы, иногда совместно с индийскими воробьями. В кладке 4-7, часто 5-6 белых или зеленовато-белых яиц с буроватыми или коричнево-серыми крапинками. Размеры яиц – 21.5 x 15.3 мм. Птенцы – в мае-июне. Питается зернами злаковых растений, как культурных, так и диких, ягодами; птенцов кормят насекомыми, пауками, гусеницами.

Статус: немногочисленная, местами обычная птица.

Полевые признаки: размером чуть больше индийского воробья. Клюв слабо вздутый, относительно удлиненный, крылья короткие. Хвост слегка закруглен. **Общая окраска тела буровато-песочная, без пестрин.** Крылья бурые с узкими светлыми каймами перьев. На

li. **Guýrugy** goňur **ujy ak tegmilli**. Çünki goňurak. Aýaklary sarymtyl-goňur, gözüniň göreji goňur. Ýaşlarynyň arka tarapy goňur öwüşginli, ýelekleri ýagty inli jähekli. Çünki açyk-goňur. Howada uçuşy serçlere däl-de girriklere çalymdaşlyk edýär. Saýraýşy çarlaklaryň ýa-da jyzlanlaryň sozulan jyryldysyna çalymdaş. Gany - 86-104, guýrugy - 50-58, söbügi - 17-19, çünki - 10-11 mm.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: solak birmeñzeş goňurak-çägepisintli reňki bilen beýleki serçelerden tapawutlanýar. Dag serçesine çalymdaş, emma arkasynda we kellesinde dik geçýän gara menekleri we **petekesinde sary tegmili bolmaýar**. Guýrugyndaky ak tegmili bilen öý we hindi serçeleriň mäkiýanlaryndan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: höwürtegeýän oblastlary Alynky we Orta Aziýa, Zakawkazýe. Türkmenistanda - Köpetdagda we Bathyzda. Günorta Arabystanda we Gündogar Afrikada guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän höwürtegeýän görnüş. Ýazky migrasiýasy aprelde. Güýzkisi - iýul-awgustda. Daglaryň seýrek gyrymsy ösümlikli ýokarky we ortaky kemerlerinde ýaşaýar. Süri bolup gezýär. Apreliň ikinji ýarymynda, maýda kiçiräk topar bolup höwürtegeýär. Höwürtegesi ýarymşar şekilli, pes boýly gyrymsyda gurýar. 4-6 sany goňur meneklije ak ýumurtgalary goýýar. Iýunda jüýjeleýär. Iýmiti, umuman, edil beýleki serçeleriňki ýaly.

Statusy: az sanly, gowşak öwrenilen guş.

крыле светлая поперечная отметина. **Хвост** тоже бурый **с белыми пятнами на конце**. Клюв буроватый. Ноги желтовато-бурые. Радужка глаз бурая. У молодых спинная сторона с более развитым бурым тоном, светлые окаймления перьев широкие. Клюв светло-бурый. По полету больше похож на вьюрков, чем на воробьев. Песня напоминает протяжное стрекотание сверчка или цикад. Крыло - 86-104, хвост - 50-58, цевка - 17-19, клюв - 10-11 мм.

Сходства - отличия: от других воробьев **отличается однотонной бледной буровато-песочной окраской**. Похож на каменного воробья, но **отсутствуют** темные продольные пестрины на спине, продольные полосы на голове и **желтое пятно на зобе**. От самок и молодых домового и индийского воробьев отличается белыми пятнами на хвосте.

Распространение: область гнездования Передняя и Средняя Азия, Закавказье. В Туркменистане - Копетдаг и Бадхыз. Зимует в Южной Аравии и Восточной Африке.

Образ жизни: прилетно-гнездящийся вид. Весенняя миграция - в апреле. Осенняя - в июле-августе. Обитает в верхнем и среднем поясе гор с редкой кустарниковой растительностью. Держится стайками. Гнездится во второй половине апреля, в мае, небольшими группами. Гнезда полушаровидной формы, на низкорослых кустах. В кладке 4-6 белых с бурыми крапинами яиц. Птенцы - в июне. Питание, в общем, как и других воробьев.

Статус: немногочисленная, слабо изученная птица.

Girrikler - Fringillidae - Вьюрковые

Däne iýýän guşlaryň uly maşgalasy. Orta we kiçi ululyklardaky guşlar. Beden gurluşy dykyz, kellesi togalagrak, boýny gysga. Çünki berdaşly, pahna görnüşde, gapdallaryndan gysylan, diňe girrigiň üstki we aşaky çüňkleri atanaklaýyn bolup, ol däneleri gabygyndan soguryp almak we pytyratmak üçin uýgunlaşdyr. Görnüşleriniň käbirleriniň çüňkiniň ujy biraz çowly, beýlekileriniň bolsa tegelenen. Burun deşikleri çüňkiniň düýbüne ýakyn ýerleşýär, deşikleriň arasy açyk, tegelegräk, üsti örtüksiz, bölekleyin ýa-da tutuşlaýyn aýratyn ýelek dessejikleri bilen örtülen bolýar. Ýelek örtügi dykyz, dürli reňkli. Mäkiýanlary, adaty bolşy ýaly, horazlarynyňka görä öçügsi reňkli. Sähra, çöl, dag we antropogen landşaftarda ýaýran, görnüşleriň köpüsi agaç ýa-da gyrymsy agaç ösümlikleri bilen baglanyşykly, şeýle-de çölde ýaşaýanlary hem duşýar. Uzak bolmadyk aralyklara möwsümleýin göçüp-gonup uçup gitmek hem bolýar. Saýraýşy sesliräk we ýönekeý. Höwürtegesi okara görnüşli, açyk. Agaçlaryň üstünde, grymsylarda, ýerde, daşlaryň hem gaýalaryň ýarçyklarynda höwürtegeýärler. Esasan, ösümlikleriň tohumlary, däneleri, şeýle-de mör-möjekleri, möýleri we beýleki oňurgasyzlary çokýarlar. Maşgalada jemi 250-den gowrak görnüş şol sanda 125-si hakyky girrikler (*Fringillinae*) aşaky maşgalasyndan bolup, Ýwropada, Aziýada, Afrikada, Amerikada ýaýrandyrlar. Türkmenistanda 21 görnüş.

Большое семейство зерноядных птиц. Размеры средние и мелкие. Телосложение плотное, голова круглая, шея короткая. Клюв крепкий, конической формы, сжатый с боков, только у клестов надклювье и подклювье перекрещиваются и приспособлены для дробления и извлечения семян. У некоторых видов конец клюва немного заостренный, у других немного закругленный. Ноздри расположены у основания клюва, сквозные, округлые, без крышечки и частично или полностью прикрыты пучками особых перьев, имеющих у основания клюва. Оперение плотное, разнообразной окраски. Самки, как правило, окрашены более тускло, чем самцы. Населяют степи, пустыни, горы и антропогенный ландшафт, большинство видов связаны с древесной или кустарниковой растительностью, есть и обитатели пустынь. Характерны сезонные передвижения на небольшие расстояния или кочевки. Пение звучное и простое. Гнезда открытые чашевидные. Гнездятся на деревьях, кустах, на земле, среди камней и в щелях скал. Питаются, главным образом, растительной пищей - семенами, зернами, а также насекомыми, и другими беспозвоночными. Распространены в Европе, Азии, Африке, Америке. Всего более 250 видов в том числе 125 - из подсемейства настоящих вьюрков (*Fringillinae*), среди них - 21 вид в Туркменистане.

386. Owgan ýer serçesi – *Montifringilla theresae* – Афганский земляной воробей

Meýdan alamatlary: hindi serçeden ölçegi kiçi. Çünki gysga, edil girrikleriňki ýaly ýogyn we olara görä daýaw. Guýrugy beýlekilere garanynda gysga, göni. **Horazynyň kellesiniň üsti, arkasy we bili gara dik tegmilli çuparrak-goňur, garyn tarapy goňurrak-çupar.** Bokurdagy gara. Mäkiýanlary we ýaşlary horazlaryna çalymdaş, ýöne öçügsi reňkli. Çünki we aýaklary gara. Ganaty – 88-99, guýrugy – 56-59, söbügi – 20, çünki – 12-12.3 mm.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: hindi we garadöş serçeleriň mäkiýanlary bilen bilelikde ýaşayan ýerlerinde çalyşmak mümkin, olardan guýrugynyň gapdallaryndaky inli ýagty zolagy bilen tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Demirgazyk Owganystan (Hindikuş we Parapamiz), Türkmenistanda Bathyz we Garabil töweregi.

Ýaşayşy: göçüp-gonyän guş. Baýyryk sähralyklarda, şorluk çöketliklerde we gum gaýaly oýlara ýanaşyk ýerlerde gabat gelmegi mümkin. Adatça, jübüt, käte daş serçeleri bilen bile süri bolup gezýär.

Statusy: seýrek, heniz ýakynan öwrenilmedik guş, Bathyz döwlet goraghanasynda görnüşiň ýaşamagy üçin wajyp şertli ýerler bar.

387. Gar girrigi – *Montifringilla nivalis* – Снежный вьюрок

Meýdan alamatlary: serçeden ulurak ölçegli. Çünki aram ýogyn, guýrugy uzynrak we göni. Ganatlary beýlekilere garanynda ýiti uçly. **Kellesi çal.** Arkasy dik geçen

Полевые признаки: размером мельче индийского воробья. Клюв короткий, как у вьюрков, толстый и сравнительно сильный. Хвост относительно короткий, прямой. **У самца голова сверху, спина и поясница рыжевато-бурые, с продольными темными пестринами; брюшная сторона буровато-рыжая. Горло черное.** Самки и молодые похожи на самцов, но тусклее. Клюв и ноги черные. Крыло – 88-99, хвост – 56-59, цевка – 20, клюв – 12-12.3 мм.

Сходства – отличия: может быть спутан с самками индийского или испанского воробьев в местах совместного обитания, от которых отличается широкими светлыми полосами по бокам хвоста.

Распространение: Северный Афганистан (Гиндукуш и Парапамиз), в Туркменистане – Бадхыз и Карабиль.

Образ жизни: оседло-кочующая птица. Может быть встречена в холмистой степи, по периферийным участкам солончаковых впадин и лессовым обрывам. Держится обычно парами, порой в стаях вместе с каменными воробьями.

Статус: редкая, почти не изученная птица, важные для вида местобитания находятся в Бадхызском заповеднике.

Полевые признаки: размером крупнее воробья. Клюв умеренно утолщен, хвост удлинённый и прямой. Крылья сравнительно острые. **Голова серая.** Спина бурая с про-

теgmilli goňur. **Ganatlaryndaky gara we ak reňkleriň utgaşygy uçan wagtynda anyk saýgardýar.** Horazynyň alkymynda we bokurdagynda, mäkiýandan tapawutlylykda, kiçiräk gara tegmilli bolýar. Guýrugynyň ortasy gara, gapdallary bolsa ak. Bedeniniň garyn tarapy kirliräk-ak. Ýaşlaryň arkasy has güýçliräk goňurrak öwürginli, umumy reňki öçügsi, bokurdagy gara tegmilsiz. Aýaklary gara, çünki tomsuna gara we guşyna – sarymtyl. Gozüniň göreji goýu-goňur. Sesi güýçli jürlemeler we gysga – “ti-ti-zýü”, saýraýşy – myňňyldyly ýiti sesli. Uçuşy çalt, emma, diňe gysga aralyga. Ganaty – 108-121, guýrugy – 62-75, söbügi – 19-23, çünki – 11-14 mm, agramy – 34-44 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: ganatlaryndaky we guýrugynyň gapdallaryndaky ak inli zolaklary bilen beýleki serçelerden we girriklerden anyk tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta Ýewropanyň daglyk oblastlary, Alynky, Ortaky we Merkezi Aziýada. Türkmenistanda Köýtendagda.

Ýaşayşy: oturymly, bölekleýin göçüp-gonyän, dag görnüşi. Adatça, süri bolup gezýär, ýerde ýymitlenýär. Daglaryň ýokarsyndaky sähralyklarda we suw toplanýan ýerlerde, şeýle-de çagyl we daş üýsmekli ýerlerde gabat gelyär. Jübüt we kiçiräk koloniya bolup, gaýalaryň ýarçyklarynda we beýleki buky ýerlerde höwürtegeleýär. Maý-iyunda 4-5 sany ak reňkli ýumurtgalary goýýar.

Statusy: seýrek. Bu guş heniz öwrenilmedik diýen ýaly. Köýtendag goraghanasynyň iň täsin wekilleriniň biri.

дольными пестринами. **На крыльях – контрастное сочетание черного и белого цветов, хорошо заметное в полете. У самца, в отличие от самки, на подбородке и горле небольшое черное пятно.** Хвост по середине черный, по бокам белый. Брюшная сторона тела грязно-белая. У молодых спина с более сильным буроватым тоном, общий окрас тусклее, черного пятна на горле нет. Ноги черные, клюв тоже черный летом и желтоватый зимой. Радужка глаз темно-бурая. Голос – громкое чириканье и короткое «ти-ти-зю», песня – резкие гнусавые звуки. Полет быстрый, но обычно на короткое расстояние. Крыло – 108-121, хвост – 62-75, цевка – 19-23, клюв – 11-14 мм. Вес – 34-44 г.

Сходства-отличия: от других воробьев и вьюрков резко отличается очень широкими белыми полосами на крыльях и по бокам хвоста.

Распространение: горные области в Южной Европе, Передней, Средней и Центральной Азии. В Туркменистане – Койтендаг.

Образ жизни: оседлый, частичнокочующий, горный вид. Держится обычно стайками, кормится на земле. Встречается на нагорных степях и лужайках, а также осыпях и каменистых участках. Гнездится парами и небольшими колониями в щелях скал и иных укрытиях, кладка в мае-июне и состоит из 4-5 яиц белого цвета.

Статус: редкая, почти не изученная птица, один из интересных представителей Койтендагского заповедника.

388. Üşegenje – *Fringilla coelebs* – Зяблик

Meýdan alamatlary: serçe ululyk-da. Çünki pahna görnüşli, uzyn, ýiti uçly, düýbi biraz ýognan. Ganatlary beýlekilere garanynda uzyn, guýrugy oýukly. Horazlarynyň maňlaýy ýazyna gara, kellesiniň üsti we boýny çal. Gaşy we kellesiniň gapdallary gülgüne öwüşginli goňras. Arkasy çalymtyl-ýaşylymtyl ýa-da poslurak-goňurrak. **Bili we guýrugynyň üsti ýaşyl.** Guýrugynyň gapdallary anyk görüňýän ak tegmilli. **Ganatlary iki sany ak kese zolakly,** ganat ýelekleri insiz ak jähekli garamtyl-goňur. Garyn tarapy, döşi has doýgun, böwürleri açyk goňurrak-goýy-gülgüne reňkli. Garynyň ortasy we guýrugynyň aşagy ak. **Kellesiniň üstüniň we boýnunyň, şeýle-de arkasynyň güýzki ýelek örtügi çyparrak-goňur. Çünki güýzine goňur we ýazyna – mawumtyl-çal. Aýaklary goňur. Mäkiýany goňurrak-çal, bedeniniň garyn tarapy has açyk reňkli bolýar.** Ýaşlary mäkiýana çalymdaş, emma, öçügsi reňkli. Sayraýsy güýçli owazlar – “fiit-fiit-lyá-lyá-wičiukik” ýaly bolup eşdilyär. Sesi – “pink-pink”, “rýu-rýu-rýu” ýa-da “fýu-fýu-fýu”. Jübüt we süri bolup gezýär. Ganaty – 84-94, guýrugy – 57-72, söbügi – 17-19.2, çüňki – 10-13.3 mm, agramy – 17-26 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: horazy reňkleriň utgaşmagy we beýleki girriklere meñzeş däldigi bilen tapawutlanýar. Ganatlary kese zolakly: ýazyna ak we güýzüne çalymtyl. Horazynyň aşak tarapy goňur-goýy-gülgüne reňkli. **Guýrugynyň gapdallary ak tegmilli.** Mäkiýany bilinde ak, döşünde we ganatlarynda çypar reňkleriň ýokdygy bilen girrigiň mäkiýanyndan tapawutlanýar, yöne

Полевые признаки: размером с воробья. Клюв конической формы, острый, слегка вздутый в основании. Крылья относительно длинные, хвост выемчатый. У самцов весной лоб черный, верх головы и шеи серые. Бровь и бока головы каштановые с розовым оттенком. Спина серо-зеленоватая или ржаво-коричневая. **Поясница и надхвостье зеленые.** Хвост по бокам с хорошо заметными белыми пятнами. **На крыльях – две поперечные белые полосы,** сами перья крыла черно-бурые с узкими белыми каемками. Брюшная сторона буровато-темно-розового цвета, более насыщенного на груди, светлее на боках. Центральная часть брюшка и подхвостье белые. **В осенне-зимнем наряде,** когда широко встречается у нас, **верхняя сторона головы и шеи, а также спина коричневые. Самка буровато-серая, брюшная сторона тела имеет более светлую окраску.** Молодые похожи на самку, но тусклее. Клюв – буроватый, ноги бурые. Песня – громкая трель. Передается как «фьит-фьит-ля-ля-вичиу-кик». Голос – «пинк-пинк», «рю-рю-рю» или «фью-фью-фью». Держится парами и стайками. Крыло – 85-94, хвост – 57-72, цевка – 17-19.2, клюв – 10-13.3 мм, вес – 17-26 г.

Сходства – отличия: самец отличается сочетанием цветов и не похож на других вьюрковых. На крыльях поперечные полосы: белые весной и сероватые осенью. **По бокам хвоста белые пятна.** От юрка отличается отсутствием бело-

olaryň ikisiniň hem ganatlaryndaky inli we insiz zolaklary elmydama görüňýär.

Ýaýran ýerleri: Ýewropanyň hemme ýerleri diýen ýaly, Demirgazyk Afrikda, Alynky we Orta Aziýa, gündogara Orta Sibire çenli. Türkmenistanda – Günbatar we Merkezi Köpetdag. Güýz-gyş döwürlerinde oazislerde, derýalaryň jülgelerinde, Köpetdagyň eteklerinde, Hazar deňziniň ýakalarynda gabat gelyär. Sanalan arealyň günbatar ýerlerinde we Afrikanyň gündogar böleginde gyşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän-gyşlaýan, Köpetdagyň käbir ýerlerinde höwürttegeleýän guş. Ýazky migrasiýasy martda, güýzkisi – oktýabr-noýabrda. Agaç we gyrymsy agaç ösümlikli ýerlerde saklanýar. Aprelde höwürttegeleýär. Ýarymşar görnüşli höwürttegesini, köplenç sütüniň şahalanan ýerinde gurýar. 4-7 sany gülgüne-syýareňk meneklije gögümtil-ýaşyl reňkli ýumurtgalary goýýar; ölçegleri – 14.3-15 x 19.5-20.5 mm. Maýda jüýjeleýär. Aglaba, mör-möjekler, şeýle-de ösümlikleriň däneleri bilen iýmitlenýär.

Statusy: ýazyna we tomsuna seýrek, käbir ýerlerde az sanly, güýz-gyş döwründe adaty görnüş.

389. Girrik – *Fringilla montifringilla* – Юпок

Meýdan alamatlary: serçe ölçeginde. Çünki göni, uýy çowly, düýbi çişigräk. Güýz-gyş aýlary, bizde gabat gelyän wagty, horazlarynyň kellesiniň üsti, ýañaklar we kellesiniň gapdallaryndaky depesinden arkasy-na gaýdýan zolaklar goýy goňur. Arkasy, ýelekleri çyparak gaýalan goňur. Guýrugy gara. Guýrugynyň üsti

го цвета на пояснице и рыжего цвета на груди и плечах, но у них обоих видны широкая и узкая полосы на крыле.

Распространение: гнездовой ареал - почти вся Европа, Северная Африка, Передняя и Средняя Азия, на восток – до Средней Сибири; в Туркменистане – Западный и Центральный Копетдаг. В осенне-зимнее время у нас в оазисах и долинах рек, предгорьях Копетдага, на Каспийском побережье. Зимует в южных областях очерченного ареала и восточных частях Африки.

Образ жизни: пролетная, зимующая, в Копетдаге местами гнездящаяся птица. Весенняя миграция – в марте, осенняя – в октябре-ноябре. Придерживается мест с древесной и кустарниковой растительностью. Гнездится в апреле. Гнездо полушаровидное, чаще в развилках ветвей. В кладке 4-7 яиц голубовато-зеленого цвета с розовато-фиолетовыми пятнами, размеры – 14.3-15 x 19.5-20.5 мм. Птенцы – в мае. Питаются, преимущественно, насекомыми, а также семенами.

Статус: весной и летом редкий, в осенне-зимний период обычный вид.

gara, ol uçýan wagty anyk görünýär. Bedeniniň böwürleri uly gara tegmilli mämişiräk-çyparrak. Bokurdagy, petekesi we döşi mämişiräk-çyparrak reňkli. Garny we guýrugynyň aşagy ak. Gözleriniň töweregi ýagty halkaly, gözleri goňur. Çünki mämişiräk-sarymtylrak, aýaklary goňur. Mäkiýänlarynyň arkasy goýu-goňur, emma olaryň umumy reňki agymtyl. Ganatlarynyň üsti we bedeniniň garyn tarapy goňurrak-çyparrak. Boýnunyň yzy we **gapdallary çal reňkli**. Sesi basyk “çi-i”. Adatça süri bolup gezyýär. Ganaty - 81.2-96.6, guýrugy - 55.4-66.6, söbügi - 17.8-19.5, çünki - 10.7-12.8 mm, agramy - 20-27.2 g.

Ýaýran ýerleri: Ýewraziýanyň taýga zolagynda höwürtleýär – Skandinawýadan Çukotka we Kamçatkada çenli. Merkezi Aziýada we Türkmenistanda ýaz we güýz uçup geçende hemme ýerlerde, gyş döwründe – derýalaryň jülgelerinde we dag eteklerinde, seýreräk daglarda duşýar. Ýewropanyň günorta böleginde, Orta we Merkezi Aziýanyň günortasynda we Päkistanyň, Hindistanyň, Günorta Hytaýyň, Ýaponiýanyň günortasynda gyşlaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän we gyşlaýan guş. Ýazky migrasiýasy – martda, güýzkisi oktýabr-noýabrda. Derýalaryň jülgelerinde, dag etek zolakda we antropogen landşaftda ýaşaýar. Tomus döwründe aglaba mör-möjekleri, gyşyna haşal otlaryň tohumlaryny we ekinleriň dänelerini iýýär.

Statusy: güýz uçup geçende we gyşlanda adaty, käbir ýerlerde köpsanly, oňat tapawutlanýan guş.

каймами перьев. Хвост черный. **Надхвостье белое, что хорошо заметно в полете.** Бока тела оранжево-рыжеватые с крупными черными пестринами. **Горло, зоб и грудь ржавчато-рыжего цвета.** Брюшко и подхвостье белые. Вокруг глаз светловатое кольцо, глаза бурые. Клюв оранжево-желтоватый, ноги бурые. У самок спина также темно-бурая, но в целом они окрашены бледнее. Крылья сверху и брюшная сторона тела буровато-рыжеватые. Зашеек и **бока шеи серого цвета.** Голос – глухое «чи-и». Держатся, как правило, стайками. Крыло – 81.2-96.6, хвост – 55.4-66.6, цевка – 17.8-19.5, клюв – 10.7-12.8 мм, вес – 20-27.2 г.

Сходства – отличия: в отличие от других вьюрковых **верх головы, щеки, уши, зашеек и спина бурые. Надхвостье белое.** Хвост черный, с небольшим белым оттенком у основания. В отличие от зяблика голова черная или бурая.

Распространение: гнездятся в таежной зоне Евразии – от Скандинавии до Чукотки и Камчатки. В Средней Азии и Туркменистане осенью и весной на пролете повсеместно, в зимнее время – по долинам рек и предгорьям, реже в горах. Зимовки в южной половине Европы, на юге Средней и Центральной Азии и южнее – в Пакистане, Индии, Южном Китае, Японии.

Образ жизни: пролетная и зимующая птица. Весенняя миграция – в марте, осенняя – в октябре-ноябре. Обитает в речных долинах, горах, подгорной полосе и в антропогенном ландшафте. Питаются в летний период преимущественно

насекомыми, в зимний растительным кормом – семенами сорняков и сельскохозяйственных культур.

Статус: на осеннем пролете и зимовке обычная, местами многочисленная, хорошо заметная птица.

390. Gyzył depeli girrik – *Serinus pusillus* – Красношапочный вьюрок

Meýdan alamatlary: serçeden biraz kiçiräk. Çünki ýognas, gysga, gapdallary sähelçe tüňňüräk, çüňküsti gerş hem tüňňüräk, aşaky çüňki göni. **Kellesi, yeňsesi, boýny, petekesi ýazyna gara, güýzine ýeleklere açyk jähekli. Maňlaýy we depesi gyzył reňkli.** Arkasy we ganatlarynyň üstüni örtüji ýeleklere garamtyl-goňur tegmilli çalymtyl-mämişi. **Bili we guýrugynyň aşagy mämişiräk-gyzył reňkli.** Ganatlary we guýrugy gararamtyl-goňur. Döşi we garnynyň aşaky tarapy mämişi öwüşginli. Bedeniniň böwürleri gara-goňur menekli. Çünki we aýaklary gara. Mäkiýany horazyna çalymdaş, ýöne reňki biraz solagrak, gyzył we gara reňkleri az. Ýaş guşlaryň kellesi gyzył “telpejiksiz”, goňur. Bokurdagy we petekesi goňurrak. Sesi batly, mylaýym heňli owazlar. Saýraýşy ses owazlaryň we jikgildileriň toplumlaryndan durýar. Ganaty – 69-79, guýrugy – 48-60, söbügi – 13.2-14.7, çünki – 5.6-8 mm, agramy – 10-12.7 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **biliniň mämişiräk-gyzyldygy** bilen beýleki girriklerden tapawutlanýar. **Maňlaýy we depesi gyzył,** bedeniniň üstki tarapy garamtyl tegmilli.

Ýaýran ýerleri: Ortaýer deňziniň gundogarragy, Kawkazda, Oňki we Orta Aziýada, gündogara Demirgazyk Hindistan we Tibete çenli. Türk-

Полевые признаки: несколько мельче воробья. Клюв вздутый короткий, по бокам слегка выпуклый, хребет надклювья тоже выпуклый, подклювья прямой. **Голова, затылок, шея, зоб черные** весной, со светлыми окаймлениями перьев осенью. **Лоб и темя красного цвета.** Спина и верхние кроющие крыла серовато-оранжевые с черно-бурыми стержневыми пятнами. **Поясница и подхвостье оранжево-красного цвета.** Крылья и хвост черно-бурые. Грудь и брюшная сторона с оранжевым оттенком. Бока тела с темно-бурыми пятнами. Клюв и ноги черные. Самка похожа на самца, но с несколько тусклой окраской, красного и черного цвета меньше. У молодой птицы голова коричневая, без красной “шапочки”. Горло и зоб коричневые. Голос – звонкая, мелодичная трель. Песня состоит из набора трелей и щебетания. Крыло – 69-79, хвост – 48-60, цевка – 13.2-14.7, клюв – 5.6-8 мм, вес – 10-12.7 мм.

Сходства – отличия: в отличие от других вьюрковых **поясница оранжево-красная. Лоб и темя красные,** верхняя сторона тела в темных пятнах.

Распространение: Восточное Средиземноморье, Кавказ, Передняя и Средняя Азия на восток до

menistanda – Uly we Kiçi Balkanda, Köpetdagda, Köýtendagda.

Ýaşayşy: oturymly dag guşy, dikligine göçüp-gonup uçup gezmekler mümkin. 3-5 sany solgun-gö-gümtil reňkli ýumurtgalary goýýar. Iýunda jüýjeleýär. Ýylda iki gezek ýumurtga goýýar. Dag ösümlikleriň, gyrymsylaryň tohumlaryny, mörmöjekleri iýýär.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde adaty, ýeterlik öwrenilmedik guş.

391. Ýaşyl paltatumşyk – *Carduelis chloris* – Зелenuшка

Meýdan alamatlary: serçäniň ululygynda. Beden gurluşy dykyz, guýrugy beýlekilere garanynda gysga, oýukly. **Umumy reňki ýaşylymytyl-sarymytyl. Kellesiniň üstki tarapy, boýny we arkasy ýaşylymytyl-çal. Bili we guýrugynyň üsti sarymytyl-ýaşyl reňkli.** Guýrugynyň ortaky ýelekleri garamtyrak-çal reňkli, **galanlary sary düşekli.** Kellesiniň gapdallary, boýny we bedeni çalymytyl-goňurrak. **Ganatlary limonpisint-sary reňki kiçiräk meýdançaly.** Bokurdagy, petekesi we döşi çal ýokundyly sarymytyl-ýaşyl reňkli. Çünki ujyna ýakyn garalýan açyk-goňur, aýaklary açyk-goňur. Mäkiýany horazyna çalymdaş, ýöne has öçügsi reňkli. Bili we bedeniniň garyn tarapy ýaşylymytyl öwüşginli. Ýaşlary mäkiýanlara çalymdaş, emma ýelekleri has garamtyl. Bili we guýrugynyň üsti goňur reňkli. Garyn tarapy dik goňur çyzykly kirliräk-ak. Saýraýşy – sykylyklar we ses owazlary “ižžž” bilen pert gutarýar. Adatça, jübüt, göçýän wagtlary süri bolup gezýärler. Ganaty – 79-95, guýrugy – 50.8-61.2, söbügi – 17.4-19.2, çünki – 10.6-13.3 mm, agramy – 20-35 g.

Северного Индостана и Тибета. В Туркменистане – Большой и Малый Балханы, Копетдаг, Койтендаг.

Образ жизни: оседлая горная птица, может совершать вертикальные кочевки. В кладке 3-5 яиц бледно-голубоватого цвета. Птенцы – в июне. Две кладки в году. Питаются семенами горных трав и кустарников, насекомыми.

Статус: немногочислен, местами обычен, изучен слабо.

Полевые признаки: размером с воробья. Телосложение плотное, хвост сравнительно короткий, выемчатый. **Общая окраска зеленовато-желтоватая. Верхняя сторона головы, шея и спина зеленовато-серые. Поясница и надхвостье желтовато-зеленого цвета.** Центральные перья хвоста черновато-серого цвета, остальные с желтыми основаниями. Бока головы, шея и тела серо-буроватые. **На крыле небольшой участок лимонно-желтого цвета.** Горло, зоб и грудь желто-зеленого цвета с серым налетом. Клюв светло-бурый, темнеющий к вершине, ноги светло-бурые. Самка похожа на самца, но окрашена более тускло. Поясница и брюшная сторона тела зеленоватого оттенка. Молодая птица похожа на самку, но с более темными перьями. Поясница и надхвостье бурого цвета. Брюшная сторона грязно-белая с бурыми продольными штрихами. Песня – посвистывание и трель, заканчивается резким «ижжж». Держатся обычно парами, во время кочевок в стайках. Крыло – 79-95, хвост – 50.8-61.2, цевка

Meňzeşlikleri-tapawutlary: umumy reňk öwüşginini ýaşylymytyl-sarymytyl dygy: bedeniniň garyn tarapyň sary, çalymytyl-goňur ganatlarynyň uçlarynyň sary jäheklidigi bilen beýleki girriklerden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: tutuş Ýewropa, demirgazyk oblastlaryndan başlary, gündogara Krasnoýarskiniň günorta bölegine çenli, Orta, Alynky we Kiçi Aziya, Ýakyn Gündogar, Demirgazyk-Günbatar Afrika. Gyşlamagy we göçüp-ganma hereketleri görnüşini arealynyň günorta böleginde geçýär. Türkmenistanda Köýtendag, Köpetdag we ýanaşyk düzlükler, Etrek, Sumbar, Tejen, Murgap derýalarynyň we Amyderýanyň jülgeleri.

Ýaşayşy: uçup geçýän-gyşlaýan we höwürtegeleýän guş. Ýazky migrasiýasy martda, güýzkisi oktyabr-noýabrda. Hemme ýerlerde agaç we gyrymsy agaç ösümlikli meýdanlarda mekan tutýar. Aprel-maýda höwürtegeleýär. Düybi düşekli okara görnüşli höwürtesini gyrymsyda ýada agaçda gurýar. 4-5 sany mawymtyl we goňur meneklije ýaşylymytyl ýumurtgalary goýýar. Ýylda iki gezek ýumurtgalaýar. Esasan, ösümlikleriň däneleri, miweleri, şeýle-de mörmöjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: jülgelerde ýaz-tomus wagtlary az sanly, daglarda – adaty, güýz-gyş döwründe käbir ýerlerde köpsanly guş.

392. Saryganat – *Carduelis carduelis* – Щегол

Meýdan alamatlary: serçäniň ululygynda. Çünki pahna görnüş-de, ýiti uçly, beýlekilere garanynda uzynrak. Guýrugy oýuk. **Maňlaýy, depesiniň oňki bölegi we bo-**

– 17.4-19.2, клюв – 10.6-13.3 мм, вес – 20-35 г.

Сходства – отличия: основной тон окраски, в отличие от других вьюрков, **зеленовато-желтоватый: брюшная сторона тела желтая.**

Распространение: вся Европа, за исключением северных областей, на восток до южных частей Красноярского края, Средняя, Передняя и Малая Азия, Ближний Восток, Северо-Западная Африка. Зимовки и кочевки – в южных частях ареала вида. В Туркменистане – Койтендаг, Копетдаг и прилегающие равнины, долины Этрека, Сумбара, Теджена, Мургаба и Амударьи.

Образ жизни: гнездящаяся и пролетно-зимующая птица. Весенняя миграция – в марте, осенняя – в октябре-ноябре. Всюду придерживается древесно-кустарниковых местообитаний. Гнездится в апреле-мае. Гнездо чашеобразное с выстилкой, на кусте или дереве. В кладке 4-5 яиц. Окраска их голубоватая с фиолетовыми и коричневыми крапинками. В году две кладки. Питаются, преимущественно, растительным кормом – семенами, ягодами, а также насекомыми.

Статус: в весенне-летнее время в долинах немногочисленная, в горах – обычная, в осенне-зимнее время местами многочисленная птица.

Полевые признаки: размером с воробья. Клюв конусовидный, остроконечный, сравнительно длинный. Хвост выемчатый. **Лоб и горло красные.** Кольцо вокруг основания клюва черное. Верх го-

kurdagy gyzyl. Çünkiniň düybüni gabayan halka gara. Kellesiniň üsti we bedeni çalymtyl-ýaşylymtyl-çypar öwüşginli. Guýrugynyň üsti ak. Garnynyň ortasy ak, böwürleri çalymtyl-goňurrak. **Ganatlary sary inli kese zolakly garamtyl-goňur** we ýelekleriniň uçlary ak. **Ganatlaryndaky sary tegmil uçan mahaly örän oňat görüňär.** Çünki sarymtylrak-ak, aýaklary goňurrak-gülgüne. Mäkiýanlary öçügsi reňkli, gyzyly reňki az. Ýaşlarynyň kellesinde gara we gyzyly reňkleri ýok, bedeniniň aşaky tarapy, petekesi, döşi we böwürleri garamyl menekli, ganatlaryndaky tegmil çyparrak. Jübüt ýa-da süri bolup gezyýärler. Saýraýşy gaty sykylyklardan, owazlardan we şowhunly seslerden durýar. Sesi güýçli – “pit-tilipit”. Horazlarynyň ganaty – 76-82.5, mäkiýanlarynyňky – 75.5-81.5 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: açykygyzyl “perdesi” we ganatlaryndaky sary tegmilleri bilen beýleki girriklerden tapawutlandyrylýar. Uçup geçende we gyşyna bizde saryganatlaryň **depesinde we ýeňsesinde gara reňki bolan** beýleki aşaky görnüşi gabat gelýär.

Ýaýran ýerleri: Ortaýer deňzi, бүтин Ýewropa, onuň çetki demirgazyk olaslaryndan başgalarynda, Günbatar we Orta Sibiriň günortasynda, Gazagystan, Orta, Alynky we Kiçi Aziýa. Gyşyna öz arealynyň demirgazyk böleginden günorta oblastlaryna göçýär. Türkmenistanda – giňişleýin gabat gelýär, ýöne olar derýalaryň jülgelerini, daglaryň derelerine we oazislere ýakynlaşmany halaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýär, höwürtleýär we gyşlaýar, daglarda oturmly guş, ýöne gyşyna göçüp-gonup uçup gezyýär. Ýazky migrasiýasy

ловы и тела серо-зелетовато-рыжеватого оттенка. Надхвостье белое. Середина брюха белая, бока серо-буроватые. **Крылья черно-бурые, с желтой широкой поперечной полосой** и белыми концами перьев. **Желтые поля на крыльях в полете очень хорошо заметны.** Клюв желтовато-белый, ноги буровато-розовые. У самок цвета тусклее, красного цвета меньше. У молодых отсутствуют на голове черный и красный цвета, нижняя сторона тела с темными пятнышками на зобе, груди и боках, а на крыльях пятна рыжеватые. Держатся парами или стайками. Пение состоит из громких свистов, трелей и трескучих звуков. Голос – звонкое «пить-тили-пить». Крыло самцов – 76-82.5, самок – 75.5-81.5 мм.

Сходства – отличия: от других вьюрков отличается ярко-красной «маской» и желтыми полями на крыльях. На пролете и зимой у нас встречаются щеглы другой формы – с развитием **черного цвета на темени и затылке.**

Распространение: Средиземноморье и вся Европа, кроме северных ее областей, юг Западной и Средней Сибири, Казахстан, Средняя, Передняя и Малая Азия. Зимой из северных частей откочевывают в южные области своего ареала. В Туркменистане – встречается широко, но тяготеет к речным и горным долинам и оазисам.

Образ жизни: пролетает, гнездится и зимует, в горах оседлая птица, но зимой совершает кочевки. Весенняя миграция в апреле, осенняя – в ноябре. Придерживается местообитаний с древесно-кустар-

апельде, güyzkisi noýabrda. Agaçly we gyrymsy agaçly ýerlerde mekan tutýar. Daglaryň derelerinde, dag eňňitlerinde we dagöňi düzlükde ýaşaýar. Aprelde höwürtleýär, ýarymşar görnüşi höwürtgelerini agaçlarda gurýar. 3-5, köplenç 4 sany kütek uýynda toplanan garamtyl ýa-da çalymtyl-melewşe meneklije solak - mawymtyl reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri –16.6-18.1 x 12.9-13.5 mm. Maýda jüýjeleýär. Ýylda iki gezek ýumurtga goýýar. Aglabä ösümlikleriň däneleri, şeýle-de mörmöjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde adaty görnüşi, aýratyn-da uçup geçýän we göçüp-gonýan wagty. Höwesjeňleriň kapasada saklamak üçin saýrak guş hökmünde ulanmaklary mümkin.

393. Ýaşyl tiltil – *Carduelis spinus* – Чиж

Meýdan alamatlary: serçeden ер-esli maýda. Çünki beýlekilere garanyňda inçe, göni, ýiti uçly, gapdallaryndan güýçli gysylan. Guýrugy oýuk. **Ýelek örtüginde sarymtyl-ýaşyl reňk agdyklyk edýär. Depesi we bokurdagy gara. Gözüniň üsti sary zolakly.** Woýnynyň üsti we arkasy ýaşylymtyl-sarymtyl. **Guýrugynyň üsti sary.** Ganatlary iki sany sary kese zolakly goňurrak-gara. Kellesiniň gapdallary sarymtyl-goňur. Bedeniniň böwürleri sary, guýrugynyň aşagy gara-goňur menekli agymtyl-sary. Aşaky tarapy tutuşlygyna sary bolup, ýuwaş-ýuwaşdan agymtyl öwüşgine geçýär. Mäkiýany has öçügsi reňkli. Onuň bokurdagynda we kellesinde gara reňki ýok. Garyn tarapy we döşi ýukajyk sarymtyl-ýaşylymtyl ýokundyly ak; döşi we böwürleri garamtyl zolakly.

никовыми насаждениями. Обитает в ущельях и на склонах гор и предгорий. Гнезда в апреле, полушаровидные, на деревьях. В кладке 3-5, чаще 4 яйца, бледно-голубого цвета с черными и серовато-лиловыми пятнышками, сосредоточенными на тупом конце. Размеры яиц – 16.6-18.1 x 12.9-13.5 мм. Птенцы – в мае. Две кладки в году. Питаются, преимущественно, семенами растений, а также насекомыми.

Статус: немногочисленный местами обычный вид, особенно во время пролета и кочевок. Может содержаться любителями птиц в качестве певчей птицы.

Полевые признаки: несколько мельче воробья. Клюв сравнительно тонкий, прямой, острый, сильно сдвоен с боков. Хвост выемчатый. **В оперении преобладают желто-зеленые цвета. У самца темя и горло черные.** Над глазом желтая полоса. Верх шеи и спина зеленовато-желтоватые. **Надхвостье желтое. Крылья буровато-черные с двумя желтыми поперечными полосами.** Бока головы желто-буроватые. Бока тела желтые, подхвостье бледно-желтое с черно-бурными пятнами. Вся нижняя сторона желтая, постепенно переходящая в беловатый оттенок. Самка окрашена более тускло. На горле и голове у нее нет черного цвета. Брюшная сторона и грудь белые с легким желтовато-зеленым налетом; на груди и боках темные полосы. Мо-

Ýaşlary mäkiýanyňa çalymdaş, ýöne has öçügsi reňkli. Çünki açyk goňur reňkli, ayaklary goňur. Adatça, kiçiräk süri bolup gezyär. Sesi batly – “tiili-tiili”. Horazynyň saýraýşy çalt “siwi-tiwi-kee” ses owazlaryna esaslanýan ýokary notadaky jikgildili. Ganaty – 65-75, guýrugy – 41-48.7, söbügi – 12.6-14.7, çünki – 8-10 mm, agramy – 11-15.2 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **ganatlaryndaky iki sany sary kese zolak bilen beýleki girriklerden tapawutlanýar. Bedeniniň böwürleri dik zolakly.** Horazynyň gara “tel-pejigi” bolýar.

Ýaýran ýerleri: Arealynda höwürtegeleýän bölegi – Ýewraziýanyň tokaý zolagy. Türkmenistanda – uçup geçende Hazar deňziniň kenaryndan Köpetdaga, Bathyza, Garabile we Amyderýanyň jülgesine çenli.

Ýaşaýşy: uçup geçýän we guşlaýan guş. Ýazky migrasiýasy mart-aprelde, güýzkisi – oktýabr-noýabrda. Agaç we gyrymsy agaç ösümlikli ýerlerde gezyär. Ösümlikleriň tohumlary, şeýle-de mör-möjekler bilen ýymitlenýär.

Statusy: uçup geçende hem az sanly görnüş. Höwesjeňler kapasada saklamak üçin saýrak guş hökmünde ulanylýarlar.

394. Kendir guşy – *Carduelis cannabina* – Коноплянка

Meýdan alamatlary: serçeden epeşli maýda. Çünki kiçiräk, pahna görnüşde. Guýrugy oýuk. **Maňlaýy we depesi gyzyly.** Ýeňsesi, kellesiniň

лодые похожи на самку, но окрашены более тускло. Клюв светло-бурого цвета, ноги бурые. Держатся, обычно, небольшими стайками. Голос – звонкое «тиили-тиии». Пение самца – быстрое щебетание на высоких нотах, основными в нем являются звуки «циви-тиви-кее». Крыло – 65-75, хвост – 41-48.7, цевка – 12.6-14.7, клюв – 8-10 мм, вес – 11-15.2 г.

Сходства – отличия: **в отличие от других вьюрков на крыле две поперечные желтоватые полосы.** Бока тела с продольными полосами. Самец имеет черную “шапочку”.

Распространение: гнездовая часть ареала – лесная зона Евразии. В Туркменистане – на пролете, встречается от побережья Каспия до Копетдага и долины Амударьи, в Бадхызе и Карабиле. Зимовки – в Южной Европе, Северо-Западной Африке, Юго-Западной Азии, Северо-Восточном Китае и Японии.

Образ жизни: пролетная и зимующая птица. Весенняя миграция – в марте-апреле, осенняя – в октябре-ноябре. Придерживается участков с древесной и кустарниковой растительностью. Питаются семенами растений, а также насекомыми.

Статус: немногочисленный вид даже на пролете. Используется любителями певчих птиц для клеточного содержания.

Полевые признаки: несколько мельче воробья. Клюв небольшой, конической формы. Хвост выемчатый. **Лоб и темя красные.** Затылок,

gapdallary we boýny goňurrak-çal. **Arkasy, eginleri we bili goňras-goňurrak.** Guýrugynyň üsti goýugonur, ýelekleri inli çuparrak-agymtyl jähekli. Bokurdagy goňurrak dik menekli ak. **Petekesi we döşi gyzyly, ýelekleri açyk jähekli.** Bedeniniň böwürleri açyk-goňur. Garny we guýruynyň aşagy agymtyl. Horazlary güýzki ýelek örtüginde umumy reňki boýunça mäkiýanyňa çalymdaş, olaryň reňkinde gyzyly reňki ýok, kellesiniň üsti garamtyl dik menekli çalymytyl-goňur. Arkasynyň reňki tutugrak goňur. Bedeniniň aşagy tarapy açyk reňkli. Ýaşlary mäkiýana çalymdaş, has solak reňkli. Çünki mawymtyl-goňur. Ayaklary goňur. Saýraýşy – sykylyklardan we jür-rüldilerden durýar. Sesi jykgyldyly sesler – “tk-tk-tk”. Jübüt we süri bolup gezyärler. Ganaty – 71.5-87.8, guýrugy – 47.7-61.2, söbügi – 14.6-17, çünki – 8-10.5 mm, agramy – 16-22 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **bedeniniň üstki tarapynyň goňras-goňur reňki bilen** beýleki griklerden tapawutlanýar. Guýrugynyň gyalaryndaky ýelekleri inli, çäkleri anyk bellenen ak jähekli. Goňras-gönur arkasy bilen dag ýa-da adaty çetçetiden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropa, guňdogara Sibiriň ortasyna, günorta Týanşan daglaryna çenli, Günorta-Günbatar Aziýa we Demirgazyk-Günbatar Afrika. Türkmenistanda – Uly Balkan, Köpetdag, Köýtendag we olaryň etekleri.

Ýaşaýşy: oturymly we göçürgonýan guş. Gyrymsy ösümlikli dag landşaftynynda, dag derýajyklarynyň boýlarynda ýaşaýar. Aprelde höwürtegeleýär. Höwürtesini okara-

бока головы и шея буровато-серые. **Спина, плечи и поясница каштаново-коричневые.** Надхвостье темно-бурое с широкими рыжеватобелыми окаймлениями перьев. Горло белое с буроватыми продольными пестринами. **Зоб и грудь красные,** со светлыми ободками перьев. Бока тела светло-коричневые. Брюшко и подхвостье беловатые. В осеннем оперении самец по общему тону похож на самку, у которой в окраске красного цвета нет, а верх головы серовато-бурый с темными продольными пестринами. Спина менее яркая, буроватая. Нижняя сторона тела светлее. Молодые похожи на самку, окраска более тусклая. Клюв голубоватобурый. Ноги бурые. Держатся парами и стайками. Пение состоит из свистов и трелей. Голос – щебечущие звуки «тк-тк-тк». Крыло – 71.5-87.8, хвост – 47.7-61.2, цевка – 14.6-17, клюв – 8-10.5 мм, вес – 16-22 г.

Сходства – отличия: от других вьюрков отличается **каштаново-коричневой окраской верхней стороны тела.** Перья по краям хвоста с широкими, резко отграниченными белыми каемками. В отличие от горной или обыкновенной чечетки спина каштаново-коричневая.

Распространение: Европа к востоку до средней Сибири, на юг до Тяньшаня, Юго-Западной Азии и Северо-Западной Африки. В Туркменистане – Большие Балханы, Копетдаг, Койтендаг и их предгорья.

Образ жизни: оседлая и кочующая птица. Обитает в горном ландшафте с зарослями кустарников, по

şekilli, adatça grymsylarda gurýar. 3-7, köplenç 5 sany mawymtyl-gyzylymtyl-goňur we garamtyl meneklije agymtyl-mawumtyl-yaşyl reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 19.2-13.5 mm. Maýda jüýjeleýär. Dürli ösümlikleriň tohumlary, ýazyna we tomsuna mör-möjekler bilen ýymitlenýär.

Statusy: az sanly, ýöne daglaryň we etekleriniň käbir ýerlerde adaty guş hasaplanýar.

395. Dag çetçetisi – *Carduelis flavirostris* – Горная чечетка

Meýdan alamatlary: serçeden biraz kiçi, guýrugy güýçli oýuk we ganatlary ýiti uçly. Çünki kiçiräk we ujy ýiti. **Kellesi, arkasy, bokurdagy we petekesi garamtyl dik zolakly agymtyl-goňurrak-çypar. Bili we guýrugynyň üsti gyzylymtyl-gülgüne reňkli,** ganatlarynyň ýelekleri we guýrugy ak jähekli goýy-goňur. **Döşi we böwürleri dik açyk-goňur menekli.** Garyn tarapy kirliräk-ak, bokurdagy we petekesi çyparrak öwüşginli. Guýrugynyň aşagy ak. **Çünki sary garamtyl uçly.** Aýaklary goňur. Mäkiýanlary we ýaşlary açyk we öçügsi, guýrugynyň üsti gülgüne reňksiz. Saýraýşy güýçli we birmeňzeş, jikgildili sesleriň toplumu. Sesi batly – “piii-ti-ti”. Uçan wagty ak ýaly bolup görünýär. Jubüt ýa-da süri bolup gezýärler. Ganaty – 70-82 mm, agramy – 15-20 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **umumy reňkinde bedeniniň üstki tarapynyň we böwürleriniň garamtyl menekli poslyrak-çypardygy bilen** beýleki girriklerden tapawutlanýar. **Guýrugynyň üsti gyzylymtyl-gülgüne reňkli.**

горным речкам. Гнездится в апреле. Гнездо чашевидное, устраивают обычно на кустарниках. В кладке 3-7, чаще 5 яиц, бледно-голубовато-зеленоватого цвета с фиолетовыми красно-бурыми и черноватыми пятнами. Размеры яиц – 19.2-13.5 мм. Птенцы – в мае. Питаются различными семенами растений, весной и летом насекомыми.

Статус: немногочисленная, но местами в горах и предгорьях может считаться обычной птицей.

Полевые признаки: несколько мельче воробья, с выемчатым хвостом и острыми крыльями. Клюв небольшой и острый. **Голова, спина, горло и зоб бледно-буровато-рыжеватые с темными продольными полосами.** Поясница и надхвостье красновато-розоватого цвета, перья крыльев и хвоста темно-бурые с белыми каемками. **На груди и боках продольные светло-буроватые пестрины.** Брюшная сторона грязно-белая с рыжеватым оттенком на горле и зобе. Подхвостье белое. **Клюв желтый с темным концом.** Ноги бурые. Самки и молодые несколько светлее и тусклее, розовый цвет надхвостья отсутствует. Во время полета кажется белой. Держится парами или стайками. Пение громкое и однообразное, с набором щебечущих звуков. Голос – звонкое «пiiiи-ти-ти». Крыло – 70-82 мм, вес – 15-20 г.

Сходства – отличия: в отличие от других вьюрков **общая окраска ржавчато-рыжая с темными пятнами на верхней стороне и боках тела. Надхвостье красно-розово-**

Guýrugynyň has uzynlygy, kellesinde gyzylymtyl “telpejiginiň” ýokdygy bilen adaty çetçetiden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: arealy güýçli bölünen – Skandinawiyanyň, Kawkazyň, Alynky we Orta Aziýanyň demirgazyk we günbatar daglyk raýonlary. Türkmenistanda – Köpetdag, Köýtendag.

Ýaşayşy: bizde gyşlaýan görnüş. Daglaryň ýokarky kemerleriniň daşlyk eňňitlerinde gabat gelýär.

Statusy: örän seýrek, gowşak öwrenilen guş.

396. Bellik: örän seýrek **adaty çetçetiniň – *Carduelis flammea*** tötänden uçup gelmegi mümkin, kendir gu-şyndan bokurdagynyň garadygy we arkasynyň goňurrak-çaldygy, dag çetçetisinden – açykgyzyl “telpejigi” bilen tapawutlanýar.

397. Ýolkaçy girrik – *Loxia curvirostra* – Клест-еловик

Meýdan alamatlary: serçe ululykda. Kellesi beýlekilere garanynda uly. Çünki egmek, gapdalyndan güýçli gysylan. **Üstki we aşaky çüňkleriniň uçlary atanaklaýyn ýapylýar.** Ganatlary örän uzyn we ýiti uçly, guýrugy gysga we güýçli oýuk. Horazlarynyň ýelek örtügininiň **umumy reňki goýy-gyzyl.** Arkasy kellesinden garamtylrak. Ganatlary we guýrugy goňur. Garnynyň gapdallary we guýrugynyň aşagy çal. Mäkiýanyň bedeniniň üstki tarapy tegmilli, depesi we guýrugynyň üsti yaşylymtyl-mämişi ýa-da sarymtyl-yaşyl ýokundyly. Garyn tarapy açyk-çal, döşi we böwürleri sary ýa-da sarymtyl-yaşyl ýokundyly. Ýaşlaryň ýelek örtügininiň umumy reňki sarymtyl-yaşyl ýokundyly kirliräk-ak. Çünki we aýaklary goňur. Sesi gaty

го цвета. В отличие от обыкновенной чечетки хвост более длинный, красной шапочки на голове нет.

Распространение: ареал сильно разобщен – горные районы севера и запада Скандинавии, Кавказа, Передней и Средней Азии. В Туркменистане – Копетдаг, Койтендаг.

Образ жизни: у нас может попадаться зимой на каменистых склонах верхнего пояса гор.

Статус: очень редкая, слабо изученная птица.

396. Примечание: зимой крайне редко, может залетать ***Carduelis flammea* – обыкновенная чечетка,** отличающаяся от коноплянки буровато-серой спиной, а от горной чечетки – ярко-красной “шапочкой”.

Полевые признаки: размером с воробья. Голова относительно большая. Клюв загнутый, сильно сдвоен с боков. **Концы надклювья и подклювья перекрещиваются.** Крылья довольно длинные и острые, хвост короткий и сильно выемчатый. У самцов общая окраска оперения темно-красная. Спина темнее головы. Крылья и хвост бурые. Брюшко по бокам и подхвостье серые. У самок верхняя сторона тела пятнистая с зеленовато-оранжевым или желтым налетом на темени и надхвостье. Брюшная сторона светло-серая с желтым или желто-зеленым налетом на груди и боках. У молодых основной фон оперения грязно-белый с желто-зеленым налетом. Клюв и ноги

– “klee-kle-kle”. Ganaty – 81-108, guýrugy – 47.3-66, söbügi – 15-20, çüňki – 12.8-21 mm, agramy – 30-57 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: umumy reňki boýunça adaty merjimege çalyndaş, ýöne sähelçe ulurak we **üstki we aşaky çüňkleriniň uçlary atanaklaýyn ýapylýar.**

Ýaýran ýerleri: höwürtegeleýän oblastlary dagynyk – tutuş Ýewropanyň, Demirgazyk-Günbatary Afrikanyň we Denirgazyk Amerikanyň düzlüklere we daglary, hemme ýerlerde pürli tokaýlar bilen baglanşykly. Türkmenistanda – Uly Balkanda, Köpetdagda.

Ýaşayşy: tötdänden uçup gelýän görnüş, höwürtegeleýän oblastyndan göçüp-gonýan döwründe pürli agaçlaryň hasylsyz ýyllary Türkmenistana aralaýar, göçýän wagty arçanyň we beýleki pürli agaçlaryň tohumlary bilen ýymitlenýär.

Statusy: seýrek, käbir ýyllarda aýry-aýry ýerlerde adaty guş.

398. Gyzylganat merjimek guşy – *Rhodopchys sanguineus* – Краснокрылый чечевичник

Meýdan alamatlary: serçeden biraz ulurak, çüňki ýognas, ýöne çişik däl, ganatlary uzyn we guýrugy sähelçe oýuk. **Maňlaýy, depesi we ýeňsesi gara.** Ýaňaklary goňurrag-gülgüne. **Bokurdagy, petekesi, döşi we bedeniniň gapdallary garamtyl menekli çyparrak-goňur.** Üstki tarapyň reňki goňur, garamtyl-goňur menekli we çyzykly. **Bili goňurrag-çyparrak, guýrugynyň üsti gülgüne reňki. Ganatlary inli gyzylymtyl-gülgüne zolakly.** Sesi sykylyk “Ti-liu...” we pessaýja jürkülde-me. Ganaty – 94-109, guýrugy – 54-61.7, söbügi – 19-21, çüňki – 10.4-12 mm.

бурые. Голос – звонкое «клее-кле-кле». Крыло – 81-108, хвост – 47.3-66, цевка – 15-20, клюв – 12.8-21 мм, вес – 30-57 г.

Сходства – отличия: общей окраской похож на обыкновенную чечевицу, но чуть крупнее и концы надклювья и подклювья перекрещиваются.

Распространение: области гнездования разобщены – равнины и горы всей Евразии, Северо-Западной Африки и Северной Америки, повсеместно связан с хвойными лесами. В Туркменистане – Большие Балханы, Копетдаг.

Образ жизни: залетный вид, появляется в Туркменистане из области гнездования в периоды кочевков в неурожайные годы хвойных, на кочевках питаются семенами арчи и других хвойных деревьев.

Статус: редкая, местами в отдельные годы обычная птица.

Полевые признаки: несколько крупнее воробья, с толстым, но не вздутым клювом, длинными крыльями и слегка выемчатым хвостом. **Лоб, темя и затылок черные.** Щеки буровато-розовые. **Горло, зоб, грудь и бока тела рыжеватобурые с темными пятнами.** Сверху окраска бурая с чернобурыми пятнами и штрихами. **Поясница буроваторыжеватая, надхвостье розовое. На крыле широкая полоса красно-розового цвета.** Голос – свист «Ти-лиу...» и негромкое чириканье. Крыло – 94-109, хвост – 54-61.7, цевка – 19-21, клюв – 10.4-12 мм.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: kellesi, edil ýaşyl tiltiliňki ýaly gara “tel-pejikli”. Guýrugynyň üsti, edil dag çetçetisiniňki ýaly gülgüne reňki. Kellesiniň has ulurakdygy, bedeniniň aşaky tarapynda gülgüne reňkiň ýokdygy bilen ýogynçüňk we mongol çöl pitpitilerinden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Demirgazyk-Günbatary Afrikanyň, Günorta Kawkazyň, Alyňky we Orta Aziýanyň, Gimalaý daglary. Türkmenistanda – Köpetdagda we Köýtendagda, Bathyzyň käbir ýerlerinde.

Ýaşayşy: oturmly, göçüp-gonýan guş. Daglaryň daşly eňňitleriniň seýrek ösümlikli, arçalykly ýerlerinde ýaşayar. Dürli ösümlikleriň tohumlary bilen ýymitlenýär.

Statusy: seýrek, çäkli ýaýrawly dag guşy.

399. *Bellik:* biziň günorta raýonlarymyz **mongol çöl pitpitisiniň – *Eremopsaltria mongolicus*** kate tötdänden uçup gelmegi mümkin, ol ýeňsesiniň goňurdygy, çüňkiniň açyk reňkli we ganatlarynyň agymtyl belliklidigi we ýogynçüňk çöl pitpitisinden, gyzylganat merjimekden bolsa, bedeniniň aşaky tarapyň gülgüne reňki bilen tapawutlanýar.

400. Ýogynçüňk çöl pitpiti – *Bucanetes githagineus* – Пустынный снегирь

Meýdan alamatlary: serçeden biraz kiçi. **Çüňki gysga we ýognas.** Guýrugy beýlekilere garanynda gysga, oýuk. Umumy reňki çalymtly-gülgüne. **Kellesi çal, ýöne horazlarynyň maňlaýy we çüňki, şeýle-de bedeniniň böwürleri we guýrugynyň üsti gyzylytgülgüne.** Ganatlary gülgüne zolakly

Сходства – отличия: на голове черная “шапочка”, как у самца чижа. Надхвостье розовое, как у горной чечетки. В отличие от пустынного и монгольского снегиря голова кажется более крупной, а на нижней стороне тела отсутствует розовый цвет.

Распространение: горы Северо-Западной Африки, Южного Кавказа, Передней и Средней Азии, Гималаи. В Туркменистане – Копетдаг и Койтендаг, может быть в Бадхызе.

Образ жизни: оседлая, кочующая птица. Обитает на каменистых горных склонах с разреженной растительностью, в арчевниках. Питаются семенами различных растений.

Статус: редкая горная птица, с ограниченным распространением.

399. *Примечание:* иногда к нам в юго-восточные районы может залетать **монгольский снегирь – *Eremopsaltria mongolicus***, который от пустынного снегиря отличается коричневым затылком, светлым клювом и беловатыми отметинами на крыле, а от краснокрылого чечевичника – розовым оттенком на нижней стороне тела.

Полевые признаки: несколько мельче воробья. **Клюв короткий и утолщенный.** Хвост сравнительно короткий, выемчатый. Общая окраска серовато-розовая. **Голова серая, но у самцов лоб и клюв, а также бока тела и надхвостье красно-розовые.** Крылья

goňur. Mäkiýanlaryň ýelek örtügi çäge pisint reňkli, döşi we guýrugynyň üsti ýukajyk gülgüne ýokundyly. Ýaşlary mäkiýanlaryna çalymdaş, ýöne has öçüksü reňkli. Çünki goňurrak-sary, aýaklary goňur. Sesi batly we arassa – “ke-ke-ke”. Ganaty – 78.5-96.4, guýrugy 46.5-58.3, söbügi – 17-18, çüňki – 7.6-10.7 mm, agramy – 18.3-22.1 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: horazlary gyzgylt çünki, gülgüne ganatlary (ak reňksiz), ýañaklarynyň çaldygy mongol çöl pitpitisinden we bedeniniň gapdallarynyň gülgünedigi – **gyzylganat merjimekden** tapawutlandyrýar.

Ýaýran ýerleri: Demirgazyk Afrika, Ýakyn Gündogar, Oňki Aziýa, Orta we Merkezi Aziýanyň günorta bölegi. Türkmenistanda – Hazarýaka raýonlaryň käbir ýerlerinde, Günbatar Uzboýda, Uly we Kiçi Balkan daglarynda, Köpetdagda (Kürendagda), Merkezi Garagumda, Üňüzde we Bathyzyň käbir ýerlerinde.

Ýaşayşy: höwürtegeýan, göçürgonýan guş. Süri bolup gezýär. Dag eteklerinde, dagyň ösümlige garyp bolan aşaky kemeriniň eňňitlerinde, gaýalyk ýerlerinde ýaşayar. Aprel-maýda höwürtegeýär, ýalpak we dykyz örülen höwürtesini, köplenç tekje köweklerde, gaýalaryň ýarçyklarynda, gyrymsylaryň goragynda ýa-da üsti telär ýaly bürenen ýerleriniň aşagynda gurýar. Ýylda iki gezek ýumurtgalayar. 3-5 sany gara mekikli agytyl-mawy reňkli ýumurtgalary goýýar. Maýda jüýjeleyär. Ösümlikleriň däneleri bilen iýmitlenýär.

Statusy: azanly, bölekleýin “ala” ýaýrawly, gowşak öwrenilen guş.

бурые с розовыми полосками. У самок оперение песочного цвета с легким розовым налетом на груди и надхвостье. Молодые похожи на самок, но более тусклые. Клюв буровато-желтый, ноги бурые. Голос – звонкое и чистое «кэ-кэ-кэ». Крыло – 78.5-96.4, хвост – 46.5-58.3, цевка – 17-18, клюв – 7.6-10.7 мм, вес 18.3-22.1 г.

Сходства – отличия: самцы отличаются от монгольского снегиря **красноватым клювом**, розоватыми (без белого) крыльями и серыми щеками и затылком, а от краснокрылого чечевичника – розоватыми боками тела.

Распространение: Северная Африка, Ближний Восток, Передняя, южные части Средней и Центральной Азии. В Туркменистане – местами в Прикаспийских районах, по Западному Узбою, в Больших и Малых Балханах, Копетдаге (Курендаге), по Унгузу в Центральных Каракумах, местами в Бадхызе.

Образ жизни: кочующая, гнездящаяся птица. Держатся в стайках. Обитают на участках предгорий, склонах нижнего пояса гор со скудной растительностью, на скалистых участках. Гнездо – в апреле-мае, представляет плоскую и плотную постройку, часто помещается в нише, трещине скал, под навесом или под защитой куста. В кладке 3-5 яиц бледно-голубого цвета с черными пятнами. Птенцы – в мае. Две кладки в году. Питаются семенами растений.

Статус: немногочисленный вид с неравномерным «пятнистым» распределением, изучен слабо.

401. Melemtil girrik – *Rhodopechus obsoletus* – Буланный вьюрок

Meýdan alamatlary: serçe ululykda. Çünki beýlekilere garanynda daýaw, horazlarynyňky mawy goşantly we mäkiýanlarynyňky açyk gara reňkli. Ýelek örtügininiň umumy reňki açyk-mele, **ganatlary inli gülgüne zolakly**. Guýrugy we ganatlary insiz dik ak zolakly gara. Guýrugynyň üsti çypar-çägepisint reňkli. Çünkiniň düýbi gara, aýaklary goňur. Sesi pessaýja sykylyklanma – “fink-fink-fink”. Saýraýşy örän çylşyrymly jikgildiler, sesli owazlaryň toplumu. Jübüt ýa-da süri bolup gezýärler. Ganaty – 80-91, guýrugy – 53-67.8, söbügi – 16.4-17.5, çüňki – 9.7-11.6 mm, agramy – 23.5-24.5 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **çünkiniň garadygy**, ganatlarynyň has garşylykly (gara-ak-gülgüne) reňklidigi we ýagty **ýelek örtügininiň umumy reňkiniň açyk-melemtildigi** bilen ýogynçüňk we mongol çöl pitpiterinden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýakyn Gündogar, Zakawkazýe, Alynky Aziýa we Orta Aziýanyň günorta bölegi. Türkmenistanda giňişleýin gabat gelyär, ýöne bölekleýin Hazarýakasynadan Garagum, Tejen, Murgap derýalaryna, Günorta-Gündogar Garaguma, Amyderýa, Köpetdaga, Bathyza we Garabile, Köýtendaga çenli duşýar.

Ýaşayşy: oturymly we göçürgonýan guş. Esasan, derýalaryň jülgelerinde, daglyklarda we oazislerde ýaşayar, agaç we gyrymsy agaçly ýerleri, çölde sazakyk ýerleri halaýar. Ýazyna, adatça jübüt, galan wagty süri bolup, ýerde gezýar, gyrymsylaryň, telegraf sütünleriniň simlerinde oturýar. Mart-aprelde höwürtegeýär.

Полевые признаки: размером с воробья. **Клюв** относительно массивный **черного цвета** с голубым отливом у самцов и светлый у самок. Общая окраска оперения светло-буланая. Хвост и крылья черные с узкими белыми продольными полосками, но с **широкой розовой полосой**. Надхвостье рыжеватопесочное. Ноги бурые. Голос – тихий посвист «финк-финк-финк». Пение – довольно сложное щебетание, набор громких трелей. Держатся парами или стайками. Крыло – 80-91, хвост – 53-67.8, цевка – 16.4-17.5, клюв – 9.7-11.6 мм, вес – 23.5-24.5 г.

Сходства – отличия: от пустынного и монгольского снегиря отличается **черным клювом**, более контрастными (черно-бело-розовыми) крыльями и яркой **светло-буланой общей окраской оперения**.

Распространение: Ближний Восток, Закавказье, Передняя и южные части Средней Азии. В Туркменистане встречается широко, но неравномерно – от Прикаспия до Каракумдарьи, Теджена, Мургаба, Юго-Восточных Каракумов, Амударьи, в Копетдаге, Бадхызе, Карабиле, Койтендаге.

Образ жизни: оседлая и кочующая птица. Обитает, в основном, в речных долинах, в горах и оазисах, предпочитает участки с древесно-кустарниковыми насаждениями, в пустыне – в саксаульниках. Весной обычно парами, в остальное время в стаях на земле, кустах, телеграфных проводах. Гнездятся в марте-апреле. Две кладки в году. Гнезда

Ýylda iki gezek ýumurtgalaýar. Höwürtesini agaçlaryň, ösgün gyrymsy agaçlaryň şahalanan ýerinde gurýar. 3-7, köplenç 5-6 sany garamtyl menekli açyk-mawy reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 14.0 x 19.1 mm. Maýda jüýjeleýär. Dürli ösümlikleriň tohumlary bilen iýmitlenýar, suw içmäge zygiderli gatnaýar.

Statusy: adaty, käbir ýerlerde köpsanly, bölekleyin ýaýrawly guş.

402. Adaty merjimek – *Carpodacus erythrinus* – Обыкновенная чечевица

Meýdan alamatlary: serçe ululykda. Horazlarynyň **kellesiniň üsti, bokurdagy, petekesi, döşi we guýrugynyň üsti gyzyl.** Arkasy gyzyl öwüşginli goňur. Bedeniniň garyn tarapy gülgüne öwüşginli çalymtyl, guýrugynyň aşagy ak. Mäkiýanlaryň üstki tarapy körek garamtyl menekli goňurrak-çal. Aşagy tarapy çyrap ýokundyly kirliräk-ak. Reňkinde gyzyl boýagy ýok. Ýaşlary mäkiýanlaryna çalymdaş, ýöne arkasy sarymtyl-çalymtyl-ýaşylymtyl öwüşginli. Çünki goňur, aýaklary açyk-goňur. Sesi owazly sykylyklaryň gaýtalanmalary – “çe-çe-wi-sa”. Ýekelikde we jübüt bolup gezýär. Ganaty – 78-90, guýrugy – 54.4-62.6, söbügi – 17.3-20, çünki 9-10.9 mm, agramy – 17.5-26 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň has uludygy, çünkiniň ýognasdygy, ganatlarynda, guýrugynda ak we bilinde gyzyl reňkiň ýokdugy bilen kendir guşyndan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Merkezi we Gündogar Ýewropada we Aziýada, demirgazyk çetlerinden, günorta we günorta-gündogar oblastlaryndan başga ýerlerinde höwürtegeleýär. Arealy sähra, ýarymçöllük we çöllük zo-

на деревьях или больших кустах, в развилках сучьев. В кладке 3-7, чаще 5-6 яиц, светло-голубого цвета с темными крапинами. Размеры яиц – 14 x 19.1 мм. Птенцы – в мае. Питаются растительными кормами – семенами различных растений, охотно посещают водопои.

Статус: обычная, местами многочисленная птица, с неравномерным распространением.

Полевые признаки: размером с воробья. У самцов **верх головы, горло, зоб, грудь и надхвостье красные.** Спина бурая с красным оттенком. Брюшная сторона тела сероватая с розовым оттенком, подхвостье белое. У самок верхняя сторона буровато-серая с расплывчатыми темными пестринами. Нижняя сторона грязно-белая с рыжеватым налетом. Красного цвета в окраске нет. Молодые похожи на самок, но спина с желто-серо-зеленоватым оттенком. Клюв бурый, ноги светло-бурые. Голос – повторение мелодичного свиста «че-че-ви-ца». Держатся одиночно и парами. Крыло – 78-90, хвост – 54.3-62.6, цевка – 17.3-20, клюв – 9-10.9 мм, вес 17.5-26 г.

Сходства – отличия: от коноплянки отличается более крупными размерами, утолщенным клювом, отсутствием белого на крыле и хвосте и красным пятном на пояснице.

Распространение: гнездится в Центральной и Восточной Европе

nalar arkaly demirgazyk we günorta bölege bölünýär. Günorta böleginde, şol sanda Türkmenistanda daglyk ýerlerde höwürtegeleýär, uçup geçýan ýerleri düzlükler Alyňky Aziýada, Hindistanda we Hindihytaý guşlary.

Ýaşyşy: uçup geçýan we käýarym höwürtegeleýän guş. Ýazky migrasiýasy aprel-maýda we güýzkisi awgust-oktyabrda. Oazislardäki baglyk ýerlerde, derýalaryň jülgelelerinde we daglaryň derelerinde, çöllüklerde; uçup geçende gyrymsylyklarda, suw ýataklarynyň golaýynda gabat gelyär. Okara görnüşli höwürtesini gyrymsylarda we agaçlaryň üstünde gurýar. 3-6 sany goňur meneklije ýaşylymtyl-mawy reňkli ýumurtgalary goýýar. Ösümlikleriň tohumlary, miweleri, şeýle-de mörmöjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: azsanly, käbir ýerlerde uçup geçende adaty görnüş.

403. Arça merjimegi – *Carpodacus rhodochlamys* – Арчевая чечевица

Meýdan alamatlary: serçeden sähelçe uly. Çünki konus görnüşli. Üstki çünkiniň gerşi has ýasy we tegelenen. Guýrugy oýuk. **Gözüniň üsti zolakly, kellesiniň gapdallary we bokurdagy kümüşleç-gülgüne. Kellesiniň üsti goňurrak-gülgüne. Arkasy garamtyl çyzykly we tegmilli goňurrak-gülgüne.** Bili we guýrugynyň üsti gülgüne reňkli. Ganatlarynyň we guýrugynyň ýelekleri gülgüne bilen jäheklenen goňur. Döşi, garyn tarapy we bedeniniň gapdallary goýu-gülgüne. Mäkiýanyň üsti garamtyl menekli goňurrak-çal. Gözüniň üsti çala saýgardýan ýagty zolakly. Garyn

и Азии, за исключением крайних северных, южных и юго-восточных областей. Ареал разобщен зонами степей, полупустынь и пустынь на северную и южную половины. В южной половине, в том числе, и в Туркменистане, гнездится в горных районах, равнины являются областями пролета. Зимуют в Передней Азии, в Индии и Индокитае.

Образ жизни: пролетная и возможно гнездящаяся птица. Весенняя миграция – в апреле-мае, осенняя – в августе-сентябре. Встречается в садах оазисов, речных и горных долинах, в пустыне; на пролете среди кустарников, вблизи воды. Гнездо чашевидное, на кустарниках и деревьях. В кладке 3-6 яиц зеленовато-голубого цвета с бурыми пятнами. Питаются семенами растений, ягодами, а также насекомыми.

Статус: немногочисленный, местами на пролете обычный вид.

Полевые признаки: несколько крупнее воробья. Клюв конической формы. Надклювье сверху сильно уплощено и закруглено. Хвост выемчатый. **Полоса над глазом, бока головы и горло серебристо-розовые. Верх головы буровато-розовый. Спина буровато-розовая с темными штрихами и пятнами.** Поясница и надхвостье розового цвета. Перья крыльев и хвоста бурые, с розовыми каемками. Грудь, брюшная сторона и бока тела темно-розовые. Самка сверху буровато-серая с темными пестринками. Над глазом слегка заметная светлая полоска. Брюшная сторона

tarapy garamtyl dik meneklenen çyparrak-ak. Ýaşlary mäkiýanlardan arkasynyň we ganatlarynyň ýelekleriniň has çypar jäheklenendigi bilen tapawutlanýar. Ýelek örtüginde gülgüne reňki bolmaýar. Aýaklary açyk-goňur. Sesi pert – “ççižžž” ýa-da “ççueeý”. Ganaty – 84-95 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: gözüniň üstündäki zolak, kellesiniň gapdallarynyň we bokurdagynyň kümüşleç ýalpyldyly gülgünedigi bilen beýleki girriklerden tapawutlanýar. Çünkiniň uzyndygy we guýrugynyň has gysgadygy adaty merjimekden tapawutlandyrýar.

Ýaýran ýerleri: Alynky Aziýanyň günbatar we Orta Aziýanyň günorta etraplary. Türkmenistanda – diňe Köýtendagda.

Ýaşaýşy: höwürtegeleýän we oturymly dag guşy bolmagy ahmal. Arçalyk zolakda ýaşaýar. Ösümlikleriň dänelerini we muwelerini iýýär.

Statusy: az sanly görnüş, Köýtendag döwlet goraghanasynyň iň täsin wekilleriniň biri.

404, 405. Bellik: Hazar deňzinde (2011 we 2012 ýý.) – Soýmonow aýlagynyň kenarynda ilkinji gezek tötänden uçup gelen **uzyngúruk pitpiti – *Uragus sibiricus*** bellendi. Bu guşyň bedeniniň ölçegleri serçeden kiçiräk, reňkinde gülgüne, kümüşsow we açyk-goňur, ganatlarynda ak öwüşginler artykmaçlyk edýär. Bizdäki duşýan girriklerden böwürleriniň ak zolaklarynda uzyn guýrugynyň gara-goňurdygy bilen tapawutlanýar.

Sowuk bolan ýyllarda Türkmenistanda örän seýrek, serçe ululykdaky **adaty pitpiti – *Pyrrhula pyrrhula*** tötänden uçup gelyär.

рыжевато-белая с темными продолжными пестринками. Молодые отличаются от самок более рыжеватыми каемками на перьях спины и крыльев. Розового цвета в окраске оперения нет. Ноги светло-бурые. Голос – резкое «ччижжж» или «ччуээй». Крыло – 84-95 мм.

Сходства – отличия: в отличие от других вьюрков полоса над глазом, бока головы и горло розовые с серебристым отблеском. От обыкновенной чечевицы отличается удлиненным клювом и более коротким хвостом.

Распространение: западные районы Передней Азии и южные Средней Азии. В Туркменистане – только Койтендаг.

Образ жизни: гнездящаяся и, вероятно, оседлая горная птица. Обитает в арчевой зоне. Питается семенами и ягодами.

Статус: немногочисленный вид, один из наиболее интересных представителей Койтендагского заповедника.

404, 405. Примечание: недавно (2011 и 2012 гг.) на Каспии - на берегу бухты Соймонова впервые отмечен залет и зимовка **длиннохвостых снегирей – *Uragus sibiricus***. Размером тела птичка эта меньше воробья, в окраске преобладают розовые, серебристые и светло-бурые, на крыльях белые тона. От всех наших вьюрковых хорошо отличается длинным черно-бурым хвостом с белыми полосками по бокам.

Крайне редко на территорию Туркменистана в холодное время года может залетать **снегирь – *Pyrrhula pyrrhula*** – птица контраст-

Horazy ýañaklarynyň we döşüniň açyk-gyzyl reňki; mäkiýany-şol reňkiň çalymtyl-gülgüne reňke çalşandygy bilen anyk tapawutlanýar. Olaryň ikisiniň hem ganatlary gara (gysga ak zolakly), guýrugy we arkasy çal, guýrugynyň üsti ak.

406. Paltatumşyk – *Coccothraustes coccothraustes* – Обыкновенный дубонос

Meýdan alamatlary: sar ölçeginde, **çünki örän ýogyn we deşli**, guýrugy oýuk, gysga. **Kellesi melemtil-goňur, çünkiniň töwergü zolakly, bokurdagy, ganatlary we guýrugy gara.** Eginleri inli ak zolakly. Arkasy goňras, boýny we bili çal, guýrugynyň üsti goňurak-çypar. Bedeniniň aşagy gülgüne-çal. Çünki tomsuna mawumtyrak çal, guşyna – ten reňkinde. Aýaklary goňurak-gülgüne, gözi çalymtyl ýa-da goňurak-ak. Sesi batly – “sik-sik” ýa-da “si-si”. Saýraýşy – şowhunly sesleriň toplumu. Ganaty – 95-108.2, guýrugy – 52.9-21.7, söbügi – 21-23.5, çünki – 16.4-21.7 mm, agramy – 42-57 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: beden gurluşy ykjam, kellesi uly, guýrugy gysga we çünki pahna görnüşli bolany üçin aňsat tanalýar. Guýrugynyň gysga we ujynyň ak bolmagy bilen arça paltatumşykdan tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewraziýanyň ýasyýaprakly we gatyşyk tokaýly zolaklarynda höwürtegeleýär. Türkmenistanda – Uly Balkan, Köpetdag Köýtendag. Günorta Ýewropada, Kiçi we Alynky Aziýada, Ýakyn Gündogar-da gyslaýar.

Ýaşaýşy: tötänden uçup gelyän we göçüp-gonýan guş, daglarda höwürte-

ной окраски, размером с воробья. Самец безошибочно узнается по ярко-красным щекам и груди; у самки же этот цвет заменен серо-розовым цветом. У тех и других - черные крылья (с белой кроткой полосой), хвост и спина серые, надхвостье белое.

Полевые признаки: размером со скворца, **с очень толстым и массивным клювом**, коротким выемчатым хвостом. **Голова буро-коричневая, полоса вокруг клюва и горло черные.** На плечах широкая белая полоса. Спина каштановая, шея и поясница серые, надхвостье буро-рыжее. Низ тела розово-серый. Клюв летом серый с голубишной, зимой телесного цвета. Ноги буровато-розовые, глаза сероватые или коричневатые-белые. Голос – громкое «цик-цик» или «ци-ци». Песня – набор трескучих звуков. Крыло – 95-108.2, хвост – 52.9-21.7, цевка – 21-23.5, клюв – 16.4-21.7 мм, вес – 42-57 г.

Сходства – отличия: легко узнается по компактному телосложению, большой голове, короткому хвосту и массивному коническому клюву. В отличие от арчевого дубоноса хвост короткий, на конце светлый.

Распространение: гнездится в зонах широколиственных и смешанных лесов Евразии. В Туркменистане – Большие Балханы, Копетдаг, Койтендаг. Зимой – в Южной Европе, Малой и Передней Азии, на Ближнем Востоке.

Образ жизни: залетная и кочу-

gelemegi hem mümkin. Tötänden uçup gelen wagty daglaryň derele- rinde, deňizýakalarda, oazislarda duş gelyär. Tekiz, aralary ýasy, aňyrsy gör- nüp, duran höwürtgесini agaçlaryň juda gizlin ýerlerinde ýerleşdirýär. 3-7, köplenç 4-5 sany garamtyl-goňur we çal menekli agymtyl-ýaşylymtyl ýa- da sarymtyl-çal reňkli ýumurtgalary goýýar. Ösümlik iýýär, jüýjelerini mör- möjekler bilen iýmitlendirýär.

Statusy: seýrek, bizde gowşak öwrenilen görnüş.

407. Arça paltatumşugy – *Mycerobas carnipis* – Арчевый дубонос

Meýdan alamatlary: sardan biraz ulurak, **deşli, uýy diş ýaly, örän küti çüňkli. Horazynyň kellesi, boýny, arkasynyň öňki bölegi, petekesi we döşi tutuk-gara.** Bili, guýrugynyň üsti, bedeniniň garyn tarapy we guýrugynyň aşagy ýaşylymtyl-sary. Ganatlary we guýrugy gara. **Ganatlary ak “aýnajykly”.** Mäkiýany we ýaşlary solak reňkli we olarda gara derek – çal reňk. Çüňki çalymtyl-gara, aýaklary goňur. Sesi gagyldyly we gyjyrdyly gykylyk – “tiu-deryk”. Ganaty – 110-130, guýrugy – 90-107, söbügi – 24-27, çüňki 18-24 mm, ag- ramy – 55.5-62 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: göw- resiniň ulydygy, guýrugynyň uzyn- dygy we ujynyň ak dældigi bilen pal- tatumşykdan tapawutlanýar. Üstki çüňkiniň uýy diş ýaly öňe çykýar.

Ýaýran ýerleri: Alynky we Orta Aziýanyň, Gimalaý, Gündogar Tibetde-daglyk oblastlary. Türkme- nistanda – Uly Balkan, Köpetdag, Köýtendag.

Ýaşaýşy: oturymly guş. Daglaryň

ующая птица, возможно гнездящая- ся в наших горах. На залетах может быть встречен в горных долинах, приморских районах, предгорьях, оазисах. Гнездо – плоская, просве- чивающая постройка, помещается на деревьях довольно скрытно. В кладке 3-7, чаще 4-5 яиц, бледно- зеленоватого или желтовато-серо- го цвета с черно-бурыми и серыми пятнами. Питаются растительным кормом, птенцов кормят насеко- мыми.

Статус: редкий, слабоизучен- ный у нас вид.

Полевые признаки: несколько крупнее скворца, с **массивным, очень толстым клювом. У самца голова, шея, передняя часть спи- ны, зоб и грудь матово-черные.** Поясница, надхвостье, брюшная сторона тела и подхвостье зелено- вато-желтые. Крылья и хвост чер- ные. **На крыле белое «зеркаль- це».** Самка и молодые окрашены бледней и у них вместо черного цвета – серый. Клюв серовато-чер- ный, ноги бурые. Голос – карка- ющий и скрипящий крик «тиу-де- рык». На земле держатся редко, обычно, когда пьют. Крыло – 110- 130, хвост – 90-107, цевка – 24-27, клюв 18-24 мм, вес – 55.5-62 г.

Сходства-отличия: в отличие от обыкновенного дубоноса крупнее, хвост удлиненный и без белого на конце. Край надклювья с выступаю- щим зубцом.

Распространение: горные об- ласти Передней и Средней Азии, Гималаи, Восточный Тибет. В Турк- менистане – Большие Балханы, Ко-

ýokarky kemerindäki arçalykda ýaşaýar. Höwürtgесini ýumşak, adat- ça, arça agajynyň üstünde gurýar. Aprel-maýda höwürtgеleýär. Ýylda iki gezek ýumyrtgалаýar. 3-5 sany melewşe-gonur çyzykly we çalymtyl- goňur menekli düşegi agymtyl reňkli ýumurtgalary goýýar. Iýunda jüýjeleýär. Ösümlikleriň, köplenç arçanyň tohumyny, şeýle-de mör- möjekleri iýýär. Suwa mätäçlik çekýär.

Statusy: amatly ýaşaýuş şertli ýerlerde adaty guş.

Süleçiler – *Emberizidae* – Овсянковые

Däne bilen iýmitlenýän maýda guşlar maşgalasy. Açyk meýdan giňişliklerinde ýa-da gyrymsyly we gamyşly jeňňeliklerde ýaşaýar. Çüňki orta ölçeglerde, konuş görnüşli, yöne onuň çowly ýa-da kütek uçly, gap- dallaryndan gysylan, deşli bolmagy mümkin. Üstki çüňkiniň aşaky gyrasy aşaklygyna sähelçe egri. Üstki we aşaky çüňkleriniň gyralary içine tar- rap güýçli basylan. Aşaky çüňkiniň üstki gyrasy ýokarky çüňkiniň aşaky gyrasy bilen doly galtaşmaýar, olaryň arasynda köplenç yş (ýarçyk) emele gelyär. Ganatlary dürli görnüşde we uzynlykda bolýar. Guýrugy orta öl- çeglerde, adatça oýuk. Görnüşleriniň käbiriniň kellesi kiçiräk hüpükli. Ýelek örtügininiň reňkine zolaklar we dik me- nekler, jüýjeleriň bolsa, bedeniniň garyn tarapyna dik çyzyklar häsiýetli. Jynsy we ýaş tapawut aýratynlyklary bolýar. Daryçylaryň aglabasy örän birmeňzeş owazda saýraýar. Hö- würtgeleri okaraşekilli, gyrymsylar- da ýa-da ýerde, käte ýarçyklarda

петдаг, Койтендаг.

Образ жизни: оседлая птица. Обитает в арчевниках в верхнем поясе гор. Гнездо – рыхлая по- стройка, располагается, как прави- ло, на арче. Гнездится – в апреле- мае. Возможно две кладки в году. В кладке 3-5 яиц, беловатого основ- ного тона, с лилово-коричневыми штрихами и серовато-бурыми пят- нами. Птенцы – в июне. Питаются семенами растений, преимуще- ственно, арчи, а также насекомы- ми. Нуждается в водопое.

Статус: в подходящих место- обитаниях обычная птица.

Семейство мелких зернояд- ных птиц. Обитают в открытых ландшафтах или среди зарослей кустарников и камышей. Клюв средних размеров, конический, но может быть острым или тупым, сжатым с боков, массивным. Ниж- ний край надклювья слегка изогнут вниз. Край надклювья и подклювья сильно вдавлены внутрь. Нижний край подклювья не соприкасается полностью с верхним краем над- клювья, между ними нередко обра- зуется просвет. Крылья различной формы и длины. Хвост средних раз- меров, обычно выемчатый. У не- которых видов на голове неболь- шой хохол. В окраске оперения характерны полосы и продольные пятна. Для птенцов – продольные штрихи на брюшной стороне тела. Половые и возрастные различия имеются. Большинство овсянок поют очень однообразно. Гнез- да чашевидные, в кустах или на земле, иногда в щелях или под ка-

ýa-da haýsy-da bolsa buky ýerlerde guryar. Köplenç ösümlikleriň däneleri we mör-möjekler bilen iýmitlenýär. Maşgalada 330-den gowrak görnüş, Amerikada, Ýewraziýada, Afrikada ýaýrandyr. Türkmenistanda – 15 görnüş.

408. Daryçy – *Malaria calandra* – Просянка

Meýdan alamatlary: serçeden azajyk ulurak, özgelere garanyňda gysga guýrukly we gelşikli beden gurluşly. Kellesi togalak. Çünki gapdallaryndan güýçli gysylan, beýik we üstki hem aşaky çüňkiniň arasy açyk. Horazlary mäkiýanlaryndan reňkleri boýunça tapawutlanmaýarlar. **Ýelek örtügiňiň umumy reňki dik garamtyl menekli goňurrak-sary. Bili goýu-goňur.** Ganatlary we guýrugy açyk gaýalan ýelekli goýu-goňur. Bedeniniň aşaky tarapy agymtyl, petekesi, döşi we böwri dik garamtyl menekli, bokurdagy garamtyl tegmillikli. Bedeniniň gapdallary çyparrak-çalymtyl-goňurrak. Çünki goňur, aýaklary açyk-goňur. Ýaşlary ulularyna meňzeş, ýöne umumy reňki has garamtylrak. Sesi özboluşly jyzzyldama. Saýraýşy gysga we birlabyzly jyzzyldama. Çagyryşy bölünp-bölünip çykýan, paltatumşugyňka çalymdaş batly sesler. Ýekelikde, jübüt we süri bolup gezyýarlar. Ganarty – 86.5-105, guýrugy – 61.5-80, söbügi – 23-26.5, çüňki 10.7-14.5 mm.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: göwresiniň uludygy, **umumy reňkiniň görksüz, ýagty öwüşginsiz, çalymtyl-goňurdygy** bilen beýleki süleçilerden tapawutlanýar. **Guýruk ýeleklere ak reňksiz.**

Ýaýran ýerleri: Günbatar, Günorta we Günorta-Gündogar Ýewropada,

ким-нибудь укрытием. Питаются преимущественно, семенами и насекомыми. В семействе более 300 видов, распространены в Америке, Евразии, Африке. В Туркменистане – 15 видов.

Полевые признаки: несколько крупнее воробья, компактного телосложения с относительно коротким хвостом. Голова округлой формы. Клюв высокий, сильно сдвинутый с боков и с характерной щелью между надклювьем и подклювьем. Самцы и самки по окраске не различаются. **Общий цвет оперения буровато-желтый с темными продольными пестринами. Поясница темно-бурая.** Крылья и хвост темно-бурый со светлыми каймами перьев. Нижняя сторона тела беловатая, с темными продольными пестринами на зобе, груди, боках и темными крапинами на горле. Бока тела рыжеватосеробуроватые. Клюв бурый, ноги светло-бурый. Молодые сходны со взрослыми, но общий тон окраски более темный. Голос – своеобразное циканье. Песня – короткая и однообразная трель. Позывка отрывистая, звонкая, похожа на дубоноса. Держится одиночно, парами и стайками. Крыло – 86.5-105, хвост – 61.5-80, цевка – 23-26.5, клюв – 10.7-14.5 мм.

Сходства – отличия: от других овсянок отличаются более крупными размерами, **окраска в целом невзрачная, серовато-бурая, без ярких тонов. В оперении хвоста отсутствует белый цвет.**

Demirgazyk Afrikanyň çetki raýonlary, Kіçi, Alynky we Merkezi Aziýa. Türkmenistanda – Uly Balkan, Köpetdag we olaryň etekleri, Tejen, Murgap, Amyderýanyň jülgeleri, Bathyz we Köýtendag.

Ýaşayşy: oturymly guş. Düzlüklerde oazislerde dag sähra ýerlerinde ýaşayar. Aprelde höwürtegeleýär. Höwürtesini köplenç ýerde, seýrek gyrymsyda guryar. 5-6 sany gülgüne öwüşginli, goňur menekli we buýraly çalymtyl-ak ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 17-23 x 18-24 mm. Maýda juýjeleýär. Esasan, ýabany we medeni ösümlikleriň däneleri, tohumlary, şeýle-de mör-möjekler we ownuk oňurgasyzlar bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde adaty guş.

409. Akdepeli süleçi – *Emberiza leucocephala* – Белошапочная овсянка

Meýdan alamatlary: serçe ululykda. Çünki kiçiräk, goňur reňkli. Guýrugy oýuk. Horazynyň ýaňagy ak we goňras-goňur, kellesi ak “telpekjikli”, **depesiniň gapdallary gara zolakly.** Arkasy goňurrak-gara menekli melemtil-goňur. **Bili açyk çypar reňkli.** Ganatlarynyň we guýrugynyň ýeleklere ýagty gaýalan goňur, guýrundaky uly ak tegmiller onuň ýeleklereňiň has köp bölegini düzýär. **Döşi, bedeniniň gapdallary we garnynyň ýokarky bölegi çyparrak-goňras,** garyn tarapyň galan bölegi çalymtyl-ak. Aýaklary goňur. Mäkiýany horazyna meňzeş, ýöne kellesindäki ak reňk az we inli hem-de ýygy-ýygy gara menekleri

Распространение: Западная, Южная и Юго-Восточная Европа, крайние районы Северной Африки, Малая, Передняя и Средняя Азия. В Туркменистане – Большие Балханы, Копетдаг и его предгорья, долины Теджена, Мургаба, Амударьи, Бадхыз и, возможно, Койтандаг.

Образ жизни: оседлая птица. Обитает на равнинах, в оазисах на полях, в горах на степеподобных участках. Гнездится в апреле. Гнездо располагается чаще на земле, редко на кустах. Две кладки в году. В кладке 5-6 яиц серовато-белого цвета с розовым оттенком и бурными пятнами и завитками. Размеры яиц – 17-23 x 18-24 мм. Птенцы – в мае. Питаются, преимущественно, семенами и побегами диких и культурных растений, а также насекомыми и мелкими беспозвоночными.

Статус: немногочисленная, местами обычная птица.

bolýar. Arkasynyň reňki öçügsi. Bokurdagy kirliräk öwüşginde goňras reňkli. Ýaşlary mäkiýanlaryna çalyndaş, ýöne ýelekleriniň reňki öçügsi, kellesindäki we petekesindäki ak reňkler çala bildirýär. Garyn tarapy kirliräk-ak. Sesi pessaýja –“sik-sik”. Saýraýşy – “dzin-zin-tiii”. Adatça süri bolup gezyär. Ganaty – 57-66 mm, agramy – 20-30 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: kellesindäki ak “telpejigi” bilen beýleki süleçilerden tapawutlanýar. **Ýelek örtügininiň umumy reňki goňur.** Bokurdagy we petekesiniň gapdallary goňras. Bedeniniň gapdaly uly dik menekli. Guýrugy ak goshundyly reňkli.

Ýaýran ýerleri: Aziýada höwürtlegeýän oblastlary – Uraldan Kolyma we Uzak Gündogara çenli, Merkezi Aziýa (Nanşan we Týanşan) çenli. Türkmenistanda – güýz-gyş döwründe, esasan derýa jülgelerinde we dag eteklerinde. Orta Aziýanyň günortasynda, Ýakyn Gündogarda, Gimalaý daglarynyň eteklerinde we Aziýanyň günorta-gündogar oblastlarynda gyşlaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän we gyşlaýan guş. Käte beýleki süleçiler bilen bileleikde gezyär. Ýabany ösümlikleriň tohumlary, seýrek mörmöjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: az sanly görnüş.

410. Adaty süleçi – *Emberiza citrinella* – Обыкновенная овсянка

Meýdan alamatlary: serçe ölçegli, ýöne göwresi has uzalan. Horazynyň kelleli, bokurdagy we döşi sary, arkasy garamtyl bellikli goňurak-çyparrak reňkli. **Bili goňurak-çypar.** Ganatlary we guýrugy goýu-goňur, ýelekleri çalymtyl-ýaşylymtyl gaýalan. Çünki we aýaklary goňur. Mäkiýany ho-

на голове белого цвета меньше и черные пестринки шире и чаще. Окраска спины тусклая. Горло каштанового цвета с грязноватым оттенком. Молодые похожи на самок, но окраска оперения тусклее, белый цвет на голове и зобе едва заметен. Брюшная сторона грязно-белая. Голос – негромкое «цик-цик». Песня – «дзинь-зинь-тиии». Держатся обычно стаями. Крыло – 57-66 мм, вес 20-30 г.

Сходства-отличия: в отличие от других овсянок **на голове белая “шапочка”.** **Общая окраска оперения коричневая.** Хвост с примесью белого цвета.

Распространение: области гнездования в Азии – от Урала до Колымы и Дальнего Востока, Центральная Азия (до Наньшаня и Тяньшаня). В Туркменистане – в осенне-зимний период, в основном, по долинам рек и предгорьям. Зимуют на юге Средней Азии, Ближнем Востоке, в предгорьях Гималаев и юго-восточных областях Азии.

Образ жизни: пролетная и зимующая птица. Держатся иногда вместе с другими овсянками. Питаются семенами диких растений, реже насекомыми.

Статус: немногочисленный вид.

Полевые признаки: размером с воробья, но более удлиненной формы. Самец с желтой головой, горлом и грудью, спина коричневато-рыжеватая с темными отметинами. **Поясница коричнево-рыжая.** Крылья и хвост темно-коричневые с серо-зеленоватыми окаймления-

razyna çalyndaş, ýöne sary reňki has öçügsi we ýukajyk ýaşylymtyl öwüşginli. Ýaş guşlar mäkiýana çalyndaş, ýöne sary reňk biraz tutuk, döşündäki menekler goňurak-çal. Saýraýşy sesleriň gaýtalanmalary – “syn-zyn-syn-zyn” we dowamly “sziii” bilen gutarýar. Esasan, süri bolup gezyärler. Ganarty – 80-96, guýrugy – 64-82, söbügi – 18-20, çünki –8-11 mm, agramy – 26.5-40 g.

Meñzeşlikleri-tapawutlary: ölçegleriniň beýlekilere garanynda ulurakdygy, ýelek örtüginde, **áýratyn-da kellesinde sary reňkiň** agdyklyk edýändigini, biliniň goňurdygy bilen beýleki süleçilerden tapawutlanýar. Bedeniniň garyn tarapy akdepeli süleçiden we daryçydan tapawutlylykda sary.

Ýaýran ýerleri: Ýewropanyň we Kawkazyň hemme ýerleri diýen ýaly, gündogara Baýkal kölüne çenli. Türkmenistanda – güýz-gyş döwründe daglarda, dag eteklerinde we oazislarda. Ortaýer deňzinde, Demitgazyk-Günbatar Afrikada, Günorta-Günbatar we Günorta-Gündogar Aziýada gyşlaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän, käte seýrek gyşlaýan guş. Ýazki migrasiýasy martda, güýzkisi – oktyabr-noýabrda. Haşal otlaryň we medeni ösümlikleriň tohumlary, ýabany otjumak ösümlikleriň ýaşyl pudajyklary, seýregräk mörmöjekler bilen iýmitlenýär.

Statusy: uçup geçende seýrek, käbir ýerlerde az sanly görnüş.

411. Stýuartyň süleçisi – *Emberiza stewarti* – Овсянка Стюарта

Meýdan alamatlary: serçeden biraz kiçi. Horazynyň ýazyna kelle-si çalymtyl-gara gapma-garşy reňli. **bedeniniň üsti, ýañaklary we**

ми перьев. Клюв и ноги бурые. Самка похожа на самца, но желтый цвет выражен более тускло и имеет легкий зеленоватый оттенок. Молодые птицы похожи на взрослых самок, но желтый цвет менее яркий, пестринки на груди коричневатосерые. Песня – повторяющиеся звуки «цын-зын-цын-зын», заканчивается протяжным «цжиии». Держатся, в основном, стайками. Крыло – 80-96, хвост – 64-82, цевка – 18-20, клюв – 8-11 мм, вес – 26.5-40 г.

Сходства – отличия: в отличие от других овсянок сравнительно крупные размеры, в окраске оперения преобладают **желтые цвета, особенно, на голове,** а поясница коричневая. В отличие от белошапочной овсянки и просянки брюшная сторона тела желтая.

Распространение: почти вся Европа и Кавказ, на восток до Байкала. В Туркменистане – в осенне-зимнее время в горах, предгорьях и оазисах. Зимовки – в Средиземноморье, Северо-Западной Африке, Юго-Западной и Юго-Восточной Азии.

Образ жизни: пролетная, изредка зимующая птица. Весенняя миграция в марте, осенняя – в октябре-ноябре. Питаются семенами сорняков и культурных растений, зелеными побегами дикорастущих трав, реже насекомыми.

Статус: на пролете редкий, местами немногочисленный вид.

Полевые признаки: несколько мельче воробья. Весной самец с контрастно окрашенной серо-черной головой, **верх головы, щеки и**

boýny çal. Gaşy, göziniň yzyndaky zolak we bokurdagy gara. Petekesi açyk-çal ýa-da ak. Döşi kese poslyrak-goňur zolakly. Arkasy we bedeniniň gapdallary garamtyl dik menekli poslyrak-goňur. Bili poslyrak-goňur. Güýzki ýelek örtüginde ýelekleriň inli ýagty gaýmalary kellesindäki çal we döşüni poslyrak-çypar reňk örtýär. Çünki goňur, aýaklary açyk-goňur. Mäkiýanlaryň we ýaşlaryň bedeniniň üsti goňurak-çalymtyl, aşagy garamtyl dik menekli çyparrak-agymtyl. Çünki açyk-goňur. Ýaş horazlar ululara çalymdaş, ýöne kellesi goňurak-çalymtyl-ýaşylymtyl. Bokurdagy gara, döşündäki insiz zolak goňras. Ýaş mäkiýanlar ululardan arkasynyň we bedeniniň garyn tarapyň çyparrak reňki bilen tapawutlanýar. Bili goňurak-çyparrak reňkli. Sesi pessaý – “sirk-sirk”. Höwürtegelemeýän döwüründe jübüt we süri bolup gezyär. Saýraýşy owazly saslerden durýar. Ganarty – 72-84, guýrugy – 64-75, söbügi – 17-19, çüňki – 9-10.2 mm, agramy – 15-19 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: kellesiniň üstüniň çaldygy we gapdallaryny gara zolagyň jähekleýändigini bilen beýleki süleçilerden tapawutlanýar. Petekesi açyk reňkli, bokurdagy gara, döşi kese poslyrak-goňur zolakly.

Ýaýran ýerleri: Alynky we Orta Aziýanyň, Günbatar Gimalaý daglary. Türkmenistanda – diňe Köýtendag.

Ýaşayşy: dag guşy, seýrek arçalyklarda höwürtegeleýär.

Statusy: seýrek, heniz öwrenilmedik görnüş, Köýtendag döwlet goraghanasynyň täsin wekilleriniň biri.

шея серые. Бровь, полоса за глазом, и горло черные. Зоб светло-серый или белый. На груди ржавчато-бурая поперечная полоса. Spina i boka tela ržavčato-burye s temnymi prodolnymi pjatnami. Pjajsnica ržavčato-ryžaja. V osenem operenii širokie svetlye okajmljenja per'jev prikrývajut seryj cvjet na golove i ržavčato-ryžij na gudi. Klyov buryj, nogi svetlo-burye. U samok i mladyx verh tela koričnevato-serovatyj, niz ryževato-belovatyj s temnymi prodolnymi pestrinami. Klyov svetlo-buryj. Mladye samcy poxoži na vzroslyx, tolko golova burvato-sero-zelenovataja. Gorlo černoje, na gudi kaštjanovaja polosa uzkaja. Mladye samki otličajut'sja ot vzroslyx ryževatym cvjetom spiny i bryšnoj storony tela. Pjajsnica burvato-ryževataja. Golos – negromkoje «cirk-cirk». V negnezdozovoje vrema deržiťsja parami i stajkami. Pesnja – zvonkaja trjel'. Krylo – 72-84, xvost – 64-75, cevka – 17-19, klyov – 9-10.2 mm, ves – 15-19 g.

Сходства-отличия: в отличие от других овсянок верх головы серый, окаймленный по бокам черной полосой. Зоб светлый, горло черное, на груди ржавчато-бурая поперечная полоса.

Распространение: в горах Передней и Средней Азии, Западные Гималаи. В Туркменистане – только Койтендаг.

Образ жизни: горная птица, гнездится в арчевом редколесье.

Статус: редкий, почти неизученный вид, один из наиболее интересных представителей Койтендагского заповедника.

412. Dag süleçisi – *Emberiza cia* – Горная овсянка

Meydan alamatlary: serçe-den sahelçe ulurak ganatlary we guýrugy özgelere görä uzyn. Üstki çüňkdäky egmek gysygy anyk saýlanýar. **Kellesiniň üsti çal, gapdallary bolsa, inli gara zolakly. Gözüniň yzy we bokurdagynyň gapdallary gara zolakly. Bokurdagy, petekesi we döşüniň ýokarky bölegi çal.** Arkasy inli gara menekli poslurak-gorňur. Bili poslurak-çypar. Ganatynyň we guýrugynyň yelekleri ak nagyşly goňurak-gara. Guýrugynyň çetki yelekleri ak uçly. **Garny we guýrugynyň aşagy poslyrak-çypar reňkli.** Ýelekleri güýzine çalymtyk inli jäheklenen. Çünki goýy-goňur, aýaklary – açyk-goňur. Mäkiýany horazyna meňzeş, ýöne sähelçe tutugsy we agymtyl. Kellesiniň gapdallaryndaky gara zolaklar anyk tapawutlanmaýar. Ýaşlary mäkiýanlara çalymdaş, ýöne agymtyl we tutuk, kellesiniň gapdallarynda gara we ak zolaklar ýok ýa-da olar açyk-goňur reňkli. Çagyryş sesi inçe jyzzyldama. Saýraýşy gysga jikgildeme. Süri bolup gezyär. Ganaty – 70-94, guýrugy – 73-90, söbügi – 18-22, çüňki – 9-12 mm, agramy – 20-29.9 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: **kellesiniň gapdallarynyň gara zolaklydygy** bilen beýleki süleçilerden tapawutlanýar. Depesiniň ortasy bir reňkli, çal. Ölçeginiň ulurakdygy, reňkiniň has açykdygy bilen gaýry süleçiden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Günorta Ýewropa, Demirgazyk-Günbatar Afrika, Kiçi, Alynky, Orta we Merkezi Azianyň daglyk etraplary, Gunorta Gimalaý daglary. Türkmenistanyň daglyk

Полевые признаки: несколько крупнее воробья с относительно длинными крыльями и хвостом. Излом на надклювье хорошо выражен. **У самца верх головы серый, с широкими черными полосами по бокам головы. Полоса за глазом и по бокам горла черные. Горло, зоб и верхняя часть груди серые.** Spina ržavčato-buraja s černymi širokimi pestrinami. Pjajsnica ržavčato-ryžaja. Krylja i xvost burvato-černoje s belymi okajmljenjami per'jev. Krajnije per'ryja xvosta s belymi koncaami. **Брюхо и подхвостье ржаво-рыжего цвета.** Osenju per'ja s širokimi serovatyimi okajmljenjami. Klyov temno-buryj, nogi svetlo-burye. Samka srodna s samcom, no nemnogo tusklee i blednee. Černoje poliski po bokam golovy rezko vydelyajut'sja. Mladye poxoži na samok, no blednee i tusklee, černyx i belyx polos po bokam golovy net ili oni svetlo-burogo cvjeta. Pozyvka – tonkoje cikan'je. Pesnja – kortkoje šebetanie. Deržiťsja stajkami. Krylo – 70-94, xvost – 73-90, cevka – 18-22, klyov – 9-12 mm, ves – 20-29.5 g.

Сходства – отличия: в отличие от других овсянок **по бокам головы продольные черные полосы.** Seređina temeni odnocvetnaja, seraja. V otličije ot skal'noj ovjan'ki okraska bolee jarkaja, razmerom крупнее.

Распространение: Южная Европа, Северо-Западная Африка, горные районы Малой, Передней, Средней и Центральной Азии, Юж-

ýerlerinde Uly we Kiçi Balkan, Köpetdag, Gunbatar Bathyz, Garabil hemde Köýtendagda.

Ýasaýşy: oturymly, dikligine göçüp-gonma hereketlerini geçirýän guş. Daglaryň arçalyk zolagyndaky eňňitlerde we derelerde ýaşaýar. Aprelde höwürtegeleýär. Ýylda iki gezek ýumurtga goýýan bolmagy mümkin. Adatça höwürtegesi ýerde, 4-5 sany melewşe-çal we garamtyl-goňur menekli çalymtyl-ak ýumurtgalary goýýar. Maý-iyunyň üçünji ongünlüginde jüýjeleýär. Ýabany we medeni ösümlikleriň tohumlary, şeýle-de mör-möjekler bilen iýmitleýär.

Statusy: birsyhly ýaýrawy bolmadyk adaty guş.

413. Bag süleçisi – *Emberiza hortulana* – Садовая овсянка

Meýdan alamatlary: serçe ululykda. **Gözüniň töweregi ak halkaly, kellesi we döşi açyk-çalymtyl-ýaşylymtyl, “murty” sary reňkli.** Guýrugy ýalpak oýuk we tegelenen. Döşi goýu-çal ýaşylymtyl ýokundyly çal. Arkasy garamtyl menekli çuparrak-goňur. **Bili sarymtylrak öwüşginli çalymtyl-goňur. Garny we guýrugynyň aşagy goňurrak-goňras.** Ganatlary çuparrak-çalymtyl gaýalan ýelekli goýu-goňur. Guýrugy goýu-goňur, gyalary uly ak tegmili. Çünki we aýaklary gyzlymtyl. Mäkiýanlary horazlaryna çalymdaş, ýöne kellesiniň üsti garamtyl dik menekli goňurrak öwüşginli, umuman mäkiýanlary goňur reňkde. Ýaşlary mäkiýanlaryna çalymdaş, ýöne kellesiniň üsti goýu-goňur, arkasynda we garnynda menekleri köpelyär. Sesi üşegenjä çalymdaşlyk edýär, pessaýja – “siw-siw”. Saýraýşy – “týur-týur-týur-týuurr”. Ganaty – 80-92,

ные Гималаи. В Туркменистане также горные районы – Большие и Малые Балханы, Копетдаг, Западный Бадхыз, Карабиль, Койтендаг.

Образ жизни: оседлая птица, совершающая вертикальные кочевки. Обитает на горных склонах и ущельях, в арчевой зоне. Гнездится в апреле. Возможно две кладки в году. Гнезда, обычно, на земле, в кладке 4-5 серовато-белых с лилово-серыми и черно-бурыми пятнами яиц. Птенцы – в третьей декаде мая-июне. Питаются семенами дикорастущих и культурных растений, а также насекомыми.

Статус: обычная птица со спорадическим распространением.

Полевые признаки: размером с воробья. Вокруг глаз светлое кольцо, голова и грудь **светло-серо-зеленоватые, «усы» желтого цвета.** Хвост слабо выемчатый и закругленный. Спина рыжеватобурая с темными пестринками. Поясница сероватобурая с желтоватым оттенком. **Брюшко и подхвостье буровато-каштановые.** Крылья темно-бурые с рыжеватосероватыми каемками перьев. Хвост темно-бурый, по краям с большими белыми пятнами. Клюв и ноги красноватые. Самки похожи на самцов, но верх головы с коричневатым оттенком, с темными продольными пестринками, в целом, самки бурой тональности. Молодые похожи на самок, но с темно-коричневым верхом головы и развитыми пятнами на спине и брюшке. Голос чем-то схож с зябликом – негромкое «цив-цив».

guýrugy – 60-75, söbügi – 18.5-20.7, çünki – 9-11 mm, agramy – 21-23.5 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: gözüniň töweregindäki açyk-sary halkasy bilen süleçileriň ählisinden tapawutlanýar.

Ýaýran ýerleri: Ýewropada, demirgazyk böleginden başga ýerlerde, Demirgazyk Gazagystanda, Günorta Sibirde we bölekleýin Merkezi, Orta we Alynky Aziýada höwürtegeleýär. Türkmenistanda Köpetdagda höwürtegeleýär, galan ýerlerde uçup geçýän döwründe duşýar. Merkezi Afrikada gyşlaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän we höwürtegeleýän guş. Ýazky migrasiýasy aprelde maýyň ortasyna, güýzküsi awgustdan sentýabryň ortasyna çenli. Adatça, daglaryň otluk-gyrymsy agaçly eňňitlerinde, dagdaky derýajyklaryň we çeşmeleriň golaýlarynda gezyär. Iýunda jüýjeleýär. Dürli haşal otlaryň tohumlary we ösümlikleriň pudajyklary, şeýle-de mör-möjekler bilen iýmitleýär.

Statusy: az sanly, käbir ýerlerde uçup geçende adaty guş.

414. Gaýa süleçisi – *Emberiza buchanani* – Скальная овсянка

Meýdan alamatlary: serçe ululykda. **Kellesiniň üsti we boýny çala görünüň garamtyl menekli çal. Ýaňaklary goňurrak-çal.** Arkasy garamtyl dik menekli çuparrak-çal. **Bili meneksiz çuparrak-çal. Bokurdagy we petekesiniň ýokarky bölegi agymtyl, petekesiniň gapdallary çal ýokundyly. Petekesi, döşi, garny we guýrugynyň aşagy solak çuparrak-goňur.** Ganat we guýruk ýelekleri çuparrak gaýalan goýu-goňur. Çünki we aýaklary edil bag

Песня – «тюр-тюр-тюр-тюрр». Крыло – 80-92, хвост – 60-75, цевка – 18.5-20.7, клюв – 9-11 мм, вес – 21-23.5 г.

Сходства – отличия: отличается от всех овсянок **светло-желтым кольцом вокруг глаз.**

Распространение: гнездится в Европе, кроме северных частей, Северном Казахстане, Южной Сибири и, частично, в Центральной, Средней и Передней Азии. В Туркменистане гнездится в Копетдаге, в остальных местах может быть встречена на пролете. Зимует в Центральной Африке.

Образ жизни: пролетная и гнездящаяся птица. Весенняя миграция – в апреле до середины мая, осенняя – в августе до середины сентября. Держатся обычно по горным склонам с травянисто-кустарниковыми зарослями, вблизи горных речек и родников. Птенцы – в июне. Питаются семенами различных сорняков и побегами растений, а также насекомыми.

Статус: немногочисленная, на пролете местами обычная птица.

Полевые признаки: размером с воробья. Верх головы и шеи серые с едва заметными темными отметинами. **Щеки буровато-серые** Спина рыжеватосерая с темными продольными пестринами. Поясница рыжеватосерая без пестрин. **Горло и верхняя часть зоба беловатые, с серым налетом на боках зоба. Зоб, грудь, брюхо и подхвостье бледно рыжеватобурые, бледнеющие к подхвостью.** Крылья и хвост темно-бурые с рыжеватыми окаймлениями

süleçisiniňki ýaly gyzylymtyl. Mäkiýany horazyna meňzeş, ol reňk öwüşgininiň has tutukdygy we kellesiniň depe böleginiň garamtyl meneklidigi bilen tapawutlanýar. Ýaş guşlaryň kellesinde we arkasynda has güýçli ösen çypar öwüşgini we gara menekleri bolýar. Sesi pessaýja “sik-sik”, saýraýşy adaty ýa-da bag süleçisine meňzeş, başgalaryna garanyňda güýçli owazly – “týurrii-týurrii”. Ganarty – 79-90, guýrugy – 63-76, söbügi – 18-20, çüňki – 9-11 mm, agramy – 19-22 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: bag süleçisine çalymdaş, ýöne sähelçe kiçi, bokurdagynyň akdygy bilen beýleki süleçilerden tapawutlanýar. Garny çyparrak-goňur. “Myrty” açyk reňkli, ýöne sary däl.

Ýaýran ýerleri: Kawkazyň, Alyny, Ortaky we Merkezi Aziýanyň daglyk oblastlary. Türkmenistanda – Uly we Kiçi Balkan daglary, Köpetdag, Günbatar Bathyz, Köýtendag. Hindistanda gyslaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän we höwürtleýän guş. Ýazky migrasiýasy aprel-maýda, güýzkisi awgust-sentyabrda. Gurak, açyk giňişlikli dag eňňitlerinde gezýärler. Maýyň birinji ongünliginden tä iýunyň birinji ongünligine çenli höwürtleýär. Höwürtesini ýerde gurýar. 3-6 sany goňur we çal meneklije mawumtyl-ýaşyl ýumurtgalary goýýar. Maýyň we iýunyň soňky günlerinde jüýjeleýär. Dürli ösümlükleriň tohumlary, şeýle-de mör-möjekler bilen iýmtenýär.

Statusy: az sanly, bölekleyin ýaýrawly guş.

415. Gamyş süleçisi – *Emberiza schoeniclus* – Тростниковая овсянка

Meýdan alamatlary: serçe ölçeğinde, ýöne sähelçe kiçi we gelşikli

перьев. Клюв и ноги розоватые как у садовой овсянки. Самка сходна с самцом, отличается более тусклым тоном окраски и темными пестринами на верхней части головы. У молодой птицы на голове и спине сильно развиты рыжий тон и темные пестрины. Голос – негромкое «цик-цик», песня схожа с обыкновенной или садовой овсянкой – относительно звонкая трель «тюррии-тюррии». Крыло – 79-90, хвост – 63-76, цевка – 18-20, клюв – 9-11 мм, вес – 19-22 г.

Сходства – отличия: похожа на садовую, но чуть меньше, в отличие от других овсянок горло беловатое. Брюшко рыжевато-бурое. «Усы» светлые, но не желтые.

Распространение: горные области Кавказа, Передней, Средней и Центральной Азии. В Туркменистане – Большие и Малые Балханы, Копетдаг, Западный Бадхыз, Койтендаг. Зимует в Индостане.

Образ жизни: пролетная и гнездящаяся птица. Весенняя миграция в апреле-мае, осенняя – в августе-сентябре. Держится стайками по открытым, сухим горным склонам. Гнездится с первой декады мая до первой декады июня. Гнезда на земле. В кладке 3-6 голубовато-зеленых с бурыми и серыми пятнами яиц. Птенцы – в последних числах мая и в июне. Питаются семенами различных растений, а также насекомыми.

Статус: немногочисленная птица со спорадическим распространением.

Полевые признаки: размером почти с воробья, но чуть меньше

bedenli. Çüňki deşli, gara. **Horazynyň kellesi, bokurdagy we petekesi gara, “boýunbagy” we “murty” ak.** Arkasy gara uly tegmilli we çyparrak jähekli sarymtyl-poslurak reňkli. **Guýrugynyň üsti goňurrak-çal.** Ganatlary we guýrugy açyk ýa-da çypar gaýalan garamtyl-goňur ýelekli. Kellesindäki we bokurdagyndaky gara nagyşlar güýzki ýelek örtüginde çyparrak ýokundyly bolýar. Mäkiýanyň kellesinde gara nagyşlar ýok, ýañagynyň aşagyndaky zolak we bokurdagy kirliräk-ak. Ýaşlary mäkiýana çaly edýär, ýöne arkasy has goýu-çypar reňkli. Aýaklary goňur. Çagyryş sesleri pessaýja “sii-siik” ýa-da “ssiiw”. Saýraýşy batly – “şri-şri-tiri-tiri” ýa-da “ti-ti-tiri”. Ganarty – 69-86, guýrugy – 59-85, söbügi – 18-21, çüňki – 7-10 mm, agramy – 16.6-23.5 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: reňki, aýratyn-da horazlarynyň reňkiniň anykdygy bilen oňat tapawutlanýar, şoňa baglylykda olary bizdäki beýleki daryçylar bilen bulaşyrmak örän kyn.

Ýaýran ýerleri: höwürtleýän çäkleri giň – Ýewraziýanyň, demirgazyk we demirgazyk-gündogardan başga, hemme ýerlerinde. Türkmenistanda derýalaryň jülgelerinde, we dag derelerinde, dag eteklerinde we oazislerde. Günbatar we Günorta Ýewropada, Kawkazda, Kiçi, Alyny we Orta Aziýada, Päkistanyň we Hindistanyň demirgazygynda, Günorta Hytaýda gyslaýar.

Ýaşaýşy: uçup geçýän, gyslaýan, käbir ýerlerde höwürtleýän guş. Ýazky migrasiýasy mart-aprelde, güýzkisi – oktyabr-noýabrda. Esasan, derýalaryň we kölleriň kenaryndaky gamyşly jeňňelliklerde gezýär.

и стройнее. Клюв массивнее, черный. **У самца голова, горло и зоб черные, «ошейник» и «усы» белые.** Спина желтовато-ржавчатая с крупными черными пятнами и рыжими окаймлениями. **Надхвостье буровато-серое.** Крылья и хвост темно-бурые со светлыми или рыжими окаймлениями перьев. В осеннем оперении черный цвет на голове и горле приобретает рыжеватый налет. У самки отсутствует черный рисунок на голове, полоса под щеками и горло грязно-белые. Молодые похожи на самку, но с более темно-рыжей спиной. Ноги бурые. Позывка – негромкое «ции-циик» или «цсииив». Песня – довольно громкое «ши-ши-тири-тири» или «ти-ти-тири». Крыло – 69-86, хвост – 59-85, цевка – 18-21, клюв – 7-10 мм, вес 16.6-23.5 г.

Сходства – отличия: хорошо отличается окраской, в особенности выраженной у самцов, благодаря которой очень трудно спутать с другими нашими овсянками.

Распространение: область гнездования обширна – почти вся Евразия, исключая север и северо-восток. В Туркменистане – речные и горные долины, предгорья и оазисы. Зимует в Западной и Южной Европе, на Кавказе, в Малой, Передней и Средней Азии, на севере Пакистана и Индии, в Южном Китае.

Образ жизни: пролетная, зимующая, местами гнездящаяся птица. Весенняя миграция – в марте-апреле, осенняя – в октябре-ноябре. Держится, в основном, среди камышовых зарослей по берегам рек и озер. Питается семенами растений, а также насекомыми.

Ösümlikleriň tohumlary, şeýle-de mör-möjekler bilen iýmittenýär.

Statusy: az sanly, güýzüne-guşyna adaty guş.

416. Garabaş süleçi – *Emberiza melanocephala* – Черноголовая овсянка

Meýdan alamatlary: adaty süleçiden sähelçe ulurak, serçe ýaly. Çünki başgalara garanyňda uly we göni, goňurrak reňkli. Guýrugy çalaja oýuk. Horazynyň ýelek örtügi anyk meneklenmedik, ol kellesindäki “telpejiginiň” garadygy we bokurdagynyň açyk-sarydygy bilen aňsat tanalýar; arkasy goňras, bedeniniň aşagy tutuşlygyna sary. **Mäkiýany goňurrak, aýratyn-da kellesi,** bedeniniň üsti dik garamtyl we insiz me-nekli; aşaky tarapy melemtil-sarymtyl, aýratyn-da guýrugynyň aşagy. Ýaşlary mäkiýanyna çalyml edýär, emma garyn tarapy has agymtyl. Çagyryş sesi “sit-sit-sit” ýada ýumşaksy, ýone kesilip-kesilip çykýan “sit”. Saýraýşy sesli jylama – “sýu-pýu-ui”. Horazlarynyň ganaty – 88-97, mäkiýanlarynyňky – 80-88 sm, agramy - 29-33 g.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: horazlary beýleki süleçilerden kellesiniň garadygy, bokurdagynyň we petekesiniň açyk sarydygy bilen tapawutlanýar, mäkiýanlary sary bilibiliň mäkiýanyna çalymdaş. Bizde duşýan süleçileriň arasynda reňkleriň şeýle utgaşykda duşýanlary ýok.

Ýaýran ýerleri: Günorta-Gündogar Ýewropada, Kawkazda, Kiçi we Alynky Aziýanyň günbatarynda. Demirgazyk Hindis-tanda gýşlaýar. Türkmenistanda Etrek derýasynyň aşaky akumynda we Kopetdagda duşýar.

Ýaşaýşy: uçup gelyän-höwürtl-

Statusy: немногочисленная, в осенне-зимний период обычная птица.

Полевые признаки: размером с воробья, чуть крупнее обыкновенной овсянки. Клюв сравнительно большой и прямой буроватого цвета. Хвост слегка выемчатый. Оперение самцов без выраженных пестрин, их **легко определить по черной «шапочке»** на голове **и контрасту с ярко-желтым горлом;** спина каштановая, весь низ тела желтый. **Самки буроватые, особенно голова,** с узкими и продольными, темными пестринами на верхней стороне тела; снизу – кремово-желтого цвета, особенно подхвостье. Молодые схожи с самками, но низ значительно светлее. Позывка – «цит-цит-цит», или мягкое, но отрывистое «ци». Песня – звучная трель – «цью-ри-уи». Крыло самцов – 88-97, самок – 80-88 мм, вес – 29-33 г.

Сходства-отличия: от других овсянок самцы отличаются черной головой и ярко-желтым горлом и зобом, самки очень схожи с самками желчных овсянок. У других наших овсянок такие цветовые вариации отсутствуют.

Распространение: в Юго-Восточной Европе, на Кавказе, в Малой и на западе Передней Азии. Зимует в Северной Индии. В Туркменистане – в низовьях Этрека и в Копетдаге.

Образ жизни: прилетно-гнездящийся вид. Прилетает в конце апреля – начале мая, отлетает в

geleýän görnüş. Apreliň aýagynda maýyň başynda uçup gelyär, awgustyň ahyrynda uçup gidýär. Gyrymsyly meýdançalaryň açyk ýerlerinde saklanýar. Maý aýynda höwürtlgeleýär, gyrymsy agaçlarda ýumurtga goýýar, olaryň ölçegleri ortaça 22 x 16 mm. Reňki – çalymtylgögümyil, ak ýa-da mawy goňur tegmilli ýa-da açyk asman reňkli. Ýaşlary iýul aýynyň ikinji ýarymynda gabat gelyär. Haşal otlaryň, seýregräk medeni ösümlikleriň däneleri bilen iýmittenýärler, mör-möjekleri, aýratyn-da jüýjelerini iýmitlendirýän wagtlary çokýarlar.

Statusy: az sanly, ýaýran ýerleri çäkli guş.

417. Sary bilbil – *Emberiza bruniceps* – Желчная овсянка

Meýdan alamatlary: serçe öleşinde, adaty süleçiden sähelçe kiçi. Çünki uly we göni. Guýrugy ýalpak oýuk. **Kellesindäki, bokurdagyndaky we petekesindäki açyk-goňur reňki boýunça aňsat tanalýar.** Arkasy garamtyl-gönür menekli ýaşylymtyl-sary. Ganatlary we guýrugy goňur öwüşginli. **Bedeniniň garyn tarapy we bili sary.** Güýzine inli çal jäheklenen ýelek örtükli. Mäkiýanda goňurrak-çäge öwüşginini agdyklyk edýär. Kellesiniň üsti goňurrak görnüşde. Bili we guýrugynyň üsti garamtyl dik menekli goňurrak-ýaşylymtyl-çal. Ýaşlary mäkiýana çalymdaş, ýone çuparrak ýokundyly, petekesi we döşi garamtyl menekli. Çünki melemtil, üstkisi- goňur reňkli. Aýaklary gyzlymtyl-goňur. Çagyryş sesi bat-syzrak – “sik-sik”. Saýraýşy labyzly owaz sesleri – “çut-çut-çut-tri-uri-uri”. Ga-naty – 75-90 mm, agramy –

конце августа. Придерживается открытых кустарниковых участков. Гнездится в мае, гнезда устраивает на кустах. В кладке обычно 4-6 яиц, варьирующих по размерам, в среднем, 22 x 16 мм, и по окраске. Цвет – белый или голубой, или бледно-голубой с серовато-фиолетовыми и бурными пятнышками. Молодые встречаются во второй половине июля. Питаются семенами сорных, реже культурных растений, добывают и насекомых, особенно во время выкармливания птенцов.

Statusy: немногочисленная птица с ограниченным распространением.

Полевые признаки: размером с воробья, чуть меньше обыкновенной овсянки. Клюв большой, прямой. Хвост слегка выемчатый. Самца легко узнать по ярко-коричневой окраске головы, горла и зоба. Спина зеленовато-желтая с черно-бурными пестринами. Крылья и хвост бурых оттенков. Брюшная сторона тела и поясница желтые. Осенью оперение с широкими серыми окаймлениями перьев. У самки преобладают коричневатопесочные тона. Верх головы с коричневатым оттенком. Поясница и надхвостье буровато-зеленовато-серые с темными продольными пестринами. Молодые похожи на самку, но с рыжеватым налетом и с темными пятнами на зобе и груди. Клюв буроватого цвета с коричневым надклювьем. Ноги красновато-бурые. Позывка – негромкое «цик-цик». Песня – звонкая трель –

21-29 г.

Meňzeşlikleri-tapawutlary: kellesiniň, bokurdagynyň we petekesiniň açyk-goňur reňklidigi, guýrugynyň üstüniň sarydygy bilen beýleki süleçilerden tapawutlanýar; bizdäki beýleki daryuçylaryň arasynda şeýle öwüşginlisi gabat gelmeýär.

Ýaýran ýerleri: Alynky we Orta Aziýada, Gazagystanda we Günorta-Günbatar Sibirdä höwürtegeýär. Türkmenistanda uçup geçýän döwründe hemme ýerlerde, höwürtegelände daglaryň derelelerinde we derýalaryň jülgelerinde, oazislerde, dag eteklerinde we deňiz kenarynda gabat gelýär. Hindistanda guşlaýar.

Ýaşayşy: uçup geçýän we höwürtegeýän guş. Ýazky migrasiýasy aprel - maýda, güýzküsi awgust - sentýabrda. Dürli otjumak ösümlikli seýrek gyrymsyly açyk ýerlerde ýaşayar. Maý-iyun aýlarynda höwürtegeýär. Höwürtesini köplenç gyrymsyda gurýar. 3-5 sany gowşak mawumtyl ýa-da ýaşylymtyl öwüşginli, goýy-goňur ýa-da kütük ujy melewşe-çal meneklije ak reňkli ýumurtgalary goýýar, ölçegleri – 22.2 x 16.3 mm. Iýun-iyulda jüýjeleýär. Dürli mör-möjekler we ösümlikleriň tohumlary bilen iýmitlenýär.

Statusy: adaty, käbir yerlerde seýrek ýa-da tersine köpsanly (mysal üçin, Bathyzda we Garabilde) guş.

Bellik: Türkmenistanda dürli döwürlerde tötänden uçup gelýän görnüşleriniň eňçemesi hasaba alyny:

418. Garapetekeli süleçi - *Calcarius lapponicus* – Hazar

«чуть-чуть-чуть-три-ури-ури». Крыло – 75-90 мм, вес – 21-29 г.

Сходства – отличия: от других овсянок отличается ярко-коричневым цветом головы, горла и зоба, а надхвостье желтое; у других наших овсянок таких цветовых вариаций нет.

Распространение: гнездится в Передней и Средней Азии, Казахстане и Юго-Западной Сибири. В Туркменистане на пролете повсеместно, на гнездовье – в горных и речных долинах, оазисах и предгорьях, по морскому побережью. Зимует в Индии.

Образ жизни: пролетная и гнездящаяся птица. Весенняя миграция – в апреле-мае, осенняя – в августе-сентябре. Тяготеет к открытым участкам с кустарниковым разнотравьем. Гнездится в мае-июне. Гнезда чаще на кустах. В кладке 3-5 яиц, белого цвета со слабым голубым или зеленоватым оттенком, с темно-коричневыми или лилово-серыми пятнами на тупом конце. Размеры яиц – 22.2 x 16.3 мм. Птенцы – в июне-июле. Питаются различными насекомыми и семенами растений.

Статус: обычная, местами редкая или, наоборот, многочисленная (например, Бадхыз и Карабиль) птица.

Примечание: В Туркменистане в разное время как залетные виды отмечены:

418. Подорожник – *Calcarius lapponicus*. Зарегистрирован (2008 г.) на побережье Каспия в районе

deňziniň kenaryndaky Soýmonow aýlajygynda bellendi (2008 ý.). Onuň horazlaryny kellesiniň, bokurdagynyň we petekesiniň garadygy (mäkiýanynyň kellesi we bokurdagy açyk reňkli), ýeňsesiniň we boýnunyň gapdallarynyň goňrasçypardygy bilen aňsat tanasa bolýar.

419. Ala süleçi - *Plectrophenax nivalis* - Türkmenbaşy aýlagynyň demirgazyk kenarynda (1972 ý.). Bu guşjagaz daryçu guşuň ululygynda bolup, ol agymtyl-goňurrak-gyzgylt, uçup barýarka - ganatlarynyň garaakdygy bilen anyk tapawutlanýar.

420. Süleçi-züýk – *Emberiza rustica*. Gyş döwründe örän seýrek duşmagy mümkin, statusy boýunça tötänden uçup gelýän we örän seýrek duşýan görnüş hasaplanýar. Umuman horazlary kellesiniň garaak nagyşlary bilen tapawutlanýarlar. Mäkiýanlary we ýaş guşlar gamyş süleçisi bilen aňsat garjaşýar, soňkydan olar bir-birinden diňe gulagynyň ýokarsyndaky ak tegmili we böwürlerindäki goňur menekleri bilen tapawutlanýarlar. Süleçizüýgüň kellesindäki ýelejykleriň sähelçe, edil kiçijek hüpük ýaly hüžžermegi mümkin.

421. Akegin süleçi - *Emberiza aureola* şol Türkmenbaşy aýlagynda üç gezek duşdy (2006-2008 ýý.). Onuň horazlary goňras “telpe-jikli”, petekesiniň kese sary zolagy we ýüzüniň “garadygy” bilen aňsat tanalýar. Garny sary, goňras egni ak zolakly. Mäkiýany tutuk reňkli, aşagy sary hem bolsa, horazyna garanynda, has solak, böwürleri we döşi dik garamtyl menekli.

422. Çal süleçi - *Emberiza cineracea*, onuň sürüjigine Sumbar

бухты Соймонова. Самцов легко узнать по черным горлу, зобу и голове (у самок голова и горло светлые) и каштаново-рыжеватому затылку и бокам шеи.

419. Пуночка – *Plectrophenax nivalis* – на северном берегу залива Туркменбаши (1972г.). Размером эта птица с просянку и легко определяется благодаря контрастной бело-буро-розовой окраске и белым крыльям.

420. Овсянка-ремез – *Emberiza rustica*. Может появляться крайне редко в зимнее время, по статусу считается залетным и очень редким видом. В целом самцы отличаются характерным черно-белым рисунком головы. Самок и молодых птиц можно спутать с тростниковыми овсянками, от которых они отличаются лишь светлым пятном над ухом и коричневыми пестринами на боках. Перышки на голове у овсянки-ремеза могут слегка топорщиться как маленький хохолок.


421. Дубровник – *Emberiza aureola* – три встречи (2006-2008 гг.) отмечены у бухты Соймонова. Самцы безошибочно определяют по каштановой «шапочке» и полоске поперек желтого зоба и черному «лицу». Брюшко желтое, а на каштановых плечах – белые пятна. Самки окрашены блекло: низ, хотя тоже желтый, но намного бледнее, чем у самцов, с темными продольными пестринами на боках и груди.

422. Серая овсянка – *Emberiza cineracea* – была встречена стайка (1989 г.) в долине Сумбара. Самцы отличаются неяркой желтовато-зеленоватой головой и желтоватым

jülgesinde duşuldy (1989 ý.). Horazy öçügsi sarymyl-ýaşylymytyl reňkli kellesi we sarymytyl garny bilen tapawutlanýar, üsti, şeýle-de ganatlary we guýrugy goňurrak-çal, arkasy meneklenen. Mäkiýanynyň aşagy dik meneklenen we ýelek örtügininiň sary reňki bolmaýar.


брюшком; верх, а также крылья и хвост буровато-серые, на спине с пестринами. Самки – с продольными пестринами на брюшке и без желтоватого цвета в оперении.

Suratlar * Иллюстрации




Karta-shemalarda umumy reňklerde görnüşiniň ýaýran ýerleri, inçe çyzyklarda – şertli görnüşiniň ýaýran ýerleriniň tutuşlaýyndygy ýa-da üzňelikde ýerleşendigi görkezilýär.

Цветной фон на всех карто-схемах обозначает области распространения, а штриховкой условно показано сплошное или прерывистое распределение вида.




1

2




3

4




5


6



7



1 Gyzyl petekeli ýogla – *Gavia stellata* – Краснозобая гагара




2 Gara petekeli ýogla – *Gavia arctica* – Чернозобая гагара



3 Kiçi tersaýak – *Tachybaptus ruficollis* – Малая поганка



4 Uly tersaýak – *Podiceps cristatus* – Большая поганка, или чомга




5 Çalyňaňak tersaýak – *Podiceps grisegena* – Серощекая поганка




6 Gyzylboýun tersaýak – *Podiceps auritus* – Красношейная поганка




7 Garaboýun tersaýak – *Podiceps nigricollis* – Черношейная поганка




8




9




10




11




12




13



14



15



8 Gyzylyt gotan – *Pelecanus onocrotalus* – Розовый пеликан

9 Vuýraly gotan – *Pelecanus crispus* – Кудрявый пеликан



10 Uly garajgaz – *Phalacrocorax carbo* – Большой баклан

11 Kiçi garajgaz – *Phalacrocorax rufamaeus* – Малый баклан




12 Hakgeý – *Botaurus stellaris* – Большая выпь




ad. ♂


13 Gögebakar – *Ixobrychus minutus* – Малая выпь



14 Kawguş – *Nycticorax nycticorax* – Кваква




15 Sary hokgar – *Ardeola ralloides* – Желтая цапля




16

17




18

19




20

21



22

23



16 Müsür hokgary – *Bubulcus ibis* – Египетская цапля




17 Uly ak hokgar – *Casmerodius albus* – Большая белая цапля




18 Kiçi ak hokgar – *Egretta garzetta* – Малая белая цапля



19 Gök hokgar – *Ardea cinerea* – Серая цапля



20 Şurpar hokgar – *Ardea purpurea* – Рыжая цапля




21 Kaşykburun – *Platalea leucorodia* – Колпица



22 Gamaburun – *Plegadis falcinellus* – Каравайка




23 Ak leqlek – *Ciconia ciconia* – Белый аист




24

25




26

27




28

29



30


31




24 Gara leglek – *Ciconia nigra* – Черный аист




25 Gyzyl gaz – *Phoenicopterus roseus* – Обыкновенный фламинго



26 Tauty – *Cygnus olor* – Лебедь-шипун




27 Kiçi ya-da tundra guwy – *Cygnus columbianus (bewickii)* – Малый, или тундровый лебедь




28 Sohra (sykylykçu guw) – *Cygnus cygnus* – Лебедь-кликун




29 Köşükpisint gaz – *Anser fabalis* – Гуменник




30 Uly sakar gaz – *Anser albifrons* – Белолобый гусь




31 Kiçi sakar gaz – *Anser erythropus* – Пискулька, или малый белолобый гусь




32



33




34




35




36




37



38




39



32 Guba gaz – *Anser anser* – Серый гусь




33 Garaçüňk gaz – *Anser cygnoides* – Сухонос




34 Gyzyl petekeli gaz – *Branta ruficollis* – Краснозобая казарка




35 Aňk – *Tadorna ferruginea* – Огарь, или отайка




36 Ala gaz – *Tadorna tadorna* – Пеганка




37 Sakarja ördek – *Anas penelope* – Связь



38 Çal ördek – *Anas strepera* – Серая утка




39 Sykylykçy jünekeý – *Anas crecca* – Чирок-свиистунок




40


41



40 Yaşylbaş – *Anas platyrhynchos* – Кряква




41 Gylguýruk ördek – *Anas acuta* – Шилохвость




42


43



42 Uly jünekey ördek – *Anas querquedula* – Чирок-трескунок




43 Tamdyra ördegi – *Anas clypeata* – Широконоска




44


45



44 Ekinçi ördek – *Marmaronetta angustirostris* – Мраморный чирок




45 Almabaş ördek – *Netta rufina* – Красноносый нырок




46


47




46 Gyzylbaş garamtyl ördek – *Aythya ferina* – Голубая чернеть, или красноголовый нырок




47 Gara ördek – *Aythya nyroca* – Белоглазая чернеть, или белоглазый нырок




48




49




50




51




52




53



54



55




48 Kekilli garamtyl ördek – *Aythya fuligula* – Хохлатая чернеть


49 Deñiz garamtyl ördegi – *Aythya marila* – Морская чернеть



50 Alaja kekilli ördek – *Anas falcata* – Косатка




51 Deñizçi ala ördek – *Clangula hyemalis* – Морянка
guyş I zima




52 Gögümtil ördek – *Melanitta nigra* – Синьга




53 Uly gara ördek – *Melanitta fusca* – Обыкновенный турпан




54 Jugaly ördek – *Bucephala clangula* – Обыкновенный гоголь




55 Kiçi jüptün ördek – *Mergellus albellus* – Луток



56




57




56 Uzunçüñkli jüptün ördek – *Mergus serrator*
– Длинноносый, или средний крохаль




57 Uly jüptün ördek – *Mergus merganser* – Большой крохаль




58




58 Gorçy – *Oxyura leucoscephala* – Савка



59




60




59 Balykçy bürgüt – *Pandion haliaetus* – Скопа




60 Arçy – *Pernis apivorus* – Обыкновенный осоед




61




62



61 Gara çaykel – *Milvus migrans* – Черный коршун




62 Uzungüyük suw bürgüdi – *Haliaeetus leucorhynchus*
– Орлан-долгохвост




63

64




65

66




67

68




69


70




63 Akquyruk suw bürgüdi – *Haliaeetus albicilla* – Орлан-белохвост




64 Sakgally garaguş – *Gypaetus barbatus* – Бородач




65 Maslykcy – *Neophron percnopterus* – Стервятник




66 Gajar – *Aegypius monachus* – Черный гриф




67 Dazzarkel – *Gyps fulvus* – Белоголовый сип




68 Ýulancy gurgy – *Circus gallicus* – Змеяяд




69 Gamys (batga) gulatysy – *Circus aeruginosus* – Болотный лунь




70 Meýdan gulatysy – *Circus cyaneus* – Полевой лунь




71




72




73




74




75




76



77




78



71 Sähra gultasy – *Circus macrourus* – Степной лунь




72 Ak gultay – *Circus pygargus* – Луговой лунь




73 Garçygaý – *Accipiter gentilis* – Тетеревятник



74 Bedeneçi gyrgy – *Accipiter nisus* – Перепелятник



75 Ýewropa sykylykçy gyrgysy – *Accipiter brevipes* – Европейский тювик




76 Sykylykçy gyrgy – *Accipiter badius* – Тювик



77 Syçaңсы – *Buteo buteo* – Обыкновенный канюк, или сарыч




78 Depe syçaңсы – *Buteo rufinus* – Курганник




79

80




81




82

83




84

85



ad. ♂

79 Tüýlek aýakly sygancy – Buteo lagopus – Зимняк



ad.


juv.

80 Uly garaguşyk – Aquila clanga – Большой подорлик



ad.


81 Sähra garaguşy – Aquila nipalensis – Степной орел



ad.

juv.


82 Mazar garaguşy – Aquila heliaca – Могильник



ad.

juv.


83 Bürgüt – Aquila chrysaetos – Беркут



ad.

juv.


84 Göydük garaguş – Hieraetus pennatus – Орел-карлик



ad.

juv.


85 Gyrgypisint garaguş – Hieraetus fasciatus – Ястребиный орел



86


87

88




89

90



91

92



93


94




86 Sähra göwenegi – Falco naumanni
-Степная пустельга

87 Göwenek – Falco tinnuculus
-Обыкновенная пустельга

88 Kісі gyrgy – Falco vespertinus
-Кобчик



89 Kerdерісі laçyn – Falco columbarius – Дербник



90 Turlutaу – Falco subbuteo – Черлок



91 Ütelgi – Falco cherrug – Балобан


92 Суарбаş laçyn – Falco peregrinoides – Шахин




93 Gök bähri – Falco peregrinus – Сапсан




94 Hindi ütelgesi – Falco jugger – Лаггар




95




96




97




98




99




100




101




102



95 Dag hindi towuğu - *Tetraogallus caspius* - Каспийский улар




96 Käkilik - *Alectoris chukar* - Кеклик



97 Çil käkilik - *Ammoperdix griseogularis* - Пустынная куропатка



98 Bedene - *Coturnix coturnix* - Перепел



99 Sülgün - *Phasianus colchicus* - Фазан




100 Turaç - *Francolinus francolinus* - Турач



101 Çal durna - *Grus grus* - Серый журавль




102 Ak durna - *Grus leucogeranus* - Стерх, или белый журавль




103

104




105

106



107

108



109

110




103 Owdan (akbaş) durna – *Grus virgo* – Журавль красавка 104 Bukanja yelbe – *Rallus aquaticus* – Пастушок



105 Yelbe (suw towugy) – *Porzana porzana* – Погоныш



106 Kiçi suw towugy – *Porzana parva* – Малый погоныш



107 Jüyje yelbe – *Porzana pusilla* – Погоныш-крошка




108 Çurpa yelbe – *Crex crex* – Коростель




109 Suw towugy – *Gallinula chloropus* – Камышиница




110 Soltantowuk – *Porphyrio porphyrio* – Султанка




111




112




113




114




115




116



117



118




ad.


111 Sakarbarak – Fulica atra - Лысуха




112 Bezeltek – Tetrax tetrax – Стренер



113 Toklutay – Otis tarda – Дрофа




114 Togdary – Chlamydomis undulata – Дрофа-красотка



ad.


115 Çakyryk – Burhinus oedicnemus – Авдотка



ad.

tomus I лето

116 Kici kebez – Charadrius dubius – Мальный зюк



ad.

tomus I лето


117 Demirgazyk kebezi – Charadrius hiaticula – Галстучник



ad.


tomus I лето

118 Deñiz kebezi – Charadrius alexandrinus – Морской зюк




119

120




121

122



123


124




586

125

126




119 Yagunçüňk kebez – *Charadrius leschenaultii* – Толстоклювый зуек




120 Hazar kebezi – *Charadrius asiaticus* – Каспийский зуек



121 Mongol kebezi – *Charadrius mongolus* – Монгольский зуек




122 Şygyrdawuk çuluk – *Eudromias morinellus* – Хрустан зуек




123 Altynsow çuluk – *Pluvialis apricaria* – Золотистая ржанка



124 Goňurganat çuluk – *Pluvialis fulva* – Бурокрылая ржанка




125 Tules çulugy – *Pluvialis squatarola* – Тулес




126 Tekejlylyk – *Vanellus leucurus* – Белохвостая пигалица

587




127

128




129

130



131

132




133


134



127 Gara depeli tekejylyk – *Vanellus gregarius* – Кречетка




128 Bezegli bezziltik – *Vanellus indicus* – Украшенный чибис




129 Bezziltik – *Vanellus vanellus* – Чибис




130 Daş döŷüji çuluk – *Arenaria interpres* – Камнешарка




131 Gyzylinjik – *Himantopus himantopus* – Ходулочник




132 Bizçüňk çuluk – *Recurvirostra avosetta* – Шилоклювка



133 Alahekek-çuluk – *Haematopus ostralegus* – Кулик-сорока




134 Island çäge çulugy – *Calidris canutus* – Исландский песочник




135

136




137

138




139

140



141


142




135 Çäge çulugy – *Calidris alba* – Песчанка




136 Serçe-çuluk – *Calidris minuta* – Кулик-воробей




137 Akguýruk çäge çulugy – *Calidris temminckii* – Белохвостый песочник




138 Gyzyl petekeliye çuluk – *Calidris ferruginea* – Краснозобик



139 Gara petekeliye çuluk – *Calidris alpina* – Чернозобик




140 Deñiz çäge çulugy – *Calidris maritima* – Морской песочник



141 Batga çulugy – *Limicola falcinellus* – Грязовик




142 Ýakaly çuluk – *Philomachus pugnax* – Турухтан




143

144




145

146




147

148



149


150



ad.


tomus I лето

143 Tüys ebek – *Lymnocyptes minimus* – Гаршнеп



ad.

144 Ebek – *Gallinago gallinago* – Бекас



ad.


145 Uly jeñnel ebegi – *Gallinago media* – Дупель



ad.




146 Uly dag ebegi – *Gallinago solitaria* – Горный дупель



ad.

147 Tokaý ebegi – *Scolopax rusticola* – Вальдшнеп




ad. ♂

tomus I лето

ad. ♀

гуш I зима

148 Uly ikburun – *Limosa limosa* – Большой веретенник



ad.


tomus I лето

149 Kіçi ikburun – *Limosa lapponica* – Малый веретенник




ad.

150 Orta úýlquсы – *Numenius phaeopus* – Средний кроншнеп




151

152




153

154




155

156




157

158




151 İnce çüňkli ýulkuşy – *Numenius tenuirostris*
– Тонкокловый, или малый кроншнеп


152 Uly ýulkuşy – *Numenius arquata* – Большой кроншнеп




153 Bezemen çuluk – *Tringa erythropus* – Щеголь




154 Gyzył aýajykly çuluk – *Tringa totanus* – Травник




155 Akarçeşme çulugy – *Tringa stagnatilis* – Поручейник




156 Uly ulit çulugy – *Tringa nebularia* – Большой улит



157 Goňurarka çuluk – *Tringa ochropus* – Черныш




158 Çalymtyl çuluk – *Tringa glareola* – Фифи




159

160




161

162




163




164

165



159 Egriçüñk çuluk – *Xenus cinereus* – Мородунка




160 Dasaviv çuluk – *Actitis hypoleucos* – Перевозчик




161 Ikburun yüzegenje – *Phalaropus lobatus* – Круглоносый плавунчик




162 Yasyburun yüzegenje – *Phalaropus fulicarius* – Плосконосый плавунчик




163 Takırçorga – *Cursorius cursor* – Бегунок



164 Garlawaç pisint çemen çulugy – *Glareola pratincola* – Луговая тиркушка




165 Garlawaç pisint sähra çulugy – *Glareola nordmani* – Степная тиркушка




166

167




168

169




170

171




172


173




166 Deñizýany uzynguýruk çarlak – *Stercorarius longicaudus* – Длиннохвостый поморник




167 Posly çarlak – *Stercorarius parasiticus* – Короткохвостый поморник




168 Deñizýany orta çarlak – *Stercorarius pomarinus* – Средний поморник



169 Garabaş gülegen çarlak – *Larus ichthyaetus* – Черноголовый хохотун




170 Garabaş çarlagy – *Larus melanocephalus* – Черноголовая чайка




171 Kiçi çarlak – *Larus minutus* – Малая чайка



172 Köl çarlagy – *Larus ridibundus* – Озерная чайка




173 Kerperi pisintli deniz çarlagy – *Larus genei* – Морской голубок



174


175

176




177

178




179

180




181

182



ad. tomus I лето

174 Garmtylarka çarлак – *Larus fuscus*
– Клуша



ad.

175 Uly çalymtyl çarлак – *Larus hyperboreus*
– Бургомистр



ad. ýaz I весна

176 Ak çarлак – *Larus caunus*
– Сизая чайка



juv.

ad.



ad.

tomus I лето

juv.


177 Gülegen çarлак – *Larus cachinnans* – Хохотунья



ad.

tomus I лето


179 Garaçünk çerik – *Sterna nilotica* – Чайконосая крачка



ad.

tomus I лето


180 Alaburun çerik – *Sterna sandvicensis* – Пестроносая крачка



ad.

tomus I лето


181 Sakaw çarлак – *Sterna caspia* – Чергава



ad.


tomus I лето

182 Derýa çerigi – *Sterna hirundo* – Речная крачка




183

184




185

186




187

188




189


190




183 Kiçi çerik – *Sterna albifrons* – Малая крачка



184 Akyañak çerik – *Chlidonias hybrida* – Белошекая крачка




185 Gara çerik – *Chlidonias niger* – Черная крачка



186 Akqanat çerik – *Chlidonias leucopterus* – Белокрылая крачка



187 Bagyrtlak – *Pterocles orientalis* – Чернобрюхий рябок




188 Gylguýruk – *Pterocles alhata* – Белобрюхий рябок



189 Dykdyky – *Syrhaptes paradoxus* – Саджа




190 Senegal bagyrtlagy – *Pterocles senegallus* – Сенегальский рябок



191


192

193




194

195




196

197




198


199




191 Gögerçin – *Columba livia* – Сизый голубь




192 Goñur keperdi – *Columba eversmanni* – Бурый голубь
193 Gaýa keperdi – *Columba rupestris* – Скалистый голубь




194 Garamtyl billi keperdi – *Columba oenas* – Клинтух




195 Hal keperdi – *Columba palumbus* – Вяхирь




196 Halkaly gumry – *Stertopelia decaoto* – Кольчатая горлица




197 Adaty gumry – *Stertopelia turtur* – Обыкновенная горлица



198 Uly gumry – *Stertopelia orientalis* – Большая горлица




199 Musaýuja gumry – *Stertopelia senegalensis* – Малая горлица




200

201




202

203



204

205




206

207



200 Adaty ikat'ok – *Cuculus canorus*
– Обыкновенная кукушка




201 Ker ikat'ok – *Cuculus saturatus* – Глухая кукушка



202 Hürpükli ikat'ok – *Clamator glandarius* – хохлатая кукушка




203 Kiçi ikat'ok – *Cuculus poliocephalus* – Малая кукушка



204 Aziya koel ikat'yogy – *Eudynamis scolopacea* – Азиатский коэль




205 Sykylyqcy hüwüjik – *Otus scops* – Сплюшка




206 Melemtil sary hüwüjik – *Otus brucei* – Буланая, или пустынная совка




207 Hüwi – *Bubo bubo* – Филин




208




209




210




211




212



213



214



215




208 Ak hüwi – *Bubo scandiaca* – Белая сова



209 Baýğuş – *Athene noctua* – Домовый сыч




210 Çalymtıl hüwi – *Strix aluco (nivicola)* – Серая неясыть



211 Boguk hüwi – *Tyto alba* – Сипуха





212 Otagaly hüwi – *Asio otus* – Ушастая сова




213 Batga hüwüsi – *Asio flammeus* – Болотная сова



214 Adaty gündizkör – *Caprimulgus europaeus* – Обыкновенный козодой




215 Melemtıl gündizkör – *Caprimulgus aegyptius* – Буланный козодой




216

217




218

219




220


221



222




216 Gara atgarlawaç – *Apus apus* - Черный стриж



217 Kiçi atgarlawaç – *Apus affinis* - Малый стриж




218 Akgaryn atgarlawaç – *Tachymarptis melba* – Белобрюхий стриж




219 Gökğarga – *Corosias garrulus* – Сизоворонка




220 Süti – *Alcedo atthis* – Обыкновенный зимородок



221 Altynsow daraklyk – *Merops apiaster* – Золотистая щурка




222 Yaşyl daraklyk – *Merops persicus* – Зеленная щурка




223



223 Нүрүрик – *Урра ерорс* – Удод




224




225




224 Şalkyboýun guş – *Jynx torquilla* – Вертишейка




225 Ýaşyl daşdeşen – *Picus viriridis* – Зеленый дятел




226




227



226 Uly ala daşdeşen – *Dendrocopos major* – Большой пестрый дятел




227 Akganat daşdeşen – *Dendrocopos leucopterus* – Белокрылый дятел



228




228 Теһне нагушы даşdeşen – *Picus squamatus* – Чешуйчатый дятел




229

230




231

232



233

234



235

236




229 Kenar garlawajy – *Riparia riparia* – Береговая ласточка




230 Gaýa garlawajy – *Hirundo rupestris* – Скальная ласточка




231 Sapak guýrukly garlawaç – *Hirundo smithii* – Нитехвостая ласточка




232 Oba garlawajy – *Hirundo rustica* – Деревенская ласточка, или касатка



233 Daş garlawajy – *Hirundo daurica* – Рыжепоясничная, или даурская ласточка




234 Dag garlawajy – *Delichon urbica* – Воронok




235 Çöl torgaýy – *Ammomanes deserti* – Пустынный жаворонok




236 Mollatorgaýy – *Galerida cristata* – Хохлатый жаворонok




237




238




239




240




241



242




243



244



237 Sähra torğayı – *Melanocorypha calandra*
– Степной жаворонок



238 Alaboyn torğayı – *Melanocorypha bimaculata*
– Двупятнистый жаворонок



239 Akganat torğayı – *Melanocorypha leucoptera*
– Белокрылый жаворонок



240 Gara torğayı – *Melanocorypha yeltoniensis*
– Черный жаворонок



241 Kiçi torğayı – *Calandrella brachydactyla*
– Малый жаворонок




242 Çal torğayı – *Calandrella rufescens* – Серый жаворонок




243 Şorluk torğayı – *Calandrella cheleensis*
– Солончаковый жаворонок



244 İnçəüñk torğayı – *Calandrella acutirostris*
– Тонкоклювый жаворонок



245




246




245 Tokaý torgaýy – *Lullula arborea* – Лесной жаворонок



246 Meýdan torgaýy – *Alauda arvensis* – Полевой жаворонок



247




248




247 Kiçi meýdan torgaýy – *Alauda gulgula* – Индийский жаворонок




248 Şahlyja torgaýy – *Eremophila alpestris* – Рогатый жаворонок



249




250




249 Meýdan aţjagazy – *Anthus campestris* – Полевой конёк



250 Sähra aţjagazy – *Anthus richardi* – Степной конёк



251




252




251 Tokaý aţjagazy – *Anthus trivialis* – Лесной конёк




252 Çemen aţjagazy – *Anthus pratensis* – Луговой конёк




253




254




255




256




257



258



259




guş I zima

253 Gyzyl petekeli atjagaz - *Anthus cervinus*
- Краснозобый конёк




254 Dag atjagazy - *Anthus spinoletta* - Горный конёк




ad.

255 Goyunguş - *Motacilla flava* - Желтая трясогузка



ad. ♂

256 Sarybaş goyunguş - *Motacilla citreola*
- Желтоголовая трясогузка



ad. ♂

257 Dag goyungusy - *Motacilla cinerea*
- Горная трясогузка




ad. ♀




juv.

258 Geçi guş - *Motacilla alba* - Белая трясогузка




ad. ♂


259 Dulanan goyunguş - *Motacilla personata*
- Маскированная трясогузка




260




261




262



263




264




265




266




267




260 Сурғуғурук тоған – *Lanius isabellinus* – Кашгарский жулан




261 Gyzył toған – *Lanius collurio* – Обыкновенный жулан




262 Ұағурын тоған – *Lanius nubicus* – Маскированный сорокопұт




263 Uzynguурук тоған – *Lanius schach* – Длиннохвостый сорокопұт




264 Gara mañlaýly toған – *Lanius minor* – Чернолобый сорокопұт




265 Ala toған – *Lanius excubitor* – Серый сорокопұт




266 Hindi gyzył toғаны – *Lanius vittatus* – Индийский жулан




267 Gyzyłbaşly toған – *Lanius senator* – Красноголовый сорокопұт




268




269




270




271



272



273



274



ad. ♂




juv.

268 Sargyldak – Oriolus oriolus – Обыкновенная иволга



269 Dag meynesı (bramin sary) – Sturnus pagodarum – Горная майна



♂

♀

270 Garasar – Sturnus vulgaris – Обыкновенный скворец




ad.

ýaz I vesna




juv.

271 Ala sar – Sturnus roseus – Розовый скворец



ad.

272 Meýne – Acridotheres tristis – Майна




274 Alahekek – Pica pica – Сорока



273 Çürçürı – Podoces panderi – Саксаульная сойка





275


276



275 Gara zag – *Pyrrhorax pyrrhorax* – Клушица



276 Alp zakya gargasy – *Pyrrhorax graculus* – Альпийская галка




277


278



277 Zakya garga – *Corvus monedula* – Галка



278 Ekinçi garga – *Corvus frugilegus* – Грач




279


280



279 Gara garga – *Corvus corone* – Черная ворона



280 Ala garga – *Corvus cornix* – Серая ворона



281


282




281 Çöl gargasy – *Corvus ruficollis* – Пустынный ворон




282 Uly garga – *Corvus corax* – Обыкновенный ворон




283




284




285




286




287



288




289



290



281 Sykylykçy – *Bombycilla garrulus* – Свиристель



282 Toganpisintli sykylykçy – *Hypocolius ampelinus* – Свиристельский сорокопут




283 Çitçiti guşy – *Troglodytes troglodytes* – Крапивник



284 Токаў owaczsy – *Prunella modularis* – Лесная завирушка




285 Menekli owaczsy – *Prunella ocularis* – Персидская завирушка



286 Garadamak owaczsy – *Prunella atrogularis* – Черногорля завирушка




287 Alp dag owaczsy – *Prunella collaris* – Альпийская завирушка




291

292




293

294



295

296



297

298



291 Ýaýwaňgýýruk gamyşgusy – *Cettia cetti* – Широкохвостка



292 Adaty çyrlak guş – *Locustella naevia* – Обыкновенный сверчок



293 Derýa çyrlak guşy – *Locustella fluviatilis* – Речной сверчок



294 Bilbil çyrlak guşy – *Locustella luscinioides* – Соловиный сверчок




295 Inçeýüňk gamyşgusy – *Acrocephalus melanopogon* – Тонкоклювая камышевка




296 Torsujak gamyşgusy – *Acrocephalus schoenobaenus* – Камышевка-барсучок




297 Hindi gamyşgusy – *Acrocephalus agricola* – Индийская камышевка




298 Bag gamyşgusy – *Acrocephalus dumetorum* – Садовая камышевка




299




300




301




302




303



304



305



306




299 Gamыşуşу – *Acrocephalus scirpaceus*
– Тростниковая камышеvка



300 Batga gamыşуşу – *Acrocephalus palustris*
– Болотная камышеvка



301 Jokjokы sypatly gamыşуşу – *Acrocephalus arundinaceus* – Дроздовидная камышеvка



302 Türküstan gamыşуşу – *Acrocephalus stentoreus*
– Туркестанская камышеvка




303 Çekçekeki – *Hippolais caligata* – Северная,
или малая бормотушка




304 Kіçi çekçekeki – *Hippolais rama* – Южная бормотушка



305 Ҷашыл şуғşуғу – *Hippolais icterina* – Зеленая
пересмешка




306 Solgun şуғşуғу – *Hippolais pallida*
– Бледная пересмешка



307


308



307 Uly şygşygy – *Hippolais languida*
– Большая бормотушка



308 Gyrgy pisintli çürəntgi – *Sylvia nisoria*
– Ястребиная славка



309


310



309 Saýrak çürəntgi – *Sylvia hortensis* – Певчая славка




310 Owazçy çürəntgi – *Sylvia curruca* – Славка-завирушка



311


312



311 Çal çürəntgi – *Sylvia communis* – Серая славка




312 Bağ çürəntgisi – *Sylvia borin* – Садовая славка



313


314




313 Garabaşly çürəntgi – *Sylvia atricapilla*
– Черноголовая славка



314 Dağ çürəntgisi – *Sylvia althaea* – Горная славка




315




316




315 Akmurtly çürəntgi – *Sylvia mystacea*
– Белоусая славка




316 Çöl çürəntgisi – *Sylvia nana* – Пустынная славка




317




318




317 Yaşıl əldəvəç – *Phylloscopus trochiloides* – Зеленая пеночка



318 Şapak əldəvəç – *Phylloscopus inornatus* – Пеночка - зарничка



319




320




319 Dağşapakçası – *Phylloscopus humei* – Горная зарничка




320 Hindi əldəvəç – *Phylloscopus griseolus* – Индийская пеночка



321




322




321 Tifnillewik əldəvəç – *Phylloscopus collybita* – Пеночка - теньковка



322 Yazçı əldəvəç – *Phylloscopus trochilus* – Пеночка - весничка




323




324




323 Eýran aldawajy – *Phylloscopus neglectus* –
Иранская пеночка



324 Şalkyguýruk çürlentgi – *Scotocerca inquieta* –
Скотоцерка



325




326




325 Sarybaş hurmajyk – *Regulus regulus* –
Желтоголовый
королек



326 Jennet uzynguýruk siňekçi –
Terpsiphone paradisi –
Райская мухоловка



327




328




327 Çal siňekçi – *Muscivora striata* –
Серая мухоловка



328 Çurguýruk siňekçi – *Muscivora ruficauda* –
Рыжехвостая мухоловка



329



330, 331




329 Kіçi siňekçi – *Ficedula parva* –
Малая мухоловка



330 Alaja siňekçi – *Ficedula hypoleuca* –
Мухоловка-пеструшка



331 Akboýun siňekçi – *Ficedula albicollis* –
Мухоловка белшейка




332


333



332 Şaraksy – *Erithacus rubecula* – Зарянка




333 Günorta bilbili – *Luscinia megarhynchos* – Южный соловей



334


335



334 Adaty bilbil – *Luscinia luscinia* – Обыкновенный соловей



335 Gökdamak bilbil – *Luscinia svecica* – Варакушка




336


337



336 Akdamak bilbil – *Irania gutturalis* – Соловей-белошейка



337 Alaganat gyzylguyruk – *Phoenicurus erythronotus* – Красноспинная горихвостка



338


339



338 Garaja gyzylguyruk – *Phoenicurus ochruros* – Горихвостка-чернушка




339 Adaty gyzylguyruk – *Phoenicurus phoenicurus* – Обыкновенная горихвостка




340

341




342

343



344

345



346

347



ad. ♂


340 Çemen jakjaky – *Saxicola rubetra* – Луговой чекан




341 Garabaş jakjaky – *Saxicola torquatus* – Черноголовый чекан



342 Gara jakjaky – *Saxicola caprata* – Черный чекан



343 Boz çekeyik – *Oenanthe isabellina* – Каменка-плюсунья



344 Adaty çekeyik – *Oenanthe oenanthe* – Обыкновенная каменка




345 Sakar çekeyik – *Oenanthe pleschanka* – Каменка-пleshанка




346 Ala çekeyik – *Oenanthe hispanica* – Испанская каменка




347 Gara çekeyik – *Oenanthe picata* – Черная каменка




348




349




350




351




352



353




354



355



348 Garaboyun çəkeşik – *Oenanthe finschii*
– Черношейная каменка




349 Çöl çəkeşiyi – *Oenanthe deserti* – Пустынная каменка



350 Guzylguşruk çəkeşik – *Oenanthe chrysopygia*
– Златогузая каменка



351 Toğay bılılı – *Erythropgia galactotes*
– Туğайный соловей



352 Ala daş jökjöküsü – *Monticola saxatilis*
– Пестрый каменный дрозд




353 Gök daş jökjöküsü – *Monticola solitarius*
– Синий каменный дрозд



354 Gara jökjökü – *Turdus merula* – Черный дрозд




355 Gara petekeli jökjökü – *Turdus ruficollis*
– Краснозобый (темнозобый) дрозд




356

357




358

359



360

361



362

363




ad.

356 Ryabina jokjokysy – *Turdus pilaris* – Рябинник



ad.

357 Saýrak jokjoký – *Turdus philomelos* – Певчий дрозд



ad.

358 Akgaş jokjoký – *Turdus iliacus* – Белобровик



ad.

359 Ala jokjoký – *Turdus viscivorus* – Деряба



ad.

360 Ak petekeli jokjoký – *Turdus torquatus* – Белозобый дрозд




ad.


361 Gök jokjoký – *Myophonus caeruleus* – Синяя птица



362 Gyrymsy jikjikisi – *Garrulax lineatus* – Кустарница




363 Murtly gögümtil jikjiki – *Panurus biarmicus* – Усатая синица




364

365




366

367




368

369




370

371



ad.

364 Uzunguýruk gögümtil jikjiki – *Aegithalos caudatus*
– Длиннохвостая синица, или ополовник



ad. ♂

365 Züýk – *Remiz pendulinus* – Обыкновенный ремез



ad. ♂

366 Garabaşly züýk – *Remiz coronatus*
– Черноголовый ремез



367 Gysgaguýruk gögümtil jikjiki – *Parus ater*
– Черная синица, или московка




368 Сурарбойун jikjiki – *Parus rufonuchalis*
– Рыжешейная синица




ad.

369 Asman reňkli jikjiki – *Parus caeruleus*
– Обыкновенная лазоревка




ad.

370 Sary petekeli jikjiki – *Parus flavipectus*
– Желтогрудая лазоревка




ad.


371 Ak asman reňkli jikjiki – *Parus cyanus*
– Белая лазоревка




372




373




374




375




376




377



378



379



ad.

372 Uly gögümtil jikjiki - Parus major - Большая синица



373 Buhara jikjikisi - Parus bokharensis - Бухарская синица



374 Çal jikjiki - Parus cinereus - Серая синица



375 Uly gaýa daşdeşeni - Sitta tephronota - Большой скалистый поползень



376 Diwarguş - Tichodroma muraria - Стенолаз




377 Gimalay jüygüldewügi - Certhia himalayana - Гималайская пищуха




378 Öy serçesi - Passer domesticus - Домовый воробей




379 Hindi serçesi - Passer indicus - Индийский воробей




380




381




382




383




384



385



386



387



tomus I лето

380 Garadöş serçe – *Passer hispaniolensis*
– Испанский воробей



381 Sazak serçesi – *Passer ammodendri*
– Сахсаульный воробей



ad.

382 Meydan serçesi – *Passer montanus* – Полевой воробей



♂

♀

383 Çöl serçesi – *Passer simplex* – Пустынный воробей



ad.

384 Daş serçesi – *Petronia petronia* – Каменный воробей



ad.

385 Gysgabarmak serçe – *Petronia brachyactyla*
– Короткопалый воробей




♂

386 Ovgan yer serçesi – *Montifringilla theresae*
– Афганский земляной воробей




♂

387 Gar gırrığı – *Montifringilla nivalis* – Снежный выюрок




388

389




390

391




392

393




394

395




388 Üşegenje – *Fringilla coelebs* – Зяблик



389 Girrik – *Fringilla montifringilla* – Юрок




390 Gyzyl depeli girrik – *Serinus pusillus* – Красношапочный выюрок




391 Ýaşyl paltatumşyk – *Carduelis chloris* – Зеленушка



392 Saryganat – *Carduelis carduelis* – Щерол




393 Ýaşyl titil – *Carduelis spinus* – Чиж



394 Kendir guşy – *Carduelis cannabina* – Коноплянка




395 Dag çetçetesi – *Carduelis flavirostris* – Горная чечетка




396

397




398

399



400

401




402

403



396 Adaty çetçeti – *Carduelis flammea* – Обыкновенная чечетка




397 Yolkaçı girrik – *Loxia curvirostra* – Клест-еловик



398 Gyzylganat merjimek guşy – *Rhodopechys sanguineus* – Краснокрылый чечевичник



399 Mongol çöl pitpitsi – *Rhodopechys mongolicus* – Монгольский снегирь



400 Yoğunçüñk çöl pitpitsi – *Bucanetes githagineus* – Пустынный снегирь




401 Melemtil girrik – *Rhodopechus obsoletus* – Буланный вьюрок



402 Adaty merjimek – *Carpodacus erythrurus* – Обыкновенная чечевица




403 Arça merjimegi – *Carpodacus rhodochlamys* – Арчевая чечевица




404




405




406




407




408



409



410



411




404 Uzyngu'ruk pitpiti - *Uragus sibiricus*
- Длиннохвостый снегирь



405 Pitpiti - *Pyrrhula pyrrhula* - Снегирь




406 Paltatunşyk - *Coccothraustes coccothraustes*
- Обыкновенный дубонос



407 Arça paltatunşygy - *Mycerobas carniceps*
- Арчевый дубонос



408 Daryşy - *Miliaria calandra* - Просянка




409 Akdepeli süleçesi - *Emberiza leucoscephala*
- Белошапочная овсянка




410 Adaty süleçesi - *Emberiza citrinella*
- Обыкновенная овсянка




411 Styuartyn süleçesi - *Emberiza stewarti*
- Овсянка Стюарта




412




413




414




415




416



417



418



419



412 Dag süleşisi – *Emberiza cia* – Горная овсянка



413 Bag süleşisi – *Emberiza hortulana* – Садовая овсянка



414 Gağa süleşisi – *Emberiza buchanani* – Скальная овсянка



415 Gamyş süleşisi – *Emberiza schoeniclus* – Тростниковая овсянка



416 Garabaş süleşisi – *Emberiza melanocephala* – Черноголовая овсянка




417 Sary bilbil – *Emberiza bruniceps* – Желчная овсянка




418 Garapetekeli süleşisi – *Calcarius lapponicus* – Подорожник




419 Ala süleşisi – *Plectrophenax nivalis* – Пуночка



420




420 Süleçi-züyk – *Emberiza rustica* – Овсянка-ремез




421



421 Akegin süleçi – *Emberiza aureola* – Дубровник



422



422 Çal süleçi – *Emberiza cineracea* – Серая овсянка

Esasyalary:

Основная:

Дементьев Г.П. 1952. Птицы Туркменистана. – Т.1. – Ашхабад: АН ТССР. – 547 с.

Рустамов А.К. 1954. Птицы пустыни Каракум. – Ашхабад: АН ТССР. – 344 с.

Рустамов А.К. 1958. Птицы Туркменистана. – Т.2. – Ашхабад: АН ТССР. – 252 с.

Рустамов А.К. 2011. Животный мир Туркменистана и его охрана (на примере фауны позвоночных животных). На туркм. и русск. языках. – Ашхабад: Ылым. – 288 с.

Рустамов А.К., Ковшарь А.Ф. /Ред./ 2007. Птицы Средней Азии. – Т.1. – Алматы: СОПК. – 574 с.

Рябицев В.К., Ковшарь А.Ф., Ковшарь В.А., Березовиков Н.Н. 2014. Полевой определитель птиц Казахстана. – Алматы. – 512 с.

Флинт В.Е., Бёме Р.Л., Костин Ю.В., Кузнецов А.А. 1968. Птицы СССР (из серии: Справочники-определители географа и путешественника). – Москва: Мысль. – 637 с.

BIRD GUIDE by Lars Svensson, Peter J. Grant, Killian Mullarney & Dan Zetterstrom. 1999-2006. – London: Collins. – 400 p.

Porter, R. & Aspinall, S. 2010. Field Guide to the Birds of the Middle East (second edition). – Helm, London, UK. – 384 p.

Flint V.E., Boehme R.L., Kostin Y.V., Kuznetsov A.A. 1984. A Field Guide to Birds of Russia and Adjacent Territories. – Princeton University Press, USA. – 353 p.

Goşmaçalary:

Дополнительная:

Guşlar/Птицы/Aves. 2011 – Красная книга Туркменистана. На туркм., англ. и русск. языках. – Т.2. – Ашхабад: Ылым. – С. 207-297.

Rustamow E.A., Saparmyradow J.S., Welş J.R. we Brombaheer M. /red./ 2009. Türkmenistanyň möhüm ornitologik ýerleri. Aşgabat: Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi. - 197 s.

Guşlar/Птицы/Aves. 1999. Türkmenistanyň Gyzyt kitaby. Т. 1. Оňurgасыз we оňургалы haýwanlar. Gaýtadan işlenen we üsti ýetirilen 2-nji neşir. Aşgabat: Türkmenistan. – S. 202-290.

Ковшарь А.Ф., Ковшарь В.А. 2006. Птицы (из серии: Школьная энциклопедия, животные Казахстана). – Алматы. – 310 с.

Крейцберг-Мухина Е.А., Кашкаров Д.Ю., Лановенко Е.Н., Шерназаров Э.Ш., Перегонцев Е.А. 2005. Птицы водоемов Узбекистана и Центрально-Азиатского региона / Полевой определитель водно-болотных птиц. – Ташкент-Алматы. – 229 с.

Линьков А.Б. 2002. Охотничьи водоплавающие птицы России. – Москва. – 269 с.

Полевой определитель гусеобразных птиц России. 2011. - Москва - 219 с.
 Рустамов А.К. 1985. Гушлар/Птицы. – Красная книга Туркменской ССР. – Т.1. – Ашхабад: Туркменистан. – С. 105-208 с.
 Рустамов Э.А., Уэлш Д.Р., Бромбахер М. /Ред./ 2009. Ключевые орнитологические территории Туркменистана. – Ашхабад: Министерство охраны природы Туркменистана. – 198 с.
 Скляренко С.Л., Хроков В.В. /Ред./ 2008. Как наблюдать за птицами или как стать хорошим бёдвочером. – Алматы: АСБК. – 28 с.
 Шестоперов Е.Л. 1937. Определитель позвоночных животных Туркменской ССР. ПТИЦЫ. – Ашхабад-Баку: Туркменгосиздат. – 331 с.
 Raffael Aye, Manuel Schweizer and Tobias Roth. 2012. Birds od Central Asia (Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afganistan). – Princeton University Press: Princeton and Oxford. - 336 p.

Guşlaryň türkmençe atlaryny görkeziji	(sah.)	Ala gaz	73, 565
		Ala gazlar	72
		Ala sar	380, 625
Указатель туркменских названий птиц	(стр.)	Ala togan	371, 623
		Ala jokjoky	478, 647
		Ala jikjikiler	482
Adaty bilbil	446, 641	Alaboýun torgaý	341, 617
Adaty çekeýik	458, 643	Alaburun çerik	264, 601
Adaty çetçeti	529, 657	Alaganat gyzylguyruk	449, 641
Adaty çyrlak guş	404, 631	Ala süleçi	553, 662
Adaty gumry	290, 605	Alahekek	384, 627
Adaty gündizkör	311, 609	Alahekek-çuluk	212, 589
Adaty gyzylguyruk	452, 641	Alaja kekilli ördek	96, 569
Adaty ikatýok	296, 607	Almabaş ördek	88, 567
Adaty merjimek	534, 657	Alp dag owazçysyş	402, 629
Adaty olýapka	396, 629	Alp zakyja gargasy	386, 627
Adaty paltatumşyk	537, 659	Altynsow çuluk	199, 587
Adaty pitpiti	536, 657	Altynsow daraklyk	321, 611
Adaty saryganat	524, 655	Aňk	72, 565
Adaty süleçi	542, 659	Arça merjimegi	535, 657
Ak asman reňkli jikjiki	493, 649	Arça paltatumşugy	538, 659
Ak çarлак	258, 601	Aryçy	107, 571
Ak durna	170, 581	Asiýa koel ikatýogy	300, 607
Ak gulaty	125, 575	Asman reňkli jikjiki	491, 649
Ak hüwi	304, 609	Atgarlawaççekilliler	314
Ak leglek	53, 563	Atgarlawaçlar	314
Ak murtly çürlentgi	427, 637	Bag çürlentgisi	424, 635
Akdepeli süleçi	541, 659	Bag gamyşguşy	410, 631
Ak petekeli jokjoky	479, 647	Bag süleçisi	546, 661
Akarçeşme çulugy	235, 595	Bagyrtlak	277
Akboyun siňekçi	442, 639	Bagyrtlaklar	276
Akdamak bilbil	448, 641	Balykçy bürgüt	106, 571
Akganat çerik	273, 603	Batga çulugy	220, 591
Akganat daşdeşen	326, 613	Batga gamyşguşy	413, 633
Akganat torgaý	313, 617	Batga hüwüsi	309, 609
Akgaryn atgarlawajy	317, 611	Baýguşçekilliler	300
Akgaş jokjoky	477, 647	Baýguşlar	301
Akguýruk çäge çulugy	217, 591	Baýguş	305, 609
Akguýruk suw bürgüdi	112, 573	Bedene	162, 581
Akegin süleçi	553, 662	Bedeneçi gyrgy	128, 575
Akyaňak çerik	270, 603	Bezbeltek	184, 585
Ala çekeýik	461, 643	Bezegli bezziltik	204, 589
Ala daş jokjokysy	469, 645	Bezemen çuluk	233, 595
Ala garga	390, 627	Bezziltik	205, 589

Bilbil çyrlak guşy	406, 631	Çyparbaş laçyn	153, 579	Gamaburun	51, 561	Garlawaç pisint çemen çulugy	247, 597
Bizçüňkliler	209	Çyparboýun jikjiki	490, 649	Gamaburunlylar	50	Garlawaç pisint sähra çulugy	248, 597
Bizçüňk çuluk	210, 589	Çyparguýruk siňekçi	440, 639	Gamyş (batga) gulatysy	121, 573	Garlawaçlar	330
Boguk hüwi	308, 609	Çyparguýruk togan	365, 623	Gamyşguşy	412, 633	Gaýa garlawajy	331, 615
Boz çekeýik	456, 643	Dag atjagazy	357, 621	Gamyş süleçisi	548, 661	Gaýa kepderisi	286, 605
Buhara jikjikisi	496, 651	Dag (dere) hindi towugy	158, 581	Gar girrigi	516, 653	Gaýa süleçisi	547, 661
Bukanja ýelbe	173, 583	Dag aldawajy	430, 637	Gara atgarlawaç	315, 611	Gazlar	65
Buýraly gotan	33, 559	Dag garlawajy	336, 615	Gara depeli tekejyllyk	203, 589	Gazsekilliler	58
Bürgüt	139, 577	Dag çetçetisi	528, 655	Gara çaykel	110, 571	Geçiguşlar	352
Çage çulugy	214, 591	Dag çürlentgisi	426, 635	Gara çekeýik	462, 643	Geçiguş	362, 621
Çakyryk	190, 585	Dag goýunguşy	361, 621	Gara çerik	272, 603	Gimalaý jüýgüldewügi	501, 651
Çakyryklar	189	Dag meýnesy	377, 625	Gara garga	389, 627	Girrikler	515
Çal çarлак	554, 662	Dag süleçisi	545, 661	Gara jakjaky	455, 643	Girrik	520, 655
Çal çürlentgi	423, 635	Daraklyklar	320	Gara jokjoky	472, 645	Goňur kepderi	284, 605
Çal durna	169, 581	Daryçy	540, 659	Gara leglek	54, 563	Goňurarka çuluk	238, 595
Çal jikjiki	497, 651	Daş dörüji çuluk	207, 589	Gara maňlaýly togan	370, 623	Goňurganat çuluk	200, 587
Çal ördek	77, 565	Daş garlawajy	335, 615	Gara ördek	91, 567	Gorçy	103, 571
Çal siňekçi	438, 639	Daş serçesi	512, 653	Gara petekeli ýogla	20, 557	Gorçylar	103
Çal süleçi	554, 662	Daşajy çuluk	241, 597	Gara petekli jokjoky	473, 645	Gotanlar	32
Çal torgaý	345, 617	Daşdeşenler	498	Gara petekeli süleçi	552, 661	Gotanşekilliler	31
Çalymtyl çuluk	239, 595	Dazzarkel	119, 573	Gara petekeli çuluk	219, 591	Goýunguş	359, 621
Çalymtyl hüwi	307, 607	Demirgazyk kebezi	193, 585	Gara sar	378, 625	Gökgarga	318, 611
Çalyñaňak tersaýak	25, 557	Deňiz çäge çulugy	220, 591	Gara torgaý	343, 617	Gökgargalar	318
Çarlaklar	250	Deňiz kebezi	194, 585	Gara zag	385, 627	Gögargaşekilliler	317
Çekçeki	416, 633	Deňizçi ala ördek	96, 569	Garabaş süleçi	550, 661	Gögebakar	39, 559
Çemen atjagazy	355, 619	Deňizçi çarlaklar	249	Garabaş çarлак	253, 599	Gögerçin	283, 605
Çemen jakjakysy	453, 643	Depe syçançysy	133, 575	Garabaş jakjaky	454, 643	Gögümtil jikjikiler	484
Çerikler	261	Derya çerigi	267, 601	Garabaşly çürlentgi	425, 635	Gögümtil ördek	96, 569
Çil käkilik	161, 581	Derýa çyrlak guşy	405, 631	Garabaşly gülegen çarлак	251, 599	Gök bähri	154, 579
Çitçitiler	397	Derýa ördekleri	75	Garabaşly züýk	488, 649	Gök daş jokjoky	471, 645
Çitçiti guşy	397, 629	Diwarguş	499, 651	Garaboýun çekeýik	463, 645	Gök hokgar	47, 561
Çöl çekeýigi	465, 645	Doňuzguşşekilliler	324	Garaboýun tersaýak	28, 557	Gök jokjoky	480, 647
Çöl çürlentgisi	428, 637	Doňuzguşlar	325	Garaçüňk çerik	262, 601	Gökdamak bilbil	447, 641
Çöl gargasy	391, 627	Dulanan goýunguş	364, 621	Garaçüňk gaz	71, 565	Göwenek	145, 579
Çöl serçesi	510, 653	Durnalar	168	Garadamak owazçy	401, 629	Göýdük garaguş	141, 577
Çöl torgaýy	337, 615	Durnaşekilliler	167	Garadöş serçe	506, 653	Guba gaz	69, 565
Çuluk-alahekekler	211	Dykydyky	281, 603	Garaja gyzylguýruk	450, 641	Guwlar	59
Çuluklar	191	Ebek	223, 593	Garajagazlar	35	Gülgüne çarлак	261, 601
Çulukşekilliler	188	Ebekler	213	Garamtyl billi kepderi	286, 605	Gülegen çarлак	260, 601
Çümýän ördekler	87	Egriçüňk çuluk	240, 597	Garamtyl deňiz ördegi	95, 569	Gündizkörler	311
Çürçüri	383, 625	Ekinçi garga	387, 627	Garamtylarka çarлак	258, 601	Gündizkörşekilliler	310
Çürlentgiler	403	Ekinçi ördek	86, 567	Garçygaý	127, 575	Günorta bilbili	444, 641
Çypar hokgar	49, 561	Eýran aldawajy	433, 639	Gargalar	383	Gylguýruk	279, 603
Çypar ýelbe	178, 583	Gajar	117, 573	Garlawaç pisint çuluklar	245	Gylguýruk ördek	82, 567

Gyrgypisintli çürlentgi	420, 635	Inçeçüňk torgaý	347, 617	Kösükpisint gaz	65, 563	Sarlar	376
Gyrgy pisint garaguş	142, 577	Island çäge çulugy	213, 589	Laçynşekilliler	105	Sary hokgar	42, 559
Gyrgylar	107	Jennet uzynguýruk siňekçi	437, 639	Laçynlar	143	Sary petekeli jikjiki	492, 649
Gyrymsy jikjikisi	483, 647	Jikjikiler	486	Laçyn – ser. ütelgi		Sarybaş goýunguş	360, 621
Gysgabarmak serçe	513, 653	Jokjoky sypatly gamyşguşy	414, 633	Leglekler	53	Sarybaş patyşajyk	435, 639
Gysgaguýruk gögümtil jikjiki	489, 649	Jokjokylar	443	Leglekşekilliler	38	Sary bilbil (sary süleçi)	551, 661
Gyzgylt gotan	32, 559	Jüptün ördekler	99	Martyn – ser. gülegen çarлак		Saýrak çürlentgi	421, 635
Gyzyl aýajykly çuluk	234, 595	Jüýgüldekler	501	Maslykçy	115, 573	Saýrak jokjoky	476, 647
Gyzylbaşly togan	374, 623	Jüýje ýelbe	177, 583	Mazar garaguşy	138, 577	Sazak serçesi	508, 653
Gyzyl depeli girrik	521, 655	Jygaly ördek	98, 569	Melemtil girrik	533, 657	Senegal bagyrtlagy	282, 603
Gyzylganat merjimek guşy	530, 657	Kaçkaldak – ser. sakarbarak		Melemtil gündizkör	313, 609	Serçe-çuluk	215, 591
Gyzyl gaz	57, 561	Kaşykburun	50, 561	Melemtil sary hüwüjik	302, 607	Serçeşekilliler	328
Gyzyl petekeli atjagaz	356, 621	Kawguş	41, 559	Menekli owazçy	400, 629	Serçeler	502
Gyzyl petekeli gaz	71, 565	Käkilik	159, 581	Meýdan atjagazy	353, 619	Sähra atjagazy	354, 619
Gyzyl petekeli ýogla	19, 557	Käte alaja siňkçi	442, 639	Meýdan gulatysy	123, 573	Sähra garaguşy	137, 577
Gyzyl petekeli je çuluk	218, 591	Kekilli garamtyl ördek	93, 569	Meýdan serçesi	509, 653	Sähra göwenegi	144, 579
Gyzyl togan	366, 623	Kel guşy – ser. maslykçy		Meýdan torgaýy	349, 619	Sähra gulatysy	124, 575
Gyzylbaş garamtyl ördek	89, 567	Kenar garlawajy	330, 615	Meýne	380, 625	Sähra torgaýy	340, 617
Gyzylboýun tersaýak	27, 557	Kendir guşy	527, 655	Mollatorgaý	338, 615	Siňekçiler	436
Gyzylganat merjimek guşy	530, 657	Kepderi pisintli deňiz çarlagy	256, 599	Mongol çöl pitpitisi	531, 657	Solgun şygşygy	418, 633
Gyzylgazlar	57	Kepderiçi laçyn	147, 579	Mongol kebezi	198, 587	Soltantowuk	181, 583
Gyzylgazşekilliler	55	Kepderiler	283	Murtly gögümtil jikjiki	484, 647	Sohra (sykylykçy guw)	63, 563
Gyzylguýruk çekeýik	466, 645	Kepderişekilliler	275	Musaýyja (kiçi) gumry	293, 605	Stýuartnyň süleçisi	543, 659
Gyzylinjik	209, 589	Ker ikatýok	298, 607	Müsür hokgary	44, 561	Suw towuklary	172
Hakgey	38, 559	Kiçi ak hokgar	46, 561	Oba garlawajy	333, 615	Suw towugy	179, 583
Hal kepderi	287, 605	Kiçi atgarlawaç	316, 611	Olýapkalar	396	Süleçiler	539
Halkaly gumry	289, 605	Kiçi çarak	253, 599	Orta çarлак	251, 599	Süleçi-züýk	553, 662
Hazar kebezi	197, 587	Kiçi çekçeki	417, 633	Orta ýylkyçy	230, 593	Sülgünler	158
Hindi aldawjy	430, 637	Kiçi çerik	269, 603	Otagaly hüwi	308, 609	Sülgün	164, 581
Hindi gamyşguşy	409, 631	Kiçi garaguşjyk	137, 577	Owadan (akbaş) durna	171, 583	Sütler	319
Hindi gyzył togany	373, 623	Kiçi garajagaz	36, 559	Owazçy çürlentgi	422, 635	Süti	319, 611
Hindi sary – ser. meýne		Kiçi guwy	62, 563	Owazçylar	398	Syçançy	132, 575
Hindi serçesi	504, 651	Kiçi gyrgy	147, 579	Owgan ýer serçesi	516, 653	Sykylykçylar	393
Hindi ütelgisi	155, 579	Kiçi ikatýok	300, 607	Öý serçesi	503, 651	Sykylykçy	394, 629
Hokgarlar	38	Kiçi ikburun	229, 593	Posly çarлак	251, 599	Sykylykçy gyrgy	130, 575
Hüpükli ikatýok	300, 607	Kiçi jüptün ördek	99, 569	Rýabina jokjokysy	474, 647	Sykylykçy hüwüjik	301, 607
Hüwi	303, 607	Kiçi kebez	191, 585	Sakar çekeýik	460, 643	Sykylykçy jünekeý	78, 565
Hüypüpikler	323	Kiçi meýdan torgaýy	350, 619	Sakarbarak	182, 585	Şahlyja torgaý	351, 619
Hüypüpik	323, 613	Kiçi sakar gaz	68, 563	Sakarja ördek	75, 565	Şalkyboýun guş	325, 613
Ikatýoklar	296	Kiçi siňekçi	441, 639	Sakaw çarлак	266, 601	Şalkyguýruk çürlentgi	434, 639
Ikatýokşekilliler	295	Kiçi suw towugy	176, 583	Sakgally garaguş	64, 573	Şapak aldawajy	429, 637
Ikburun ýüzegenje	243, 597	Kiçi tersaýak	22, 557	Sapak guýrukly garlawaç	332, 615	Şapakçy	443, 641
Inçe çüňkli ýylkyçy	231, 595	Kiçi torgaý	343, 617	Sargyldaklar	374	Şorluk torgaýy	346, 617
Inçeçüňk gamyşguşy	407, 637	Köl çarlagy	254, 599	Sargyldak	375, 625	Şygyrdawuk çuluk	198, 587

Takyryorga	245, 597	Uly tersaýak	24, 557
Tamdyra ördegi	85, 567	Uly ulit çulugy	237, 595
Tauty (gyzylçunk guw)	59, 563	Uly ýylkыçy	232, 595
Tekejlylyk	202, 587	Uzynçüňkli jüptün ördek	101, 571
Teñňe nagyşly daşdeşen	328, 613	Uzynguýruk çarlak	251, 599
Tersaýaklar	22	Uzyn guýruk jikjikiler	485
Tersaýakşekilliler	21	Uzynguýruk gögümtil jikjiki	485, 649
Tiňňillewüjik aldawaç	431, 637	Uzynguýruk pitpiti	536, 659
Toganlar	364	Uzynguýruk suw bürgüdi	111, 571
Toganpisintli sykylykыçy	395, 629	Uzynguýruk togan	369, 623
Togdary	187, 585	Üşegen bürgütler	106
Tokaý atjagazy	354, 619	Üşegenje	518, 655
Tokaý bilbili	467, 645	Ütelgi	151, 579
Tokaý ebegi	227, 593	Ýakaly çuluk	222, 591
Tokaý torgaýy	348, 619	Ýasyburun ýüzegenje	244, 597
Tokaý owazçysy	399, 629	Ýaşyl aldawaç	429, 637
Toklutaý	186, 585	Ýaşyl daraklyk	322, 611
Toklutaýlar	183	Ýaşyl daşdeşen	326, 613
Torgaýlar	337	Ýaşyl paltatumşuk	522, 655
Torsujak gamyşguşy	408, 631	Ýaşyl şygşygy	417, 633
Towukşekilliler	156	Ýaşyl tiltil	525, 655
Tules çulugy	201, 587	Ýaşylbaş	80, 567
Turaç	166, 581	Ýaşyryn togan	367, 623
Turlutaý	149, 579	Ýazçy aldawaç	432, 637
Türküstan gamyşguşy	415, 633	Ýaýbaň güýruk gamyşguşy	403, 631
Tüýlek aýakly syçançy	135, 577	Ýelbe (suw towugy)	174, 583
Tüýs ebek	222, 593	Ýewropa sykylykыçy gyrgysy	129, 575
Uly ak hokgar	45, 561	Ýoglalar	19
Uly ala daşdeşen	326, 613	Ýoglaşekilliler	19
Uly çalymtyl çarlak	258, 601	Ýogynçüňk çöl pitpitisi	531, 657
Uly dag ebegi	226, 593	Ýogynçüňk kebez	195, 587
Uly gara ördek	97, 569	Ýolkaçy girrik	529, 657
Uly garaguşjyk	136, 577	Ýylançy gyrgy	120, 573
Uly garajagaz	35, 559	Zakýja garga	386, 627
Uly garga	392, 627	Züýk	487, 649
Uly gaýa daşdeşeni	498, 651		
Uly gögümtil jikjiki	494, 651		
Uly gumry	292, 605		
Uly ikburun	228, 593		
Uly jeñňel ebegi	225, 593		
Uly jünekey ördek	84, 567		
Uly jüptün ördek	102, 571		
Uly sakar gaz	66, 563		
Uly şygşygy	419, 635		

Guşlaryň latynça atlaryny görkeziji

Указатель латинских названий птиц

	(sah.)	Anser erythropus	68, 563
		Anser fabalis	65, 563
		Anseriformes	58
		Anserinae	65
	(стр.)	Anthus campestris	353, 619
		Anthus cervinus	356, 621
		Anthus pratensis	355, 619
		Anthus richardi	354, 619
		Anthus spinoletta	357, 621
		Anthus trivialis	354, 619
		Apodiformes	314
		Apodidae	314
		Apus affinis	316, 611
		Apus apus	314, 611
		Aquila chrysaetos	139, 577
		Aquila clanga	136, 577
		Aquila heliaca	138, 577
		Aquila nipalensis	137, 577
		Ardeidae	38
		Ardea cinerea	47, 561
		Ardea purpurea	49, 561
		Ardeola ralloides	42, 559
		Arenaria interpres	207, 589
		Asio flammeus	309, 609
		Asio otus	308, 609
		Athene noctua	305, 609
		Aythya ferina	89, 567
		Aythya fuligula	93, 569
		Aythya marila	95, 569
		Aythya nyroca	91, 567
		Aythiinae	87
		Bombycillidae	393
		Bombycilla garrulus	394, 629
		Botaurus stellaris	38, 559
		Branta ruficollis	71, 565
		Bubo bubo	303, 607
		Bubo scandiaca	304, 609
		Bubulcus ibis	44, 561
		Bucanetes githagineus	531, 657
		Bucephala clangula	98, 569
		Burhinidae	189
		Burhinus oediconemus	190, 585
		Buteo buteo	132, 575
		Buteo lagopus	135, 577
		Accipitridae	107
		Accipiter badius	130, 575
		Accipiter brevipes	129, 575
		Accipiter gentiles	127, 575
		Accipiter nisus	128, 575
		Acridotheres tristis	380, 625
		Acrocephalus agricola	409, 631
		Acrocephalus arundinaceus	414, 633
		Acrocephalus dumetorum	410, 631
		Acrocephalus melanopogon	407, 631
		Acrocephalus palustris	413, 633
		Acrocephalus schoenobaenus	408, 631
		Acrocephalus scirpaceus	412, 633
		Acrocephalus stentoreus	415, 633
		Actitis hypoleucos	241, 597
		Aegithalidae	485
		Aegithalos caudatus	485, 649
		Aegypius monachus	117, 573
		Alaudidae	337
		Alauda arvensis	349, 619
		Alauda gulgula	350, 619
		Alcedinidae	319
		Alcedo atthis	319, 611
		Alectoris chukar	159, 581
		Ammomanes deserti	337, 615
		Ammoperdix griseogularis	161, 581
		Anatinae	75
		Anas acuta	82, 567
		Anas clypeata	85, 567
		Anas crecca	78, 565
		Anas falcata	96, 569
		Anas querquedula	84, 567
		Anas penelope	75, 565
		Anas platyrhynchos	80, 567
		Anas strepera	77, 565
		Anser albifrons	66, 563
		Anser anser	69, 565
		Anser cygnoides	71, 565

Buteo rufinus	133, 575	Ciconia ciconia	53, 563	Egretta garzetta	46, 561	Gallinago solitaria	226, 593
Bucanetes githagineus	532, 657	Ciconia nigra	54, 563	Emberizidae	539	Gallinula chloropus	179, 593
Calandrella acutirostris	347, 617	Cinclidae	396	Emberiza aureola	553, 662	Garrulax lineatus	482, 647
Calandrella brachydactyla	144, 617	Cinclus cinclus	396, 629	Emberiza bruniceps	551, 661	Gaviiformes	19
Calandrella cheleensis	346, 617	Circaetus gallicus	120, 573	Emberiza buchanani	547, 661	Gaviidae	19
Calandrella rufescens	345, 617	Circus aeruginosus	121, 573	Emberiza rustica	553, 662	Gavia arctica	20, 557
Colchicus lapponicus	552, 661	Circus cyaneus	123, 573	Emberiza cia	545, 661	Gavia stellata	19, 557
Calidris alba	214, 591	Circus macrourus	124, 575	Emberiza cineracea	554, 662	Glareolidae	245
Calidris alpina	219, 591	Circus pygargus	125, 575	Emberiza citrinella	543, 659	Glareola nordmanni	248, 597
Calidris canutus	213, 589	Clamator glandarius	300, 607	Emberiza hortulana	546, 661	Glareola pratincta	247, 597
Calidris ferruginea	218, 591	Clangula hyemalis	96, 569	Emberiza leucocephala	542, 659	Gruiformes	167
Calidris maritima	220, 591	Coccothraustes coccothraustes	537, 659	Emberiza schoeniclus	548, 661	Gruidae	168
Calidris minuta	215, 591	Columbidae	282	Emberiza stewarti	543, 659	Grus grus	169, 581
Calidris temminckii	217, 591	Columbiformes	275	Eremopsaltria mangolicus	531, 657	Grus leucogeranus	171, 581
Caprimulgiformes	310	Columba eversmanni	284, 605	Eremophila alpestris	351, 619	Grus virgo	171, 583
Caprimulgidae	311	Columba livia	283, 605	Erithakus rubecula	443, 641	Gypaetus barbatus	114, 573
Caprimulgus aegyptius	313, 609	Columba oenas	287, 605	Erythropygia galactotes	467, 645	Gyps fulvus	119, 573
Caprimulgus europaeus	311, 609	Columba palumbus	288, 605	Eudromias morinellus	198, 587	Haematopodidae	211
Carduelis cannabina	526, 655	Columba rupestris	286, 605	Eudynamis scolopaceus	300, 607	Haematopus ostralegus	212, 589
Carduelis carduelis	523, 655	Coraciiformes	317	Falco cherrug	151, 579	Haliaeetus albicilla	112, 573
Carduelis chloris	522, 655	Coraciidae	318	Falco columbarius	147, 579	Haliaeetus leucoryphus	111, 571
Carduelis flammea	529, 657	Coracias garrulus	318, 611	Falco jugger	155, 579	Hieraaetus fasciatus	142, 577
Carduelis flavirostris	528, 655	Corvidae	382	Falco naumanni	144, 579	Hieraaetus pennatus	141, 577
Carduelis spinus	525, 655	Corvus corax	392, 627	Falco pelegrinoides	154, 579	Himantopus himantopus	209, 589
Carpodacus erythrinus	534, 657	Corvus cornix	390, 627	Falco peregrinus	155, 579	Hippolais caligata	416, 633
Carpodacus rhodochlamys	535, 657	Corvus corone	389, 627	Falco subbuteo	149, 579	Hippolais icterina	417, 633
Casmerodius albus	45, 561	Corvus frugilegus	387, 627	Falco tinnuculus	145, 579	Hippolais languida	419, 635
Certhiidae	500	Corvus monedula	386, 627	Falco vespertinus	147, 579	Hippolais pallida	418, 633
Certhia himalayana	501, 651	Corvus ruficollis	391, 627	Falconidae	143	Hippolais rama	417, 633
Cettia cetti	403, 631	Coturnix coturnix	162, 581	Falconiformes	105	Hipocolius ampelinus	395, 629
Charadriiformes	188	Crex crex	178, 583	Fasianidae	157	Hirundinidae	330
Charadriidae	191	Cuculiformes	295	Ficedula albicollis	442, 639	Hirundo daurica	335, 615
Charadrius alexandrinus	194, 585	Cuculidae	296	Ficedula parva	441, 639	Hirundo rupestris	331, 615
Charadrius asiaticus	197, 587	Cuculus canorus	296, 607	Ficedula hypoleuca	442, 639	Hirundo rustica	333, 615
Charadrius dubius	192, 585	Cuculus poliocephalus	300, 607	Francolinus francolinus	166, 581	Hirundo smithii	332, 615
Charadrius hiaticula	193, 585	Cuculus saturatus	298, 607	Fringillidae	515	Ibididae	50
Charadrius leschenaultii	195, 587	Cursorius cursor	246, 597	Fringilla coelebs	519, 655	Irania gutturalis	448, 641
Charadrius mongolus	198, 587	Cygninae	59	Fringilla montifringilla	520, 655	Ixobrychus minutus	39, 559
Chlamydotis undulata	187, 585	Cygnus columbianus (bewickii)	62, 563	Fulica atra	182, 585	Jynx torquilla	325, 613
Chlidonias hybrida	270, 603	Cygnus cygnus	63, 563	Galerida cristata	338, 615	Laniidae	364
Chlidonias leucopterus	273, 603	Cygnus olor	59, 563	Galliformes	156	Lanius collurio	366, 623
Chlidonias niger	272, 603	Delichon urbica	336, 615	Gallinago gallinago	223, 593	Lanius excubitor	371, 623
Ciconiiformes	38	Dendrocopos leucopterus	326, 613	Gallinago media	225, 593	Lanius isabellinus	365, 623
Ciconiidae	53	Dendrocopos major	326, 613			Lanius minor	376, 623

Lanius nubicus	367, 623	Montifringilla nivalis	516, 653	Parus cyanus	493, 649	Platalea leucorodia	50, 561
Lanius schach	369, 623	Montifringilla theresae	516, 653	Parus flavipectus	492, 649	Plegadis falcinellus	51, 561
Lanius senator	375, 623	Motacillidae	352	Parus major	494, 651	Plectrophenax nivalis	553, 662
Lanius vittatus	374, 623	Motacilla alba	362, 621	Parus rufonuchalis	490, 649	Pluvialis apricaria	299, 587
Laridae	250	Motacilla cinerea	361, 621	Passeriformes	328	Pluvialis fulva	200, 587
Larus cachinnans	260, 601	Motacilla citreola	360, 621	Passeridae	502	Pluvialis squatarola	201, 587
Larus canus	258, 601	Motacilla flawa	359, 621	Passer ammodendri	508, 653	Podicipediformes	21
Larus fuscus	258, 601	Motacilla personata	363, 621	Passer domesticus	503, 651	Podicipedidae	22
Larus genei	256, 599	Muscicapide	436	Passer hispaniolensis	506, 653	Podiceps auritus	27, 557
Larus hyperboreus	558, 661	Muscicapa striata	438, 639	Passer indicus	504, 651	Podiceps cristatus	24, 557
Larus ichthyaetus	251, 599	Muscikapa ruficauda	440, 639	Passer montanus	509, 653	Podiceps grisegena	25, 557
Larus melanocephalus	253, 599	Mycerobas carnipes	538, 659	Passer simplex	510, 653	Podiceps nigricollis	28, 557
Larus minutus	253, 599	Myophonus caeruleus	480, 647	Pelecaniformes	31	Podoces panderi	383, 625
Larus ridibundus	254, 599	Neophron percnopterus	115, 573	Pelecanidae	32	Porphyrio porphyrio	181, 583
Limicola falcinellus	221, 591	Netta rufina	88, 567	Pelecanus crispus	33, 559	Porzana parva	176, 583
Limosa lapponica	219, 593	Numenius arquata	232, 595	Pelecanus onocrotalus	32, 559	Porzana porzana	174, 583
Limosa limosa	228, 593	Numenius phaeopus	230, 593	Pernis apivorus	107, 571	Porzana pusilla	177, 583
Locustella fluviatilis	405, 631	Numenius tenuirostris	231, 595	Petronia brachydactyla	513, 653	Prunellidae	398
Locustella luscinioides	406, 631	Nycticorax nycticorax	41, 559	Petronia petronia	512, 653	Prunella atrogularis	401, 629
Locustella naevia	404, 631	Oenanthe deserti	463, 645	Phalacrocoracidae	35	Prunella collaris	402, 629
Loxia curvirostra	529, 657	Oenanthe finschii	464, 645	Phalacrocorax carbo	35, 559	Prunella modularis	399, 629
Lullula arborea	348, 619	Oenanthe hispanica	461, 643	Phalacrocorax pygmeus	36, 559	Prunella ocularis	400, 629
Luscinia luscinia	446, 641	Oenanthe isabellina	456, 643	Phalaropus fulicarius	244, 597	Pteroklidae	276
Luscinia megarhynchos	444, 641	Oenanthe oenanthe	458, 643	Phalaropus lobatus	243, 597	Pterokles alhata	279, 603
Luscinia svecica	447, 641	Oenanthe pikata	462, 643	Phasianus colchicus	164, 581	Pterokles orientalis	277, 603
Lymnocyptes minimus	222, 593	Oenanthe pleschanka	460, 643	Philomachus pugnax	221, 591	Pterokles senegallus	282, 603
Marmaronetta angustirostris	86, 567	Oenanthe chrysopygia	466, 645	Phoenicopteriformes	55	Pyrrhula pyrrhula	536, 657
Melanitta fusca	97, 569	Oriolidae	375	Phoenicopteridae	57	Pyrrhula graculus	386, 627
Melanitta nigra	96, 569	Oriolus oriolus	375, 625	Phoebicopterus roseus	57, 561	Pyrrhorax pyrrhorax	385, 627
Melanocorypha bimaculata	341, 617	Otididae	183	Phoenicurus erythronotus	449, 641	Rallidae	172
Melanocorypha calandra	340, 617	Otis tarda	186, 585	Phoenicurus ochruros	450, 641	Rallus aquaticus	173, 583
Melanocorypha leucoptera	342, 617	Otus brucei	302, 607	Phoenicurus phoenicurus	452, 641	Recurvirostriidae	209
Melanocorypha yeltoniensis	343, 617	Otus scops	301, 607	Phylloscopus collybita	431, 637	Recurvirostra avosetta	210, 589
Merginae	99	Oxyura leucocephala	103, 571	Phylloscopus griseolus	430, 637	Regulidae	435
Mergellus albellus	99, 569	Oxyurinae	103	Phylloscopus humei	430, 637	Regulus regulus	435, 639
Mergus merganser	102, 571	Pandion haliaetus	106, 571	Phylloscopus inornatus	429, 637	Remiz coronatus	488, 649
Mergus serrator	101, 571	Pandionidae	106	Phylloscopus neglectus	433, 639	Remiz pendulinus	487, 649
Meropidae	320	Panuridae	484	Phylloscopus trochiloides	429, 637	Rhodopechys obsoletus	533, 657
Merops apiaster	321, 611	Panurus biarmicus	484, 647	Phylloscopus trochilus	432, 637	Rhodopechys sanguinea	530, 657
Merops persicus	322, 611	Paridae	486	Pica pica	384, 627	Rhodostethia rosea	261, 601
Milaria calandra	540, 659	Parus ater	489, 649	Piciformes	324	Riparia riparia	330, 615
Milvus migrans	110, 571	Parus bokharensis	496, 651	Picidae	325	Saxicola caprata	455, 643
Monticola saxatilis	469, 645	Parus cinereus	497, 651	Picus squamatus	328, 613	Saxicola rubetra	453, 643
Monticola solitarius	470, 645	Parus caeruleus	491, 649	Picus viridis	326, 613	Saxicola torquatus	454, 643

Scolopacidae	213	Tetraogallus caspius	157, 581
Scolopax rusticola	227, 593	Tetrax tetrax	184, 585
Scotocerca inquieta	434, 639	Tichodroma muraria	549, 651
Serinus pusillus	521, 655	Timeliidae	482
Sittidae	498	Tringa erythropus	233, 595
Sitta tephronota	498, 651	Tringa glareola	239, 595
Stercorariidae	249	Tringa nebularia	237, 595
Stercorarius longicaudus	250, 599	Tringa ochropus	238, 595
Stercorarius parasiticus	250, 599	Tringa stagnatilis	235, 595
Stercorarius pomarinus	250, 599	Tringa totanus	234, 595
Sternidae	261	Troglodytidae	397
Sterna albifrons	269, 603	Troglodytes troglodytes	397, 629
Sterna caspia	266, 601	Turdidae	443
Sterna hirundo	267, 601	Turdus iliacus	477, 647
Sterna nilotica	262, 601	Turdus merula	472, 645
Sterna sandvicensis	264, 601	Turdus philomelos	476, 647
Streptopelia decaocto	289, 605	Turdus pilaris	474, 647
Streptopelia orientalis	292, 605	Turdus ruficollis	473, 645
Streptopelia senegalensis	293, 605	Turdus torquatus	479, 647
Streptopelia turtur	290, 605	Turdus viscivorus	478, 647
Strigiformes	300	Tytonidae	308
Strigidae	301	Tyto alba	308, 609
Strix aluco (nivicola)	307, 609	Upupidae	323
Sturnidae	376	Upupa epops	323, 613
Sturnus pagodarum	377, 625	Uragus sibiricus	536, 659
Sturnus roseus	379, 625	Vanellus gregarius	203, 589
Sturnus vulgaris	377, 625	Vanellus indicus	205, 589
Sylviidae	403	Vanellus leucurus	202, 587
Sylvia althaea	426, 635	Vanellus vanellus	205, 589
Sylvia atricapilla	425, 635	Xenus cinereus	240, 597
Sylvia borin	424, 635		
Sylvia communis	423, 635		
Sylvia curruca	422, 635		
Sylvia hortensis	421, 635		
Sylvia mystacea	427, 637		
Sylvia nana	428, 637		
Sylvia nisia	420, 635		
Syrrhaptes paradokus	281, 603		
Tachybaptus ruficollis	22, 557		
Tachymarptis melba	317, 609		
Tadorna ferruginea	72, 565		
Tadorna tadorna	73, 565		
Tadorninae	72		
Terpsiphone paradisi	437, 639		

Guşlaryň rusça atларыny görkeziji	(sah.)	Воробей пустынный	510, 653
		Воробей саксаульный	508, 653
		Врановые	382
Указатель русских названий птиц	(стр.)	Ворон обыкновенный	392, 627
		Ворон пустынный	391, 627
		Ворона серая	390, 627
		Ворона черная	389, 627
Авдотка	190, 585	Воронок	336, 615
Авдотки	189	Выпь большая	38, 559
Аистообразные	38	Выпь малая	39, 559
Аистовые	53	Вьюрковые	515
Аист белый	53, 561	Вьюрок – см. юрок	
Аист черный	54, 563	Вьюрок буланный	533, 657
[Афганка] - см. нырок красноносый		Вьюрок красношапочный	521, 655
Баклановые	35	Вьюрок снежный	516, 653
Баклан большой	35, 559	Вяхирь	287, 605
Баклан малый	36, 559	Гагарообразные	19
Балобан	151, 579	Гагаровые	19
Бегунок	245, 597	Гагара краснозобая	19, 557
Бекас	223, 593	Гагара чернозобая	20, 557
Бекасовые	213	Галка	386, 627
Белоголовый сип	119, 573	Галка альпийская	387, 627
Белохвостая пигалица	202, 587	Гаршнеп	222, 593
Беркут	139, 577	Гоголь обыкновенный	98, 569
Большой подорлик	136, 577	Голубеобразные	275
Большой улит	237, 595	Голубиные	282
Бормотушка большая	419, 635	Голубь бурый	284, 605
Бормотушка северная	416, 633	Голубь сизый	283, 605
Бормотушка южная	417, 633	Голубь скалистый	286, 605
Бородач	114, 573	Горихвостка красноспинная	449, 641
Бургомистр	258, 601	Горихвостка обыкновенная	452, 641
Вальдшнеп	227, 593	Горихвостка-чернушка	450, 641
Варакушка	447, 641	Горлица малая	293, 605
Веретенник большой	228, 593	Горлица большая	292, 605
Веретенник малый	229, 593	Горлица кольчатая	289, 605
Вертишейка	325, 613	Горлица обыкновенная	290, 605
Воробей афганский земляной	516, 653	Горная зарничка	430, 637
Воробьинообразные	328	Горный дупель	226, 593
Воробьиные	502	Грач	387, 627
Воробей домовый	503, 651	Гриф – см. черный гриф	
Воробей индийский	504, 651	Грязовик	220, 591
Воробей испанский	506, 653	Гуменник	65, 563
Воробей каменный	512, 653	Гусеобразные	58
Воробей короткопалый	513, 653	Гусиные	65
Воробей полевой	509, 653		

Гусь белолобый	66, 563	Жаворонок степной	340, 617	Камышевка - барсучок	408, 631	Крапивник	397, 629
Гусь серый	69, 565	Жаворонок тонкоклювый	347, 617	Камышевка болотная	413, 633	Красавка – см. журавль-красавка	
Гусь-гуменник – см. гуменник		Жаворонок хохлатый	338, 615	Камышевка дроздовидная	414, 633	[Краснобаш] – см. чернеть голубая	
Гусь-пискулька – см. пискулька		Жаворонок черный	343, 617	Камышевка индийская	409, 631	Краснозобая казарка	71, 565
Гусь-сухонос – см. сухонос		Жулан индийский	373, 623	Камышевка садовая	410, 631	Краснозобик	218, 591
Дербник	147, 579	Жулан кашгарский	365, 623	Камышевка тонкоклювая	407, 631	Краснокрылый чечевичник	530, 657
Джек – см. дрофа-красотка		Жулан обыкновенный	366, 623	Камышевка тростниковая	412, 633	[Красотка] – см. дрофа-красотка	
Длиннохвостые синицы	485	Журавлеобразные	167	Камышевка туркестанская	415, 633	Крачковые	261
Домовый сыч	305, 609	Журавлиные	168	Камышевка широкохвостая – см.		Крачка белокрылая	273, 603
Дроздовые	443	Журавль белый – см. стерх		широкохвостка		Крачка белошекая	270, 603
Дрозд-белобровик	477, 647	Журавль серый	169, 581	Камышница	179, 583	Крачка малая	269, 603
Дрозд белозобый	479, 647	Журавль-красавка	171, 583	Канюк-курганник - см. курганник		Крачка пестроногая	264, 601
Дрозд-деряба	478, 647	Завирушковые	398	Канюк обыкновенный	132, 575	Крачка речная	267, 601
Дрозд певчий	476, 647	Завирушка альпийская	402, 629	Каравайка	51, 561	Крачка чайконогая	262, 601
Дрозд пестрый каменный	469, 645	Завирушка лесная	399, 629	Касатка – см. ласточка деревенская		Крачка черная	272, 603
Дрозд синий каменный	470, 645	Завирушка персидская	400, 629	Касатка [утка]	96, 569	Кречетка	203, 589
Дрозд краснозобый	473, 645	Завирушка черногорлая	401, 629	Каспийский улар	157, 581	Кроншнеп большой	232, 595
Дрозд черный	472, 645	Зарянка	443, 641	[Качкалдак] – см. лысуха		Кроншнеп тонкоклювый	231, 595
Дрозд-рябинник	474, 647	Зеленушка	522, 655	Кваква	41, 559	Кроншнеп средний	230, 593
Дрофиные	183	Зимняк	135, 577	Кеклик	159, 581	Крохалиные	99
Дрофа	186, 585	Зимородковые	319	Клест-еловик	529, 657	Крохаль большой	102, 571
Дрофа-красотка, или джек	187, 585	Зимородок обыкновенный	319, 611	Клинтух	286, 605	Крохаль длинноносый	101, 571
Дубонос арчёвый	538, 659	Змеяяд	120, 573	Клуша	258, 601	Кряква	80, 567
Дубонос обыкновенный	537, 659	Зуек - галстучник	193, 585	Клушица	385, 627	Кукушка глухая	298, 607
Дупель	225, 593	Зуек каспийский	197, 587	Кобчик	147, 579	Кукушка малая	300, 607
Дупель горный – см. горный дупель		Зуек малый	191, 585	Козодоеобразные	310	Кукушка обыкновенная	296, 607
Дубровник	553, 662	Зуек монгольский	198, 587	Козодоевые	311	Кукушка хохлатая	300, 607
Дятлообразные	324	Зуек морской	194, 585	Козодой буланный	313, 609	Кукушкообразные	295
Дятловые	325	Зуек толстоклювый	195, 587	Козодой обыкновенный	311, 609	Кукушковые	296
Дятел белокрылый	326, 613	Зяблик	518, 655	Колпица	50, 561	Кулик-воробей	215, 591
Дятел большой пестрый	326, 613	Ибисовые	50	Конек горный	357, 621	Кулик-сорока	212, 589
Дятел зеленый	326, 613	Иволговые	374	Конек краснозобый	356, 621	Кулики-сороки	211
Дятел чешуйчатый	328, 613	Иволга обыкновенная	375, 625	Конек лесной	354, 619	Курганник	133, 575
Жаворонковые	337	Казарка краснозобая – см.		Конек луговой	355, 619	Курообразные	156
Жаворонок белокрылый	3432, 617	краснозобая казарка		Конек полевой	353, 619	Куропатка каменная – см. кеклик	
Жаворонок двупятнистый	341, 617	Каменка златогузая	466, 645	Конек степной	354, 619	Куропатка пустынная	161, 581
Жаворонок индийский	350, 619	Каменка испанская	461, 643	Коноплянка	526, 655	Кустарница	482, 647
Жаворонок лесной	348, 619	Каменка обыкновенная	458, 643	[Копытка] – см. саджа		Лаггар	155, 579
Жаворонок малый	343, 617	Каменка-плешанка	460, 643	Корольковые	435	Лазоревка белая	493, 649
Жаворонок полевой	349, 619	Каменка-плясунья	456, 643	Королек желтоголовый	435, 639	Лазоревка желтогрудая	492, 649
Жаворонок пустынный	337, 615	Каменка пустынная	465, 645	Коростель	178, 583	Лазоревка обыкновенная	491, 649
Жаворонок рогатый	351, 619	Каменка черная	462, 643	Коршун – см. черный коршун		Ласточковые	330
Жаворонок серый	345, 617	Каменка черношейная	463, 645	Коэль азиатский	300, 607	Ласточка береговая	330, 615
Жаворонок солончаковый	346, 617	Камнешарка	207, 589	Крапивники	397	Ласточка городская – см. воронка	

Ласточка деревенская	333, 615	Овсянка серая	554, 662	Песочник морской	220, 591	Савка, или белоголовая утка	103, 571
Ласточка нитехвостая	332, 615	Овсянка скальная	547, 661	Песчанка	214, 591	Саджа	281, 603
Ласточка рыжепоясничная	335, 615	Овсянка Стюарта	543, 659	Пигалица – см. белохвостая		Саксаульная сойка	383, 625
Ласточка скальная	331, 615	Овсянка тростниковая	548, 661	пигалица		Сапсан	154, 579
Лебединые	59	Овсянка черноголовая	550, 661	Пискулька	68, 563	Сарыч – см. канюк обыкновенный	
Лебедь малый	62, 563	Огарь, или отайка [огарёк]	72, 565	Пищуховые	500	Сверчок обыкновенный	404, 631
Лебедь-кликун	63, 563	Оляпка обыкновенная	396, 629	Пищуха гималайская	501, 651	Сверчок речной	405, 631
Лебедь-шипун	59, 563	Оляпковые	396	Плавунчик круглоносый	243, 597	Сверчок соловьиный	406, 631
Лунь болотный	121, 573	Ополовник – см. длиннохвостая		Плавунчик плосконосый	244, 597	Свиристелевые	393
Лунь луговой	125, 575	синица		Поганкообразные	21	Свиристель	394, 629
Лунь полевой	123, 573	Орел-беркут – см. беркут		Поганковые	22	Свиристелевый сорокопут –	
Лунь степной	124, 575	Орел-карлик	141, 577	Поганка большая, или чомга	24, 557	см. сорокопутовый свиристель	
Луток	99, 569	Орел-могильник – см. могильник		Поганка красношейная	27, 557	Свизь	75, 565
Лысуха	182, 585	Орел-подорлик – см. большой		Поганка малая	22, 557	[Седыш] – см. чернеть голубая	
Майна	380, 625	подорлик		Поганка серощекая	25, 557	Серая неясуть	307, 609
Майна горная	377, 625	Орел степной	137, 577	Поганка черношейная	28, 557	Серая утка [Серушка]	77, 565
[Мартын] – см. хохотунья		Орел ястребиный – см. ястребиный		Погоньш	174, 583	Сизоворонковые	318
Могильник	138, 577	орел		Погоньш-крошка	177, 583	Сизоворонка	318, 611
Мородунка	240, 597	Орлан-белохвост	112, 573	Погоньш малый	176, 583	Синицевые	486
Морской голубок	256, 599	Орлан-долгохвост	111, 571	Подорожник	552, 661	Синица большая	494, 651
Морянка	96, 569	Осоед обыкновенный	107, 571	Поморниковые	249	Синица бухарская	496, 651
Мраморный чирок	86, 567	Пастушковые	172	Поморник длиннохвостый	250, 599	Синица длиннохвостая	485, 649
Мухоловковые	436	Пастушок	173, 583	Поморник короткохвостый	250, 599	Синица рыжешейная	490, 649
Мухоловка-белошейка	442, 639	Пеганковые	72	Поморник средний	250, 599	Синица серая	497, 651
Мухоловка малая	441, 639	Пеганка	73, 565	Поползневые	498	Синица усатая	484, 647
Мухоловка райская	437, 639	Пеликанообразные	31	Поползень большой скалистый	498, 651	Синица черная, или московка	489, 649
Мухоловка рыжехвостая	440, 639	Пеликановые	32	Поручейник	235, 595	Синьга	96, 569
Мухоловка серая	438, 639	Пеликан кудрявый	33, 559	Просянка	540, 659	Синяя птица	480, 647
Мухоловка-пеструшка	442, 639	Пеликан розовый	32, 559	Пуночка	553, 661	Сип – см. белоголовый сип	
Неясуть – см. серая неясуть		Пеночка-весничка	432, 637	Пустельга обыкновенная	145, 579	Сипуха	308, 609
Нырковые – см. утки нырковые		Пеночка горная – см. горная		Пустельгая степная	144, 579	Скворцовые	376
Нырок белоглазый – см. чернеть		зарничка		Ракшеобразные	317	Скворец длиннохохлый – см.	
белоглазая		Пеночка-зарничка	429, 637	Ремез обыкновенный	487, 649	майна горная	
Нырок красноголовый – см.		Пеночка зеленая	429, 637	Ремез черноголовый	488, 649	Скворец индийский – см. майна	
чернеть голубая		Пеночка индийская	430, 637	Ржанкообразные	188	Скворец обыкновенный	377, 625
Нырок красноносый	88, 567	Пеночка иранская	433, 639	Ржанки	191	Скворец розовый	379, 625
Обыкновенный фламинго	57, 563	Пеночка-теньковка	431, 637	Ржанка бурокрылая	200, 587	Скопиные	106
Овсянковые	539	Перевозчик	241, 597	Ржанка золотистая	199, 587	Скопа	106, 571
Овсянка белошапочная	541, 659	Перепел	162, 581	Рыжеголовый сокол – см. шахин		Скотоцерка	434, 639
Овсянка горная	545, 661	Перепелятник	128, 575	Рябковые	276	Славковые	403
Овсянка желчная	551, 661	Пересмешка бледная	418, 633	Рябок белобрюхий	279, 603	Славка белоусая	427, 637
Овсянка обыкновенная	542, 659	Пересмешка зеленая	417, 633	Рябок сенегальский	282, 603	Славка вертлявая – см. скотоцерка	
Овсянка-ремез	553, 662	Песочник белохвостый	217, 591	Рябок чернобрюхий	277, 603	Славка горная	426, 637
Овсянка садовая	546, 661	Песочник исландский	213, 589	Савковые	103	Славка-завирушка	422, 635

Славка певчая	421, 635	Тетеревятник	127, 575
Славка пустынная	428, 637	Тимелиевые	482
Славка садовая	424, 635	Тимелия полосатая – см.	
Славка серая	423, 635	кустарница	
Славка черноголовая	425, 635	Тиркушковые	245
Славка ястребиная	420, 635	Тиркушка луговая	247, 597
Снегирь	536, 659	Тиркушка степная	248, 597
Снегирь длиннохвостый	536, 659	Травник	234, 595
Снегирь монгольский	531, 657	Трясогузковые	352
Снегирь пустынный	531, 657	Трясогузка белая	362, 621
Совообразные	300	Трясогузка горная	361, 621
Совиные	301	Трясогузка жёлтая	359, 621
Сова белая	304, 609	Трясогузка желтоголовая	360, 621
Сова болотная	309, 609	Трясогузка маскированная	363, 621
Сова ушастая	308, 609	Тугайный соловей	467, 645
Совка буланая или пустынная	302, 607	Тулес	201, 587
Совка-сплюшка – см. сплюшка		[Тураль] – см. рябок	
Соколообразные	105	чернобрюхий	
Соколиные	143	Турач	166, 581
Соловей-белошейка	448, 641	Турпан обыкновенный	97, 569
Соловей обыкновенный	446, 641	[Туртушка] – см. рябок	
Соловей южный	444, 641	белобрюхий	
Сорока	384, 625	Турухтан	221, 591
Сорокопутовые	364	Тювик	130, 575
Сорокопут длиннохвостый	369, 623	Тювик европейский	129, 575
Сорокопут красноголовый	374, 623	Удодовые	323
Сорокопут маскированный	367, 623	Удод	323, 613
Сорокопут серый	371, 623	Украшенный чибис	204, 589
Сорокопут чернолобый	370, 623	Улар – см. каспийский улар	
Сорокопутовый свиристель	395, 629	Утки нырковые	87
Сплюшка	301, 607	Утки речные	75
Стенолаз	499, 651	Фазановые	157
Стервятник	115, 573	Фазан	164, 581
Стерх	170, 581	Филин	303, 607
Стрепет	184, 585	Фифи	239, 595
Стрижеобразные	314	Фламингообразные	55
Стрижиные	314	Фламинговые	57
Стриж белобрюхий	317, 611	Фламинго – см. обыкновенный	
Стриж малый	316, 611	фламинго	
Стриж черный	314, 611	Ходулочник	209, 589
Султанка	181, 583	Хохотунья	260, 601
Суторовые	484	Хрустан	198, 587
Сухонос	71, 565	Цаплевые	38
Сыч – см. домовый сыч		Цапля большая белая	45, 561


Цапля египетская	44, 561	Чиж	525, 655
Цапля желтая	42, 559	[Чиль] – см. пустынная куропатка	
Цапля малая белая	46, 561	Чирок мраморный – см.	
Цапля рыжая	49, 561	мраморный чирок	
Цапля серая	47, 561	Чирок-свиистунок	78, 565
Чайковые	250	Чирок-трескунок	84, 567
Чайка-голубок – см. морской		Чомга – см. поганка большая	
голубок		Шахин	153, 579
Чайка малая	253, 599	Шилоклювковые	209
Чайка озерная	254, 599	Шилоклювка	210, 589
Чайка розовая	261, 601	Широкохвостка	403, 631
Чайка серебристая – см.		Шилохвость	82, 567
хохотунья		Широконоска	85, 567
Чайка сизая	258, 601	Щегол	523, 655
Чайка черноголовая	253, 599	Щёголь	233, 595
Чайка-клуша – см. клуша		Щурковые	320
Чайка-хохотун – см. черноголовый		Щурка зеленая	322, 611
хохотун		Щурка золотистая	321, 611
Чайка-хохотунья – см.		Юрок	519, 655
хохотунья		Ястребиные	107
Чеглок	149, 579	Ястребиный орел	142, 577
Чеграва	266, 601		
Чекан луговой	453, 643		
Чекан черноголовый	454, 643		
Чекан чёрный	455, 643		
Чернеть белоглазая	91, 567		
Чернеть голубая	89, 567		
Чернеть красноголовая – см.			
чернеть голубая			
Чернеть морская	95, 569		
Чернеть хохлатая	93, 569		
Черноголовый хохотун	251, 599		
Чернозобик	219, 591		
[Чернушка] – см. чернеть хохлатая			
Черный гриф	117, 573		
Черный коршун	110, 571		
Черныш	238, 595		
Чечевица арчевая	535, 657		
Чечевица обыкновенная	534, 657		
Чечетка горная	528, 655		
Чечетка обыкновенная	529, 657		
Чибис	205, 589		
Чибис украшенный – см.			
украшенный чибис			

GUŞLARYŇ DEŇEŞDIRME ÖLÇEGLERI
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПТИЦ

MAZMUNY


ОГЛАВЛЕНИЕ

Sözbaşy	3	Вводная часть	3
Guşlaryň sistematiki toparlarynyň we görnüşleriniň beýany	19	Описания систематических групп и видов птиц	19
Ýoglaşkilliler	19	Гагарообразные	19
Tersayakşekilliler	21	Поганкообразные	21
Gotanşekilliler	31	Пеликанообразные	31
Leglekşekilliler	38	Аистообразные	38
Gyzylgazşekilliler	55	Фламингообразные	55
Gazşekilliler	58	Гусеобразные	58
Laçynşekilliler	105	Соколообразные	105
Towukşekilliler	156	Курообразные	156
Durnaşekilliler	167	Журавлеобразные	167
Çulukşekilliler	188	Ржанкообразные	188
Kepderişekilliler	275	Голубеобразные	275
Ikatyökşekilliler	295	Кукушкообразные	295
Hüwişekilliler	300	Совообразные	300
Gündizkörşekilliler	310	Козодоеобразные	310
Atgarlawaçşekilliler	314	Стрижеобразные	314
Gökgargaşekilliler	317	Ракшеобразные	317
Doňuzguşşekilliler	324	Дятлообразные	324
Serçeşekilliler	328	Воробьеобразные	328
Suratlar	555	Иллюстрации	555
Hödürlenýän edebiýatlar	663	Рекомендуемая литература	663
Guşlaryň türkmençe atlaryny görkeziji	665	Указатель туркменских названий птиц	665
Guşlaryň latinça atlaryny görkeziji	671	Указатель латинских названий птиц	671
Guşlaryň rusça atlaryny görkeziji	677	Указатель русских названий птиц	677




GUŞLARYŇ BEDEN BÖLEKLERINIŇ WE ÝELEK ÖRTÜKLI MEÝDANÇALARYNYŇ ATLARY

НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ ТЕЛА И УЧАСТКОВ ОПЕРЕНИЯ ПТИЦЫ



WAJYP ÖLÇEGLER WAJNEIŞIE PROMERY



GUÝRUK KESIMINIŇ GÖRNÜŞLERI (FORMALARY) ФОРМА ОБРЕЗА ХВОСТА



**Türkmenistanyň territoriýasunyň
landşaftlary böünişi**

**Ландшафтное подразделение
территории Туркменистана**

