

QL
690
S65S25
1907
Birds

6.11.09

К. А. Сатунинъ.


МАТЕРИАЛЫ

КЪ ПОЗНАНИЮ ПТИЦЪ КАВКАЗСКАГО КРАЯ.

ТИФЛИСЪ.

Типографії К. П. Козловскаго (Головинскій просп., № 12) в
Канцелярії Намѣстника ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
на Кавказѣ.

1907.



598.204

Birds

QL

690

598.204

1907


300

K. A. Satunin
K. A. Сатунинъ.

Guide to the birds of the Caucasus /

МАТЕРИАЛЫ

к Руководству по изучению птиц Кавказа
КЪ ПОЗНАНИЮ ПТИЦЪ КАВКАЗСКАГО КРАЯ.



ТИФЛИСЪ.

Типографія К. П. Козловскаго (Головинскій просп., № 12) и
Канцелярія Намѣстника ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
на Кавказѣ.

1907.

Напечатано по распоряженію Распорядительного Комитета Кавказскаго
Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.

Матеріалы къ познанію птицъ Кавказскаго края.

П р е д и с л о в і е.

Съ первого же года моего переселенія въ Закавказье (1893 г.) я сталъ производить орнитологическія наблюденія и собирать птичіи шкурки. Эти изслѣдованія хотя и производились лишь при моихъ служебныхъ поѣздахъ, слѣдовательно велись не систематически, но зато продолжались съ небольшими перерывами до настоящаго времени (1906 г.), слѣдовательно уже 14 лѣтъ, въ теченіе которыхъ я посѣтилъ почти всѣ части разнообразнаго Кавказскаго края, а потому мнѣ, понятно, удалось сдѣлать много новыхъ и интересныхъ наблюденій надъ жизнью и географическимъ распространеніемъ кавказскихъ птицъ, еще довольно мало изученныхыхъ. Но вниманіе и досугъ мой всецѣло были поглощены изученіемъ совершенно еще неизвѣстныхъ млекопитающихъ этой страны, почему все остальное отошло по необходимости на второй планъ и я не имѣлъ возможности самъ лично обработать собранія мною обширныя коллекціи птицъ. Поэтому въ этой статьѣ я не могу дать ничего новаго по ихъ систематикѣ и, вѣроятно, въ нижеприведенномъ не избѣгъ ошибки въ опредѣленіи нѣкоторыхъ видовъ, но большая часть собранной мною коллекціи находится въ Кавказскомъ Музѣѣ и мои опредѣленія могутъ быть исправлены при просмотрѣ этого матеріала.

Я рѣшаюсь опубликовать свои наблюденія только потому, что они все таки содержать много еще не опубликованныхъ фактovъ о географическомъ распространеніи кавказскихъ птицъ, а отчасти и обѣихъ образахъ жизни.

*) Я сдѣлалъ исключеніе только для интереснѣйшихъ статей о священномъ ибисѣ и черномъ журавлѣ, которыя раньше были напечатаны мною въ мало распространенному охотничьемъ журналѣ.

Я пишу только или свои наблюдения, или то изъ чужихъ, что нигдѣ еще не было опубликовано *), — поэтому моя статья не содержитъ въ себѣ перечня всѣхъ птицъ Кавказского края. Но время для генеральной сводки всего известнаго о птицахъ Кавказа, по моему, еще не пришло.

Я прошу смотрѣть на мою статью, какъ на посильный вкладъ въ изученіе кавказскихъ птицъ и материалъ для будущей обширной работы по этому вопросу.

Какъ замѣтить внимательный читатель этой статьи, мои наблюденія касаются главнымъ образомъ восточнаго Закавказья, гдѣ я ъездилъ больше всего и при томъ въ самое благопріятное для орнитологическихъ изслѣдованій время — весною и лѣтомъ.

Въ съверной части черноморскаго побережья и въ Кубанской области я не былъ вовсе.

Я собиралъ главнымъ образомъ только мелкихъ птичекъ, такъ какъ часто совершенно не имѣлъ времени на препаровку большихъ. Но во всѣхъ моихъ поѣздкахъ со мною было неразлучно сочиненіе проф. М. А. Мензбира „Птицы Россіи“, и я, если не могъ препаровать, то старался хоть опредѣлить убитую птицу.

Еще въ 1896 году Александръ Борисовичъ Шелковниковъ, помѣщикъ Арешскаго уѣзда Елисаветпольской губ., страстный любитель природы и коллекторъ, предоставилъ въ мое распоряженіе небольшую рукопись, содержащую біологическія наблюденія надъ нѣкоторыми болотными птицами. Я заимствовалъ изъ нея чрезвычайно интересныя описанія гнѣзовья цапель, пеликановъ и проч., каждый разъ указывая, разумѣется, на источникъ. За разрѣшеніе воспользоваться этими интересными описаніями я приношу ему здѣсь мою искреннюю благодарность. Глубокую признательность выражаю я здѣсь и проф. М. А. Мензбирѣ, во-первыхъ, за то, что онъ далъ намъ книгу, съ которой стало возможнымъ заниматься въ Россіи орнитологіей и не въ однѣхъ только столицахъ, а, во-вторыхъ, за определеніе многихъ изъ собранныхъ мною птицъ.

К. А. Сатунинъ.

Тифлісъ.

3 декабря 1906 г.

Отрядъ I. Passeriformes. Воробьинообразныя.

Сем. 1. Corvidae. Вороновыя.

1. *Corvus corax* L. Воронъ.

Мензбиръ, II, 457 *).

Воронъ встречается въ Закавказье не часто и только въ юго-западной его части можетъ быть названъ обыкновенно птицей. Насколько онъ рѣдокъ въ другихъ мѣстахъ Кавказскаго края, лучше всего показываетъ то обстоятельство, что за всѣ мои поѣздки по Дагестану и другимъ мѣстамъ Большого Кавказа онъ ни разу мнѣ здѣсь не встрѣтился.

Въ Талышинскихъ горахъ, на Муровъ-дагѣ (въ Маломъ Кавказѣ), на хребтѣ Топъ-юль (юго-вост. Закавказье) и другихъ мѣстахъ я встрѣчалъ ворона или въ альпійской области, или въ такихъ мѣстахъ, гдѣ среди лѣса выдаются голые скалы, какъ, напр., у поста Гурджаанъ въ Артвинскомъ округѣ. Въ ноябрѣ 1906 года во время поѣздокъ по ущелью Чороха я встрѣчалъ ворона очень часто, какъ никогда нигдѣ раньше на Кавказѣ.

2. *Corvus cornix* L. Сѣрая ворона.

Мензбиръ, II, 469.

Карга (татарск.).

Въ предѣлахъ Кавказскаго края сѣрая ворона встрѣчается рѣшительно повсюду и даже поднимается довольно высоко въ горы: Гунибъ въ Дагестанѣ, сел. Гасанризъ и Нижн. Акулисы въ Маломъ Кавказѣ, Гельская котловина и проч. Но особенно много-

*). Я вездѣ привожу сочиненіе, по которому было произведено определеніе; въ подавляющемъ большинствѣ это — классическое сочиненіе проф. М. А. Мензбира „Птицы Россіи“, которое я и цитирую сокращенно „Мензбиръ“. Римская цифра означаетъ томъ, арабскія — страницу.

численною встрѣчается она по долинѣ нижняго теченія р. Куры и по морскимъ побережьямъ. Въ Тифлисѣ вороны приступаютъ къ постройкѣ гнѣздъ во второй половинѣ февраля, а со средины мая на низменности вороны встрѣчаются выводками.

3. *Corvus corone* L. Черная ворона.

Мензбиръ, II, 474.

Я встрѣчалъ черныхъ воронъ небольшими стайками по р. Курѣ близъ Тифлиса, исключительно только на весеннемъ пролетѣ, въ концѣ февраля и началѣ марта, и то довольно рѣдко. Въ восточномъ Закавказье черная ворона положительно нигдѣ не гнѣздится.

Какъ видно по экземплярамъ Кавказскаго Музея, Г. И. Радде часто смѣшивалъ черную ворону съ молодыми грачами, почему къ сообщаемымъ имъ свѣдѣніямъ объ этой птицѣ нужно относиться очень осторожно.

4. *Tyrapocorax frugilegus* L. Грачъ.

Мензбиръ, II, 462 (*Corvus frugilegus*).

Кара-карга (татарск.).

Грачъ встрѣчается въ громадномъ количествѣ по рѣчнымъ долинамъ какъ Сѣвернаго Кавказа (напр., по Кумѣ), такъ и Закавказья, главнымъ же образомъ по Курѣ. Нижнее теченіе Куры представляетъ, повидимому, идеальную мѣстность для ихъ жизни. На высокихъ деревьяхъ по берегу рѣки они устраиваютъ колоніи своихъ гнѣздъ, а разстилающіяся по обѣимъ сторонамъ Куры степи доставляютъ имъ обильную пищу, такъ какъ именно во время выкармливанія птенцовъ кишать насѣкомыми. Большая колонія грачей я видѣлъ около Джевата и въ Сальянахъ. У одного убитаго близъ Джевата 23. V. 94 грача зобъ и клювъ были полны саранчей, которую онъ несъ со степи въ гнѣздо. Въ лѣсистыхъ мѣстахъ, напр., въ мѣстности Самухъ при сліяніи съ Курою пр. Іоры и Алазани я грачей не видѣлъ.

3. X. 900 я встрѣтилъ около Кагызмана громадную пролетную стаю грачей.

Истребляя массу саранчи, составляющей истинный бичъ Закавказья, грачъ является одною изъ полезнѣйшихъ здѣшнихъ птицъ.

5. *Coloeus monedula collaris* Drumm. Галка.

Мензбиръ, II, 478 (*Corvus monedula collaris*).

Тулаша (татарск.).

Кавказская галка, несомнѣнно, относится къ подвиду *C. m. collaris*, такъ какъ и у молодыхъ птицъ сѣровато-блѣлый ошейникъ выраженъ очень рѣзко.

Остается, вѣроятно, вѣчною загадкой, какимъ образомъ Г. И. Радде проглядѣлъ массовое гнѣзданіе галки въ Закавказье.

Во всемъ восточномъ Закавказье и Кубинскомъ уѣздѣ галка принадлежитъ къ числу самыхъ обыкновенныхъ гнѣздающихъ птицъ.

Въ южномъ Дагестанѣ (Кюринскій округъ) и Кубинскомъ уѣздѣ галка гнѣздится, насколько мнѣ известно, исключительно въ дуплахъ въ дубовыхъ лѣсахъ. Поэтому она очень обыкновенна и даже многочисленна въ сѣверной, лѣsistой части Кубинскаго уѣзда, но не попадалась мнѣ въ южной, степной его части. Тамъ, гдѣ есть глинистые обрывы, какъ, напр., около Аджи-Кабула, галка гнѣздится въ норахъ, вырытыхъ въ этихъ обрывахъ сизоворонками. Сама она, кажется, норъ не роетъ. Гнѣздовья въ строеніяхъ мнѣ не попадалось. Въ первой половинѣ мая каждый татарченокъ обязательно носить на плечѣ галченка.

Зимою галки сбиваются въ большія стаи и кочуютъ въ поискахъ за пищею. Въ паркѣ Муштаидъ въ Тифлисѣ онѣ собирались на ночлегъ съ половины августа.

6. *Pica pica* L. Сорока.

Мензбиръ, II, 483 (*Pica caudata*).

Сагсаганъ (татарск.).

Вѣроятно, на Кавказѣ водится не одинъ видъ сороки, но я не умѣлъ ихъ различить, а потому говорю обо всѣхъ вмѣстѣ.

Сорока очень обыкновенна по всему Кавказскому краю.

Станціи, занимаемыя ею, — мелколѣссе, рѣчныя долины, сады и выгоны у селеній. Вмѣстѣ съ послѣдними она поднимается и довольно высоко въ горы. Такъ, я встрѣтилъ ее во многихъ высоколежащихъ селеніяхъ Дагестана (Рутуль, Кази-Кумухъ, Гу-

нибъ), Малаго Кавказа и западнаго Закавказскаго илоскогорья (Кагызманъ, Сарыкамышъ, Гельская котловина).

Сороки совершенно нѣтъ ни въ густолѣсистыхъ мѣстностяхъ, ни въ открытыхъ степяхъ. Такъ, на Маломъ Кавказѣ я не встрѣтилъ ея въ с. Шихаузъ, окруженному со всѣхъ сторонъ лѣсами, въ селеніяхъ западной, лѣсной части Ахалцихскаго у. (Гагва, напр.), а также въ Трухменской лѣтней ставкѣ въ Ставропольск. губерніи.

Гнѣздится сорока если и не совсѣмъ колоніально, то все же небольшими обществами. Когда 15. V. 95 я посѣтилъ устье р. Тертеръ, близъ сел. Чилябилияръ Джеванширскаго у., въ заросляхъ по рѣкѣ сороки и сойки гнѣздились въ такомъ большомъ количествѣ, что совершенно выжили всѣхъ другихъ птицъ. Только въ ближайшихъ садахъ слышалъ я соловья, въ заросляхъ же положительно не было ни одной мелкой птички, тогда какъ въ недалекомъ разстояніи оттуда такія же заросли кишѣли ими.

Сороки любятъ сопровождать стада, и тамъ, гдѣ пасутся буйволы, всегда можно встрѣтить и сорокъ, сидящихъ у нихъ на спинѣ и выбирающихъ паразитовъ.

Сильный снѣгъ и мятель гонять сорокъ къ человѣческому жилью, и тогда онѣ встрѣчаются здѣсь въ огромномъ количествѣ. 8. III. 98 по случаю большого снѣга весь дворикъ почтовой станціи Агдамъ, по тракту въ Шушу, былъ буквально силошь покрытъ сороками.

7. *Garrulus garrulus Krinickyi Kalenicz.* Кавказская сойка.

Мензбиръ, II, 497 (*Garrulus Krynickii*).

Кавказская сойка широко распространена какъ по всему Большому Кавказу, такъ и въ большей части Закавказья, за исключеніемъ самаго юго-восточнаго и юго-западнаго угловъ его, гдѣ она замѣнена другими близкими видами.

Въ Закавказїи сойка встрѣчается рѣшительно везде, гдѣ есть лѣсъ, хотя бы и мелкій, или даже большиe сады.

Хотя сойка и гнѣздится на низменности, но зимою количество здѣсь этихъ птицъ значительно увеличивается.

Желуди и здѣсь составляютъ, повидимому, ея любимую пищу, потому что, по возможности, сойки придерживаются дубовыхъ лѣсовъ. Зобъ и ротъ сойки, убитой мною 27. IX. 97 въ Гори, были биткомъ набиты желудями.

8. *Garrulus garrulus hyrcanus* Blanf. Талышинская сойка.

9. *Garrulus garrulus caspius* Seeb. Каспийская сойка.

Hartert, 31.

Первая обитает въ горныхъ лѣсахъ Талыша, вторая въ низменныхъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, говорить Hartert *), — я же ихъ не различалъ. Зимою, во всякомъ случаѣ, онѣ живутъ вмѣстѣ. Сойки въ Талышѣ очень обыкновенны.

10. *Garrulus garrulus Anatoliae* Seeb. Малоазійская сойка.

Палутъ-каргashi („дубовая ворона“, туркменск.).

Этотъ слабо отличающійся отъ *G. g. Krinickyi* подвидъ обитаетъ въ юго-западномъ углу Закавказья — Артвинскомъ окружѣ и западной части Карской области. Я убилъ одинъ экземпляръ въ с. Мишехъ 24. IX. 902 (по тракту Ардаганъ — Ольты). Вѣроятно, сюда же относятся и сойки гельскихъ лѣсовъ.

11. *Ryrhocorax graculus* L. Клушкица.

Мензбиръ, II, 507.

Клушкица очень обыкновенна во всей альпійской области какъ Главнаго хребта, такъ и закавказскихъ горъ.

Я встрѣтилъ большую семью этихъ птицъ, кормившихся на лугу на Бусарчильскомъ перевалѣ. Въ большомъ количествѣ я встрѣчалъ ихъ также по военно-грузинской дорогѣ отъ Казбека до Гудаура, повсюду въ Дагестанѣ, на Шахъ-дагѣ, Ааратѣ, Агри-дагѣ и Топъ-іолѣ.

Иногда онѣ спускаются и довольно низко: такъ, 17. VI. 96 я встрѣтилъ ихъ около аула Мурухъ, гдѣ онѣ встрѣчаются съ сѣрой вороной, 18. VI. 98 на невысокомъ Атлы-буюнскомъ хребтѣ между Петровскомъ и Темиръ-Ханъ-Шурою, а 1. IX. 900 около Кегартского монастыря въ ущельѣ того же имени (къ с.-в. отъ Эривани). Въ послѣднемъ мѣстѣ меня увѣряли, что зимою онѣ часто нападаютъ на курочекъ (*Caccabis chukar*).

12. *Ryrhocorax alpinus* Vieill. Альпійская галка.

Мензбиръ, II, 511.

Много рѣже предыдущаго вида. Я убилъ альпійскую галку только однажды въ сел. Лаза, у подножья Шахъ-дага въ Кубин-

*) Hartert, E. Die Vögel paläarktischen Fauna, Heft 1, p. 31 (1903).

скомъ уѣздѣ, гдѣ она держалась вмѣстѣ съ клушицей, и одинъ разъ видѣлъ на перевальномъ участкѣ военно-грузинской дороги.

Сем. 2. *Sturnidae*. Скворцы.

13. *Sturnus caucasicus* Lorenz. Кавказскій скворецъ.

Мензбиръ, II, 519.

Сыгарчинъ (татарск.).

Прежде чѣмъ говорить о распространеніи различныхъ формъ скворцовъ на Кавказѣ, я хотѣлъ бы сдѣлать слѣдующія предварительныя замѣчанія. Hartert считаетъ большое количество формъ скворцовъ, описанныхъ какъ самостоятельные виды, за подвиды *Sturnus vulgaris*. Такъ, во всякомъ случаѣ, легче справиться съ ихъ номенклатурой, но, будетъ ли справедливымъ ставить на одинаковыхъ правахъ подвида такой рѣзко обособленный видъ, какъ *Sturnus caucasicus*, съ одной стороны, и мало обособленный *St. Poltorazkyi* Satunini, съ другой, это кажется мнѣ сомнительнымъ. Кромѣ того *St. caucasicus* и *St. Poltorazkyi* иногда встречаются и гнѣздащимися вмѣстѣ: напр., въ паркѣ Муштаандъ одинъ изъ этихъ видовъ занималъ дупла, а другой разныя помѣщенія въ зданіяхъ.

Рѣшать эти вопросы — не мое дѣло. Я долженъ быть только указать ихъ орнитологамъ.

Для нижеиздѣйшаго обзора областей гнѣздовья разныхъ формъ скворцовъ я могъ пользоваться, къ сожалѣнію, лишь небольшою частью своей коллекціи, опредѣленной проф. М. А. Мензбпромъ. Опредѣленія Радде ненадежны, а опредѣленія тѣхъ скворцовъ, которые попали въ Зоол. Музей Академіи Наукъ, я не могъ получить, несмотря на все мои просьбы.

Область гнѣздовья кавказскаго скворца въ Закавказье занимаетъ прикаснійскую полосу. Но вполнѣ типичныхъ *St. caucasicus* я нашелъ только въ лѣсахъ Талыша (с. Тангевонъ S. V. 97, с. Машханъ ZO. V. 97 etc.) и на краю Мугани въ Белясуварѣ (10. VI. 97). Какъ было уже упомянуто, въ Тифлисѣ онъ гнѣздится вмѣстѣ съ *St. Poltorazkyi*. На Сѣверномъ Кавказѣ этотъ скворецъ гнѣздится повсюду вдоль всего Кавказскаго хребта. Въ Кавк. Музѣѣ имѣются экземпляры изъ Кисловодска и изъ Хасавъ-юрта.

На пролетѣ и зимою обыкновененъ во всемъ восточномъ Закавказье.

Въ Тифлисѣ я наблюдалъ, что скворцы только первое время кормятъ своихъ птенцовъ насѣкомыми, когда же они немного подрастутъ, то носятъ имъ исключительно ягоды, главнымъ образомъ тутовыхъ.

14. *Sturnus Poltorazkyi Satunini Buturlin.*

Buturlin, Ornith. Jahrb., XV, 1904, p. 207.

Область гнѣздовья этого скворца лежитъ между областями *Sturnus caucasicus* и *Sturnus Poltorazkyi*, почему я и думалъ, что онъ, можетъ быть, представляетъ просто помѣсь этихъ двухъ видовъ.

Насколько я могу теперь сообразить по своимъ запискамъ и экземплярамъ, еще доступнымъ мнѣ, область гнѣздовья этого сомнительного скворца идетъ отъ Белясувара (9. VI. 97) по низовьямъ Куры (с. Бульдугъ) и по южнымъ предгорьямъ Кавказскаго хребта, гдѣ я встрѣтилъ его въ сел. Маразы (2. V. 96) и около станц. Карасахкалы, гдѣ онъ гнѣздился въ норахъ рядомъ со щурками и сизоворонками; далѣе по всей Кубинской низменности (с. Дедели 29. V. 96).

15. *Sturnus Poltorazkyi Finsch.*

Сыгарчинъ (татарск.).

Очень обыкновенный скворецъ Закавказья. Область его гнѣздовья обнимаетъ центральную часть Закавказья — Тифлисскую губернію, гдѣ я въ большомъ числѣ встрѣчалъ его около Мцхета, Тифлиса и въ Борчалинскомъ у. Далѣе вмѣстѣ съ предыдущею формой я встрѣтилъ его и въ Шемахинскомъ у. (Шарадиль 28. IV. 96; Маразы 2. V. 96).

16. *Sturnus Menzbieri Scharpe.*

Мензбиръ, II, 519.

10. III. 96 я убилъ одного скворца этого вида близъ Тифлиса по дорогѣ къ Соленому озеру. Скворцы въ большомъ количествѣ держались здѣсь среди стада овецъ.

17. *Sturnus vulgaris L. typ. Обыкновенный скворецъ.*

Мензбиръ, II, 519.

Зимою вмѣстѣ съ другими скворцами я убивалъ и такихъ, которые не отличались отъ средне-русскихъ.

18. *Sturnus purpurascens* Gould.

Мензбиръ, II, 519.

Гнѣздящійся скворецъ сѣверо-западной части Предкавказья.

Въ Кавказскомъ Музеѣ есть экземпляръ изъ Майкопа, добытый 25. V. 86 Ф. К. Лоренцомъ.

19. *Pastor roseus* L. Розовый скворецъ.

Мензбиръ, II, 512.

Розовый скворецъ распространенъ на всемъ Кавказѣ, но въ большинствѣ мѣстностей не гнѣздится регулярно. Въ одинъ годъ онъ появляется въ данной мѣстности, обыкновенно массою, выводить здѣсь дѣтей, а затѣмъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ не появляется здѣсь болѣе на гнѣздовьяѣ. Такъ бывало, напр., около Тифлиса, с. Маразы Шемахинскаго уѣзда и въ другихъ мѣстахъ. Единственное мѣсто, где я каждый годъ наблюдалъ его одинаково въ громадномъ количествѣ, — Талышинская низменность.

Я встрѣчалъ розового скворца на гнѣздовьяѣ въ Ставропольской губ. по р. Калаусу (6. V. 99); на Кубинской низменности (27. V. 96) у сел. Бостанчи и др.; на южномъ склонѣ восточной части Кавказскаго хребта въ Шемахинскомъ у. близъ селенія Маразы (1. V. 96); на низменности Елисаветпольскаго (4. V. 95) и Арешскаго (V. 94) уѣздовъ Елисаветпольской губ., въ Джебраильскомъ у., по восточнымъ склонамъ Малаго Кавказа (27. V. 94); на Талышинской низменности (V. 1897 и 1898 гг.); на Эриванской равнинѣ и по долинѣ Аракса.

Какъ известно, онъ пользуется большимъ уваженіемъ населенія за то, что всюду слѣдуетъ за полчищами саранчи и истребляетъ ее въ гораздо большемъ количествѣ, чѣмъ можетъ сѣсть. Обычай обращаться за помощью къ содѣйствію розового скворца вошелъ въ культъ армянского народа. При появлѣніи большой массы саранчи процессія съ духовенствомъ во главѣ направляется къ источнику св. Іакова на Арапатѣ за водою, которую потомъ окрошаютъ поля, послѣ чего на нихъ должны прилетѣть розовые скворцы. Даже розовый цвѣтъ этой птицы здѣшніе жители объясняютъ кровью избитой ею саранчи. Къ сожалѣнію, розовые скворцы иногда переходятъ и на растительную пищу и жестоко опустошаютъ виноградники. Въ селеніи Карабчайли-Василь-оба 8. VIII. 99 я наблюдалъ, какъ они ёли бѣлую крупноплодную шелковицу. Желая убѣдиться, что я не

обманываюсь и что они действительно ёдят плоды шелковицы, а не какихъ нибудь сидящихъ на нихъ насѣкомыхъ, я убиль одного и вскрытиемъ окончательно убѣдился, что они ёдятъ именно ягоды.

Въ 1897 г. около с. Сейфидоръ на Ленкоранской низменности въ стаѣ нормальныхъ молодыхъ и старыхъ розовыхъ скворцовъ я убилъ одного старого скворца, у котораго весь розовый цвѣтъ былъ замѣненъ ярко-желтымъ.

Въ бытность мою въ ноябрѣ 1906 г. въ сел. Верхне-Марадиды Артвинскаго округа я слышалъ отъ командира Марадидскаго отряда пограничной стражи С. И. Безсомыкина что въ началѣ декабря здѣсь выпадаетъ снѣгъ и тогда съ горъ въ это закрытое ущелье, гдѣ стоитъ еще 4° тепла, спускается масса птицъ, а между ними и розовые скворцы. Онъ здѣсь уже четыре года, и наблюдаетъ ихъ ежегодно. Г. Безсомыкинъ интересуется птицами и имѣеть сочиненіе Холодковскаго и Силантьева „Птицы Европы“, такъ что предположить какое нибудь *qui pro quo* нельзя. Въ ноябрѣ здѣсь цвѣли фіалки и азалии и распустились рододендроны.

Сем. 3. Oriolidae. Иволговыя.

20. *Oriolus galbula* L. Иволга.

Мензбиръ, II, 735.

Сары-куюнхъ (татарск.).

Иволга широко распространена въ предѣлахъ всего Кавказскаго края. Я встрѣчалъ ее въ садахъ Ставропольской губ. и Терской области, во всѣхъ подходящихъ мѣстахъ Дагестана, въ большомъ количествѣ повсюду въ восточномъ Закавказье, Эриванской губ., Карской области и по черноморскому побережью. Иволга держится въ садахъ и свѣтлыхъ лиственныхъ лѣсахъ предгорій. Въ большихъ лѣсахъ верхняго лѣсного пояса мнѣ она не встрѣчалась, но по садамъ, расположеннымъ въ Дагестанѣ по долинамъ рѣкъ, она поднимается довольно высоко въ горы. Такъ, я встрѣтилъ ее на Гунибѣ (20. VIII. 97) и въ аулѣ Рутулы въ верховьяхъ р. Самура (2. VII. 96).

Прилетѣ иволги я наблюдалъ 24. IV. 95 на низменности Елисаветпольского у. у сел. Алабашлы. Парочки этихъ птицъ держались при этомъ на совершенно неподходящихъ имъ въ обыч-

ное время мѣстахъ: на сухихъ изгородяхъ и т. п. Въ 1898 г. въ первый разъ замѣтилъ я иволгу на Талышинской низменности 29. IV близъ сел. Арчеванъ. Иволги, очевидно, успѣваютъ спа-
риться еще до прилета, ибо весною я встрѣчалъ ихъ не иначе,
какъ парами.

Самая поздняя имѣющаяся у меня дата, касающаяся пребы-
ванія у насъ иволги, — 21. VIII. 96.

Сем. 4. Fringillidae. Вьюрковыя.

Подсем. Coccothraustinae.

21. Coccothraustes coccothraustes L. Дубоносъ.

Мензбиръ, II, 657.

На гнѣздовѣѣ я нигдѣ дубоноса не наблюдалъ, зимою же это — довольно обыкновенная птица долины Куры. Самое раннее время появленія его осенью въ паркѣ Муштаидѣ въ Тифлисѣ — 21. XI. 96, самое позднее весною тамъ же — 21. IV. 96. Уже въ первыхъ числахъ декабря самцы имѣютъ вполнѣ развитой брач-
ный нарядъ. Во второй половинѣ февраля они начинаютъ пѣть.

Радде также не наблюдалъ дубоноса на гнѣздовѣѣ, но счи-
таетъ его гнѣздающеся здѣсь птицею на томъ основаніи, что встрѣчалъ его въ Тифлисѣ еще въ мартѣ. Какъ видно изъ выше-
изложеннаго, я находилъ здѣсь дубоноса гораздо позднѣе, но не считаю это доказательствомъ его гнѣзданія въ Закавказье, такъ какъ въ это же время встрѣчается здѣсь еще и *Fringilla monti-*
fringilla, уже, во всякомъ случаѣ, нигдѣ на Кавказѣ не гнѣзда-
щійся. Поэтому гнѣзданіе дубоноса въ восточномъ Закавказье
представляется мнѣ сомнительнымъ.

22. Chlorospiza chloris L. Зеленушка.

Мензбиръ, II, 661.

Обыкновенная осѣдлая птица низменности восточного За-
кавказья.

Самецъ и самка очень привязаны другъ къ другу. 7. IV. 95
года я замѣтилъ на высокомъ деревѣ зеленушку-самца, который
неѣлъ трепеща крыльшками; выше него на вершинѣ этого же де-
рева сидѣла самка. Когда самецъ былъ убитъ, самка не улетала прочь.

Въ другихъ мѣстахъ Кавказа мнѣ не приходилось наблю-
дать зеленушку.

Подсем. Fringillinae.

23, a. *Carduelis carduelis* L. Щеголъ.

Мензбиръ, II, 651.

23, b. *Carduelis carduelis brevirostris* Zarudny.

Hartert, 70.

Распространение щегла на Кавказѣ чрезвычайно обширно. Гнѣздащимся я встрѣчалъ его отъ уровня моря до высоты выше 7000', именно: на южномъ склонѣ Главнаго хребта, въ большомъ количествѣ въ садахъ и лѣсахъ по р. Курѣ, въ талышинскихъ лѣсахъ, выше лѣсного пояса по садамъ, разведеннымъ въ глубокой рѣчной долинѣ между сс. Руарутъ и Кальвазъ (выше 6000'); на Маломъ Кавказѣ по верховьямъ Тертера. Осенью щеглы не торопятся спускаться на низменность: такъ, я встрѣтилъ ихъ въ смѣшанномъ лѣсу около Сарыкамыша еще 8. X. 900 и въ Гельской лѣсной дачѣ 30. VIII. 902 (выше 7000').

Зимою щеглы большими стаями кочуютъ на низменности и представляютъ самую легкую добычу мальчишекъ-птицелововъ, такъ что на рынкѣ въ Тифлисѣ продаются копѣйки по двѣ.

С. А. Бутурлинъ при сравненіи пяти экземпляровъ закавказскаго щегла своей коллекціи съ типомъ Заруднаго опредѣлилъ ихъ какъ *C. c. brevirostris*. Но, принадлежать ли къ этому подвиду все закавказскіе щеглы или встрѣчается здѣсь и типичная форма, пока неизвѣстно. Типъ происходитъ изъ Баку.

24. *Chrysomitris spinus* L. Чижъ.

Мензбиръ, II, 646.

Гораздо рѣже щегла. Я только однажды встрѣтилъ его на гнѣздовье, именно 27. V. 95 встрѣтилъ маленькую стайку чижей на границѣ лѣсной растительности въ уроцищѣ Турагай на Мурровъ-дагѣ. Лѣсъ состоялъ здѣсь изъ граба, дуба, клена и др. лиственныхъ породъ, хвойныхъ-же здѣсь неѣтъ вовсе; поэтому у меня осталось сомнѣніе въ томъ, что чизи здѣсь действительно гнѣздятся, тѣмъ болѣе, что еще немного выше почки на деревьяхъ едва только распускались.

Зимою чижъ очень обыкновененъ на низменности, но всегда маленькими стаяками. Весною я часто наблюдалъ его въ компаніи со щеглами, а одинъ разъ съ канареечнымъ вьюркомъ. Сильный

осенний летъ чижей надъ Тифлисомъ начинается въ половинѣ октября.

Въ концѣ ноября они больше не встречаются здѣсь.

25. *Acanthis cannabina* L. Рѣполовъ.

Мензбиръ, II, 613.

Громадными стаями зимуетъ на низменности р. Куры. Около Тифлиса я наблюдалъ рѣполова со средины ноября до начала апреля.

26. *Acanthis fringillirostris* Bonap. et Schleg. Кавказскій рѣполовъ.

Мензбиръ, II, 617.

Какъ гнѣздащаяся птица кавказскій рѣполовъ встрѣченъ мною въ восточной части Кавказскаго хребта въ предѣлахъ Шемахинскаго у. (близъ с. Маразы 2. V. 96), въ нагорной части Кубинскаго уѣзда (сс. Сусай — Мурухъ 16. VI. 96), во многихъ мѣстахъ Дагестана и на горныхъ лугахъ Малаго Кавказа. Гнѣздится преимущественно въ безлѣсныхъ мѣстностяхъ по балкамъ, поросшимъ мелкимъ кустарникомъ.

Зимою также сбивается въ большія стаи и кочуетъ по низменности. Около Тифлиса я наблюдалъ его зимою съ января до начала апреля. Они кормятся по полямъ и усаживаются на ночлегъ по кручамъ, поросшимъ кустарникомъ.

27. *Acanthis brevirostris* Moor.

Мензбиръ, II, 606.

Встрѣчена мною тоже только зимою близъ Тифлиса большими стаями. Можетъ быть, зимою всѣ эти виды летаютъ вмѣстѣ въ одной стаѣ. Во всякомъ случаѣ, въ это время они ничѣмъ не различаются по своимъ повадкамъ.

28. *Oraeginthus pusillus* Pall. Королевскій вьюрокъ.

Мензбиръ, II, 644 (*Serinus pusillus*).

Королевскій вьюрокъ, или малиновка, какъ называютъ его тифлисскіе птицеловы, — обыкновенная птица альпійской области Большого и Малаго Кавказа и держится тамъ, гдѣ альпійскіе луга перемѣшаны съ обнаженными скалами и каменными осыпями. Они любятъ также кустики, ютящіеся по обрывамъ и трещинамъ

отвѣсныхъ скалъ. Тамъ, гдѣ нѣтъ скаль и камней, ихъ не уви-дишь.

Зимою эта птичка спускается ниже, но на низменности не замѣчена. Только во время сильной мятли въ концѣ декабря 1905 года я видѣлъ въ Тифлисѣ одного такого выюрка, подлетѣвшаго къ выѣщенной на выходящемъ въ садъ балконѣ клѣткѣ съ птичкой того же вида. Въ 1906 году на птичьемъ базарѣ въ Тифлисѣ королевскіе выюрки появились уже 21. X, но они были пойманы гораздо выше, въ горахъ.

Несмотря на то, что статья моя не преслѣдуется систематическихъ цѣлей, я позволю себѣ сдѣлать исключение для этой и еще другой птички и сказать нѣсколько словъ объ ихъ систематическомъ положеніи. Вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ высокоавторитетныхъ орнитологовъ я никакъ не могу согласиться на присоединеніе королевскаго выюрка къ роду *Serinus*.

Что же общаго у *Oraeginthus pusillus* и *Serinus hortulanus*? Мнѣ отвѣтить, конечно: пластические признаки. Но вся моя уже немалая теперЬ зоологическая практика привела меня къ заключенію, что эти „пластические“ признаки... черезчуръ пластичны, т. е. измѣняются очень легко, и гораздо болѣе надежнымъ признакомъ является извѣстная группировка цветковъ окраски.

Несмотря на всю мою орнитологическую неопытность, я твердо убѣжденъ, что предложенное въ послѣднее время Hartert'омъ *) соединеніе въ одинъ родъ *Acanthis* (или *Carduelis*) щегловъ, чижей, чечетокъ и проч. не будетъ принято ни однимъ опытнымъ орнитологомъ.

Многочисленные африканскіе виды *Serinus*, съ которыми я случайно познакомился, поразительно однообразны по окраскѣ (въ смыслѣ сочетанія цветовъ) и не имѣютъ ничего общаго съ *Oraeginthus*.

Далѣе, всякій, наблюдавшій на волѣ *Oraeginthus* и *Serinus*, согласится, что въ образѣ ихъ жизни нѣть ничего общаго.

Когда стайка *Oraeginthus pusillus* съ характернымъ чириканьемъ проносится по альпійскому лугу съ одного камня на другой, никому, глядя на нихъ, и въ голову не придетъ причислить эту птичку къ роду *Serinus*, представители котораго всѣ — древесныя птицы.

*) Hartert, Die Vögel der paläarktischen Fauna, I, p. 65.

29. *Serinus canaria serinus* L. Канареечный вьюрокъ.

Hartert, 83.

28. III. 96 я встрѣтилъ стайку, штукъ въ 10, этихъ птичекъ въ паркѣ Муштандъ въ Тифлисѣ и добылъ изъ нихъ 4 штуки: 2 самцовъ и 2 самокъ.

Они сидѣли на вершинѣ высокаго дерева (гледичіи) и пѣли. Я прослѣдилъ ихъ до первыхъ чиселъ апрѣля, когда долженъ былъ уѣхать. Они держались во все время въ одномъ мѣстѣ парка и, повидимому, собирались здѣсь гнѣздиться. 2. IV я добылъ еще одного самца; они летали въ это время вмѣстѣ съ чижами и зябликами.

Канареечный вьюрокъ на Кавказѣ никѣмъ кромѣ меня не наблюдался. Поэтому я предполагаю, что это была случайно за-летная стайка или передовая при разселеніи его къ сѣверу. Иначе трудно объяснить, почему его никто до сихъ поръ не замѣтилъ.

30. *Rugihula pyrrhula Rossikowi* Derjugin. Кавказскій снѣгирь.
Дерюгинъ, Ежегодн. Зоол. Муз. Имп. Ак. Наукъ, V, 1900, стр. 285.

Я встрѣчалъ снѣгири только зимою (XI—I) въ Тифлисѣ въ паркѣ Муштандъ. Немногіе экземпляры, добытые здѣсь мною въ ноябрѣ и декабрѣ, я опредѣлилъ сперва, какъ *Rugihula coccinea*, но, по свидѣтельству В. Л. Біанки, всѣ закавказскіе снѣгири относятся къ установленному Дерюгінымъ подвиду *R. p. Rossikowi*. Замѣчу, однако, что пока число закавказскихъ экземпляровъ этой птицы въ коллекціяхъ весьма ограничено, а мои, напр., добыты въ мѣстности, где снѣгирь является случайною птицей. Изъ мѣстностей же, где зимою онъ обыкновененъ, напр., изъ Нухи, экземпляровъ пока не имѣется. Изъ соотвѣтствующей главы сочиненія Радде нельзя понять, о какомъ видѣ идетъ рѣчь.

Изъ всего этого слѣдуетъ, что пока нельзя еще решить, действительно ли это — единственный снѣгирь Закавказья.

На Сѣверномъ же Кавказѣ живетъ, вѣроятно, и другой видъ.

31. *Carpodacus erythrinus roseatus* Hodgs. Чечевица.

Hartert, 108.

Я нигдѣ не нашелъ чечевицы гнѣздающею на низменности, хотя она здѣсь и задерживается довольно поздно, до половины мая.

Не различить голоса этой столь знакомой мнѣ птицы среди хора другихъ пѣвцовъ представляется мнѣ положительно невозможнымъ. На низменности я наблюдалъ ее съ конца апрѣля (Тифлисъ, Муштаидъ, 23. IV. 96; Талышинская низменность, с. Арчеванъ, 24. IV. 97, с. Машханъ, 29. IV. 98) до средины мая (Ахъ-су, Шемахинского уѣзда, 12. V. 96; Тифлисъ, Муштаидъ, 12. V. 906).

Гнѣздающеся я нашелъ чечевицу въ горахъ Большого Кавказа отъ пояса лѣса (приблизительно съ 3000') до альпийскихъ луговъ. Чечевица не встрѣчается въ силошныхъ густыхъ лѣсахъ, а держится тамъ, гдѣ лѣсъ чередуется съ лугами, и особенно любить стоящія среди нихъ болѣпія одиночныя деревья, на вершинѣ которыхъ самцы и поютъ обыкновенно во время высиживанія самками яицъ. Тамъ, гдѣ нѣтъ уже болѣе ни деревьевъ, ни кустарника, чечевица гнѣздится въ высокихъ бурьянахъ субальпийскихъ луговъ, особенно на громадныхъ зонтичныхъ, какъ я наблюдалъ это по дорогѣ изъ аула Микрахъ въ аулъ Куруши, высочайшее селеніе Кавказа. Особенно много было ихъ близъ аула Пиркендъ на высотѣ свыше 7000'.

На Шахъ-дагѣ, поднимаясь изъ аула Лаза, я встрѣтилъ ихъ 17. VI. 96 въ мѣстности съ очень скудною, низкою альпійскою растительностью и не могъ догадаться, гдѣ онѣ находять здѣсь мѣсто для устройства своихъ гнѣздъ. Самцы здѣсь поютъ усѣвшись на какой нибудь высокій обломокъ скалы, какъ и близъ Пиркенда. 16. VI. 96 я нашелъ на заросшей высокимъ бурьяномъ полянѣ среди лѣса между селеніями Сусай и Мурухъ въ горной части Кубинскаго уѣзда гнѣздо съ пятью уже насиженными яйцами. Оно помѣщалось въ единственномъ маленькомъ кустикѣ среди этой поляны. Въ непосредственномъ сосѣдствѣ гнѣздились и *Acrocephalus palustris*.

23. V. 96 я слышалъ чечевицу въ садахъ селенія Зизикъ, недалеко отъ г. Кубы, ниже 2000', такъ что, можетъ быть, граница гнѣзданія этой птицы лежитъ и ниже указанного мною предѣла. Но это было единственный только разъ.

Въ Талышинскихъ горахъ я встрѣтилъ чечевицу гнѣздающуюся около сел. Лирикъ (18. V. 97).

Помимо перечисленныхъ выше мѣстностей я встрѣчалъ чечевицу и во многихъ мѣстностяхъ нагорной части Кубинскаго уѣзда и Дагестана, а также (въ началѣ мая) и въ садахъ Терской области, но странно, что она ни разу не встрѣчалась мнѣ

въ горахъ Малаго Кавказа. Впрочемъ, въ юго-западной части Закавказья я никогда не былъ въ началѣ лѣта.

Закавказскіе экземпляры окрашены значительно ярче, чѣмъ средне-руssкіе. Hartert (l. c.) относитъ кавказскіе экземпляры обыкн. чечевицы къ подвиду *C. c. roseatus*, но говоритъ, что по окраскѣ она иногда сильно приближается къ типичной формѣ.

32. *Loxia curvirostra caucasica* Buturlin. Клестъ-еловикъ кавказскій.

Buturlin, Reichenow's Ornithol. Monatsber., Jann. 1907, p. 8.

Я встрѣтилъ клеста единственный разъ, именно 18. VIII. 902 въ селеніи Гагва Ахалцихскаго уѣзда (восточный склонъ Месхийскаго хребта), расположенному среди смѣшанного лѣса, съ преобладаніемъ лиственныхъ породъ. Здѣсь стайка клестовъ, штуку въ восемь, усѣлась рядомъ на шесть на балконѣ въ трехъ шагахъ отъ меня.

Въ бытность мою въ Бакуріанахъ мнѣ передавали, какъ особое чудо, что во время рубки лѣса зимию было найдено гнѣздо клеста съ еще голыми птенцами.

По Бутурлину (l. c.), кавказскій клестъ отличается отъ типичнаго болѣе яркимъ краснымъ цвѣтомъ у старыхъ самцовъ.

33. *Fringilla coelebs* L. Зябликъ.

Мензбиръ, II, 626.

Обыкновеннѣйшая птица всего Кавказскаго края и встрѣченъ мною вездѣ, гдѣ есть сады или какая нибудь древесная растительность.

Область гнѣздовья зяблника совершенно совпадаетъ съ границами лѣсного пояса горъ. Въ Талышинскихъ горахъ онъ найденъ мною и въ тѣхъ садахъ, которые разведены въ глубокой балкѣ между с. Руаруть (=Рувары) и Кяльвазъ, уже выше естественной лѣсной границы. Но въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лѣсъ спускается къ самому морю и вліяніе послѣдняго уменьшаетъ лѣтнюю жару, именно въ Талышѣ и по черноморскому побережью, и зябликъ гнѣздится на уровняхъ моря. На жаркой же низменности восточнаго Закавказья, до высоты Тифлиса, зяблника лѣтомъ не бываетъ, зато онъ весьма многочисленъ зимию. Появляется онъ здѣсь въ концѣ августа и остается, смотря по погодѣ, до среди-

ны или конца апрѣля, къ каковому времени его нарядъ получаетъ наибольшую интенсивность окраски.

Для своего мѣстожительства зябликъ выбираетъ преимущественно лиственные лѣса, но встрѣчается и въ чисто хвойныхъ, каковы лѣса около Гельской котловины.

34. *Fringilla montifringilla* L. Вьюрокъ.

Мензбиръ, II, 621.

Эта сѣверная птичка въ громадномъ количествѣ зимуетъ на низменности, а отчасти и предгорьяхъ восточнаго Закавказья. Первое время по прилетѣ сюда они, вѣроятно, держатся въ поясѣ лѣса. Только однажды я видѣлъ на тифлисскомъ птичьемъ рынке одного вьюрка, пойманнаго гдѣ то въ окрестностяхъ города уже 15. X. 906. Въ громадномъ же количествѣ появляются они только послѣ выпаденія большого снѣга. Въ 1905 году я замѣтилъ первого вьюрка въ городѣ 7. XII; съ тѣхъ поръ число ихъ все увеличивалось, но, какъ только въ январѣ снѣгъ стаялъ, откочевали и вьюрки. Въ суровую зиму 1895—96 г. громадная стаи ихъ носились по прилежащимъ къ Тифлису степямъ. Въ мятель имъ приходилось плохо: такъ, послѣ сильной мятели и мороза, розыгравшихся 24. I. 96, я находилъ много ихъ замерзшими. Въ одной норѣ полевки (*Microtus socialis*) я нашелъ вмѣстѣ четыре штуки погибшихъ такимъ образомъ вьюрковъ. Въ этомъ году они задержались здѣсь очень поздно, и я убилъ одного въ паркѣ Муштаандѣ еще 13. IV.

35. *Montifringilla alpicola* Pall. Горный вьюрокъ.

Мензбиръ, II, 618.

26 и 27. IV. 99, проѣзжая по военно-грузинской дорогѣ, я наблюдалъ горнаго вьюрка отъ ст. Гудауръ до ст. Казбекъ и немного дальше послѣдней. Между Гудауромъ и Коби стояла еще суровая зима и лежалъ глубокій спѣгъ. Здѣсь я могъ убѣдиться, что окраска горнаго вьюрка совершенно гармонируетъ съ окружающею обстановкой и, когда онъ садится на бурый камень среди снѣжнаго поля, то совершенно сливаются съ ними. Несмотря на отвратительную погоду (все было затянуто туманомъ и моросиль мелкій дождь), вьюрки чувствовали себя, очевидно, въ самомъ разгарѣ весны. Они то сидѣли на обрывахъ и оглашали этотъ

мертвый пейзажъ своимъ чрезвычайно мелодичнымъ пѣніемъ, то перелетали волнистымъ полетомъ съ мѣста на мѣсто и гонялись другъ за другомъ. Самки попадались, однако, рѣдко, а большинство державшихся на виду птицъ были самцы. Все таки мнѣ удалось убить и пару самокъ, въ которыхъ я нашелъ яйца на сносѣ.

Горные выюрки живутъ здѣсь круглый годъ и зимою попадаются большими стаями на самой дорогѣ, роясь въ пометѣ, какъ воробы.

Здѣсь же наблюдалъ я ихъ и лѣтомъ 14—17. VI. 901. Они держались на тѣхъ же мѣстахъ и самцы усердно пѣли. Летящій выюрокъ со своими бѣлыми крыльшками чрезвычайно красивъ на зеленомъ фонѣ альпійскаго луга, но, едва онъ сѣлъ на камень, какъ совершенно исчезаетъ изъ вида.

Ни по своимъ повадкамъ, ни по пѣнію горный выюрокъ нисколько не похожъ на другихъ нашихъ выюровъ.

36. *Petronia petronia exigua Hellmayr.* Каменный воробей.

Hartert, 143.

На гнѣзовѣй я находилъ каменного воробья въ большомъ количествѣ въ разныхъ мѣстахъ Дагестана (Гимры, Леваши, Акуша), въ Талышинскихъ горахъ (Барнасарскій перевалъ) и въ Кульцахъ Эриванской губ. Вѣроятно, онъ гнѣздится и гдѣнибудь въ горахъ около Тифлиса, но я убивалъ его здѣсь только въ ноябрѣ и весной (9. IV. 95).

Я отношу закавказскаго каменного воробья къ подвиду *P. p. exigua* только по свидѣтельству Hartert'a (I. c. p. 143).

37. *Passer domesticus caucasicus M. Bogdanow.* Кавказскій воробей.

Мензбиръ, II, 632.

Сырче (татарск.).

Я не могу, конечно, въ точности указать отличительныхъ признаковъ этого подвида, но разница между типичною и кавказскою формами въ общей окраскѣ такъ сильно бросается въ глаза, что отожествлять ихъ невозможно.

Домашній воробей обыкновененъ во всемъ Кавказскомъ краѣ въ плодородныхъ мѣстностяхъ и часто встречается и далеко отъ жилищъ.

Гнѣздится онъ въ постройкахъ, въ аистовыхъ гнѣздахъ, хотя гораздо рѣже черногрудаго воробья, и наконецъ въ самостоительно устроенныхъ гнѣздахъ. 10. VI. 97 я нашелъ около Белясувара (Джеватского уѣзда) въ заброшенномъ тутовникѣ на молодыхъ тутовыхъ деревьяхъ обширную колонію домашнихъ воробьевъ. На каждомъ деревѣ было по нѣсколько штукъ довольно большихъ круглыхъ грубо сдѣланныхъ изъ соломы гнѣздъ.

38. *Passer hispaniolensis transcaspicus Tschusi.* Черногрудый воробей.

Hartert, 157.

Кара-сырче (татарск., Кубинского уѣзда).

Я называю кавказскаго черногрудаго воробья этимъ именемъ также только на основаніи свидѣтельства Hartert'a (I. c. 157).

Черногрудый воробей широко распространенъ въ степной части Кубинской низменности, по всей низменности восточнаго Закавказья и однажды былъ встрѣченъ мною на Закавказскомъ плоскогорье въ Гельской котловинѣ.

Послѣднее мѣстонахожденіе, впрочемъ, не подтверждено документально. Именно 28. VIII. 902 я видѣлъ около гнѣзда аиста на развалинахъ старинной церкви въ с. Окамъ воробьевъ, у которыхъ въ окраскѣ было много чернаго и которыхъ я принялъ за *P. hispaniolensis*, но, когда я вернулся въ началѣ сентября съ ружьемъ, то засталъ только *Passer domesticus*. Думаю, однако, что я не ошибся, такъ какъ хорошо знаю эту птицу.

Несмотря на широкое распространеніе черногрудаго воробья, быстро проѣзывающій по странѣ изслѣдователь легко можетъ пропасть его вслѣдствіе того, что онъ встрѣчается только спорадически болѣе или менѣе обширными колоніями. Я замѣтилъ, что распространеніе черногрудаго воробья тѣсно связано съ распространеніемъ бѣлого аиста, ибо чаще всего этотъ воробей гнѣздится въ гнѣздахъ аиста, безразлично, обитаемы они или уже покинуты ихъ настоящими владельцами. Гнѣзда воробья помѣщаются или въ самой толщѣ довольно безалабернаго аистового гнѣзда, или облѣпляютъ его круглыми комками соломы. Гораздо интереснѣе гнѣзда, устраиваемыя ими самостотельно. Иногда они устраиваются въ нѣкоторомъ отдаленіи другъ отъ друга, иногда плотно другъ къ другу, съ общую крышей, и тогда весьма напоминаютъ гнѣзда

африканского общественного воробья. Такое гнѣздо, конечно, далеко не такъ правильно и аккуратно, какъ это рисуютъ для по-слѣдняго, но я и не думаю, чтобы эти рисунки были очень вѣрны. Гнѣзда первого типа я находилъ въ Кубинскомъ уѣздѣ. Въ сел. Каракайли-Василь-оба на молодомъ засохшемъ пирамидальномъ тополѣ находилось штукъ 15 такихъ гнѣздъ, которая размѣщались по два, по три въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ отъ главнаго ствола отходили боковыя вѣтви, и представляли собою довольно крупные грубо сдѣланые соломенные шары съ отверстиемъ сбоку.

Самое большое общее гнѣздо я встрѣтилъ въ сел. Саять Кубинского уѣзда. Оно помѣщалось на громадномъ платанѣ, тамъ, гдѣ главный стволъ раздѣлялся на нѣсколько вѣтвей, и обхватывало и стволъ и вѣтви. Насколько помню, оно имѣло болѣе двухъ аршинъ въ діаметрѣ и круглую сплюснутую сверху внизъ форму. Сверху оно было совершенно закрыто, а съ боковъ и снизу всюду виднѣлись многочисленныя входыя отверстія. Кругомъ хлопотали воробы. Что въ основѣ этого сооруженія не было гнѣзда аиста, ясно изъ того, что аисты не выютъ гнѣздъ въ полдерева.

Хотя у черногрудаго воробья, какъ у птицы перелетной, должно было бы ожидать большей правильности во времени кладки яицъ и высиживанія птенцовъ, чѣмъ у домашняго воробья, на дѣлѣ оказывается, что въ одной и той же колоніи можно найти всѣ стадіи развитія отъ свѣжаго яйца до почти оперившихся молодыхъ. 6. VI. 96 въ селеніи Нижніе Кущи въ одномъ гнѣздѣ, прикрѣпленномъ къ брошенному гнѣзду аиста, я нашелъ девять голыхъ птенцовъ различной величины: самый маленький былъ вдвое меньше самаго большого. У одной самки, убитой въ сел. Хиналагъ-оба, во рту былъ сверчокъ, — слѣдовательно, она кормила птенцовъ; въ другой найдено совершенно сформировавшееся яйцо, еще безъ скорлупы; въ этомъ же селеніи въ тотъ же день мальчишки достали мнѣ изъ гнѣзда четырехъ уже полуоперившихся молодыхъ.

Черногрудый воробей любить открытыя плодородныя мѣстности, такъ какъ питается почти исключительно зерномъ, — слѣдовательно, является настоящимъ паразитомъ.

Поэтому въ лѣсистыхъ мѣстахъ, какъ, напримѣръ, на Талышинской низменности, онъ нигдѣ мною на гнѣзовъѣ не встрѣченъ. Колоніи его я встрѣтилъ въ Кубинскомъ уѣздѣ, именно въ

степной его части, по Араксу, около Мендживанского поста * и въ Джеванширскомъ уѣздѣ.

Самая большая колонія была осмотрѣна мною въ сел. Кеймуразъ 4. VI. 96 (въ Кубинскомъ уѣздѣ); здѣсь тростниковые воробы вмѣстѣ со скворцами жили въ аистовой колоніи изъ семи гнѣзда.

Повсюду мѣстные жители увѣряли меня, что черногрудые воробы остаются на зиму здѣсь же. Но я думаю, что они ошибаются. Энергично экскурсируя въ концѣ февраля и марта 1895 г. въ Джеватскомъ уѣздѣ, я ни разу не видѣлъ здѣсь другихъ воробьевъ кромѣ домашнихъ. Въ началѣ же апрѣля 1897 г. всюду по тракту отъ станціи Аджи-Кабуль (5. IV) до Сальянъ (7. IV) я встрѣтилъ большія стаи черногрудыхъ воробьевъ, которые летали вмѣстѣ со скворцами. Немного позже я встрѣтилъ такія же смѣшанныя стаи и на Ленкоранской низменности.

Вся сумма моихъ наблюдений указываетъ, повидимому, на то, что черногрудый воробей прилетаетъ въ Закавказье въ началѣ апрѣля, или, быть можетъ, въ послѣднихъ числахъ марта, и по прилетѣ нѣкоторое время держится стаями, при чемъ въ это время залетаетъ и въ такія мѣстности, гдѣ не гнѣздится (южная часть Ленкоранского уѣзда, Арешскій уѣздъ Елисаветпольской губ.). Отлетаетъ онъ, судя по единственному, при томъ ненадежному наблюденію въ Гельской котловинѣ, въ началѣ сентября. Но с. Окамъ лежить на высотѣ болѣе 7000', — слѣдовательно, на низменности это должно происходить позднѣе.

39. *Passer montanus* L. Полевой воробей.

Мензбиръ, II, 636.

Полевой воробей, сравнительно съ домашнимъ, встрѣчается очень рѣдко. Онъ найденъ мною въ Тифлисѣ, по долинѣ Куры въ Тифлисскомъ и Елисаветпольскомъ уѣздахъ, на Маломъ Кавказѣ (сс. Шихаузъ — Мазра, 28. VI. 94) и во многихъ селеніяхъ Дагестана; въ нѣкоторыхъ изъ послѣднихъ я замѣтилъ, что это былъ единственный встрѣчающійся тамъ видъ, напр., въ аулѣ Цугни Даргинскаго округа (15. VIII. 97). Около Тифлиса и въ самомъ городѣ онъ встрѣчался мнѣ только зимою. Въ селеніи Алабашлы на низменности Елисаветпольского уѣзда 23. IV. 95 я

* А не Шахчинарскаго, какъ я ошибочно сообщилъ проф. М. А. Мензбиру.

услышалъ какую то незнакомую мнѣ короткую пѣсню, и, когда убилъ птицу, къ удивлению, узналъ въ ней полевого воробья.

Я ни разу не встрѣчалъ этого воробья ни въ Талышѣ, ни на черноморскомъ побережїѣ, ни на сравнительно хорошо изслѣдованной мною Кубинской низменности.

С. А. Бутурлинъ отличилъ полевого воробья западнаго Закавказья, какъ *Passer montanus transcaucasicus* (*Ibis*, 1906, р. 423). Но я не знаю, относится ли это описание и къ воробьямъ восточнаго Закавказья, а тѣмъ болѣе Дагестана, а потому и привожу наблюдавшихся мною полевыхъ воробьевъ пока подъ именемъ *P. montanus* L., такъ какъ въ западномъ Закавказьѣ я этой птицы не наблюдалъ.

Подсем. *Emberizinae*.

40. *Miliaria calandra* L. Просянка.

Мензбиръ, II, 562 (*Emberiza miliaria*).

Просянка — обыкновеннѣйшая осѣдлая птица Закавказья. Она гнѣздится здѣсь отъ уровня моря до альпійскихъ луговъ. Такъ, въ Талышинскихъ горахъ я встрѣтилъ ее близъ поста Кяльвазъ 26. V. 96 на высотѣ около 7000'. Спускаются ли гнѣздающіеся столь высоко экземпляры зимою на низменность, я не знаю, но около Тифлиса она держится и зимою и лѣтомъ на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ, и въ одинаковомъ количествѣ. Распространеніе ея связано съ распространеніемъ посѣвовъ, на которыхъ или вблизи которыхъ она постоянно держится. По обработаннымъ полямъ поднимается она и высоко въ горы. Птичка эта лѣтомъ чрезвычайно довѣрчива и подпускаетъ человѣка на нѣсколько шаговъ.

Пустынныхъ мѣстностей, каковы, напр., невысокая плоская возвышенность Бозъ-дагъ и неорошенная часть Мугани, просянка избѣгаетъ, равно какъ и сырыхъ и лѣсистыхъ мѣстностей. Уже съ конца марта слышно трескучее пѣніе просянки, при чемъ она обыкновенно сидитъ на изгороди или маленькомъ кустикѣ.

41. *Emberiza citrinella erythrogenys* Brehm. Обыкновенная овсянка.

Мензбиръ, II, 553 (*Emberiza citrinella*); Hartert, 169.

Распространеніе обыкновенной овсянки въ Закавказьѣ для меня не вполнѣ ясно. Я не знаю даже, гнѣздится ли она тутъ, и встрѣчалъ ее главнымъ образомъ только осенью и зимою.

Съ ноября по февраль я встрѣчалъ ее небольшими стайками по долинѣ р. Куры около Тифлиса и въ Арешскомъ уѣздѣ Елисаветпольской губ., 27. IX. 98 около города Гори, 6. XI. 96 въ горной части Елисаветпольского уѣзда около духоборскихъ селеній и, наконецъ, одинъ разъ въ апрѣль (24. IV. 97) на Талышинской низменности близъ персидской границы у сел. Алаша-кендѣ. Въ послѣднемъ мѣстѣ жители жаловались на то, что она поѣдаетъ много чалтыка (риса). Я не берусь дѣлать какойнибудь выводъ изъ столь отрывочныхъ наблюденій, хотя не могу не замѣтить, что странно было бы, если я пропустилъ ее гдѣ нибудь на гнѣздувѣ въ восточномъ Закавказье.

42. *Emberiza melanocephala* Scop. Черноголовая овсянка.

Мензбиръ, II, 567.

Распространеніе этой красивой, милой птички въ предѣлахъ Кавказскаго края весьма обширно.

Въ степяхъ Сѣвернаго Кавказа она всюду обыкновенна и 8. V. 99 я нашелъ ее еще по р. Калаусу; сѣвернѣе я не былъ.

По побережью Каспійскаго моря и въ восточномъ Закавказье я встрѣчалъ ее всюду какъ въ пустынныхъ степяхъ, если только тамъ понадаются хоть какіе нибудь кустики, такъ и въ культурныхъ мѣстностяхъ, и на уровняхъ моря, и довольно высоко въ горахъ. Лѣсовъ и сырыхъ мѣстностей черноголовая овсянка избѣгаетъ. Высоко въ горахъ я нашелъ ее въ уроцищѣ Умутлы по склону Муровъ-дага и въ Талышинскихъ горахъ 18. V. 97 около селенія Лирикъ, гдѣ она гнѣздила рядомъ съ *Carpodacus erythrinus*, и 27. V. 98 около сел. Кяльвазъ. Но всетаки обильнѣе всего она держится на низменности и предгорьяхъ, покрытыхъ рѣдкимъ кустарникомъ, особенно любимымъ ею держи-деревомъ (*Paliurus australis*). Я никогда не наблюдалъ, чтобы самцы усаживались для пѣнія рядомъ на одинъ кустъ, какъ обѣ этомъ говорить Палласъ. Сколько бы ни было въ данной мѣстности черноголовыхъ овсянокъ, — а иногда ихъ бываетъ очень много, — всегда каждый самецъ сидитъ отдельно на вершинѣ маленькаго кустика. Это положительно одинъ изъ лучшихъ пѣвцовъ Закавказья, по мелодичности и звучности своего голоса далеко оставляющій за собою здѣшняго соловья.

Гнѣздо черноголовая овсянка вѣтъ среди куста держи-дерева; часто оно бываетъ спрятано довольно плохо: 16: V. 94 я нашелъ

въ одномъ ущельѣ Бозъ-дага нѣсколько такихъ гнѣздъ въ недалекомъ другъ отъ друга разстояніи. Всѣ они содержали по пяти яицъ.

Прилетѣть черноголовой овсянки я наблюдалъ на низменности Елисаветпольского уѣзда 20. IV. 95 у сел. Калякъ. Овсянки держались въ это время небольшою стайкой. 20. IV. 97 на Талышинской низменности въ сел. Бутасаръ мнѣ принесли продавать черноголовую овсянку, пойманную здѣсь нѣсколько дней тому назадъ. Замѣчу, что въ южной части Ленкоранскаго уѣзда эта птица врядъ ли гнѣздится на низменности, ибо мѣстность здѣсь для нея совершенно неподходящая, кромѣ узкой полосы вдоль берега моря, гдѣ я дѣйствительно и убилъ одну близъ сел. Гилякеранъ 1. V. 98.

Улетаетъ изъ Закавказья черноголовая овсянка сравнительно очень рано, уже въ августѣ. Какъ исключеніе, я видѣлъ у одного охотника 3. IX. 95 только что убитую имъ подъ Тифлисомъ птичку этого вида.

43. *Emberiza hortulana* L. Садовая овсянка.

Мензбиръ, II. 545.

Я никакъ не могу согласиться съ мнѣніемъ Радде, что садовая и горная (*Emberiza cia*) овсянки занимаютъ на Кавказѣ одну и ту же область. Такое мнѣніе вышеупомянутаго ученаго тѣмъ болѣе странно, что садовая овсянка въ Закавказье только *льтующая* птица, а горная — *осьдлая*.

По моимъ наблюденіямъ, садовая овсянка занимаетъ въ восточномъ Закавказье область предгорій, но поднимается и довольно высоко въ горы; на Маломъ Кавказѣ и южныхъ склонахъ Главнаго хребта она не встрѣчалась мнѣ, однако, выше 5000'. Въ Дагестанѣ распространена очень широко и еще въ августѣ встрѣчена мною на значительной высотѣ, именно по дорогѣ изъ аула Вихли въ Кази-Кумухъ. Впрочемъ, это могли быть и пролетныя птицы.

Садовая овсянка избѣгаетъ такихъ сухихъ, пустынныхъ мѣстностей, какія любить черноголовая овсянка, а держится среди болѣе обильной растительности и преимущественно по заросшимъ кустарникомъ склонамъ горъ. Прилетѣть садовой овсянки на Елисаветпольской низменности я наблюдалъ одновременно съ приле-

томъ черноголовой 20. IV. 95. Стайки обоихъ видовъ попались мнѣ здѣсь одна за другой. Около Тифлиса въ 1896 г. я встрѣтилъ ее первый разъ 18. IV, около Ленкорани 18. IV. 97. Въ концѣ августа эта птичка исчезаетъ.

Пѣніе садовой овсянки довольно пріятно, но не можетъ быть и сравнено съ пѣніемъ черноголовой.

44. *Emberiza cia* par Hartert. Горная овсянка.

Hartert, 184.

Обыкновенная осѣдлая птичка всей горной области Кавказа. Нижняя граница ея гнѣздовой области здѣсь, вѣроятно, не ниже 3000'. Ни около Тифлиса, ни около Мцхета она еще не гнѣздится, а появляется здѣсь только зимою. Она любить крутые склоны и обрывы, поросшіе скудно горною растительностью, почему я нашелъ ее весьма многочисленною въ Артвинскомъ округѣ и Дагестанѣ, но ни разу не видалъ въ Талышинскихъ горахъ.

Зимою горная овсянка спускается ниже, но все же не доходитъ до уровня моря. Около Гудаура на Крестовомъ перевалѣ она встрѣчается еще и въ декабрѣ. Въ холодныхъ зимы она все же многочисленнѣе въ Мцхетѣ, чѣмъ въ ниже лежащемъ Тифлисѣ. Только глубокій снѣгъ загоняетъ ее иногда въ тифлисскіе сады. Но на высотѣ Тифлиса она всетаки остается лишь довольно короткое время — съ ноября по мартъ. Какъ видно изъ этого краткаго очерка, она имѣть мало общаго съ садовою овсянкой.

45. *Emberiza schoeniclus* Tschusii Reiser & Almasy. Камышевая овсянка.

Hartert, 198.

Я встрѣчалъ камышевую овсянку только въ февралѣ и мартѣ около Тифлиса на Соленомъ озерѣ. 2. II. 96 я убилъ парочку въ сырой балкѣ около упомянутаго озера, въ кустикахъ. Самецъ имѣлъ полный брачный нарядъ. 10. III. 96 я встрѣтилъ на озерѣ еще парочку: они летали по берегу и садились на плавающіе пучки камыша. Самое позднее, что я видѣлъ ихъ здѣсь, было 26. III. 900.

Я отношу ихъ къ подвиду *E. sch. Tschusii* по свидѣтельству Hartert'a (l. c. p. 198).

Сем. 5. Alaudidae. Жаворонковыя.

46. *Melanocorypha calandra* L. Большой степной жаворонокъ.

47. *Melanocorypha bimaculata* Ménétr.

Мензбиръ, II, 435.

Къ сожалѣнію, какъ разъ лѣтніе экземпляры большихъ степныхъ жаворонковъ остались по большей части не опредѣленными, и я не знаю, куда ихъ дѣлъ Г. И. Радде; въ каталогѣ Музея они не значатся. Поэтому я долженъ говорить объ обоихъ видахъ вмѣстѣ.

Степные жаворонки весьма обыкновенны во всѣхъ низменныхъ степяхъ восточного Закавказья, начиная отъ Тифлиса, а также въ степяхъ каспійского побережья и Сѣвернаго Кавказа.

Зимою около Тифлиса я убивалъ только *Melanocorypha calandra*; они остаются здѣсь до марта. Жаворонки же, гнѣздащіеся по каспійскому побережью, опредѣлены мною какъ *Melanocorypha bimaculata*. Оба вида наиболѣе любятъ пустынныя полынныя стени.

Гнѣздащійся видъ ковыльныхъ степей Сѣвернаго Кавказа опредѣленъ мною какъ *Melanocorypha calandra*.

Указаніе Hartert'a (I. c. 210) на гнѣзданіе *Melanocorypha bimaculata* на Талышинской низменности, т. е. въ южной части Ленкоранскаго уѣзда, очевидно, основано на недоразумѣніи, ибо тамъ нѣть ни степей, ни жаворонковъ.

48. *Calandrella brachydactyla* Leissl. Малый жаворонокъ.

Мензбиръ, II, 435.

Малый жаворонокъ найденъ мною гнѣздащимся въ горныхъ степяхъ около Тифлиса и на низменности Джеванширскаго уѣзда около Тертера. Въ началѣ мая 1899 г. онъ встрѣченъ мною на гнѣздовѣ въ степяхъ Ставропольской губерніи.

Собственно, я находилъ представителей рода *Calandrella* во всѣхъ степяхъ восточного Закавказья, прикаспійскихъ степяхъ (Кубинскій уѣздъ и Дагестанъ) и степяхъ Сѣвернаго Кавказа.

Какъ и представители предыдущаго рода, они любятъ пустынныя полынныя степи. Какъ проходитъ граница между обоими

видами, я не знаю опять таки потому, что мнѣ не удалось узнать определенія многихъ изъ собранныхъ мною экземпляровъ. Поэтому для распространенія каждого вида въ отдельности я привожу только тѣ мѣстности, откуда имѣю определенные экземпляры.

Такимъ образомъ, область гнѣздовья *Calandrella brachydactyla* — западная часть восточно-закавказской низменности и степи Сѣвернаго Кавказа.

49. *Calandrella pispoletta* Pall. Сѣрый жаворонокъ.

Мензбиръ, II, 435.

Найденъ мною на гнѣздовье въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ на Бозъ-дагѣ (25. IV. 95), на Мугани и въ степной части Кубинскаго уѣзда. Слѣдовательно, область гнѣздовья его лежитъ по Курѣ и каспійскому побережью.

50. *Galerida cristata caucasica* Tacz. Кавказскій хохлатый жаворонокъ.

Hartert, 230.

Одна изъ обыкновеннѣйшихъ птицъ всего Кавказскаго края. Держится предпочтительно на низменности, но по безлѣснымъ горамъ со степнымъ характеромъ поднимается и въ предгорья и встрѣчается также по высокимъ степямъ Эриванской губерніи и Карской области. Всюду живеть осѣдо. Часто поетъ, сидя на невысокомъ кустикѣ, особенно держи-дерева, чего не дѣлаютъ другіе жаворонки, кромѣ, конечно, лѣсного.

51. *Lulula arborea* L. Лѣсной жаворонокъ.

Мензбиръ, II, 452 (*Alauda arborea*).

Лѣсной жаворонокъ встрѣтился мнѣ всего только нѣсколько разъ. На весеннемъ пролетѣ я убилъ его 17. III. 96 подъ Тифлисомъ.

20. V. 97 я нашелъ его несомнѣнно гнѣздающимся въ Талышинскихъ горахъ около с. Лирикъ. Наконецъ, 8. X. 900 я встрѣтилъ его въ смѣшанномъ лѣсу около Сарыкамыша.

52. *Alauda arvensis* L. Полевой жаворонокъ.

Мензбиръ, II, 447.

Турагай (татарск.).

Обыкновенная осьдлая птица всего Кавказа. Въ Закавказье гнѣздится отъ высоты 2500 — 3000' до альпийскихъ луговъ: 26. V. 98 я встрѣтилъ его, напр., въ Талышинскихъ горахъ на высотѣ болѣе 7000' около селеній Руарутъ и Кяльвазъ; 20. VI. 98 въ Дагестанѣ около аула Карапай, и въ другихъ мѣстностяхъ. Указаніе Радде на гнѣздованіе полевого жаворонка у Тифлиса слѣдуетъ понимать такъ, что гнѣзда жаворонковъ были принесены этому ученому въ Тифлисъ. На высотѣ Тифлиса жаворонокъ этой не гнѣздится, а гнѣздится на высоколежащихъ надъ нимъ плоскихъ возвышеностяхъ со степнымъ характеромъ.

Зимою полевой жаворонокъ бываетъ весьма многочисленъ на низменности и около Тифлиса держится до конца марта.

Hartert говоритъ, что зимою на Сѣверномъ Кавказѣ очень обыкновененъ *Alauda arvensis cinerea* Ehmske, но я не зналъ отличій этой формы и поэтому не обратилъ на нее вниманія.

53. *Otocoris alpestris flava* Gmelin. Полярный жаворонокъ.Hartert, 255 (*Eremophila alpestris flava*).

Полярный жаворонокъ попадался мнѣ только на весеннемъ пролетѣ подъ Тифлисомъ (10. III. 96).

54. *Otocoris penicillata* Gould. Рогатый горный жаворонокъ.

Мензбиръ, II, 427.

Чернобривчикъ (духоборск.).

Я нашелъ этого рогатаго жаворонка на гнѣздовьяхъ во многихъ мѣстностяхъ Дагестана, Малаго Кавказа и Закавказского плоскогорья, никогда не ниже 5000 — 6000'.

Въ суровыя зимы рогольки спускаются на низменность и бываютъ весьма многочисленны около Тифлиса, кормясь при глубокомъ снѣгу на дорогахъ. Въ нѣмецкой колоніи Александрдорфъ около Тифлиса они забираются иногда даже въ конюшни, какъ и *Galerida cristata*.

Однако, и зимою они остаются въ значительномъ количествѣ на горахъ. Такъ, 9. III. 98 сильная мятель заставила меня оста-

новиться на станциі Хонашенъ по тракту изъ Агдама въ Ванкъ. Надъ сиѣжными равнинами цѣлый день носились стайки рогольковъ. Рогольки обыкновенно очень быстро летятъ надъ самой землей и при этомъ издаются своеобразный свистящій пискъ, чѣмъ очень напоминаютъ нѣкоторыхъ куликовъ. 7. XI. 96 при довольно ощущительномъ морозѣ и рѣзкомъ вѣтре я встрѣтилъ ихъ около Кедабекскаго завода.

Долженъ замѣтить, вопреки мнѣнію Радде, что распространение чернаго цвѣта у этого жаворонка очевь постоянно, хотя, конечно, и зависитъ отъ возраста.

Нѣкоторыхъ молодыхъ, у которыхъ концы перьевъ еще не обносились, этотъ ученый принялъ за *O. alpestris*. Но и у нихъ черный цвѣтъ уже просвѣчивается въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ пока еще не проявился вполнѣ, и легко можетъ быть обнаруженъ. Пролетные *O. alpestris* рѣзко отличаются отъ такихъ молодыхъ птицъ.

55. *Otocoris penicillata* subsp.? (*An. albogula* Bonap.)?

? Hartert, 262 (*Eremophila alpestris albogula*).

Зимою 1895 года на Крестовомъ перевалѣ военно-грузинской дороги было убито нѣсколько рогатыхъ жаворонковъ какимъ то путешественникомъ, отдавшимъ ихъ для приготовленія шкурокъ одному мастеру въ Тифлисѣ, гдѣ я ихъ увидалъ.

Они имѣли расположение чернаго цвѣта, какъ у *O. penicillata**, но горло было не желтое, а чисто бѣлое.

Мнѣ такіе рогольки никогда не попадались.

Изъ описаній, данныхъ Hartert'омъ (I. c.), они ближе всего подходятъ къ его *Eremophila alpestris albogula* (Br.).

Сем. 6. Motacillidae. оКньковыя.

56. *Anthus campestris* L. Полевой конекъ.

Мензбиръ, II, 748.

Я нашелъ полевого конька гнѣздищимся по всему побережью Каспийскаго моря отъ Дербента до Астары, разумѣется, въ подхо-

* Почему я и не могу считать ихъ за *O. Brandti* Dress.

дящихъ мѣстахъ; въ южной части Кубинскаго уѣзда и на Апшеронскомъ полуостровѣ его нѣть; затѣмъ, около Тифлиса и въ Карабахѣ въ предгорьяхъ, иногда уже довольно высоко. Въ Кубинскомъ уѣздѣ онъ встрѣченъ мною тоже въ предгорьяхъ. Полевой конекъ въ Карабахѣ и Кубинскомъ уѣздѣ попадался мнѣ только на поросшихъ хорошею травою мѣстахъ, около Тифлиса же онъ довольно встречается и болѣе скудною растительностью, доставляющею ему, однако, весною достаточное прикрытие для устройства гнѣзда.

Около Тифлиса полевой конекъ, повидимому, не живеть осѣдло: я никогда не встрѣчалъ его здѣсь зимою. Появляется онъ здѣсь въ концѣ марта, а въ первой половинѣ апрѣля приступаетъ къ гнѣзовью. 11. IV. 99 я наблюдалъ, какъ они таскали соломинки для устройства гнѣзда. Въ началѣ іюня (6. VI. 96 въ Кубинскомъ уѣздѣ) мнѣ приходилось убивать молодыхъ. Весною, въ началѣ апрѣля, и осенюю, въ концѣ августа, количество полевыхъ коньковъ подъ Тифлисомъ замѣтно увеличивается, вѣроятно, пролетными экземплярами. Во второй половинѣ сентября они мнѣ болѣе не встрѣчались въ Закавказье.

57. *Anthus trivialis* L. Лѣсной конекъ.

Мензбиръ, II, 753 (*Anthus arboreus*); Hartert, 272.

Лѣсной конекъ найденъ мною гнѣздащимся въ лѣсной области восточной части Большого Кавказа (Кубинскій уѣздъ и южный Дагестанъ), Талышинскихъ горъ, Малаго Кавказа (Муревъ-дагъ) и западно-закавказскаго нагорья (Гельская лѣсная дача). Онъ живеть здѣсь до границы лѣсной растительности, и 28. V. 95 одинъ экземпляръ былъ убитъ мною на Муревъ-дагѣ уже въ альпийской области.

Подъ Тифлисомъ я встрѣчалъ лѣсного конька только въ началѣ апрѣля на весеннемъ и въ началѣ октября на осеннемъ пролетахъ.

58. *Anthus pratensis* L. Луговой конекъ.

Мензбиръ, II, 761.

Я знаю лугового конька только какъ пролетную птицу восточнаго Закавказья. Можетъ быть, онъ и зимуетъ здѣсь, такъ какъ съ самаго моего прїѣзда въ Сальянъ во второй половинѣ февраля

1895 г. я наблюдалъ на выгонахъ около этого мѣстечка стайки щеврицъ, изъ которыхъ только 14. III мнѣ удалось наконецъ добыть одинъ экземпляръ, оказавшійся принадлежащимъ именно къ этому виду. 24. III того-же года я добылъ два экземпляра около мѣста. Джеватъ при сліяніи Куры съ Араксомъ.

59. *Anthus spinoletta* L. Горный конекъ.

Мензбиръ, II, 745.

Обыкновенная птица альпійской области Большого и Малаго Кавказа. Вѣроятно, только при наступленіи очень большихъ холодовъ горные коньки покидаютъ мѣста своего гнѣздовья. 27. IV. 99 при весьма ощутительномъ холодѣ я наблюдалъ при переѣздѣ отъ Гудаура къ Коби по военно-грузинской дорогѣ стайки этихъ щеврицъ, весело бѣгавшія по снѣжнымъ полямъ.

15. VI. 901 я встрѣтилъ горныхъ коньковъ въ большомъ количествѣ гнѣздившимися у Гудаура. Безъ большого труда нашелъ я два гнѣзда, изъ которыхъ въ одномъ было: 5, а въ другомъ 4 совершенно свѣжихъ яйца. Гнѣзда были устроены по склону горы и оба были защищены сверху, одно — камнемъ, другое — густымъ пучкомъ травы.

Въ октябрѣ и ноябрѣ я находилъ горныхъ коньковъ около Тифлиса. Кажется, это — единственный видъ *Anthus*, который здѣсь зимуетъ. Но и то я не помню, встрѣчалъ ли я здѣсь эту птичку въ декабрѣ и январѣ, а экземпляровъ этого времени теперь у меня нѣть.

60. *Budites flavus* L. et intermed. Желтая плиска.

Мензбиръ, II, 770 (*Motacilla flava*).

Желтая плиска обыкновенны въ Закавказье по сырымъ лугамъ и кочковатымъ болотамъ, но такихъ мѣсть немнога. Около Тифлиса желтыхъ плискъ можно встрѣтить круглый годъ. Здѣсь она гнѣздится около Соленаго озера (въ 8 верстахъ отъ Тифлиса). Весною и осенью кажется многочисленнѣе. Прилетаетъ она въ апрѣлѣ, а отлетаетъ, — вѣрнѣе, откочевываетъ, — въ августѣ. На каспійскомъ побережїи и, вѣроятно, въ мѣстностяхъ, лежащихъ ниже Тифлиса, она зимуетъ.

Каталогъ Кавказскаго Музея составленъ такъ безтолково, что трудно даже понять, какъ опредѣлилъ составитель его Г. И. Радде моихъ птицъ. Такъ ♂ убитый мною около Тифлиса 27. VIII. 95 обозначенъ „*Budites intermed. flav.*“ (№ 111 v.); два экземпляра,

добытые у Ленкорани 29. IV. 97 (№ 111 ee, ff) — „*Budites intermed. cinereoscap.* typ.“. Наконецъ, молодой экземпляр № 111 ii опредѣленъ имъ какъ *Budites borealis*. Онъ былъ убитъ мною у Соленаго озера близъ Тифлиса 11. VIII. 96. У меня, къ сожалѣнію, нѣть ни времени, ни достаточной опытности, чтобы выяснить, что представляютъ на самомъ дѣлѣ эти формы, — поэтому я могу только пожелать, чтобы этотъ материалъ скорѣе попалъ въ надлежащія руки.

Въ концѣ апрѣля 1897 г. въ Ленкоранскомъ уѣздѣ по береговой полосѣ шель валовой пролетѣ разныхъ желтыхъ плисокъ. 11. III. 95 я видѣлъ на Мугани значительныя стайки желтыхъ плисокъ, которыхъ держались очень строго и близко не подпускали.

Во время пролета плиски имѣютъ обыкновеніе держаться среди стадъ, чѣмъ очень затрудняютъ ихъ добычу.

61. *Budites melanocephalus* Feldegg Mich. Черноголовая плиска.

Мензбиръ, II, 776 (*Motacilla feldeggii* Mich.).

Въ Закавказье внутри страны встрѣчается рѣдко, но очень обыкновенна па пролетѣ и гнѣздовѣ по берегу Каспійскаго моря въ Ленкоранскомъ уѣздѣ.

Первый разъ встрѣтилъ я этихъ плисокъ небольшими стайками по берегамъ разлива р. Аракса между Сальянами и Ленкоранью 9. IV. 97. Въ большомъ количествѣ нашелъ ихъ 16. V. 98 гнѣздающими по морскому берегу у станціи Кумбashi. Немного времени спустя, именно 27. V. 97, я, къ удивленію своему, нашелъ этихъ же плисокъ гнѣздающими на сырыхъ лугахъ около сел. Каяльвазъ на высотѣ около 7000'. Нигдѣ въ промежуткахъ между берегомъ моря и этою, уже альпійскою областью я черноголовой плиски не находилъ, да здѣсь имъ и держаться негдѣ, ибо все покрыто густымъ лѣсомъ.

По книгѣ проф. Мензбира я опредѣлилъ здѣшнихъ черноголовыхъ плисокъ какъ *Budites Feldeggii*, такъ какъ только у одной или двухъ я замѣтилъ на бровяхъ два, три желтыхъ перышка, у большинства же нѣтъ никакого намека на свѣтлую бровь.

62. *Budites campestris* Pall. Желтолобая плиска.

Мензбиръ, II, 767 (*Motacilla campestris*).

30. IV. 97 во время валового пролета желтыхъ плисокъ по берегу Каспійскаго моря около станц. Кумбashi я хорошо разсмотрѣлъ

среди другихъ плисокъ одну, рѣзко отличавшуюся отъ нихъ, желтоголовую. 1. V. 98 добылъ одинъ экземпляръ (♂) на берегу моря около сел. Шахъ-Агачъ (12 в. къ югу отъ Ленкорани).

63. *Motacilla boarula melanope* Pall. Горная трясогузка.

Hartert, 300.

Довольно обыкновенна во всей горной области Закавказья. Въ восточномъ Закавказье область ея гнѣздовья отъ предгорій поднимается по рѣчкамъ и ручьямъ до альпійской области. Въ мѣстахъ, обильныхъ осадками, она гнѣздится и на низменности. Такъ, въ Ленкоранскомъ уѣздѣ я нашелъ ее на р. Астаринкѣ (персидская граница) около селенія Алаша-кендѣ 25. IV. 97, когда трясогузки, несомнѣнно, уже высиживали, такъ какъ, напр., 24. V. 98 я убилъ въ Талышинскихъ предгорьяхъ около сел. Тангевонъ молодую летную трясогузку этого вида. Также и на черноморскомъ побережье я наблюдалъ ее въ юлѣ 1906 г. близъ Кобулетъ на р. Дегва.

Но на жаркой сухой низменности она бываетъ только зимою. Въ Тифлисѣ горная трясогузка появляется въ октябрѣ и держится здѣсь до февраля. Чѣмъ хуже погода и чѣмъ глубже лежить сиѣгъ, тѣмъ въ большемъ количествѣ она здѣсь появляется, даже на дворахъ самаго города.

Горная трясогузка любить лѣсъ и вообще хорошую растительность. 25. V. 95 я убилъ на спускѣ Сарсянгѣ въ верховьяхъ р. Тертеръ парочку этихъ птичекъ на ручейкѣ, который текъ подъ сводами громадныхъ деревьевъ столь густыхъ, что къ ручейку почти не проникало солнце. И позднѣе я не разъ встрѣчалъ въ такихъ мѣстахъ горныхъ трясогузокъ въ Карабахѣ и Талышѣ. Но она встрѣчается и въ совершенно безлѣсныхъ мѣстностяхъ, какъ восточный Дагестанъ и сѣверные склоны Агидага (24. IX. 900 близъ сел. Орговъ).

64. *Motacilla alba* L. (subspp.?). Бѣлая трясогузка.

Мензбиръ, II, 784; Hartert, 302—304.

Радде опредѣлилъ собранныхъ мною бѣлыхъ трясогузокъ какъ *Motacilla alba* typ., *Mot. alba dukhunensis* Sykes, *M. baicalensis* Swinh., *M. intermedia alba* и *M. luzoniensis* Scop. Отъ такого списка можно притти въ отчаяніе. Къ тому же, просматривая даты, значащіяся на этихъ экземплярахъ, нельзя установить, что такая

то форма попадается зимою, а такая то лѣтомъ, что внесло бы нѣкоторый свѣтъ въ отношеніе этихъ формъ другъ къ другу. На-противъ: все перепутано въ самомъ фантастическомъ беспорядкѣ, и выходитъ, что всѣ формы встрѣчаются одновременно, и въ од-номъ и томъ же мѣстѣ. Поэтому я думаю, что Радде здѣсь просто напуталъ. Несомнѣнно, на Кавказѣ гнѣздится только одна форма, которая живетъ тутъ осѣдло и отличается большимъ распространенiemъ бѣлаго цвѣта. Я не могу рѣшить, какъ ее правильнѣе назвать: *dukhunensis* или *baicalensis*? Формы эти очень близки другъ къ другу. Судя по общему географическому распространенію, это должна быть *Motacilla dukhunensis* Sykes, но рѣшать этотъ вопросъ я не берусь.

Типичная же сѣверная бѣлая трясогузка *Motacilla alba* L. встрѣчается здѣсь, вѣроятно, на пролетѣ или, быть можетъ, зи-муетъ.

Область распространенія этой самой обыкновенной трясогуз-ки въ Закавказье — низменность и предгорья.

Въ самкѣ, убитой по р. Ахсу, близъ сел. Кычатанъ Ше-махинскаго уѣзда 8. V. 96, я нашелъ яйцо на - сносѣ, уже въ скорлупѣ.

Когда это уже было написано, я узналъ, что Бутурлинъ относитъ *закавказскую* бѣлую трясогузку къ подвиду *Motacilla alba orientalis* Zarudn., который Hartert отожествляетъ съ *M. a. du-khunensis*.

Сем. 7. Certhiidae. Пищуховыя.

65. *Certhia familiaris caucasica* Buturlin. Пищуха кавказская.

Buturlin, Reichenow's Ornith. Monatsber., Jan. 1907, p. 8.

Какъ гнѣздащаяся птица, пищуха принадлежитъ верхнему поя-су лѣса. Гнѣздится преимущественно въ хвойныхъ лѣсахъ, но иногда и въ лиственныхъ: такъ, я встрѣтилъ ее 25. V. 95 на склонѣ Муровъ-дага близъ сел. Гасанризъ. Осеню я встрѣчалъ ее на восточныхъ склонахъ Месхійскаго хребта и въ Гельской лѣсной дачѣ на окраинѣ Гельской котловины (Ардаганскій округъ). Зимою пищуха спускается на низменность, и я наблюдалъ ее то-гда въ разныхъ пунктахъ долины р. Куры. Въ Тифлисѣ она по-падалась мнѣ съ половины октября до начала марта, но всего

многочисленнѣе бывала въ ноябрѣ. 22. XI. 906 я добылъ ее въ ущельѣ Чороха въ сел. Верхн. Марадиди.

У лѣсничаго Бртекъ я видѣлъ цѣлую серію гнѣздъ пищухи, собранныхъ имъ въ Бакуріанахъ. Всѣ они были построены по одному типу: между отставшою корою и стволомъ на соснахъ.

По Бутурлину (I. c.), кавказская пищуха отличается менѣе чистою окраской нижней стороны и болѣе длинными хвостомъ и клювомъ.

66. *Tichodroma muraria* L. Стѣнолазъ.

Мензбиръ, II, 666.

Я всего три раза наблюдалъ эту рѣдкую красивую птицу: въ юнѣ 1901 г. на военно-грузинской дорогѣ близъ Дарьяльскаго ущелья, въ Дагестанѣ и въ ущельѣ Чороха близъ Артвина. Въ коллекціи Шелковникова былъ экземпляръ убитой въ Нухинскомъ уѣздѣ, — слѣдовательно, на юномъ склонѣ Кавказскаго хребта.

Сем. S. Sittidae. Поползневые.

67. *Sitta europaea caucasica* Reich. Кавказскій поползень.

Hartert, 333.

Я встрѣтилъ кавказскаго поползня почти во всѣхъ лѣсахъ восточнаго Закавказья какъ на низменности, такъ и въ горахъ до высоты приблизительно 6000': въ лѣсахъ Карабаха, по верховьямъ р. Тертера, близъ сел. Гасанризъ на склонахъ Муровъ-дага, въ Талышѣ на уровнѣ моря и въ нижнемъ поясе лѣса, и въ низменныхъ лѣсахъ по р. Курѣ. Въ особенно большомъ количествѣ встрѣтилъ я его въ послѣднемъ мѣстѣ, именно въ лѣсистомъ мѣстѣ Самухъ при слияніи съ Курою Йоры и Алазани. Здѣсь 28. IV. 97 поползни летали уже выводками, но молодыхъ еще легко можно было отличить отъ взрослыхъ. Большия синицы (*Rarus major*) здѣсь въ это время тоже уже вывели, но ихъ молодые еще не летали. На низменности поползень, вѣроятно, живетъ осѣдо, такъ какъ въ Тифлисѣ я часто наблюдалъ его и съ ноября по февраль.

Когда это было уже напечатано, С. А. Бутурлинъ обратилъ мое вниманіе на то, что талышинскій поползень, отличающійся очень яркой окраской и особенно большимъ, грубымъ клювомъ, описанъ Н. А. Заруднымъ въ „Ornith. Jahrb.“, XVI (1905), р. 140 подъ именемъ *Sitta rubiginosa*. На величину клюва ленкоранскаго поползня указывалъ еще Радде.

68. *Sitta Krüperi Pelz.* Рыжегрудый поползень.

Мензбиръ, II, 800.

Въ августѣ 1902 г., при переходѣ изъ Гуріи въ Ахалцихскій уѣздъ черезъ Месхійскій хребетъ, я встрѣтилъ рыжегрудаго поползня въ большомъ количествѣ въ еловыхъ лѣсахъ и добылъ нѣсколько экземпляровъ. Этотъ поползень чрезвычайно обыкновененъ также въ Боржомѣ и расположенному выше него селеніи Бакуріаны. Здѣсь рыжегрудый поползень гнѣздится, и лѣсничій Бртекъ показывалъ мнѣ его гнѣзда, найденные въ Бакуріанахъ и попавшія потомъ въ Кавказскій Музей.

Не одно лѣто прожилъ Г. И. Радде въ Боржомѣ, но что то все мѣшало ему обратить вниманіе на эту птицу, отчего она и пропущена въ его „*Ognis caucasica*“.

69. *Sitta syriaca parva Buturlin.* Кавказскій скалистый поползень.

Buturlin, *Ibis*, 1906, р. 417.

Скалистый поползень встрѣчался мнѣ главнымъ образомъ въ безплодныхъ горахъ Эриванской губерніи и Карской области. Здѣсь онъ лазаетъ по отвѣснымъ скаламъ и обрывамъ. Его громкий голосъ слышенъ издалека. Моихъ наблюдений недостаточно для выясненія его вертикального распространенія, тѣмъ болѣе, что въ западномъ Закавказье я бывалъ только осенью. Я нашелъ его: 1. IX. 900 близъ монастыря Кегартъ въ ущельѣ того же имени, гдѣ, по словамъ настоятеля этого монастыря, онъ живетъ круглый годъ; на сѣверныхъ склонахъ Агри-дага близъ селенія Орговъ, и во многихъ другихъ мѣстностяхъ западнаго Закавказья. При подъемѣ изъ ущелья Аракса близъ Кағыzmanы, у сел. Карабагъ, на Закавказское плоскогорье (3. X. 900) три скалистыхъ поползня очень забавляли меня своимъ поведеніемъ. Они перелетали съ мѣста на мѣсто, усаживались въ - кружокъ головами другъ къ

другу, распускали крылышки и кричали и вертѣлись самымъ невозможнымъ образомъ. Затѣмъ, напрыгавшись здѣсь, перелетали на другое мѣсто и продѣливали тамъ то же самое. Что могло означать это у нихъ въ такое позднее время года?

Бутурлинъ (I. c.) описалъ недавно эту форму скалистаго поползня изъ Ахалциха; но я не знаю, принадлежать ли къ ней всѣ наблюдавшіеся мною представители этого вида; добытые же мною экземпляры рыжихъ птенцъ на внутреннихъ опахалахъ крайнихъ рулевыхъ не имѣли.

Сем. 9. Regulidae. Корольковыя.

70. *Regulus regulus* L. Желтоволосый королекъ.

Мензбиръ, II, 849 (*Regulus cristatus*); Hartert, 394.

Желтоволосый королекъ попадался мнѣ только зимою на низменности въ долинѣ Куры, гдѣ онъ задерживается до начала марта. Глубокою осенью я наблюдалъ его также въ Сарыкамышѣ и Гельской лѣсной дачѣ. Но въ послѣднемъ пункте я его не добылъ и не вполнѣ увѣренъ, что это былъ именно описываемый видъ.

Сем. 10. Paridae. Синицевыея.

71, а. *Parus major* L. Большая синица.

Мензбиръ, II, 828.

71, б. *Parus major caspius* Zarudn. et Loudon.

Zarudny und Loudon, Reichenow's Ornith. Monatsber., Jun./Jul. 1905, p. 108.

Обыкновеннѣйшая птица всего Кавказскаго края. Въ большомъ количествѣ гнѣздится на низменности въ садахъ и прирѣчныхъ лѣсахъ, но не поднимается высоко въ горы. Радде приводитъ въ своемъ каталогѣ синицъ изъ Боржома съ датою „V. 96“, но это еще не доказывается, что она тамъ гнѣздится, ибо въ это время большія синицы иногда уже бродятъ выводками. Какъ бы то ни было, а мнѣ на гнѣздовѣѣ большая синица никогда не

попадалась высоко въ горахъ, даже въ верхней полосѣ лѣса. Любимое мѣстопребываніе большой синицы въ восточномъ Закавказье — заросли по рѣкамъ и сады. Время вывода дѣтей у большихъ синицъ значительно колеблется. 28. III. 96 въ самкѣ, убитой въ паркѣ Муштаидъ (Тифлисъ), я нашелъ яйцо на-сносѣ; 17. V. 95 у устья р. Тертеръ (близъ сел. Алпаутъ Джеванширскаго уѣзда) большія синицы уже летали выводками. 23. V. 94 въ сел. Калагойны близъ сліянія Куры и Аракса въ одномъ изъ столбовъ, подпирающихъ вышку, я нашелъ гнѣздо, въ которомъ были еще не оперившіяся дѣти.

Съ сентября около Тифлиса и во всѣхъ садахъ города большая синица появляется въ огромномъ количествѣ. При своихъ кочевкахъ она часто посѣщаетъ и совершенно безлѣсныя мѣстности и держится въ маленькихъ кустикахъ.

Прикаспійская форма отдѣлена Заруднымъ и Лоудономъ въ особый подвидъ *P. m. caspius*, весьма, впрочемъ, слабо отличающейся.

72, а. *Periparus ater Michalowskii Bogd.* Кавказская черная синица.

Hartert, 360 (*Parus ater michalowskii*).

72, б. *Periparus ater Derjugini Zarudn. et Loudon.*

Hartert, 360 (*Parus ater derjugini*).

72, в. *Periparus ater phaeonotus Blansf.*

Hartert, 361.

Я не могу съ увѣренностью указать область гнѣздовья черной синицы.

Въ виду того, что я нашелъ въ предгорьяхъ Талышинскихъ горъ 13. III. 99 около селенія Борджалы (Подгорное тожъ) много птичекъ этого вида, которая усердно нѣли, я думаю, что онѣ здѣсь и гнѣzdятся. Но нигдѣ болѣе въ такое раннее время я ихъ не наблюдалъ. Въ концѣ мая 1895 года (25—28. V) я встрѣтилъ черныхъ синицъ въ лѣсахъ по склону Муровъ-дага до границы лѣсной растительности и добылъ тутъ какъ старыхъ, такъ и молодыхъ. 9. VI. 94 въ садахъ селенія Рафиденлу онѣ летали выводками. 30. VIII и 15—16. IX. 902 я встрѣтилъ ихъ въ разныхъ мѣстахъ въ сосновыхъ лѣсахъ къ западу отъ Гельской котловины.

Зимою она попадается маленькими стайками въ садахъ Тифлиса. Въ 1906 г. первую такую стайку я замѣтилъ 23. X. Въ 1894 и 1895 гг. я наблюдалъ ее въ паркѣ Муштайдъ только въ ноябрѣ. Лѣсничій Бртекъ нашелъ нѣсколько гнѣздъ этого (?) вида въ Бакуріанахъ. Они помѣчены въ каталогѣ Кавказскаго Музея 20. V. 98. Но, означаетъ ли это время нахожденія гнѣзда или поступленія его въ Музей, рѣшить теперь трудно. Къ сожалѣнію, самъ Бртекъ вовсе не писалъ этикетокъ къ собираемымъ имъ предметамъ.

Hartert называетъ закавказскую черную синицу *Parus ater michalowskii Bogdanow*, а Зарудный и Лоудонъ описали въ послѣднее время еще *Parus ater derjugini*. Кромѣ того въ Талышѣ и по Араксу живетъ несомнѣнно *P. a. phaenotus*. Я не берусь и не могу разбирать эти подвиды, но замѣчу, что, вѣроятно, *P. a. Michalowskii* свойственна западному Закавказью, а упомянутые мною экземпляры изъ гельскихъ лѣсовъ легко, можетъ быть, относятся именно къ *P. a. derjugini*, равно какъ и наблюдавшіеся мною въ ноябрѣ 1906 г. въ ущельѣ Чороха (Артвинскій округъ).

73. *Cyanistes coeruleus* L. Лазоревка.

Мензбиръ, II, 806.

На низменностяхъ восточнаго Закавказья и предгорьяхъ осѣдлая птица. Особенно многочисленна въ заросляхъ по Курѣ отъ Тифлиса до Сальянъ и въ Талышинской низменности.

Въ предгорьяхъ Джеванширскаго уѣзда я убилъ молодую 25. V. 95. Высоко въ горахъ, даже въ верхнемъ поясѣ лѣса я никогда лазоревки не наблюдалъ, хотя, по Радде, она и водится еще въ Боржомѣ. Зимою въ долинѣ Куры число ихъ значительно увеличивается.

По имѣющимся въ доступной мнѣ литературѣ даннымъ я не могъ выяснить, относится ли наша лазоревка къ типичной формѣ или нѣтъ.

74. *Aegithalos irbyi caucasicus* Lorenz. Кавказская долгохвостая синица.

Мензбиръ, II, 837 (*Acredula*).

Также обыкновенная гнѣздящаяся птица Кавказа. Часто встрѣчается во всѣхъ лѣсахъ низменныхъ и горныхъ, за исключениемъ Талыша, гдѣ вполнѣ замѣнена слѣдующимъ видомъ.

3. III. 96 въ убитой на низменности Арешского уѣзда самкѣ я нашелъ уже яйцо на-сносѣ. 23. V. 96 на Кубинской низменности я встрѣтилъ этихъ синицъ летающими выводками. Молодыхъ легко было узнать по короткому хвосту. Зимою стайки долговостыхъ синицъ бродятъ повсюду и часто попадаются въ тифлисскихъ садахъ.

75. *Aegithalos tephronotus* Günth. Талышинская долгохвостая синица.

Мензбиръ, II, 837 (*Acredula*).

Обыкновенная осѣдлая птица талышинскихъ лѣсовъ. Я встрѣчалъ здѣсь выводки уже съ половины апрѣля.

76. *Anthoscopus pendulinus caspius* Poelzam. Каспійскій ремезъ.

Hartert, 390.

Ремезъ обыкновененъ, хотя и мало замѣтенъ по всѣмъ рѣчнымъ долинамъ восточнаго Закавказья и побережью Каспійскаго моря. Я чаще находилъ его старыя гнѣзда, которыя очень замѣтны зимию, чѣмъ самое птичку. Послѣднюю я наблюдалъ только въ Сальянахъ и на Талышинской низменности. Гнѣзда они строятъ обыкновенно на свѣшивающихся, по большей части надъ водою, вѣтвяхъ ивы, между двумя расходящимися сучками. 14. VI. 97 я нашелъ въ Сальянахъ только что начатое гнѣздо, помѣщавшееся въ развилинѣ нависшей надъ Курою вѣтки, и слѣдилъ за его постройкой до 17. VI., когда долженъ былъ уѣхать. Матеріаломъ для постройки служилъ ивовый пухъ, который усердно таскали обѣ птички. За $2\frac{1}{2}$ сутокъ наблюденія онѣ удлинили гнѣздо всего на толщину большого пальца.

Пустыя гнѣзда ремезовъ въ значительномъ количествѣ я находилъ недалеко отъ Тифлиса въ маленькомъ лѣсѣ по правому берегу Куры противъ ст. Авчалы, въ Джеватѣ, Арапыхѣ и др. мѣстахъ.

77. *Panurus biarmicus russicus* Brehm. Усатая синица.

Hartert, 405.

Въ подходящихъ мѣстахъ живетъ по всему каспійскому побережью отъ Ленкорани до устья Волги, какъ я могъ убѣдиться по шкуркамъ въ коллекціяхъ разныхъ любителей. Въ Ленкорани я видѣлъ у лѣсничаго П. О. Василевскаго экземпляръ, добытый въ камышахъ Ленкоранскаго морца (Ольховское озеро).

По письменному сообщению Ф. Д. Плеске, встречается и въ низовьяхъ Кубани и въ Терской области.

Сем. 11. Laniidae. Сорокопутовые.

78, а. *Enneoctonus collurio* L. Жуланъ.

Мензбиръ, II, 717 (*Lanius collurio*).

78, б. *Enneoctonus collurio* Kobylini Buturlin. Закавказскій жуланъ.

Buturlin, *Ibis*, 1906, p. 416.

Обыкновеннѣйшая птица всего Кавказскаго края. Я встрѣчалъ его въ подходящихъ мѣстахъ рѣшительно повсюду, но чаще всего онъ встречается все же на низменности. Любимѣйшее мѣсто пребываніе жулана — изгороди вокругъ садовъ и обработанныхъ полей. По дорогамъ и изгородямъ онъ поднимается высоко въ горы, но въ альпійской области я его никогда не видалъ. Излишне, пожалуй, говорить, что онъ не встречается ни въ сплошныхъ густыхъ лѣсахъ, ни среди лишенной даже кустиковъ степи. Но въ саду Лѣтней Трухменской ставки, кругомъ которой на большое протяженіе тянутся лишенныя всякой кустарниковой заросли степи, жуланъ гнѣздится. На черноморскомъ побережїѣ около Кобулетъ это — положительно самая обыкновенная птица, встречающаяся на каждомъ шагу, тогда какъ авиауна тамъ вообще бѣдна.

Въ восточное Закавказье жуланъ прилетаетъ въ самомъ началѣ апрѣля, въ Тифлисъ въ 1895 г. прилетѣлъ 7. IV. Около половины юна встречаются молодые еще плохо летающіе. Исчезаетъ изъ Закавказья довольно рано, уже въ августѣ; въ послѣднихъ числахъ этого мѣсяца я уже никогда его не встречалъ.

С. А. Бутурлинъ въ недавнее время описалъ (*Ibis*, 1906, p. 416) жулана западнаго Закавказья какъ особый подвидъ *Enneoctonus collurio* Kobylini. Еще раньше на особенности закавказскаго жулана (изъ Ленкорани) указывалъ Радде и сѣверно-кавказскаго — Лоренцъ. Поэтому, вѣроятно, всѣ кавказскіе жуланы относятся именно къ этому подвиду, но, можетъ быть, на Сѣверномъ Кавказѣ, напримѣръ, въ ставропольскихъ степяхъ, встречается и типичная форма, почему въ заголовкѣ этой статьи я и ставлю оба названія.

79. *Lanius senator* L. Красноголовый сорокопутъ.

Мензбиръ, II, 715 (*Lanius rufus*); Hartert, 434.

Я встрѣтилъ этого сорокопута только по Бозъ-дагу. 3. V. 95 убилъ одного, вѣроятно, пролетнаго, на этой возвышенности въ Елисаветпольскомъ у., и въ значительномъ количествѣ встрѣчалъ его въ ущельяхъ Бозъ-дага въ Арешкомъ у. Экскурсируя 16. V. 94 вмѣстѣ съ А. Б. Шелковниковымъ, мы нашли въ одномъ изъ ущелий вышеупомянутой возвышенности нѣсколько гнѣздъ красноголоваго сорокопута, которыхъ помѣщались довольно открыто въ кустахъ держи - дерева (*Paliurus australis*).

80. *Lanius minor* Gmel. Черноголовый сорокопутъ.

Мензбиръ, II, 723.

Очень обыкновененъ повсюду на низменности и невысоко въ предгорьяхъ. На Сѣверномъ Кавказѣ я нашелъ его гнѣздящимся въ Лѣтней Трухменской ставкѣ. Держится въ садахъ, мелколѣсьѣ и рѣчныхъ долинахъ. 27. IV. 95 въ Елисаветпольскомъ у. на Курѣ я встрѣтилъ, очевидно, только что прилетѣвшую стайку этихъ птицъ. Въ восточномъ Закавказье улетаетъ въ августѣ, — кажется, еще раньше жулана.

Вильконскій считаетъ его не гнѣздящимся въ изслѣдованной имъ мѣстности, но въ концѣ юля я нашелъ въ дельтѣ р. Кинтришъ выводокъ, державшійся въ чащѣ, гдѣ, очевидно, было ихъ гнѣздо. Не думаю, чтобы такие молодые выводки были способны на длинныя перекочевки.

81. ? *Lanius excubitor* L. Большой сорокопутъ.

Мензбиръ, II, 728.

6. XI. 96 я убилъ одного большого сорокопута въ нагорной части Елисаветпольского у. близъ селенія Ново-Горѣлое. Онъ Ѳль полевку, насаженную на сухую колючку.

Сем. 12. Ampelidae. Свиристелевые.

82. *Bombycilla garrula* L. Свиристель.

Мензбиръ, II, 708 (*Ampelis garrulus*); Hartert, 456.

Въ суровыя зимы мѣстные охотники часто приносили мнѣ для опредѣленія свиристелей, убитыхъ около Тифлиса или въ лѣсахъ

Тифлисского уѣзда. Птица эта появляется здѣсь всегда маленьками стайками и служить предвестникомъ холодной зимы.

Сем. 13. Sylviidae. Славковыя.

83. *Aëdon familiaris* Ménétr. Краснохвостка, тугайный соловей.

Мензбиръ, II, 974 (*Sylvia familiaris*).

Краснохвостка обыкновенна во всей низменности восточного Закавказья, но держится только на низменности, нисколько не поднимаясь въ предгорья. Самый западный пунктъ, гдѣ я ее встрѣтилъ, очевидно, еще на прилетѣ — сел. Мансурлы Елизаветпольскаго уѣзда на Курѣ (2. V. 95) и сел. Бабы на Араксѣ (Джебраильскаго уѣзда). По побережью Каспійскаго моря эта птичка еще очень обыкновенна въ южной, степной части Кубинскаго уѣзда, но въ сѣверной, лѣсистой его части уже не встрѣчается.

Я встрѣчалъ тугайного соловья обыкновенно въ бесплодныхъ выжженыхъ солнцемъ мѣстахъ со скудною растительностью. Если замѣтишь гдѣ нибудь среди солончака два-три кустика тамариска, то, навѣрное, здѣсь же встрѣтишь и *Aëdon familiaris*. Онъ любить также находящіяся среди степи сухія канавы и рвы, которые, вѣроятно, представляютъ ему удобство для устройства гнѣзда. Человѣка онъ боится мало и охотно держится среди самыхъ селеній и гнѣздится даже въ маленькихъ палисадникахъ передъ домами (Сальяны).

Прилетаетъ эта интересная птичка въ восточное Закавказье въ самомъ началѣ мая; отлета мнѣ наблюдать не приходилось, такъ какъ осеню я никогда не бывалъ въ обитаемыхъ ею мѣстахъ.

Хотя я и не занимаюсь специально систематикой птицъ, но не могу не высказать здѣсь, что, по моему мнѣнію, тугайный соловей вполнѣ заслуживаетъ того, чтобы быть отдѣленнымъ отъ славокъ въ особый родъ. Кто видѣлъ его на волѣ, вполнѣ согласится со мною, что по своимъ повадкамъ онъ скорѣе напоминаетъ чекана, чѣмъ славку. Подобно чекану онъ избѣгаetъ густой растительности, обыкновенно прыгаетъ по землѣ и, вскочивъ на какую нибудь кочки или камень, въ два приема задираетъ кверху хвостикъ и „чакаетъ“ совсѣмъ какъ чеканъ. Только когда онъ поетъ, садится гдѣ нибудь на кустикѣ, — однако, невысоко отъ земли. Пѣніе его чрезвычайно пріятно и превосходитъ пѣніе соловья Гафиза.

Долженъ замѣтить здѣсь, что слово „буль-буль“ перево-дятъ обыкновенно *соловей*, и такового оно дѣйствительно обозна-чаетъ книжно. Но народъ называетъ этимъ именемъ вообще вся-кую маленькую пѣвчую птичку. Одинъ мулла рассказывалъ мнѣ, что булюлей есть семь сортовъ: красный, желтый и т. д.

84. *Sylvia nisoria* Bechst. Ястребиная славка.

Мензбиръ, II, 946.

Я встрѣчалъ ястребиную славку во второй половинѣ апрѣля на Талышской низменности (сел. Вель, 19. V. 97) и въ концѣ этого мѣсяца въ долинѣ р. Куры, гдѣ, по Радде, она гнѣз-дится, именно 26. V. 95 въ садахъ сел. Карасахкалъ на Курѣ (Елисаветпольского уѣзда). Но вообще это — довольно рѣдкая здѣсь птица.

85. *Sylvia cinerea fuscipilea* Landb. Сѣрая славка.

Мензбиръ, II, 950.

На низменности восточнаго Закавказья сѣрая славка обыкно-вена повсюду, но распространена преимущественно на низмен-ности и только невысоко поднимается въ предгорья. Держится она въ густомъ кустарнике какъ среди рѣчныхъ тугаевъ, такъ и въ открытой степи. Любить кустики гребенщика (*Tamarix*), гдѣ встрѣчается вмѣстѣ съ *Aëdon familiaris* и *Sylvia mystacea*.

86. *Sylvia hortensis* Bechst. Садовая славка.

Мензбиръ, II, 955.

Въ восточномъ Закавказье столь же рѣдка, какъ и ястреби-ная славка. На гнѣзовѣ я наблюдалъ ее, собственно, только одинъ разъ — 12. V. 96 въ сел. Ахсу Шемахинскаго уѣзда у южнаго подножья Кавказскаго хребта, еще на низменности.

На весеннемъ пролетѣ въ Тифлисѣ я наблюдалъ ее въ на-чалѣ апрѣля (6. IV. 98), на осеннемъ — во второй половинѣ ав-густа (21. VIII. 96).

87. *Sylvia curruca* L. Славка-завиушка.

Мензбиръ, II, 960.

Славка-пересмѣшка довольно обыкновена на низменности восточнаго Закавказья и въ лѣсномъ поясе поднимается довольно

высоко въ горы: такъ, я встрѣтилъ ее въ предгорьяхъ Муровъ-дага (24. V. 95) и въ горной части Кубинскаго уѣзда.

Экземпляры, добытые 30. IV. 97 на островѣ Сари, отличались довольно замѣтно отъ другихъ, но, къ сожалѣнію, были потеряны при возвращеніи оттуда.

Я упоминалъ уже, что Радде уничтожилъ мои этикеты и написалъ свои, при чемъ страшно все перепуталъ. Въ особенности это относится къ этому виду. Экземпляры № 47 f—l, помѣченные „Тифлисъ, 29. VIII. 93“, убиты не въ Тифлисѣ и не въ указанное время, ибо въ 1893 г. я здѣсь птицъ еще не собиралъ.

Осенний пролетъ въ Тифлисѣ бываетъ въ концѣ августа.

88. *Sylvia mystacea* Ménétr. Усатая славка.

Мензбиръ, II, 964.

Первый разъ я встрѣтилъ парочку этихъ птичекъ недалеко отъ сліянія Куры съ Араксомъ около селенія Джевать въ маленькихъ кустикахъ по берегу Аракса 23. III. 95. На другой день я нашелъ ихъ во множествѣ въ садахъ сел. Калагойны на Араксѣ, въ трехъ верстахъ отъ устья, на муганской сторонѣ. Самцы усердно пѣли. Во время дальнѣйшаго моего путешествія въ томъ-же году мнѣ удалось прослѣдить усатую славку до сел. Алабашлы Елизаветпольскаго уѣзда на западѣ, — западнѣе я не изслѣдовалъ, — т. е. почти до рѣчки Шамхоръ.

Въ 1897 году я во множествѣ нашелъ ее около Сальянъ и отсюда къ югу вплоть до Ленкорани и Астары.

Такимъ образомъ, оказалось, что видъ этотъ распространенъ по всей низменной части долины р. Куры и при томъ вездѣ здѣсь обыкновенентъ. По каспійскому же побережью я прослѣдилъ его отъ нашей персидской границы къ сѣверу до рѣчки Чагаджикъ-чай въ Кубинскомъ уѣздѣ, гдѣ встрѣтилъ его 26. VI. 96 въ мелкихъ чахлыхъ заросляхъ ишата и другихъ колючихъ деревьевъ. Убитыя здѣсь птицы были старыя, въ очень обтрепанномъ перѣ.

Усатая славка держится преимущественно въ садахъ и небольшихъ кустикахъ, особенно въ гребенщикѣ, который небольшими группами попадается и среди голой степи. Въ лѣсахъ и густыхъ заросляхъ, „джонгляхъ“, какъ ихъ называетъ Радде, я никогда не встрѣчалъ. Весною, скоро послѣ прилета, эта птичка вовсе не боязлива и подпускаетъ очень близко, такъ что въ это время

очень легко можно добыть сколько угодно экземпляровъ. Но позже она становится очень осторожною; къ тому же, растительность развивается, кустарники покрываются листьями, и найти усатую славку въ маѣ уже трудно. 2. VI. 97 въ Сальянахъ, въ тѣхъ мѣстахъ, которыхъ въ апрѣлѣ кишили этими славками, очевидно, здѣсь гнѣздишися, я не встрѣтилъ уже ни одной, несмотря на самые тщательные поиски. Вѣроятно, послѣ вывода молодыхъ онѣ откочевываютъ въ другое мѣсто.

Усатая славка — очень подвижная птичка и, подобно пѣночкамъ, находится въ непрестанномъ движеніи. Въ брачную пору самецъ на короткое время выбирается на выдающейся сучекъ, поетъ свою хорошенѣкую пѣсенку и снова ныряетъ въ чащу.

89. *Sylvia atricapilla* L. Черноголовая славка.

Мензбиръ, II, 966.

Черноголовка гнѣздится по садамъ и тугаямъ низменности восточного Закавказья, а также, вѣроятно, и въ предгорьяхъ. Относительно послѣднихъ у меня есть, впрочемъ, только одно свое личное наблюденіе, именно я слышалъ въ горной части Шемахинского уѣзда въ сел. Астраханкѣ ея характерное пѣніе 19. V. 96. На низменности же я находилъ ее около сел. Бегманлу Джебраильского уѣзда (7. VI. 94) на Араксѣ, въ часто уже упоминавшемся сел. Ахсу Шемахинского уѣзда (12. V. 96), и на Талышинской низменности около пограничного мѣстечка Астара (21. IV. 97). Около Тифлиса она появляется въ концѣ марта и исчезаетъ въ концѣ сентября. 7. IV. 96 я наблюдалъ здѣсь цѣлую стайку этихъ птичекъ, очевидно, пролетную.

90. *Phylloscopus nitidus* Blyth. Желтобрюхая пѣночка.

Мензбиръ, II, 916.

Желтобрюхая пѣночка — довольно обыкновенная птица лѣсовъ и садовъ восточной части Кавказскаго хребта. Я нашелъ ее гнѣздающеюся въ Шемахинскомъ уѣзде: въ садахъ сел. Маразы, на родникѣ Халтава (2. V. 96), въ Астраханкѣ (5. V. 96) на южномъ склонѣ хребта и въ лѣсу у сел. Алты-агачъ, на самомъ перевалѣ, здѣсь очень невысокомъ (20. V. 96); на сѣверномъ склонѣ хребта — въ лѣсахъ горной части Кубинскаго уѣзда, близъ сел. Сусай (15. VI. 96) и др.

Въ Ленкоранскомъ уѣздѣ, какъ о томъ отмѣтилъ въ своемъ каталогѣ Радде, я ея не находилъ. Экземпляръ, помѣченный этимъ ученымъ, по непонятнымъ мнѣ причинамъ, какъ найденный въ Ленкоранскомъ уѣздѣ (№ 58 f), на самомъ дѣлѣ добытъ мною въ сел. Астраханкѣ Шемахинскаго уѣзда.

91. *Phylloscopus trochillus* L. Пѣночка-весничка.

Мензбиръ, II, 926.

Лѣтомъ въ Закавказье я нигдѣ не встрѣчалъ пѣночки-веснички.

Весною она появляется въ Тифлисѣ гораздо позже пѣночки-кузнечика, именно въ первой половинѣ апрѣля, и въ долинѣ р. Куры задерживается до конца этого мѣсяца. Въ Ленкоранскомъ же уѣздѣ она встрѣчается уже въ началѣ марта (4. III. 96).

Осенью весничка появляется тоже раньше кузнечика, именно уже въ первой половинѣ августа и держится здѣсь до начала сентября.

92. *Phylloscopus collybita* Vieill. Пѣночка-кузнечикъ.

Мензбиръ, II, 931.

На гнѣздовья я нашелъ пѣночку-куznечика въ лѣсномъ поясѣ центральнаго Закавказья и южнаго Дагестана. Гнѣздится ли она на пизменности, я не знаю.

Весною она появляется около Тифлиса въ началѣ марта и держится до начала апрѣля, а осенью въ началѣ октября. Какъ весенній, такъ и осенній пролетъ этой пѣночки очень обиленъ и весь окрестные кустики и самые сады города во время валового пролета бываютъ полны этими птичками. Держатся онѣ, однако, вразсыпную.

93. *Phylloscopus Lorenzi* Severts. Кавказская пѣночка.

Lorenz, Beitr. z. Kenntniss der Ornithol. Fauna an d. Nordseite des Kaukasus, p. 28; Мензбиръ, II, 937 (Ph. sindianus); Hartert, 506.

Только однажды, именно 22. X. 95 я добылъ одинъ экземпляръ этого вида въ паркѣ Муштаидъ въ Тифлисѣ.

Курьезно, что этотъ экземпляръ отмѣченъ въ каталогѣ Радде и подъ именемъ Ph. sindianus и подъ именемъ Ph. tristis.

94. *Hypolais icterina* Vieill. Лѣсная малиновка.

Мензбиръ, II, 903.

Я нашелъ лѣсную малиновку гнѣздящуюся въ большомъ числѣ въ узкомъ ущельѣ р. Ленкоранки близъ сел. Руа, а затѣмъ и въ другихъ мѣстахъ Талышинской низменности, напр., въ лѣсу около селенія Бутасаръ.

Ущелье р. Ленкоранки близъ сел. Руа было удивительно похоже на средне-русскій лѣсной оврагъ, вродѣ тѣхъ, которые въ былое время прорѣзывали Воробьевы горы подъ Москвой. Стѣны его, конечно, были грандіознѣ, но такъ же круты, а дно такъ же ровно и такъ же поросло тонкими высокими ольхами, на верхушкахъ которыхъ и пѣли лѣсныя малиновки. Тутъ же жили западный соловей и сѣрыя мухоловки, и, къ довершенію сходства, раздавался крикъ вертишечки. Словомъ, птичья фауна была та же, что подъ Москвой.

Странно, что лѣсной малиновки не нашелъ Радде, который только Талышъ подробно и изслѣдовалъ. Это — очень замѣтная птичка здѣшнихъ лѣсовъ.

95. *Iduna calligata* Licht. Бормотушка.

Мензбиръ, II, 907.

Бормотушка встрѣчена мною только на узкой поросшей мелкимъ кустарникомъ полосѣ по морскому берегу въ южной части Ленкоранскаго уѣзда въ маѣ (сел. Кассаларъ, 6. V. 97; с. Шахъ-Агачъ, 29. V. 97) и около Сальянъ (20. V. 97). Какъ показываетъ время ея нахожденія, она здѣсь гнѣздится.

96. *Iduna pallida* Hempr. et Ehrenb. Блѣдная малиновка.

Мензбиръ, II, 909.

Блѣдная малиновка очень обыкновенна по всему каспійскому побережью, гдѣ я встрѣчалъ ее отъ Ленкорани до Низовой пристани (сел. Михайловское) Кубинскаго уѣзда.

Здѣсь она держится главнымъ образомъ въ садахъ на высокихъ деревьяхъ. Самцы поютъ на самой верхушкѣ дерева и имѣютъ обыкновеніе съ пѣніемъ перелетать съ верхушки одного дерева на верхушку другого, при чемъ, часто трепеща крылышками, сперва поднимаются косо вверхъ, а затѣмъ спускаются, описавъ такимъ

образомъ дугу. Внутри страны я встрѣтилъ эту птичку только около Тертера Джеванширского уѣзда, — слѣдовательно, у подножья Карабахскихъ горъ, 2. VI. 95 въ низкихъ заросляхъ по канавѣ, и въ садахъ сел. Ахсу Шемахинскаго уѣзда.

Когда прилетаетъ къ намъ эта птичка, я не знаю. Могу только замѣтить, что позже всѣхъ другихъ мелкихъ птичекъ. Я встрѣчалъ ее не раньше 1. VI. Описываемыя эволюціи самчики продѣливали въ первой половинѣ юна.

Во всей Кубинской низменности блѣдная малиновка очень многочисленна, но въ предгорьяхъ, даже на небольшой высотѣ, напримѣръ, около сел. Кимиль, ея уже нѣть. Въ камышовыхъ заросляхъ эта птичка никогда не встрѣчается.

97. *Acrocephalus phragmitis* Bechst. Камышовка-барсучекъ.

Мензбиръ, II, 880.

Къ концѣ апрѣля 1897 г. я добылъ нѣсколько экземпляровъ камышовки-барсучка на низменности южной части Ленкоранскаго уѣзда, въ садахъ и въ камышахъ озера Каладагна около сел. Арчевань (сел. Вель, 12. IV. 97; оз. Каладагна, 23. IV. 97). Судя по тому, что 12. V. 98 я нашелъ ее около станціи Кумбапи, и по болѣе позднимъ находкамъ Радде, эта птичка здѣсь гнѣздится.

Въ камышахъ озеръ Черепашьяго и Лиси около Тифлиса я часто наблюдалъ въ концѣ апрѣля, повидимому, этотъ видъ; но, гнѣздится ли онъ здѣсь или только пролетаетъ, я навѣрное не знаю.

98. *Acrocephalus turdoides* Meyer. Дроздовидная камышовка.

Мензбиръ, II, 887.

Дроздовидная камышовка такая замѣтная птица, что прослѣдить ея распространеніе очень легко, хотя и далеко не легко ее добыть. Я встрѣчалъ ее рѣшительно везде, гдѣ есть вода и камышовая заросли — отъ станицы Государственной Терской области на Сѣверномъ Кавказѣ до ленкоранскихъ морцовъ въ Закавказье. Тамъ, гдѣ по берегамъ Куры существуютъ обширныя камышовые заросли, озерки и старыя русла, именно въ предѣлахъ Джеванширского, Шушинского и Джеватского уѣздовъ Елизаветпольской и Бакинской губ., дроздовидная камышовка встрѣчается

въ громадномъ количествѣ. Около Тифлиса она встрѣчается въ небольшомъ числѣ на озерахъ Черепашьемъ, Лиси и Соленомъ. На послѣднемъ бываетъ иногда многочисленна. Въ окрестности Тифлиса дроздовидная камышовка прилетаетъ во второй половинѣ апрѣля.

99. *Acrocephalus palustris* Bechst. Болотная камышовка.

Мензбиръ, II, 893.

Болотная камышовка встрѣчена мною на гнѣздахъ въ горной части Шемахинского и Кубинского уѣздовъ и южномъ Дагестанѣ. Здѣсь она держится вовсе не на болотахъ, а на лугахъ и лѣсныхъ полянахъ, покрытыхъ высокою травянистою растительностью, среди которой и гнѣздится. Я заключаю это изъ того, что часто наблюдалъ въ такихъ мѣстахъ парочки, поведеніе которыхъ ясно показывало, что у нихъ по-близости находится гнѣздо; найти таковое мнѣ, однако, не удавалось. Въ Дагестанѣ въ долинѣ р. Самура эта птичка по хлѣбнымъ полямъ поднимается до аула Рутуль. Въ Шемахинскомъ уѣздѣ я наблюдалъ болотную камышовку во второй половинѣ мая (с. Курдамичъ, 19. V. 96), въ Кубинскомъ уѣздѣ — въ срединѣ юня, къ каковому времени и относится ея гнѣзданье.

Одинъ разъ, именно 10. V. 95, я встрѣтилъ ее на низменности Арешского уѣзда.

На пролетѣ я наблюдалъ ее въ Тифлисѣ въ концѣ августа.

100. *Acrocephalus streperus* Vieill. Тростниковая камышовка.

Мензбиръ, II, 896.

Я встрѣчалъ тростниковую камышовку только на осеннемъ пролетѣ въ Тифлисѣ. Она появляется здѣсь въ августѣ и бываетъ весьма многочисленна во всѣхъ садахъ города и въ окрестностяхъ.

Acrocephalus dumetorum Blyth.

Такъ какъ Радде уничтожилъ мои этикетки, то я теперь совсѣмъ не могу рѣшить, откуда происходитъ экземпляръ № 73а съ датой „Тифлисъ, IV. 93“. Во всякомъ случаѣ, въ апрѣль 1893 года я еще не жилъ на Кавказѣ.

101. *Cettia cetti* Marm. Соловинная камышовка.

Мензбиръ, II, 875.

Я добылъ только одинъ экземпляръ соловиной камышовки 23. IV. 97 на Каладагнинскомъ морцѣ въ южной части Ленкоранского уѣзда. Птичка эта вовсе не рѣдка здѣсь, но условія, при которыхъ она встрѣчается, дѣлаютъ добываніе ея необычайно труднымъ. Въ Ленкоранскомъ уѣздѣ эти маленькия птички жили на заросшихъ камышомъ топяхъ, гдѣ держались у самой земли, т. е. у поверхности топи, да притомъ въ такой темнотѣ, что едва можно было, подъѣхавъ въ удобномъ мѣстѣ на лодкѣ, разглядѣть маленькую птичку, быстро мелькающую среди частыхъ толстыхъ стеблей камыша. Далеко въ такой гущинѣ не видно, близко стрѣлять нельзя. Кромѣ того, птичку не приходится видѣть долѣе одного мгновенія. Вотъ почему она сравнительно рѣдко дѣлается добывающею коллектора.

Сем. 14. *Turdidae*. Дроздовые.Подсем. *Saxicolinae*.102. ? *Pratincola rubicola* L. Черноголовый чеканъ.

Мензбиръ, II, 1011.

Г. И. Радде отнесъ къ этому виду одинъ экземпляръ, убитый мною около Тифлиса 11. IV. 96, и другой — около Шемахи 8. V. 96, слѣдовательно, уже гнѣздающійся тамъ. Эти опредѣленія кажутся мнѣ сомнительными.

103. *Pratincola Hemprichii* Ehrenb. et intermed. Бѣлохвостый чеканъ.

Мензбиръ, II, 1014.

У Тифлиса я наблюдалъ луговыхъ чекановъ на пролетѣ по сырьмъ лугамъ въ концѣ марта.

Въ большомъ количествѣ найдены были мною эти чеканы на гнѣздахъ въ маѣ 1896 г. въ предгорьяхъ Кавказскаго хребта въ Шемахинскомъ уѣздѣ. Они держались здѣсь по сырьмъ лугамъ. Большинство добытыхъ въ этой мѣстности чекановъ отмѣчено проф. М. А. Мензиромъ, какъ „intermed.“.

По немногу, главнымъ образомъ все въ мартѣ, я встрѣчалъ бѣлохвостаго чекана во многихъ мѣстахъ долины р. Куры и на Талышинской низменности. Но онъ, вѣроятно, не гнѣздится здѣсь.

104. *Pratincola rubetra* L. Луговой чеканъ.

Мензбиръ, II, 1017.

На низменности я находилъ лугового чекана весною (во второй половинѣ апрѣля) на хорошихъ лугахъ по долинѣ р. Куры: близъ Тифлиса у Соленаго озера, въ Елисаветпольскомъ (18. IV. 95) и Арешскомъ уу. Елисаветпольской губ., и на Талышинской низменности (с. Вель, 19. IV. 97; Сейдакерань, 4. V. 95). Вѣроятно, онъ и гнѣздится здѣсь, на что указываетъ какъ нахожденіе его на Талышинской низменности еще въ маѣ, такъ и то обстоятельство, что въ августѣ я встрѣчалъ его близъ Тифлиса выводками. Однако, это — только предположенія. Несомнѣнно же на гнѣздовыѣ я встрѣтилъ его по военно-грузинской дорогѣ близъ станц. Гудауръ (7000'), а на черноморскомъ побережїѣ — близъ Кобулетъ въ 1906 году.

Рѣдкости этотъ чеканъ въ Закавказье, во всякомъ случаѣ, не представляетъ, но вообще онъ нигдѣ не попадается въ большомъ количествѣ.

105. *Saxicola oenanthe* L. Каменка обыкновенная.

Мензбиръ, II, 1022.

„Чакъ-чаки“ (татарск., всѣ каменки).

Вмѣстѣ съ *Saxicola isabellina* это — самые обыкновенные представители рода *Saxicola* на протяженіи всего Кавказскаго края.

Въ долинѣ Куры и около Тифлиса обыкновенная каменка появляется довольно поздно, только въ концѣ марта, и исчезаетъ довольно рано. Мне кажется это довольно страннымъ, но около Тифлиса по крайней мѣрѣ, гдѣ я весною экскурсировалъ довольно часто, я положительно не встрѣчалъ ее раньше 30. III. По прилетѣ каменки нѣкоторое время держатся по пашнямъ и лугамъ, а затѣмъ уже занимаютъ для вывода дѣтей свои обычныя каменистые мѣста: каменные розсыпи, глинистые обрывы и особенно каменистая русла рѣкъ, по которымъ поднимаются очень высоко въ горы, даже среди лѣсистыхъ мѣстностей. Около Тифлиса обыкновенная каменка гнѣздится на высотѣ около 2000'; на Арапатѣ осенью, уже при довольно холодной погодѣ я встрѣтилъ ее

на высотѣ около 9000'; въ Талышинскихъ горахъ около Кяльвяза находилъ, несомнѣнно, на гнѣздовѣ на высотѣ 7000', и на такой же высотѣ въ многихъ мѣстностяхъ Дагестана. Гнѣздится ли эта птичка въ восточномъ Закавказье гдѣ нибудь на уровнѣ моря, я не знаю. Но на черноморскомъ побережье около Кобулетъ она гнѣздится на морскомъ берегу, который одинъ только удовлетворяетъ, по своей обнаженности, требованіямъ каменки въ этой сплошь покрытой роскошною растительностью странѣ.

Въ предѣлахъ Кавказскаго края обыкновенная каменка встрѣчается рѣшительно повсюду: отъ Чернаго моря до Каспійскаго и отъ ставропольскихъ степей до Талышинскихъ горъ и Агридага.

На зиму обыкновенная каменка въ Закавказье рѣшительно нигдѣ не остается. Талышинские экземпляры, добытые на высотѣ 7000' близъ перевала Барнасарь, по-моему, сильно отличались по окраскѣ отъ другихъ, но это пусть разберутъ уже специалисты-орнитологи.

106. *Saxicola isabellina* Kjpp. Каменка-плясунья.

Мензбиръ, II, 1028.

Очень обыкновенна во всѣхъ пустынныхъ степяхъ Сѣвернаго Кавказа и восточнаго Закавказья, держится также по невысокимъ безплоднымъ горамъ, а въ западномъ Закавказье, за немѣнiemъ болѣе удобнаго мѣста, живетъ на морскомъ берегу вмѣстѣ съ *S. oenanthe*. Высоко въ горы нигдѣ не поднимается. Самое высокое наблюдавшееся мною мѣстонахожденіе этой каменки, перевалъ черезъ гору Такялту Эриванской губ., къ югу отъ мѣстечка Кульпы, не превышало 4000'.

12. V. 99 я встрѣтилъ на Сѣверномъ Кавказѣ въ ставропольской степи парочку, гнѣздившуюся въ оставленной норѣ суслика у аула Башанта.

Камней, какъ нѣкоторая другія каменки, каменка-плясунья не любить. Любимое ея мѣстопребываніе — пустынныя солончаковые степи. Здѣсь она устраиваетъ гнѣздо въ оставленной норѣ какого нибудь грызуна. Едва порхающихъ молодыхъ я встрѣчалъ на низменности восточнаго Закавказья въ концѣ апрѣля. Въ началѣ мая они летаютъ уже порядочно. Въ противоположность *S. oenanthe*, *S. isabellina* положительно не любить и избѣгаетъ каменистыхъ мѣстностей. Скорѣе ее можно встрѣтить на выгонахъ

и склонахъ горъ, покрытыхъ скудною растительностью, но никогда на обнаженныхъ скалахъ.

Въ небольшомъ числѣ каменка-плясунья остается въ Закавказье на зиму, и не только на низменности, но иногда даже и у Тифлиса. Нормально же появляется здѣсь уже въ февралѣ.

Около сел. Мансурлы Елисаветпольского уѣзда я нашелъ гнѣздо этой птички, устроенное довольно глубоко въ оставленной норѣ песчанки (*Gerbillus caucasicus*).

107. *Saxicola deserti* Temm. Пустынная каменка.

Мензбиръ, II, 1030.

Я встрѣчалъ пустынную каменку только около Тифлиса. Отдельные парочки и молодыя встрѣчались по скалистому кряжу одной изъ возвышеностей около города.

Лѣтомъ мнѣ не приходилось здѣсь экскурсировать, но въ августѣ я убивалъ молодыхъ и старыхъ, поэтому считаю пустынную каменку рѣдкою, но гнѣздящеюся птицею окрестностей Тифлиса.

108. *Saxicola melanoleuca* Guld.

Мензбиръ, II, 1031.

Рѣдкая у насъ птица. Одинъ экземпляръ этого вида (δ) былъ добытъ А. Б. Шелковниковымъ въ Арецскомъ у. 30. III. 94.

109. *Saxicola aurita* Temm.

Мензбиръ, II, 1026.

Я видѣлъ только одинъ экземпляръ этого рѣдкаго вида (δ), тоже добытый г. Шелковниковымъ тамъ же, мѣстн. Мазитъ-дара (въ Бозъ-дагѣ) Арешск. у., 30. III. 94.

110. *Saxicola morio* Ehrenb. Каменка-плѣшанка.

Мензбиръ, II, 1033.

Я наблюдалъ каменку-плѣшанку: около Тифлиса; по глинистымъ обрывамъ плоскаго хребта Бозъ-дагъ, тянущагося черезъ Елисаветпольскій и Арешскій уѣзды; въ южныхъ предгорьяхъ Кавказскаго хребта и на Талышинской низменности. Въ послѣдней мѣстности она бываетъ только на пролетѣ, въ остальныхъ же, повидимому, гнѣздится; по крайней мѣрѣ, въ августѣ я встрѣчалъ около Тифлиса выводки, а въ другихъ перечисленныхъ здѣсь мѣстахъ наблюдалъ ее во время гнѣзданья.

Каменка-плѣшанка держится предпочтительно на глинистыхъ обрывахъ, но встрѣчается и на скалахъ, которыя другіе чеканы этой группы избѣгаютъ, предпочитая болѣе мягкую почву.

111. *Saxicola Finschi* Heugl. Черногорлый чеканъ.

Мензбиръ, II, 1037.

Черногорлый чеканъ любить мѣста, гдѣ глинистые обрывы чередуются съ выходами скалъ, — поэтому истинное царство его представляетъ самая восточная часть Кавказскаго хребта — отъ восточной части Шемахинскаго у. до Апперонскаго полуострова. Онъ держится здѣсь приблизительно на высотѣ Шемахи. Въ маѣ 1896 г. я встрѣчалъ его здѣсь всюду въ большомъ количествѣ, несомнѣнно, на гнѣздовья.

Въ значительномъ же количествѣ я встрѣтилъ его гнѣздящимся и въ Талышинскихъ горахъ, близъ поста Кяльвазъ на высотѣ 7000', и осенью по сѣверному склону Агри-дага; особенно много было ихъ на горѣ Такялту къ югу отъ Кулыпъ, Эриванской губерніи.

Зимою этотъ чеканъ спускается на низменность, и однажды въ декабрѣ былъ убитъ въ Арешскомъ уѣздѣ.

112. *Saxicola vittata* Hempr. et Ehrenb.

Зарудный въ своей „Орнитологической фаунѣ Закаспійскаго края“ * говоритъ про этого чекана: „между прочимъ довольно часто гнѣздился къ 1884 и 1886 гг. въ пустынныхъ горахъ около Баку“.

21. VI. 97 на плоскихъ скалистыхъ кряжахъ на сѣверномъ берегу Апперонскаго полуострова около сел. Мардакянъ я наблюдалъ пару какихъ то неизвѣстныхъ мнѣ чекановъ. Вѣроятно, они принадлежали къ этому виду.

Подсем. *Ruticillinae*.

113. *Ruticilla phoenicurus* L. Обыкновенная горихвостка.

Мензбиръ, II, 1001.

На Сѣверномъ Кавказѣ я наблюдалъ обыкновенную горихвостку въ нѣсколькихъ пунктахъ Ставропольской губ., между

* Материалы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи. Отд. зоологич. Вып. II, стр. 59 (1896).

прочимъ 10. V. 99 въ саду при Лѣтней Трухменской ставкѣ, среди голой степи, тянущейся на много верстъ кругомъ.

Въ восточномъ Закавказье она очень обыкновенна на низменности и въ предгорьяхъ. Рѣзкой разницы между распространениемъ *Rut. phoenicurus* и *Rut. mesoleuca* въ вертикальномъ направлении я не замѣтилъ. Она найдена мною въ послѣдней трети апрѣля и началѣ мая на Талышинской низменности (с. Тангерудъ, 22. IV. 97; с. Машханъ, 23. IV. 97; с. Вель, 25. IV. 98), въ долинѣ р. Куры, въ Елисаветпольскомъ и Арешскомъ уѣздахъ (с. Сафи-Куртъ, 19. IV. 95; с. Агаси-богли, 22. IV. 95; Мансурлы, 2. V. 95), въ предгорьяхъ южного склона Кавказскаго хребта (Шемаха, 8. V. 96) и около Тифлиса. Въ окрестностяхъ послѣдняго по крайней мѣрѣ, несомнѣнно, гнѣздятся оба вида, такъ какъ въ концѣ августа я убивалъ здѣсь молодыхъ какъ *R. phoenicurus*, такъ и *R. mesoleuca*. Въ западномъ Закавказье въ бассейнѣ р. Ріона горихвостка, вѣроятно, очень рѣдка, такъ какъ я ни разу не встрѣтилъ ея на своемъ пути осенью 1902 г. изъ Гуріи въ Тифлисскую губернию черезъ Месхійскій хребеть и ни разу не видѣлъ ее, проживъ цѣлое лѣто 1906 г. въ Кобулетахъ.

Прилетѣ горихвостки я наблюдалъ въ 1896 г. въ Тифлисѣ 4. IV, въ 1897 г. въ Ленкорани — 16. IV. Въ Тифлисѣ она держится до начала октября; самое позднее время наблюденія — 7. X. 95 (Муштаидъ).

114. *Ruticilla mesoleuca* Hempr. et Ehrenb. Бѣлокрылая горихвостка.

Мензбиръ, II, 1005.

Я наблюдалъ бѣлокрылую горихвостку на гнѣздахъ въ предгорьяхъ Кавказскаго хребта (с. Боскалъ Шемахинск. у., 10. V. 96) и около Тифлиса, гдѣ встрѣчалъ молодыхъ уже въ концѣ июля.

115. *Ruticilla ochrirostris* Gmel. Кавказская горихвостка-чернушка.

Мензбиръ, II, 1006.

Обыкновенная гнѣздащаяся птица альпійскаго пояса горъ. На Большомъ Кавказѣ я встрѣчалъ ее по военно-грузинской дорогѣ отъ станціи Гудауръ до ст. Казбекъ, въ Кубинскомъ у. у селенія Лаза при подножіи Шахъ-дага, и всюду въ Дагестанѣ.

Гнѣздится она въ оградахъ и зданіяхъ, сложенныхъ изъ булыжника и дикаго камня безъ цемента. У убитой 27. IV. 99 у станціи Гудауръ самки я нашель яйцо на-снош. 12. VI. 901 я нашелъ въ такой каменной оградѣ близъ Бусарчильского перевала гнѣздо этой горихвостки, съ птенцами въ пуху.

116. *Ruticilla erythrogaster* Guld.

Мензбиръ, II, 1008.

Я одинъ только разъ встрѣтилъ и добылъ эту высокогорную птицу 18. II. 96, при довольно холодной погодѣ, на скалахъ по берегу р. Куры между Мцхетомъ и Авчалами.

117. *Daulias luscinia* L. Западный соловей.

Мензбиръ, II, 982 (*Erithacus luscinia*).

Всѣ соловьи бюль-бюль (татарск.).

Одинъ экземпляръ западнаго соловья добытъ мною 7. V. 97 въ заросшей по дну ольхою, а по склонамъ разнымъ кустарникомъ узкой балкѣ р. Ленкоранки близъ сел. Руя, вмѣстѣ съ *Hupolais icterina*, при обстоятельствахъ, очень похожихъ на гнѣздование. Интересно, что въ „*Ornis Caucasica*“ пропущены обѣ упомянутыя здѣсь птицы.

Другой экземпляръ добытъ уже, несомнѣнно, на пролетѣ 20. IV. 95 близъ сел. Азуръ-Ахметлы Елисаветпольского уѣзда.

118. *Daulias philomela* Bechst. Восточный соловей.

Мензбиръ, II, 978 (*Erithacus philomela*).

Восточный соловей — гнѣздащаяся птица Сѣвернаго Кавказа, где 10. V. 99 я слышалъ его въ саду Лѣтней Трухменской ставки Ставропольской губ., и центральнаго Закавказья. Пѣніе его раздается съ мая всюду въ садахъ окрестностей Тифлиса и даже въ большихъ садахъ самаго города.

Во второй половинѣ августа число особей этого соловья въ Тифлисѣ значительно увеличивается: вѣроятно, идетъ пролетъ. Въ это время (16. VIII) они тоже понемногу поютъ, хотя и очень несложно.

На весеннемъ пролетѣ однажды онъ былъ встрѣченъ мною и подъ Ленкоранью (сел. Вель, 11 верстъ къ югу отъ Ленкорани, 19. IV. 97). По пѣнію очень легко отличить *D. philomela* отъ *D. Hafizi*, не труднѣе, чѣмъ щегленка отъ чижка. Хотя здѣшніе

D. philomela поютъ и несравненно лучше, чѣмъ *D. Hafizi*, но все же пѣніе ихъ значительно уступаетъ пѣнію ихъ собратій въ средней Россіи.

Соловей совсѣмъ не такая ужъ смирная птичка, какъ это принято думать. Одинъ соловей,—вѣроятно, этого вида,—жившій въ саду при отдѣленіи Кавказской шелководственной станціи въ г. Нухѣ, ежедневно регулярно являлся къ черводонѣ осматривать выбрасываемыя „подстилки“, т. е. не сѣденій шелковичными червями листъ, на которомъ всегда остается небольшое количество отставшихъ или больныхъ червей, которыми онъ и пользовался. При этомъ онъ энергично отгонялъ не только болѣе слабыхъ птичекъ, но и нахальныхъ воробьевъ, желавшихъ также пользоваться этими остатками, и однажды (3. V. 904) на моихъ глазахъ одного изъ нихъ, сѣвшаго черезчуръ близко къ нему, клюнулъ въ голову и обратилъ въ бѣгство.

119. Daulias Hafizi Severts. Соловей Гафиза.

Мензбиръ, II, 983 (*Erithacus hafizi*).

Этотъ соловей весьма обыкновененъ и многочисленъ во всей низменности и предгорьяхъ восточного Закавказья и по каспийскому побережью отъ персидской границы до Дербента. Но около Тифлиса, гдѣ его находилъ Радде („*Ornis Caucasicus*“, стр. 195), я его никогда не слыхалъ лѣтомъ и не убивалъ осенью на пролетѣ. Его пѣніе, очень плохое и лишь слабо напоминающее соловьиное, такъ характерно, что ошибиться и смѣшать его съ *D. philomela* невозможно. Въ Кубинскомъ у. онъ тоже многочисленъ, но такъ wysoko въ горахъ, какъ это указываетъ Радде, т. е. до 5000', мнѣ никогда не попадался. Вообще онъ избѣгаетъ густыхъ высокоствольныхъ лѣсовъ и держится исключительно въ мелкихъ заросляхъ, некрупномъ рѣдкомъ лѣсу и особенно въ садахъ.

120. Cyanecula suecica pallidogularis Zarudn. Варакушка блѣдногорлая.

Я встрѣчалъ варакушку только подъ Тифлисомъ на весен-немъ пролетѣ въ концѣ марта и началѣ апрѣля, и въ долинѣ Куры (Арешскій у.) въ началѣ марта.

Подъ Тифлисомъ варакушки держались обыкновенно на днѣ глубокихъ густо заросшихъ промоинъ, а однажды (26. III. 900) я

встрѣтилъ ихъ на совершенно голомъ берегу Соленаго озера, гдѣ онъ собирали что-то у самой воды.

Указаниемъ на то, что кавказская варакушка относится къ описанному Н. А. Заруднымъ подвиду *C. s. pallidogularis*, я обязанъ С. А. Бутурлину, но описание этой формы мнѣ, къ сожалѣнію, неизвѣстно.

121. *Erythacus rubeculus caucasicus* Buturlin. Кавказская зарянка.

Buturlin, Reichenow's Ornith. Monatsber., Jan. 1907, p. 8.

Эта зарянка широко распространена во всемъ Закавказье и живетъ здѣсь осѣдло. Гнѣздится она въ лѣсномъ поясѣ и, весьма вѣроятно, въ заросляхъ на низменности. Я могу, однако, утверждать это только относительно Талыша, гдѣ убивалъ этотъ видъ въ маѣ. Въ другихъ же мѣстахъ восточно-закавказской низменности я не наблюдалъ ея, вѣроятно, только потому, что ее невозможно замѣтить лѣтомъ при ея скрытомъ образѣ жизни въ тѣхъ непролазныхъ заросляхъ, въ которыхъ она держится. 15. VIII. 902 я встрѣтилъ зарянокъ въ заросляхъ рододендрона на Аджарскомъ хребтѣ, почти на границѣ лѣсной растительности.

13. III. 99 въ сел. Борджалы зарянки пѣли такъ усердно, какъ я раньше и не слыхалъ. 16. III, проѣзжая послѣ заката солнца лѣсомъ изъ сел. Арчевань въ сел. Алаша, я видѣлъ, какъ зарянки гонялись другъ за другомъ. Изъ этого я заключаю, что спариваются онѣ въ срединѣ марта. 8. V. 97 въ предгорьяхъ Талышинскихъ горъ между сс. Руа и Бибіаны я убилъ молодую, уже летную зарянку въ гнѣздовомъ нарядѣ. Я уѣхалъ въ томъ, что это — зарянка, только послѣ второго выстрѣла, которымъ посчастливилось убить молодую и старую вмѣстѣ. Онѣ держались въ лощинѣ среди бурелома и папоротника. Старая очень волновалась, летая надъ молодыми.

18. VI. 97 въ горной части Талыша — Зувандѣ я находилъ уже хорошо летающихъ молодыхъ.

Зимою зарянка весьма многочисленна всюду на низменности, не исключая и тифлисскихъ садовъ. Такъ какъ Радде не различалъ *E. hugcanus* и *E. rubeculus*, то весьма странно, что онъ говоритъ о прилетѣ зарянокъ (*Ornis Caucas.*, стр. 26) въ Тифлисъ, когда онѣ не улетаютъ отсюда и въ самыя жестокія зимы. Обыкновенная зарянка мнѣ ни разу въ Закавказье не встрѣчалась. Я

особенно тщательно разсмотрѣлъ экземпляры, добыты мною въ самый разгаръ зимы при большомъ снѣгѣ и морозѣ 22. XII. 95 и 24. XII. 905, но онѣ оказались не типичными, а, какъ я думалъ раньше, *E. hyrcanus*, т. е. въ дѣйствительности *E. rubeoculus caucasicus*.

Молодой экземпляръ, убитый мною въ Манглисѣ 5. IX. 97, имѣлъ уже цвѣтъ взрослаго.

Подсем. *Turdinae*.

122. *Turdus pilaris* L. Дроздъ-рябинникъ.

Мензбиръ, II, 1079.

Я встрѣчалъ рябинника только во время второй половины зимы въ долинѣ р. Куры отъ Мцхета до Арешскаго у. Елисаветпольской губ. Въ окрестностяхъ Тифлиса они держались по покрытымъ мелколѣсьемъ горамъ (Авчалы, Мцхетъ) и въ тугаяхъ по р. Курѣ, а при выпаденіи большого снѣга (сравнительно, по мѣстному) появлялись и въ тифлисскихъ садахъ. Такъ, во время мятели, продолжавшейся нѣсколько дней въ концѣ февраля 1898 г., въ паркѣ Муштаидъ было множество совершенно обезсиленныхъ и страшно исхудалыхъ дроздовъ разныхъ видовъ. Ни въ ноябрѣ, ни въ декабрѣ я ни разу его здѣсь не наблюдалъ.

123. *Turdus iliacus* L. Дроздъ-блѣлобровикъ.

Мензбиръ, II, 1076.

Въ противоположность мнѣнію, высказанному Радде (*Ornis Caucas.*, стр. 210), блѣлобровикъ является зимующею птицей не только Ленкорани, но, вѣроятно, и всей долины р. Куры, такъ какъ я наблюдалъ его въ Тифлисѣ съ конца ноября до начала апрѣля. Особенно многочисленны были блѣлобровики всю зиму 1896 — 97 гг. въ паркѣ Муштаидъ. Нахожденіе блѣлобровика въ этомъ паркѣ еще 6. IV. 98 кажется мнѣ очень позднимъ, такъ какъ подъ Москвою этотъ дроздъ приступаетъ къ гнѣзданью во второй половинѣ апрѣля, а прилетаетъ уже въ концѣ марта.

124. *Turdus musicus* L. Пѣвчій дроздъ.

Мензбиръ, II, 1073.

Въ долинѣ средняго теченія Куры я наблюдалъ пѣвчаго дрозда только позднею осенью (октябрь) и весною (мартъ).

Радде считаетъ пѣвчаго дрозда гнѣздащимся въ лѣсномъ поясѣ до 7000', кажется, только на томъ основаніи, что наблюдалъ его въ Боржомѣ З. IV. Но если такой выводъ вѣренъ, то здѣсь гнѣздится и бѣлобровикъ. Однако, въ лѣтнюю пору ни въ лѣсахъ Карабаха, ни въ талышинскихъ, ни по южному склону Кавказскаго хребта и Кубинскомъ уѣздѣ я никогда никакого другого дрозда кромѣ чернаго не наблюдалъ, а пѣніе бѣлобровика и пѣвчаго дрозда такъ характерно и громко, что мудрено было бы его не услышать. Слѣдовательно, если пѣвчій дроздъ и гнѣздится здѣсь, то, вѣроятно, только въ хвойныхъ лѣсахъ, и обобщеніе Радде ни на чёмъ не основано.

125. *Turdus viscivorus* L. Дроздъ-деряба.

Мензбиръ, II, 1068.

Появляется въ долинѣ средняго теченія р. Куры и въ Тифлисѣ только при выпаденіи большого снѣга въ горахъ. Убитые въ Муштаидѣ 1. III. 98 были такъ истощены, что почти валились съ дерева. Вѣроятно, они голодали уже долго, ибо исхудали такъ, что ободранныя тушки казались высохшими.

Насколько я могъ выяснить, деряба гнѣздится въ полосѣ хвойнаго лѣса. Осеню (8. X. 900) я встрѣчалъ небольшія стайки дерябъ около Сарыкамыша въ смѣшанномъ лѣсу по склону хребта Саганлугъ, и въ сосновыхъ лѣсахъ по горамъ, окружающимъ Гельскую котловину (Ардаганскій округъ Карской обл., 1. IX. 902).

126. *Merula merula* L. Черный дроздъ.

Мензбиръ, II, 1061.

Кара-тоухъ (татарск.).

Черный дроздъ, несомнѣнно, одна изъ самыхъ обыкновенныхъ и многочисленныхъ осѣдлыхъ птицъ Закавказья. Область гнѣздовья его обнимаетъ поясъ лѣсовъ приблизительно отъ 3000' до 5000', а, можетъ быть, и выше. Но это касается только внутренней части перешейка; по сырому же лѣсистому побережью Талыша и Кутаисской губ. онъ встрѣчается и лѣтомъ и, вѣроятно, гнѣздится на уровняхъ моря.

Осеню въ вост. Закавказье нормально появляется на низменности въ октябрѣ раньше или позже, смотря по состоянію погоды. Но иногда единичными экземплярами встрѣчается и гораздо раньше: такъ,

въ 1894 г. я видѣлъ его около Тифлиса въ началѣ августа. Чѣмъ холоднѣе и чѣмъ больше снѣга выпало въ горахъ, тѣмъ многочисленнѣе черный дроздъ въ тифлисскихъ садахъ и заросляхъ по берегамъ Куры. Однако, не слѣдуетъ думать, что всѣ дрозды обязательно скочевываютъ зимою съ горъ на низменность. Въ безснѣжныхъ мѣстахъ въ теплую сравнительно погоду они и зимою попадаются довольно высоко, вѣроятно, въ мѣстахъ своего гнѣздувья. Такъ, по дорогѣ съ поста Кёръ-оглы на постъ Эрюкъ вдоль турецкой границы я встрѣтилъ чернаго дрозда 7. X. 902 на склонахъ хребта Топъ-іолъ на высотѣ выше 5000'; 9. X. 96 при очень холодной погодѣ на пути изъ Кедабека въ с. Загликъ (Ганджинскія горы), тоже довольно высоко; наконецъ, 8. XI. 906 въ Ликанахъ около Боржома.

Въ мартѣ черный дроздъ уже исчезаетъ съ низменности, отправляясь на мѣста своего гнѣздувья. 17. III. 96 я не встрѣтилъ уже ни одного въ долинѣ Куры у Мцхета. Съ половины марта слышно ихъ пѣніе на мѣстахъ гнѣздувья, гдѣ потеплѣе. Въ сел. Борджали, въ предгорьяхъ Талышинскихъ горъ, я слышалъ ихъ пѣніе уже 13. III. 99.

127. *Merula torquata* L. Бѣлозобый дроздъ.

Мензбіръ, II, 1057.

Бѣлозобый дроздъ встрѣченъ мною только въ субъ-альпійской полосѣ горъ, гдѣ онъ держится въ высокихъ травянистыхъ заросляхъ. Въ Дагестанѣ близъ аула Курушъ я убилъ одного 4. VII. 96 на высотѣ около 8000'. Въ области истоковъ р. Куры къ юго-западу отъ Гельской котловины я встрѣтилъ его по р. Лаустанъ-чаю, у подошвы горы Кабахъ-тапа еще выше — 20. IX. 902, когда вся растительность тамъ уже давно погибла и мѣстами лежалъ снѣгъ.

128. *Monticola saxatilis* L. Каменный дроздъ.

Мензбіръ, II, 1053.

Каменный дроздъ попадался мнѣ довольно рѣдко, хотя мѣстами въ Эриванской губерніи онъ довольно многочисленъ. 27. IV. 99 я убилъ одного самца во время отвратительной погоды близъ станціи Гудауръ военно-грузинской дороги. 24. IX. 900 я встрѣтилъ его въ Орговскомъ ущельѣ, къ югу отъ мѣст. Игдыръ

Эриванск. губ., а 23. IX. 902 около сел. Мшехъ по дорогѣ изъ Ардагана въ Ольты.

Monticola cyanus L. Голубой дроздъ.

Мнѣ никогда не попадался.

Я упоминаю о немъ только для того, чтобы обратить вниманіе лицъ, пользующихся сочиненіями Г. И. Радде, особенно его каталогомъ „Museum Caucasicum“, I, и на слѣдующее обстоятельство.

Радде приводить его для окрестностей Тифлиса (*Ognis Caucas.*, стр. 203), но это врядъ-ли нужно понимать въ прямомъ смыслѣ. Я по крайней мѣрѣ во время моихъ многочисленныхъ и многолѣтнихъ экспедицій здѣсь ни разу ни этого, ни предыдущаго вида не встрѣтилъ, хотя и нашелъ кое что не замѣченное Радде. А за 14 лѣтъ занятій при Кавказскомъ Музѣѣ я успѣль убѣдиться, что Г. И. Радде ставилъ на этикетѣ „Тифлисъ“ на всякомъ предметѣ, который ему приносили въ Тифлисъ, мало заботясь о настоящемъ его происхожденіи.

Сем. 15. Accentoridae. Завирушковыя.

129. *Accentor modularis orientalis* Sharpe.

Мензбиръ, II, 1044.

Мнѣ не приходилось наблюдать эту завирушку на гнѣздовьяхъ, но зимою она очень обыкновенна на низменности восточнаго Закавказья, где я наблюдалъ ее во многихъ мѣстахъ долины р. Куры отъ Мцхета до Сальянъ и въ Талышъ. Эта птичка обыкновенно держится въ самыхъ густыхъ заросляхъ у самой земли, такъ что даже зимою, когда кусты обнажены отъ листвьевъ, замѣтить ее довольно трудно. Поэтому я не рѣшаюсь утверждать, что она здѣсь никогда не гнѣздится, ибо усмотрѣть ее въ заросляхъ лѣтомъ, при ея образѣ жизни, рѣшительно невозможно. Нахожденіе завиушки на низменности еще въ концѣ апрѣля (23. IV. 95, Джеватъ), повидимому, указываетъ на то, что она здѣсь гнѣздится, ибо въ это время всѣ птицы тамъ приступили уже къ гнѣздовью.

Я находилъ завиушку исключительно на низменности.

130. *Accendor alpinus* Gmel. Горная завишка.

Мензбиръ, II, 1047.

Гнѣздящаяся птица альпийскихъ луговъ. Я наблюдалъ ее въ юнѣ на Муровъ-дагѣ (въ Ганджинскихъ горахъ), въ Талышинскихъ горахъ и на Шахъ-дагѣ (южный Дагестанъ) на высотѣ обыкновенно свыше 7000'.

Альпийская завишка — очень осторожная птица и подойти къ ней на выстрѣль не легко. На Шахъ-дагѣ, гдѣ 17. VI. 96 я добылъ одинъ молодой экземпляръ, она держалась на покрытомъ очень скудною растительностью альпийскомъ лугу съ разбросанными по нему крупными кусками скалъ. Вмѣстѣ съ нею держались *Anthus spinolella* и *Oraegithus pusillus*.

131. *Accendor oocularis* Radde. Завишка Радде.

Бianки, Ежегодн. Зоолог. Муз. И. Акад. Наукъ, т. IX, стр. 142
(*Spermolegus oocularis*).

Я только разъ встрѣтилъ эту рѣдкую завишку въ бересковомъ лѣсу на склонѣ Малаго Араката на высотѣ 8800'. Здѣсь летала цѣлая стайка этихъ птичекъ, которая держалась довольно скрытно и садились на нижнія вѣтви деревьевъ. Вслѣдствіе очень трудной ходьбы по крутымъ склонамъ, покрытымъ очень скользкой травою, я могъ добыть только одну птичку, которая находится нынѣ въ Зоологическомъ Музѣѣ Имп. Академіи Наукъ въ С.-Петербургѣ.

Радде (*Ornis Caucasica*, стр. 192) описалъ эту птичку такъ, что профессору М. А. Мензбиру не оставалось дѣлать ничего другого, какъ соединить ее съ *Accendor fulvescens*. Изслѣдованіе моего экземпляра и экземпляровъ съ Демавенда хранителемъ орнитологического отдѣленія вышеупомянутаго Музея В. Л. Бianки показало, что видъ этотъ самостоятельный, но его характерные признаки, отличающіе его отъ *A. fulvescens*, были пропущены въ описаніи Радде.

Сем. 16. *Cinclidae*. Оляпковыя.132. *Cinclus cinclus caucasicus* Madarasz. Кавказская оляпка.

Бianки, Русскія оляпки, „Природа и Охота“, 1905, V, стр. 8.

Оляпка въ Закавказье встречается довольно часто на быстрыхъ горныхъ рѣчкахъ съ прозрачною водой. Осенью 1893 г.

я наблюдалъ ее въ Карабахѣ на пути изъ сел. Мигры на Араксѣ въ мѣст. Герюсы. По военно-грузинской дорогѣ я часто встрѣчалъ ее по рр. Арагвѣ и Бѣлой, а также въ Гудомакарскомъ ущельѣ.

18. VIII. 902 я добылъ одинъ молодой экземпляръ близъ сел. Гагуа Ахалцихскаго у. на быстрой рѣчкѣ среди лѣса. Довольно часто встрѣчалъ я оляпку также въ ущельѣ р. Чороха.

Сем. 17. *Troglodytidae*. Крапивниковые.

133. *Troglodytes parvulus* Koch. Крапивникъ.

Мензбиръ, II, 789.

Крапивникъ очень обыкновененъ зимою на низменности восточнаго Закавказья, но, гнѣздится ли тутъ, рѣшить мнѣ не удалось, ибо, какъ только здѣшнія заросли покроются листьями, замѣтить такихъ скрытныхъ птицъ, какъ крапивникъ и завирушка, становится чрезвычайно трудно. Однако, крапивникъ тамъ, гдѣ я наблюдалъ его гнѣздающимся, напр., подъ Москвою, любить по временамъ показываться, такъ что, вѣроятно, я замѣтилъ бы его, если бы онъ гнѣздился подъ Тифлисомъ. На низменности, въ долинѣ Куры крапивникъ встрѣчается съ сентября до марта.

Въ лѣсной полосѣ онъ гнѣздится. Лѣсничій Бртекъ показывалъ мнѣ цѣлую серию гнѣздъ этой птички, собранныхъ имъ близъ сел. Бакуріани (выше Боржома) въ маѣ 1896 г. Въ нихъ было мало яицъ (2—3), но, оттого ли, что онъ ихъ собралъ черезчуръ рано, или оттого, что разбилъ, я позабылъ его спросить. Нынѣ эти гнѣзда находятся въ Кавказскомъ Музѣѣ.

Сем. 18. *Muscicapidae*. Мухоловковые.

134. *Siphia parva* Bechst. Краснозобая мухоловка.

Мензбиръ, II, 693 (*Muscicapa*).

Въ Талышѣ я встрѣтилъ краснозобую мухоловку гнѣздающеюся отъ уровня моря (с. Бутасарь, 20. IV. 97) до верхней границы лѣсной растительности (близъ с. Лирикъ, 20. V. 97), которая проходитъ здѣсь очень низко. Вѣроятно, она гнѣздится во всемъ лѣсномъ поясе Кавказа, но мною на гнѣзовыѣ больше не встрѣчена. Зато

на пролетъ она чрезвычайно многочисленна во всей долинѣ Куры. Гнѣздится ли здесь она, я, однако, павѣрное не знаю. Однѣ разъ я нашелъ ее въ Елисаветпольскомъ у. на низменности, около селенія Саровъ еще 20. IV. 95, что, можетъ быть, указываетъ на ея гнѣздовые здѣсь, но ни въ Джеватскомъ уѣздѣ, ни въ Кубинскомъ, довольно подробно мною осмотрѣнномъ, я ея ни разу не видалъ лѣтомъ на низменности. Весною пролетъ начинается въ послѣднихъ числахъ марта или началѣ апрѣля. Въ 1895 г. 30. III появился первый, 7. IV шель валовой пролетъ и паркъ Муштаидъ былъ полонъ ими; въ 1896 г. первый — 1. IV, валовой пролетъ — 7. IV, въ 1898 г. первый — 4. IV. Въ началѣ апрѣля мнѣ всегда приходилось уѣзжать изъ Тифлиса, но вообще на низменности я ихъ не встрѣчалъ уже болѣе послѣ 20. IV. Осенний пролетъ бываетъ столь же многочисленъ, какъ и весенний. Въ Тифлисѣ первыя осення мухоловки появляются въ началѣ августа и держатся въ здѣшнихъ садахъ и окрестностяхъ города, въ тугаяхъ по р. Курѣ, до второй половины октября. Однако, единичные экземпляры остаются въ теплыхъ зимы здѣсь зимовать, на что указываютъ слѣдующія даты добытыхъ здѣсь мною экземпляровъ: 2. XI. 95, 11. XI. 95, 19. II. 95 и 1. III. 99.

Удивительно, какъ Радде не замѣтилъ этой птички на осеннемъ пролетѣ, когда она наполняетъ всѣ сады своимъ характернымъ трескучимъ позывомъ.

135. *Hedymela semitorquata* Homeyer. Кавказская мухоловка-бѣлошайка.

Мензбиръ, II, 699 (Muscicapa).

Первый разъ я встрѣтилъ эту мухоловку въ лѣсу розовыхъ акацій по дорогѣ изъ сел. Тангерудъ въ сел. Арчевань въ южной части Талышинской низменности (Астаринскіймагалъ) 22. IV. 97 и убилъ здѣсь двухъ самчиковъ. Но на низменности эта птичка не гнѣздится и позднѣе исчезаетъ отсюда. На гнѣздовѣ же я встрѣтилъ ее гораздо выше въ верхнемъ поясѣ лѣса, именно близъ селенія Лирикъ 17. V. 97, по дорогѣ изъ селенія Осакюджа. Я хорошо разсмотрѣлъ ее и узналъ ея пѣніе, хотя и не добылъ. Она держалась на громадныхъ отдалено стоящихъ букахъ.

24. IV. 98 я снова наблюдалъ ее на низменности, въ селеніи Арчевань, гдѣ она пѣла передъ занимаемымъ мною домомъ.

136. *Muscicapa striata* Pall. Сѣрая мухоловка.

Мензбиръ, II, 704 (*Muscicapa grisola*).

Я не увѣренъ, гнѣздится ли сѣрая мухоловка на низменности р. Куры, хотя и встрѣчалъ ее здѣсь довольно поздно. Такъ, 26. IV. 95 я убилъ одинъ экземпляръ въ садахъ селенія Карасахкалъ на Курѣ (Елисаветпольск. у.). Несомнѣнно уже гнѣздающеся я нашелъ эту мухоловку въ сел. Ахсу, лежащемъ еще на низменности у начала подъема къ г. Шемахѣ, гдѣ одинъ экземпляръ убить можно 16. V. 96. На низменности южной части Ленкоранскаго у. я убилъ парочку (♂ и ♀) еще 28. IV. 98 и думаю, что здѣсь она гнѣздится. Во всякомъ случаѣ, она уже въ значительномъ количествѣ гнѣздится въ предгорьяхъ Талышинскихъ горъ, совсѣмъ не высоко. Для мѣстожительства выбираетъ свѣтлый мѣста — широкія поляны въ лѣсу. Такъ, напр., я наблюдалъ 7. V. 97 нѣсколько экземпляровъ близъ сел. Руа, которые держались на выгорѣвшемъ мѣстѣ на обгорѣлыхъ кустахъ ежевики.

На осеннемъ пролетѣ въ Тифлисѣ я встрѣтилъ сѣрую мухоловку 29. VIII.

Сем. 19. Hirundinidae. Ласточкивыя.

137. *Hirundo rustica* L. Касатка.

Мензбиръ, II, 686.

Деревенская ласточка — обыкновенная гнѣздающаяся птица всего Кавказскаго края и встрѣчается повсюду кромѣ сплошныхъ лѣсовъ и большихъ высотъ.

Въ восточное Закавказье онѣ прилетаютъ въ самомъ началѣ марта. Въ 1895 г. въ с. Джеватъ прилетѣли 8. III, въ 1899 г. въ Ленкорань — 10. III. Молодыя ласточки первого вывода вылетаютъ въ срединѣ іюня, второго — въ срединѣ августа. Отлетаютъ отъ насъ касатки около середины сентября. Въ 1895 г. онѣ исчезли изъ Тифлиса уже 17. IX. Въ сентябрѣ я наблюдалъ ихъ приготовленіе къ отлету въ Гельской котловинѣ на высотѣ около 6500'. 13. IX онѣ собирались въ маленькия стайки и, повидимому, готовились улетѣть, но на другой день онѣ все еще оставались тутъ, несмотря на бывшій ночью весьма ощущительный морозецъ и густой снѣгъ. Странно было смотрѣть, какъ онѣ летали среди падающаго снѣга. Степей ласточки не избѣгаютъ, а прилетаютъ на нихъ охотиться

даже на значительное разстояніе отъ своего настоящаго мѣсто-пребыванія. За всадникомъ въ степи всегда слѣдуетъ масса мухъ, выносящихся преимущественно надъ головою лошади. Проѣзжая въ южной части Кубинскаго уѣзда въ жаркую пору дня, я часто бывалъ окруженнъ цѣлымъ роемъ ласточекъ, неустанно шнырявшихъ вокругъ меня на такомъ разстояніи, что ихъ можно было бы достать рукой, и ловившихъ взлетающихъ съ лошади мухъ. Онѣ слѣдовали такимъ образомъ за нашими лошадьми на далекое разстояніе.

138. *Chelidon urbica* L. Воронокъ.

Мензбиръ, II, 674.

Воронокъ встрѣчается несравненно рѣже касатки. Я встрѣтилъ эту ласточку гнѣздающеюся въ предгорьяхъ восточной части Кавказскаго хребта въ сел. Маразы Шемахинскаго у., около станціи военно-грузинской дороги Гудауръ, на Алазани, по тракту изъ Сигнаха въ Лагодехи, на станціи Чиаури и на черноморскомъ побережїѣ въ Кобулетахъ, гдѣ она значительно уступала въ числѣ деревенской ласточки.

Въ сел. Маразы 2. Въ городскія ласточки еще только лѣпили гнѣзда.

139. *Cotyle riparia* L. Береговой стрижъ.

Мензбиръ, II, 679.

Наблюдалъ только осенью близъ Тифлиса. Именно 11. VIII. 96 убилъ нѣсколько экземпляровъ у Соленаго озера.

Въ Кубанской области гнѣздится по обрывистымъ берегамъ рѣкъ.

Отрядъ II. Coraciiformes. Ракшеобразныя.

Сем. 20. *Picidae*. Дятловыя.

Подсем. *Junginae*.

140. *Jynx torquilla* L. Вертишайка.

Мензбиръ, II, 339.

Въ Закавказье вертишайка попадалась мнѣ довольно рѣдко. На гнѣздовья я нашелъ ее только въ Ленкоранскомъ у., гдѣ въ

вышеописанномъ ущельѣ р. Ленкоранки около сел. Руа я встрѣтилъ ее 7. V. 97 вмѣстѣ съ *Hypolais icterina* и *Muscicapa striata*.

Около Тифлиса я находилъ вертишайку только на весеннемъ (7. IV. 95) и на осеннемъ (въ началѣ сентября 1899 г.) пролетѣ въ паркѣ Муштаидѣ.

Подсем. *Picinae*.

141. *Picus martinus* L. Желна.

Мензбиръ, II, 345.

Черный дятель гнѣздится въ лѣсной полосѣ Закавказья, а зимою часто попадается на низменности. 25. V. 98 я встрѣтилъ его въ буковомъ лѣсу у сел. Тангевонъ Ленкоранскаго у., а 29. IV. 98 на низменности у сел. Машханъ, — слѣдовательно, этотъ дятель, подобно зяблику и другимъ птицамъ, въ Талышѣ гнѣздится и на низменности. Осеню и зимою я часто наблюдалъ его въ садахъ и тугаяхъ по р. Курѣ и въ тифлисскихъ садахъ. 30. VIII. 902 я добылъ одинъ экземпляръ въ сосновомъ лѣсу Гельской лѣсной дачи (Ардаганскій окр.).

142. *Dendrocopos major tenuirostris* Buturlin. Тонкоклювый пестрый дятель.

Buturlin, Ibis, 1906, p. 412.

Агачъ-даданъ (татарск., всѣ дятлы).

Очень обыкновененъ во всей лѣсной области Кавказа, но, гнѣздится ли онъ на низменности въ Закавказье, я не знаю. Я наблюдалъ его здѣсь (Тифлисъ), однако, и довольно поздно, уже въ апрѣль, при чѣмъ онъ издавалъ особый трескъ, никогда не слышанный мною въ другую пору. Зимою онъ здѣсь очень обыкновененъ. Въ большомъ числѣ онъ остается на зиму и довольно высоко въ горахъ. Такъ, 8. XI. 96 я встрѣтилъ его довольно высоко въ Шамхорскомъ ущельѣ, Елисаветп. у.; 18. IX. 902 въ значительномъ количествѣ видѣлъ и добылъ этотъ видъ въ Гельской лѣсной дачѣ.

Междуду нормальными экземплярами, убитыми мною зимою подъ Тифлисомъ, попадались и очень темно окрашенные съ нижней стороны, представляющіе по окраскѣ какъ бы переходъ къ *P. Poelzami*.

143. *Dendrocopos major* Poelzami Bogd. Дятелъ Пельцама.

Мензбиръ, II, 355 (*Picus major poelzami*).

Въ большомъ количествѣ найденъ мною на Талышинской низменности. Всѣ мои экземпляры добыты здѣсь въ разные годы въ апрѣль мѣсяцѣ, но онъ встрѣчался здѣсь и въ другое время. 1. XI. 94 я убилъ одинъ экземпляръ въ паркѣ Муштаидъ.

144. *Dendrocopos syriacus* Hempr. et Ehrenb. Сирійскій дятелъ.

Мензбиръ, II, 356 (*Picus syriacus*).

Осенью и зимою 1894 г. въ паркѣ Муштаидъ держалось очень много дятловъ; между ними я убилъ и двухъ *D. syriacus*, но позднѣе ни разу не встрѣчалъ этого дятла. Определеніе это было сдѣлано Радде. Мои экземпляры были совершенно сходны съ экземплярами Кавказскаго Музея за № 245, добытыми въ Караказахъ, нѣсколько ниже Тифлиса по Курѣ.

145. *Dendrocopos medius caucasicus* Bianchi. Кавказскій вертлявый дятелъ.

Біанки, Ежегодн. Зоолог. Музея ИМП. Акад. Наукъ, IX, р. I.

Вертлявый дятелъ обыкновенная осѣдлая птица долины Куры. Въ зиму 1894 — 95 г. ихъ было много въ Тифлисѣ въ паркѣ Муштаидъ. Мною были препарированы экземпляры, убитые: ♂ 17. XI. 94, ♂ 15. II. 95 и ♂ 21. II. 95. Этюю же зимою я добылъ его въ имѣніи А. Б. Шелковникова въ Арешскомъ уѣздѣ 2. III. 95.

29. IV. 95 я нашелъ гнѣздо этого дятла въ сел. Алпаутъ въ мѣстѣ Самухъ при сліяніи Куры съ Йорой и Алазанью. Молодые уже высовывали изъ дупла свои носы. Одного мнѣ приносили; онъ былъ уже вполнѣ оперенъ.

Въ срединѣ мая того же 1895 г. я встрѣтилъ много дятловъ этой группы въ низовьяхъ р. Тертера, 15. V у сел. Айриджа, 16. V у сел. Чилибилиръ Джеванширскаго уѣзда, но ни одного здѣсь не добылъ, почему и не могу сказать, принадлежали ли они къ этому виду или иному.

146. *Picus Danfordi* Hargitt. Кавказский малый дятель.

Мензбиръ, II, 362 (*Picus minor quadrifasciatus* Radde).

По определению проф. М. А. Мензбира, добытый мною въ Ленкоранскомъ уѣздѣ малый дятель относится къ этому малоазійскому виду. Но и тифлисскіе экземпляры не отличаются отъ ленкоранскихъ.

Встрѣчается малый дятель въ Закавказье не часто.

Вотъ даты моихъ экземпляровъ: ♂ 21. XI. 96 и ♀ 29. XI. 96, паркъ Муштаидъ, Тифлисъ; ♂ 24. IV. 97, сел. Арчевань; ♂ 27. IV. 98, сел. Бутасаръ.

Такимъ образомъ, въ Закавказье малый дятель встрѣченъ пока только по долинѣ Куры и на Талышинской низменности.

147. *Gecinus viridis* Saundersi Tacz. Зеленый дятель.

Мензбиръ, II, 374 (*Gecinus viridis*).

Обыкновенная осѣдлая птица Закавказья. Гнѣздится въ садахъ, лиственныхъ лѣсахъ и тугаяхъ всего Закавказья и Кубинского уѣзда на низменности и въ предгорьяхъ. 30. V. 96 я нашелъ въ саду сел. Дедели гнѣздо этого дятла съ дѣтьми. На Кубинской низменности я не встрѣтилъ кромѣ этого весьма обыкновенного здѣсь дятла никакого другого.

Въ лиственныхъ лѣсахъ западнаго Закавказья онъ также весьма обыкновененъ. Зимою въ долинѣ Куры я встрѣчалъ его всюду въ значительномъ количествѣ, чаще, чѣмъ другие виды дятловъ. Въ Талышѣ весьма обыкновененъ. Высоко въ горахъ никогда не встрѣченъ.

Сем. 21. *Cypselidae*. Стрижовыя.

148. *Cypselus melba* L. Бѣлобрюхій стрижъ.

Мензбиръ, II, 414.

Я встрѣтилъ бѣлобрюхаго стрижа только въ Дагестанѣ 27. VI. 96 у сел. Куркендъ Кюринского округа, гдѣ ихъ было довольно много, и въ ущельѣ Чороха близъ Артвина.

149. *Cypselus affinis* Hardw. Африканский стрижъ.

Мензбиръ, II, 414.

Этого стрижа я наблюдалъ 17. VI. 96 около сел. Лаза у подножья Шахъ-дага въ Кубинскомъ уѣздѣ (собственно, южный Дагестанъ); 26. IV. 98 на перевалѣ Барнасаръ въ Талышинскихъ горахъ, между сс. Руарутъ и Кяльвазъ, гдѣ онъ гнѣздился на скалахъ, и въ Кегартскомъ ущельѣ къ сѣверо-востоку отъ Эривани. Здѣсь мѣстные жители увѣряли меня, будто онъ не улетаетъ на зиму.

Сем. 22. Caprimulgidae. Козодоевые.

150. *Caprimulgus europaeus* L. Козодой.

Мензбиръ, II, 404.

Я встрѣчалъ козодоя нечасто, вѣроятно, вслѣдствіе его скрытного образа жизни. Нѣсколько экземпляровъ его я добылъ 2 и 3. V. 95 на низменности Елисаветпольского уѣзда и въ іюнѣ около Тифлиса на Соленомъ озерѣ, гдѣ было добыть и сомнительный козодой Радде (*Caprimulgus unwini?*).

Сем. 23. Bubonidae. Совиные.

151. *Athene noctua caucasica* Zarudn. et Loud. Сычъ кавказ-
скій.

Байгушъ (татарск.).

Этотъ маленький сычъ обыкновененъ на низменности восточнаго Закавказья и Кубинского уѣзда, но держится исключительно въ степныхъ мѣстностяхъ. Въ совершенно безлѣсной мѣстности гнѣздится въ норахъ, вырытыхъ въ обрывахъ; тамъ, гдѣ есть большія деревья, — въ дуплахъ.

7. IX. 900 я убилъ молодой экземпляръ въ Арасовѣ въ паркѣ. Проѣзжалъ послѣ заката солнца по почтовымъ трактамъ, идущимъ по степной мѣстности, напримѣръ, изъ Евлаха на ст. Барда, изъ Баку въ Кубу (нынѣ, съ проведениемъ желѣзной дороги, упраздненъ), я часто видѣлъ этихъ сычиковъ сидящими на

телеграфной проволокѣ. Порою они безшумно снимались и, схвативъ какое нибудь насѣкомое, снова возвращались на мѣсто.

152. *Bubo bubo* L. Филинъ.

Мензбиръ, II, 269 (*Bubo maximus*).

Подъ Тифлисомъ я ежегодно наблюдалъ филина зимою въ паркѣ Муштаидъ и въ разное время добылъ тамъ три экземпляра.

153. *Ephialtes scops* L. Сплошка, зорька.

Мензбиръ, II, 280 (*Scops giu*).

Зорька обыкновенна и многочисленна на низменности всего восточного Закавказья. Прилетъ зорьки легко замѣтить благодаря ея характерному крику. Въ Тифлисѣ я слышалъ ее первый разъ въ 1896 году — 6. IV, въ 1897 — 23. III, въ 1898 — I. IV и въ 1900 — 27. III, въ паркѣ Муштаидъ. Крикъ сплюшки раздается все лѣто, но всего интенсивнѣе бываетъ въ маѣ.

Сплошка встрѣчалась мнѣ главнымъ образомъ на низменностяхъ, гдѣ любить селиться въ садахъ, но встрѣчается и въ предгорьяхъ, напр., у сел. Боскалъ Шемахинскаго уѣзда, 10. V. 96.

Въ началѣ августа у Тифлиса крикъ сплюшки умолкаетъ, но, улетаетъ ли она въ это время, я не знаю.

154. *Sygnium aluco* L. Лѣсная сова.

Мензбиръ, II, 301.

Я часто слышалъ крикъ этой совы въ разныхъ мѣстахъ Закавказья отъ уровня моря до верхней границы лѣсной растительности (на горѣ Муровъ-дагъ, въ уроцищѣ Турагай 27. V. 95), но на глаза она попадалась мнѣ не часто, и я добылъ всего три экземпляра: два въ саду сел. Кечерли Джеванширскаго уѣзда 28. V. 94 и одинъ въ паркѣ Муштаидъ въ Тифлисѣ 1. XI. 94.

Зимою она бываетъ въ Тифлисѣ болѣе многочисленна.

155. *Syrnium aluco Wilkonskyi* Menzbier.

Зимою 1895 — 96 г. въ Тифлисѣ было убито два экземпляра темной разновидности лѣсной совы; одну изъ нихъ убили просто палкою на заборѣ въ самомъ городѣ.

156. *Nystea nivea* L. Полярная сова.

Мензбиръ, II, 307.

Въ зиму 1902—3 г. 2 или 3 экземпляра было добыто въ окрестностяхъ г. Петровска, Дагестанской области.

157. *Asio otus* L. Ушастая сова.

Мензбиръ, II, 318.

Я встрѣтилъ и добылъ эту сову только два раза: 15. III. 95 въ Сальянахъ и 19. IV. 95 въ сел. Сафи-Кюртъ Елисаветпольского уѣзда. Въ обоихъ мѣстахъ она держалась въ садахъ. Въ Сафи-Кюртѣ я выгналъ ее днемъ изъ густой посадки тутовыхъ деревьевъ („тахмачаръ“).

158. *Asio accipitrinus* Pall. Болотная сова.

Мензбиръ, II, 313.

На низменности восточного Закавказья обыкновенна. Одинъ экземпляръ я добылъ 23. IV. 95 въ сел. Алабашлы Елисаветпольского уѣзда.

Сем. 24. *Upupidae*. Удодовыя.

159. Урока еропс L. Удодъ.

Мензбиръ, II, 416.

Шена-пиникъ (татарск. на Араксѣ), шена-пунцу (татарск. Кубинск. у.).

Гнѣздащаяся птица всего Кавказа; на зиму нигдѣ не остается, хотя и прилетаетъ очень рано.

Удодъ болѣе всего предпочитаетъ выгоны около селений, но встрѣчается и на лужайкахъ среди лѣса, гдѣ пасется скотъ, и въ степи. Очень многочисленъ на низменности, но по удобнымъ мѣстамъ поднимается и высоко въ горы. Въ Талышинскихъ горахъ я встрѣтилъ его близъ с. Кяльвазъ, выше древесной растительности; во многихъ мѣстностяхъ Дагестана, напр., 17. VIII. 97 въ Кази-Кумухѣ; 29. VIII. 902 на окраинѣ Гельской котловины на Сигнатской кочевиѣ. Прилетаетъ въ самомъ началѣ марта, исчезаетъ уже въ августѣ.

Сем. 25. Meropidae. Щурки.

160. *Merops apiaster* L. Золотистая щурка.

Мензбиръ, II, 396.

Кызылъръ-кушъ (татарск. *птица дъвицә*).

Золотистая щурка весьма обыкновенна во всемъ Кавказскомъ краѣ. Такъ какъ въ концѣ девяностыхъ годовъ прошлаго столѣтія возникъ вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли считать щурку вредною или полезною птицей, на Кавказской шелководственной станціи, зоологическимъ отдѣленіемъ которой я завѣду, былъ собранъ обширный матеріалъ по біологии этой птицы и ея распространенію на Кавказѣ *.

Область гнѣздовья золотистой щурки обнимаетъ только низменности. Она гнѣздится въ большомъ количествѣ въ степяхъ всего Сѣвернаго Кавказа (Ставропольская губ., Терская и Кубанская области) и въ восточномъ Закавказьѣ. Въ западной же его части она гнѣздится только въ небольшомъ количествѣ.

Щурка принадлежитъ къ птицамъ, прилетающимъ къ намъ очень поздно, именно въ срединѣ апрѣля. Не замѣчено большой разницы между прилетомъ ея въ Закавказье и на Сѣверный Кавказъ. На запросы Кавказской шелководственной станціи большинство наблюдателей какъ время прилета указывало 14, 15 апрѣля.

Въ Закавказье щурка прилетаетъ небольшими стайками, въ 20—30 особей, и нѣкоторое время кочуетъ. Въ мѣстахъ ея гнѣздовья въ это время пасѣкомыхъ бываетъ еще мало, поэтому она по прилетѣ посѣщаетъ пасѣки и наносить здѣсь большой вредъ. При преслѣдованіи своей любимой добычи щурки теряютъ всякую осторожность и какъ-бы шалѣютъ. Выстрѣлы не производятъ на нихъ никакого впечатлѣнія. О количествѣ, въ какомъ онѣ появляются весною на пасѣкахъ въ Тифлисѣ, даетъ представление то, что въ теченіе двухъ недѣль на пасѣкѣ Кавказской шелководственной станціи въ паркѣ Муштаидѣ охотниками, охранявшими пасѣку, было убито болѣе 1200 экземпляровъ. Нападеніе на пчельника происходило обыкновенно слѣдующимъ образомъ. Въ пасмурный или дождливый день стайка щурокъ съ характернымъ крикомъ появлялась надъ пасѣкой и начинала ловить летающихъ пчелъ. Схвативъ пчелу, птица садилась на ближайшее дерево и

* Труды Кавказской Шелководственной Станціи, т. IX, вып. 2 (1900).

заглатывала ее, а затѣмъ снова взлетала за другою. По произведеннымъ здѣсь наблюденіямъ, каждая птица заглатывала въ теченіе трехъ минутъ пять пчелъ. Пріемы ловли были очень характерны и однообразны у всѣхъ щурокъ. Обыкновенно сидящая на деревѣ щурка, замѣтивъ летающую пчелу, взлетаетъ нѣсколько кверху, затѣмъ падаетъ внизъ, дѣлая полукругъ, схватываетъ пчелу и сей-часъ-же поднимается съ нею кверху до ближайшей вѣтки, гдѣ присаживается и, задравъ кверху голову, заглатываетъ добычу. Набивъ желудокъ, щурки остаются нѣкоторое время въ покое, послѣ чего отрыгаютъ погадку, состоящую изъ хитинныхъ частей пчелъ, и снова принимаются за ловлю. Заразъ въ желудкѣ щурокъ при вскрытии находили до 25 пчелъ. Пчелиный ядъ, очевидно, вовсе не дѣйствуетъ на нихъ, такъ какъ при вскрытии иногда находили въ пустомъ желудкѣ щурки до 20 жалъ, воткнувшихся въ его стѣнки. Въ кишкахъ никогда не бываетъ ни малѣйшаго кусочка хитина. Когда наступаетъ время высиживанія яицъ, щурки рѣдко появляются на пасѣкахъ, только тогда, когда нѣсколько дней подрядъ стоитъ дождливая погода и онѣ не находятъ себѣ пропитанія въ мѣстахъ гнѣздовья.

Въ степяхъ Сѣверного Кавказа и восточномъ Закавказьѣ щурки устраиваютъ свои гнѣзда въ длинныхъ норахъ, вырытыхъ въ глинистыхъ обрывахъ холмовъ, въ промоинахъ и берегахъ пересохшихъ рѣчекъ. Для своего мѣстопребыванія онѣ выбираютъ себѣ обыкновенно степнаго, часто пустыннаго мѣстности. Къ устройству гнѣзда на Сѣверномъ Кавказѣ пчелоды приступаютъ въ началѣ мая, въ Закавказьѣ немного раньше. Несмотря на слабость своихъ ногъ, щурки сами роютъ норы для своего гнѣзда, но, при твердомъ грунте, употребляютъ для этого очень много времени, почему и стараются занять свое прошлогоднее гнѣздо. Въ мягкомъ грунте работа оканчивается въ нѣсколько дней. Нора вырывается горизонтально и достигаетъ длины 4 и болѣе аршинъ, смотря по твердости грунта, при діаметрѣ отъ $1\frac{1}{2}$ до 2 вершковъ. Конецъ норы, т. е. помѣщеніе для гнѣзда, значительно шире прохода (около 4 вершковъ) и лежитъ ниже его. Поль гнѣздовой камеры немного разрыхляется. Вместо подстилки на концѣ такой норы обыкновенно находится слой хитинныхъ частей различныхъ насѣкомыхъ, послужившихъ пищею птицѣ.

Въ срединѣ мая въ восточномъ Закавказьѣ (Арешскій и Ленкоранскій уу.) я находилъ на такой подстилкѣ отъ 5 до 7 свѣжихъ яицъ; въ то же время находилъ яйца и В. А. Зейдлицъ въ

Ставропольской губ. Но не всѣ щурки садятся на яйца одновременно. Случалось наблюдать, что въ то время, какъ однѣ уже высиживали, другія были еще заняты рытьемъ норъ. Вѣроятно, это были не захватившія старой норы.

Гнѣзданіе щурокъ на черноморскомъ побережье предста-
вляетъ нѣкоторыя особенности, о которыхъ Н. Н. Шавровъ сооб-
щаетъ слѣдующее: „Пчелоѣды водятся во всей низменной части
Кутаисской губерніи и даже въ мѣстахъ довольно сырыхъ, но
они здѣсь не изобилуютъ такъ, какъ въ восточномъ Закавказье.
Но, во всякомъ случаѣ, они являются здѣсь коренными обитате-
лями и гнѣздятся всюду въ полосѣ своего распространенія не-
большими колоніями. мнѣ приходилось наблюдать ихъ гнѣзовья
въ Поти при условіяхъ, весьма схожихъ съ кумбашинскимъ гнѣз-
довьемъ въ Ленкоранскомъ уѣздѣ. Недалеко отъ моря — въ $\frac{1}{2}$,
или $\frac{3}{4}$ версты — ихъ гнѣзовья тянутся по лѣснымъ лужайкамъ
въ низкой ровной мѣстности, где подпочвенная вода находится
на глубинѣ $1\frac{1}{2}$ — 2 аршинъ. Для начала норокъ щурки пользу-
ются всякою неровностью мѣстности, всякимъ крохотнымъ холми-
комъ. Несмотря на песчаный рыхлый грунтъ и различныя неудоб-
ства, щурки неизмѣняютъ характера своихъ норъ: мнѣ случалось
раскапывать ихъ не разъ, и рѣдкая нора была менѣе 2 аршинъ
длиною, обыкновенно же между 2 и 3 аршинами. Въ этой лѣси-
стой и болотистой мѣстности онѣ имѣютъ, повидимому, обильную
пищу постоянно и, если нападаютъ отъ времени до времени на
пчельники, то нападенія эти и по количеству нападающихъ, и по
стрѣмительности и назойливости представляютъ лишь слабую тѣнь
того, что происходитъ, напримѣръ, въ Тифлисѣ“.

Птенцы выводятся въ началѣ іюня. Они никогда не бы-
ваютъ одинаковой величины. Обыкновенно находишь рядомъ съ
еще совершенно голымъ и почти совсѣмъ оперившагося птенца.
Когда у щурокъ дѣти, въ гнѣзовомъ ходѣ недалеко отъ гнѣзда
всегда можно найти еще живыхъ, но искалѣченныхъ кузнециковъ,
жука и т. п. Вѣроятно, эти насѣкомыя были принесены для
корма птенцамъ, но вырвались.

Молодыя вылетаютъ въ первой половинѣ іюня.

Въ хорошую погоду щурки уже рано утромъ вылетаютъ на
добычу въ степь и, пока не сѣли на яйца, совершаютъ большиѳ
перелеты. Въ мѣстахъ ихъ гнѣзовья постоянно можно встрѣ-
тить небольшія стайки щурокъ, несущихся невысоко надъ землею
колеблющимся полетомъ, то вразсыпаную, то вытянувшись въ рядъ.

Поминутно то одна, то другая изъ нихъ какъ бы ныряеть къ травѣ, схватываетъ какое нибудь насѣкомое и съ нимъ снова взвивается кверху. Вообще щурки ловятъ насѣкомыхъ, составляющихъ ихъ исключительную пищу, главнымъ образомъ на-лету, и только въ рѣдкихъ случаяхъ подбираютъ съ земли. Это бываетъ только тогда, когда сидящая на землѣ щурка замѣтить какое нибудь насѣкомое, что называется, у себя подъ носомъ, такъ какъходить, по причинѣ короткости своихъ ногъ, она не можетъ. Наѣвшись щурки летаютъ, повидимому, просто для удовольствія и при этомъ поднимаются на громадную высоту. Отдыхать онѣ присаживаются обыкновенно на кустики, столбики, даже на выступы почвы или просто на землю, но, повидимому, всему предпочитаются телеграфныя проволоки, которыя иногда бываютъ силою унизаны этими красивыми птичками. Однако, живая натура щурки не позволяетъ ей и во время отдыха оставаться неподвижною. Поминутно онѣ срываются съ мѣста, чтобы схватить какое нибудь насѣкомое, и, возвратившись на мѣсто, заглатываютъ его. Пищу ихъ помимо пчелъ составляютъ различныя крупныя насѣкомыя, главнымъ образомъ жуки и прямокрылые, почему щурка, несмотря на вредъ, причиняемый на пчельникахъ, должна считаться очень полезною птицей.

Отлетаютъ щурки изъ Закавказья въ половинѣ сентября. Одинъ наблюдатель, учитель Григорьевъ въ Касумъ-кентѣ (въ южномъ Дагестанѣ), сообщалъ, что отлетъ ихъ въ его мѣстности происходитъ въ октябрѣ, но это, очевидно, ошибочно.

На пролетѣ щурка бываетъ и на весьма возвышенныхъ мѣстахъ. Такъ, Ф. Ф. Каврайскій наблюдалъ ихъ 17. VIII. 95 въ Боржомѣ; 27. VIII. 95 близъ станціи Конорбель на оз. Хозапинъ на высотѣ 6000' въ 6 ч. утра щурки летѣли скученными стайками на западъ; въ это утро здѣсь былъ небольшой морозъ. На другой день этотъ же наблюдатель видѣлъ ихъ въ ущельѣ Куры близъ станціи Беграхатунъ (6500'). При ихъ способности къ летанію Кавказскій хребетъ, безъ сомнѣнія, не представляетъ имъ никакой преграды при перелетѣ. Вероятно, отъ этого зависитъ и то странное обстоятельство, что всѣ периодическія явленія въ жизни щурки (прилетѣ, выводѣ молодыхъ, отлетѣ) происходятъ въ одно время какъ на Сѣверномъ Кавказѣ, такъ и въ Закавказї.

По Н. Н. Шаврову, на черноморскомъ побережье щурки начинаютъ собираться въ стаи и готовиться къ отлету уже въ началѣ августа, а во второй половинѣ августа здѣсь появляются громад-

ныя стаи щурокъ, гнѣздащихся сѣвернѣе. За ними тянуть и мѣстныя, что бываетъ обыкновенно между 1 и 15 сентября.

161. *Merops persicus* Pall. Персидская щурка.

Мензбиръ, II, 401.

Распространеніе зеленої щурки на Кавказѣ ограничено узкой прибрежной полосой Каспійскаго моря. Но въ сѣверной части побережья она рѣдка и обыкновенна только въ Ленкоранскомъ уѣздѣ и около Сальянъ. Персидская щурка прилетаетъ нѣсколько позднѣе золотистой и свое гнѣздовье устраиваетъ обыкновенно на морскомъ берегу. Гнѣзда расположены, какъ и у обыкновенной щурки, небольшими колоніями. Наибольшая колонія, которую я наблюдалъ нѣсколько лѣтъ, была расположена на морскомъ берегу около станціи Кумбашы Ленкоранскаго уѣзда.

Здѣсь въ прибрежномъ пескѣ, перемѣшанномъ съ ракушей, зеленые щурки роютъ норы для своихъ гнѣздъ. Они начинаютъ рыть нору прямо съ горизонтальной поверхности и ведутъ ее внизъ подъ угломъ въ 5 — 6 градусовъ. Передъ помѣщеніемъ для гнѣзда небольшой выгибъ кверху. Это помѣщеніе въ нѣсколькихъ раскопанныхъ мною норахъ находилось на глубинѣ 1 — $\frac{1}{2}$ аршина отъ поверхности почвы, при длинѣ норы до одной сажени. 13. V. 98 около станціи Кумбашы не было еще ни одной готовой норы. Слѣдуетъ замѣтить, что норы служать только одинъ сезонъ и щуркамъ приходится здѣсь каждый годъ рыть новыя. Яйца персидской щурки я добылъ только одинъ разъ, именно 5. VI. 98. Ихъ было въ гнѣздахъ только по четыре, — слѣдовательно, кладка не была еще закончена. Они были еще совершенно свѣжи.

Сем. 26. *Alcedinidae*. Зимородковыя.

162. *Alcedo ispida* L. Зимородокъ.

Мензбиръ, II, 381.

Обыкновененъ всюду въ Закавказї, но особенно многочисленъ въ Талышѣ на низменности и на черноморскомъ побережї. Зимородокъ держится преимущественно на неглубокихъ рыбообильныхъ рѣчкахъ съ чистою прозрачною водою, но встрѣчается и на ленкоранскихъ морцахъ и оросительныхъ канавахъ.

Сем. 27. Coraciidae. Сизоворонковые.

163. *Coracias garrula* Semenowi Loud. et Tschusi. Сизоворонка.

Мензбиръ, II, 391 (*Coracias garrula*).

Одна изъ самыхъ обыкновенныхъ и замѣтныхъ итицъ Кавказа. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Закавказья, а въ особенности на Кубинской низменности она встрѣчается положительно на каждомъ шагу и подпускаетъ человѣка на нѣсколько шаговъ.

12. IV. 95 я наблюдалъ подъ Тифлисомъ прилетъ сизоворонокъ большою стаю; больше я никогда ихъ обществами не видаль. Сизоворонка любить открытыя мѣстности: степи, рѣдкіе лиственные лѣса, мелкія кустарниковые поросли и т. п.

Въ Дагестанѣ я встрѣчалъ ее довольно высоко на обнаженныхъ горахъ съ самою скучною растительностью. Гнѣздится она въ выкопываемыхъ ею самою глубокихъ норахъ въ глинистыхъ обрывахъ. Нишу сизоворонки составляютъ различныя крупные насѣкомыя, что при страшной прожорливости птицы дѣлаетъ ее чрезвычайно полезною. Въ концѣ августа сизоворонки исчезаютъ изъ Закавказья.

По Бутурлину, относится къ тому-же подвиду, который описанъ изъ Закаспійской области подъ именемъ *Coracias garrula* Semenowi.

Отрядъ III. Cuculiformes. Кукушкообразные.

Сем. 28. Cuculidae. Кукушковые.

164. *Cuculus canorus* L. Кукушка обыкновенная.

Мензбиръ, II, 330.

Попокъ, пупу, тутай (татарск.).

Кукушка — обыкновенная лѣтняя птица всего Кавказского края и въ вертикальномъ направленіи распространена отъ уровня моря до границы лѣсной растительности. Въ Талышинскихъ горахъ я встрѣтилъ ее въ садахъ, расположенныхъ въ глубокой рѣчной долинѣ между с. Руарутъ и Кяльвазъ, уже выше границы лѣса, на высотѣ свыше 6000'.

Кукушка любить болѣе открытыя мѣстности — сады, изрѣзанные полянами свѣтлые лѣса и часто держится даже на совершенно безлѣсныхъ горахъ. 1. V. 96 я слышалъ ея кукованіе на пути изъ гор. Шемахи въ сел. Мараза среди совершенно безлѣсныхъ каменистыхъ горъ. 19. V. 96 въ Шемахинскомъ же уѣздѣ по дорогѣ въ сел. Алты-агачъ я замѣтилъ кукушку, которая куковала на совершенно безлѣсномъ склонѣ горы съ кое гдѣ разбросанными маленьками кустиками. Она сидѣла на очень маленькому кустикѣ, такъ что ее было видно издалека. Въ совершенно безлѣсной же мѣстности я часто встрѣчалъ ее въ разныхъ частяхъ Дагестана, напримѣръ, въ долинѣ Самура у сел. Мурухъ 17. VI. 96.

Въ садахъ на низменности восточного Закавказья она всюду очень многочисленна, также и въ тугаяхъ на р. Курѣ.

Въ силошныхъ лиственныхъ лѣсахъ я встрѣтилъ ее въ Талышѣ на низменности и въ предгорьяхъ, и въ нагорной части Кубинского уѣзда, но въ крупныхъ хвойныхъ высокогорныхъ лѣсахъ мнѣ ее встрѣчать не случалось.

Кукушка прилетаетъ въ Закавказье въ началѣ апрѣля. Самое раннее наблюденіе — 5. IV. 96 Муштаидъ (Тифлисъ). Въ началѣ мая бываетъ самый разгаръ брачной жизни кукушки. 4. V. 99 въ лѣсной дачѣ Варвара на р. Курѣ (Елизаветпольскій уѣздъ) онѣ куковали по нѣсколько штукъ заразъ. Когда происходитъ отлетъ этой птицы изъ Закавказья, не знаю, но убилъ одну еще 7. IX. 900 въ Арагацѣ въ паркѣ (у подножья Араката).

Отрядъ IV. Columbiformes. Голубинообразныя.

Сем. 29. Peristeridae. Горлицевые.

165. *Peristera turtur* L. Горлинка.

Мензбіръ, II, 569 (*Turtur auritus*).

Курѣ-курѣ (татарск., по Шелковникову, Арешск. у.).

Горлинка одна изъ самыхъ обыкновенныхъ гнѣздащихся птицъ всего Закавказья и Кубинского уѣзда. Держится она главнымъ образомъ на низменности и въ предгорьяхъ. Помимо восточ-

наго Закавказья и низменности Кубинского уезда, где она была особенно многочисленна, я встрѣтилъ ее также въ большомъ количествѣ на Эриванской равнинѣ и черноморскомъ побережье.

Въ Закавказье горлинка прилетаетъ уже сравнительно поздно — во второй половинѣ апрѣля. Въ 1897 г. на Талышинской низменности я замѣтилъ ее первый разъ только 22. IV (у сел. Арчевань).

На безлѣсной низменности восточного Закавказья горлинка устраиваетъ свое гнѣздо по большей части въ большомъ кустѣ держи-дерева (*Paliurus australis*). Экскурсируя 16. V. 94 съ А. Б. Шелковниковымъ въ Арешскомъ у., мы нашли нѣсколько такихъ гнѣздъ съ яйцами. Каждое изъ нихъ было расположено на одной горизонтальной вѣточкѣ, сдѣлано очень грубо изъ палочекъ и вѣточекъ и представляло только одинъ лотокъ, притомъ столь рѣдкій, что яйца можно было видѣть и снизу. Послѣднихъ бываетъ только два. Г. Шелковниковъ обратилъ вниманіе на тотъ фактъ, что ущелье это было совершенно безводно и до ближайшей рѣчки было не менѣе пяти верстъ. Я часто находилъ горлинокъ и въ другихъ мѣстахъ, очевидно, на гнѣздахъ, но также въ совершенно безводной мѣстности, напр., на Эриванской равнинѣ.

Отлетъ горлинокъ мною не наблюдался.

166. *Peristera* sp. ?

Какая то горлинка, отличная отъ обыкновенной, была мною убита 27. IV. 97 у Гудаура, когда тамъ еще лежалъ снѣгъ и стояла отвратительная холодная погода. Къ сожалѣнію, она, по недоразумѣнію, была отдана на кухню и оцищана раньше, чѣмъ я успѣлъ ее подробно разсмотрѣть.

Сем. 30. *Columbidae*. Голубиные.

167. *Columba livia* L. Сизый голубь.

Мензбиръ, I, 557.

Сизый голубь спорадично распространенъ по всему Кавказскому краю. Я находилъ его и на низменности (Тертеръ, 30. V. 95; низменность Елисаветпольск. уезда, 24. IV. 95), но гораздо чаще въ горахъ: по военно-грузинской дорогѣ, на восточной оконечности

Большого Кавказа, между с. Алты-агачъ и ст. Кизиль-Бурунъ; во многихъ мѣстахъ Дагестана; на перевалѣ между Петровскомъ и станціей Атлы-буюнъ; въ Орговскомъ ущельѣ на сѣверномъ склонѣ Агри-дага (24. IX. 900); въ Гёльской котловинѣ (30. VIII, с. Окамъ) и проч.

Сколько я знаю, сизый голубь живеть въ Закавказье осѣдло. Гнѣздится онъ на скалахъ. Въ большомъ количествѣ гнѣздится онъ въ Кульпахъ, въ заброшенныхъ штолняхъ Соляной горы.

168. *Columba palumbus* L. Витютень.

Мензбиръ, I, 587.

Осѣдлая птица восточного Закавказья. Гнѣздающимся я нашелъ его здѣсь во многихъ мѣстахъ низменности и предгорій: сѣверная, лѣсная половина Кубинскаго уѣзда; Алты-агачъ, Шемахинскаго у.; Талышъ. Зимою на нижнемъ теченіи Куры между Джеватомъ и Сальянами я встрѣчалъ громадныя стаи витютней. Въ это время они встречаются иногда въ компаніи съ *Columba livia* и *C. oenas*.

169. *Columba oenas* L. Клинтухъ.

Мензбиръ, I, 582.

На гнѣздовѣ я встрѣтилъ клинтуха въ маѣ только въ лѣсахъ долины Куры и Кубинской низменности. Зимою встречается въ стаяхъ вмѣстѣ съ витютнемъ, но всегда въ гораздо меньшемъ количествѣ.

Сем. 31. *Pterocletidae*. Рябковыя.

170. *Pterocles arenarius* Pall.

Мензбиръ, I, 650.

Туртушка (у мѣстныхъ русскихъ).

Маленькую стайку этихъ рябковъ я встрѣтилъ въ августѣ 1893 г. на Эриванской равнинѣ, а въ началѣ октября 1900 г. убилъ одного близъ сел. Дигоръ на Карскомъ плато.

По словамъ А. Б. Шелковникова, этотъ рябокъ нерѣдокъ въ Арепскомъ у. въ половинѣ марта на весеннемъ пролетѣ (куда?). Тогда онъ попадается здѣсь стайками въ 5—6 особей на безводной полынной степи, разстилающейся подъ хребтомъ Арганъ-дагъ.

Отрядъ V. Lariformes. Чайкообразныя.

Сем. 32. Laridae. Чайковыя.

171. *Larus cachinans* Pall.

Мензбиръ, I, 125.

Чуть ли не самая обыкновенная чайка побережья морей Каспийского и Черного.

30. IV. 97 я осматривалъ громадную колонію чаекъ на съверо-западномъ берегу острова Сари. Въ этомъ мѣстѣ берегъ постепенно повышается. Гнѣзда находились на песчаномъ берегу, покрытомъ скудною травянистою растительностью, на той его полосѣ, где почти оканчивается пологій спускъ къ морю и начинается кустарниковая растительность. Они представляли плоскій лоточекъ изъ грубой сухой травы и помѣщались прямо на землѣ, а не въ ямочкахъ, какъ обѣ этомъ пишутъ въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ. Лицъ было отъ 1 до 3, чаще всего 2, рѣже всего 3. Большая часть яицъ была сильно насижена, только немногія — еще слабо. Тамъ, где было по три яйца, они все были очень сильно насижены, уже съ вполнѣ сформировавшимися птенцами, и представляли, вѣроятно, первую, нормальную кладку. Гнѣзда же съ меньшимъ числомъ яицъ, значительно менѣе насиженныхъ, представляли вторую кладку, такъ какъ жители рыболовныхъ ватагъ острова и Ленкорани весною собираютъ ихъ яйца цѣлыми лодками.

172. *Larus canus* L.

Мензбиръ, I, 136.

Въ большомъ количествѣ я наблюдалъ и стрѣлялъ эту чайку въ дельтѣ Волги, въ сентябрѣ 1887 г. Она держалась здѣсь стаями на взморье.

На Кавказѣ я наблюдалъ ее по каспійскому побережью, но не часто.

Larus gelastes Licht. Морской голубокъ.

Мензбиръ, I, 143.

Я наблюдалъ эту чайку въ апрѣль 1891 г. на островѣ Свя-

томъ изъ группы острововъ Кулалы, гдѣ она, повидимому, гнѣздилась.

На кавказскомъ побережье мнѣ она не попадалась.

173. *Chroicocephalus ichtyaëtos* Pall. Черноголовый мартынъ.

Мензбиръ, I, 147.

Черноголовый мартынъ (у каспийскихъ рыбаковъ).

Въ настоящее время эта чайка не гнѣздится больше на островѣ Сари, но большое гнѣзловье ея находится на расположенныхъ близъ сѣверной оконечности этого острова мелкихъ островахъ Буранки. Держится преимущественно въ открытомъ морѣ и по его островамъ, а у береговъ перепейка встрѣчается очень рѣдко. 10. VI. 98 я встрѣтилъ этихъ чаекъ въ морѣ близъ Апперонского полуострова.

174. *Chroicocephalus ridibundus* L.

Мензбиръ, I, 152.

18. III. 99 я встрѣтилъ этотъ видъ въ обществѣ другихъ укаладагинской ватаги, расположенной на протокѣ изъ озера Каладагна (въ южной части Ленкоранскаго уѣзда) въ морѣ.

175. *Chroicocephalus minimus* Pall.

Мензбиръ, I, 158.

Я нерѣдко встрѣчаль и убивалъ этихъ чаекъ лѣтомъ въ разныхъ пунктахъ каспийскаго побережья.

176. *Hydrochelidon hybrida* Pall.

Мензбиръ, I, 166.

Въ изобилии гнѣздится по болотамъ вдоль р. Куры. 7. VI. 95 я добылъ нѣсколько экземпляровъ на Курѣ близъ сел. Лямберанъ.

177. *Hydrochelidon leucoptera* Sch.

Мензбиръ, I, 169.

Я наблюдалъ эту крачку только весною. 10. II. 95 я добылъ парочку (δ и φ) подъ Тифлисомъ. Въ апрѣлѣ одна птица этого вида была убита близъ ст. Евлахъ.

178. *Hydrochelidon nigra* L.

Мензбиръ, I, 172.

Около Тифлиса попадалась мнѣ только осенью. Экземпляръ ея я здѣсь не добылъ, но думаю, что не ошибся въ определеніи.

Проѣзжая по разливу р. Аракса между Сальянами и Пришибомъ (Ленкоранскій уѣздъ) 11. VI. 97, я видѣлъ этихъ крачекъ, носившихъ траву для гнѣздъ. Такое позднее гнѣздованье я объяснилъ себѣ тѣмъ, что первыя кладки погибли у нихъ отъ наводненія. Но то же самое я наблюдалъ здѣсь и въ слѣдующемъ, 1898 году 6. VI.

179. *Sterna anglica* Mont.

Мензбиръ, I, 179.

Эта чайка, столь многочисленная на островахъ сѣверной части Каспійского моря, на кавказскомъ побережье попадалась мнѣ не часто. Я наблюдалъ и добылъ ее вмѣстѣ съ другими видами у каладагнинской рыболовной ватаги 18. III. 99.

28. VI. 97 я добылъ одинъ экземпляръ на озерѣ Ахъ-Зыбиръ Кубинскаго уѣзда близъ сел. Сарванъ, а 10. VII того-же года на томъ-же озерѣ близъ сел. Кутчи *.

180. *Sterna cantiaca* Gmel.

Мензбиръ, I, 192.

Одна изъ обыкновеннѣйшихъ чаекъ каспійскаго побережья.

181. *Sterna caspia* Pall. Каспійская чайка.

Мензбиръ, I, 195.

О каспійской чайкѣ нужно повторить сказанное о предыдущей. На Каспійскомъ морѣ мѣстами, особенно около рыболовныхъ ватагъ, чайки встречаются въ громадномъ количествѣ и не только подпускаютъ на выстрѣлъ, но первое время не обнаруживаютъ никакого страха. Если сбитая первымъ выстрѣломъ чайка только ранена и кричитъ, другія чайки собираются надъ нею въ не-

* Какъ произносятъ на мѣстѣ, или „Күщп“, какъ называется это селеніе на картахъ.

смѣтномъ количествѣ и позволяютъ стрѣлять себя на выборъ. Около упомянутой уже мною ватаги на протокѣ изъ оз. Каладагна въ море 18. III. 99 я, не сходя съ мѣста, убилъ по крайней мѣрѣ семь видовъ *Larus* и *Sterna*, но ни препарировать, ни опредѣлить ихъ всѣхъ на мѣстѣ, къ сожалѣнію, не могъ.

182. *Sterna hirundo* L.

Мензбиръ, I, 182.

Очень обыкновенная гнѣздащаяся птица кавказскаго побережья и рѣчныхъ долинъ восточнаго Закавказья.

Я встрѣтилъ ее на озерѣ Гокчѣ, на оз. Ахъ-Зыбирь Кубинскаго уѣзда (28. VI и 10. VII. 97), 19. VI. '94 на среднемъ течении Аракса у впаденія р. Бергушетъ.

183. *Sterna minuta* L.

Мензбиръ, I, 198.

Добыта мною 10. VII. 97 въ нѣсколькихъ экземплярахъ на оз. Ахъ-Зыбирь близъ сел. Нижній Кутчи Кубинскаго уѣзда.

Отрядъ VI. Charadriiformes. Куликообразныя.

Сем. 33. Oedicnemidae. Авдотковыя.

184. *Oedicnemus scolopax* L. Авдотка.

Мензбиръ, I, 403 (*Oed. crepitans*).

Чобанъ-алладанъ (т. е. „пастуха обманывающая“, татарск.).

Авдотка — обыкновенная гнѣздащаяся птица пустынныхъ степей восточнаго Закавказья, Кубинскаго уѣзда и другихъ частей каспійскаго побережья. Здѣсь чаше всего я встрѣчалъ ее по морскому берегу и солончакамъ, но она держится также и въ мѣстностяхъ со сравнительно густою травою и мелкими кустарниками зарослями, напримѣръ, на пути со станціи желѣзной дороги Евлахъ на станцію Барда (по шушинскому тракту). Но въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ я не встрѣтилъ ея на плодородной низменности,

тогда какъ на пустынномъ плоскомъ Бозъ-дагѣ она была обыкновенна.

Характерный свистъ авдотки слышится уже съ конца марта. Самое раннее наблюденіе — 22. III. 95 у с. Бульдугъ Джеватского уѣзда. Въ это время она попадалась мнѣ и въ молодыхъ веходахъ пшеницы, такъ какъ степь была совершенно еще гола. Я встрѣчалъ авдотку обыкновенно подъ вечеръ, но вовсе не рѣдкость встрѣтить ее и днемъ. Завида человѣка, она только немножко отбѣгаетъ въ сторону, а затѣмъ останавливается и, завернувъ голову, съ любопытствомъ осматриваетъ его. Неопытному человѣку кажется, что ее можно легко поймать, такъ какъ при преслѣдованіи она никогда сразу не бѣжитъ далеко, а подпускаетъ на самое близкое разстояніе, затѣмъ необыкновенно быстро отбѣгаетъ на небольшое разстояніе, снова останавливается и т. д. Отсюда и произошло ея татарское название „обманывающая пастуха“. Въ пустынныхъ степяхъ по Курѣ и на каспийскомъ побережїи я часто наблюдалъ охоту авдотокъ еще до захода солнца. Молодыя днемъ встрѣчаются чаше старыхъ. 7. IV. 95 я встрѣтилъ на разстояніи одной версты нѣсколько молодыхъ авдотокъ около сел. Лямберанъ въ пустынной степи по Курѣ. Онѣ не могли еще летать, но бѣгали очень быстро. На одну изъ нихъ налетѣлъ большой камышовый лунь, но она перевернулась на спину и такъ на него закричала, что онъ поспѣшилъ улетѣть.

У одной авдотки, убитой на берегу моря 7. VI. 96 близъ сел. Кѣланы Кубинскаго уѣзда, въ желудкѣ оказались остатки рака (*Astacus*).

Сем. 34. Glareolidae. Тиркушковыя.

185. *Glareola pratincola* L. Луговая тиркушка.

Мензбиръ, I, 344.

Я встрѣтилъ тиркушку: въ Ставронольской губ. 7. V. 99 около сел. Дербетовки въ степи по Калаусу; въ Кубинскомъ уѣздѣ около озера Ахъ-Зыбиръ въ іюнѣ и іюль 1897 г. и въ Карайазской степи въ Закавказье 23. VII. 94. Въ іюль стайки ихъ состояли и изъ старыхъ, и изъ молодыхъ. Держались они по заброшеннымъ сухимъ чалтыкамъ и пустыннымъ степямъ. 26. VI. 96 въ южной части Кубинскаго уѣзда на пути изъ сел. Кутчи

въ с. Кёланы я нашелъ на землѣ, безъ всякаго гнѣзда, два яйца, повидимому, этого вида, но, къ сожалѣнію, потерялъ ихъ дорогою.

186. *Glareola melanoptera* Nordm. Степная тиркушка.

Мензбиръ, I, 344.

27. VI. 97 близъ сел. Сарванъ на берегу оз. Ахъ-Зыбиръ въ Кубинскомъ уѣздѣ я убилъ въ стайкѣ луговыхъ тиркушекъ одинъ экземпляръ этого вида.

Сем. 35. *Cursoriidae*. Бѣгунковыя.

Cursorius gallicus Gmel. Бѣгунокъ.

Ни одинъ изъ изслѣдователей послѣдняго времени послѣ Нордманна (т. е. ст. 1838 г.) не наблюдалъ бѣгунка въ Закавказье. Я думаю, что, если онъ и водился здѣсь прежде, то теперь совершенно перевелся.

Сем. 36. *Charadriidae*. Ржанковыя.

Подсем. *Tringinae*.

187. *Scolopax rusticola* L. Вальдшнепъ.

Мензбиръ, I, 205.

Въ небольшомъ количествѣ гнѣздится въ лѣсахъ около сел. Бакуріани на сѣверномъ склонѣ хребта Цихисъ-Джвари. Я встрѣчалъ вальдшнепа главнымъ образомъ на осеннемъ пролетѣ и зимою около Тифлиса въ садахъ пѣмѣцкой колоніи Александр-дорфъ и въ Горийскомъ уѣздѣ. Какъ кажется, на черноморскомъ побережїѣ онъ зимуетъ въ большемъ количествѣ. 19. X. 906 вальдшнепъ былъ убитъ въ ущельѣ Чороха близъ сел. Марадиди.

188. *Gallinago major* L. Дучель.

Мензбиръ, I, 212 (Scolopax).

На Сѣверномъ Кавказѣ въ Ставропольской губ. я убилъ дупеля у сел. Предтеча 6. V. 99. Въ Закавказье онъ встрѣчался

мнѣ только на весеннемъ пролетѣ. Въ срединѣ марта 1899 г. я встрѣчалъ около Ленкорани большія высыпки дупелей, которыхъ мѣстные охотники безжалостно истребляли, убивая иногда часа въ два — три 30 — 40 штукъ. На пролетѣ дупель встрѣчается и на Гудаурѣ, — слѣдовательно, летитъ прямо черезъ Кавказскій хребеть.

189. *Gallinago gallinago* L. Бекасъ.

Мензбиръ, I, 217 (Scolopax).

16. IV. 900 у Соленаго озера близъ Тифлиса я наблюдалъ блѣщааго бекаса и убилъ его. За исключениемъ этого случая, я никогда не наблюдалъ его позднею весною и лѣтомъ. Онъ, несомнѣнно, во множествѣ зимуетъ во всемъ Закавказьѣ и держится зимою главнымъ образомъ на чалтыкахъ (рисовыхъ плантаціяхъ), представляющихъ искусственныя болота. Осеню я встрѣчалъ его единичными экземплярами подъ Тифлисомъ, въ громадномъ количествѣ въ августѣ и сентябрѣ 1902 г. въ Гельской котловинѣ и въ марта 1895 г. на Мугани близъ Сальянъ.

190. *Limnocryptes gallinula* L. Горншнепъ.

Мензбиръ, I, 225 (Scolopax).

Горншнепъ попадался мнѣ въ небольшомъ количествѣ раннею весною въ Ленкоранскомъ уѣздѣ. 6. III. 99 около сел. Андreeевки этого уѣзда, при переѣздѣ черезъ болото, горншнепъ сѣлъ около самаго моего экипажа, такъ что ямщикъ стегнулъ его кнутомъ, но, къ счастію, не попалъ.

191. *Tringa minuta* Leisl. Песочникъ.

Мензбиръ, I, 234.

Песочникъ встрѣчался мнѣ зимою на Соленыхъ озерахъ около Тифлиса.

192. *Tringa alpina* L. Чернозобикъ.

Мензбиръ, I, 247.

27. VIII. 95 я убилъ одинъ экземпляръ чернозобика на Соленомъ озерѣ у Тифлиса.

193. *Tringa subarquata* Guld. Краснозобикъ.

Мензбиръ, I, 255.

15. V. 99 на соленой лужѣ близъ Ачикулакской ставки (Ставропольской губ.) я убилъ однимъ выстрѣломъ изъ стайки этихъ куликовъ трехъ самцовъ.

Около Тифлиса онъ часто попадался мнѣ осенью и зимою на Соленомъ озерѣ. Экземпляръ коллекціи здѣсь добытъ 3. IX. 95.

Подсем. *Totaninae*.194. *Pavoncella pugnax* L. Турухтанъ.Мензбиръ, I, 275 (*Totanus pugnax*).

Я встрѣчалъ турухтана зимою близъ Тифлиса на Соленыхъ озерахъ и около Ленкорани.

195. *Astitis hypoleucus* L. Перевозчикъ.Мензбиръ, I, 282 (*Totanus hypoleucus*).

Перевозчикъ очень обыкновененъ по всѣмъ рѣкамъ Кавказскаго края. Я встрѣчалъ его и въ разныхъ мѣстахъ Сѣвернаго Кавказа и всюду въ Закавказїѣ, какъ восточномъ, такъ и западномъ. По рѣчкамъ онъ поднимается и довольно высоко въ горы. Я встрѣчалъ его все лѣто 1906 г. около Кобулетъ на черноморскомъ побережье у устья р. Кинтришъ, гдѣ онъ, несомнѣнно, гнѣздится, ибо осенью эти кулички летали здѣсь уже выводками. Въ восточномъ Закавказїѣ я нашелъ его гнѣздящимся по Курѣ и Араксу (близъ Мендживанскаго поста 19. VI. 94), а также на многихъ мелкихъ рѣчкахъ.

196. ? *Totanus ochropus* L. Чернышъ.

Мензбиръ, I, 291.

Повидимому, этотъ видъ я наблюдалъ 29. VIII. 900 въ Мисханскомъ ущельѣ (Эриванской губ.). Болѣе онъ мнѣ не попадался.

197. *Totanus glareola* L. Фифи.

Мензбиръ, I, 295.

Фифи обыкновененъ въ Закавказїѣ, гдѣ встрѣчается по рѣчкамъ, болотамъ, ручейкамъ и мочежинамъ отъ уровня моря до альпийской области. Въ іюнѣ 1900 г. я встрѣтилъ его на Бусарчиль-

скомъ перевалъ на болотъ, дающемъ съ сѣверной стороны ручейки въ бассейнъ Терека, а съ южной — въ бассейнъ Арагвы.

198. *Totanus glottis* L.

Мензбиръ, I, 301.

12. XI. 96 я наблюдалъ этого кулика на отмели р. Куры у сел. Карасахкаль, но добыть его мнѣ не удалось.

199. *Totanus colidris* L. Красноножка.

Мензбиръ, I, 306.

Нерѣдка въ восточномъ Закавказье, особенно въ прикаспийской полосѣ по соленымъ озерамъ. Вѣроятно, зимуетъ здѣсь, ибо 9. III. 95 я добылъ одинъ экземпляръ около Сальянъ.

200. *Numenius arquatus* L. Большой кроншнепъ.

Мензбиръ, I, 321.

7. III. 99 я наблюдалъ большую стаю кроншнеповъ между Сальянами и Ленкоранью.

30. VII. 906 видѣлъ стайку въ восемь особей на берегу Чернаго моря около устья р. Кинтришъ.

Подсем. *Phalaropodinae*.

201. *Phalaropus hyperboreus* L. Круглоносый плавунчикъ.

Мензбиръ, I, 313.

Я наблюдалъ плавунчика только въ Ленкоранскомъ уѣздѣ, гдѣ онъ бываетъ зимою.

Подсем. *Himantopodinae*.

202. *Recurvirostra avocetta* Briss. Шилоклювка.

Мензбиръ, I, 337 (*Himantopus avocetta*).

Я нашелъ шилоклювку гнѣздающеюся на болотахъ по среднему теченію р. Куры, на озерѣ Ахъ-Зыбирь въ южной части Кубинскаго уѣзда и по соленымъ лужамъ Ставропольской губ. близъ ставки Ачикулакъ.

203. *Himantopus himantopus* L. Ходуличникъ.

Мензбиръ, I, 340 (*H. melanopterus*).

Ходуличникъ гнѣздится почти въ тѣхъ же самыхъ мѣстахъ, гдѣ и шилоклювка; я встрѣчалъ его въ камышовыхъ заросляхъ по болотамъ вдоль средняго теченія Куры и на озерѣ Ахъ-Зыбирь.

Подсем. *Charadriinae*.

204. *Vanellus vanellus* L. Чпбисъ.

Мензбиръ, I, 365 (*V. cristatus*).

Обыкновенная гнѣздящаяся птица низменности восточнаго Закавказья и Кубинскаго уѣзда. Кроме того я встрѣчалъ его также во множествѣ на Эриванской равнинѣ, по маленькимъ рѣчкамъ, какъ Тандурекъ-чай, въ южной части Эриванской губ. и въ Гельской котловинѣ. Въ восточномъ Закавказье зимуетъ на низменности, гдѣ особенно охотно держится по чалтыкамъ.

205. *Eudromias cantianus* Lath. Морской зуекъ.

Мензбиръ, I, 373 (*Charadrius cantianus*).

Я встрѣчалъ морского зуїка довольно часто на берегу Каспійскаго моря. Мои экземпляры были добыты мною въ Кубинскомъ уѣздѣ между селеніями Нижн. Кутчи и Кёланы. Они кормятся на линіи прибоя. Бѣгаютъ такъ быстро, что подстрѣленныхъ нельзя догнать пѣшему.

206. *Eudromias asiaticus* Pall. Каспійскій зуекъ.

Мензбиръ, I, 374 (*Charadrius asiaticus*).

Каспійскаго зуїка я часто встрѣчалъ и убивалъ на берегу моря въ Ленкоранскомъ уѣздѣ.

207. *Eudromias Geoffroyi* Wagl. Толстоклювый зуекъ.

Мензбиръ, I, 376 (*Charadrius geoffroyi*).

29. V. 97 я убилъ самку этого вида на берегу Каспійскаго моря противъ сел. Шахъ-Агачъ Ленкоранскаго уѣзда. Больше я его не встрѣчалъ.

208. *Eudromias morinellus* L. Глупая сивка.Мензбиръ, I, 385 (*Charadrius morinellus*).

Я встрѣчалъ этотъ видъ только на весеннемъ пролетѣ, въ марта, на среднемъ теченіи Куры, но ни одного изъ убитыхъ препарировать не пришлось. Экземпляръ 431, 1 каталога Радде съ датою „29. III. 94“ и помѣченный имъ: „Unt. Kura.....Sat.“, добытъ не мною, а А. Б. Шелковниковымъ, и не на нижней Курѣ, а въ Арешскомъ уѣздѣ.

209. *Aegialites curonicus* Bes. Малый зуекъ.Мензбиръ, I, 378 (*Charadrius minor*).

На гнѣздахъ я встрѣтилъ малаго зуйка по р. Курѣ, въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ, 28. IV. 95 я убилъ парочку (♂ и ♀) въ мѣстѣ Самухъ, и въ Ленкоранскомъ уѣздѣ. Можетъ быть, онъ гнѣздится и на Соленомъ озерѣ около Тифлиса, такъ какъ одинъ экземпляръ былъ убитъ здѣсь мною 16. IV. 900. Лѣтомъ 1906 г. я наблюдалъ его гнѣздащимся въ устьѣ рр. Дегва, Кинтришъ и Ачкуа, которыя, сливаясь вмѣстѣ, образуютъ нѣсколько мелкихъ островковъ.

210. *Aegialites hiaticula* L. Зуекъ - галстушникъ.Мензбиръ, I, 381 (*Charadrius hiaticula*).

Я встрѣчалъ галстушника только осенью близъ Тифлиса на Соленомъ озерѣ, гдѣ эта птичка держалась небольшими стайками. Экземпляры моей коллекціи были добыты 3. IX. 95. У мѣстныхъ препараторовъ я видѣлъ экземпляры этого зуйка, добытые здѣсь же и въ апрѣль, почему я думаю, что, можетъ быть, онъ здѣсь и гнѣздится.

Отрядъ VII. *Gruiformes*. Журавлеобразныя.Сем. 37. *Otidae*. Дрофовыя.211. *Otis tarda* L. Дрофа.

Мензбиръ, I, 441.

Дойдахъ (татарск.).

Въ Закавказье бываетъ только зимою. Въ февраль 1898 года

я нашелъ растерзанную какимъ то хищникомъ дрофу около Соленаго озера близъ Тифлиса.

По наблюденіямъ А. Б. Шелковникова, дрофа зимуетъ въ Арешскомъ уѣздѣ въ полынныхъ степяхъ. Въ теплыхъ зимахъ появляется здѣсь лишь въ небольшомъ числѣ.

212. *Otis tetrax* L. Стрепетъ.

Мензбиръ, I, 434.

Бѣзгекъ (татарск.).

Я нашелъ стрепета гнѣздащимся въ значительномъ количествѣ въ степяхъ Елисаветпольского, Джеванширского и Шушинского уу. Елисаветпольской губ. и въ степи около сел. Кумторкале, близъ гор. Петровска на каспійскомъ побережїи. 24. IV. 95 я убилъ близъ сел. Кадели Елисаветпольского уѣзда въ травянистой степи самца въ прекрасномъ брачномъ нарядѣ и еще 7. VI. 95 видѣлъ около сел. Лямберанъ въ такомъ же нарядѣ. Зимою стрепетъ появляется въ Закавказье громадными стаями, и, чѣмъ холоднѣе зима, тѣмъ въ большемъ количествѣ. Заимствую изъ любезно предоставленныхъ мнѣ записокъ А. Б. Шелковникова слѣдующія относящіяся къ Арешскому уѣзду Елисаветпольской губ. наблюденія. „Зимуютъ у насъ въ громадномъ количествѣ. Держатся исключительно въ полынной степи подъ горами Арчанъ-дагъ, гдѣ кормятся сѣменами полыни, такъ что мясо ихъ получаетъ сильный запахъ этого растенія. Иногда среди зимы наблюдается перекочевка громадныхъ стаи стрепетовъ вдоль подножья Арчанъ-дага. Такъ, 20 и 21. I. 94 съ утра до вечера низко надъ землею съ востока на западъ одна за другою летѣли стаи стрепетовъ. Рѣзкихъ перемѣнъ температуры въ эти дни не было. Въ теплыхъ безспѣжныхъ зимахъ прилетѣтъ крайне ограниченъ или его совсѣмъ нѣтъ. На лѣто остаются лишь отдѣльныя пары“.

Я встрѣчалъ стрепетовъ еще стаями въ концѣ марта.

Сем. 38. *Gruidae*. Журавлины.

213. *Grus cinerea* Bechst. Журавль.

Мензбиръ, I, 416.

Дурна (татарск.).

Въ восточномъ Закавказье журавль бываетъ только весною и осенью на пролетѣ. Около Тифлиса я наблюдалъ весенній про-

летъ въ началѣ марта. 2. III. 900 въ окрестностяхъ Тифлиса я наблюдалъ громадную стаю журавлей, въ которой, по приблизительному подсчету, было не менѣе 200 особей, такъ какъ въ меньшемъ крылѣ — они летѣли неправильнымъ треугольникомъ — было 80 особей, а оно было чуть не вдвое короче другого. Крылья были, однако, неправильны и составляющіе ихъ журавли то опережали, то догоняли другъ друга, такъ что вся линія волнобразно извивалась. Потомъ всѣ сбились въ одну кучу и стали кружиться надъ Соленымъ озеромъ, куда, кажется, въ концѣ концовъ и опустились. Въ Арешскомъ уѣздѣ г. Шелковниковъ наблюдалъ ихъ весенній пролетъ ранній 3. III. 94, поздній — 22. IV. 95.

Въ западномъ Закавказѣ журавль гнѣздится въ громадномъ количествѣ на Закавказскомъ плоскогорье, особенно же въ Гѣльской котловинѣ, въ области истоковъ р. Куры. Здѣсь журавли держатся все лѣто и выводятъ дѣтей на неприступныхъ болотахъ, покрывающихъ эту котловину. Во время моего пребыванія здѣсь въ сентябрѣ 1902 г. они держались по большей части большими стадами до 100 и болѣе особей, но нѣкоторые держались еще и отдельными парами. Я уѣхалъ оттуда 23. IX., но журавли еще не улетали, хотя уже 14. IX. разразилась сильная снѣжная мятель при нѣсколькихъ градусахъ холода и снѣгъ лежалъ нѣсколько дней. Журавли только собирались въ еще большія стаи и летали кругами высоко въ воздухѣ:ѣроятно, они приготовлялись къ отлету.

Въ Тифлисѣ осенний пролетъ я наблюдалъ въ началѣ сентября въ 1898 г. (3 и 5. IX.), Шелковниковъ въ Арешскомъ уѣздѣ — 17, 20 и 21. VIII. 94. Въ 1900 г. въ Кульпахъ я замѣтилъ пролетные стаи журавлей 1 и 2. IX.

214. *Grus leucogeranus* Pall. Стерхъ.

Мензбиръ, I, 422.

Въ коллекціяхъ нѣкоторыхъ любителей я видѣлъ чучела стерха. Эти птицы были убиты гдѣ то на каспійскомъ побережїѣ къ югу отъ Апшеронского полуострова.

215. *Grus spec.?* (an *leucachen* Temm.?) Черный журавль.

Старожилъ г. Ленкорани баронъ Б. Л. Тизенгаузенъ сообщилъ мнѣ объ этомъ загадочномъ журавлѣ слѣдующее:

„16 марта 1876 года въ Астаринскомъ магалѣ (южная часть Ленкоранского уѣзда) въ мѣстности Ніабутъ Асланъ (мой

охотникъ) принесъ убитаго имъ журавля, вида котораго я опредѣлить не могъ. Журавль этотъ отличался отъ обыкновенныхъ журавлей тѣмъ, что онъ былъ больше, шею имѣлъ почти бѣлую съ черноватыми полосками по бокамъ шеи; полосы эти къ туловищу уширялись. Голова этого журавля была красноватая шершавая, покрыта какъ бы бородавками краснаго цвѣта и рѣдкими жесткими волосками. Носъ сѣро-зеленоватаго цвѣта, ноги красноватыя, концы пальцевъ искрасна-черные. Крылья черно-сѣрыя съ синимъ отливомъ. Вообще все опереніе темнѣе, чѣмъ у обыкновенного журавля. Убить на большой полянѣ, покрытой осокою и мелкою травою, около деревни Санджарады на мѣстности Дашибылъгджаръ. Асланъ передалъ, что онъ его убилъ, встрѣтъя въ числѣ семи штукъ въ стаѣ обыкновенныхъ журавлей, которые, летя изъ Персіи, остановились отдыхать на этой полянѣ. При этомъ онъ заявилъ, что мѣстного названія его нѣтъ, такъ какъ онъ является очень рѣдко, а онъ отличаетъ его потому, что этотъ журавль темнѣе обыкновенного. На другой день я отправился на это мѣсто, но журавлей тамъ уже больше не было.

„5 марта 1892 года по почтовой дорогѣ между станціею Кумбаси и русскимъ селеніемъ Николаевка (сѣверная часть уѣзда) я видѣлъ убитаго однимъ изъ жителей селенія Сарчеваръ журавля. Этотъ охотникъ мнѣ объяснилъ, что онъ его убилъ въ стаѣ обыкновенныхъ журавлей и убилъ потому, что ему показалась странною его бѣлая шея. Журавль этотъ былъ больше обыкновенного и отличался отъ него еще слѣдующими признаками: голова красноватая, покрытая какъ бы бородавками и темными рѣдкими волосками; шея бѣлая, по бокамъ съ черною полоскою, которая идетъ до туловища; носъ зеленовато-сѣрий, ноги красныя, концы пальцевъ черные, все опереніе темно-дымчатое. Другіе жители селенія Сарчеваръ, которымъ я показывалъ этого журавля, называли его „кечалъ дурна“ (*паршивоголовый журавль*); также говорили, что его называютъ „юлъ-герсантъ“ (*указывающій дорогу*) и „дурна чаушъ“ (*журавль-вожакъ*). Охотникъ, убившій этого журавля, говорилъ, что онъ его встрѣчалъ очень рѣдко въ своей жизни, несмотря на то, что охотится постоянно (охотнику 50 лѣтъ), и убиваетъ его лишь въ третій разъ и всегда въ стаѣ обыкновенныхъ журавлей, въ которой такихъ журавлей бываетъ не болѣе трехъ. Талышинцы называютъ его „вожакомъ“ потому, что, по ихъ замѣчанію, онъ бываетъ рѣдокъ и всегда въ стаѣ сидитъ на-сторожѣ, охраняетъ стадо, предупре-

ждая его обь опасности, собираетъ стада журавлей и руководить ими при перелетѣ“.

Сем. 39. Rallidae. Пастушковыя.

216. *Fulica atra* L. Лысуха.

Мензбиръ, I, 449.

Кашкалдакъ (татарск.).

Обыкновенная осѣдлая птица низменности восточнаго Закавказья. Она держится на всѣхъ большихъ и маленькихъ озерахъ, лишь бы на нихъ росъ камышъ. Около Тифлиса она живеть осѣдою въ большомъ количествѣ на всѣхъ расположенныхъ около него озерахъ — Черепашьемъ, Лиси и Соленомъ. Въ громадномъ количествѣ она встрѣчена мною по болотистымъ озерамъ и разливамъ по среднему теченію Куры, по разливамъ Аракса и по морцамъ Ленкоранскаго уѣзда.

Во время моего пребыванія въ имѣніи А. Б. Шелковникова въ Арешскомъ уѣздѣ татаринъ принесъ ему 9. V. 95 двѣ кладки лысухи, по 8 совершенно свѣжихъ яицъ. По словамъ г. Шелковникова, полная кладка заключаетъ 11 — 12 яицъ. Гнѣзда устраиваются на неглубокой водѣ. Зимою лысухи собираются громадными стаями и держатся очень строго. Да и въ другое время онѣ здѣсь гораздо осторожнѣе, чѣмъ, напримѣръ, въ Астраханской губерніи, такъ какъ татары очень цѣнятъ ихъ мясо и ожесточенно преслѣдуютъ ихъ.

217. *Gallinula chloropus* L.

Мензбиръ, I, 453.

И мнѣ, и А. Б. Шелковникову водяная курица попадалась только зимою, по среднему теченію Куры. Гнѣздится ли она здѣсь, я не знаю.

218. *Porphyrrio poliocephalus* Lath. Султанка.

Мензбиръ, I, 458.

Боя-хана (татарск.); нарсухъ (талышинск.).

Я встрѣчалъ султанку зимою на Мугани близъ Сальянъ и весною въ заросляхъ по разливу Аракса, на пути между Сальян-

нами и Ленкоранью и, наконецъ, около самой Ленкорани на Ольховскомъ морцѣ. Однажды въ апрѣлѣ я видѣлъ съ лодки цѣлое дерево (иву), облѣпленное султанками. Онѣ любять сидѣть на почти вертикальномъ сучкѣ, ухватившись за него такъ, что одна лапа находится надъ другой, а туловище параллельно сучку. Биологическихъ наблюдений надъ образомъ жизни этой птицы мнѣ самому дѣлать не пришлось,—поэтому я помѣщаю здѣсь наблюденія, которыя еще въ 1903 году передалъ мнѣ баронъ Б. Л. Тизенгаузенъ.

„Самца можно отличить отъ самки лишь во время брачнаго периода, такъ какъ тогда цвѣтомъ онъ гораздо ярче и какъ-то осанистѣй. Птица эта, на большихъ ногахъ съ довольно длинными пальцами, очень хорошо бѣгаетъ въ камышовыхъ заросляхъ, дѣлая довольно большие шаги. Большею частью она старается спастись бѣгомъ и крайне неохотно взлетаетъ; летить всегда по прямому направлению и тихо, тяжелымъ полетомъ; когда бѣжитъ, то хвостъ свой держитъ кверху и немного вбокъ, постоянно имъ встряхивая. Эту привычку она имѣеть и тогда, когда стоитъ въ нокѣ, и хвостикъ настолько высоко поднимаетъ, что виденъ бѣлый цвѣтъ подхвостныхъ перьевъ.

„Султанка водится къ югу отъ устья Курьи вдоль болотистыхъ береговъ Каспія, по всѣмъ морцамъ, озерамъ и болотамъ. Постоянное пребываніе султанки и любимыя мѣста ея — камышовая заросли. Живутъ султанки небольшими стайками отъ пяти до восьми штукъ, но въ февралѣ мѣсяцѣ мнѣ случалось ихъ встрѣчать и большими стаями, до ста штукъ и болѣе, собравшихся въ открытыхъ мѣстахъ на укромныхъ лужайкахъ, находящихся среди камышей.

„Я пришелъ къ тому заключенію, что, такъ какъ султанка собирается въ большія стаи за нѣсколько времени передъ спариваніемъ, то собирается специально для спаривания, устраивая тѣмъ родъ тока. Какъ только стая услышитъ или завидитъ какую либо опасность, то всѣ султанки моментально быстро уѣгаютъ въ противоположную сторону отъ заслышаннаго ими шума и бѣгутъ, сильно вытянувъ впередъ шею.

„Въ концѣ марта или первыхъ числахъ апрѣля султанки начинаютъ гнѣздиться. Гнѣзда дѣлаютъ, выбирая мѣста самыя глухія и малодоступныя, въ самыхъ густыхъ камышахъ и заросляхъ, на земляныхъ кочкахъ или старыхъ кустахъ куки или другой болотной травы и устраиваютъ ихъ слѣдующимъ образомъ: сна-

чала на земляную кочку или сухой кустъ травы укладываютъ довольно толстый слой сухого камыша, настолько высокій, что даже во время половодья онъ не затопляется; на этотъ камышъ накладываютъ сухую осоку и другія мелкія травы; лотокъ гнѣзда выстилаютъ камышовыми метелками и дѣлаютъ не очень глубокимъ. Кладутъ отъ трехъ до пяти яицъ, которыя меныше утиныхъ, похожи формою и величиною на яйца лыски „кашкалдакъ“ (*Fulica atra*), но только гораздо нѣжнѣе, желто-зеленоватаго цвѣта, покрыты мутно-бурыми пятнами круглой, а иногда и продолговатой формы, и небольшой величины. Высиживаютъ ихъ отъ 22 до 25 дней; въ очень густыхъ тѣнистыхъ мѣстахъ дольше, чѣмъ на мѣстахъ, куда проникаютъ солнечные лучи. На яйцахъ болѣею частью сидитъ самка; самецъ хотя и помогаетъ самкѣ, но очень мало. Мнѣ случалось наблюдать, что, когда самка слѣзаетъ съ гнѣзда, она кричитъ, издавая особый звукъ, похожій на крикъ сѣрой цапли, но рѣзче, на который прибѣгаешьъ, а иногда и прилетаетъ самецъ и садится на гнѣздо; тогда самка отправляется кормиться и въ отсутствіи бываетъ около полутора часа. Какъ только она вернется, самецъ сейчасъ же слетаетъ съ гнѣзда. Если самка запаздываетъ и долго не является къ гнѣзду, то самецъ пронзительнымъ крикомъ начинаетъ вызывать самку и не слѣзаетъ до тѣхъ поръ, пока она не прилетитъ. Разъ какъ-то случилось, что мой проводникъ - лодочникъ во время моихъ наблюдений убилъ слетѣвшую для корма самку. Самецъ ждалъ ее долго, постоянно испуская крики, и, видя, что самка не прилетаетъ, а солнце уже близко къ закату, спрыгнулъ съ гнѣзда и побѣжалъ по слѣдамъ самки. Пробѣгавъ съ четверть часа, онъ снова вернулся къ гнѣзду и, сѣвъ опять на яйца, уже больше не испускалъ своихъ криковъ. Прѣхавъ на другой день послѣ полудня къ этому гнѣзду, я самца не засталъ, а четыре яйца были расклеваны, по всей вѣроятности, самимъ самцомъ. Маленькие птенцы крайне некрасивы: съ большою головою, покрыты темно-бурымъ пухомъ и съ непропорціонально длинными ногами. Пока птенцы въ гнѣзда, гдѣ они остаются до четырехъ дней, самка и самецъ не вылѣзая по-очереди прикрываютъ ихъ. Въ особенности интересно видѣть во время дождя, какъ самка и самецъ прикрываютъ птенцовъ своихъ, растопыривъ надъ ними свои крылья. Замѣчательно еще то, что самка и самецъ всходятъ и сходятъ съ гнѣзда всегда въ одномъ мѣстѣ, гдѣ гнѣзда значительно примято, и даже по илу видны въ одномъ направленіи слѣды, идущіе отъ гнѣзда, но не болѣе,

какъ фута на два. Водитъ птенцовъ одна самка и на землѣ ихъ прикрываетъ крыльями точно такъ же, какъ простая курица. Случается, что и послѣ весь выводокъ ночуетъ въ гнѣздахъ, но, когда птенцы подрастаютъ, то нѣсколько самокъ соединяются въ одно небольшое стадо и укрываются съ птенцами въ самыя укромныя мѣста глухихъ камышей; въ это время присоединяются къ нимъ и самцы. Мѣстные жители увѣряли, что очень часто бываетъ у одного самца до трехъ самокъ; мнѣ же самому это примѣтить не удавалось; могу лишь сказать, что, когда въ мартѣ мѣсяцѣ мнѣ приходилось поднимать султанокъ изъ камышей, то онѣ взлетали большою частью парами и всегда улетали по направлению къ густымъ камышамъ. У нѣкоторыхъ охотниковъ сложилось мнѣніе, что султанка въ началѣ весны отлетаетъ и является къ намъ въ концѣ сентября или началѣ октября, но это предположеніе крайне ошибочное. Я съ достовѣрностью могу сказать, что султанка не перелетная птица, да и по своему сложенію далеко летѣть не можетъ, и предположеніе, что султанка — птица перелетная, сложилось оттого, что она дѣйствительно съ марта мѣсяца по октябрь ведетъ скрытный образъ жизни. И въ это время ихъ въ Талыши увидѣть въ тѣхъ мѣстахъ, где онѣ попадаются обыкновенно зимою, почти что невозможно, а это происходитъ оттого, что въ концѣ февраля султанки начинаютъ пароваться, потомъ прячутся въ густые, малодоступные камыши, где дѣлаютъ гнѣзда, высиживаютъ птенцовъ, выращиваютъ ихъ, и, наконецъ, старая птицы линяютъ, и потомъ, за спадомъ воды въ болотахъ, въ густыхъ камышахъ онѣ имѣютъ все лѣто обильную пищу, что обыкновенно продолжается съ марта по октябрь. Зимою же, въ особенности, когда выпадаетъ снѣгъ или замерзнутъ болота, по берегамъ ихъ появляется громадное количество истощенныхъ султанокъ. Въ прежнія времена, въ то время, когда выпадали глубокіе снѣга и озеро и берега моря въ камышахъ замерзали, несчастныя султанки залетали во дворы жилыхъ домовъ, совершенно изнуренные и настолько худыя, что никуда не были годны. Мясо султанокъ было цѣнѣта, нѣжное и очень вкусное, не уступаетъ фазану.

„Въ неволѣ султанка скоро осваивается и дѣлается совершенно ручною, привыкаетъ къ дому, ходитъ по двору вмѣстѣ съ обыкновенными курами, при чемъ необходимо, однако, чтобы крылья были у нихъ сшиты или связаны, — въ противномъ случаѣ онѣ взлетаютъ на деревья и съ одного на другое добираются до бо-

лота. Онъ узнаютъ очень хорошо то лицо, которое даетъ имъ кормъ, и отличаютъ звукъ его голоса, стремительно прибѣгая на его зовъ. У меня пара султанокъ жила около трехъ лѣтъ и сдѣлалась настолько ручнаю, что привыкла къ свистку, и, когда приходилось имъ свистнуть или же прямо звать: „султанка, султанка!“, онѣ стремительно прибѣгали, брали изъ рукъ куски хлѣба, сначала въ клювъ, а изъ клюва въ лапу, и, стоя на одной ногѣ, преспокойно ёли хлѣбъ, отщипывая по кусочкамъ и поднося каждый разъ лапку съ хлѣбомъ къ клюву. Но, какъ бы вы ни пріучали ихъ къ дому, онѣ во время спаривания и вообще во время гнѣздованія непремѣнно удираютъ изъ дома въ камыши, такъ что въ эту пору (февраль и мартъ) мнѣ приходилось держать ихъ взаперти. Во время линянія мои султанки постоянно прятались подъ балконъ или же за большой ларь съ ячменемъ и выходили очень рѣдко, и то лишь для того, чтобы выкупаться въ водѣ, для нихъ приготовленной. Во время линянія онѣ очень вялы и кажутся какъ бы больными.

„На свободѣ султанка питается молодыми стеблями камыша и кути, а въ концѣ лѣта любимою пищею ея служить болотный каштанъ (чилимъ). Въ неволѣ султанка питается разнаго рода зерномъ, плодами, овощами, любить печеный хлѣбъ, ёсть хорошо сырое и вареное мясо и не брезгаетъ кухонными отбросами“.

219. *Crex crex* L. Коростель.

Мензбиръ, I, 461 (*Crex pratensis*).

Йельба (татарск., по Шелковникову).

Я встрѣчалъ коростеля на гнѣздахъ въ восточномъ Закавказье повсюду, гдѣ степи не имѣютъ характера пустыни (Елисаветпольскій и Арешскій уу. Елисаветп. губ.), въ Шемахинскомъ у. въ предгорьяхъ Большого Кавказа (Халтава и Маразы 2. V. 96), въ предгорьяхъ Кубинскаго у., на умѣренной высотѣ всюду въ Дагестанѣ, приблизительно до 5—6000', и на западно-закавказскомъ плоскогорье, въ Эриванской губ. и Карской области. Держится только въ мѣстностяхъ, покрытыхъ высокою густою травою, и въ хлѣбахъ. Время прилета и отлета его не замѣтилъ, но убивалъ коростелей по Курѣ уже въ первой половинѣ апрѣля, а послѣдняго убилъ въ Кульпахъ 27. IX. 900.

220. *Porzana parva* Scop.

Мензбиръ, I, 466.

Одинъ экземпляръ добытъ А. Б. Шелковниковымъ 20. III. 94. Мнѣ самому этотъ видъ не попадался.

221. *Porzana maruetta* Leach.

Мензбиръ, I, 471.

Встрѣчалъ ее весною, въ мартѣ, по среднему теченію Куры. По Шелковникову, гнѣздится въ Аренискомъ уѣздѣ.

222. *Rallus aquaticus* Briss. Водяной пастушокъ.

Мензбиръ, I, 474.

Мнѣ почему-то никогда не попадался, но въ коллекціяхъ любителей я видѣлъ многочисленные экземпляры пастушка, убитые подъ Ленкоранью, преимущественно зимою.

Отрядъ VIII. Galliformes. Куринообразныя.**Сем. 40. Tetraonidae. Тетеревитныя.**223. *Lyrurus Mlocosiewiczi* Taczan. Кавказскій тетеревъ.

Мензбиръ, I, 489.

Въ дополненіе къ имѣющимся свѣдѣніямъ о распространеніи кавказскаго тетерева я могу сообщить лишь слѣдующее. Онъ водится въ горахъ около Деликанскаго ущелья, въ Артвинскомъ округѣ на пограничномъ съ Турцией хребтѣ и на Аджарскомъ хребтѣ.

Сем. 41. Phasianidae. Фазаны.224. *Coturnix coturnix* L. Перепель.Мензбиръ, I, 522 (*C. communis*).

Бильдерчи (татарск.).

Перепель гнѣздится во всемъ Кавказскомъ краѣ и всюду очень обыкновенъ. На гнѣздахъ я встрѣчалъ его отъ высоты,

лишь немногого превышающей уровень моря, до альпийских луговъ. На низменности восточного Закавказья онъ встречается тамъ, гдѣ есть хорошая трава (напр., Елисаветин. у.), и не встречается въ пустынныхъ степяхъ. По посѣвамъ онъ распространяется до альпийской области. И встречи его въ періодъ гнѣздовья на альпийскихъ лугахъ многихъ мѣстъ Дагестана и на Маломъ Кавказѣ на Муровъ-дагѣ. Въ западномъ Закавказье онъ гнѣздится на Закавказскомъ плоскогорье и въ Гёльской котловинѣ. Осенью (въ августѣ) я встрѣчалъ перепела и на черноморскомъ побережье у Кобулетъ, но за цѣлое лѣто ни разу его не слышалъ. Осенью перепела сваливаются на хлѣбные поля, при чемъ обнаруживаются особое пристрастіе къ просу. На пролетѣ встречаются въ громадномъ количествѣ. Въ небольшомъ числѣ зимуютъ на низменности восточного Закавказья. Даже на высотѣ около 7500' въ Гёльской котловинѣ я встрѣчалъ переполовъ еще въ началѣ сентября.

225, a. *Perdix perdix* L. Сѣрая куропатка.

Мензбиръ, I, 527 (*Perdix cinerea*).

225, b. *Perdix perdix canescens* Buturlin. Закавказская сѣрая куропатка.

Buturlin, *Ibis*, 1906, p. 411.

Чиль (татарск., по Шелковникову).

Сѣрая куропатка живеть осѣдо въ плодородныхъ частяхъ низменности восточного Закавказья, Кубинскаго у. и Эриванской равнины. По Шелковникову, гнѣздится въ сѣверной части Аремпскаго у. на плоскогорье Суруджи подъ горами. Въ октябрѣ мѣсяцѣ куропатка въ значительномъ числѣ перекочевываетъ въ южную, низменную часть уѣзда, гдѣ и держится табунками до весны. Въ незначительномъ числѣ онѣ гнѣздятся и здѣсь. Зимою держатся близъ полей и рисовыхъ плантацій въ кустарникахъ и заросляхъ держи-дерева.

Въ ноябрѣ куропатки держатся въ значительномъ числѣ около г. Эривани. Эриванская сѣрая и каменная куропатки откармливаются главнымъ образомъ рисомъ, и потому жирнѣе и вкуснѣе куропатокъ изъ другихъ мѣстностей и цѣняются на тифлисскомъ рынке дороже послѣднихъ. Цѣна пары сѣрыхъ куропатокъ въ Тифлисѣ — отъ 80 к. до 1 р. 20 к.

На Съверномъ Кавказѣ я наблюдалъ сѣрую куропатку около станицы Червлениной Терской области въ маѣ 1899 г. среди песчаной степи. Вѣроятно, тамошняя сѣрая куропатка относится къ типичной формѣ.

226. *Caccabis chukar* Gray. Горная курочка.

Мензбиръ, I, 533.

Кяглакъ (татарск.).

Обыкновенная осѣдлая птица всего Закавказья. Вертикальное распространеніе горной курочки удивительно велико: она гнѣздится отъ низменности восточного Закавказья, лишь немнога возвышающейся надъ уровнемъ моря, до высоты около 10000'. На низменности я нашелъ горную курочку на гнѣздовьяѣ у сел. Кадели Елисавети. у. близъ Куры, гдѣ она гнѣздилаась (22. IV. 95) вмѣстѣ съ турачемъ, и около с. Мансурлы въ томъ же уѣздѣ на Курѣ (1. V. 95). Въ большомъ количествѣ встрѣчается она по предгорьямъ и горамъ, лишеннымъ лѣса. На большой высотѣ я встрѣчалъ ее въ Дагестанѣ близъ ауловъ Курахъ и Курушъ, и на Маломъ Аракатѣ (9500'). Отъ достойныхъ довѣрія охотниковъ я слышалъ неоднократно, что она водится у самыхъ ледниковъ вмѣстѣ съ горною индѣйкою. Что касается горизонтального распространенія этой птицы на Кавказѣ, то я находилъ ее въ восточномъ и южномъ Дагестанѣ, по всему южному склону Большого Кавказа (уу. Шемахинскій, Нухинскій, Сигнахскій и Душетскій и Закатальскій округъ), на всемъ Маломъ Кавказѣ, Закавказскомъ плоскогорьеѣ и пограничныхъ горахъ — на Аракатахъ, Агри-дагѣ и въ Артвинскомъ округѣ.

Любимое мѣстопребываніе курочки — каменистые склоны горъ, покрытые ксерофильною растительностью. Въ по-истинѣ громадномъ количествѣ я встрѣчалъ ихъ въ ущельяхъ рѣчекъ, текущихъ съ Малаго Кавказа въ Араксъ (Акера, Бергушетъ), по сѣверному склону Агри-дага и около Ольты. На черноморскомъ побережьеѣ горная курочка мнѣ не попадалась и, вѣроятно, не встрѣчается здѣсь, такъ какъ не любить ни сырости, ни пышной растительности. Въ ущельѣ Чороха она встрѣчается не ниже сел. Борчхи, а выше, у Артвина и по дорогѣ отсюда къ мѣст. Арданучъ обыкновенна. Изрѣдка она встрѣчается и на горахъ среди лѣсовъ, напр., на хребтѣ Цихисъ-Джвари выше сел. Бакурiani.

Шицу курочки составляют съмена различныхъ травъ, а также въ небольшомъ количествѣ и насѣкомыя. Тамъ, гдѣ ихъ много, какъ, напр., въ Эриванской губ. и Ольтинскомъ округѣ, не рѣдкость встрѣтить ихъ на дорогѣ, расклевывающихъ пометъ. Осеню и зимою онѣ держатся по-близости хлѣбныхъ полей и чалтыковъ и сильно раскармливаются оставшимся отъ уборки зерномъ, такъ что дѣлаются очень жирными. Яйца кладутъ въ маѣ, обыкновенно по 12 штукъ; 27. V. 95 я нашелъ въ уроцищѣ Джанъ-ялагъ (Джеванширскій у. Елисаветпольской губ.) гнѣздо съ 14 сильно насиженными яйцами.

Цѣна пары курочекъ въ Тифлисѣ — отъ 90 к. (кахетинскія) до 1 р. 80 к. (эриванская).

227. *Tetraogallus caucasicus* Pall. Кавказская горная индѣйка.

Мензбиръ, I, 540.

Я охотился на горную индѣйку только въ двухъ мѣстахъ въ Дагестанѣ — около аула Курахъ и на Шахъ-дагѣ. Здѣсь эти птицы держались около самыхъ ледниковъ и были обыкновенны, какъ и всюду въ такихъ мѣстахъ въ Дагестанѣ. По словамъ со-провождавшихъ меня лезгинъ, онѣ кладутъ яйца въ началѣ юля, отъ двухъ до четырехъ.

228. *Tetraogallus caspius* Gmel. Каспійская горная индѣйка.

Мензбиръ, I, 543.

Каспійскую горную индѣйку я встрѣтилъ только однажды — 23. IX. 900 на Зорскихъ высотахъ въ хребтѣ Агри-дагъ. Она водится и на Арапатѣ, но тамъ мнѣ не встрѣтилась. Также тщетно искалъ я ее и на Талышинскихъ горахъ, но на Саваланѣ (въ Персіи) она, по словамъ мѣстныхъ жителей, нерѣдка.

229. *Attagen francolinus* L. Турачъ.

Мензбиръ, I, 545.

Турачъ (у всѣхъ народовъ восточнаго Закавказья).

Турачъ живеть только въ степяхъ восточнаго Закавказья и область его распространенія быстро сокращается съ каждымъ годомъ. Я не могу даже ручаться, что онъ встрѣчается еще во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, которыхъ я упоминаю ниже. Перехожу къ подробному разсмотрѣнію его географическаго распространенія на Кавказѣ.

По долинѣ Куры турачъ распространенъ, съ нѣкоторыми перерывами въ мѣстахъ, гдѣ онъ уже истребленъ, отъ станціи Пойлы (немного восточнѣе впаденія р. Акстафы) до низовьевъ, и встрѣчается еще по рукаву Акуша верстахъ въ 20 ниже Сальянъ. Къ сѣверу отъ Куры захватываетъ южную часть Арешскаго уѣзда Елисаветпольской губ. и Геокчайскій и южную часть Шемахинскаго у. Бакинской губ. По лѣвую же сторону Куры онъ еще многочисленъ въ Самухскомъ имѣніи при сліяніи съ Курою Йоры и Алазани. Въ наибольшемъ количествѣ по Курѣ онъ встрѣчается до сихъ поръ между р. Таузъ и Зардобомъ. Обиліемъ турачей славится имѣнія бековъ шамхорскихъ Далляръ и Кечелы, Кадылинское имѣніе и наконецъ Мисюсли, около ст. ж. д. того же имени, въ Геокчайскомъ уѣздѣ. Въ Шемахинскомъ у. я нашелъ его еще въ 30 верст. отъ сел. Маразы, близь Соленаго озера. Резюмируя все это, можно сказать, что сѣверную границу распространенія турача въ Елисаветпольской и Бакинской губерніяхъ отъ впаденія Йоры съ Алазанью составляютъ плоская возвышенность Бозъ-дагъ и южная предгорья восточной части Кавказскаго хребта. Къ югу отъ Куры турачъ распространенъ по низовьямъ многихъ впадающихъ въ нее рѣчекъ — Тауза, Дзегама, Шамхора и особенно рѣки Тертера. Между Джеватомъ и Сальянами турачъ живеть по обѣимъ сторонамъ рѣки, но на муганской сторонѣ многочисленнѣе.

По Араксу турачъ доходитъ на западъ до Джебраильскаго уѣзда, гдѣ я въ большомъ числѣ встрѣтилъ его еще въ 1894 году около сел. Бегманлу. Но еще на памяти здѣшнихъ жителей онъ былъ распространенъ здѣсь и гораздо западнѣе, а по долинѣ впадающихъ въ Араксъ рѣчекъ поднимался довольно высоко. Такъ, охотники въ сел. Аскелюмъ передавали мнѣ, когда я былъ тамъ въ 1894 г., что турачъ исчезъ изъ ихъ мѣстности только лѣтъ 8—10 тому назадъ (т. е. въ восьмидесятыхъ годахъ). На Мугани, насколько я могъ выяснить во время моихъ поѣздокъ и на основаніи разспросныхъ свѣдѣній, онъ встрѣчается спорадически, на удобныхъ мѣстахъ, не страдающихъ отъ наводненій. Замѣчено, что послѣ того, какъ какуюнибудь прикуринскую мѣстность постигнетъ наводненіе, турачи исчезаютъ въ ней на нѣсколько лѣтъ.

Любимое мѣстопребываніе турача — густыя заросли колючихъ кустарниковъ (держи-дерева, гранатника, ежевики, а иногда и гребенщика) вблизи воды. Поэтому чаще всего его можно встрѣ-

тить по берегамъ рѣчекъ и оросительныхъ канавъ, а внутри сухой степи онъ не встрѣчается. По наблюденіямъ А. Б. Шелковникова, онъ вовсе не боится человѣка и часто гнѣздится въ тутовыхъ и виноградныхъ садахъ. „Весною, говоритъ этотъ наблюдатель, самцы подходили къ самому моему дому шаговъ на двѣсти, и я самъ наблюдалъ, какъ осенью, при распашкѣ земли въ саду, пара турачей бѣгала за союю шагахъ въ ста, отыскивая пищу въ свѣжей бороздѣ.“

Тамъ, где турачей еще много, они держатся осенью и зимою небольшими стайками, хотя и не такъ сплошенно, какъ, напр., сѣрыя куропатки. При преслѣдованіи охотникомъ съ собакою такая стайка сначала бѣжитъ, а затѣмъ птицы начинаютъ сниматься одна за другою, по одной или по двѣ заразъ.

Смотря по состоянію погоды, уже въ февралѣ или только въ мартѣ турачи разбиваются на пары. Токованье турачей происходитъ съ первыхъ чиселъ марта до конца мая, но крикъ ихъ бываетъ слышенъ еще и все лѣто. А. Б. Шелковниковъ наблюдалъ, что въ началѣ тока самцы ожесточенно дерутся между собою. „Я наблюдалъ, говоритъ онъ, бой двухъ самцовъ 9. III. 93 на берегу рѣчки Альджигять, на полянкѣ между кустами гребенщика и лоха. Разбѣжавшись турачи бросаются другъ на друга, поднимаясь при этомъ столбомъ на воздухъ аршина на полтора отъ земли. Бьются другъ друга клювомъ и ногами настолько сильно, что кругомъ летятъ перья. Затѣмъ расходятся, чтобы снова начать бой. Это продолжается 5—6 разъ, пока одинъ изъ самцовъ не обратится въ бѣгство побѣженный“. Вѣроятно, такія драки бываютъ только въ самомъ началѣ любовной поры у турачей и предшествуютъ разбиванію ихъ на пары, такъ какъ позднѣе турачъ мирно живетъ со своею самкою и не ссорится съ противниками. Но крайней мѣрѣ ни я, ни кто другой никогда не наблюдалъ дракъ между ними въ болѣе позднее время года, хотя наблюдать ухаживаніе самца за самкою приходилось и очень часто.

Въ обыкновенное время турачъ очень молчаливая птица. Взлетая при внезапномъ испугѣ, онъ „кокаетъ“, какъ говорятъ охотники, при чемъ голосъ самки пискливѣе. Такое же, но болѣе спокойное коканье производятъ турачи при перелетахъ, не будучи испугнуты. Любовная же пѣснь турача громка и оригинальна. Голосъ его болѣе всего похожъ на голосъ молодого домашняго пѣтушка, только что пробующаго свои силы. Слогами его мож-

но передать приблизительно такъ: „Кик (отрывочно), кик-кики-и-ки!“ Въ періодъ спариванія и насиживанія пѣсня эта слышится безъ перерыва цѣлый день. Самецъ держится недалеко отъ самки и для пѣнія вскакиваетъ на какую нибудь кочку и поетъ дергаясь и вытягивая шею вверху, какъ это дѣлаютъ и домашніе пѣтухи. Въ особенности усердно поетъ турачъ въ пасмурные, сѣренкіе дни и подъ вечеръ.

Ухаживая за самкою, какъ я это неоднократно наблюдалъ въ Елисаветпольскомъ и Джеванширскомъ уу., турачъ принимаетъ позу, свойственную большинству куриныхъ: онъ закидываетъ назадъ голову, выпичиваетъ свою ярко окрашенную грудь, распускаетъ вѣромъ хвостъ и опускается внизъ растопыренныя крылья, которыми чертить по землѣ, крутясь передъ самкой. Въ этомъ положеніи онъ, пожалуй, больше всего похожъ па индюка. Самка относится довольно хладнокровно къ ухаживанію своего кавалера. Обыкновенно она спокойно ходить, поклевывая зернышки, самецъ же крутится передъ нею, иногда даже слегка толкаетъ ее, переминается съ ноги на ногу, заступаетъ ей дорогу, чертитъ крыльями по землѣ. По временамъ онъ вытягиваетъ шею съ стоящими на ней перьями впередъ, какъ это дѣлаютъ голуби, но, приближаясь къ самкѣ, снова закидываетъ ее на спину. Издаетъ ли онъ при этомъ какой нибудь звукъ? Могу сказать только, что въ это время, т. е. во время танцевъ, онъ не поетъ своей обычной пѣсни: для пѣнія онъ всегда останавливается. Если онъ издастъ какой-нибудь звукъ при движениіи, то послѣдній, вѣроятно, очень тихъ, такъ какъ, наблюдая токующаго турача не далѣе, какъ въ 50—60 шагахъ, я ни разу ничего не слышалъ. Во время тока турачъ глухъ и слѣпъ: самка всегда замѣчаетъ въ это время опасность первая, а за нею летить уже и самецъ. Никто изъ известныхъ мнѣ наблюдателей и охотниковъ не встрѣчалъ при турачѣ болѣе одной самки. Также я никогда не видаль и не слыхалъ, чтобы при одной самкѣ токовало болѣе одного пѣтуха.

Гнѣздо устраивается въ густой заросли въ небольшой ямкѣ подъ кустомъ. Оно выстлано соломой и сухой травой. Кладка, по Шелковникову, въ Арепскомъ уѣздѣ начинается въ первой половинѣ апрѣля и достигаетъ полнаго комплекта, отъ 10 до 12 яицъ, въ концѣ этого мѣсяца; я находилъ полныя кладки, около 10 яицъ, въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ въ началѣ мая. Покойной лѣсничій А. Е. Старосивильскій, съ которымъ мы вмѣстѣ наблюдали токъ турачей близъ Тертера въ Джеванширскомъ уѣздѣ, говорилъ, что

находилъ полные кладки въ началѣ іюня, но, вѣроятно, яйца были уже насижены тогда. Ему принесли однажды кладку изъ 14 яицъ; нужно считать 10—12. Мнѣ не удалось выяснить, въ чемъ состоитъ роль самца при высиживаніи, но онъ не отходитъ отъ гнѣзда и развлекаетъ самку пѣніемъ. Самецъ, повидимому, не участвуетъ и въ заботѣ о выведеніи птенцахъ, ибо никогда никому не приходилось поднимать самца при выводкѣ. По мнѣнію А. Е. Старосивильскаго, турачъ *нормально* гнѣздится два раза, такъ какъ и въ самые нормальные годы, когда дичь не страдала ни отъ наводненій, ни отъ другихъ бѣдствій, ему еще въ концѣ сентября приходилось наблюдать выводки величиною съ перепелку. Можетъ быть, этою значительной плодовитостью турача и объясняется тотъ фактъ, что онъ до сихъ поръ еще не истребленъ окончательно.

Днемъ турачи держатся въ густыхъ заросляхъ, а вечеромъ выходятъ кормиться на болѣе открытые мѣста и охотно посѣщаются хлѣбныхъ полей, особенно снятыхъ чалтычныхъ (рисовыхъ) полей, послѣ того, какъ они достаточно подсохнутъ. Пищу ихъ составляютъ сѣмена различныхъ растеній, особенно культурныхъ—риса, пшеницы, ячменя и проса. Турачъ никогда не садится на деревья и отъ опасности всегда сперва старается спастись бѣгствомъ, а, когда видитъ, что это невозможно, взлетаетъ. Взлетая турачъ поднимается сперва столбомъ кверху, а затѣмъ уже летитъ горизонтально, довольно слабымъ и сравнительно тихимъ полетомъ.

Турача никакъ нельзя назвать осторожною птицей, и охота за нимъ не представляетъ никакого затрудненія. Его и преслѣдуютъ ожесточенно за его вкусное бѣло мясо, которое на Кавказѣ считается самымъ вкуснымъ изо всей дичи, и истребляютъ самымъ варварскимъ способомъ. Особенно гибельны для него снѣжные зимы, когда мальчишки-пастухи избиваютъ турачей даже просто палками.

Цѣна турачей на тифлисскомъ рынке въ настоящее время колеблется отъ 1 р. 40 к. до 2 р. 50 к. за пару.

230. *Phasianus colchicus* L. Колхидскій фазанъ.

Хахобія (груз.).

Въ настоящее время въ западномъ Закавказье фазанъ представляетъ большую рѣдкость. Я встрѣтилъ его здѣсь только около Чаквы.

С. А. Бутурлинъ, недавно писавшій и по-русски, и по-англійски о распространеніи настоящихъ фазановъ, считаетъ фазана Ріонской низменности за основной типъ. Но я думаю, что изъ всѣхъ кавказскихъ фазановъ этотъ имѣлъ наименѣе шансовъ попасть для описанія Линнею.

231. *Phasianus colchicus septentrionalis Lorenz.* Сѣверо-кавказскій фазанъ.

Lorenz, Journ. f. Ornith., p. 571 (1888).

До сихъ поръ еще въ значительномъ количествѣ встрѣчается въ „кизлярскихъ камышахъ“ въ дельтѣ Терека, гдѣ я встрѣтилъ его въ маѣ 1899 г. Здѣшніе фазаны не отличались отъ добытыхъ мною въ 1890 году въ дельтѣ Волги. Ни по Тереку, ни по Кумѣ, ни по Сунжѣ фазановъ больше нѣтъ. Но въ южномъ, низменномъ Дагестанѣ они еще очень многочисленны въ Кайтаго-Табасаранскомъ и Кюринскомъ округахъ и около Дербента. Но, принадлежать ли эти и водящіеся въ Кубинскомъ уѣзда фазаны именно къ этой формѣ, я не знаю. Г. Бутурлинъ о фазанахъ этой части каспійского побережья ничего не говоритъ. Въ Кубинскомъ уѣзда подъ вліяніемъ строгой охраны фазаны сильно размножились.

232. *Phasianus colchicus Lorenzi Buturlin.* Закавказскій фазанъ.

Buturlin, „Ibis“, p. 386 (1904).

Крговулъ (татарск.).

Этотъ фазанъ, хорошо географически обосновленный отъ другихъ горными пѣдіями, еще довольно многочисленъ въ восточномъ Закавказье. Онъ, безъ сомнѣнія, прѣдѣлеялся его сплошь до высоты около 2—3 тысячъ фут., но теперь во многихъ мѣстахъ истребленъ. Самымъ западнымъ пунктомъ восточнаго Закавказья, гдѣ мнѣ приходилось охотиться на фазановъ, было имѣніе Мухранъ, недалеко отъ станціи Каспи закавказской жел. дор. Да же къ востоку я встрѣчала фазановъ въ значительномъ количествѣ въ Кахетіи, по Іорѣ и Алазани и по южнымъ предгорьямъ Кавказскаго хребта до Шемахинскаго уѣзда, гдѣ встрѣтилъ еще ихъ около Шарадильской почтовой станціи, въ глубокой рѣчной балкѣ и въ лѣсу около сел. Алты-агачъ. Къ югу отсюда фазаны встрѣчаются во всѣхъ удобныхъ мѣстахъ. Для своего мѣстожительства

они, повидимому, предпочитают леса с густым подсёдом и перевитые колючими вьющимися растениями, представляющими не-пролазные крепи. Но по Куре и Араксу они попадались мне иногда и в совершенно безлесных местах и держались здесь в густых камышах. В Карабахе, именно в Дживанширском уезде, близ сел. Гасанризъ я встретил 4. VI. 95 фазана на высоте около 4000' на хребтном поле.

Весною самцы дерутся между собою, но особаго ожесточения между ними я не замечалъ. Тѣ, которыхъ мне приходилось наблюдать, стояли нагнувшись и вытянувшись другъ къ другу шеи, а за темъ, захвативъ другъ друга клювами, долго таскали одинъ другого. Крикъ фазановъ слышенъ весною и летомъ. Я находилъ въ Дживанширскомъ уезде, въ предгорьяхъ, яйца фазановъ съ конца мая. Такъ, 27. V. 95 въ урочищѣ Джанъ-ялагъ по Тертеру я нашелъ въ гнѣздахъ 4 совершенно свѣжихъ яйца; полная же кладки, достигающая 15 яицъ, лишь въ началѣ июня. По Шелковникову же на низменности Арешского уезда кладка (10 — 15 яицъ) заканчивается уже въ концѣ апрѣля.

233. *Phasianus colchicus talyschensis* Lorenz. Талышинскій фазанъ.

Lorenz, Journ. f. Ornithol., p. 572 (1888). *Ph. persicus* subsp. *talischensis*.

По Лоренцу, это — фазанъ Талышинской низменности. Еще въ 1897 году я встрѣтилъ его въ большомъ количествѣ на низменности и на островѣ Сари. Но уже въ 1899 г. онъ былъ истребленъ и на этомъ островѣ до-чиста и въ уезде сдался рѣдкостью.

Отрядъ IX. Falconiformes. Дневныя хищныя птицы.

Сем. 42. Pandionidae. Скопы.

234. *Pandion haliaetus* L. Скопа.

Мензбиръ, II, 5.

Скопа распространена по всему Кавказскому краю и въ значительномъ количествѣ встречается по всѣмъ его рыбообильнымъ водамъ. Чаще всего я встречалъ скопу въ Ленкоранскомъ уезде

на низменности, сильно изрѣзанной мелкими рѣчками и морцами, по берегамъ озера Гокчи и на черноморскомъ побережье; въ значительно меньшемъ количествѣ — по Курѣ, Араксу и болѣе мелкимъ рѣчкамъ Закавказья, а изрѣдка — и на мелкихъ горныхъ рѣчкахъ, напр., въ верховьяхъ р. Бергушетъ въ Зангезурскомъ уѣздѣ. Словомъ, гдѣ много рыбы и гдѣ ловить ее легко, тамъ водится и скопа.

На безлѣсныхъ берегахъ озера Гокчи она устраиваеть гнѣзда на одиночно торчащихъ скалахъ; такое гнѣздо я видѣлъ, напр., по дорогѣ изъ с. Еленовки въ Новобаязетъ близъ станціи Гаджи-Муханъ. Въ лѣсистомъ же Ленкоранскомъ уѣздѣ гнѣзда помѣщаются обыкновенно на высокомъ, по большей части отдельно стоящемъ деревѣ. Въ южной части уѣзда я находилъ много такихъ гнѣздъ, но, къ сожалѣнію, ни до одного изъ нихъ не могъ добраться.

Сем. 43. Falconidae. Соколиные.

Подсем. Falconinae.

235. *Cenchrus tinunculus* L. Обыкновенная пустельга.

Мензбиръ, II, 11 (*Tinunculus alaudarius*).

Сычанчи (татарск.).

Обыкновенная пустельга — самый обыкновенный хищникъ восточной части Закавказья; въ западной же части — въ Эриванской туб. она никогда мнѣ не попадалась и, повидимому, совершенно замѣнена тамъ бѣлокоготною пустельгою, не встречающеюся въ восточной части. Однако, съ положительностью я могу сказать это только обѣ Эриванской губерніи.

Я встрѣчалъ обыкновенную пустельгу только на низменности. Въ особенно большомъ числѣ я встрѣтилъ ее на нижнемъ теченіи Куры отъ впаденія въ нее Аракса до Сальянъ. Здѣсь она зимуетъ, изъ другихъ же частей Закавказья на зиму отлетаетъ, но появляется уже очень рано: 3. III. 97 я наблюдалъ пролетъ этого вида большою стаею.

Въ тугаяхъ по Курѣ у Джевата и Сальянъ пустельга гнѣздится въ очень большомъ количествѣ на высокихъ тополяхъ. 24. V. 94 я нашелъ въ одномъ гнѣздѣ уже птенцовъ. Какъ это ни странно, но въ безлѣсныхъ мѣстахъ каспійского побережья, именно около Аджи-Кабула пустельга, за неимѣніемъ лучшаго, гнѣздится и въ порахъ, вырытыхъ въ глинистыхъ обрывахъ. Вѣроятно,

она пользуется норами, вырытыми сизоворонками. Высиживающая парочка ревниво оберегает свое гнездо от всяких непрошеныхъ гостей. Наблюдая за однимъ гнездомъ, устроеннымъ на высокомъ платанѣ въ одномъ селеніи на нижней Курѣ, я видѣлъ, какъ пустельги храбро бросались на всѣхъ пролетавшихъ по-близости грачей и коршуновъ. Охотясь преимущественно на стели и истребляя массу различныхъ крупныхъ насѣкомыхъ, пустельги приносятъ несомнѣнно большую пользу. У пустельги, убитой 8. III. 95 въ Сальянахъ, въ клювѣ были земляные черви. Осенью онѣ собираются на ночлегъ вмѣстѣ, значительными обществами. Такъ, въ концѣ юля 1899 года онѣ облюбовали для этого группу большихъ платановъ противъ моихъ оконъ въ паркѣ Муштаидъ; 24. VII я насчиталъ ихъ болѣе 50 особей. Передъ закатомъ солнца онѣ вились и хлопотали надъ этими деревьями, какъ это дѣлаютъ и галки, усаживаясь на ночлегъ, только безъ такого шума. Онѣ собирались сюда на ночлегъ до конца августа.

236. *Cenchrис cerchneis* Naum. Бѣлокоготная пустельга.

Мензбиръ, II, 17 (*Tinunculus cenchris*).

Сычанчи (какъ и предыд.).

Область распространенія бѣлокоготной пустельги въ Закавказье идетъ отъ западной части низменности восточного Закавказья на западъ до Чернаго моря.

По почтовому тракту отъ станціи Евлахъ ж. д. до Шуши и Джебраила я встрѣчалъ только эту пустельгу, притомъ во множествѣ; далѣе я встрѣтилъ ее по Араксу вверхъ отъ Джебраила, на Эриванской равнинѣ, Закавказскомъ плоскогорьѣ и Гельской котловинѣ. У Тифлиса встречаются оба вида, но, въ то время какъ обыкновенная пустельга здѣсь очень многочисленна, бѣлокоготныя представляютъ рѣдкость. Только 15. VIII. 96 я встрѣтилъ нѣсколько экземпляровъ этого вида вмѣстѣ у Соленаго озера подъ Тифлисомъ и убилъ одну; повидимому, это былъ пролетъ.

237. *Erythrops vespertinus* L. Кобчикъ.

Мензбиръ, II, 22.

7. IX. 900 я убилъ одинъ экземпляръ (самку) въ Аралыхѣ, въ паркѣ. Одинъ разъ, въ августѣ 1901 г. наблюдалъ его въ паркѣ Муштаидъ.

238. Lithofalco aesalon Briss. Дербникъ.

Мензбиръ, II, 30.

Во второй половинѣ августа 1899 г. я убилъ пару дербниковъ въ паркѣ Муштаидъ. Судя по коллекціямъ мѣстныхъ любителей, дербникъ очень обыкновененъ около Ленкорани.

239. Falco subbuteo L. Чеглокъ.

Мензбиръ, II, 38.

Осенью довольно часто попадается подъ Тифлисомъ. 5. VIII. 99 я убилъ одного (♀) въ паркѣ Муштаидъ. 1. IX. 900 убилъ одного на Эзнось-яйля въ сосновомъ лѣсу (около 8000') въ Карской области, къ сѣверо-западу отъ Гельской котловины.

240. Falco peregrinus Briss. Сапсанъ.

Мензбиръ, II, 44.

24. III. 95 я добылъ одинъ экземпляръ (♀) по дорогѣ изъ Джевата на станцію ж. д. Сагиры, среди голой степи. 12. V. 96 видѣлъ близъ селенія Босхаль Шемахинскаго уѣзда. Обыкновененъ сапсанъ только зимою въ Ленкоранскомъ уѣздѣ, но уже въ мартѣ и тамъ становится рѣдкимъ.

Подсем. Buteoninae.

241. Milvus ater Gmel. Коршунъ.

Мензбиръ, II, 80.

Чалаганъ (татарск.).

Обыкновенная и характерная птица рѣчныхъ долинъ Кавказскаго края. На Сѣверномъ Кавказѣ я встрѣтилъ его въ большомъ количествѣ по рр. Кумѣ и Тереку, въ Закавказье онъ особенно многочисленъ по среднему и нижнему теченію Куры. Между Джеватомъ и Сальянами онъ встрѣчается прямо въ громадномъ количествѣ. Гнѣздится онъ на высокихъ деревьяхъ прирѣчныхъ лѣсовъ.

242. Milvus melanotis Temm. Черноухій коршунъ.

Мензбиръ, II, 89.

Этотъ коршунъ встрѣчается въ Закавказье вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ, но въ меньшемъ количествѣ.

Я добылъ экземпляры его въ Елисаветпольскомъ и Арешскомъ уу. Елисаветпольской губ., около Джевата и Сальянъ.

Такъ какъ признаки, отличающіе этотъ видъ отъ предыдущаго, не всегда бываютъ ясны, а живуть оба вида вмѣстѣ, было бы весьма желательно, чтобы гг. орнитологи провѣрили хорошенько вопросъ о степени самостоятельности этого вида, котораго я по неподготовленности своей здѣсь не затрагиваю.

243. *Buteo* sp.?

Въ началѣ сентября 1902 г. очень часто парами попадался въ Гёльской котловинѣ (въ Ардаганскомъ округѣ Карской области). Я отоспалъ добытый тамъ экземпляръ проф. М. А. Мензбирю, но, къ сожалѣнію, до сихъ поръ не получилъ его опредѣленія.

Подсем. *Aquilinae*.

244. *Aquila fulva* Temm. Горный орель.

Мензбиръ, II, 121.

Не разъ наблюдалъ и стрѣлялъ этого орла на Главномъ Кавказскомъ хребтѣ, но ни одного экземпляра не добылъ, такъ какъ раненый онъ улеталъ далеко, а застрѣленный скатывался въ такую пропасть, что достать его не было возможности. Я, однако, хорошо могъ разсмотрѣть ихъ въ сильный бинокль и увѣренъ въ своемъ опредѣленіи.

245. *Aquila heliaca* Sav. Орель-могильникъ.

Мензбиръ, II, 123.

Внимательно слѣдя за крупными хищниками, которыхъ приносили охотники мѣстнымъ препараторамъ, я замѣтилъ, что могильникъ является довольно обыкновенною зимней птицей низменности восточнаго Закавказья, по крайней мѣрѣ окрестностей Тифлиса, где онъ встрѣчается съ конца сентября по начало апрѣля. Лѣтнихъ экземпляровъ я не видѣлъ и не знаю, попадается ли онъ здѣсь и лѣтомъ.

246. *Aquila naevia* Meyer. Малый подорликъ.

Мензбиръ, II, 152.

У лѣсничаго Бртекъ, сдѣлавшаго потомъ препараторомъ, я видѣлъ большую серію этихъ орловъ, добытыхъ преимущественно

осенью въ Бакуріанахъ въ 1898 г. Большая часть этой коллекціи, насколько помню, была отправлена Фритчу въ Прагу.

247. *Aquila clanga* Pall. Большой подорликъ.

Мензбиръ, II, 145.

Я наблюдалъ и добыть большого подорлика подъ Тифлисомъ въ ноябрѣ 1895 г. Видѣль у тифлисскихъ препараторовъ и другихъ, добытыхъ въ то же время.

248. *Aquila pennata* Gmel.

Мензбиръ, II, 158.

17. VIII. 900 въ ущельѣ по дорогѣ изъ Караклиса въ Делижань я наблюдалъ орла-карника, сидѣвшаго на вершинѣ сухого дерева. Онъ подпустилъ экипажъ очень близко и позволилъ хорошо разсмотреть себя въ бинокль.

249. *Circaëtos gallicus* Gmel. Орелъ-змѣядъ.

Мензбиръ, II, 169.

Демиръ-кайнахъ (татарск., Сальяны).

Весною 1894 г. мнѣ принесли орла-змѣяда, пойманнаго въ окрестностяхъ Тифлиса (на горѣ св. Давида). Позднѣе былъ пойманъ и другой экземпляръ, который также не могъ почему-то летать. Это наводить меня на мысль, что охота за ядовитыми змѣями не всегда сходитъ ему благополучно. Я нѣсколько разъ встрѣчалъ его на каспійскомъ побережїѣ, на Мугани и въ Кубинскомъ уѣздѣ. На Мугани я добылъ 11. VI. 97 одинъ экземпляръ около поста Домаха на разливѣ Аракса. Въ Кубинскомъ у. на пути изъ сел. Нараджанъ на Низовую пристань 30. V. 96 я замѣтилъ змѣяда на высокомъ сухомъ дубѣ. При моемъ приближеніи онъ слетѣлъ, держа въ когтяхъ длинную змѣю. Она была, очевидно, уже мертвою, такъ какъ висѣла плетью.

На жившемъ въ вольерѣ при Кавказскомъ музѣѣ орлѣ-змѣядѣ я замѣтилъ, что съ возрастомъ нижняя сторона его становится все бѣлѣе.

250. *Haliaëtos albicilla* Briss. Орланъ-бѣлохвостъ.

Мензбиръ, II, 96.

Обыкновенная птица побережья обоихъ морей. Наблюдать, какъ онъ охотится, мнѣ не приходилось, но я очень часто встрѣ-

чаль его на морскомъ берегу на разной падали, выбрасываемой моремъ — тюленѣ, бѣлугѣ и т. п.

Около Тифлиса онъ является обыкновеннымъ посѣтителемъ боенъ.

Подсем. *Accipitrinae*.

251. *Accipiter nisus* L. Ястребъ-перепелятникъ.

Мензбиръ, II, 189.

Ястребъ-перепелятникъ довольно обыкновененъ на низменности восточного Закавказья. Я часто наблюдалъ охоту этого дерзкаго разбойника, не разъ хватавшаго воробьевъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня. Экземпляры его я добылъ на пути изъ сел. Наряджанъ на Низовую пристань, Кубинск. у. (30. V. 96); близъ сел. Кѣчерли (28. V. 94) и Агдамъ (3. VI. 95) Джеванширского у.; на Талышинской низменности, с. Бутасарь (28. IV. 98), и около Тифлиса.

252. *Astur brevipes* Severts. Ястребъ-тювикъ.

Мензбиръ, II, 210.

Такъ какъ я не умѣю отличить этого ястреба на волѣ отъ предыдущаго, то могу сказать только, что я убивалъ его въ паркѣ Муштаидѣ въ Тифлисѣ; экз. коллекціи добытъ 15. V. 900.

253. *Astur palumbarius* L. Ястребъ-тетеревятникъ.

Мензбиръ, II, 205.

Я неоднократно наблюдалъ тетеревятника зимою въ Тифлисѣ на дворѣ Кавказской шелководственной станціи, гдѣ онъ охотился за домашними голубями, и въ паркѣ Муштаидѣ, но ни разу не удалось мнѣ подстрѣлить этого ловкаго и осторожнаго разбойника. Онъ ни разу при мнѣ не присаживался здѣсь, а всегда являлся неожиданно изъ за какого нибудь прикрытия, стремительно схватывая добычу и быстро исчезалъ съ нею.

254. *Circus aeruginosus* L. Камышовый лунь.

Мензбиръ, II, 235.

Непремѣнныи спутникъ камышовыхъ зарослей по берегамъ рѣкъ, озеръ и болотъ восточного Закавказья. Тамъ, гдѣ такихъ

зарослей много, какъ, напр., по разливамъ Аракса и на Талышинской низменности, и камышовый лунь встрѣчается въ большомъ количествѣ.

255. *Circus aeruginosus unicolor* Radde. Темный камышовый лунь.

Radde, *Ornis Caucasica*, p. 83, Tab. III.

Два раза я убивалъ на Ольховскомъ морѣ около Ленкорани луней, совершенно сходныхъ съ описаннымъ Радде. Экземпляръ моей коллекціи добытъ 12. IV. 97.

256. *Circus cineraceus* Mont. Луговой лунь.

Мензбиръ, II, 217.

Нерѣдокъ въ восточномъ Закавказье. Я часто убивалъ его около Тифлиса осенью. У убитыхъ въ августѣ у Соленаго озера близъ Тифлиса желудки были набиты одними кузнечиками. Лѣтомъ я добытъ только одинъ экземпляръ около сел. Конахъ-кендъ Шемахинскаго уѣзда (6. V. 96).

257. *Circus cyaneus* L. Полевой лунь.

Мензбиръ, II, 229.

Около Тифлиса попадался мнѣ нерѣдко весною и осенью. Одинъ молодой экземпляръ добытъ мною 1. V. 96 около города Шемахи.

258. *Circus macrurus* Gmel. Степной лунь.

Мензбиръ, II, 224.

Я добытъ только одинъ молодой экземпляръ степного луня, близъ Соленаго озера у Тифлиса 27. VIII. 95.

Подсем. *Gypaetinae*.

259. *Gypaetus barbatus* L. Ягнятникъ.

Мензбиръ, II, 255.

Я наблюдалъ ягнятника только издали въ альпийской области Главнаго Кавказскаго хребта къ востоку отъ военно - грузинской дороги и въ горахъ близъ Ахалкалакъ зимою 1896 года.

Сем. 44. Vulturidae. Грифы Старого Свѣта.

260. *Neophron percnopterus* L. Стервятникъ.

Мензбиръ, II, 242.

Я встрѣчалъ стервятника повсюду на Кавказѣ, какъ на низменности, такъ и въ горахъ. Гнѣздится онъ, однако, высоко въ горахъ и на низменность является только за добываніемъ пищи. Однако, я нашелъ его гнѣздовье и сравнительно очень невысоко, именно около селенія Аскелюмъ Зангезурскаго уѣзда въ ущельѣ рѣки на скалахъ не выше 3000' (въ юлѣ 1894 г.). Другое гнѣздовье я наблюдалъ въ Дагестанѣ близъ аула Чохъ, къ югу отъ Гуниба.

Около Тифлиса онъ въ большомъ количествѣ постоянно держится около боенъ, и почти каждый день можно наблюдать стервятниковъ, парящихъ высоко надъ городомъ. На низменности я иногда видѣлъ его отдыхающимъ на деревѣ.

261. *Vultur monachus* L. Сѣрый грифъ.

Мензбиръ, II, 246.

Нерѣдокъ около тифлисскихъ боенъ.

262. *Gyps fulvus* Briss. Бѣлоголовый сипъ.

Мензбиръ, II, 249.

Хотя бѣлоголовый сипъ гнѣздится тоже высоко въ горахъ на неприступныхъ скалахъ, онъ не представляетъ рѣдкости на жаркой низменности даже лѣтомъ, что, впрочемъ, весьма понятно, такъ какъ его могучія крылья могутъ въ нѣсколько минутъ унести его изъ жаркой равнины къ вѣчнымъ льдамъ. 8. V. 95 я замѣтилъ на пути изъ сел. Агдамъ въ сел. Карабанлы Джеванширскаго у. этого грифа, отдыхавшаго на стогу сѣна; его преслѣдовали воронь, но очень осторожно. Зимою же онъ на низменности гораздо многочисленнѣе. Во всякое время года онъ многочисленъ и на бойняхъ около Тифлиса.

31. I. 96 въ глубокой балкѣ у Тифлиса я убилъ камнемъ одного грифа, объѣвшагося падали до того, что онъ не могъ скоро подняться. Экземпляръ этотъ былъ отосланъ профессору М. А. Мензиру.

Отрядъ X. Anseriformes. Утинообразныя.

Сем. 45. Anatidae. Утиныя.

Подсем. Anserinae.

263. *Chen hyperboreus* Pall. Полярный гусь.

Куба-казъ (татарск.).

Мензбиръ, I, 722 (*Anser hyperboreus*).

Въ февралѣ 1895 года я видѣлъ на Мугани въ стаѣ другихъ гусей одного бѣлаго съ чернымъ на крыльяхъ, какъ я хорошо разсмотрѣлъ въ бинокль. Сопровождавшій меня охотникъ - татаринъ сказалъ мнѣ, что это не домашній гусь, какъ я было подумалъ въ первый моментъ, а дикий, называемый ими «кубинскимъ гусемъ» (Куба-казъ), вѣроятно, потому, что Куба лежитъ къ сѣверу отсюда. Какъ бы то ни было, но особое название для этого гуся показываетъ, что мѣстные жители его хорошо знаютъ. Въ одной изъ татарскихъ пѣсенъ при описаніи зимы говорится: «по небу летятъ кубинскіе гуси...».

А. Б. Шелковниковъ наблюдалъ 29. I. 95 стайку этихъ гусей въ девять особей около своей усадьбы въ Арешскомъ уѣздѣ.

На Мугани наблюдалъ его и баронъ Б. Л. Тизенгаузенъ, но до сихъ поръ этотъ гусь не попалъ въ руки ни одному собирателю.

264. *Anser anser* L. Сѣрый гусь.

Мензбиръ, I, 748 (*Anser cinereus*).

Казъ (татарск.).

Это — единственный гусь, гнѣздающійся въ Закавказье. На гнѣздахъ я нашелъ его по Курѣ, между Джеватомъ и Сальянами, и на Араксѣ. Въ сел. Енгикендѣ на Курѣ я видѣлъ молодыхъ гусей этого вида, ходившихъ съ домашними. По словамъ мѣстныхъ жителей, приручить ихъ окончательно не удается, и съ наступлениемъ осени они улетаютъ и присоединяются къ своимъ дикимъ собратіямъ. Зимою тысячными стада гусей держатся въ восточномъ Закавказье и пасутся по озимымъ хлѣбамъ, которымъ наносятъ сильный вредъ.

265. *Anser albifrons* Scop. Бѣлолобая казарка.

Мензбиръ, I, 734.

Джуръ казъ (татарск., по Шелковникову).

Въ громадномъ количествѣ зимуетъ въ восточномъ Закавказье. Большая стаи ихъ я видѣлъ въ Карайзахъ зимою 1904 года. 3. II. 95 я получилъ 2 экземпляра въ Арешскомъ у. въ имѣніи Шелковникова. 10. III. 96 наблюдалъ двѣ большія стаи на Соленомъ озерѣ близъ Тифлиса.

266. *Rufibrenta ruficollis* Pall.Мензбиръ, I, 730 (*Anser ruficollis*).

Зимою нерѣдокъ на каспийскомъ побережье у Ленкорани. У ленкоранского лѣсничаго П. О. Василевскаго я видѣлъ добытые здѣсь экземпляры. Громадными стадами держится зимою на озерахъ Мугани.

Подсем. *Cygninae*.267. *Cygnus* sp.? Лебедь.

Лебедь зимуетъ въ восточномъ Закавказье въ значительномъ количествѣ, держась по болѣе глубокимъ и отдаленнымъ отъ жилья озерамъ. По Шелковникову, держится зимою и въ Арешкомъ у. на озерахъ близъ с. Наметъ-Абатъ.

Къ сожалѣнію, я не знаю, къ какому виду относятся наблюдавшіеся мною и г. Шелковниковымъ лебеди.

Подсем. *Anatinae*.268. *Vulpanser tadorna* L. Пѣганская.Мензбиръ, I, 697 (*Tadorna cornuta*).

Пѣганская — осѣдлая птица восточнаго Закавказья, но встрѣчается здѣсь въ небольшомъ количествѣ.

Я наблюдалъ ее, обыкновенно парами, въ разныхъ мѣстахъ по Курѣ, въ болѣе значительномъ числѣ 9. III. 95 около Сальянъ. 14. II. 99 видѣлъ двѣ пары на Соленомъ озерахъ близъ Тифлиса. Въ 1900 г. одна пара гнѣздилась около этого озера, счастливо избѣгая обстрѣла многочисленными воскресными охотниками.

269. Casarca rutila Pall. Красная утка.

Мензбиръ, I, 702 (Tadorna rutila).

Ангутъ (татарск.); гагарка (у русскихъ охотниковъ).

Обыкновенная осѣдлая птица всего восточного Закавказья. Я встрѣчалъ ее въ большомъ количествѣ по Курѣ, въ Кубинскомъ уѣздѣ, всюду по дорогѣ отъ Сальянъ въ Ленкорань небольшими стайками, въ большомъ числѣ на Аджи - Кабульскомъ озерѣ (4. III. 99) и на Араксѣ. Татары часто держать молодыхъ красныхъ утокъ вмѣстѣ съ домашней птицей. 6. VI. 94 я видѣлъ въ сел. Бегманлы Джебраильского у. на Араксѣ молодую утку, которую мальчишки водили, привязавъ за ногу.

270. Anas boschas L. Кряква.

Мензбиръ, I, 681.

Яшылбашъ-ѣрдақъ (татарск., по Шелковникову).

Одна изъ самыхъ обыкновенныхъ утокъ всего Кавказского края. Гнѣздится въ большомъ количествѣ по берегамъ рѣкъ, озеръ и болотъ всего восточного Закавказья, Кубинского уѣзда, Закавказского илоскогорья; въ громадномъ количествѣ въ Гѣльской котловинѣ и на черноморскомъ побережї. Зимою количество кряквъ въ Закавказї значительно увеличивается прилетающими съ ѿвера. На пролетѣ встрѣчается высоко въ горахъ; такъ, я встрѣтилъ ее осенью на военно - грузинской дорогѣ близъ Крестового перевала.

271. Chaulelasmus streperus L. Сѣрая утка.

Мензбиръ, I, 677 (Anas strepera).

Мнѣ сѣрая утка попадалась въ Закавказї не часто, но, есть ли это дѣло случая, такъ какъ я мало охотился здѣсь за водяною дичью, или она здѣсь дѣйствительно рѣдка лѣтомъ, не знаю. На гнѣздовье я встрѣтилъ ее единственный разъ на островѣ Сари, гдѣ и убилъ пару 30. IV. 97.

Зимою она довольно обыкновенна здѣсь, судя по тифлисскому базару. Я встрѣчалъ ее въ это время по долинѣ Куры и видѣлъ убитыхъ въ Кааязахъ (22. X. 906).

272. Daphila acuta L. Шилохвостъ.

Мензбиръ, I, 690 (*Anas acuta* L.).

Шишъ-куйрюкъ-ёрдакъ (татарск., по Шелковникову).

Я встрѣчалъ эту утку только зимою по небольшимъ озерамъ восточнаго Закавказья и на морцахъ и истиляхъ Ленкоранскаго уѣзда. Въ это время года она здѣсь не рѣдка.

273. Mareca penelope L. Свіязь.

Мензбиръ, I, 693 (*Anas penelope*).

На охотѣ совмѣстно съ А. Б. Шелковниковымъ, на ноурѣ близъ сел. Наметъ-Абадъ Арешскаго уѣзда 4. II. 95 была убита одна утка этого вида. По словамъ г. Шелковникова, она зимуетъ здѣсь въ значительномъ количествѣ. Зимою она нерѣдка и въ Ленкоранскомъ уѣздѣ.

274. Spatula clypeata Briss. Широконоска.

Мензбиръ, I, 665 (*Anas clypeata*).

Я встрѣчалъ эту утку только зимою на низменности Ленкоранскаго уѣзда. По словамъ А. Б. Шелковникова, она попадается зимою, хотя и рѣже другихъ утокъ, и въ Арешскомъ уѣздѣ.

275. Pterocyanæa querquedula L. Чирокъ-трескунокъ.

Мензбиръ, I, 668 (*Anas circia*).

Страннымъ образомъ, мнѣ самому не приходилось здѣсь убивать чирка-трескунка. Я видѣлъ его, однако, и въ коллекціи ленкоранскаго лѣсничаго г. Василевскаго и у А. Б. Шелковникова. По словамъ послѣдняго, онъ зимуетъ въ Арешскомъ уѣздѣ.

276. Nettion crecca L. Чирокъ-свистунокъ.

Мензбиръ, I, 671 (*Anas crecca*).

Джиръ-ёрдакъ (татарск.).

Обыкновенная осѣдлая птица восточнаго Закавказья, столь же многочисленная здѣсь, какъ и кряква. На гнѣздовья я находилъ ее во всей долинѣ Куры и въ Ленкоранскомъ уѣздѣ. Зимою

онъ встрѣчается громадными стаями. Даже близъ самаго Тифлиса 26. XI. 95 я встрѣтилъ на Соленыхъ озерахъ и образовавшихся около нихъ отъ дождя лужахъ громаднѣйшую стаю этихъ утокъ.

277. Marmaronetta angustirostris Ménétr. Мраморная утка.

Мензбиръ, I, 674 (*Anas angustirostris*).

Гнѣздящаяся утка всей долины Куры (отъ Елисаветпольскаго уѣзда) и Ленкоранской низменности. Кажется, это единственная утка, отлетающая на зиму. По крайней мѣрѣ, я никогда не встрѣчалъ ее зимою, и не слыхалъ, чтобы она кѣмъ-нибудь была здѣсь найдена въ это время года.

Подсем. *Fuligulinae*.

278. Aithya ferina L. Красноголовый нырокъ.

Мензбиръ, I, 660 (*Fuligula ferina*).

Зимою въ большомъ количествѣ встрѣчается на побережье обоихъ морей.

279. Netta rufina Pall. Красноносый нырокъ.

Мензбиръ, I, 649 (*Fuligula rufina*).

Алма-башъ-ѣрдакъ (татарск., по Шелковникову).

Въ восточномъ Закавказье одна изъ обыкновеннѣйшихъ зимующихъ утокъ. Я наблюдалъ ее зимою на Соленыхъ озерахъ около Тифлиса, гдѣ эти нырки держались большими стаями на серединѣ озера. 5. II. 95 добылъ одинъ экземпляръ въ имѣніи А. Б. Шелковникова, въ Арешскомъ уѣздѣ.

280. Fuligula marilla L. Морской нырокъ.

Мензбиръ, I, 657.

Зимою встрѣчается на Каспійскомъ морѣ около Ленкорани. Я видѣлъ добытые здѣсь экземпляры морского нырка въ коллекціяхъ барона Б. Л. Тизенгаузена и П. О. Василевскаго.

281. Fuligula cristata Leach. Хохлатый нырокъ.

Мензбиръ, I, 652.

Зимуетъ въ восточномъ Закавказье, но встрѣчается довольно рѣдко. Я видѣлъ стайку хохлатой чернети 4. III. 99 на Аджи-Кабульскомъ озерѣ и спустя нѣсколько дней добылъ одинъ экземпляръ у Ленкорани. А. Б. Шелковниковъ находилъ ихъ зимою въ Арешскомъ у. близъ сел. Арабъ-Басра.

282. Glaucion clangula. Гоголь.

Мензбиръ, I, 641 (Fuligula clangula).

Зимою около Ленкорани гоголь очень обыкновененъ на морѣ.

283. Nyroca pygoca Guld. Бѣлоглазый нырокъ.

Мензбиръ, I, 646 (Fuligula pygoca).

Ноурузъ-ѣрдақъ (татарск., по Шелковникову).

Мнѣ не встрѣчался. Въ Ленкорани я видѣлъ въ коллекціяхъ мѣстныхъ любителей экземпляры бѣлоглазаго нырка, добытые здѣсь зимою. По А. Б. Шелковникову, весьма обыкновенная зимующая утка Арешскаго уѣзда.

284. Oidemia fusca L. Турпанъ.

Мензбиръ, I, 628 (Fuligula fusca).

Гнѣздится на большихъ озерахъ Закавказскаго края. Я нашелъ турпана на Гокчѣ и Табисцхури, гдѣ онъ и зимуетъ (9. XI. 906). 15. VIII. 96 бывшій консерваторъ Кавказскаго Музея Е. Г. Кѣнигъ нашелъ на озерѣ Табисцхури гнѣздо турпана съ 7 свѣжими яйцами. Оно было расположено въ травѣ на берегу озера. Здѣсь было много такихъ гнѣздъ, но всѣ они были уже пусты. Однако, фактъ такого поздняго гнѣзданья турпана на Табисцхури не единичный. Такъ, Ф. Ф. Каврайскій во время своей поѣздки для изслѣдованія рыболовства этого озера въ 1896 году нашелъ 15 августа на его островахъ много «разныхъ утокъ, сидѣвшихъ еще на яйцахъ», а другія плавали близъ берега съ только что вылупившимися утятами*.

* Каврайскій. Отчетъ о командировкѣ для изученія р. Куры etc. «Вѣстн. Рыбопромышл.», 1901, №№ 7 — 10, стр. 32 (отд. оттиска).

Подсем. *Erismaturinae*.

285. *Erismatura leucocephala* Scop. Савка.

Мензбиръ, I, 610.

Самъ я ни разу не встрѣчалъ савки, но видѣлъ экземпляры ея, добытые зимою у Ленкорани, въ коллекціи барона Б. Л. Тизенгаузена и экземпляръ, добытый лѣтомъ (14. VII. 93) на озеркѣ близъ сел. Халданъ Арешскаго у., въ коллекціи А. Б. Шелковникова. Это былъ старый самецъ.

Подсем. *Merginae*.

286. *Mergus albellus* L. Лутокъ.

Мензбиръ, I, 597.

Лѣтомъ я встрѣчалъ лутка на соленыхъ лужахъ (онѣ такъ мелки, что озерами ихъ назвать нельзя) Ставропольской губ., близъ Ачикулакской ставки *.

Зимующая птица восточнаго Закавказья. 4. III. 99 я видѣлъ большое количество лутковъ на Аджи-Кабульскомъ озерѣ. 5. III. 99 встрѣчалъ его массами между Сальянами и Ленкоранью. Въ громадномъ количествѣ встречается также на Мугани.

287. *Merganser serrator* L. Длинноносый крохаль.

Мензбиръ, I, 601 (*Mergus serrator*).

Въ декабрѣ 1898 г. я нашелъ на базарѣ нѣсколько экземпляровъ длинноносаго крохала, которые, по словамъ продававшихъ ихъ, были добыты въ окрестностяхъ Тифлиса.

288. *Merganser merganser* L. Большой крохаль.

Мензбиръ, I, 604 (*Mergus merganser*).

По словамъ Шелковникова, попадается въ Арешскомъ у. на весеннемъ пролетѣ. Мнѣ не встрѣчался.

* При совершенно аналогичныхъ условіяхъ я встрѣтилъ лутка лѣтомъ 1887 г. около озера Эльтонъ.

Отрядъ XI. Pelargiformes. Аистообразныя.

Сем. 46. Phoenicopteridae. Фламинго.

289. *Phoenicopterus roseus* Pall.

Мензбиръ, I, 756.

Я встрѣчалъ фламинго только зимою, когда онъ попадается довольно часто на каспійскомъ побережье, между устьями Куры и Ленкоранью и на соленыхъ озерахъ у Сальянъ. По разспроснымъ свѣдѣніямъ, фламинго и гнѣздится въ Закавказье, около Кизиль-агачского залива и въ Гиллинскихъ болотахъ на юго-восточномъ берегу озера Гокчи. Экспедиція Кавказскаго Музея въ 1905 г. въ августѣ мѣсяца уже не застала ихъ тамъ, но нашла слѣды несомнѣннаго ихъ тамъ пребыванія лѣтомъ.

Сем. 47. Ciconidae. Аистовыя.

290. *Ciconia ciconia* L. Бѣлый аистъ.

Мензбиръ, I, 771 (*Ciconia alba*).

Хаджи-ляйлехъ (татарск.).

Относительно Сѣвернаго Кавказа, въ виду существующаго по этому поводу разногласія между различными авторами, я считаю нужнымъ замѣтить, что ни въ Ставропольской губ., ни въ посѣщенной мною части Терской области аистовъ положительно нѣть. Направляясь отсюда по побережью Каспійскаго моря къ югу, мы въ первый разъ встрѣчаемся съ бѣлыми аистами въ южной, степной части Кубинскаго уѣзда. Здѣсь, въ селеніяхъ, расположенныхъ на низменности, уже часто встрѣчаются не только одиночныя гнѣзда, но и цѣлые колоніи ихъ до 5—6 штукъ. Гнѣзда помѣщаются здѣсь главнымъ образомъ на высокихъ деревьяхъ. Къ югу отсюда аистъ обыкновененъ во всемъ восточномъ Закавказье, гдѣ селится поблизости чалтыковъ и болотъ, доставляющихъ ему обильную пищу. Даже по долинамъ рѣкъ и чалтыкамъ онъ не поднимается въ горы сколько-нибудь высоко. Въ распространеніи его въ Закавказье замѣчается нѣкоторая спорадичность, почему я считаю полезнымъ подробно перечислить мѣстности, гдѣ онъ мною наблюдался. Въ Бакинскомъ и Шемахинскомъ уѣздахъ (кромѣ его прикуринской части) онъ мнѣ ни разу не попадался. Въ Джеватскомъ уѣздѣ и сѣ-

верной части Ленкоранского встрѣчается далеко не часто, въ не- сравненно меньшемъ числѣ, чѣмъ въ Кубинскомъ, а въ южной, лѣсистой части послѣдняго уѣзда онъ и вовсе мнѣ не попадался. Отъ прикаспійской полосы къ западу по долинѣ Куры и Аракса бѣлый аистъ становится все многочисленнѣе и очень обыкновенѣнъ въ уѣздахъ Арешскомъ, Джеванширскомъ, Шушинскомъ и Джебраильскомъ. Отсюда къ западу онъ встрѣченъ мною во множествѣ по всему ущелью Аракса и низовьямъ впадающихъ въ него рѣчекъ, на Эриванской равнинѣ и въ громадномъ количествѣ въ Гѣльской котловинѣ. Я не засталъ уже здѣсь бѣлыхъ аистовъ, такъ какъ прїѣхалъ туда позднею осенью, но о многочисленности ихъ въ этой мѣстности, помимо показаній мѣстныхъ жителей, свидѣтельствовала масса ихъ гнѣздъ на развалинахъ среди селеній, на крышахъ домовъ и на нарочно для нихъ выставленныхъ колесахъ, надѣтыхъ на шесты. На черноморскомъ побережїѣ я нигдѣ бѣлаго аиста не встрѣчалъ.

Каждая пара аистовъ всегда, какъ это хорошо извѣстно, возвращается на свое старое гнѣзда. Кладка яицъ начинается довольно поздно. А. Б. Шелковниковъ получилъ ненасижденныя яйца 11 и 12. IV.

Прилетаетъ аистъ очень рано, уже въ концѣ апрѣля или въ началѣ марта. Во время моего пребыванія въ Арешскомъ уѣздѣ въ 1895 году передовые аисты прилетѣли уже 11. II, но нормальное время прилета бываетъ здѣсь, по Шелковникову, отъ 23. II до 3. III. Замѣчено, что сперва прилетаютъ передовые, какъ бы развѣдчики, а за ними черезъ нѣкоторое время слѣдуетъ и валовой прилетъ.

5. VI. 96 я нашелъ на Кубинской низменности въ сел. Ханалугъ-оба въ гнѣздѣ аиста уже вполнѣ оперившихся дѣтей, а 29. V. 94 встрѣтилъ по дорогѣ изъ сел. Кочерли въ сел. Карабулагъ Джеванширского уѣзда аистовъ, уже летавшихъ выводками. Значитъ ли это, что въ Кубинскомъ уѣздѣ аисты выводятъ позднѣе или разно въ разные годы, изъ одного наблюденія вывести конечно, еще нельзя.

Когда происходитъ отлетъ аистовъ изъ восточнаго Закавказья, мнѣ наблюдать не приходилось, но въ Гѣльской котловинѣ меня единогласно увѣряли мѣстные жители, что они улетаютъ аккуратно между 15 и 20 августа. Дѣйствительно, въ концѣ мѣсяца ихъ тамъ уже не было.

Аистъ пользуется всеобщимъ уваженіемъ мѣстнаго населенія.

Въроятно, въ основѣ этого уваженія лежитъ то обстоятельство, что аистъ, отличаясь ужасною прожорливостью, истребляетъ массу гадовъ. Онъ поѣдаетъ мышей, черепахъ, лягушекъ, змѣй и т. п. А. Б. Шелковниковъ въ зобу и желудкѣ одного убитаго экземпляра нашелъ трехъ маленькихъ *Clemmys caspica*, четырехъ *Tropidonotus persa* и шесть лягушекъ.

О сожительствѣ бѣлаго аиста съ черногрудымъ (тростниковымъ) воробьемъ я говорилъ уже въ статьѣ о послѣднемъ видѣ.

291. *Ciconia nigra* L. Черный аистъ.

Мензбиръ, I, 777.

Кара-хаджи-ляйлехъ (татарск.).

Въ концѣ августа, 1894 г. я встрѣтилъ этотъ видъ въ большомъ числѣ на чалтыкахъ по Эриванской равнинѣ.

За исключеніемъ этого случая, я встрѣчалъ его только одиночными экземплярами или парами, всегда несравненно рѣже, чѣмъ бѣлаго аиста.

30. V. 99 я видѣлъ чернаго аиста на Терекѣ, близъ аула Гудермесъ; онъ летѣлъ высоко надъ лѣсомъ.

Въ Кубинскомъ у. видѣлъ пару около сел. Кѣльны 6. VI. 96. Нужно замѣтить, что черный аистъ, въ противоположность своему бѣлому собрату, не довѣряетъ человѣку и избѣгаетъ его. Гнѣздится онъ, повидимому, въ лѣсу, очень скрытно. Да же, я встрѣчалъ его въ Арешскомъ у. 2. III. 95, на Араксѣ, около Мендживанскаго поста, на отмели рѣки 19. VI. 94 и въ др. мѣстахъ восточнаго Закавказья. Въ Гельской котловинѣ я видѣлъ на Курѣ, представляющей здѣсь еще маленькую рѣчушку, одного чернаго аиста VIII. 902.

Сем. 48. *Plataleidae*. Колпицы.

292. *Platalea leucorodia* L. Колпица.

Мензбиръ, I, 767.

Ахджахоккаръ (татарск., по Шелковникову).

Колпица въ значительномъ количествѣ гнѣздится въ густыхъ камышовыхъ заросляхъ по среднему и нижнему теченію Куры и разливу Аракса на Мугани.

Въ любезно предоставленной мнѣ рукописи А. Б. Шелковникова имѣются слѣдующія интересныя наблюденія, относящіяся къ этой птицѣ.

«Держится тамъ же, гдѣ и *Ibis falcinellus*, но въ меньшемъ количествѣ. Лѣтомъ держится въ одиночку, но осенью передъ отлетомъ собирается въ громадную стаю. Тогда ихъ можно видѣть выстроившимися въ длинныя шеренги по грудь въ водѣ, добывающими себѣ кормъ. Гнѣздятся онѣ въ непроходимыхъ камышахъ среди глубокихъ болотъ. Гнѣзда расположено на 2—3 фута выше поверхности воды и состоятъ изъ группы растущаго отъ одного корня камыша, у котораго на одной высотѣ заломлены верхушки; такимъ образомъ, получается мѣсто для устройства непріхотливаго лотка около фута въ діаметрѣ, устланнаго тростникомъ и сухими листьями камыша. 4. V. 94 въ гнѣздахъ колпицъ, расположенныхъ близко одно около другого, было по 2—3 яйца еще не насиженныхъ. Кладка, видимо, не была еще окончена. Прилетаетъ колпица (въ Арешскій у.) въ концѣ марта или въ началѣ апрѣля».

Сем. 49. *Ibididae*. Ибисовыя.

293. *Ibis falcinellus* L. Каравайка.

Мензбиръ, I, 762.

Карабаштахъ, караназъ (татарск.).

Въ большомъ количествѣ встречается въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ и колпица, т. е. по озерамъ и болотамъ по Курѣ, на озерахъ Мугани и Ленкоранскаго у. Такъ какъ собственныхъ наблюдений, кромѣ того, что я видѣлъ эту птицу, у меня нѣть, я заимствую снова изъ рукописи А. Б. Шелковникова. «Для Арешскаго у. каравайка довольно обыкновенная гнѣздащаяся птица всюду, гдѣ есть болота, ноуры (озерки) или чалтыки, на которыхъ стан караваекъ находятъ обильную пищу. Я находилъ ихъ великое множество близъ сел. Наметъ-Абадъ на ноурахъ, гдѣ среди камыша, въ не-пролазной гущѣ и находится гнѣздовые этой птицы. Прилетаетъ она сравнительно поздно. Мои наблюденія относятся къ половинѣ апрѣля и до начала мая, въ зависимости отъ хода весны. Птица эта общественная. Иногда, на утреннихъ и вечернихъ перелетахъ для отысканія корма она собирается въ стаю отъ 20 до 100 штукъ и болѣе».

294. *Ibis religiosa* Cuv. Священный ибисъ.

Мензбиръ, I, 764.

Въ вопросѣ о томъ, какой ибисъ залетаетъ, вѣрнѣе — прежде залеталъ въ Закавказье, мнѣнія орнитологовъ расходятся.

Палласъ называетъ его *Numenius ibis* (священный ибисъ), но ставить синонимомъ *Tantalus ibis* (клювачъ). Нордманиъ отнесъ эти свѣдѣнія къ священному ибису, Кесслеръ — къ клювачу. Радде перепуталъ оба эти названія, называя священнаго ибиса *Tantalus ibis*, т. е. клювачемъ. Наконецъ, проф. М. А. Мензбиръ говоритъ, что затрудняется опредѣлить, къ какой птицѣ нужно отнести эти свѣдѣнія, но склоняется къ мнѣнію, что къ намъ залеталъ священный ибисъ. Порывшись въ старыхъ запискахъ барона Б. Л. Тизенгаузена, я нашелъ тамъ замѣтки, несомнѣнно подтверждающія мнѣніе проф. Мензира. Привожу ихъ безъ измѣненія.

«25 іюля 1874 года въ селеніи Арчеванъ (самая южная часть Ленкоранскаго уѣзда) Фараджъ-Арабъ-оглы (негръ, охотникъ владѣльца Астаринскаго магала Миръ-Тели-хана Талышинскаго, имѣніемъ котораго я въ то время управлялъ) принесъ какую-то птицу, которую назвалъ «имамъ - али - книга», что по-талышински означаетъ «птица пророка Алія». Птицу эту я видѣлъ первый разъ. Вся птица бѣлая, больше каравайки (*Ibis falcinellus*), но немного меньше колпицы (*Platalea leucogaster*): такая же бѣлая, какъ колпица, но только хвостъ гораздо болѣе пушистый, раскидистый; голова и шея до половины голыя, какъ у грифа; шершавая кожа темнаго, почти что чернаго цвета. Хвостовыя перья гораздо темнѣе всего оперенія. Клювъ и ноги гораздо толще, чѣмъ у каравайки; клювъ не-пропорциональный, въ верхней части своей толще, темно-черный; ноги темно-бурыя въ красноватыхъ колечкахъ, короче, но толще, чѣмъ у каравайки; глаза желтые. Хвостовыя перья вырваны и отосланы въ Ленкоранъ для шляпы госпожѣ П. Птица выброшена, такъ какъ препарировать было некому.

«23 іюля 1875 года, селеніе Ардуна Астаринскаго магала. Вслѣдствіе заявленія Фараджа (служащій при мнѣ) о кражѣ чалтычныхъ сноповъ, я отправился на ардунинскіе чалтыки (рисовыя плантациі), на которыхъ встрѣтилъ большую стаю караваекъ и въ числѣ ихъ бѣлу каравайку, на видъ похожую на ту, которая была убита негромъ Фараджемъ въ прошломъ году около селенія Арчеванъ. Вся эта стая караваекъ, въ томъ числѣ и бѣлая, слетѣла

по направлению къ Каладагнинскому морцу, куда былъ посланъ Егоръ съ приказаниемъ во что бы то ни стало добыть эту птицу.

«24 июля послѣ полудня явился Егоръ и принесъ бѣлую каравайку, которую ему удалось убить только сегодня, около завтрака (часовъ въ десять утра), потому что она была очень строга и близко не подпускала. Птица оказалась такою самою, какая была убита Фараджемъ-Арабъ-оглы, съ небольшою разницей въ опереніи. Больше обыкновенной каравайки, но ниже и меньшие колпика. Хвостъ пушистый, раскидистый, перья хвоста похожи на страусовыя, но гораздо грубѣе, голова и большая часть шеи голая и видомъ похожи на кожу голыхъ собакъ африканской породы, цвѣта темно-чернаго, подходящаго подъ цвѣтъ негра. Опереніе все бѣлое, кромѣ хвоста, который имѣеть темно-дымчатый цвѣтъ, переходящий къ концу въ черный. Клювъ и ноги гораздо толще, чѣмъ у каравайки; клювъ чернаго цвѣта, ноги черно-зеленаго съ красноватыми кольцами и короче, чѣмъ у каравайки, но гораздо толще. Боковые края крыльевъ свѣтло-дымчатые, глаза желтые. Молла Бунъять (мѣстный житель) называлъ эту птицу по-талышински «си-ни-локя», что означаетъ *бѣлая каравайка*, также «кечаласи-локя» (*паршивоголовая каравайка*). Мѣстные талышинцы были крайне недовольны тѣмъ, что была убита эта птица. Гаджи-Азисъ (старый слуга и мусульманскій писарь при талышинскихъ ханахъ, восьмидесяти семи лѣтъ) называлъ эту птицу «имамъ-али-кушъ», т. е. *птица пророки-имама Аля*, которую также называютъ «піамбаръ-кушъ» — *священная птица*; при этомъ онъ говорилъ, что въ старыя времена, времена его молодости, еще до взятія Ленкоранія (Ленкорань взята въ ночь съ 31 декабря 1812 г. на 1-е января 1813 года), птица эта прилетала въ Талышъ очень часто, что имамъ-али-кушъ прилетаетъ для успокоенія народа, и въ годы прилета всегда бывають хорошие урожаи всѣхъ произведеній, и въ эти годы болѣзней не бываетъ. Въ послѣднее время она стала являться очень рѣдко и въ самомъ маломъ количествѣ, потому что мусульмане стали забывать Бога и малоѣздить на богомолье въ Мекку, перемѣнили свои обычай, стали съять «русскій хлѣбъ», т. е. пшеницу и ячмень (до 1863 года въ Астаринскомъмагалѣ пшеницы и ячменя не съяли и довольствовались однимъ рисомъ). Также, по мнѣнію талышинцевъ, съ тѣхъ поръ, какъ имамъ-али-кушъ перестала посѣщать ихъ страну, начали болѣть и пропадать ихъшелковичные черви, такъ какъ раньше эти птицы уничтожали змѣй, которыхъ портятъ червей».

Мнѣ кажется, что эти описанія, сдѣланныя человѣкомъ, правда, страстно любившимъ природу, но не имѣвшимъ никакого понятія о существованіи священнаго ибиса и не знавшимъ никакого литературнаго описанія этой птицы, доказываютъ, безъ вся资料а сомнѣнія, что еще 30 лѣтъ тому назадъ въ Талышѣ залеталъ именно *Ibis religiosa*.

Сем. 50. *Ardeidae*. Цаплевыя.

295. *Botaurus stellaris* L. Выпь.

Мензбиръ, I, 781.

Вагхъ (татарск.).

Обыкновенна во всей низменности восточного Закавказья по камышовымъ зарослямъ, чалтыкамъ и болотамъ. Я встрѣтилъ ее также и на Эриванской равнинѣ и по мелкимъ притокамъ Аракса, какъ болотистый Кара-су около Аралыха.

По Шелковникову, она не только гнѣздится, но и зимуетъ въ Арешскомъ у. Мнѣ зимою она не попадалась.

296. *Ardetta minuta* L. Малая выпь.

Мензбиръ, I, 786 (*Botaurus minutus*).

Встрѣчается тамъ же, гдѣ и предыдущій видъ, но предпочитаетъ заросли камыша, перемѣшанныя съ кустарниками, какъ это часто бываетъ по берегамъ ленкоранскихъ морцовъ, гдѣ она и не составляетъ рѣдкости.

297. *Nycticorax nycticorax* L. Кваква.

Мензбиръ, I, 792 (*N. griseus*).

Вагхъ (татарск., по Шелковникову).

Во всемъ восточномъ Закавказїи кваква очень обыкновенна. Я встрѣчалъ ее въ Тифлисѣ, всюду отсюда внизъ по долинѣ Куры, около Сальянъ и въ Ленкоранскомъ уѣздѣ. Необходимое условіе ея мѣстопребыванія — древесная растительность около воды. Густыхъ зарослей ей не нужно, и ее часто можно встрѣтить на большихъ рѣдкихъ деревьяхъ около совершенно чистой, лишенной всякой мелкой береговой поросли рѣки.

Образъ жизни кваква ведеть совершенно ночной, но днемъ сидить на деревѣ хотя и неподвижно, но часто совершенно открыто. Вѣроятно, она въ это время плохо видить, такъ какъ подпускаеть на близкій выстрѣль. Въ Сальянахъ я убивалъ ее уже въ началѣ марта, но, зимуетъ ли она тамъ, не знаю. По словамъ А. Б. Шелковникова, она зимуетъ въ громадномъ количествѣ въ степныхъ болотахъ Шемахинскаго уѣзда. О гнѣзданіи кваквы этотъ наблюдатель говоритъ слѣдующее: «20. VI. 95, при посѣщеніи мною гнѣздовья *Ardea bubulcus*, я нашель и гнѣздо кваквы, уже покинутое птенцами, которые держались на близѣ расположенныхъ вѣткахъ, ростомъ мало отличались отъ родителей, но летать еще не могли. Гнѣзда *N. griseus* обыкновенно расположены на опушкѣ лѣса, нѣсколько въ сторонѣ отъ гнѣздъ другихъ цапель».

298. *Ardeola ralloides* Scop. Желтая чепура.

Мензбиръ, I, 796 (*Ardea comata*).

Довольно обыкновенна по среднему и нижнему теченію Куры, озерамъ и чалтыкамъ восточнаго Закавказья. Послѣ прорыва Аракса весною 1894 г. я во множествѣ наблюдалъ ее по разливу на пути изъ Джевата въ расположенные ниже по Курѣ селенія. А. Б. Шелковниковъ даетъ слѣдующія свѣдѣнія обѣ этой цаплѣ: «Какъ гнѣздащаяся птица, *A. comata* весьма обыкновенна для Арешскаго уѣзда. Днемъ держится въ одиночку, рѣдко парами по чалтыкамъ. Прилетаетъ въ началѣ апрѣля. Пищу ея составляютъ кузнецы, пауки, разныя личинки и мелкія лягушки. Мнѣ известно гнѣздовье этой цапли въ лѣсу близъ селенія Карадаглы-Шадарь. Тамъ ея гнѣзда въ небольшомъ числѣ разсѣяны между гнѣздами *Ardea bubulcus* и *A. gazetta*. Устроены они обыкновенно на ивахъ и тополяхъ. Гнѣзда по устройству очень походятъ на таковыя *A. bubulcus*. При моемъ посѣщеніи гнѣздовья 20. VI. 95, молодыя были уже настолько развиты, что могли перепархивать съ вѣтки на вѣтку».

299. *Bubulcus lucidus* Rafin. Египетская цапля.

Мензбиръ, I, 798 (*Ardea bubulcus*).

Я самъ видѣлъ эту цаплю очень рѣдко на разливѣ Аракса; А. Б. Шелковниковъ нашелъ ее во множествѣ въ Арешскомъ уѣзде и сообщаетъ о ней слѣдующее:

«Цапля эта въ Арешскомъ уѣздѣ является болѣе обыкновен-
ною, чѣмъ всѣ другіе виды. Изъ гнѣздовій ея мною изслѣдовано
одно громадное колоніальное гнѣздовье въ рощѣ сел. Карадаглы-
Падаръ близъ Агдаша, близъ самаго человѣческаго жилья. Почти
всѣ деревья этой рощи, состоящей изъ дубовъ, орѣховыхъ деревьевъ,
карагача, хурмы и тутовыхъ деревьевъ, на высотѣ 4—5 сажень
отъ земли имѣютъ гнѣзда, отъ 5 до 50 на одномъ деревѣ, смотря
по его вѣтвистости. Словомъ, гнѣзда расположены такъ густо, что
земля и трава въ рощѣ почти сплошь покрыты бѣловатыми экскре-
ментами. Гнѣзда устраиваются при развѣтвленіи трехъ и болѣе вѣ-
твокъ и состоятъ изъ мелкихъ прутиковъ, довольно прочно перепле-
тенныхъ между собою. Диаметръ гнѣзда отъ 16 до 20 дюймовъ, а
толщина отъ 10 до 14 дюймовъ. Лотокъ глубиною 2 дюйма и
8 дюймовъ въ диаметрѣ; подстилки никакой нѣтъ. Кладка содер-
житъ отъ 7 до 9 яицъ свѣтло-голубого цвѣта. Размѣры яицъ отъ
 50×35 mm. до 46×34 mm. Кладка яицъ начинается въ пер-
вой половинѣ апрѣля. Яйца, добытыя 25. IV. 95, частью были
болѣе или менѣе насыжены, частью же еще совсѣмъ свѣжи. Птенцы
начинаютъ вылупляться въ началѣ мая. При моемъ посѣщеніи
гнѣздовья 17. VII. 94 большая часть гнѣздъ была уже пуста. Изъ
остальныхъ же птицы перебрались на сосѣднія вѣтви, по которымъ
лазили съ изумительной ловкостью, помогая себѣ клювомъ и шеей.
Держатся онѣ на вѣтвяхъ стольочно, что стряхнуть ихъ почти
невозможно.

«Опереніе молодыхъ птицъ чисто бѣлаго цвѣта съ пробивающи-
щимися на головѣ между перьями пушинками. Клювъ темно-сини-
цово-чернаго цвѣта съ желтою вершиною. Голая кожа вокругъ глазъ
сѣрая. Радужина грязно-бѣлая. Ноги свинцово-сѣраго цвѣта съ
зеленымъ сочененіемъ голени съ плюсной. Размѣрами вылетѣвшіе
изъ гнѣзда экземпляры почти не отличаются отъ старыхъ.

«Цапля эта очень молчалива; лишь на гнѣздѣ старыя птицы
издаютъ рѣдкіе крики, похожіе на низкое «корр» или «курр». Мол-
одыя очень крикливы, но издаваемые ими звуки трудно поддаются
описанію: то они похожи на кваканье лягушки, то на карканье,
то на урчаніе кошки, прерываемое весьма рѣзкими высокими но-
тами. При вскрытии ихъ желудковъ, они оказывались переполнен-
ными кузнечиками, пауками, живущими въ водѣ личинками, жу-
ками и мелкими лягушатами. Но любимую ихъ пищу составляютъ
кузнечики, которыхъ иногда бываетъ въ желудкѣ до 100 и болѣе
штукъ.

«Внѣ гнѣзовья эта цапля громадными стаями, до 200—300 особей, пасется на чалтыкахъ, или же стайками въ 15—20 особей сопровождаетъ пасущихся въ болотахъ буйволовъ, отыскивая на нихъ спинѣ приставшихъ изъ грязи червячковъ и личинокъ, для чего онѣ по одной, по двѣ, по три садятся на спину буйвола, къ чему послѣдній относится совершенно равнодушно. 20. VI. 95 я снова посетилъ гнѣзовья *A. bubulcus*. Молодыя цапли были во всѣхъ стадіяхъ развитія, начиная отъ только что вылупившихся до вполнѣ развитыхъ летающихъ особей. Въ нѣкоторыхъ гнѣздахъ были еще сильно насиженныя яйца. Вообще кладка яицъ у этого вида тянется очень долго, и итенцы выводятся очень неравномѣрно».

300. *Herodias alba* L. Бѣлая цапля.

Мензбиръ, I, 803 (*Ardea alba*).

Акъ-кушъ (татарск.).

Обыкновенная гнѣздащаяся птица всего восточного Закавказья. Однако, нигдѣ не попадается она часто, и я постоянно встрѣчалъ лишь одиночные экземпляры. Наиболѣе многочисленна была она на разливѣ Аракса на Мугани въ 1897 г. Цапли эти весною безжалостно преслѣдуются татарами изъ-за длинныхъ бѣлыхъ головныхъ перьевъ, употребляемыхъ для приготовленія эгretокъ. Скупщики на мѣстѣ платили тогда около 60 р. за фунтъ этихъ перьевъ.

По Шелковникову, одиночные экземпляры остаются въ Арепскомъ уѣздѣ на зиму. Я встрѣчалъ ее зимою въ Ленкоранскомъ уѣздѣ.

301. *Gazetta gazetta* L. Чепура-нужда.

Мензбиръ I, 800 (*Ardea gazetta*).

Акъ-кушъ (татарск.).

Мнѣ попадалась тамъ же, гдѣ и предыдущіе виды, но въ небольшомъ числѣ. Я встрѣчалъ ее, однако, не только въ болотахъ, но въ Талышѣ очень часто и на лѣсныхъ рѣчкахъ, напр., на р. Астаринкѣ близъ сел. Алана на персидской границѣ.

А. Б. Шелковниковъ сообщаетъ относительно Арепского у. слѣдующія свѣдѣнія обѣ этой птицѣ:

«Въ Арепскомъ у. весьма обыкновенна, но лишь какъ лѣтняя птица. Зимою мнѣ ни разу не попадалась. Прилетаетъ къ намъ

въ первой половинѣ марта. Держится она или небольшими стайками, или по-парно и въ-одиночку. Держится и гнѣздится тамъ же, гдѣ и *A. bubulcus*. При моемъ посѣщеніи вышеописанного гнѣздувья цапель 20. VI. 95 молодыя птицы этого вида уже летали, а нѣсколько отставшихъ уже свободно перепархивали по вѣткамъ».

302. *Phoynx purpurea* L. Рыжая цапля.

Мензбиръ, I, 807 (*Ardea purpurea*).

Я встрѣтилъ эту цаплю осенью 1894 года въ болотѣ около озера Гокчи, гдѣ береть начало р. Занга, и на Эриванской равнинѣ по чалтыкамъ, а весною 1897 и 1898 гг. въ сѣверной части Ленкоранскаго у. Относительно Арещскаго у. А. Б. Шелковниковъ говорить слѣдующее: «Довольно обыкновенная гнѣздящаяся птица. Встрѣчается по-одиночкѣ, или по двѣ, по три, но въ большія стаи не сбивается. Вылетаетъ на добычу по вечерамъ *, днемъ же держится въ заросляхъ и камышахъ. Гнѣздо ея устроено совершенно такъ же, какъ и у колпицы, и представляетъ пучокъ растущаго камыша, у котораго на высотѣ 3—4 футовъ надъ водою камышинны заломлены на одномъ уровнѣ и образовано такимъ образомъ основаніе для лотка, устланнаго мелкимъ сухимъ тростникомъ и камышовыми листьями. Кладка содержитъ отъ трехъ до пяти яицъ, красиваго зеленовато-голубого цвѣта, которая при моемъ посѣщеніи гнѣздувья 4. V. 94 были уже частью насижены. У птицъ, убитыхъ 7. IV. 94, яичникъ былъ развитъ еще слабо. Пищу описываемой птицы, судя по содержанію желудка, составляютъ главнымъ образомъ мелкія пресмыкающіяся. Такъ, напримѣръ, у одной изъ нихъ въ желудкѣ оказались: 1 небольшая лягушка, 1 крупная расклеванная и 1 маленькая (въ 3 сант.) водяная черепаха. Кромѣ того онѣ ёдятъ разныхъ личинокъ, водящихъ въ водѣ».

303. *Ardea cinerea* Briss. Сѣрая цапля.

Мензбиръ, I, 811.

Это, безъ сомнѣнія, самая многочисленная цапля всего Кавказскаго края. Она найдена мною въ Кубинскомъ у., во всемъ восточномъ Закавказьѣ, въ ущельѣ Аракса, около озера Гокчи, на

* Въ вышеуказанныхъ мѣстахъ я наблюдалъ эту цаплю днемъ.
К. С.

Эриванской равнинѣ, въ Гёльской котловинѣ и на черноморскомъ побережье, гдѣ въ большомъ количествѣ все лѣто 1906 г. встрѣчалась на самомъ взморье, обществами до 20 особей. Она живетъ въ Закавказье осѣдо, и около самаго Тифлиса ее можно наблюдать на Курѣ всю зиму.

Отрядъ XII. *Steganopodes*. Веслоногія.

Сем. 51. *Phalacrocoracidae*. Баклановыя.

304. *Phalacrocorax carbo* L. Большой бакланъ.

Мензбиръ, I, 831.

Балыкъ-уданъ (татарск.).

Большой бакланъ въ громадномъ количествѣ обитаетъ побережья обоихъ морей и по большимъ рѣкамъ проникаетъ далеко вглубь перешейка. Въ восточномъ Закавказье онъ живетъ и по озерамъ и разливамъ далеко отъ Куры, напр., въ Арешскомъ у. Въ громадномъ количествѣ онъ живетъ и на озерахъ Гокчѣ. На сѣверной части западнаго берега Каспійскаго моря бакланы гнѣдятся, вѣроятно, на скалахъ, такъ какъ по-близости, наприм., Аишеронскаго полуострова, прибрежныя скалы котораго бывають сплошь покрыты бакланами, на далекомъ разстояніи вовсе нѣтъ лѣсовъ. Въ Ленкоранскомъ же уѣздѣ я находилъ огромныя гнѣздовыя колоніи баклановъ на такъ называемыхъ «истили». Истили — водные резервуары для снабженія водою чалтыковъ въ жаркое время года. Оригинальность этихъ резервуаровъ заключается въ томъ, что они представляютъ собою затопленные участки лѣса. На высокихъ деревьяхъ среди этихъ «истили» и устраиваютъ свои гнѣзда бакланы громадными колоніями. Такія колоніи я встрѣчалъ между селеніемъ Машханъ и моремъ.

Дорога идеть здѣсь по дамбѣ, проложенной черезъ затопленный лѣсъ, и колоніи совершенно недоступны. Онѣ по наружному виду очень похожи на грачины, и гнѣзда расположены на деревьяхъ такъ же густо, но, конечно, имѣютъ гораздо большую величину. Въ маѣ мѣсяцѣ, когда я наблюдалъ эту колонію, бакланы въ громадномъ количествѣ непрерывно летали между моремъ и этой колоніей, вѣроятно, таская пищу своимъ птенцамъ.

29. V. 97 я, сидя на террасѣ въ сел. Шахъ-Агачъ, сосчи-

таль, что въ теченіе пяти минутъ протянули надъ моремъ на гнѣздувье 72 баклана. Было около 2 час. дня.

Я наблюдалъ здѣсь, что они вылетали на охоту исключительно въ открытое море. Пища ихъ, какъ я могъ убѣдиться вскрытиемъ убитыхъ, состоитъ исключительно изъ рыбы. Въ сѣверной же части Каспійскаго моря я не разъ наблюдалъ, какъ они охотились, иногда вмѣстѣ съ пеликанами, двигаясь въ какой-нибудь мелкой бухтѣ полуокругомъ къ берегу. Бакланъ живетъ въ занимаемой имъ области осѣдо.

Самцы, убитые въ Арешскомъ у. въ началѣ февраля, имѣли прекрасный брачный нарядъ.

305. *Phalacrocorax pygmaeus* Pall. Малый бакланъ.

Мензбиръ, I, 827.

Я встрѣчалъ малаго баклана тамъ же, гдѣ и большого, но въ несравненно меньшемъ количествѣ.

Сем. 52. *Pelicanidae*. Пеликановыя.

306. *Pelicanus crispus* Brush. Кудрявый пеликанъ.

Мензбиръ, I, 819.

Кутанъ (татарск.).

Я встрѣчалъ кудряваго пеликаны въ громадномъ количествѣ по всему побережью Каспійскаго моря, особенно у устьевъ Куры и на ленкоранскихъ морцахъ, и по заросшимъ камышомъ озерамъ и болотамъ восточнаго Закавказья, гдѣ онъ также гнѣздится. А. Б. Шелковниковъ даетъ слѣдующее интересное описание гнѣздувья кудряваго пеликаны въ Арешкомъ уѣздѣ: «Прилетаетъ кудрявый пеликанъ рано. 9. III. 39 большая стая этихъ пеликановъ уже кружилась надъ своими гнѣздувьями на Наметь-Абатскомъ ноурѣ (озерѣ). Въ 1896 году первые пеликаны, въ числѣ 10 особей, появились здѣсь 15. II. 4. V. 94 я постыль ихъ гнѣздувье. Гнѣзда были расположены посрединѣ глубокаго густо заросшаго камышомъ болота. Послѣ почти часовой утомительной ходьбы по пояснице въ водѣ я добрался до ихъ гнѣздувья, расположенного на открытомъ, не

заросшемъ камышомъ участкѣ болота. Здѣсь, на высотѣ около аршина надъ водою, высилаась плотина неправильной формы, пло- щадью около двухъ квадратныхъ саженей. Образована была эта плотина изъ заломанныхъ и переплетенныхъ между собою концовъ тростника, поверхъ котораго была положена грубая настилка. Вся поверхность ея была густо покрыта, точно оштукатурена, экскрементами птицы. Невдалекѣ виднѣлись другая и третья плотины. Онѣ свободно держать двухъ человѣкъ. При моемъ приближеніи улетѣли 17 старыхъ пеликановъ, а когда я вышелъ на открытое мѣсто, то съ плотинъ грунно начали шлепаться въ воду и молодые, сидѣвшіе на нихъ до тѣхъ поръ. Собравшись въ группу около 50 особей, они сбились у начала камышей, шагахъ въ 50 отъ меня. При дальнѣйшемъ же моемъ приближеніи молодые стали издавать густой басовой ревъ и старались скрыться въ густыхъ камышахъ. При этомъ они помогали себѣ необросшими еще крыльями и длинною шеей, которою цѣплялись за растущіе впереди тростники и затѣмъ подтягивались впередъ. Но они были еще настолько не- укуложи, что настигнуть и поймать ихъ не стоило большого труда. Птенцы были покрыты пухомъ и имѣли отъ вершины клюва до начала хвоста около двухъ футовъ. Были и болѣе мелкие и слабые экземпляры.

«Болото, на которомъ было расположено это гнѣздовье, питалось сточными изъ оросительныхъ канавъ водами и изобиловало сазанами, которые и доставляли обильную пищу пеликанамъ.

«На полетѣ птица эта очень легка и, поднимаясь въ воздухъ спиральами, забирается на громадную высоту. Къ гнѣздамъ старыя птицы спускались тоже кругами».

Отрядъ XIII. Colymbiformes. Гагарообразныя.

Сем. 53. Podicipedidae. Чомговыя.

307. *Podiceps cristatus* L. Большая поганка.

Мензбиръ, I, 5.

Эта поганка живеть въ восточномъ Закавказье осѣдло, но зимою количество ихъ здѣсь увеличивается прилетными съ сѣвера. ^

Я наблюдалъ этотъ видъ на морѣ около Ленкорани въ апрѣль 1897-го года, но уже и въ это время, какъ и все лѣто,

она держится столь скрытно, что увидѣть ее можно лишь случайно. По Шелковникову, гнѣздится въ Арешскомъ уѣздѣ; я видѣлъ экземпляръ убитой здѣсь, именно на разливѣ около Халдана 9. V. 95.

308. *Podiceps griseigena* Bodd. Сѣрощекая поганка.

Мензбиръ, I, 13.

По Шелковникову, гнѣздится въ Арешскомъ уѣздѣ, что подтверждается экземпляромъ, убитымъ 9. V. 95 на разливѣ у Халдана. 14. V. 906 я наблюдалъ этотъ же видъ на озерѣ Лиси у Тифлиса, — слѣдовательно, она гнѣздится и здѣсь.

309. *Podiceps nigricollis* C. L. Brehm. Упастая поганка.

Мензбиръ, I, 24.

Я видѣлъ двухъ самцовъ и самку, убитыхъ 9. V. 95 на разливѣ у Халдана. По словамъ Шелковникова, эта поганка гнѣздится въ Арешскомъ уѣздѣ. Вышеупомянутые экземпляры были въ брачномъ нарядѣ. Желудки ихъ были набиты растительными веществами, среди которыхъ попадались и остатки водяныхъ жуковъ.

310. *Podiceps minor* Briss. Малая поганка.

Мензбиръ, I, 21.

Обыкновенная осѣдлая птица восточного Закавказья. Я встрѣтилъ ее въ большомъ количествѣ на озерахъ около Тифлиса, особенно на озерѣ Лиси. А. Б. Шелковниковъ наблюдалъ ее въ Арешскомъ уѣздѣ.

Сем. 54. *Colymbidae*. Гагаровыя.

311. *Colymbus arcticus* L. Чернозобая гагара.

Мензбиръ, I, 36.

Добытые зимою экземпляры чернозобой гагары я видѣлъ въ Ленкорани у мѣстныхъ любителей. Эта гагара иногда попадается и внутри страны: такъ, въ мартѣ 1891 г. она была добыта въ Елисаветпольской губ. близъ ст. Евлахъ.

К. А. Сатунинъ.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00703 2170